Karl A. Geyer.

CAROLI LINNÆI,

EQUITIS STELLAE POLARIS, ARCHIATRI REGII, PROF. MED. ET REI HERB. IN UNIVERS. UPSAL.

Linnean
QK41.
C616
1825
v.2

SYSTEMA VEGETABILIUM.

EDITIO DECIMA SEXTA,

CURANTE

CURTIO SPRENGEL,

EQUITE STELLAE POLARIS ET AQUILAE RUBRAE, PROF. MED. ET REI HERB. IN UNIVERS. HAL.

VOLUMEN II.

CLASSES 6—15.

GOTTINGAE,

SUMTIBUS LIBRARIAE DIETERICHIANAE.

1825.

SYSTEMA
VEGETABILIUM.

VOLUMEN SECUNDUM.

CLASSIS VI.

HEXANDRIA.

MONOGYNIA.

I. *Palmae, floribus ſpathaceis.*

1156. *Calamus.* Perianth. utrumque 3phyllum. Stylus 3fidus. Bacca loricata 3ſperma. Embryo baſilaris.

1157. *Licuala* Thunb. Perianth. utrumque 3partitum. Stamina in urceolum connata. Stylus ſimplex. Drupa 1ſperma. Embryo lateralis.

1158. *Taliera* Mart. Cal. 3fidus. Cor. 3petala. Stamina baſi connata. Stylus ſimplex. Baccae 3 1ſpermae. Embryo verticalis.

1159. *Mauritia* L. fil. Flores polygami. Cal. 3fidus. Cor. 3petala vel 3partita. Antherae lineares erectae. Stigma 3lobum. Bacca teſſellato-corticata 1ſperma. Embryo lateralis.

1160. *Geonoma* W. Flores diclini, alveolis racheos immerſi. Cal. 3ſepalus. Cor. 3petala vel 3partita. Stam. ex urceolo dentato, dentibus ſingulis diantheris. Stylus lateralis vel baſilaris. Bacca 1ſperma. Embryo baſilaris vel lateralis.

1161. *Kunthia* Humb. Flores monoeci. Cal. 3partitus. Cor. 3petala. Filamenta libera. Bacca 1ſperma. Embryo baſilaris.

1162. *Acrocomia* Mart. Flores monoeci foveis immerſi. Cal. 3ſepalus. Cor. 3petala. Drupa 1ſperma, putamine lateribus 3poro. Embryo lateralis intra porum.

1163. *Aſtrocaryon* Meyer. Flores monoeci, ♂ foveolis immerſi, ♀ infra ſpicas ♂ ſolitarii. Cal. 3partitus. Cor. 3partita. Drupa fibroſa 1ſperma, 3pora. Embryo intra porum.

1164. *Thrinax* L. fil. Flores ☿. Cal. 1ſepalus 6dentatus. Cor. 0. Antherae lineares. Stigma infundibuliforme. Bacca 1ſperma. Embryo baſilaris?

II. *Bromelieae, ſpathis perianthioque duplici inſtructae.*

1165. *Bromelia.* Cal. 3partitus corolla brevior. Cor. 3partita ſtaminifera. Bacca infera 3locularis polyſperma.

1166. *Guzmannia* R. et P. Cal 3ſepalus inferus. Cor. 3petala convoluta. Stamina receptaculo inſerta. Stigmata 3. Capſ. 3locularis 3valvis.

1167. *Aechmea* R. et P. Cal. duplex 3ſepalus, exter. inferus, int. ſuperus. Cor. 3petala baſi ſquamis inſtructa, ante anthefin convoluta. Stigma 3lobum. Capſ. 3locularis 3valvis.

1168. *Pitcairnia* Herit. Ait. Cal. 3partitus inferus. Cor. 3partita basi squamis instructa. Stigmata 3. Capf. 3locularis. Semina subalata.

1169. *Pourretia* R. et P. Cal. 3partitus inferus. Cor. 3partita, basi nuda. Stigmata 3. Capf. 3locularis. Semina nuda.

1170. *Tillandsia*. Cal. 3partitus inferus. Cor. 3partita. Capf. 3valvis. Semina pappofa.

1171. *Cartonema* R. Br. Cal. 3partitus acutus inferus. Cor. 3petala. Stamina receptaculo inserta. Stigma barbatum. Capf. 3locularis, loculis 2spermis.

1172. *Acanthospora* *. Cal. 2sepalus inferus. Cor. 3petala convoluta. Stigmata 3 fimbriata. Capf. 3locularis. Semina funiculo setaceo ad placentam 3alatam fixa.

III. *Haemodoreae.*

1173. *Barbacenia* Vand. Cal. corollinus infundibuliformis 6fidus extus glandulofo-pilofus. Filamenta tubo corollae inserta 2fida dorfo antherifera. Capf. 3locularis polyfperma.

1174. *Conostylis* R. Br. Cal. corollinus fuperus lanatus. Stamina tubo inserta, antherae anticae. Capf. 3locularis polyfperma apice dehifcens, ftylo coronata.

1175. *Schwägrichenia* *. Cal. corollinus fuperus tubulofus extus hifpidus, laciniis fubfecundis. Stamina fauci inserta afcendentia, antherae erectae. Capf. 3locularis polyfperma apice dehifcens, ftylo deciduo.

1176. *Lanaria* Ait. Cal. corollinus fuperus extus plumofo-lanatus. Filamenta tubo inserta, antherae incumbentes. Capf. 3locularis oligofperma.

1177. *Lophiola* Ker. Cal. corollinus inferus bracteatus barbatus. Stamina hypogyna. Capf. 3locularis polyfperma.

1178. *Phlebocarya* R. Br. Cal. corollinus fuperus 6partitus imberbis. Stamina fauci inserta. Antherae 4gonae fubfeffiles. Stigma fimplex. Nux corticata coronata 1fperma.

IV. *Spathaceae.*

1. *Fructus fuperi.*

* *Perianthium duplex.*

1179. *Mnafium* Schreb. Spatha 2valvis multiflora. Perianth. ext. 3partitum lanceolatum, int. 3lobum abbreviatum cum ftaminibus connatum. Stigmata convoluta. Ovaria 3 globofa.

1180. *Pollia* Thunb. Spathae breves bracteiformes. Perianth. ext. obtufum, int. acuminatum. Stamina receptaculo inserta. Bacca globofa polyfperma.

1181. *Tulbaghia*. Perianth. ext. infundibuliforme 6partitum, int. 3lobum, lobis 2fidis, aut 3phyllum, 6dentatum. Antherae feffiles 2feriales ad internam perianthii int. paginam. Capf. 3locularis, feminibus 3quetris.

1182. *Albuca*. Perianth. ext. patulum calycinum, int. fornicatum apice fubglandulofum. Stamina fubinde abortientia incraffata. Stigma 3quetrum pyramidatum.

1183. *Maffonia*. Perianth. ext. 6petalum patulum: int. tubulofum, dentibus ftaminiferis. Capf. 3alata.

** *Perianthium simplex.*

1184. *Agapanthus* Herit. Cor. regularis infundibuliformis. Stamina declinata tubo inserta. Caps. 3locularis elongata. Semina hinc alata.

1185. *Ornithogalum*. Cor. 6petala patens. Filamenta basi dilatata receptaculo inserta. Caps. 3locularis. Embryo axilis.

1186. *Allium*. Cor. 6petala patens. Filamenta vel aequalia petalorum basi inserta, vel basi dilatata subconnata, vel 3cuspidata. Caps. 3locularis. Embryo eccentricus.

1187. *Sowerbaea* Sm. Cor. 6petala patens persistens. Stamina basi petalorum inserta, alterna abortientia. Caps. 3locularis, seminibus binis peltatis in quovis loculo.

1188. *Bulbocodium*. Cor. infundibuliformis, tubo elongato. Stamina unguibus laciniarum inserta. Stigma 3fidum. Caps. trigona.

1189. *Blandfordia* Sm. Cor. tubulosa, limbo 6lobo. Stamina tubo inserta. Antherae basi excavatae. Caps. prismatica 3partibilis: semina pubescentia marginibus futurae affixa.

1190. *Funkia* *. Cor. campanulata subringens. Stamina declinata basi corollae inserta. Caps. 3locularis: semina arillata, embryonibus pluribus.

1191. *Yucca*. Cor. campanulata 6fida. Filamenta clavata. Ovarium 3quetrum staminа excedens. Caps. carnosa 6locularis.

1192. *Pontederia*. Cor. 6fida ringens. Stamina tria longiora ori, tria basi corollae inserta. Stylus declinatus. Caps. carnosa 3locularis.

2. *Fructus inferi.*

* *Perianthium duplex.*

1193. *Narcissus*. Perianth. ext. regulare 6fidum patens, int. tubulosum, limbo crenulato, dentato aut lobato. Stamina inaequalia tubo adnata. Stigma 3lobum. Caps. 3locularis.

1194. *Calostemma* R. Br. Perianth. ext. tubulosum, limbo 6fido erecto, int. tubulosum, ore dentato, dentibus alternis antheriferis. Bacca sphaerica sub-1sperma.

1195. *Pancratium*. Perianth. ext. infundibuliforme, limbo 6fido patente, int. tubulosum vel dentibus marginis, vel interna pagina staminiferum. Caps. 3locularis polysperma.

1196. *Galanthus*. Perianth. utrumque 3petalum, int. brevius emarginatum. Stamina brevia receptaculo inserta. Antherae apice setaceae. Caps. 3locularis; seminum strophiolo membranaceo.

** *Perianthium simplex.*

1197. *Leucoïum*. Cor. 6petala campanulata regularis, petalis apice incrassatis. Antherae 2loculares apice dehiscentes. Stylus clavatus. Caps. 3locularis.

1198. *Amaryllis*. Cor. 6partita subregularis vel ringens, fauce nuda vel squamis coronata. Stamina declinata vel recta. Caps. 3locularis.

1199. *Crinum*. Cor. 6partita subregularis, laciniis apice uncinatis. Stamina recta tubo inserta. Caps. 3locularis.

1200. *Eucrosia* Ker. Cor. 6partita ringens, tubo brevissimo. Stamina declinata monadelpha exserta. Caps. 3locularis.

1201. *Haemanthus.* Spatha multivalvis multiflora. Cor. 6partita. Bacca ſub-3ſperma.
1202. *Sternbergia* Kit. Spatha 1flora. Cor. 6partita ſubregularis. Stamina baſi laciniarum inſerta. Antherae 4loculares. Stigma 3gonum. Capſ. 3locularis. Semina ſtrophiolata.
1203. *Strumaria* Jacqu. Cor. infundibuliformis 6fida regularis. Stamina tubo inſerta. Piſtillum baſi incraſſatum. Stigma 3fidum. Capſ globoſa 3locularis: ſemina compreſſa.
1204. *Cyrtanthus* Ait. Cor. tubuloſo-clavata incurva, limbo 6fido abbreviato. Stamina tubo inſerta. Semina membrana laxe involuta.
1205. *Euſtephia* Cav. Spatha 4valvis. Cor. tubuloſa 6partita. Stamina 3cuſpidata tubo inſerta.
1206. *Hypoxis.* Spathae bracteiformes. Cor. 6partita plana extus calycina perſiſtens. Diſcus nectariferus ſtaminifer. Stigmata 3. Capſ. 3locularis non dehiſcens. Sem. globoſa, ſtrophiolo roſtrato.
1207. *Curculigo* Gärtn. Cor. hypocrateriformis, tubus perſiſtens ſtylo accretus. Stigmata 3. Bacca oligoſperma, ſtrophiolo roſtrato.

V. *Liliaceae.*

1. *Fructus ſuperi triloculares.*

1208. *Lilium.* Cor. campanulata 6partita regularis, ſulcis nectariferis in laciniis. Capſ. 6ſulca, valvis reticulo fibroſo nexis: ſemina compreſſa.
1209. *Tulipa.* Cor. 6petala campanulata, baſi nuda. Stylus 0. Stamina receptaculo inſerta.
1210. *Fritillaria.* Cor. 6petala baſi nectarifera. Semina compreſſa marginata.
1211. *Erythronium.* Cor. 6petala campanulata, limbo reflexo: petalis tribus interioribus baſi 2calloſis. Capſ. valvis placentiferis.
1212. *Adamſia* W. Cor. 1petala 6partita. Coronula faucis 6dentata. Filamenta breviſſima. Stigma ſimplex.
1213. *Glorioſa.* Cor. 6petala, petalis elongatis reflexis. Stylus declinatus ſtigmate 3lobo. Semina globoſa.
1214. *Hemerocallis.* Cor. 6partita campanulata. Stamina baſi corollae inſerta declinata. Semina globuloſa.
1215. *Hyacinthus.* Cor. 6fida regularis. Stamina tubo inſerta. Ovarium glandulis tribus nectariferis. Loculi capſulae oligoſpermi.
1216. *Muſcari* Desf. Cor. globoſo-ovata ſ. cylindrica, fauce conſtricta, limbo abbreviato 6dentato.
1217. *Scilla.* Cor. ſubrotata. Stamina aequalia baſi petalis adnata. Semina globoſa.
1218. *Aloë.* Cor. tubuloſa baſi nectarifera, limbo 6fido regulari aut 2labiato. Stamina receptaculo inſerta. Placenta centralis a valvis formata. Semina 3quetra vel compreſſa margine alato.
1219. *Lomatophyllum* W. Cor. 6petala baſi ficca in tubum connivens. Stamina receptaculo inſerta. Placenta centralis, valvis diſcretis.
1220. *Tritoma* Ker. Cor. 1petala 6dentata. Stamina receptaculo inſerta, alterna longiora, exſerta.
1221. *Aletris.* Cor. infundibuliformis rugoſa farinoſa. Stamina baſi corollae inſerta. Stylus diviſus.

1222. *Veltheimia* Gled. Cor. tubulosa 6dentata. Stamina tubo inserta. Capsula Salata, loculis 2spermis.
1223. *Drimia* Jacqu. Cor. brevissime tubulosa 6partita, laciniis revolutis. Stamina basi corollae inserta. Stigma capitatum.
1224. *Millea* Cav. Cor. infundibuliformis, limbo 6partito. Antherae fauci insertae. Germen pedicellatum.
1225. *Polianthes*. Cor. infundibuliformis, limbo 6partito. Stam. tubo inserta. Sem. plana.
1226. *Eucomis* Herit. Cor. subrotata regularis. Filamenta nectario adnata. Sem. ovata.
1227. *Eriospermum* Jacqu. Cor. campanulata 6petala. Filamenta basi dilatata. Sem. lana obvoluta.
1228. *Phormium*. Cor. 6petala: petala ext. calycina breviora, int. conniventia. Stam. receptaculo inserta corolla longiora. Capsl. torta elongata.
1229. *Lachenalia* Jacqu. Cor. 6petala: petala int. longiora. Stam. erecta. Capsl 3alata. Sem. globosa.
1230. *Uropetalum* Ker. Cor. 6partita, laciniis ext longioribus calycinis subcaudatis, int. conniventibus. Stam tubo inserta. Sem. plana.
1231. *Cyanella*. Cor. 6petala, petalis 3 int. propendentibus. Stam. inf. declinata. Anthera unica maxima.

2. *Fructus inferi triloculares.*

1232. *Agave*. Cor. tubulosa, limbo 6partito. Stam. tubo inserta. Capsl. 3gona polyspermа.
1233. *Doryanthes* Corr. Cor. 6partita. Filamenta corolla breviora. Antherae erectae basi excavatae. Stylus 3sulcus 6partibilis. Sem. 2serialia.
1234. *Alströmeria*. Cor. 6partita subbilabiata extus calycina, laciniis duabus basi nectariferis. Stam. basi corollae inserta declinata. Capsl. 6angularis. Sem globosa.

3. *Bacca infera.*

1235. *Gethyllis*. Cor. 6fida tubo gracili elongato radicali. Stam. subtriadelpha. Antherae contortae. Bacca 1locularis polysperma.

VI. *Asphodeleae.*

1. *Capsulares.*

1236. *Asphodelus*. Cor. patula. Filamenta basi fornicata. Sem. 3quetra.
1237. *Eremurus* M. B. Cor. 6petala post anthesin involuta. Stam. impubera intra corollam conduplicata, effoeta longissime exserta. Stylus fecundatus reflexus.
1238. *Anthericum*. Cor. patens decidua. Filamenta filiformia receptaculo inserta. Stylus declinatus. Ovarii sulci nectariferi.
1239. *Bulbine* W. Cor. patens decidua. Filamenta barbata.
1240. *Arthropodium* R. Br. Cor. patens, petalis interioribus undulatis. Filamenta geniculata barbata. Antherae basi emarginatae. Capsl. 3locularis oligospermа.
1241. *Chlorophytum* Ker. Cor. patens 6partita persistens. Filamenta filiformia. Capsl. 3loba, lobis venosis.

1242. *Caesia* R. Br. Cor. patens decidua. Filamenta imberbia utrinque angustata. Semina ventricosa strophiolata.
1243. *Tricoryne* R. Br. Cor. patens decidua. Filamenta barbata. Capsl. 3 evalves 1spermae clavatae.
1244. *Thysanotus* R. Br. Cor. 6partita patens, laciniis interioribus latioribus fimbriato-ciliatis. Stam. hypogyna declinata. Antherae inaequales. Capsl. 3locularis: semina bina strophiolata.
1245. *Narthecium* Möhr. Cor. 6partita persistens. Filamenta barbata. Capsl. 3locularis. Sem. lanceolata utrinque processibus filiformibus.
1246. *Czackia* Andrz. Cor. 6petala subcampanulata. Stam. declinata. Stigma 3lobum. Capsl. 3locularis 6gona. Sem. angulata.
1247. *Conanthera* R. et P. Cor. supera 6petala, reflexa, petalis alternis inaequalibus. Antherae in conum coalitae. Filamenta subglandulosa. Capsl. 3locularis oligosperma.
1248. *Laxmannia* R. Br. Cor. 6partita persistens. Filamenta subulata glabra basi corollae inserta. Antherae peltatae. Capsl. 3locularis. Sem. subsolitaria peltata.
1249. *Baumgartenia* *. Cor. bracteata infundibuliformis, limbo 6partito. Stam. fauci inserta. Capsl. bracteis inclusa 3locularis.
1250. *Xanthorrhoea* Sm. Cor. bracteata 6partita, laciniis interioribus conniventibus. Stam. basi corollae inserta glabra exserta. Capsl. lignea 3locularis, seminibus subsolitariis compressis.
1251. *Herreria* R. et P. Cor. rotata 6partita. Stigma 3quetrum. Capsl. 3alata 3locularis. Sem. alata.

2. *Bacciferae*.

1252. *Dianella* Lam. Cor. 6partita decidua. Filamenta incurva apice incrassata stuposa. Antherae lineares basi insertae. Bacca globosa polysperma.
1253. *Dracaena*. Cor. 6partita. Filamenta medio incrassata corollae inserta. Stigma 3fidum. Bacca 3locularis, loculis 2spermis.
1254. *Sanseviera* Thunb. Cor. tubulosa, limbo revoluto 6fido. Filamenta fauci imposita filiformia. Bacca 3locularis, loculis 1spermis.
1255. *Luzuriaga* R. et P. Cor. 6partita aequalis decidua. Stamina basi laciniarum inserta, filamentis filiformibus apice incurvis, antheris sagittatis filamenta superantibus. Bacca oligosperma.
1256. *Eustrephus* R. Br. Cor. 6partita, laciniis interioribus fimbriatis. Filamenta breviss ima hypogyna. Bacca 3locularis, seminibus strophiolatis.
1257. *Asparagus*. Cor. 6partita decidua. Stamina basi corollae inserta. Antherae basi emarginatae. Bacca sub-3locularis oligosperma.

VII. *Sarmentaccae*.

1258. *Convallaria*. Cor. tubulosa, limbo 6fido. Filamenta tubo adnata. Bacca supera 3locularis, loculis oligospermis.
1259. *Smilacina* Desf. Cor 6petaloidea rotata s. stellata. Filamenta perigyna. Bacca 3locularis.
1260. *Ophiopogon* Ker. Cor. semisupera urceolata. Antherae sessiles. Bacca 1-3sperma.
1261. *Ledebouria* Roth. Cor. 6petala connivens persistens. Filamenta petalorum basi inserta. Stigma simplicissimum. Utriculi 3 1spermi.

1262. *Burchardia* R. Br. Cor. 6petala patens, unguibus foveola nectarifera. Stamina basi petalorum inserta. Antherae peltatae. Stylus 3fidus. Capſ. 3locularis polyſperma.

1263. *Schelhammera* R. Br. Cor. 6petala campanulata, petalis unguiculatis ſtaminiferis. Antherae poſticae. Stigmata 3. Capſ. 3locularis oligoſperma. Sem. ventricoſa.

1264. *Uvularia*. Cor. 6partita campanulatą, foveis nectariferis in basi corollae. Filamenta breviſſima. Stigmata 3 revoluta. Capſ. 3valvis, valvis ſeptiferis. Semina globoſa ſtrophiolata.

1265. *Streptopus* Mx. Cor. 6partita campanulata, laciniis basi nudis. Stigma ſimplex. Bacca 3locularis, ſemina umbilico nudo.

1266. *Drymophila* R. Br. Cor. 6petala decidua. Stamina hypogyna. Stylus 3partitus, ſtigmatibus revolutis. Bacca 3locularis polyſperma.

1267. *Phileſia* Juſſ. Cor. 6petala, petalis interioribus longioribus. Stigma 3lobum. Bacca ſupera polyſperma.

1268. *Callixene* Juſſ. Cor. 6petala, petalis alternis basi 2glandulo-ſis. Filamenta basi dilatata. Bacca ſupera polyſperma.

1269. *Xerophyta* Juſſ. Cor. 6partita, laciniis exterioribus angu-ſtioribus. Stigma clavatum. Capſ. infera 3locularis polyſperma.

1270. *Lapageria* R. et P. Cor. 6petala, petalis interioribus latio-ribus. Stigma clavatum. Bacca ſupera 1locularis polyſperma. Semina 3ſerialia.

1271. *Ripogonum* Forſt. Cor. 6partita bracteata. Stamina elongata Stigma 3lobum. Bacca ſub-1ſperma.

1272. *Smilax*. Flores dioeci. Cor. 6partita perſiſtens. Stylus breviſſimus. Stigmata 3. Bacca ſub-3ſperma.

1273. *Oncus* Lour. Cor. campanulata 6fida bracteata. Stamina breviſſima. Stylus 3partitus, ſtigmatibus 2fidis. Bacca 3locularis polyſperma.

1274. *Peliosanthes* Andr. Cor. rotata ſupera 1petala 6loba, fauce fornicata antheras fovens. Antherae ſeſſiles didymae. Baccae 3 clavatae 1ſpermae.

VIII. *Junceae*.

1275. *Juncus*. Perianth. glumaceum 6partitum 2bracteatum. Stamina hypogyna 3 vel 6. Stigmata 3 plumoſa. Capſ. 3locularis polyſperma, vel 1locularis ſeptis perſiſtentibus columnam centralem conſtituentibus. Teſta ſeminis vel conformis nucleo, vel utrinque alata.

1276. *Luzula* Cand. Perianth. Junci. Stam. et Stigm. eadem. Capſ. 1locularis 3valvis 3ſperma.

1277. *Aphyllanthes*. Perianth. 6phyllum ſquamis imbricatis ſuffultum. Antherae perianthii laminis inſertae. Stigma 3lobum. Capſ. polyſperma.

1278. *Daſypogon* R. Br. Flores capitati. Perianth. duplex, ext. 3fidum, int. 3phyllum corollinum. Filamenta basi perianthii inſerta, apice incraſſata. Stigma ſimplex. Utriculus 1ſpermus ſuperus.

1279. *Calectaſia* R. Br. Perianth. tubuloſum, limbo 6partito. Stamina fauci inſerta. Antherae conniventes. Stigma ſimplex. Utriculus 1ſpermus tubo perianthii indurato incluſus.

IX. *Gramineae.*

1280. *Bambusa* Schreb. Spiculae paniculatae multiflorae. Cal. et cor. 2valvis, infer. ☿, super. ♂. Stylus 3partitus. Squamae 3 hypogynae.

1281. *Nastus* Juss. Spiculae paniculatae uni-multiflorae, flore terminali ☿ 2valvi, reliquis neutris 1valvibus. Stylus 2-3partitus. Squamae hypogynae 3.

1282. *Melocanna* Trin. Spiculae paniculatae superiores ☿, inf. steriles. Stylus 3partitus. Semen oblongum pericarpio carnoso maximo occultum.

1283. *Gahnia* Forst. Spiculae 1florae, squamis plurimis vacuis. Stylus 2fidus: stigmata 2fida. Squamae hypogynae 0. Nux ossea, nucleo transversim inciso aut laevi.

1284. *Pharus.* Flores monoeci. Spiculae 1florae 2valves. Squamae hypogynae 0. Stigmata 3. Semen elongatum valvis persistentibus cinctum.

1285. *Ehrharta* Thunb. Spiculae 1-3florae.. Cal. 2valvis cor. minor. Cor. duplex 1valvis, exterior basi excisa. Squamae hypogynae. Stigmata duo, vel styli duo. Semen corolla tectum.

X. *Museae.*

1286. *Urania* Schreb. Spathae distichae multiflorae. Cor. 2labiata 3petala. Nectar. 2phyllum foliolo altero 2fido. Capsl. 3locularis polyspermа. Semina strophiolo lanato.

XI. *Commelineae.*

1287. *Tradescantia.* Cal. et cor. profunde 6partita. Filamenta subvillosa. Capsl. 3locularis.

1288. *Campelia* Rich. Cal. et cor. profunde 6partita. Filamenta villosa. Antherarum loculi discreti. Capsl. baccata 3locularis 2sperma calyce corollaque incrassatis cincta.

1289. *Dichorisandra* Mik. Cal. 3sepalus. Cor. 3petala. Filamenta brevissima. Antherae duae divergentes elongatae. Capsl. 3locularis polyspermа, corolla incrassata cincta.

XII. *Aroideae.*

1290. *Orontium.* Spadix multiflorus. Cal. corollinus 6sepalus carnosus connivens. Filamenta brevissima plana. Antherae 2loculares, loculis discretis. Stylus 0. Stigma obtusum. Utriculus 1spermus.

1291. *Rhodea* Roth. Spadix multiflorus. Cal. corollinus 1sepalus ore 6dentato. Filamenta calyci adnata. Antherae didymae. Stigma 3fidum. Bacca 1sperma.

1292. *Tupistra* Ker. Spadix multiflorus. Cor. bracteata campanulata 6fida. Antherae sessiles corollae adnatae. Stylus crassus 3sulcus, stigmate 3lobo. Bacca 3locularis.

1293. *Acorus.* Spadix lateralis multiflorus. Cal. corollinus 6petalus. Filamenta subulata hypogyna. Antherae peltatae. Stylus 0. Capsl. 6gona 3locularis.

1294. *Tacca* Forst. Involucrum multiflorum duplex utrumque 4phyllum. Flores pedicellati. Cal. corollinus superus 6partitus reflexus. Filamenta brevissima crassa fornicata, antheras intus foventia. Stigma 3lobum. Bacca 1locularis, semina valvis affixa. *Aristolochieae.*

XIII. *Berberideae.*

1295. *Berberis.* Cal. 6ſepalus baſi ſquamatus. Petala 6 intus 2glandulosa. Stam. medio articulata aut 2dentata. Antherae 2loculares. Bacca 2-3ſperma.
1296. *Nandina* Thunb. Cal. 6ſepalus, baſi ſquamis imbricatis cinctus. Petala 6 intus eglandulosa. Bacca exſucca ſtylo coronata 2ſperma.
1297. *Leontice.* Cal. 6ſepalus baſi nudus. Petala 6 baſi ſquamata. Capſ. ſubinflata oligoſperma.
1298. *Diphylleia* Mx. Cal. 3ſepalus baſi nudus. Petala 6 baſi nuda. Bacca 2-3ſperma.

1299. *Cleome.* Cal. 4ſepalus. Petala 4 ſubaſcendentia, baſi nectarifera. Staminа perigyna ſubmonadelpha ſubinaequalia. Siliqua ſtipitata vel ſeſſilis. *Cappariđeae.*
1300. *Peritoma* Cand. Cal. 1phyllus baſi circumſciſſus 5dentatus. Petala aequalia ſeſſilia. Glandulae nectariferae 0. Stamina monadelpha. Siliqua ſtipitata. *Cappariđeae.*
1301. *Canarium.* Flores dioeci. Cal. inferus urceolatus 3dentatus Cor. 3petala connivens. Filamenta baſi connata. Stigma ſubgloboſum. Drupa baccata, putamine 3loculari, loculis duobus abortientibus. *Terebinthaceae.*
1302. *Coſſinia* Commerſ. Cal. 5partitus perſiſtens. Petala 4-5 unguiculata. Capſ. 3gona 3locularis, loculis 2ſpermis. *Sapindeae.*
1303. *Maba* Forſt. Flores dioeci. Cal. 3fidus. Cor. urceolata 3fida. Stamina hypogyna. Bacca calyce cincta ſub-3locularis. *Styraceae.*
1304. *Floſcopa* Lour. Cal. 3fidus inferus. Cor. 3petala. Capſ. 2valvis 1ſperma. *Familia?*
1305. *Lindera* Thunb. Cal. 0. Cor. 6petala infera. Filamenta epigyna corolla breviora. Stylus erectus. Stigmata 2. Capſ. 2locularis. *Familia?*
1306. *Amajoua* Aubl. Cal. ſuperus 6dentatus. Cor. infundibuliformis, limbo 6fido. Stam. incluſa. Stigma incraſſatum. Bacca 1locularis polyſperma. *Rubiaceae.*
1307. *Iſertia* Schreb. Cal. ſuperus 4dentatus. Cor. infundibuliformis, limbo 6fido. Stam. incluſa. Stigma ſub-6lobum. Drupa 6pyrena, pyrenis polyſpermis. *Rubiaceae.*
1308. *Caſſupa* Humb. Cal. ſuperus integer. Cor. tubuloſa, limbo 6partito. Stam. fauci impoſita exſerta. Stigma 2fidum. Bacca 2locularis, loculis polyſpermis. *Rubiaceae.*
1309. *Richardia.* Cal. ſuperus 6-8partitus. Cor. infundibuliformis. Stam. exſerta. Stylus ſub-3fidus. Capſ. 3cocca, coccis 1ſpermis, calyce coronata. *Rubiaceae.*
1310. *Stevenſia* Poit. Cal. ſuperus 2fidus. Cor. tubuloſa, limbo 6-7fido. Antherae ſeſſiles tubo inſertae. Stigma 2lamellatum. Capſ. 2locularis polyſpermae apice 4valvis. *Rubiaceae.*
1311. *Coutarea* Aubl. Cal. 6partitus deciduus, bracteis ariſtatis ſuffultus. Cor. ventricoſa infundibuliformis. Stam. exſerta. Capſ. 2locularis. Sem. alata. *Rubiaceae.*
1312. *Hillia.* Cal. 6fidus bracteatus. Cor. tubuloſa longiſſima. Stam. incluſa. Capſ. ſiliquaeformis 2locularis, ſeminum alis fimbriatis. *Rubiaceae.*

1313. *Pfathyra* Commerſ. Cal. 6dentatus ſuperus. Cor. rotata 6loba. Filamenta breviſſima fauci inſerta. Antherae didymae. Stigma 3lobum. Bacca 6ſperma. *Rubiaceae.*

1314. *Schradera* Vahl. Involucrum multiflorum 5fidum. Cal. urceolatus indiviſus. Cor. campanulata 6fida. Staminum numerus valde incertus. Bacca infera polyſperma. *Caprifolia.*

1315. *Loranthus.* Cal. obſolete dentatus ſuperus. Cor. 4–8petala. Filamenta petalis baſi aduata. Antherae 2loculares. Stigma obtuſum. Bacca 1ſperma. *Loranthaceae.*

1316. *Achras.* Cal. 6partitus. Cor. 6fida. Stamina 6 ſterilia cum fertilibus alternantia. Pomum 12ſpermum. *Sapoteae.*

1317. *Prinos.* Flores ſubdiclini. Cal. 6partitus. Cor. ſubrotata ſub-6fida. Bacca 6ſperma. *Sapoteae.*

1318. *Ehrenbergia* *, Cal. inferus truncatus 5-6dentatus. Cor. tubuloſa, limbo 6fido. Antherae 6 intra tubum ſubſeſſiles. *Drupa? Sapoteae?*

1319. *Triphaſia* Lour. Cal. 3dentatus inferus. Cor campanulata 3partita. Stamina libera. Bacca 3ſperma, embryonibus pluribus in eodem ſemine. *Aurantia.*

1320. *Amoora* Roxb. Flores polygami. Cal. 5dentatus 2bracteatus. Petala 5 conniventia. Urceolus interne antheras gerens. Capſ. 3locularis, ſemina arillata. *Meliaceae.*

1321. *Anopterus* Labill. Cal. 6fidus inferus. Cor. 6loba. Capſ. ſupera 2valvis. Sem. apice alata. *Gentianeae? Ericeae?*

1322. *Frankenia.* Cal. tubuloſus 5dentatus. Cor. 5petala. Stigma 3fidum. Capſ. 3-4valvis, valvis ſeminiferis. *Frankeniaceae.*

1323. *Canarina.* Cal. 6partitus. Cor. campanulata 6fida. Filamenta fornicata Stigmata 6. Capſ. 6locularis, placentis membranaceis binis in quovis loculo. *Campanulaceae.*

1324. *Peplis.* Cal. campanulatus 12dentatus, dentibus alternis anguſtioribus. Cor. 6petala vel 0. Capſ. 2locularis polyſperma. *Salicariae.*

1325. *Flörkea* W. Cal. 3partitus. Petala 3 obtuſa calyci inſerta. Stamina baſi glandulis cincta. Stylus 2fidus. Utriculi 2 1ſpermi.

DIGYNIA.

1326. *Nectris* Schreb. Cal. 6partitus, laciniis interioribus petaloideis baſi 2glandulofis. Capſ. carnoſa ſtylis coronata 1–2ſperma.

1327. *Oxyria* Hill. Perianthium 4ſepalum poſt antheſin auctum. Styli reflexi. Caryopſis compreſſa. Embryo centralis. *Polygoneae.*

1328. *Atraphaxis.* Perianthium 4ſepalum poſt antheſin auctum. Stigmata capitata. Caryopſis compreſſa. Embryo lateralis. *Polygoneae.*

1329. *Oryza.* Gramen paniculatum. Cal. 1florus minimus. Cor. baſi calloſa compreſſa coriacea 2valvis ſemini adnata. *Gramineae.*

1330. *Zizania.* Flores monoeci. Cal. 1florus 2valvis. Cor. 0. Semen corticatum. *Gramineae.*

1331. *Potamophila* R. Br. Flores polygami. Cal. 1florus minimus. Cor. 2valvis mutica nervoſa. *Gramineae.*

TRIGYNIA.

I. *Palmae.*

1332. *Chamaedorea* W. Flores dioeci. Cal. 3partitus. Cor. 3petala. Bacca 1sperma. Embryo lateralis.

1333. *Sabal* Adans. Flores ☿. Cal. 1sepalus 3dentatus. Cor. 3petala. 3tamina distincta. Styli connati. Bacca sub-1sperma. Embryo lateralis.

1334. *Morenia* R. et P. Flores dioeci. Cal. 3fidus. Cor. 3petala. Baccae tres. Embryo basilaris.

1335. *Rhapis* L. fil. Flores polygami. Cal. 3fidus. Cor. 3petala. Bacca 1sperma.

1336. *Chamaerops.* Flores polygami bracteati. Cal. 3partitus. Cor. 3petala. Filamenta basi connata. Styl. 0. Stigmata 3. Baccae 3 1spermae. Embryo lateralis.

1337. *Livistonia* R. Br. Flores ☿. Cal. 3partitus. Cor. 3partita. Filamenta distincta. Styli connati. Bacca 1sperma. Embryo dorsalis.

1338. *Corypha.* Flores ☿. Cal. 3fidus. Cor. 3fida. Stamina corollae inserta. Styli connati. Bacca 1sperma. Embryo basilaris.

1339. *Phoenix.* Flores dioeci. Cal. 3dentatus. Cor. 3petala. Stigmata uncinata. Drupa 1sperma. Embryo dorsalis.

1340. *Lepidocaryon* Mart. Flores polygami. Cal. campanulatus 3dentatus. Cor. 3partita. Antherae dorso filamentorum adnatae. Bacca tessellato-corticata 1sperma. Embryo lateralis.

1341. *Metroxylon* Rottb. Flores androgyni. Cal. campanulatus sub-3dentatus. Cor. 3partita. Bacca tessellato-corticata 1sperma. Embryo lateralis.

1342. *Hyphaene* Gärtn. Flores dioeci. Cal. 3partitus. Cor. 3partita. Drupa 1sperma, putamine coriaceo apice pervio. Embryo verticalis.

1343. *Leopoldinia* Mart. Flores androgyni. Cal. 3sepalus. Cor. 3petala. Bacca reticulato-fibrosa 1sperma. Embryo subbasilaris.

1344. *Hyospathe* Mart. Flores androgyni ebracteati. Cal. 3partitus. Cor. 3petala. Bacca 1sperma. Embryo basilaris.

1345. *Areca.* Flores androgyni. Cal. 3partitus. Cor. 3petala. Drupa fibrosa 1sperma. Embryo basilaris.

1346. *Oenocarpus* Mart. Flores androgyni in scrobiculis sessiles ebracteati. Cal. 3partitus. Cor. 3petala. Bacca fibrosa 1sperma. Embryo basilaris.

1347. *Euterpe* Gärtn. Flores androgyni in scrobiculis sessiles bracteati. Cal. 3sepalus. Cor. 3petala. Bacca fibrosa 1sperma. Embryo lateralis.

1348. *Wallichia* Roxb. Flores androgyni. Cal. ♂ 3dentatus, ♀ 3partitus 2bracteatus. Cor. 3petala. Bacca 2sperma. Embryo lateralis.

1349. *Gulielma* Mart. Flores androgyni. Cal. 1sepalus. Cor. 1petala 3dentata s. 3fida. Drupa 1sperma, putamine apice 3poro. Embryo verticalis intra porum.

1350. *Elaeis* Jacqu. Flores monoeci, foveolis immersi. Cal 3sepalus. Cor. 3petala. Filamenta basi connata. Drupa oleosa, putamine apice 3poro. Embryo intra porum.

1351. *Syagrus* Mart. Flores androgyni spatha duplici. Cal. 3sepalus. Cor. 3petala. Drupa fibrosa, putamine basi pervio. Embryo basilaris.

1352. *Elate.* Flores androgyni ſpatha duplici. Cal. 3dentatus. Cor. 3petala. Antherae ſeſſiles. Drupa putamine baſi ſulcato 3poro. Embryo baſilaris.

1353. *Cocos.* Flores androgyni ſpatha ſimplici. Cal. 3ſepalus. Cor. 3petala. Drupa fibroſa, putamine baſi 3poro. Embryo baſilaris intra porum.

1354. *Maximiliana* Mart. Flores polygami. Cal. 3ſepalus. Cor. 3petala. Drupa putamine baſi 3poro. Embryo baſilaris in albumine.

1355. *Martinezia* R. et P. Flores androgyni. Cal. 3ſepalus. Cor. 3petala. Drupa 1ſperma. Embryo?

II. *Aſphodeleae.*

1356. *Campynema* Labill. Cal. ſuperus corollinus 6partitus. Filamenta ſtylique recurvi. Capſ. 3locularis polyſperma. Semina teſta ſpongioſa.

1357. *Cymation* *. Cal. corollinus inferus 6ſepalus, ſepalis undulatis canaliculatis. Stamina incurva. Capſ. 3locularis. Semina globoſa ſtrophiolata.

III. *Coronariae.*

1358. *Colchicum.* Cor. 6fida tubo longiſſimo radicali. Styli filiformes. Antherae ſuberectae. Capſ. 3, ſeminibus globoſis.

1359. *Androcymbium* W. Petala 6 cucullata, unguibus filiformibus. Filamenta mediis petalis inſerta. Capſ. tres.

IV. *Junceae.*

1360. *Scheuchzeria.* Cal. corollinus 6ſepalus. Stamina receptaculo inſerta. Antherae elongatae. Capſ. 3 inflatae 2valves 1ſpermae.

1361. *Toſieldia* Hudſ. Cal. corollinus 6ſepalus calyculatus bracteatus. Stamina ſepalis oppoſita. Folliculi 3 polyſpermi.

1362. *Helonias.* Cal. corollinus 6ſepalus bracteatus. Capſ. 3locularis 3–6ſperma.

1363. *Xerophyllum* Mx. Cal. corollinus ſubrotatus. Filamenta baſi dilatata contigua. Stigmata revoluta. Capſ. 3locularis, ſuturis externe dehiſcens, 6ſperma.

1364. *Aſtelia* Banks. Flores polygami. Cal. corollinus 6partitus. Bacca 1–3locularis polyſperma.

†1365. *Hydromyſtria* Meyer. Cal. 3ſepalus coloratus. Petala 3 lineari-lanceolata. Filamenta breviſſima. Antherae elongatae. Capſ. 1locularis.

1366. *Triglochin.* Perianthium duplex, utrumque 3ſepalum. Stamina epipetala. Antherae circulo dehiſcentes. Stigmata ſeſſilia plumoſa. Capſ. 3 ſ. 6 nexae.

1367. *Melanthium.* Cor. 6petala patens. Petala unguiculata ſtaminifera baſi 2glanduloſa. Capſ. 3locularis. Sem. alata.

1368. *Anguillaria* R. Br. Cor. 6petala patens. Petala unguiculata ſtaminifera. Capſ. 3locularis. Sem. ſubgloboſa.

1369. *Zigadenus* Mx. Cor. 6partita patens. Petala ſubunguiculata baſi 2glanduloſa. Stam. receptaculo inſerta. Capſ. 3locularis. Sem. ſolida.

1370. *Ornithogloſſum* Salisb. Cor. 6petala. Petala ſine unguiculis glandulisque. Stamina receptaculo inſerta. Capſ. 3locularis. Sem. ſolida.

1371. *Calochortus* Purſh. Cor. 6partita patens, laciniis tribus interioribus ſupra lanatis baſi maculatis. Filamenta breviſſima baſi corollae inſerta. Capſ. 3locularis.
1372. *Nolina* Mx. Cor. 6partita aequalis patens. Capſ. 3locularis 3ſperma.
1373. *Wurmbea* Thunb. Cor. tubuloſa 6fida. Stamina tubo inſerta. Capſ. 3locularis. Sem. globoſa.
1374. *Xerotes* R. Br. Flores dioeci capitati, ſpicati vel paniculati. Perianth. coloratum 6partitum bracteatum, baſi ſtaminiferum. Antherae peltatae membrana pellucida cinctae. Capſ. 3locularis. Sem. peltata.

V. *Sarmentaceae.*

1375. *Flagellaria*. Cal. corollinus ſuperus 6ſepalus. Stamina receptaculo inſerta. Drupa globoſa 1ſperma.
1376. *Trillium*. Cor. 6petala: petala ext. anguſtiora calycina. Bacca 3locularis.
1377. *Medeola*. Cal. corollinus 6ſepalus revolutus. Styli divaricati. Germen ſeſſile. Bacca 3locularis, 3–6ſperma.
1378. *Myrſiphyllum* W. Cal. corollinus 6ſepalus revolutus. Styli ſtricti contigui. Germen pedicellatum. Bacca 3locularis, loculis 2ſpermis.
1379. *Veratrum*. Flores polygami. Cal. corollinus 6ſepalus patens. Stamina receptaculo inſerta. Capſ. 3, feminibus alatis.
1380. *Dioſcorea*. Flores dioeci. Cal. 6partitus. Capſ. 3locularis. Semina alata.
1381. *Rajania*. Flores dioeci. Cal. 6partitus. Capſ. 3locularis, loculis duobus abortientibus, tertio in alam maximam producto 1ſpermo.

VI. *Meniſpermeae.*

1382. *Meniſpermum*. Flores dioeci. Cal. vel 3ſepalus bracteatus vel 6ſepalus. Cor. 3–6petala. Stamina petalis oppoſitis. Nectaria 6 glanduloſo-petaloidea. Drupae baccatae 1ſpermae.
1383. *Batſchia* Thunb. Flores dioeci. Cal. 3ſepalus. Cor. 3petala. Stam. 3 ſterilia in ♂, 6 in ♀. Drupae coriaceae 1ſpermae.
1384. *Lardizabala* R. et P. Flores polygami. Cal. 6ſepalus. Cor. 6petala. Stam. in ♂ monadelpha, in ☿ et ♀ diſtincta. Antherae apice in membranulam productae. Baccae 6loculares, loculis polyſpermis.

VII. *Polygoneae.*

1385. *Rumex*. Cal. 6ſepalus, ſepalis interioribus ſemen 3quetrum tegentibus. Stigmata penicillata. Embryo lateralis.
1386. *Emex* Neck. Cal. ♀ 1phyllus, valvis reflexis ſubſpinoſis ſemen oblongum tegentibus. Embryo periphericus.
1387. *Podopterus* Humb. Cal. duplex uterque 3partitus, laciniis exterioribus dorſo alatis. Stigmata capitata. Achenium calyce tectum.

1388. *Hydrogeton* Perſ. Cal. 0. Cor. 3petala. Filamenta baſi dilatata. Styli ſimplices. Capſ. 3 membranaceae 2ſpermae. Sem. parietibus affixa. *Aliſmeae.*

TETRAGYNIA.

1389. *Tetroncium* W. Flores dioeci. Cal. 3sepalus. Cor. 3petala. Styli 4, stigmatibus simplicibus. Capſ. supera 4locularis stylis rostrata, 4sperma. *Junceae.*

HEXAGYNIA.

1390. *Damasonium* Schreb. Spatha 1phylla 5alata. Cal. superus 3partitus. Cor. 3petala. Glandulae 3 nectariferae. Bacca 6valvis polysperma, valvis placentiferis. *Alismeae.*

POLYGYNIA.

1391. *Alisma.* Cal. corollinus 6sepalus. Capſ. plures stellatae 1-2-spermae. *Alismeae.*

CLASSIS VI.

HEXANDRIA.

MONOGYNIA.

1156. Calamus.

petræus Lour. 1. C. caudice craſſiſſimo, ſtipitibus foliolisque aculeatis, aculeis erectis, ſpadice terminali elongato. *Ind. or. Cochinchin. Inſ. Molucc.* (C. Rotang W.)

verus Lour. 2. C. caudice ſtipitibusque patulo-aculeatis, foliolis inferioribus nervoſis glabris ſuperioribus hirtis, ſtipitibus longiſſimis apice productis radicantibus, ſpadicibus axillaribus paniculatis erectis. *Ind. or. Cochinchin. Inſ. Molucc.*

niger W. 3. C. caudice ſtipitibusque patulo-ſetoſis, foliolis glabris, ſtipitibus apice longiſſime productis radicantibus, ſpadicibus axillaribus pendulis. *Inſ. Molucc.*

rudentum Lour. 4. C. caudice ſtipitibusque retrorſum aculeatis, foliolis hirtis ciliatis, ſpadicibus axillaribus paniculatis divaricatis. *Ind. or. Cochinchina. Inſ. Molucc.* (Caudex 500 pedes altus Lour.)

viminalis W. 5. C. caudice foliolisque patulo-ſetoſis, ſpinis ſtipitum ſpadicisque reflexis, ſpadicis ramis flexuoſis nutantibus. *Inſ. Molucc.*

equeſtris W. 6. C. caudice ſtipitibusque patulo-aculeatis, foliolis ſparſis elliptico-lanceolatis utrinque attenuatis, ſpadicibus ſimplicibus erectis flexuoſis. *Inſ. Molucc.*

Zalacca Gärtn. 7. C. caudice ſtipitibusque patulo-aculeatis, foliolis linearibus glabris, ſpadice ſimplici radicali. *Inſ. Molucc.*

Draco W. 8. C. caudice ſtipitibusque patulo-aculeatis, foliolis ſetoſo-ciliatis, ſpadice erecto paniculato. *Ind. orient.*

ſcipionum Lour. 9. C. caudice glabro, frondibus ſpinoſis, ſpadice ramoſo paucifloro. *Inſ. Sund. Malacc.*

amarus Lour. 10. C. caudice laevi, frondibus conferte ſpinoſis, ſpadicibus terminalibus remotis ſpathaceis. *Cochinchina.*

dioecus Lour. 11. C. caudice gracili flexiliſſimo, frondibus ſpinisque abbreviatis, ſpadicibus dioecis. *Cochinchina.*

secundiflorus P. B. 12. C. frondium reflexarum spinis geminis latissimis utrinque scindentibus, foliolis margine spinosis. *Guinea.*

1157. LICUALA Thunb.

spinosa Thunb. *Inf. Moluce. Cochinchina.* Palma caudice subulnari, stipitibus 3orgyalibus spinosis, frondibus flabelliformibus digitatis, foliolis apice erosо-dentatis, spadice erecto ramoso. (Corypha Pilearia Lour.)

1158. TALIERA Mart.

bengalensis * *Bengal.* Palma caudice annulato procero, frondibus palmato-flabelliformibus suborbiculatis, stipitibus canaliculatis margine spinosis, spadice terminali erecto. (Corypha Taliera Roxb.)

1159. MAURITIA L. fil.

vinifera Mart. 1. M. caudice elato stricto, frondibus flabelliformi-pinnatifidis concoloribus, stipitibus semiteretibus canaliculatis, squamis baccarum ovatarum subaequaliter rhombeis. *Brasil.*

flexuosa L. fil. 2. M. caudice stricto inermi, frondibus flabelliformi-pinnatifidis subtus concoloribus, stipitibus semiteretibus canaliculatis, squamis baccarum orbicularibus. *Surinam.*

armata Mart. 3. M. caudice flexuoso spinoso, frondibus flabelliformi-pinnatifidis subtus glaucescentibus, stipitibus teretibus, spadicibus glabris, squamis baccarum obtusis. *Brasil.*

aculeata Humb. 4. M. caudice spinoso, frondibus flabelliformi-pinnatifidis ciliato-spinulosis subtus dense pruinosis, stipitibus teretibus, squamis baccarum rhombeis. *Nov. Granat.*

1160. GEONOMA W.

simplicifrons W. 1. G. caudice erecto, frondibus simplicibus cuneatis 2fidis, calycibus ♂ corollas aequantibus, antheris pendulis, baccis globosis. *Caracas. Brasil.*

macrostachys Mart. 2. G. acaulis, frondibus simplicibus lanceolatis basi attenuatis apice 2fidis, spadicibus radicalibus simplicibus cylindricis, corollis ♂ calyces excedentibus, baccis ovatis. *Ad fl. Amazonum.*

acaulis Mart. 3. G. acaulis, frondibus pinnato-fissis, pinnis lanceolatis, spadicibus radicalibus simplicibus cylindricis, calycibus ♂ corolla brevioribus. *Brasil. Guiana.* (Gynestum acaule Poit.)

arundinacea Mart. 4. G. caudice arundinaceo, frondibus lateralibus terminalibusque ovatis 2furcis tandem pinnato-fissis, spadicibus subsimplicibus, floribus remote verticillatis, calycibus ♂ corollas subaequantibus, baccis ovato-globosis. *Ad fl. Amazonum.* (Gynestum baculiferum Poit.)

pycnoſtachys Mart. 5. G. caudice arundinaceo, frondibus lateralibus terminalibusque lineari-oblongis breviter 2fidis, ſpadicibus ſimplicibus androgynis villoſis, floribus denſiſſime imbricatis, calycibus ♂ corollas ſubaequantibus barbatis, baccis ovatis. *Peru. Guiana.* (Gyneſtum ſtrictum Poit.)

pinnatifrons W. 6. G. caudice ſtricto, frondibus terminalibus interrupte pinnatis, pinnis falcatis praemorſis, ſpadicibus paniculato-multifidis, baccis ellipticis. *Peru. Caracas.* (Martinezia interrupta R. et P.)

Spixiana Mart. 7. G. caudice ſtricto, frondibus terminalibus indiviſis lanceolatis baſi attenuatis apice 2furcis, ſpadicibus paniculatis pubeſcentibus, floribus imbricatis, baccis ovato-globoſis. *Amer. auſtr.*

ſynanthera Mart. 8. G. frondibus terminalibus pinnato-fiſſis, pinnis lanceolatis acuminatis ſubfalcatis, ſpadicibus ramoſis, floribus imbricatis. *Peru.*

laxiflora Mart. 9. G. caudice tenui, frondibus pinnatis, pinnis furcato-2fidis, ſpadicibus ramoſis laxis, floribus ſparſis. *Ad fl. Amazonum.*

paniculigera Mart. 10. G. frondibus terminalibus pinnato-fiſſis abruptis, pinnis alternis anguſtis, ſpadicibus paniculato-ramoſiſſimis pubeſcentibus, floribus ſubverticillatis, baccis globoſis. *Braſil.* (G. pauciflora Mart. var.?)

acutiflora Mart. 11. G. frondibus terminalibus pinnato-fiſſis abruptis, ſpadicibus ramoſis pubeſcentibus, floribus imbricatis acutis, ſtaminibus longe exſertis, baccis ellipticis. *Ad fl. Amazonum.* (Gyneſtum maximum Poit.)

multiflora Mart. 12. G. frondibus terminalibus pinnatis, pinnis ſubfalcatis tortis, ſpadicibus paniculatis pubeſcentibus, floribus 4-5fariam laxiuscule imbricatis, urceolo antherifero in ♀ ſterili exſerto. *Amer. auſtr.* (Gyneſtum deverſum Poit.)

1161. KUNTHIA Humb.

montana Humb. *Nov. Granat.* Palma caudice gracili annulato, frondibus pinnatis.

1162. ACROCOMIA Mart.

ſclerocarpa Mart. *Ind. occid. Amer. auſtr.* Palma caudice elato baſi attenuato ſpinoſo, frondibus pinnatis, ſtipitibus ſpathisque aculeatis. (Cocos fuſiformis Sw., aculeata Jacq. Bactris minor Gärtn.)

1163. ASTROCARYON Meyer.

acaule Mart. 1. A. pinnis anguſto-lanceolatis acuminatis ſubtus pallidioribus, florum ♂ bracteis dorſo penicillatis, calycibus integerrimis, ♀ pedunculatorum calycibus corollisque ſubaequalibus glabriusculis, fructibus globoſis inermibus. *Braſil.*

campeſtre Mart. 2. A. acaule, pinnis linearibus ſubfalcatis ſubtus albis, florum ♂ bracteis ciliatis, calycibus fimbriatis, ♀ calycibus corollisque ſubaequalibus glabris, fructibus obovatis roſtratis inermibus. *Braſil.*

aculeatum Meyer. 3. A. caudice elato, pinnis linearibus praemorſis ſubtus pallidioribus extimis connatis, florum ♀ ſeſſilium calyce corollaque denſiſſime aculeatis, fructibus ſubgloboſis inermibus. *Guiana.*

Tucuma Mart. 4. A. caudice elato, pinnis lanceolatis acuminatis ſubtus argenteis, florum ♂ bracteis ciliatis, calycibus ſubintegerrimis, ♀ pedunculatorum calycibus urceolato-cylindricis pubeſcentibus corollas glabras ſuperantibus, fructibus globoſis inermibus. *Braſil.*

Jauari Mart. 5. A. caudice elato, pinnis linearibus acuminatis ſubtus albis, florum ♂ bracteis rufo-barbatis, calycibus ſerrato-ciliatis, ♀ pedunculatorum calycibus corollisque ciliatis, fructibus obovatis inermibus. *Braſil.*

vulgare Mart. 6. A. caudice elato, pinnis lanceolatis acuminatis ſubtus albis, florum ♂ bracteis dorſo ciliato-villoſis, calycibus ſubintegerrimis, ♀ pedunculatorum calycibus corollisque ſubaequalibus glabris, fructibus ovatis inermibus. *Braſil.*

Murururu Mart. 7. A. caudice elato aculeatiſſimo, pinnis lanceolatis ſubfalcatis ſubtus argenteis, florum ♂ bracteis glabriusculis, ♀ ſubſeſſilium calycibus glabris corolla pubeſcente brevioribus, fructibus pyriformibus ſpinuloſis. *Braſil.*

Miri Mart. 8. A. caudice elato aculeatiſſimo, pinnis anguſte lanceolatis acuminatis ſubtus argenteis, florum ♂ bracteis hirtis, calycibus multifido-ciliatis, ♀ ſeſſilium calycibus corollisque longioribus fructibusque obovatis roſtratis ſetoſis. *Braſil.*

gynacanthum Mart. 9. A. caudice humili, pinnis lanceolatis ſubtus pallidis, florum ♂ bracteis ſubtomentoſis, calycibus integerrimis, ♀ ſeſſilium calycibus corollisque denſiſſime aculeatis, aculeis ſubtortis. *Braſil.*

Munbaca Mart. 10. A. caudice humili, pinnis lineari-lanceolatis acutis ſubtus albido-pubeſcentibus, extimis latioribus ſubconnatis, floribus ♀ ſeſſilibus denſe aculeatis, fructibus obovatis inermibus. *Braſil.*

1164. THRINAX L. fil.

parviflora Sw. *Jamaica. Hiſpaniola.* Palma Sorgyalis inermis, frondibus palmatis plicatis.

1165. BROMELIA.

* *Foliis dentato- ſ. ſerrato-ſpinoſis.*

† *Floribus ſpicatis.*

Ananas 1. Bt. foliis glaucis dentato-ſpinoſis mucronatis, ſpica comoſa. *Ind. occid.*

ſemiſerrata W. 2. Br. foliis viridibus apice dentato-ſpinoſis, ſpica comoſa. *Ind. occid.*

lingulata 3. Br. foliis ſerrato-ſpinuloſis obtuſis erectis, ſpica compoſita, ſpiculis alternis. *Ind. occid.*

bracteata Sw. 4. Br. foliis ſerrato-ſpinoſis acutis, ſpica decompoſita, bracteis ovato-lanceolatis coloratis, calycibus uncinato-mucronatis. *Jamaica.*

faſtuoſa Lindl. 5. Br. foliis ſerrato-ſpinoſis acuminatis, ſpica compoſita, bracteis linearibus coloratis, calycibus rectis inermibus. *Mexico.*

melanantha Ker. 6. Br. foliis glaucis obtuſis mucronatis ciliato-ſpinuloſis erectis, ſcapo ſimplici lanato, bracteis ſcarioſis acuminatis integerrimis, ſpica indiviſa, calycibus ſubgloboſis carnoſis lanatis. *Inſ. Trinit.*

nudicaulis 7. Br. foliis viridibus acutis ſerrato-ſpinuloſis, ſcapo bracteis oblongis acutis coloratis tecto, ſpica ſimplici laxiuscula, calycibus obtuſiusculis. *Braſil.* (Br. pyramidalis Curt.)

lutea Meyer. 8. Br. foliis linguaeformibus ſpinoſo-ciliatis, ſcapo ſublanato bracteis tecto, ſpica compoſitâ nutante, bracteis ovatis calycibusque mucronatis. *Surinam.*

Mertenſii Meyer. 9. Br. foliis linguaeformibus ſpinoſo-ciliatis ſpina terminatis, ſcapo ſubvilloſo bracteato, ſpica compoſita erecta, bracteis calycibusque obtuſis mucronatis. *Surinam.*

incarnata R. et P. 10. Br. foliis linguaeformibus mucronatis ſerrato-ſpinoſis, ſpica compoſita, bracteis obtuſis, calycibus acuminatis. *Peru.*

ſphacelata R. et P. 11. Br. foliis enſiformibus acutiſſimis ciliato-aculeatis, ſpicis axillaribus conico-truncatis, bracteis lanceolatis medio ſphacelatis, calycibus acutis. *Chili.*

†† *Floribus ſeſſilibus aggregatis.*

Karatas 12. Br. foliis dentato-ſpinoſis mucronatis erectis, floribus acaulibus ſeſſilibus aggregatis. *Ind. occ.*

humilis Jacq. 13. Br. foliis dentato-ſpinoſis longiſſime acuminatis patentibus, axillis ſtoloniferis, floribus acaulibus ſpicato-aggregatis bracteatis, calycibus obtuſis. *Ind. occid.*

bicolor R. et P. 14. Br. foliis ciliato-ſpinoſis acuminatis patentibus ſubtomentoſis, floribus aggregatis ſeſſilibus, bracteis ſpathulatis, calycibus pulverulentis. *Chili.*

††† *Floribus pedunculatis, racemoſis, paniculatis.*

pallida Ker. 15. Br. foliis remote ciliato-ſpinuloſis acutis, pedunculis ſparſis ſubracemoſis glabris bracteatis, calycibus acutis. *Amer. auſtr.*

iridifolia Mart. 16. Br. foliis lanceolato-enſiformibus inferne ſpinuloſo-ſerratis, floribus ſubſpicatis remotis, ſpathis longitudine florum lanceolatis pedicello adnatis. *Braſil.*

Pinguin 17. Br. foliis dentato-ſpinuloſis mucronatis, racemo laxo terminali. *Ind. occid.*

chrysantha Jacq. 18. Br. foliis ciliato-ſpinoſis mucronatis, bracteis lanceolatis dentatis, racemo compoſito foliis breviori. *Amer. auſtr.*

paniculigera Sw. 19. Br. foliis ſerrato-ſpinoſis, ſcapo bracteis lanceolatis veſtito, racemo compoſito ſubtomentoſo. *Ind. occid.*

ſyloeſtris W. 20. Br. foliis ciliato-ſpinoſis longiſſime acuminatis, racemo compoſito, racemulis vix emergentibus, bracteis longe racemos ſuperantibus. *Braſil.*

Acanga 21. Br. foliis ciliato-ſpinoſis recurvis, panicula diffuſa. *Braſil.*

** *Foliis integerrimis.*

lucida W. 22. Br. foliis integerrimis, ſpica comoſa. *America auſtr.*

1166. GUZMANNIA R. et P.

tricolor R. et P. *Peru. Portorico.* Herba paraſitica, foliis enſiformibus, ſcapo ſpicato bracteato, floribus albis.

1167. AECHMEA R. et P.

paniculata R. et P. *Peru.* Herba paraſitica, foliis enſiformibus aculeatis, floribus paniculatis luteſcentibus.

1168. PITCARNIA Herit. Ait.

ſtaminea Sims. 1. P. foliis lineari-lanceolatis integerrimis, pedunculis glabris, calycibus acuminatis, petalis revolutis, ſtaminibus longiſſimis. *Amer. auſtr.*

integrifolia Sims. 2. P. foliis linearibus integerrimis ſubtus candicantibus, pedunculis calycibusque villoſis. *Ind. occ.*

latifolia Ait. 3. P. foliis lanceolatis acuminatis integerrimis baſi margine ſpinoſis, racemo conferto, bracteis pedicellos aequantibus. *Ind. occid.*

bracteata Ait. 4. P. foliis integerrimis baſi ſubſpinoſis, bracteis pedicellos ſuperantibus. *Inſ. S. Vincent.* (P. latifolia Red. ſulfurea Andr.)

paniculata R. et P. 5. P. foliis enſiformibus ſerrato-aculeatis pulverulentis, panicula decompoſita. *Peru.*

pulverulenta R. et P. 6. P. foliis enſiformibus margine ſpinuloſis ſubtus pulverulentis, inferioribus petiolatis, floribus paniculatis bracteatis. *Peru.*

lanuginoſa R. et P. 7. P. foliis lineari-lanceolatis inferne ſpinuloſis ſubtus lanatis, racemo ſimplici terminali. *Peru.*

bromelifolia Ait. 8. P. foliis enſiformibus longiſſimis ſerrato-ſpinuloſis glauceſcentibus, racemo ſimplici glabro. *Ind. occid.*

anguſtifolia Ait. 9. P. foliis lineari-lanceolatis ciliato-ſpinoſis ſubtus racemoque tomentoſis. *Ind. occid.* (P. pungens Kunth.)

furfuracea W. 10. P. foliis lanceolato-linearibus elongatis ciliato-ſpinuloſis ſubtus furfuraceis, racemis pani-

culatis villosis. *Amer. austr.* (Pourretia pyramidata R. et P.)

pruinosa Kunth. 11. P. foliis lanceolatis dentato-spinosis utrinque glauco-pruinosis, racemo glabro. *Amer. austr.*

1169. POURRETIA R. et P.

lanuginosa R. et P. 1. P. foliis linearibus dentato-spinosis utrinque argenteo-lepidotis, racemo tomentoso. *America austr.* (Pitcarnia crystallina Pers.)

lanata Kunth. 2. P. foliis lanceolato-linearibus acuminatis dentato-spinosis utrinque glaucescentibus, floribus spicatis lanatis. *Peru.*

ferruginea * 3. P. foliis ensiformibus margine aculeatis, floribus paniculatis recurvo-falcatis. *Peru.* (Pitcarnia ferruginea R. et P.)

coarctata R. et P. 4. P. foliis linearibus margine aculeatis subobliquis glauco-pruinosis, floribus spicatis. *Chili.* (Pitcarnia coarctata Pers.)

1170. TILLANDSIA.

* *Floribus subsolitariis.*

usneoides 1. T. caule filiformi furfuraceo-squamoso flexuoso pendulo, floribus axillaribus sub-3andris. *Carolina. Ind. occid.*

trichoides Kunth. 2. T. caule capillaceo laevi ramoso flexuoso, floribus axillaribus. *Cumana.*

virescens R. et P. 3. T. caule stricto abbreviato, foliis distichis lineari-subulatis striatis subreflexis, pedunculis axillaribus 1floris folia aequantibus. *Peru.*

Bartramii Ell. 4. T. foliis lineari-subulatis canaliculatis pruinosis erectis, scapo sub-2floro foliis breviori. *Georgia. Mexico.* (T. uniflora Kunth.)

recurvata 5. T. foliis lineari-subulatis furfuraceo-lepidotis recurvis, scapo 2floro folia superante apice bracteato. *Amer. tropic.*

capillaris R. et P. 6. T. caule dichotomo, foliis lineari-subulatis striatis patulis, pedunculis axillaribus sub-1floris capillaribus glaberrimis. *Peru.*

xiphioides Ker. 7. T. foliis lanceolatis acutis glabris, scapo 1floro bracteis tecto, spathis calycibusque acuminatis, laciniis corollae spathulatis tortis, stigmate fila tenuissima producente. *Bonaria.*

** *Spicis simplicibus.*

serrata 8. T. foliis lato-lanceolatis obtusiusculis serrato-spinosis, spica densa bracteato-comosa. *Ind. occ.*

lingulata 9. T. foliis linguaeformibus obtusis integerrimis basi ventricosis, spica densa bracteato-comosa. *Ind. occid.*

sessiliflora R. et P. 10. T. foliis linguaeformibus retusis, spica gracili elongata, bracteis obtusis. *Peru.*

ſetacea Sw. 11. T. foliis lineari-filiformis ſetaceis recurvatis argenteo-lepidotis, ſpathis imbricatis diſtichis, floribus alternis. *Jamaica.*

ſtricta Sims. 12. T. foliis canaliculato-ſubulatis pruinoſo-caneſcentibus, ſpica multiflora terminali. *Braſil.*

pruinoſa Sw. 13. T. foliis lanceolato-linearibus reclinatis ſpathisque imbricatis ſquamuloſo-tomentoſis. *Jamaica.*

heptantha R. et P. 14. T. foliis enſiformi-ſubulatis argenteo-pruinoſis, ſpica 7flora diſticha bracteata. *Peru.*

coerulea Kunth. 15. T. foliis lineari-ſubulatis reflexis argenteo-furfuraceis, ſpica 7flora, floribus diſtantibus, bracteis elongatis acutis. *Mexico.*

incarnata Kunth. 16. T. foliis lineari-ſubulatis baſi dilatatis recurvatis argenteo-furfuraceis, ſpica multiflora, floribus approximatis, bracteis elongatis. *Quito.*

heliconioides Kunth. 17. T. foliis lineari-lanceolatis apice ſubulatis glabris, ſpica elongata, floribus diſtantibus bractea brevioribus. *Nov. Granat.*

clavata Lam. 18. T. foliis lineari-lanceolatis ſubulatis glabris, ſpica ovato-conica compacta, bracteis ſerratis. *Hiſpaniola.*

****** Spicis compoſitis.***

utriculata 19. T. foliis lato-lanceolatis baſi utriculatis, ſpica compoſita ſubpaniculata. *Ind. occid.*

tenuifolia 20. T. foliis lineari-filiformibus ſetaceis erectis, ſpicis alternis ſubdiſtichis imbricatis, bracteis obtuſis. *Ind. occid.*

flexuoſa Sw. 21. T. foliis lanceolato-linearibus reclinatis ſubtus argenteo-lepidotis, ſpicis aggregatis laxis flexuoſis, bracteis abbreviatis appreſſis. *Ind. occid.*

nutans Sw. 22. T. foliis ovato-lanceolatis baſi ventricoſis ſtriatis glabris, ſpicis diviſis nutantibus, bracteis obtuſis flores ovatos approximatos includentibus. *Ind. occid.*

faſciculata Sw. 23. T. foliis lanceolato-ſubulatis ſtrictis ſubtus puberſcentibus, ſpicis diſtichis imbricatis lateralibus. *Jamaica.*

polyſtachya 24. T. foliis lanceolato-ſubulatis reclinatis ſubtus lepidotis, ſpicis ſparſis gracilibus lateralibus. *Ind. occid.*

caneſcens Sw. 25. T. foliis linearibus erectis incanis rigidis, ſpicis terminalibus aggregatis, floribus diſtichis bracteatis. *Jamaica.*

anguſtifolia Sw. 26. T. foliis longiſſimis lineari-lanceolatis erectiusculis ſtrictis glabris, ſpicis faſciculatis multifloris vaginatis. *Ind. occid.*

floribunda Kunth. 27. T. foliis longiſſimis lineari-ſubulatis argenteo-lepidotis, ſpicis congeſtis oblongis, floribus diſtichis bracteas aequantibus. *Peru.*

diſticha Humb. 28. T. foliis lineari-ſubulatis canaliculatis argenteo-lepidotis, ſpicis congeſtis alternis linearibus, bracteis imbricatis acutis flores ſubaequantibus. *Peru.*

elongata Humb. 29. T. foliis longiſſimis lineari-ſubulatis glabris reflexis, ſpicis congeſtis alternis linearibus elongatis, bracteis imbricatis acutis calyce longioribus. *Nov. Granat.*

ſecunda Kunth. 30. T. foliis lineari-lanceolatis planis ſublepidotis, ſpicis numeroſis alternis patentibus, floribus ſecundis, bracteis bifariam imbricatis glabris. *Quito.*

paniculata 31. T. foliis radicalibus lanceolatis acutis abbreviatis pruinoſis, panicula ramoſiſſima nudiuscula, floribus ſpicatis bracteas acutas excedentibus. *Ind. occid.*

maculata R. et P. 32. T. foliis radicalibus lanceolato-enſiformibus ſplendentibus maculatis apice revolutis, ſpicis paniculatis coloratis. *Peru.*

rubra R. et P. 33. T. foliis enſiformibus acutis ſupra lucidis ſubtus argenteo-pruinoſis, ſpicis paniculatis alternis, bracteis calyces aequantibus. *Peru.*

parviflora R. et P. 34. T. foliis e baſi ampliſſima ſubulatis divergentibus farinoſo-lepidotis, ſpicis paniculatis alternis, bracteis calyce brevioribus. *Peru.*

purpurea R. et P. 35. T. foliis lanceolato-ſubulatis recurvis argenteo-lepidotis, ſpicis paniculatis diſtichis, bracteis calycibusque aequalibus roſeis. *Peru. Hiſpaniola.*

ſtraminea Kunth. 36. T. foliis linearibus ſubulatis canaliculatis argenteo-lepidotis, ſpicis paniculato-coarctatis, bracteis glabris calycem aequantibus. *Peru.*

amoena Link. 37. T. foliis lanceolatis canaliculatis ſerrato-aculeatis glabris, exterioribus acutis, interioribus retuſis, ſpicis racemoſo-paniculatis. *Braſil.*

**** *Floribus pedicellatis.*

biflora R. et P. 38. T. foliis enſiformibus acutis ſtriatis, ſpicis racemoſis, floribus geminis pedicellatis. *Peru.*

tetrantha R. et P. 39. T. foliis lanceolatis reflexis maculatis, ſcapo racemoſo, pedicellis 4floris. *Peru.*

1171. CARTONEMA. R. Br.

ſpicatum R. Br. *Nov. Holl.* Herba piloſa, foliis linearibus, floribus ſpicatis flavis 2bracteatis.

1172. ACANTHOSPORA *.

*juncea** 1. A. foliis lineari-ſubulatis canaliculatis elongatis, ſpica compoſita thyrſoidea, bracteis elongatis ſcarioſis. *Peru.* (Bonapartea R. et P. Tillandſia Poir)

*conantha** 2. A. foliis enſiformibus ſubtus pulverulento-lepidotis abbreviatis, ſpica ſtrobiliformi compacta, bracteis acuminatis. *Peru.* (Bonapartea ſtrobilantha R. et P. Tillandſia Poir.)

1173. BARBACENIA Vand.

bicolor Mart. 1. B. caule craſſo erecto dichotomo, foliis linearibus acuminatis ciliatis, pedunculis apice glandu-

losis folia aequantibus, antheris filamentorum longitudine. *Brasil.*

tomentosa Mart. 2. B. caule erecto subramoso, foliis lineari-lanceolatis tomentoso-incanis, pedunculo foliis breviori pubescente, laciniis calycis erectis, filamentis brevissimis. *Brasil.*

rubro-virens Mart. 3. B. caule crasso subramoso, foliis linearibus subulatis strictis glabris, pedunculis folia superantibus pubescentibus, calycis tomentosi laciniis reflexis, filamentis brevissimis. *Brasil.*

tricolor Mart. 4. B. caule radicante abbreviato, foliis linearibus acuminatis hirsutis, pedunculo foliis breviori, calycis glandulosо-pubescentis laciniis patulis, antheris filamenta aequantibus. *Brasil.*

longiflora Mart. 5. B. caule simplici brevissimo, foliis lineari-lanceolatis rigidis ciliatis, pedunculo foliis breviori, calycis elongati glandulosо-pilosi laciniis erectis, antheris filamenta duplo superantibus. *Brasil.*

exscapa Mart. 6. B. caule subnullo, foliis lanceolatis recurvatis ciliato-serratis, floribus sessilibus, filamentis latissimis. *Brasil.*

1174. CONOSTYLIS R. Br.

aculeata R. Br. 1. C. foliis glabris margine aculeatis, scapo diviso corymbosо, calycibus intus glabris. *Nov. Holl.*

serrulata R. Br. 2. C. foliis nervoso-striatis margine setoso-denticulatis, scapo simplici bracteato abbreviato corymbosо, calycibus intus glabris. *Nov. Holl.*

setigera R. Br. 3. C. foliis margine setoso-ciliatis, scapo simplici elongato, floribus capitatis intus lanatis, filamentis alternis longioribus. *Nov. Holl.*

breviscapa R. Br. 4. C. foliis tomentosis margine scabris, scapo simplici abbreviato, floribus capitatis intus tomentosis, filamentis aequalibus. *Nov. Holl.*

1175. SCHWÄGRICHENIA*.

*flavida** 1. Schw. caule foliisque glaberrimis, ramorum tomento deciduo, antherarum apiculis reflexis. *Nov. Holl.* (Anigozanthus flavida Red. R. Br.)

*rufa** 2. Schw. caule tomento persistente tecto, antheris muticis. *Nov. Holl.* (Anigozanthos rufa Labill.)

1176. LANARIA Ait.

plumosa Ait. *C. B. S.* Caulis ramosus plumoso-lanatus, folia ensiformia glabra serrata, flores paniculati extus plumoso-lanati intus purpurei. (Hyacinthus lanatus L. Argolasia lanata Juss. Lam. Dilatris hexandra Lam.)

1177. LOPHIOLA Ker.

aurea Ker. *Nov. Caesar.* Caulis simplex glaber foliatus, foliis gramineis, floribus paniculato-corymbosis extus dense lanatis intus luteis. (Conostylis americana Pursh.)

1178. PHLEBOCARYA R. Br.

ciliata R. Br. *Nov. Holl.* Herba subacaulis, foliis distichis linearibus ciliatis, floribus paniculatis.

1179. MNASIUM Schreb.

paludosum W. *Guiana.* Herba foliis lineari-lanceolatis infra medium angustatis basi dilatatis, scapo foliis brevioribus, spatha ingente flores flavos occultante. (Rapatea paludosa Aubl.)

1180. POLLIA Thunb.

japonica Thunb. *Japonia. Java.* Caulis ramosus villosus, foliis ensiformibus glabriusculis subtus albidis, floribus albis corymbosis.

1181. TULBAGHIA.

alliacea 1. T. foliis ensiformi-filiformibus, floribus cernuis, limbo tubum aequante, perianthio interno 6lobo fusco. *Afric. austr.*

affinis Link. 2. T. foliis linearibus, floribus cernuis, tubo limbum longe superante, perianthio interno 6dentato virente. *C. B. S.*

cepacea 3. T. foliis linearibus, floribus erectis, tubo limbum aequante, perianthio interno 3phyllo flavo. *Afric. austr.*

1182. ALBUCA.

* *Staminibus tribus fertilibus: pedunculis racemosis patentibus, floribus nutantibus.*

altissima Jacqu. 1. A. foliis lanceolatis canaliculatis flaccidis glaucis. *C. B. S.*

major Dryand. 2. A. foliis lineari-lanceolatis planiusculis reclinatis. *C. B. S.* (Ornithogalum canadense L.)

flaccida Jacqu. 3. A. foliis lanceolato-linearibus oblique flexis flaccidis. *C. B. S.*

minor 4. A. foliis lineari-subulatis canaliculatis flaccidis. *C. B. S.*

viridiflora Jacqu. 5. A. foliis lineari-subulatis canaliculatis subtus scapoque hirsutis. *C. B. S.*

coarctata Dryand. 6. A. foliis lineari-subulatis glabris, racemo coarctato, bracteis elongatis. *C. B. S.*

**** *Staminibus omnibus fertilibus.***

† *Floribus erectis.*

***fastigiata* Dryand.** 7. A. foliis lanceolatis serrulatis flaccidis, racemo corymboso foliis breviori. *C. B. S.*

***caudata* Jacq.** 8. A. foliis lineari-lanceolatis canaliculatis strictis racemo patentissimo brevioribus. *C. B. S.*

***setosa* Jacqu.** 9. A. foliis lineari-lanceolatis planiusculis flaccidis, pedunculis corymbosis patentissimis. *C. B. S.*

***aurea* Jacqu.** 10. A. foliis lineari-lanceolatis planis, pedunculis erectis corymbosis. *C. B. S.*

***vittata* Ker.** 11. A. foliis linearibus canaliculatis, scapo pauciflоro, perianthio interno apice barbato. *C. B. S.*

†† *Floribus cernuis.*

***abyssinica* Jacqu.** 12. A. foliis longissimis linearibus strictis erectis, bracteis flores superantibus, pedicellis brevissimis. *Afric. austr.* et *med.*

***fragrans* Jacqu.** 13. A. foliis lineari-lanceolatis canaliculatis, bracteis brevissimis, pedicellis flores aequantibus. *C. B. S.*

viscosa 14. A. foliis lineari-subulatis canaliculatis viscoso-pilosis, pedunculis patentibus flore longioribus. *C. B. S.*

spiralis 15. A. foliis lineari-subulatis convolutis apice spiratim tortis villosis scapo longioribus. *C. B. S.*

1183. MASSONIA.

*** *Geminae: corymbis coarctato-congestis sessilibus: foliis radicalibus binis.***

***longifolia* Jacqu.** 1. M. foliis subrotundo-oblongis obtusis nervosis glaberrimis, laciniis corollae patulo-reflexis. *C. B. S.* (M. obovata et lanceaefolia Jacqu. varr.)

latifolia 2. M. foliis subrotundo-ovatis acutis enerviis glabris, laciniis corollae patentibus. *C. B. S.* (M. coronata Jacqu.)

***cordata* Jacqu.** 3. M. foliis cordato-subrotundis acutis nervosis, laciniis corollae patulis. *C. B. S.* (M. sanguinea Jacqu.)

***muricata* Ker.** 4. M. foliis subrotundis glabris versus apicem muricatis. *C. B. S.*

***scabra* Andr.** 5. M. foliis subrotundis venosis tuberculato-scabris. *C. B. S.* (M. pustulata Ker.)

echinata 6. M. foliis ovato-oblongis tuberculatis pilosis, laciniis corollae filiformibus. *C. B. S.*

***pauciflora* Dryand.** 7. M. foliis oblongis eveniis tuberculatis glabris, laciniis corollae ovatis. *C. B. S.*

**** *Descisсentes.***

angustifolia 8. M. foliis oblongo-lanceolatis acutis erectis, corymbo patulo, laciniis corollae lanceolatis reflexis. *C. B. S.* (M. lanceolata Thunb.)

***undulata* Thunb.** 9. M. foliis lanceolatis undulatis glabris, scapo umbellato. *C. B. S.*

enſifolia Ker. 10. M. foliis oblongis acutis erectiusculis, racemo elongato folia ſuperante, tubo corollae limbum patentem excedente. *C. B. S.* (M. violacea Andr. Agapanthus enſifolius W. Mauhlia Thunb. Polianthes pygmaea Jacqu. Hyacinthus 2folius Cav.)

1184. AGAPANTHUS Herit.

umbellatus Herit. *C. B. S.* Herba foliis linearibus ſesquipedalibus, ſcapo cubitali et altiori, floribus coeruleis umbellatis. (Ag. praecox W. var. Crinum africanum L. Mauhlia linearis Thunb.)

1185. ORNITHOGALUM.

* *Caule unifloro.*

uniflorum 1. O. caule unifloro 2folio glabro, foliis oppoſitis, petalis oblongis obtuſiusculis internis latioribus. *Sibir.*

ſtriatum W. 2. O. caule 1floro folioſo, foliis radicalibus linearifiliformibus caulem aequantibus, foliis caulinis lanceolatis abbreviatis, petalis obtuſis nervoſoſtriatis. *Alp. Europ. med. Sibir. Inſ. Aleut.* (Anthericum ſerotinum L.)

bulbiferum Pall. 3. O. caule 1floro pubeſcente, foliis alternis linearifiliformibus baſi bulbiferis, petalis aequalibus acutis. *Ad Volgam. Caucaſ. Sibir.*

fibroſum Desf. 4. O. radicibus fibroſis intertextis, foliis radicalibus canaliculatis, ſcapo breviſſimo 1floro, petalis acutis. *Afric. bor.*

pygmaeum W. 5. O. foliis radicalibus geminis lineari-filiformibus canaliculatis, floralibus alternis ſubciliatis, pedunculis ſubvilloſis, petalis obtuſis. *Hiſpania. Creta.* (O. pedunculare Presl.)

bohemicum Schmidt. 6. O. caule folioſo ſub-1floro, foliis radicalibus filiformi-canaliculatis, caulinis alternis lanceolatis, petalis ſpathulatis ſtriatis. *Saxon. Bohem.* (O. fiſtuloſum Cand.)

** *Floribus paucis ſubumbellatis.*

† *Petalis obtuſiusculis.*

luteum 7. O. bulbo ſolitario ſolido, folio radicali unico lineari-lanceolato glauceſcente, floralibus ſubternis, pedunculis teretibus glabris, ſtylo tereti glabro ſtaminibus breviori. *Europ. Caucaſ.* (O. pratenſe β. W., ſylvaticum Perſ., folioſum Presl.)

pratenſe Perſ. 8. O. radice tuberoſa, folio radicali unico canaliculato, floralibus ſubſenis, pedunculis 3gonis glabris, ſtylo 3gono glabro ſtamina ſuperante. *Europ.* (O. luteum W.)

arvenſe Perſ. 9. O. bulbo nidulante, foliis pubeſcentibus radicalibus binis floralibus ſubſenis, pedunculis teretibus villoſiusculis, ſtylo 3gono ſtamina ſuperante.

Europ. Caucaſ. (O. villoſum M. B., minimum Roth. W.)

† *tunicatum* Presl. 10. O. bulbo ſolitario oblongo ſubhorizontali, folio radicali ſolitario canaliculato caulem longe excedente, floralibus oppoſitis villoſis, pedunculis ſubumbellatis. *Bohem. Moravia.*

chloranthum M. B. 11. O. bulbo reticulato-fibrilloſo, folio radicali ſolitario filiformi, caulinis alternis lineari-lanceolatis margine ſubvilloſis, pedunculis glabris, petalis obtuſis inaequalibus. *Caucaſ. Sibir.* ?(O. 3florum Ledeb.?)

Liotardi Sternb. 12. O. bulbo ſolitario, foliis radicalibus binis lineari-lanceolatis elongatis, floralibus oppoſitis ovato-oblongis nervoſis, pedunculis ſubternis villoſis, petalis obtuſiusculis ſtriatis. *Delphinat. Alp. carn. rhaet.*

†† *Petalis acutiusculis.*

minimum 13. O. bulbo nidulante, folio radicali ſolitario planiusculo, floralibus alternis, imo maximo ſpathaeformi, pedunculis ramoſis glabris corymboſis, petalis acutiusculis. *Europ. Aſia méd. et bor.* (O. ſpathaceum Hayn. Haynii Roth. Sternbergii Hopp.)

puſillum Schmidt. 14. O. bulbo grumoſo, folio radicali ſolitario canaliculato triquetro, floralibus oppoſitis, pedunculis ſimplicibus ſubumbellatis, petalis acutis. *Bohem. Transſylvan. Caucaſ.*

circinatum 15. O. bulbo fibrilloſo cavo, folio radicali lineari-filiformi elongato floralibusque ſimilibus recurvatis cauleque paucifloro incanis, petalis acuminato-cuſpidatis. *Tauria. Caucaſ. Ad Volgam.* (O. reticulatum Pall.)

gramineum Sims. 16. O. ſcapo angulato foliis linearibus altiori, umbella erecta, ſpathis ovatis obtuſiusculis, petalis acutis venoſo-ſtriatis. *Chili.*

bonarienſe Perſ. 17. O. foliis radicalibus filiformibus elongatis, bracteis ſquamaeformibus breviſſimis, pedunculis umbellato-corymboſis, petalis ſtriato-venoſis. *Bonar.* (O. ſpathaceum Poir.)

*** *Floribus corymboſo-racemoſis.*

umbellatum 18. O. foliis linearibus elongatis, pedunculis corymboſis bracteas multo ſuperantibus, petalis marginatis lanceolatis. *Europ. med.* (O. montanum Tenor. var.)

refractum W. 19. O. foliis linearibus canaliculatis, pedunculis corymboſis fructiferis reflexis, petalis ovato-oblongis. *Hungar. Neapol.* (O. exſcapum Tenor.)

fimbriatum W. 20. O. foliis linearibus planis hirſutis, racemo ſubcorymboſo paucifloro radicali, pedunculis fructiferis elongatis patentiſſimis. *Tauria.*

comoſum 21. O. foliis linearibus, racemo breviſſimo, bracteis lanceolatis flores aequantibus, petalis obtuſis. *Auſtria. Transſylvan.*

conicum Jacqu. 22. O. foliis lanceolatis margine membranaceis ciliatis, racemo conico, bracteis membranaceis pedunculos aequantibus. *C. B. S.*

niveum Soland. 23. O. foliis lineari-filiformibus canaliculatis elongatis, racemo paucifloro, pedunculis abbreviatis, petalis oblongis obtusiusculis. *Afric. austr.*

sessiliflorum Desf. 24. O. foliis lineari-canaliculatis, pedunculis brevissimis, bracteis subulatis flores aequantibus, petalis ellipticis obtusis. *Atlas.*

ovatum Thunb. 25. O. foliis radicalibus ovatis, scapo racemoso, pedunculis brevissimis approximatis, bracteis setaceis. *C. B. S.*

ciliatum Thunb. 26. O. foliis radicalibus ovatis acutis ciliatis, scapo racemoso, pedunculis capillaribus nutantibus. *C. B. S.*

crenulatum Thunb. 27. O. foliis radicalibus oblongis obtusis crenulato-ciliatis, scapo paucifloro, bracteis lanceolatis pedunculos superantibus. *C. B. S.*

maculatum Thunb. 28. O. foliis radicalibus lineari-lanceolatis ciliatis, scapo racemoso paucifloro, floribus secundis obtusis, petalis exterioribus brevioribus maculatis. *C. B. S.* (O. secundum Jacqu.)

tenellum Jacqu. 29. O. foliis linearibus acuminatis canaliculatis, racemo brevi, bracteis abbreviatis, petalis lanceolatis acutis. *C. B. S.* (O. graminifolium Thunb.)

pilosum Thunb. 30. O. foliis lineari-ensiformibus ciliatis, pedunculis racemosis incurvis bracteas lanceolatas superantibus. *Afric. austr.*

revolutum Jacqu. 31. O. foliis lanceolato-linearibus subcarnosis margine subcartilagineo-ciliatis, pedunculis racemosis erectis bracteas superantibus, petalis oblongis oblique flexis revolutis. *C. B. S.*

croceum Ell. 32. O. foliis linearibus scapo longioribus, pedunculis racemosis bracteas obtusas multo excedentibus, petalis oblongis obtusis. *Georgia.* (Phalangium croceum Mx.)

lanceolatum Labill. 33. O. foliis lanceolatis scapo longioribus, pedunculis corymbosis bracteas subaequantibus, petalis alternis majoribus. *Syria.*

corymbosum R. et P. 34. O. foliis ensiformibus acuminatis carinatis, spathis elongatis pedunculos corymbosos involventibus, petalis alternis latissimis. *Peru.*

tenuifolium Red. 35. O. foliis linearibus canaliculatis scapum aequantibus, pedunculis racemosis erectis, petalis ovatis apice glanduloso-callosis. *C. B. S.* (O. rupestre Rudolph. Rudolphii Jacqu.)

prasinum Ker. 36. O. foliis loriformibus canaliculatis scapoque folia superante glaucis, pedunculis corymbosis patentissimis bracteas longe superantibus, petalis obtusis patentibus. *C. B. S.*

suaveolens Jacqu. 37. O. foliis linearibus canaliculatis, racemo paucifloro, pedunculis cernuis flores aequantibus, petalis obtusis. *C. B. S.* (O. albucoides Thunb.?)

barbatum Jacqu. 38. O. foliis filiformibus, racemo paucifloro, petalis linearibus obtusis, exterioribus apice barbatis, interioribus mucronatis. *C. B. S.*

polyphyllum Jacq. 39. O. foliis lineari-ſubulatis ſemiteretibus, racemo paucifloro, petalis linearibus obtuſis apice calloſo-inflexis. *C. B. S.*

rupeſtre 40. O. foliis filiformibus carnoſis ſcapo longioribus, racemo paucifloro, bracteis ovatis pedunculos aequantibus, petalis obtuſis. *C. B. S.*

juncifolium Jacqu. 41. O. foliis filiformi-ſubulatis, racemo elongato multifloro, petalis lanceolatis acutis. *C. B. S.*

fuſcatum Jacqu. 42. O. foliis lineari-enſiformibus cuſpidatis ſcapo triplo brevioribus, racemo multifloro, petalis linearibus obtuſis. *C. B. S.*

odoratum Jacqu. 43. *O.* foliis linearibus depreſſis, racemo elongato, petalis lanceolatis obtuſis apice calloſo-inflexis. *C. B. S.*

albucoides Thunb. 44. O. foliis linearibus canaliculatis ſcapo brevioribus, racemo paucifloro erecto, petalis apice incraſſatis. *Afric. auſtr.* (Anthericum albucoides Ait.)

pyramidale 45. O. foliis enſiformibus, racemo conico multifloro, pedunculis erectis elongatis, petalis oblongis planis. *Hiſpan. Luſitan.*

japonicum Thunb. 46. O. foliis linearibus erectis ſcapo brevioribus, racemo cylindrico longiſſimo, pedunculis erectis elongatis, petalis lanceolatis. *China. Japon.* (O. chinenſe Lour.)

longebracteatum Jacq. 47. O. foliis enſiformibus acuminatis, racemo longiſſimo, bracteis pedunculos duplo ſuperantibus. *C. B. S.* (O. bracteatum Thunb.)

ſcilloides Jacqu. 48. O. foliis lineari-loriformibus, racemo longiſſimo, bracteis pedunculos aequantibus. *C. B. S.*

latifolium 49. O. foliis lanceolatis, racemo longiſſimo, pedunculis flore longioribus bracteas aequantibus, petalis lanceolatis patulis. *Aegypt. Arab. Italia.*

narbonenſe 50. O. foliis lanceolatis, racemo oblongo, pedunculis patentibus, filamentis latis membranaceis. *Europ. auſtr.*

pyrenaicum. 51. O. foliis linearibus canaliculatis ſuberectis, racemo elongato, pedunculis erectis bracteas ſubulatas ſubaequantibus, petalis linearibus obtuſiusculis, filamentis aequalibus obovato-mucronatis. *Anglia. Europ. auſtr.*

ſtachyoides Ait. 52. O. foliis linearibus loriformibus ſcapum ſubaequantibus, racemo longiſſimo, pedunculis patulis bracteas ſuperantibus, petalis oblongis, filamentis dilatatis, alternis brevioribus. *Europ. auſtr.* (O. pyrenaicum Gouan)

lacteum Jacqu. 53. O. foliis lanceolatis ciliatis, racemo elongato, pedunculis patulis bracteas oblongas ſuperantibus, petalis oblongis acutis. *C. B. S.*

caudatum Ait. 54. O. foliis lanceolato-linearibus loriformibus elongatis, racemo longiſſimo, petalis oblongis acutis, filamentis alternis cuneiformibus. *C. B. S.*

**** *Filamentis alternis emarginatis: Tulbaghioides.*

nutans 55. O. foliis linearibus canaliculatis, racemo elongato, pedunculis nutantibus, petalis oblongis reflexis, fila-

filamentis dilatatis conniventibus alternis 2fidis. *Europ.*

coarctatum Jacqu. 56. O. foliis linearibus canaliculatis, racemo multifloro coarctato, filamentis alternis emarginatis. *C. B. S.*

aureum Curt. 57. O. foliis lanceolatis cartilagineo-denticulatis, racemo coarctato, bracteis pedunculo brevioribus, filamentis alternis emarginatis. *C. B. S.* (O. miniatum, flavescens, flavissimum Jacqu.)

thyrsoides Jacqu. 58. O. foliis lanceolatis lucidis ciliatis, racemo corymboso, pedunculis erectis, petalis oblongis obtusis, filamentis alternis 2dentatis. *C. B. S.*

arabicum 59. O. foliis lanceolatis, racemo corymboso, bracteis cordatis, corolla subcampanulata, filamentis conniventibus alternis subemarginatis. *Lusitan. Afric. bor.*

ixioides Ait. 60. O. floribus umbellatis, filamentis omnibus 2furcatis. *California.*

hispidum Horn. 61. O. foliis ovato-lanceolatis pilosis, racemo elongato, filamentis dilatatis alternis 3cuspidatis. *C. B. S.* (Anthericum pilosum Jacq.)

virens Lindl. 62. O. foliis loriformibus glabris, racemo elongato, bracteis linearibus marcidis, filamentis alternis 3cuspidatis corolla brevioribus. *Afric. austr.*

1186. ALLIUM.

Staminibus alternis trifidis.

† *Umbella bulbifera.*

α. *Foliis planis.*

sativum 1. A. caule graminifolio, vaginis teretibus, spatha acuminata umbellam duplo superante. *Patria?*

arenarium 2. A. caule graminifolio, foliis margine carinaque ciliatis, vaginis teretibus, umbella pauciflora spatham ovato-oblongam superante. *Rupes* et *montes Europ. med.*

Scorodoprasum 3. A. caule graminifolio, ante anthesin convoluto, foliis margine glabris, vaginis ancipitibus, floribus plerisque abortientibus. *Dumeta et nemora Europ.*

Ophioscorodon Link. 4. A. caule graminifolio sub anthesi convoluto, foliis margine glabris, vaginis teretibus, floribus omnibus masculis, spatha longissime cuspidata. *Hungar.* (A. controversum Schrad.)

litoreum Bertol. 5. A. caule planifolio recto, foliis subtus convexis, spatha elongata, umbellae radiis laxis, staminibus corollam aequantibus. *Gallia provinc.* et *narbon. Italia.* (A. monspessulanum W.)

β. *Foliis teretiusculis.*

vineale 6. A. caule foliisque teretibus scabris, spatha decidua, staminibus corollam superantibus. *Europ. med.* (A. compactum Thuill. Pers.)

proliferum Schrad. 7. A. caule ſubnudo tortuoſo fiſtuloſo, umbella prolifera, ſtaminibus corollam ſuperantibus. *Patria?*

†† *Umbella capſulifera.*

α. *Foliis planis.*

Porrum 8. A. caule tereti, foliis lanceolatis carinatis acutis, umbella globoſa compacta, genitalibus corolla longioribus, *Patria?*

rotundum 9. A. caule tereti, foliis linearibus carinatis acutis, umbella ſubglobоſa, ſtaminibus corolla brevioribus. *Europ. Aſia-media.*

Ampeloprаſum 10. A. caule tereti, foliis lineari-lanceolatis elongatis, umbella patente ſubglobоſa, ſpatha lanceolata, genitalibus corollam aequantibus. *Anglia. Helvetia. Italia.*

nutans 11. A. caule nudiuſculo ancipiti ante antheſin nutante, foliis linearibus, umbella globoſa, ſtaminibus corollam ſubexcedentibus. *Sibir.*

ſtrictum Schrad. 12. A. caule tereti ſtricto, foliis linearibus obtuſis ſubtus convexis, umbella globoſa, ſtaminibus corollam ſubaequantibus. *Volhynia. Aſia med.* (A. deflexum W., volhynicum Beſſ.)

lineare 13. A. caule tereti, foliis linearibus obtuſis ſubtus convexis, ſtaminibus corolla duplo longioribus. *Aſia med.*

albidum Fiſch. 14. A. bulbis radici transverſali adnatis, caule angulato apice ante antheſin nutante, foliis linearibus ſubtus convexis, umbella patente, ſtaminibus corollam ſubaequantibus. *Tauria. Caucaſ.*

acutiflorum Loiſ. 15. A. caule tereti apice nudo, foliis linearibus, umbella multiflora ſubglobоſa ſpatham acutam ſubaequante, petalis lanceolatis acuminatis ſtamina ſubciliata ſuperantibus. *Alp. Galliae auſtr.*

multiflorum Desf. 16. A. caule tereti, foliis linearibus, umbella multiflora ſubglobоſa, ſpatha caduca, petalis lanceolatis acutis, ſtaminibus glaberrimis exſertis. *Gallia auſtr. Africa bor.*

β. *Foliis teretibus ſ. teretiuſculis.*

Cepa 17. A. caule foliisque fiſtuloſis ventricoſis, umbella capitata, ſtaminibus exſertis. *Patria?*

aſcalonicum 18. A. caule nudiuſculo tereti, foliis fiſtuloſis, umbella globoſo-capitata, petalis lanceolatis ſtamina aequantibus. *Syria. Aſia minor.*

ſphaerocephalum 19. A. caule folioſo tereti, foliis fiſtuloſis canaliculatis, umbella ovata capitato-compacta, ſtaminibus exſertis. *Italia. Helvetia. Sibiria.* (A. deſcendens L.)

guttatum Stev. 20. A. caule folioſo tereti, foliis teretibus glaucis ſcabris, umbella capitata, ſpatha multifida, petalis exiguis linearibus acutis maculatis, ſtaminibus exſertis. *Podolia. Tauria. Inſ. Scyrus maris aegei.* d'Urville.

margaritaceum Sibth. 21. A. caule folioſo tereti, foliis canaliculatis glaucis, petalis obovatis obtuſis, ſtaminibus exſertis. *Inſ. maris aegei. Aſia minor.*

pruinatum Link. 22. A. caule folioſo tereti, foliis tereti-filiformibus, umbella erecta, petalis oblongis obtuſis ſtamina excedentibus, ſtylo exſerto. *Luſitan.*

junceum Sm. 23. A. caule folioſo tereti, foliis ſubfiliformibus elongatis, umbella capitata, filamentis alternis 5fidis. *Cyprus.*

carneum W. 24. A. caule folioſo, foliis fiſtuloſis, umbella ſubcapitata, petalis oblongis acutis ſtamina ſuperantibus. *Patria?*

** *Staminibus ſimplicibus.*

† *Umbella bulbifera.*

α. *Foliis planis.*

carinatum 25. A. caule folioſo tereti, foliis linearibus ſubtus convexis, ſpatha longiſſima, umbellae radiis laxis, petalis oblongis acutiusculis ſtamina ſuperantibus. *Europ.*

canadenſe 26. A. caule baſi folioſo, foliis linearibus laevibus, ſpatha ovata mucronata, umbella faſtigiata, petalis ovalibus ſtamina aequantibus. *Amer. bor.*

flexum Kit. 27. A. caule folioſo flexuoſo, foliis linearibus anguſtis canaliculatis flaccidis, ſpatha lineari elongata, umbella faſtigiata, petalis oblongis obtuſis conniventibus, genitalibus exſertis. *Hungaria.* (A. violaceum W. ſuppl.)

Tenorii * 28. A. caule baſi folioſo, foliis linearibus, umbella pauciflora patula, ſpatha ovata cuſpidata, petalis obtuſiſſimis campanulatis, ſtaminibus incluſis. *Italia. Sicilia.* (A. carneum Tenor.)

incarnatum Horn. 29. A. caule baſi folioſo, foliis linearibus apice canaliculato-ſetaceis caule longioribus, umbella faſtigiata, petalis acutis apice crenatis, ſtaminibus incluſis. *Gallia.* (A. intermedium Cand.)

ſcorzoneraefolium Desf. 30. A. caule baſi folioſo, foliis lineari-lanceolatis canaliculatis, umbella pauciflora, petalis oblongis obtuſis campanulatis, ſtaminibus incluſis, ovario 6ptero. *Patria?*

β. *Foliis teretibus.*

oleraceum 31. A. caule folioſo tereti, foliis lineari-filiformibus canaliculatis ſcabris, ſpatha umbellam laxam ſuperante, ſtaminibus baſi petalis cohaerentibus longitudine aequalibus. *Europ.* (A. foetidum Link.)

ambiguum Sm. 32. A. caule baſi folioſo, foliis ſemiteretibus, ſtaminibus corolla brevioribus. *Italia.*

†† *Umbella capsulifera.*

α. *Foliis planis.*

1. *latioribus.*

Victorialis 33. A. caule basi folioso, foliis oblongis, umbella fastigiata, staminibus exsertis. *German. austr. Helvet.*

ursinum 34. A. caule basi foliato 3quetro, foliis oblongis in petiolum decurrentibus, umbella fastigiata, petalis lineari-lanceolatis patulis stamina superantibus, capsulis 3spermis. *Europ.*

Moly 35. A. caule basi foliato teretiusculo, foliis oblongo-lanceolatis amplexicaulibus, umbella fastigiata, petalis oblongis acutis stamina superantibus. *Europ. austr. Afric. bor.*

magicum 36. A. caule basi foliato tereti, foliis oblongo-lanceolatis canaliculatis strictis, umbella subhemisphaerica; staminibus basi connatis corolla patentissima brevioribus. *Europ. austr.* (A. monspessulanum Gouan., nigrum W., speciosum Cyrill., multibulbosum Jacq.)

Cowani Ker. 37. A. caule basi foliato semitereti, foliis oblongo-lanceolatis acuminatis flaccidis ciliatis, umbella fastigiata, petalis obtusis patentibus stamina superantibus. *Peru.*

atropurpureum Kit. 38. A. caule basi foliato, foliis ensiformibus acuminatis, spatha appressa abbreviata, umbellae fastigiatae radiis strictis, petalis linearibus patentibus stamina monadelpha superantibus. *Hungar.*

maiale Tenor. 39. A. caule foliato, foliis lato-lanceolatis canaliculatis, umbella compacta, petalis ovalibus, staminibus exsertis. *Neapol.*

caspium M. B. 40. A. caule basi foliato tereti, foliis lanceolatis undulatis, umbellae hemisphaericae radiis longissimis, staminibus corolla duplo longioribus. *Deserta ad mare caspium.* (Crinum caspium Pall., Amaryllis W.)

siculum Ucr. 41. A. caule elato tereti basi foliato, foliis lanceolato-loriformibus longissimis, spatha subnulla, umbellae radiis inaequalibus erectis, corollae campanulatae petalis exterioribus latioribus acutis, staminibus inclusis. *Sicil.*

neapolitanum Cyrill. 42. A. caule basi foliato ancipiti, foliis lanceolato-loriformibus flaccidis, umbella patente, spatha ovata acuta, petalis obtusis patulis stamina superantibus. *Neapol.*

subhirsutum 43. A. caule basi foliato subangulato, foliis lineari-lanceolatis striatis ciliatis, umbellae fastigiatae ramis erectis, petalis obtusiusculis patulis stamina superantibus. *Italia. Graecia. Africa bor.* (A. ciliatum Cyrill., niveum Roth., Clusianum Retz.)

graecum Urvill. 44. A. caule basi foliato, foliis lineari-lanceolatis elongatis hirsutis, umbellae fastigiatae radiis gracilibus, petalis acutis stamina superantibus. *Inf. Melos maris aegei.*

tricoccum Ait. 45. A. caule basi foliato semitereti, foliis lanceolatis glabris, umbella globosa, capsulis 3spermis. *Amer. bor.*

obliquum 46. A. caule ad apicem folioso, foliis lanceolatis obliquis, umbella globosa, petalis acutis, staminibus longe exsertis. *Sibir.* (A. ramosum Jacq.)

2. *Foliis angustis.*

Chamaemoly 47. A. foliis radicalibus linearibus acuminatis hirsutis, umbella radicali, petalis stamina superantibus, capsulis cernuis. *Calabria. Afric. bor.*

angulosum 48. A. caule basi foliato angulato, foliis linearibus subtus carinatis, umbella fastigiata, staminibus corollam aequantibus aut superantibus. *Europa. Asia med.* (A. inodorum et acutangulum W. danubiale *.)

senescens 49. A. caule acutangulo basi foliato, foliis linearibus subtus convexis glaucis subtortis, umbella fastigiata erecta, staminibus exsertis. *Europa.* (A. glaucum Schrad., baicalense W., montanum Schmidt.)

narcissiflorum Vill. 50. A. caule basi foliato ancipiti, foliis linearibus obtusis carinatis, umbella nutante compacta, petalis oblongis obtusiusculis stamina superantibus. *Gallia occid. et austr. Italia super.* (A. pedemontanum W., nigrum All., grandiflorum Gaud.)

cernuum Roth. 51. A. caule basi foliato 4gono, foliis linearibus carinatis, umbella fastigiata laxa cernua, petalis obtusis conniventibus, staminibus exsertis. *Amer. bor.* (A. tricorne Poir.)

suaveolens Jacq. 52. A. caule teretiusculo basi foliato, foliis linearibus obtusis carinatis, umbella globosa, petalis obtusis, staminibus longe exsertis. *Gallia. Italia.* (A. ambiguum Gand., ericetorum Thor. Bertol.)

fragrans Vent. 53. A. caule basi foliato tereti, foliis linearibus flaccidis, umbellae erectae radiis elongatis, spatha abbreviata, petalis oblongis obtusiusculis stamina comata superantibus. *Amer. bor.* (A. gracile et inodorum Ait. hyemale Rafin.)

† *mutabile* Mx. 54. A. caule basi foliato tereti, foliis linear-setaceis, umbella multiflora, spatha 3phylla, petalis lanceolatis acutis stamina superantibus, capsula 3sperma. *Carolina.*

carolinianum Gand. 55. A. caule basi foliato tereti, foliis linearibus obtusis subtus planis, umbella globosa, petalis obtusis, staminibus longe exsertis alternis latioribus, capsula polysperma. *Carolina.*

spirale W. 56. A. caule basi foliato tereti, foliis linearibus planis spiratim tortis, umbella subglobosa laxa, genitalibus petala obtusiuscula superantibus. *Russia?*

fuscum Kit. 57. A. caule foliato tereti, foliis linearibus angustis crenulatis subtus angulatis, spatha longissima reflexa foliacea, umbellae radiis elongatis flaccidis, petalis acutiusculis stamina subaequantibus *Banatus.*

ochroleucum Kit. 58. A. caule basi foliato tereti, foliis linearibus subtus planis, umbella globosa, petalis obtusis, staminibus exsertis. *Croat. Transsylvan.*

roseum 59. A. caule tereti foliato, foliis linearibus elongatis, spatha 4phylla, umbella fastigiata, petalis obtusis emarginatis, staminibus brevissimis. *Ital. Austria. Dalmatia.* (A. illyricum Jacq.)

microcephalum Tausch. 60. A. caule tereti basi foliato, foliis linearibus subtus planis rigidis enerviis, umbella globosa compacta, petalis acutiusculis, staminibus subexsertis. *Bohemia.*

Tinei Presl. 61. A. caule sulcato basi foliato, foliis linearibus erectis, umbella pauciflora, petalis obtusis stamina superantibus. *Sicil.*

tuberosum Rottl. 62. A. caule tereti basi foliato, foliis linearibus flaccidis caulem aequantibus, umbella fastigiata erecta spatham superante, petalis oblongis obtusiusculis stamina aequantibus. *Malabar.*

longifolium Humb. 63. A. caule striato basi foliato, foliis linear-loriformibus obtusis longissimis, umbella pauciflora, spatha reflexa, petalis lanceolatis stamina superantibus. *Mexico.*

album Sav. 64. A. caule 3gono basi foliato, foliis linearibus carinatis, umbellae pauciflorae radiis elongatis patentibus, petalis obtusis stamina superantibus. *Ital. Graecia.* (A. pendulinum Tenor., lacteum Sm.)

β. Foliis triquetris, teretibus, filiformibus.

triquetrum 65. A. caule basi foliato foliisque 3quetris, umbella pauciflora spatham subaequante, petalis lanceolatis stamina superantibus. *Italia. Gallia narbon. Hispan.*

† *palustre* Lag. 66. A. caule basi foliato foliisque filiformibus sub-3gonis, umbella multiflora, spatha 1phylla, petalis acuminatis stamina superantibus. *Hispan.*

stellatum Sims. 67. A. caule tereti basi foliato, foliis sub-3quetris, umbella fastigiata, staminibus inclusis. *Ad fl. Missuri.* (A. angulosum Pursh.)

flexuosum Urv. 68. A. caule folioso flexuoso, foliis semiteretibus, umbella subglobosa spatham aequante, petalis obtusis stamina aequantibus, capsulis 3spermis. *Ins. maris aegei.*

† *bisulcum* Red. 69. A. caule folioso, foliis distichis semiteretibus acutis, staminibus corollam aequantibus. *Patria?*

odorum 70. A. caule subcompresso basi foliato, foliis distichis canaliculato-3quetris, umbella fastigiata patente multiflora, petalis lanceolatis acutis stamina duplo superantibus. *Sibir.* (A. tataricum L. suppl., umbellatum Hall.)

paniculatum 71. A. caule tereti folioso, foliis semiteretibus carinatis, spatha subulata elongata, umbellae radiis pendulis, petalis obtusis stamina aequantibus. *Europ. austr.* (A. pallens Gouan., longispathum Red.)

coloratum * 72. A. caule tereti foliato, foliis semiteretibus flaccidis, spatha acuminata elongata, umbellae ra-

diis pendulis coloratis, petalis obtusis, staminibus longe exsertis. *Patria?*

parviflorum 73. A. caule tereti inferne folioso, foliis semiteretibus subulatis caule brevioribus, umbella capitata, petalis subulatis stamina aequantibus. *Afric. bor.*

foliosum Cand. 74. A. caule tereti folioso, foliis teretibus fistulosis subulatis, spatha oblonga acuta, umbella fastigiata erecta, petalis oblongis acuminatis stamina superantibus. *Gallia.* (A. acutum *.)

striatum Jacq. 75. A. caule subangulato inferne foliato, foliis semiteretibus subtus striatis, umbella fastigiata pauciflora, petalis obtusis stamina superantibus. *Amer. bor.* (A. ornithogaloides Bosc., canadense Mx.)

prostratum Trev. 76. A. caule basi foliato declinato subcompresso, foliis semiteretibus subtus 2angulatis, umbella subfastigiata multiflora, petalis obtusis crenatis, staminibus exsertis. *Sibir.*

pusillum Cyr. 77. A. caule tereti foliato, foliis semiteretibus filiformibus, umbellae radiis fructiferis pendulis, petalis obtusis integerrimis stamina aequantibus. *Sicil.* (A. obtusiflorum Poir.)

flavescens Bess. 78. A. caule basi foliato subangulato, foliis semiteretibus strictis, umbella subfastigiata, staminibus exsertis. *Podolia. Tauria.* (A. albidum M. B.)

montanum Sm. 79. A. caule foliato, foliis semiteretibus canaliculatis caulem aequantibus, umbella laxa, spatha deflexa. *Olymp. Asiae min.*

staticiforme Sm. 80. A. caule basi foliato, foliis subteretibus recurvis caule brevioribus, umbella capitata multiflora, petalis obovatis. *Inf. mar. aegei.*

fistulosum 81. A. caule folioso ventricoso foliisque fistulosis, umbella subglobosa, petalis acutis, staminibus exsertis. *Asia medii?*

sibiricum 82. A. caule tereti folioso, foliis semiteretibus caulem aequantibus, umbella globosa, petalis lanceolatis acuminatis elongatis, staminibus inclusis. *Sudetes. Sibir.*

Schoenoprasum 83. A. caule tereti basi foliato, foliis teretibus fistulosis, umbella compacta, petalis acutis stamina superantibus. *Anglia. Suecia. Sibir.*

flavum 84. A. caule folioso foliisque teretibus, umbellae radiis flaccidis, spatha elongata, petalis ovatis, staminibus exsertis. *Austr. Transsylvan. Tauria.*

globosum M. B. 85. A. caule basi foliato foliisque teretibus, umbella subglobosa, spatha acuminata elongata, petalis acutis, staminibus exsertis. *Caucas.* (A. caucasicum Sims.)

saxatile M. B. 86. A. caule basi foliato tereti, foliis semicylindricis, spatha acuminata elongata, staminibus petala patentia superantibus. *Tauria. Caucas.*

rubellum M. B. 87. A. caule tereti basi foliato, foliis semiteretibus canaliculatis, spatha abbreviata, umbella convexa multiflora, petalis acutis, staminibus inclusis. *Caucas.*

rupeſtre M. B. 88. A. caule foliato foliisque teretibus, umbella faſtigiata, ſpathae valva altera elongata, petalis conniventibus ſtamina aequantibus. *Caucaſ.*

odoratiſſimum Desf. 89. A. caule baſi foliato, foliis teretiusculis ſubulatis, ſpatha 4valvi, umbella pauciflora faſtigiata, petalis obtuſis ſtamina ſuperantibus. *Afr. bor.*

Pallaſii Murr. 90. A. caule tereti foliato, foliis ſemiteretibus ſubulatis, umbella multiflora ſpatham ſuperante, petalis lanceolatis ſtamina aequantibus. *Sibir.*

tenuiſſimum W. 91. A. caule tereti baſi foliato, foliis ſubulatis filiformibus, umbella pauciflora, petalis ſubrotundo-ovatis obtuſis ſtamina ſuperantibus. *Sibir.*

Stellerianum W. 92. A. caule baſi foliato, foliis ſemiteretibus erectis, umbella ſubgloboſa, ſtaminibus corolla longioribus. *Sibir.*

moſchatum 93. A. caule tereti baſi foliato, foliis filiformibus, umbella pauciflora, petalis lanceolatis ſtamina ſuperantibus. *Europ. auſtr. Tauria.* (A. ſetaceum Kit., capillare Cav., tenuiflorum Tenor.)

piloſum Sm. 94. A. caule foliato humili, foliis teretibus elongatis vaginisque piloſiſſimis, ſpatha acuta umbellam aequante, petalis obtuſis ſtamina aequantibus. *Inſ. maris aegei.*

circinatum Sieb. 95. A. caule baſi foliato foliisque filiformibus ſpiratim tortis piloſiſſimis, umbella 3flora, petalis acutis ſtamina ſuperantibus. *Creta.*

Cupani Rafin. 96. A. bulbo reticulato-fibrilloſo, caule filiformi foliato, foliis capillaribus tortis, umbella ſub-3flora erecta, ſpatha 1valvi, petalis lanceolatis acutis ſtamina ſuperantibus. *Sicil.*

1187. SOWERBAEA Sm.

juncea Sm. *Nov. Holl.* Herba foliis radicalibus gramineis, floribus umbellato-capitatis roſeis.

1188. BULBOCODIUM.

vernum 1. B. foliis linearibus ſtrictis, laciniis corollae lanceolatis obtuſis. *Europ. auſtr.*

verſicolor * 2. B. foliis lanceolatis glaucis demum ſpiralibus, laciniis corollae linearibus ſtrictis, ſtigmate ſubſimplici. *Ruſſia auſtr.* (Colchicum verſicolor Ker.)

1189. BLANDFORDIA Sm.

nobilis Sm. 1. Bl. foliis linearibus, pedunculis bracteas excedentibus. *Nov. Holl.*

grandiflora R. Br. 2. Bl. foliis rigidis linearibus margine cartilagineo-crenulatis, pedunculis bracteas ſubaequantibus. *Nov. Holl.* (Aletris punicea Labill.)

1190. FUNKIA *.

ovata * 1. F. foliis ovatis, floribus pendulis. *Japon.* (Hemerocallis coerulea Andr. japonica β. W.)

subcordata * 2. F. foliis subcordatis, floribus cernuis. *Japon.* (Hemerocallis alba Andr. japonica Thunb. W.)

lancifolia * 3. F. foliis ovato-lanceolatis, floribus cernuis. *Japon.* (Hemerocallis lancifolia et japonica Thunb. Aletris japonica Ej.)

1191. YUCCA.

* *Foliis integerrimis.*

Gloriosa 1. Y. arborescens, foliis lineari-lanceolatis rigidis erectis, floribus campanulatis. *Carolina.* (Y. superba Haw.)

obliqua Haw. 2. Y. arborescens subramosa, foliis lanceolato-linearibus obliquis glaucis. *Patria?*

rufo-cincta Haw. 3. Y. subacaulis, foliis lanceolato-linearibus marginatis flaccidis glaucescentibus, floribus subcampanulatis. *Patria?*

stricta Ker. 4. Y. acaulis, foliis lanceolato-linearibus acuminatis strictissimis, scapo basi ramoso, floribus globoso-campanulatis. *Carolina.*

** *Foliis margine filamentosis.*

filamentosa 5. Y. acaulis, foliis lanceolatis acutis patulis concavis marginatis, scapo ramoso. *Virginia.*

concava Haw. 6. Y. acaulis, foliis oblongo-lanceolatis obtusis submucronatis scabris nervoso-striatis. *Patria?* (Y. flaccida Haw.?)

angustifolia Nutt. 7. Y. acaulis, foliis linearibus erectis rigidis glaucis, scapo simplici. *Ad fl. Missuri.* (Y. glaucescens Haw.?)

recurva Salisb. 8. Y. arborescens, foliis lineari-lanceolatis rigidis reflexis, laciniis corollae interioribus latioribus. *Graecia.*

*** *Foliis margine serrulatis; arborescentes.*

Draconis 9. Y. foliis imbricatis lanceolato-linearibus margine asperis reflexis. *Carolina.*

aloifolia 10. Y. foliis imbricatis lanceolato-linearibus margine serrulato-asperis strictis. *Nov. Hispan.*

serrulata Haw. 11. Y. foliis arcte imbricatis linearibus margine asperrimo strictis. *Georgia.*

conspicua Haw. 12. Y. foliis sparsis lato-lanceolatis margine serrulato-asperis. *Patria?*

crenulata Haw. 13. Y. foliis lineari-lanceolatis obliquis subrecurvis glaucis margine carinaque asperis. *Patria?*

arcuata Haw. 14. Y. foliis lanceolato-linearibus flaccidis recurvo-arcuatis margine asperiusculis. *Patria?*

tenuifolia Haw. 15. Y. foliis linearibus angustissimis carinato-subsquetris serrulatis rigidis. *Patria?*

**** *Foliis margine spinosis.*

spinosa Kunth. 16. Y. arborescens, foliis linearibus margine simpliciter spinosis. *Nov. Hispan.*

acaulis Kunth. 17. Y. acaulis, foliis lanceolato-ensiformibus margine spinosis, spinis 2fidis reflexis. *Caracas.*

1192. PONTEDERIA.

cordata — 1. P. foliis cordatis, floribus ſpicatis, pedunculo villoſo. *Virginia.*

azurea Sw. — 2. P. foliis ſubrotundo-ellipticis, petiolis elongatis incraſſatis ſuberoſis, floribus ſpicatis, pedunculo glabro. *Jamaica.*

lanceolata Nutt. — 3. P. foliis oblongo-lanceolatis obtuſis, petiolis ſpicisque abbreviatis. *Georgia. Carolina.* (P. lancifolia Mühlb. Ell.)

anguſtifolia Purſh. — 4. P. foliis ſubcordato-3angularibus acutis, floribus ſpicatis. *Nov. Caeſar.*

rotundifolia — 5. P. foliis orbiculato-cordatis obtuſis, racemo ſpicato ovato hiſpidiusculo. *Surinam.*

craſſipes Mart. — 6. P. foliis rhombeo-ovatis, petiolis incraſſati ſpongioſo-celluloſis, ſcapo ſub-3floro. *Braſil.*

vaginalis — 7. P. foliis ſubcordato-oblongis acutis, petiolis elongatis vaginantibus, floribus axillaribus racemoſis cernuis. *Ind. or.*

dilatata Buchan. — 8. P. foliis cordatis, floribus umbellato-corymboſis. *Ind. extra Gangem.*

haſtata — 9. P. foliis haſtatis, floribus faſciculato-umbellatis, filamentis inferioribus connatis ſ. furcatis. *Ind. or.*

paniculata * — 10. P. foliis cordato-ovatis acutis, panicula erecta, laciniis corollae longe unguiculatis. *Braſil.*

1193. NARCISSUS.

* *Hermione* Salisb. Corona laciniis corollae brevior. Spatha 8-multiflora.

ſerotinus — 1. N. foliis ſubulatis, ſcapo gracili, ſpatha 1-pauciflora, laciniis corollae anguſtis acutis, corona ſubcrenulata breviſſima. *Sicilia. Sardinia. Hiſp. auſtr. Numidia.* (N. Brouſſoneti Lag.?)

viridiflorus Schousb. — 2. N. foliis teretibus fiſtuloſis, ſpatha multiflora, laciniis corollae linearibus diſtantibus alternis apice uncinatis, corona campanulata breviſſima. *Hiſpan. auſtr. Mauritania. Numidia.*

Jonquilla — 3. N. foliis linearibus canaliculatis, ſcapo compreſſo, ſpatha multiflora, tubo corollae elongato, laciniis ovatis alternis latioribus coronam cyathiformem plicato-crenulatam triplo ſuperante. *Gallia auſtr.* (N. tenuior Curt., gracilis Sabin., anguſtifolius W., ochroleucus Loiſ. varr.)

Tazzetta — 4. N. foliis planis obtuſiusculis glauceſcentibus, ſcapo teretiusculo, ſpatha multiflora, laciniis corollae ſubdiscoloribus coronam campanulatam truncatam integerrimam triplo ſuperante. *Europ. auſtr. Afric. bor. Aſia minor. Japon.* (N. intermedius Red., chrysanthus Cand., flavus Lag. varr.)

primulinus Haw. — 5. N. foliis linearibus canaliculatis viridibus, ſcapo ſubcompreſſo, ſpatha multiflora, tubo corollae longiſſimo, laciniis ovato-ſubrotundis coronam

globam patulam ſuperantibus. *Hiſpania.* (N. bifrons Sims., compreſſus Haw.)

longiflorus W. 6. N. foliis linearibus planis virentibus, ſcapo teretiusculo, laciniis corollae oblongis mucronatis tubo duplo brevioribus, corona breviſſima 6partita. *Neapol. Graecia. Aſia minor.* (N. praecox Tenor., tereticaulis Haw.)

patulus Loiſ. 7. N. foliis canaliculatis glauceſcentibus, ſcapo teretiusculo, ſpatha multiflora, laciniis corollae discoloribus alternis latioribus coronam cyathiformem obſolete lobatam 4plo ſuperantibus. *Inſ. Stoechades.* (N. radiatus Red., orientalis Sims.)

polyanthes Loiſ. 8. N. foliis lato-linearibus viridibus, ſcapo teretiusculo, ſpatha multiflora, laciniis corollae ovatis alternis latioribus coronam cyathiformem ſubintegerrimam triplo ſuperantibus. *Hiſpan. Gall. auſtr. Ital.* (N. Tazzetta All.)

niveus Loiſ. 9. N. foliis planiusculis viridibus, ſcapo depreſſo ancipiti, laciniis corollae lanceolatis concoloribus coronam campanulatam crenatam 4plo ſuperantibus. *Gallia auſtr. Hiſpan.* (N. ſtellatus Cand., anceps Ej.?, papyraceus α. Sims.)

unicolor Tenor. 10. N. foliis planis glauceſcentibus, ſcapo teretiusculo, ſpatha multiflora, laciniis corollae oblongis concoloribus coronam campanulatam plicatam laceram 6plo ſuperantibus. *Inſ. Caprea.*

orientalis 11. N. foliis latiusculis, ſcapo ancipiti, ſpatha ſubbiflora, laciniis corollae oblongis coronam campanulatam 3fidam emarginatam 3plo ſuperantibus. *Italia. Aſia minor.* (N. italicus Gawl.?)

dubius Gouan. 12. N. foliis planiusculis glauceſcentibus, ſcapo obtuſe compreſſo, ſpatha multiflora, laciniis corollae ovalibus coronam cyathiformem denticulatam duplo ſuperantibus. *Ad Monſpel.* (N. Trewianus Ker., crenulatus Haw.)

** *Narciſſus* Salisb. Corona brevis patellaris ſubintegra laciniis brevior. Tubus laciniis brevior. Spatha ſubbiflora.

poëticus 13. N. foliis linearibus planis, ſcapo ancipiti, laciniis corollae baſi ſibi incumbentibus, corona breviſſima ſcarioſa crenulata marginata. *Anglia et Europ. auſtr.* (N. recurvus Haw. var.)

majalis Curt. 14. N. foliis canaliculatis glaucis, ſcapo ancipiti, laciniis corollae contiguis margine deflexis, corona breviſſima ſcarioſa crenulata. *Alp. auſtr.? Ad Monſpel.* (N. patellaris Salisb.)

radiiflorus Salisb. 15. N. foliis linearibus ſubcontortis glaucis, ſcapo gracili compreſſo, tubo corollae elongato, laciniis corollae diſtantibus ſpathulato-mucronatis, corona abbreviata ſcarioſa marginata. *Gallia auſtr. Helvetia.* (N. anguſtifolius Curt.)

biflorus Curt. 16. N. foliis linearibus acute carinatis margine inflexis, ſcapo ante anthesin geniculato 2floro, laciniis corollae oblongis patulis, corona breviſſi-

ma ſcarioſa marginata. *Anglia. Ager romanus.* (N. poëticus Hudſ., cothurnalis Salisb.)

*** *Queltia* Salisb. Corona repanda lobata laciniis corollae dimidio brevior. Tubus lacinias aequans. Spatha uni-pauciflora.

incomparabilis Curt. 17. N. foliis glaucis, ſcapo ancipiti, ſpatha 1flora ſcarioſa, tubo corollae cernuae elongato, laciniis oblongis discoloribus coronam cyathiformem undulatam erectam duplo ſuperantibus. *Italia. Gallia auſtr.*

odorus 18. N. foliis linearibus canaliculatis tortis viridibus, ſcapo teretiusculo, ſpatha ſub-1flora tubuloſa elongata colorata, laciniis ovato-oblongis patentibus coronam campanulatam 6lobam dimidio ſuperantibus. *Europ. auſtr.* (N. Gouani Roth, lobatus Poir., laetus Cand., major γ. Gawl., Sibthorpii Haw., obvallaris Salisb., calathinus L., Infundibulum Poir., elatior Haw., conſpicuus Salisb. varr.)

trilobus 19. N. foliis linearibus canaliculatis, ſcapo ancipiti, ſpatha ſubmultiflora, laciniis corollae coronam campanulatam 3lobam discolorem dimidio ſuperantibus. *Hiſpan.* (N. 3partitus Horn.)

triandrus 20. N. foliis linearibus canaliculatis, ſcapo teretiusculo, ſpatha ſub-3flora, laciniis corollae cernuae reflexis lanceolatis coronam campanulatam crenulatam dimidio ſuperantibus, ſtaminibus alternis prominulis, ſtylo ſubexſerto. *Pyrenaei. Hiſpan. cantabr.* (N. calathinus et pumilus Red., concolor Haw., cernuus Salisb., nutans Haw., 3lobus Sims.)

**** *Aiax.* Corona ſubrepanda lacinias corollae aequans vel ſuperans. Stamina aequalia. Spatha 1flora.

Pſeudonarciſſus 21. N. foliis planis glaucis lanceolato-linearibus, ſcapo compreſſo ſtriato, ſpatha 1flora ſcarioſa, coronae campanulatae limbo patulo undulato inciſo lacinias corollae concoloris planas oblongas patentes aequante. *German. med. Anglia. Europ. auſtr. Tauria.* (N. hiſpanicus Gouan., major Curt., grandiflorus Salisb., glaucus Horn., ſerratus Haw.)

minor 22. N. foliis linearibus ſcapum ancipitem glaberrimum ſuperantibus, ſpatha 1flora virente, corona obconica erecta 6fida criſpa lacinias corollae nutantis lanceolatas discretas aequante. *Hiſpania.* (N. exiguus Salisb. N. bicolor L. eſt varietas foliis latioribus, corona discolore crenulato-lobata. N. reflexus Brot.?)

moſchatus 23. N. foliis lineari-lanceolatis glaucis ſubtortis, ſcapo compreſſo, ſpatha 1flora ſcarioſa, corona cylindrica ſulcata, limbo erecto repando-cre-

nato lacinias corollae cernuae ſubconcoloris oblongas tortas ſubaequante. *Hiſpan. Gall. auſtr.* (N. tortuoſus, albus, abſciſſus Haw.; montanus Sabini, Macleai Ker.; tubaeflorus, poculiformis Salisb., cernuus Roth., candidiſſimus Red. varr.)

Bulbocodium 24. N. foliis ſubulatis ſtrictis ſcapum aequantibus, ſpatha 1flora, corona turbinata truncata integerrima laciniis corollae ſubcernuae linearibus patentibus longiore, ſtaminibus declinatis, ſtylo exſerto. *Hiſpan. Luſitan.* (N. juncifolius Lag.?, tenuifolius Red.)

albicans Haw. 25. N. foliis obtuſiusculis flaccidis, ſpatha 1flora, corona turbinata integerrima lacinias corollae concoloris anguſtas appreſſas aequante, ſtylo exſerto. *Hiſpania cantabric.* (N. inflatus Haw., obeſus Salisb.)

1194. CALOSTEMMA R. Br.

album R. Br. 1. C. foliis oblongo-ellipticis ſubſolitariis, coronae dentibus ſterilibus linearibus emarginatis. *Nov. Holl.*

purpureum R. Br. 2. C. foliis linearibus flaccidis ſerotinis, laciniis coronae 3dentatis, dente medio ſtaminifero. *Nov. Holl.*

luteum Ker. 3. C. foliis linearibus flaccidis coaetaneis, corona inter ſtamina 2dentata. *Nov. Holl.*

1195. PANCRATIUM.

* *Coronae pagina interiore ſtaminifera.*

† *Corona lobata.*

calathinum Ker. 1. P. foliis acutis, ſcapo ancipiti paucifloro, ſpatha herbacea, corona 6loba cyathiformi crenata laciniis corollae ſubbreviore, ſtaminibus introrſum verſis. *Braſil.* (Iſmene Herb.)

nutans Ker. 2. P. foliis obtuſis, ſcapo ancipiti paucifloro, ſpatha ſcarioſa, corona 6loba campanulata plicata dentata laciniis corollae breviore, antheris filamenta conniventia ſuperantibus. *Braſil.* (Iſmene Herb.)

Amancaës Ker. 3. P. foliis canaliculatis acutis, ſcapo ancipiti paucifloro, ſpatha ſcarioſa, floribus nutantibus, corona ſtellata 12loba crenata laciniis breviore, ſtaminibus introrſum verſis. *Peru.* (Narciſſus Amancaës R. et P. Iſmene Herb.)

†† *Corona* 12*dentata*, *aut* 6*dentata*, *dentibus fiſſis.*

maritimum 4. P. foliis ſublinearibus ſcapoque compreſſo glaucis, ſpatha ſcarioſa, floribus erectis, coronae campanulatae dentibus brevibus obtuſiusculis, ſtaminibus introrſum verſis. *Europ. auſtr. Afric. bor. Carolina. Ind. or.* (P. carolinianum L.)

canarienſe Ker. 5. P. foliis lanceolatis obtuſis ſcapoque compreſſo glaucis, floribus pedunculatis, tubo corollae abbreviato, coronae dentibus ovatis, ſtaminibus conniventibus. *Inſ. Canar.*

zeylanicum 6. P. foliis oblongo-lanceolatis acutis, ſpatha herbacea 1flora, laciniis corollae elongatis revolutis, dentibus coronae reflexis acutis. *Ind. or.*

longiflorum Roxb. 7. P. foliis anguſte lanceolatis, ſcapo humili, ſpatha 1flora, laciniis corollae tubo brevioribus, dentibus coronae ſtamina conniventia aequantibus. *Inſ. Molucc.*

verecundum Soland. 8. P. foliis oblongo-lanceolatis acuminatis, ſpatha ſubtriflora, tubo corollae longiſſimo, coronae dentibus acutis ſtaminibusque exſertis erectis. *Ind. or.*

illyricum 9. P. foliis lanceolatis obtuſis glaucis, ſcapo ancipiti, ſpatha multiflora, floribus ſubpedunculatis, laciniis corollae reflexis, dentibus coronae ſubulatis, ſtaminibus divergentibus longe exſertis. *Europ. auſtr.*

parviflorum Red. 10. P. foliis ligulatis canaliculatis, ſpatha ſub-6flora, laciniis corollae reflexis, filamentis baſi dilatatis utrinque dentatis, coronae dentibus acutis. *Patria?*

amboinenſe 11. P. foliis petiolatis oblongis coſtatis, ſpatha multiflora, laciniis corollae linearibus revolutis tubum longe ſuperantibus, coronae dentibus lanceolatis acutis, ſtaminibus longiſſime exſertis. *Amboina.* (Proiphys Herb.)

ringens R. et P. 12. P. foliis loriformibus canaliculatis, ſpatha ſub-5flora, limbi laciniis ſubringentibus, coronae dentibus reflexis, ſtaminibus declinatis. *Peru.* (Liriope Herb.)

undulatum Kunth. 13. P. foliis petiolatis ellipticis, ſcapo compreſſo multifloro, floribus ſeſſilibus, ſtaminibus limbo brevioribus. *Caracas.* (Hymenocallis Herb.)

** *Corona e dentibus ſtaminifera.*

anguſtum Ker. 14. P. foliis lanceolatis acuminatis, ſcapo ancipiti, ſpatha multiflora, floribus ſeſſilibus, laciniis corollae linearibus longiſſimis pendulis, coronae dentibus ſubintegerrimis acutiusculis, ſtaminibus erectis longiſſime exſertis. *Amer. auſtr.*?

expanſum Sims. 15. P. foliis lineari-lanceolatis ſtriatis, laciniis corollae patentiſſimis tubo longioribus, filamentis flexuoſis. *Patria?*

guianenſe Ker. 16. P. foliis longe petiolatis elliptico-oblongis acutis, ſpatha multiflora, floribus ſeſſilibus, tubo corollae gracili elongato, laciniis linearibus pendulis, interſtitiis ſtaminum integerrimis, filamentis longiſſime exſertis. *Guiana.* (Hymenocallis Herb.)

litorale Jacq. 17. P. foliis lineari-lanceolatis loriformibus, ſpatha multiflora, interſtitiis ſtaminum irregulariter denticulatis, laciniis corollae revolutis tu-

bum aequantibus. *Amer. auſtr.* (P. diſtichum Bot. mag.)

Dryandri Ker. 18. P. foliis lanceolatis loriformibus. ſpatha multiflora, interſtitiis ſtaminum ſubrepandis, laciniis corollae tubum aequantibus. *Patria?* (Hymenocallis Herb.)

rotatum Ker. 19. P. foliis linearibus obtuſiusculis loriformibus, ſpatha ſubmultiflora, interſtitiis ſtaminum inciſo-dentatis, laciniis corollae tubum aequantibus. *Carolina.* (P. mexicanum Walt. diſciforme Red.)

mexicanum 20. P. foliis lineari-lanceolatis acuminatis, ſpatha 2flora, interſtitiis ſtaminum ſubrepandis, laciniis corollae linearibus patentibus tubum aequantibus. *Mexico.*

caribaeum. 21. P. foliis oblongis acutis, ſcapo multifloro, floribus ſeſſilibus, interſtitiis ſtaminum 1dentatis, laciniis corollae revolutis tubum ſuperantibus, ſtaminibus longiſſimis. *Ind. occ.* (P. declinatum Jacq.)

patens Red. 22. P. foliis lanceolato-linearibus, floribus ſeſſilibus, interſtitiis ſtaminum repandis, laciniis corollae linearibus rectiuſculis tubo longioribus. *Ind. occ.* (P. declinatum Red. fragrans Salisb.)

amoenum Salisb. 23. P. foliis oblongis petiolatis, floribus ſeſſilibus divaricatis, interſtitiis ſtaminum 2dentatis, laciniis corollae revolutis tubo longioribus. *Guiana.*

ovatum Mill. 24. P. foliis ovato-oblongis utrinque attenuatis, ſpatha multiflora, floribus ſeſſilibus, interſtitiis ſtaminum 1dentatis, laciniis corollae linearibus undulatis elongatis. *Ind. occid.* (P. amoenum Andr.)

ſpecioſum Salisb. 25. P. foliis oblongis acutis petiolatis, ſpatha multiflora, floribus pedunculatis, interſtitiis ſtaminum ſubulato-dentatis, laciniis corollae revolutis linearibus tubum ſuperantibus. *Ind. occid.* (Hymenocallis Herb.)

biflorum Roxb. 26. P. foliis ſpathulato-linearibus, ſpatha 2flora, interſtitiis ſtaminum eroſis, laciniis corollae revolutis tubum 3gonum aequantibus, ſtaminibus divaricatis. *Ind. or.*

viridiflorum R. et P. 27. P. foliis enſiformibus ſuberectis, ſcapo elato ſub-4floro, corona limbum corollae aequante, ſtaminibus exſertis. *Peru.*

**** Corona breviſſima, vel e filamentis baſi dilatatis conflata; Chryſiphialae* Lamb.

auſtrale * 28. P. foliis petiolatis cordato-ſubrotundis coſtatis, ſpatha multiflora, floribus pedunculatis, filamentis baſi dilatatis, alternis 2dentatis in urceolum coalitis limbo corollae brevioribus, antheris erectis. *Nov. Holland.* (P. auſtralaſicum Ker.)

flavum R. et P. 29. P. foliis linearibus canaliculatis, ſcapo tereti multifloro, floribus pedunculatis, limbi campanulati laciniis erectis oblongis, corona latente,

antheris incumbentibus limbum aequantibus, ſtylo clavato. *Peru.* (Stenomeſſon Herb.)

luteum Poir. 30. P. foliis linearibus obtuſis, ſcapo compreſſo ſub-3floro, limbi laciniis oblongis mucronatis patentibus tubo brevioribus, filamentis alternis 2dentatis in urceolum coalitis, antheris erectis, ſtigmate 3fido. *Chili.* (Chlidanthus fragrans Lindl.)

coccineum R. et P. 31. P. foliis linearibus acutis, ſcapo torto ſub-6floro, floribus pedunculatis, limbi laciniis erectis oblongis, tubo baſi conſtricto, filamentis baſi in cyathum dentatum connatis corollam aequantibus. *Peru.* (P. croceum Red. aurantiacum Kunth. Stenomeſſon Herb.)

recurvatum R. et P. 32. P. foliis enſiformibus, ſcapo ancipiti ſub-3floro, floribus pedunculatis, tubo corollae cernuae incurvo, coronae breviſſimae dentibus ſubulatis filamenta aequantibus, ſtaminibus alternis brevioribus corollam aequantibus. *Peru.* (Carpodetes Herb.)

latifolium R. et P. 33. P. foliis oblongo-lanceolatis petiolatis, ſcapo tereti, floribus pendulis, laciniis limbi conniventibus, corona breviſſima 6partita dentata, ſtaminibus exſertis. *Peru.* (Leperiza Herb.)

variegatum R. et P. 34. P. foliis enſiformibus, ſcapo ancipiti, floribus pedunculatis, tubo corollae longiſſimo, laciniis limbi erecto-patulis ovatis acuminatis, coronae dentibus furcatis reflexis. *Peru.*

incarnatum Kunth. 35. P. foliis linearibus obtuſis, ſcapo ancipiti ſub-4floro, laciniis limbi patulis obtuſis, corona breviſſima 12dentata, ſtaminibus corolla brevioribus. *Quito.*

† *humile* Cav. 36. P. foliis lineari-ſubulatis flaccidis ſcapo 2floro longioribus, floribus pedunculatis erectis, laciniis limbi tubo longioribus patentiſſimis obtuſis, corona crenulata breviſſima. *Hiſpan. auſtr.*

1196. GALANTHUS.

nivalis 1. G. foliis linearibus obtuſis planis. *Europ.*

plicatus M. B. 2. G. foliis oblongis margine utrinque plicatis. *Caucaſ. Aſia media.*

1197. LEUCOÏUM.

vernum 1. L. ſpatha 1flora, ſtylo clavato, foliis lineari-lanceolatis obtuſis. *Europ.*

trichophyllum Brot. 2. L. ſpatha 1flora, ſtylo filiformi, foliis linearifiliformibus canaliculatis elongatis. *Luſitan. Numidia.* (L. grandiflorum Red.)

† *roſeum* Mart. 3. L. ſpatha 1flora, ſtylo foliisque filiformibus. *Corſica.*

† *capitulatum* Lour. 4. L. ſpatha 1flora, foliis oblongis plicatis, petiolis triquetris. *Cochinchina.*

5.

autumnale 5. L. ſpatha ſubmultiflora, ſtylo foliisque filiformibus. *Europ. auſtr.*

aeſtivum 6. L. ſpatha multiflora, ſtylo clavato, foliis lineari-lanceolatis. *Europ. auſtr.*

1198. AMARYLLIS.

* *Uniflorae.*

† *Corollae faux nuda.*

pumila Spin. 1. A. foliis linearibus canaliculatis, ſpatha 2fida acuta tubum corollae regularis ſuperante, ſtaminibus incluſis. *Patria?*

Atamaſco 2. A. foliis ligulatis, ſpatha 2fida acuta tubum ſubaequante, laciniis corollae campanulatae acutis, ſtaminibus erectis. *Carolin. Virgin.* (Zephyranthes Herb.)

tubiſpatha Herit. 3. A. foliis linearibus glaucis ſubtus convexis, ſpatha 2fida tubuloſa, tubo corollae ſubnullo, laciniis internis minoribus, ſtaminibus aequalibus. *Amer. auſtr.* (Zephyranthes Herb.)

candida Ker. 4. A. foliis linearibus carnoſis ſcapum ſuperantibus, ſpatha hinc fiſſa, laciniis corollae erectis obtuſis ſtamina aequalia ſuperantibus. *Peru.*

Berterii * 5. A. foliis lato-lanceolatis ſubloriformibus, ſpatha 2fida lanceolata, tubo longiſſimo, laciniis corollae campanulatae erectis acutis, ſtaminibus declinatis. *Amer. auſtr.* Bertero.

pudica Ker. 6. A. ſcapo abbreviato, ſpatha diphylla, tubo corollae abbreviato, laciniis corollae acuminatis conniventibus, infima ſtaminibusque declinatis. *C. B. S.*

Pumilio Ait. 7. A. folio ſolitario lineari, ſpatha diphylla, tubo corollae ventricoſo, laciniis oblongis acutis reflexis, ſtaminibus inclinatis alternis brevioribus. *Afric. auſtr.* (Gaſtronema Sims.)

†† *Corollae faux ſquamis coronata.*

minuta Humb. 8. A. foliis anguſtiſſimis linearibus, ſpatha inflata acuminata, limbo corollae campanulatae regulari, ſtaminibus aequalibus. *Nov. Hiſpan.*

nervoſa Humb. 9. A. foliis anguſtiſſimis linearibus, ſpatha lanceolata elongata, laciniis corollae campanulatae oblongis acutis nervoſis aequalibus, ſtaminibus aequalibus alternis brevioribus. *Mexico.*

tubiflora Herit. 10. A. foliis binis linearibus, ſpatha diphylla, tubo longiſſimo, corolla infundibuliformi, laciniis patentiſſimis lanceolatis acuminatis elongatis, ſtaminibus aequalibus. *Lima.*

flammea R. et P. 11. A. foliis linearibus acuminatis abbreviatis, corollae campanulatae laciniis ſubconvolutis reflexis tubum ſuperantibus; ſtaminibus erectis abbreviatis. *Lima.*

peruviana Ker. 12. A. foliis linearibus carinatis, corolla campanulata patentiuscula, ſtaminibus erectis, ſtylo declinato. *Peru.* (A. aurea R. et P.)

maculata Herit. 13. A. ſcapo maculato, ſpatha diphylla lineari, corolla campanulata, genitalibus declinatis. *Chili.*

formoſiſſima 14. A. foliis ſublinearibus canaliculatis elongatis, corolla bilabiata nutante, genitalibus declinatis. *Amer. auſtr.* (Sprekelia Herb.)

** *Subbiflorae.*

† *Corollae faux coronata.*

Reginae 15. A. foliis ſubloriformibus carinatis, pedicellis divaricatis, corollae cernuae ſubringentis fauce fimbriata, laciniis oblongis undulatis, ſtaminibus declinatis. *Ind. occ. Amer. auſtr.* (A. bráſilienſis Andr.)

miniata R. et P. 16. A. foliis loriformibus ſcapoque glaucis, corolla ringente cernua, lacinia ſuprema reflexa, tubo breviſſimo fimbriato, ſtaminibus declinatis. *Peru.*

equeſtris Jacq. 17. A. foliis lato-lanceolatis, ſcapo glauco, pedicellis erectis ſpatha brevioribus, tubo corollae horizontali fimbriato filiformi, limbo patulo, genitalibus declinatis corolla brevioribus. *Ind. occ. Amer. auſtr.* (A. dubia L.)

maranenſis Ker. 18. A. foliis lato-lanceolatis nitidis baſi purpuraſcentibus, pedicellis erectis, tubo cernuo fimbriato, limbo patulo ſubringente, genitalibus declinatis corollam ſuperantibus. *Braſil.* (Hippeaſtrum ſtyloſum Sims.)

chilenſis Herit. 19. A. foliis linearibus compreſſis carnoſis, ſcapo purpuraſcente, ſpatha colorata, tubo brevi intus ſquamis 3-4fidis coronato, laciniis lanceolatis patulis, filamentis declinatis corolla brevioribus. *Chili. Peru.*

calyptrata Ker. 20. A. foliis lato-lanceolatis loriformibus ſcapo longioribus, laciniis corollae ſubringentis oblongis undulatis tubo longioribus, faucis corona contracta triangulari, genitalibus declinatis exſertis. *Braſil.*

aulica Ker. 21. A. foliis lanceolatis loriformibus, pedicellis erectis, tubo ſubnullo, faucis corona contracta 3angulari, limbo ringente, laciniis oblongis acutis, genitalibus declinatis corolla brevioribus. *Braſil.*

pſittacina Ker. 22. A. foliis lanceolatis ſcapoque glaucis, pedicellis erectis, corona faucis membranacea denticulata, limbi campanulati, laciniis oblongis, genitalibus declinatis corollam ſubaequantibus. *Braſil.*

†† *Corollae faux nuda.*

chloroleuca Ker. 23. A. folio ſolitario lineari, ſpatha acuta erecta, corollae campanulatae tubo ſubnullo, laciniis

conniventibus, ſtaminibus erectis alternis brevioribus. *Patria?* (Zephyranthes Herb.)

ſolandraeflora Lindl. 24. A. foliis lanceolatis obtuſiusculis erectis ſcapo multo brevioribus, tubo corollae longiſſimo, limbo intus ſtriato glabro. *Cayenn.*

fulgida Ker. 25. A. foliis oblongo-lanceolatis, ſcapo glauco, pedicellis erectis tuboque elongatis, corollae cernuae ſubringentis lacinia ſuprema latiſſima, genitalibus declinatis corolla ſubbrevioribus. *Braſil.*

rutila Ker. 26. A. foliis lanceolatis ſubloriformibus, ſcapo glauco, pedicellis erectis, tubo corollae abbreviato, limbo bilabiato, lacinia infimae anguſtiore, genitalibus declinatis corolla brevioribus. *Braſil.*

Principis Salm. 27. A. foliis oblongis obtuſis baſi attenuatis ſubtus purpuraſcentibus ſcapo multo brevioribus, ſpatha ſubtriflora, tubo corollae limbum ſuperante. *Braſil.*

** *Multiflorae.*

† *Corolla ſubregularis.*

bicolor R. et P. 28. A. foliis ſubloriformibus, ſcapo ancipiti, corollae campanulatae tubo ſquamato, ſtaminibus erectis. *Peru.*

tatarica Pall. 29. A. foliis linearibus anguſtiſſimis, floribus longe pedicellatis, corollae campanulatae laciniis ſubinaequalibus, genitalibus incluſis. *Montes Aſiae.* (A. montana Labill.)

blanda Ker. 30. A. foliis oblongo-lanceolatis obtuſis loriformibus, pedicellis divaricatis, corollae nutantis tubo turbinato abbreviato, laciniis undulatis patentiſſimis, ſtaminibus declinatis. *C. B. S.*

cyrtanthoides Sims. 31. A. foliis loriformibus obtuſis, pedicellis cernuis, corolla campanulata, genitalibus rectis exſertis. *Chili.*

ignea Lindl. 32. A. foliis lineari-lanceolatis obtuſis, umbella 6flora, pedunculis corollas aequantibus, laciniis corollae conniventibus ſtigmate ſimplici brevioribus. *Chili.*

Belladonna 33. A. foliis loriformibus ſcapo compreſſo brevioribus, corollae nutantis campanulatae laciniis oblongis baſi connatis. *Ind. occ. C. B. S.* (A. pallida Red. variabilis Jacq.)

vittata Ait. 34. A. foliis loriformibus ſcapo tereti brevioribus, corollae campanulatae laciniis ſubconnatis margine criſpis. *C. B. S.?*

purpurea Ait. 35. A. foliis lanceolatis obtuſis ſcapum ſubcompreſſum aequantibus, corollae infundibuliformis tubo elongato, fauce coronata, laciniis ovalibus ſubaequalibus, ſtaminibus rectis. *C. B. S.* (A. elata Jacq. ſpecioſa Herit. Crinum ſpecioſum Th. L. ſuppl. Vallota Herb.)

abranica Burch. 86. A. foliis ſubfalcatis ſerrulatis ſcapoque ancipiti glaucis, floribus numeroſis ſubſeſſilibus, laciniis limbi linearibus revolutis tubo longioribus, ſtaminibus erectis. *Afr. auſtr.* (Ammocharis Herb.)

marginata Jacq. 87. A. foliis lingulatis proſtratis cartilagineo-marginatis, pedunculis clavatis, corolla ſub-6petala revoluta, ſtaminibus rectis longe exſertis. *C. B. S.* (Brunsvigia Ker. Imhofia Herb.)

falcata Ait. 88. A. foliis ſubfalcatis ſerrulatis, ſcapo compreſſo umbellam aequante, pedunculis angulatis clavatis, corolla ſub-6petala erecta. *C. B. S.* (Crinum Jacqu. Haemanthus Th. Brunsvigia Ker. Ammocharis Herb.)

diſticha 89. A. foliis lanceolatis loriformibus margine laevibus ſcapoque ſubcompreſſo glaucis, pedunculis numeroſis confertis clavatis, corollae infundibuliformis laciniis revolutis, ſtaminibus longiſſime exſertis. *C. B. S.* (Haemanthus toxicarius Ait. Brunsvigia Ker. Boophane Herb.)

ſurvifolia Jacq. 40. A. foliis linearibus ſubfalcatis ſcapoque glaucis, pedicellis erectis, laciniis corollae ſubrotatis revolutis undulatis, ſtaminibus rectis exſertis. *C. B. S.* (A. Fothergillia Andr., humilis et coruſca Ker. Nerine Herb.)

ſarnienſis 41. A. foliis erectis lanceolatis obtuſis, ſcapo compreſſis, pedicellis ſpatha ſubbrevioribus, corolla ſub-6petala patente revoluta, ſtaminibus rectis. *Japon. C. B. S.* (A. venuſta Ker. Nerine Ker.)

auſtralis * 42. A. foliis lineari-loriformibus, pedicellis rectis craſſis, corollae nutantis tubo ſtriato lacinias oblongas obtuſas patulas ſubaequante, genitalibus declinatis: *Nov. Holl. occ.* (A. auſtralaſica Ker.)

longifolia Ait. 43. A. foliis lato-lanceolatis margine ſcabris loriformibus, pedicellis breviſſimis, tubo corollae elongato, limbo campanulato ſtamina ſubaſcendentia ſuperante. *Afric. auſtr.* (A. capenſis Mill. Crinum capenſe Herb.)

revoluta Ait. 44. A. foliis linearibus canaliculatis loriformibus, pedicellis tuboque corollae abbreviatis, limbo campanulato revoluto, ſtaminibus ſuberectis. *C. B. S.* (A. linearis L. ſuppl. Crinum lineare Thunb.)

ſeylanica 45. A. foliis loriformibus undulatis margine laevibus, floribus ſeſſilibus, tubo elongato gracili, limbo campanulato, laciniis apice recurvis. *Ind. orient.* (A. ornata Ker. Crinum latifolium Andr. inſignis Ker. var.)

gigantea Ait. 46. A. foliis oblongis utrinque attenuatis undulatis margine ſcabris, floribus ſeſſilibus, corollae infundibuliformis tubo limbum patentem ſuperante. *Sierra Leona.* (Crinum giganteum Andr.)

latifolia Herit. 47. A. foliis oblongo-lanceolatis margine ſcabris, floribus pedicellatis, tubo corollae limbum aequante. *Ind. or.* (Crinum latifolium L.)

moluccana Ker. 48. A. foliis lanceolatis loriformibus margine cartilagineis ſcabris baſi undulatis, floribus ſeſſilibus,

tubo corollae campanulatae limbum aequante. *Inf. Molucc.* (Crinum moluccanum Roxb. Sims.)

†† *Corolla ringens: femina bulbosa.*

advena Ker. 49. A. foliis canaliculatis obtusis, floribus pedunculatis, tubo corollae abbreviato, fauce fimbriata, limbo 2labiato divaricato, staminibus declinatis. *Chili.*

reticulata Ait. 50. A. foliis oblongis basi attenuatis, scapo subcompresso, floribus pedicellatis, corollae cernuae laciniis oblongis reticulatis tubum subaequantibus. *Brasil.* (Coburgia Herb.)

acuminata Ker. 51. A. foliis lanceolatis loriformibus supra incano-pruinosis, scapo tereti, floribus pedicellatis, laciniis inaequalibus patentissimis tubum staminaque superantibus. *Bonaria.* (Hippeastrum pulverulentum Sims.)

crocata Ker. 52. A. foliis oblongis obtusis scapo tereti glauco brevioribus, pedicellis erectis, corollae nutantis laciniis obliquis inaequalibus, staminibus alternis brevioribus. *Brasil.*

pulchella * 53. A. foliis lanceolatis glaucis, scapo tereti elato, floribus pedicellatis, corollis sub-6petalis, laciniis lanceolato-linearibus mucronatis undulatis. *Afric. austr.* (Nerine pulchella Sims.)

laticoma Ker. 54. A. foliis lanceolatis obtusis loriformibus lucidis, scapo complanato scabro, pedicellis numerosis 3quetris hispidis, corolla sub-6petala, laciniis linearibus planis revolutis, infima cum genitalibus deflexa. *C. B. S.*

flexuosa Jacq. 55. A. foliis angustis loriformibus pustulato-punctatis, pedunculis patentibus, corolla sub-6petala, laciniis undulatis reflexis, infima divaricata. *C. B. S.*

undulata Jacq. 56. A. foliis linearibus canaliculatis laevibus, corolla sub-6petala, laciniis undulatis reflexis, infima divaricata. *C. B. S.* (A. humilis Jacq.)

radiata Ait. 57. A. foliis lineari-lingulatis glaucis, scapo compresso, pedunculis abbreviatis, corollae tubo subnullo, laciniis linearibus undulato-crispis radiato-reflexis, infima divaricata, genitalibus longissimis. *China.* (Lycoris Herb.)

hyacinthina Ker. 58. A. foliis elliptico-oblongis reticulato-costatis, scapo tereti, floribus pedicellatis nutantibus, tubo corollae abbreviato, laciniis lanceolatis ringentibus, inferioribus undulatis, staminibus divaricatis. *Brasil.* (Griffinia Herb.)

aurea Ait. 59. A. foliis linearibus carinatis, scapo teretiusculo, pedicellis tuboque corollae brevissimis, fauce coronata, laciniis patentibus undulatis, infima deflexa, genitalibus corollam superantibus. *China.* (Lycoris Herb.)

orientalis 60. A. foliis obovato-oblongis prostratis, scapo pedunculos 3gonos clavatos aequante, corollae suburceolatae resupinatae tubo nullo, staminibus ex-

fertis, capſula alata. *C. B. S.* (Brunſvigia multiflora Heiſt. Sims.)

Joſephinae Red. 61. A. foliis lanceolatis elongatis erecto-patentibus glaucis, ſcapo ſubcompreſſo pedunculos teretes clavatos longe ſuperante, corollae infundibuliformis incurvae tubo abbreviato, ſtaminibus declinatis ſubexſertis, capſula oblonga 3loba. *Afric. auſtr.* (Brunſvigia Ker.)

ſtriata Jacq. 62. A. foliis elliptico-ovatis erectis marginatis dorſo ſtriatis, pedunculis clavatis, corollae campanulatae laciniis reflexis inaequalibus. *C. B. S.*

Radula Jacqu. 63. A. foliis ellipticis proſtratis puſtulato-aſperis, pedunculis clavatis, corollae ſub-6petalae lacinia infima divaricata. *C. B. S.*

1199. CRINUM.

* *Umbella ſeſſili.*

† *Foliis loriformibus.*

americanum 1. Cr. foliis margine glaberrimis, tubo corollae ſulcato limbum aequante, ſtaminibus inclinatis. *Amer. auſtr.* (Cr. Commelini Red.)

erubeſcens Ait. 2. Cr. foliis margine cartilagineo-aſperis, tubo limbum ſuperante, ſtylo ſtaminibus longiori. *Amer. auſtr.*

Commelini Jacqu. 3. Cr. foliis margine integerrimis linearibus canaliculatis, umbella pauciflora, tubo limbum ſuperante, ſtaminibus inclinatis. *Amer. auſtr.*

defixum Ker. 4. Cr. bulbo oblongo ſubfuſiformi, foliis erectis canaliculatis margine glabris, umbella multiflora, ſtylo ſtamina patentia aequante, capſula pedicellata. *Ind. or.*

enſifolium Roxb. 5. Cr. bulbo ovato, foliis ſuberectis anguſte lanceolatis elongatis, umbella ſeſſili pauciflora, tubo limbum aequante, laciniis anguſtiſſimis flaccidis. *Ind. orient.*

amoenum Roxb. 6. Cr. bulbo globoſo, foliis rectis canaliculatis margine ſcabris, tubo limbum aequante, laciniis lineari-lanceolatis, ſtaminibus inclinatis. *Ind. or.*

ſumatranum Roxb. 7. Cr. bulbo ovali, foliis rigidis erectis margine cartilagineo-aſperis, umbella multiflora, tubo limbum aequante, ſtylo ſtaminibus breviori, capſula grandi. *Sumatra.*

longifolium Roxb. 8. Cr. bulbo globoſo, foliis laxis longiſſimis margine aſperis, umbella multiflora, laciniis tubo ſubbrevioribus. *Bengal.*

†† *Foliis lanceolatis, linearibus.*

cruentum Ker. 9. Cr. bulbo pyramidato ſtolonifero, foliis lato-lanceolatis ſubcoriaceis obtuſiuſculis, umbella multiflora, tubo limbum duplo ſuperante. *Ind. or.*

† *anguſtifolium* R. Br. 10. Cr. foliis margine ſcabris, laciniis corollae lanceolatis genitalia ſuperantibus. *Nov. Holl.*

venosum R. Br. 11. Cr. laciniis corollae elliptico-lanceolatis venosis tubo brevioribus, antheris filamenta aequantibus, stylo incluso. *Nov. Holl.*

****** *Umbella pedunculata.*

† *Foliis loriformibus.*

aquaticum Burch. 12. Cr. bulbo ovato, foliis canaliculatis margine scabris, umbella pauciflora, tubo elongato, laciniis limbi subrotundo-oblongis obtusis. *Afric. austr.*

scabrum Sims. 13. Cr. foliis longissimis basi undulatis margine cartilagineo-asperrimis, umbella multiflora, tubo limbum patentissimum superante. *Brasil.*

flaccidum Herb. 14. Cr. foliis linearibus flaccidis glaberrimis, umbella multiflora, tubo sub 3gono lacinias obovato-oblongas aequante. *Nov. Holl.*

amabile Don. 15. Cr. bulbo elongato conico, foliis lato-lanceolatis margine glaberrimis glaucescentibus, umbella multiflora, tubo limbum aequante, laciniis lato-lanceolatis revolutis stamina superantibus. *Bengal.*

augustum Roxb. 16. Cr. bulbo columnari caulem aemulante, foliis canaliculatis margine glabris, umbella multiflora, laciniis limbi tubum superantis lanceolatis, staminibus declinatis. *Inf. Mascaren.*

lorifolium Roxb. 17. Cr. bulbo subconico, foliis longissimis sublinearibus, umbella multiflora. *Pegu.*

canaliculatum Roxb. 18. Cr. bulbo cylindrico, foliis canaliculatis longissimis margine laevibus, umbella multiflora, laciniis linearibus obtusis tubo longioribus. *Ind. or.*

†† *Foliis lanceolatis.*

asiaticum 19. Cr. bulbo cylindrico, foliis lato-lanceolatis erectiusculis scapo longioribus, umbella multiflora, laciniis linearibus revolutis tubum aequantibus. *China.* (Cr. americanum Red., toxicarium Roxb., declinatum Ker.)

pedunculatum R. Br. 20. Cr. bulbo cylindrico, foliis lato-lanceolatis obtusiusculis scapo brevioribus, umbella multiflora, laciniis linearibus patentissimis tubo brevioribus. *Nov. Holl.*

arenarium Sims. 21. Cr. bulbo ovato, foliis lanceolatis margine asperis, umbella multiflora, tubo longissimo, laciniis lanceolatis acutis. *Nov. Holl.*

Broussoneti Herb. 22. Cr. foliis lanceolatis undulatis serratis, umbella pauciflora, laciniis corollae patentissimis obtusis. *Sierra Leone.* (Amaryllis spectabilis Andr.)

bracteatum W. 23. Cr. bulbo cylindrico, foliis oblongis margine cartilagineis laevissimis, umbella multiflora bracteata, tubo laciniis limbi bracteisque breviori. *Ind. or.*

brachyandrum Carey. 24. Cr. bulbo oblongo, foliis linearibus erectis, umbella multiflora, laciniis limbi linearibus, staminibus abbreviatis. *Nov. Holl.*

quitense * 25. Cr. foliis lanceolatis acutiusculis glaberrimis, umbella multiflora, floribus pendulis bracteatis,

laciniis linearibus tubum ſuperantibus. *Quito.* (Haemanthus dubius Bonpl. Kunth.)

†*urceolatum* R. et P. 26. Cr. foliis longe petiolatis oblongo-lanceolatis, umbella multiflora, limbo urceolato tubum ſuperante. *Peru.* (Urceolaria Herb.)

†*Martinezii** 27. Cr. foliis linearibus obtuſis diſco discoloribus, umbella 8flora, floribus erectis, antheris ſagittatis. *Hiſpan. auſtr.* (Lapiedra Martinezii Lag.)

1200. EUCROSIA Ker.

***bicolor* Ker.** *Amer. auſtr.* Herba foliis petiolatis oblongis, ſcapo teretiusculo, floribus rubro-luteo-viridibus.

1201. HAEMANTHUS.

*** *Involucro umbellam excedente: foliis bifariis linguaeformibus.***

coccineus 1. H. foliis laevibus humi appreſſis, umbella faſtigiata coarctata, involucro colorato, limbo corollae patulo. *C. B. S.*

***coarctatus* Jacqu.** 2. H. foliis laevibus erectis apice calloſis, umbella coarctata, involucro colorato, limbo corollae erecto. *C. B. S.*

***tigrinus* Jacqu.** 3. H. foliis glabris depreſſis ſubtus maculatis ciliatis, umbella coarctata, involucro colorato, limbo corollae erecto. *C. B. S.*

***quadrivalvis* Jacqu.** 4. H. foliis baſi anguſtatis glabris patulis ciliatis verſus apicem villoſis, involucro 4phyllo colorato, limbo corollae erecto. *C. B. S.* (H. pubeſcens Thunb.)

***craſſipes* Jacqu.** 5. H. foliis obovatis ciliatis ſubtus maculatis, involucro 5phyllo colorato, limbo corollae obtuſo patulo. *C. B. S.*

***hyalocarpus* Jacqu.** 6. H. foliis glaberrimis immaculatis, involucro 7phyllo colorato, limbo corollae erecto, baccis ſemi-pellucidis. *C. B. S.*

**** *Involucro umbellam aequante.***

***puniceus* Jacqu.** 7. H. foliis oblongis undulatis retuſis, involucro ſubcolorato, limbo corollae erecto. *Guinea. C. B. S.*

***rotundifolius* Sims.** 8. H. foliis orbiculatis ſcabris cartilagineo-marginatis, involucro 4phyllo. *C. B. S.*

***humilis* Jacqu.** 9. H. foliis ellipticis glabris ciliatis erectis, involucro 6phyllo colorato, limbo corollae erecto. *C. B. S.*

***Pumilio* Jacqu.** 10. H. foliis lineari-lanceolatis glabris erecto-falcatis, ſcapo gracili, umbella pauciflora, limbo corollae patulo. *C. B. S.*

***** *Umbella involucrum ſuperante.***

ciliaris 11. H. foliis linguaeformibus glabris ciliatis, involucro ovato, limbo corollae reflexo. *C. B. S.* (Amaryllis ciliaris L. Brunſvigia Ker.)

pubeſcens 12. H. foliis linguaeformibus villoſis ciliatis, involucro viridi 4phyllo ciliato, limbo corollae patulo. *C. B. S.* (H albiflos Jacqu.)

multiflorus 13. H. foliis oblongo-lanceolatis concavis erectis, involucro 4phyllo patentiſſimo, limbo corollae patulo, ſtaminibus longiſſime exſertis. *Sierra Leone.*

ſanguineus 14. H. foliis linguaeformibus laevibus, involucro 7phyllo ſubcolorato, limbo corollae patulo. *C. B. S.*

moſchatus Jacqu. 15. H. foliis ellipticis acutis pubeſcentibus revolutis ciliatis ſubtus faſciato-maculatis, involucro polyphyllo acuto, limbo corollae erecto. *C. B. S.*

amarylloides Jacqu. 16. H. foliis lineari-linguaeformibus glabris, involucro 4phyllo, limbo corollae patulo. *C. B. S.*

lanceaefolius Jacqu. 17. H. foliis elliptico-lanceolatis ciliatis, involucro 4phyllo, pedicellis elongatis, limbo patente. *C. B. S.*

carneus Ker. 18. H. foliis rotundato-ovatis abbreviatis ſcapoque hirſutis, involucro ſcarioſo laxo, pedicellis elongatis, limbo corollae patulo ſtamina ſuperante. *Afric. auſtr.*

1202. STERNBERGIA Kit.

colchiciflora Kit. 1. St. foliis linearibus obtuſis lucidis obliquis, laciniis limbi ſublinearibus erectis ſtamina ſuperantibus. *Hungar. Taur.*

Cluſiana Ker. 2 St. foliis lineari-lanceolatis glaucis ſpiraliter tortis, laciniis limbi erectis inaequalibus apice uncinatis. *Thracia?* (Amaryllis Cluſiana bot. mag.)

exigua Ker. 3. St. foliis filiformibus, laciniis limbi aequalibus obtuſis ſtamina aequantibus. *Afric. bor.* (Amaryllis exigua Schousb.)

citrina Ker. 4. St. ſpatha indiviſa obtuſa, laciniis limbi linearibus emarginatis. *Peloponneſ.* (Amaryllis citrina Sm.)

lutea Ker. 5. St. foliis linearibus canaliculatis obtuſis, ſpatha indiviſa obtuſa, laciniis oblongis obtuſis ſtamina ſuperantibus. *Sicil. Graec. Caucaſ.* (Amaryllis lutea L.)

americana Hofmannsegg. 6. St. foliis filiformibus, ſpatha 2fida, ſtaminibus alternis longioribus, ſtigmate 3fido. *Buenos Ayres.*

1203. STRUMARIA Jacqu.

filifolia Jacqu. 1. Str. foliis filiformibus, umbella multiflora, laciniis corollae ſtellatis acutis, ſtyli ſtruma baſi inflata, anguloſo-plicata. *C. B. S.* (Crinum tenellum L. ſuppl. Leucoium ſtrumoſum Thunb. Ait.)

ſpiralis Ker. 2. Str. foliis ſetaceis, ſcapo baſi ſpirali flexuoſo, umbella pauciflora. *C. B. S.* (Crinum tenellum Jacqu. ſpirale Andr. Haemanthus ſpiralis Ait. W.)

criſpa Ker. 3. Str. foliis lineari-filiformibus laxis, umbella pauciflora, laciniis corollae patentiſſimis oblongis obtuſis undulatis. *C. B. S.* (Amaryllis criſpa Jacqu.)

ſtellaris Ker. 4. Str. foliis linearibus erectis, umbella multiflora, corolla patentiſſima. *C. B. S.* (Amaryllis ſtellaris Jacqu.)

anguſtifolia Jacqu. 5. Str. foliis linearibus planis, umbella pauciflora, ſtyli ſtruma cum filamentis connata, germine 3glanduloſo. *C. B. S.*

undulata Jacqu. 6. Str. foliis linearibus oblique flexis, umbella pauciflora, ſtyli ſtruma libera, laciniis corollae undulatis. *C. B. S.*

rubella Jacqu. 7. Str. foliis linearibus oblique flexis, umbella pauciflora, ſtyli ſtruma cum filamentis connata utrinque acuta, laciniis corollae planis. *C. B. S.*

truncata Jacqu. 8. Str. foliis lineari-enſiformibus obtuſis, ſcapo compreſſo, umbella multiflora, ſtyli ſtruma cum filamentis connata apice truncata, ſtaminibus corolla longioribus. *C. B. S.*

linguaefolia Jacqu. 9. Str. foliis linguaeformibus obtuſis, ſcapo inferne tereti, umbella pauciflora, ſtyli ſtruma cum filamentis connata utrinque acuta, ſtaminibus corollam aequantibus. *C. B. S.*

gemmata Sims. 10. Str. foliis oblongis ſubfalcatis ciliatis, umbella laxa, laciniis corollae patentibus criſpis, ſtyli ſtruma gibboſa cum filamentis connata. *C. B. S.*

1204. CYRTANTHUS Ait.

uniflorus Ker. 1. C. folio ſolitario lineari glauco, ſpatha 1flora, tubo recto, limbo faucem aequante. *Afric. auſtr.* (Amaryllis clavata Herit.)

vittatus Desf. 2. C. foliis linearibus canaliculatis, floribus umbellatis erectis, tubo cylindrico gracili. *C. B. S.?*

obliquus Ait. 3. C. foliis lanceolatis obtuſis oblique flexis, umbella reclinata multiflora, floribus pendulis obverſe conicis. *C. B. S.* (Crinum obliquum L. ſuppl. Amaryllis Umbella Herit.)

anguſtifolius 4. C. foliis linearibus canaliculatis laxis, floribus cylindricis cernuis ſubumbellatis, limbi dentibus acutis. *C. B. S.* (Crinum anguſtifolium L. ſuppl. Amaryllis cylindracea Herit.)

collinus Burch. 5. C. foliis linearibus canaliculatis flaccidis glaucis, umbella multiflora, floribus pendulis ſubcylindrico-angulatis, lobis limbi rotundatis, ſtaminibus incluſis. *Afric. auſtr.*

ſpiralis Burch. 6. C. foliis lineari-loriformibus ſpiratim tortis glaucis, umbella ſubmultiflora, floribus pendulis clavato-cylindricis, lobis limbi obtuſis patulis, ſtaminibus limbum ſubaequantibus. *Afric. auſtr.* (C. anguſtifolius Jacqu., ventricoſus W.)

odorus Ker. 7. C. foliis linearibus anguſtiſſimis, umbella pauciflora, floribus cernuis longe tubuloſis, limbi lobis obtuſis patulis diſtantibus, ſtaminibus incluſis, ſtylo exſerto. *Afric. auſtr.*

1205. EUSTEPHIA Cav.

coccinea Cav. *Patria?* Herba foliis radicalibus linearibus obtusis, floribus umbellatis nutantibus, staminibus exsertis.

1206. HYPOXIS.

* *Uniflorae.*

† *Pilosae.*

juncea **Sm.** 1. H. foliis linearibus canaliculatis, scapo unifloro. *Carolinae turfeta.*

aurea **Lour.** 2. H. foliis subulatis canaliculatis reflexis scapum 1florum aequantibus. *Cochinchina.*

marginata **R. Br.** 3. H. foliis linearibus longissimis margine incrassatis, scapo 2bracteato, capsulis cylindricis villosis. *Nov. Holl.*

hygrometrica **Labill.** 4. H. foliis lineari-subulatis hirsutis, (pilis hygrometrice tortis), scapo gracili folia aequante, capsula turbinata glabra. *Nov. Holl. Terra Diemen.*

†† *Glabrae.*

alba 5. H. foliis tereti-filiformibus scapum bracteatum subdivisum superantibus. *C. B. S.*

glabella **R. Br.** 6. H. foliis lineari-subulatis canaliculatis scapo 2bracteato longioribus, stylo brevissimo. *Nov. Holl.*

linearis **Andr.** 7. H. foliis lanceolato-linearibus canaliculatis scapo 1floro longioribus. *C. B. S.*

stellata 8. H. foliis lineari-lanceolatis carinatis laxis scapo 1floro longioribus, corolla basi maculata. *C. B. S.* (H. elegans Andr., Amaryllis capensis L.)

serrata 9. H. foliis linearibus carinatis ciliato-serratis scapo 1floro longioribus, corollis defloratis reflexis. *C. B. S.*

breviscapa **Kunth.** 10. H. foliis lineari-lanceolatis integerrimis scapum subvillosum superantibus, capsula clavata pilosa. *Guiana.*

ovata **Thunb.** 11. H. foliis ovato-lanceolatis integerrimis scapo 1floro brevioribus. *C. B. S.*

veratrifolia **W.** 12. H. foliis ovali-oblongis plicato-nervosis scapo filiformi 1floro longioribus. *C. B. S.* (H. plicata Jacqu.)

** *Pauciflorae.*

† *Pilosae.*

carolinensis **Mx.** 13. H. foliis subtriquetro-filiformibus pilosis, scapo sub-2floro. *Carolina. Georgia.* (H. filifolia Ell.)

decumbens 14. H. foliis lineari-lanceolatis scapo decumbente sub-2floro longioribus. *Jamaica.*

stellipilis **Ker.** 15. H. foliis lanceolatis canaliculatis nervosis subtus stellulato-tomentosis, scapo hirsuto 2floro foliis brevioribus. *C. B. S.*

humilis Kunth. 16. H foliis linearibus canaliculatis recurvatis scapoque 2floro pilosis. *Cumana.* (H. pusilla Kunth.)

elongata Kunth. 17. H. foliis linearibus canaliculatis 3nerviis longissimis scapoque 3floro pilosis, capsula cylindrica. *Nov. Granat.*

obliqua Jacqu. 18. H. foliis lanceolatis oblique flexis margine medioque lanatis scapum sub-triflorum pilosum aequantibus, pedunculis flore triplo longioribus. *C. B. S.*

pratensis R.Br. 19. H. foliis linearibus elongatis margine scapoque 3floro pilosis, capsula globoso-turbinata. *Nov. Holl.*

erecta 20. H foliis lineari-lanceolatis hirsutis scapo sub-4floro longioribus, pedunculis florem excedentibus, laciniis corollae acutiusculis. *Amer. bor.* (H. sessilis L.)

sobolifera Jacqu. 21. H. foliis lineari-lanceolatis hirsutis scapum sub-4florum aequantibus, pedunculis flore longioribus, laciniis corollae obtusiusculis. *C. B. S.*

villosa 22. H. foliis lineari-lanceolatis villosis scapo sub-4floro longioribus, pedunculis flore brevioribus, capsulis cylindricis. *C. B. S.*

obtusa Burch. 23. H. foliis lanceolatis erectis subtortis marginatis scapum sub-4florum superantibus, floribus racemosis, laciniis corollae obtusis. *Afric. austr.*

†† *Glabra.*

aquatica 24. H. foliis linearibus laxis, floribus polygamis, ☿ solitariis ♂ umbellatis. *C. B. S.*

1207. CURCULIGO.

plicata Dryand. 1. C. foliis lanceolatis subulatis subplicatis subpubescentibus, floribus radicalibus paucis sessilibus. *C. B. S.* (Hypoxis plicata Thunb. Gethyllis Jacqu. W.)

*fascicularis** 2. C. foliis lineari-canaliculatis glabris, floribus radicalibus pedicellatis fasciculatis longissime tubulosis. *Syria.* (Hypoxis fascicularis L.)

orchioides Roxb. 3. C. foliis lineari-subulatis 3nerviis, scapo racemoso. *Ora Coromandel.*

brevifolia Dryand. 4. C. foliis lanceolatis, scapo racemoso, tubo floris longissimo. *Ind. or.*

latifolia Dryand. 5. C. foliis oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis petiolatis, capitulo sessili radicali, tubo limbum aequante *Amboina.*

recurvata Dryand. 6. C. foliis oblongis utrinque attenuatis nervosis longe petiolatis, scapo hirsuto, floribus capitatis bracteatis nutantibus, tubo floris brevissimo. *Bengal.*

ensifolia R. Br. 7. C. foliis lanceolato-ensiformibus pilosiusculis petiolatis marginatis, tubo corollae hirsuto fructum excedente. *Nov. Holl.*

1208. LILIUM.

*Floribus erectis.

†*Foliis sparsis.*

candidum 1. L. caule multifloro, foliis lanceolatis lucidis basi attenuatis, corollis intus glabris, sulcis nectariferis obsoletis. *Helvetia. Europ. austr. Asia minor.*

bulbiferum 2. L. caule multifloro, foliis lineari-lanceolatis, corollis intus papillosis. *Italia. Austria. Amer. bor.* (L. pensylvanicum Ker.)

lancifolium Thunb. 3. L. caule hirsuto paucifloro, foliis lanceolatis glabris, axillis superioribus bulbiferis, laciniis corollae basi angustatis discretis. *Japon.* (L. bulbiferum Thunb.)

concolor Salisb. 4. L. caule multifloro, foliis oblongo-lanceolatis, corolla intus papillosa extus glabra. *China.*

Catesbaei Curt. 5. C. caule sub-1floro, foliis lineari-lanceolatis, corolla intus punctata, laciniis longe unguiculatis discretis margine undulatis apice reflexis. *Carolina.* (L. carolinianum Lam. spectabile Salisb.)

††*Foliis verticillatis.*

philadelphicum 6. L. caule sub-1floro, foliis lanceolatis 3nerviis, corolla genitalia superante, laciniis unguiculatis discretis maculatis. *Amer. bor.* (L. andinum Nuttall., umbellatum Pursh. est var. floribus 3-5.)

dauricum Ker. 7. L. caule sub-1floro 5gono alato, foliis lineari-lanceolatis, summis verticillatis florem aequantibus, pedunculo corollaque turbinato-patente extus lanatis, laciniis infimis ovali-lanceolatis. *Dauria.* (L. pensylvanicum Pursh. Nutt., spectabile Link., bulbiferum β. Dryand.)

**Floribus cernuis aut reflexis.

†*Foliis sparsis.*

longiflorum Thunb. 8. L. caule sub-1floro, foliis lanceolatis utrinque attenuatis nervosis, corollae cernuae tubo elongato, staminibus declinatis corolla brevioribus. *Japon.*

japonicum Thunb. 9. L. caule 1floro, foliis lanceolatis acuminatis petiolatis nervosis; corolla cernua subcampanulata. *Japon.*

pumilum Red. 10. L. caule paucifloro, foliis lineari-subulatis, corollis subrotatis reflexis revolutis intus glabris. *Dauria.* (L. linifolium Hornem.)

pyrenaicum Gouan. 11. L. caule multifloro, foliis confertis linearibus ciliolatis, corollis subracemosis reflexis revolutis intus papilloso-punctatis. *Gallia austr.*

pomponium 12. L. caule sub-2floro, foliis lineari-subulatis canaliculatis glaberrimis, corollis reflexis revolutis intus papillosis. *Hispania. Sibiria.* (L. pyrenaicum Red.)

chalcedonicum 13. L. caule multifloro ad apicem folioso, foliis lineari-lanceolatis, corollis reflexis revolutis intus punctatis. *Europ. austr. Asia minor.*

monadelphum M. B. 14. L. caule multifloro, foliis lanceolatis nervosis subtus pubescentibus, corollis subaggregatis cernuo-reflexis, filamentis basi connatis. *Caucas.*

tigrinum Ker. 15. L. caule multifloro, foliis lanceolatis 5nerviis, floralibus cordato-ovatis, axillis bulbiferis, corollis reflexis revolutis intus papillosis. *China.* (L. speciosum Andr.)

speciosum Th. 16. L. caule ramoso multifloro, foliis ovato-oblongis nervosis petiolatis, corollis reflexis revolutis intus papilloso-dentatis, sulco nectarifero barbato. *Japon.* (L. superbum Th. fl. jap.)

†† *Foliis verticillatis.*

carolinianum Mx. 17. L. caule sub-1floro, foliis spathulatis acutis enerviis, corolla cernua revoluta intus glabra punctata, staminibus exsertis. *Carolina.* (L. Michauxii Poir.)

nepalense Wall. 18. L. caule 1floro scabro, foliis summis verticillatis lanceolatis, corollae cernuae laciniis unguiculatis. *Nepal.*

canadense 19. L. caule sub-1floro, foliis lanceolatis utrinque acuminatis nervosis margine scabris, corollae nutantis laciniis lanceolatis acuminatis reflexis intus punctatis. *Amer. boreal.* (L. penduliflorum Red.)

maculatum Th. 20. L. caule multifloro, foliis sparso-verticillatis ovato-lanceolatis nervosis, corollis subumbellatis nutantibus subrevolutis intus maculatis. *Japon.*

Martagon 21. L. caule multifloro pubescente, foliis ovato-lanceolatis, corollis racemosis reflexis revolutis intus hirsutis. *Europ.*

glabrum * 22. L. caule multifloro scabro, foliis oblongis acutis nervosis, corollis racemosis reflexis revolutis intus glaberrimis. *Patria?*

superbum Lam. 23. L. caule multifloro, foliis sparso-verticillatis lineari-lanceolatis nervosis, corollis racemoso-pyramidatis reflexis revolutis punctatis. *Amer. boreal.*

1209. TULIPA.

(Caulis omnium subuniflorus, flos erectus.)

biflora Pall. 1. T. foliis binis linearibus glaucis, petalis acutis patulis filamentisque basi barbatis, capsula globosa mucronata. *Montes Ural. Ad Volgam et mare casp.*

Celsiana Red. 2. T. foliis lineari-lanceolatis elongatis, petalis lanceolatis acutis patentibus glabris, filamentis subulatis barbatis, alternis brevioribus. *Gallia. Lusitania. Tauria. Ad Volgam.* (T. transtagana Brot.)

sylvestris 3. T. foliis caulinis lanceolatis, flore nubili nutante, petalis acutis, interioribus filamentisque basi pubescentibus. *Europ. et Asia med.*

acuminata Vahl. 4. T. foliis caulinis lanceolatis acutis undulatis glaucis, petalis patentibus longiſſime acuminatis apice convolutis, alternis anguſtioribus, ſtaminibus ſtigmate brevioribus. *Thracia. Aſia minor.* (T. cornuta Red., turcica Roth. W. ſuppl.)

altaica Pall. 5. T. foliis caulinis oblongo-lanceolatis undulatis cartilagineo-marginatis florem ſubaequantibus, pedunculo ſcabro, petalis glaberrimis, alternis lanceolatis, alternis ſpathulato-oblongis, ovario antheris breviori filamenta ſuperante. *Mons Imaus.*

praecox Tenor. 6. T. foliis caulinis ovato-lanceolatis ciliatis, bulbo lanato, petalis ovato-lanceolatis acuminatis apice barbatis, filamentis baſi dilatatis. *Neapol.*

Cluſiana Red. 7. T. foliis caulinis oblongis acutis glaucis florem ſubaequantibus, petalis oblongis acutis glabris, ovario ſtamina ſuperante. *Perſia.*

Oculus Solis S. Amand. 8. T. foliis caulinis oblongis acutis ſubciliatis, petalis exterioribus acutis, omnibus baſi maculatis, ſtaminibus ovarium excedentibus, ſtigmatibus villoſo-fimbriatis. *Gallia.*

pubeſcens W. 9. T. foliis oblongo-lanceolatis florem ſuperantibus pubeſcentibus, petalis exterioribus acutis, interioribus obtuſis mucronatis. *Aſia minor.*

ſuaveolens Roth. 10. T. caule ſuperne nudo pubeſcente, foliis ovato-lanceolatis, petalis obtuſis glabris. *Europ. auſtr.*

Gesneriana 11. T. caule ſuperne nudo glabro, foliis ovato-oblongis acutis, petalis obtuſis glabris. *Thracia. Aſia minor.*

ſaxatilis Sieb. 12. T. caule ſubbifloro flexuoſo folioſo, foliis oblongo-lanceolatis acutis, petalis erectis obtuſis apice ſubbarbatis, ovario antheras ſuperante. *Creta.*

1210. FRITILLARIA.

(Flores omnium nutantes.)

* *Caule uniſloro.*

Meleagris 1. Fr. foliis alternis linearibus canaliculatis, flore teſſellato. *German. Europ. auſtr.*

tenella M. B. 2. Fr. foliis lineari-lanceolatis acuminatis paucis, flore teſſellato. *Caucaſ.*

nervoſa W. 3. Fr. foliis alternis linearibus nervoſis, flore teſſellato. *Europ. auſtr.*

lutea M. B. 4. Fr. caule baſi nudo, foliis abbreviatis lanceolatis ſtriatis glaucis, flore teſſellato. *Caucaſ.* (Fr. collina Adam.)

ruthenica Wikſtr. 5. Fr. foliis oppoſitis erectis lineari-lanceolatis cirrhoſis, flore teſſellato, capſula alata. *Tauria. Caucaſ.* (Fr. verticillata M. B., pyrenaica Pall., perſica S. G. Gmel.)

verticillata W. 6. Fr. foliis inferioribus oppoſitis lanceola[illegible], ſuperioribus quaternis linearibus cirrhoſis, flore nervoſo-venoſo. *Sibir. Japon.* (Uvularia cirrhoſa Thunb.)

latifolia W. 7. Fr. foliis inferioribus alternis oblongo-lanceolatis, ſummis oppoſitis, flore teſſellato. *Caucaſ.*

meſſanenſis Raſin. 8. Fr. foliis radicalibus ovalibus petiolatis, caulinis lanceolatis, ſummis florem ſuperantibus, flore concolore marginato. *Sicil.* (Fr. plantaginifolia Lam.?)

pudica * 9. Fr. foliis alternis lineari-lanceolatis nervoſis, flore concolore. *Amer. bor.* (Lilium pudicum Purſh.)

luſitanica Wikſtr. 10. Fr. foliis alternis lanceolatis acuminatis, flore discolore ſtriato. *Luſitania.*

tulipifolia M. B. 11. Fr. foliis alternis oblongo-lanceolatis obtuſiusculis nervoſis, flore cernuo ſtriato. *Caucaſ.* (Fr. caucaſica *Adam.*)

purpurea Kunth. 12. Fr. foliis ſparſis linearibus acuminatis canaliculatis, flore ſtriato, petalis exterioribus acutis, interioribus oblongis fimbriatis. *Nov. Hiſpan.*

lanceolata Purſh. 13. Fr. foliis verticillatis lanceolatis obtuſiusculis nervoſis, flore ſtriato, petalis lanceolatis. *Camtſchatca. Amer. bor.* (Lilium camtſchatcenſe L.)

** *Caule multifloro.*

cantonienſis Lour. 14. Fr. floribus geminis axillaribus concoloribus, foliis lanceolatis 3nerviis. *China auſtr.*

Imperialis 15. Fr. floribus verticillatis pendulis concoloribus baſi maculatis ſuperne folioſis, foliis confertis oblongo-lanceolatis lucidis. *Perſia.*

barbata Kunth. 16. Fr. floribus axillaribus ſtriatis, petalis exterioribus cuſpidatis, interioribus obovatis crenulatis barbatis, foliis linearibus acuminatis ſparſis. *Mexico.*

pyrenaica 17. Fr. floribus axillaribus pendulis teſſellatis, foliis lineari-lanceolatis obliquis nervoſis, imis oppoſitis. *Pyrenaei. Ruſſia.*

alba Nuttall. 18. Fr. floribus ſubracemoſis concoloribus, foliis lineari-oblongis obtuſis obliquis ſubſtriatis. *Amer. bor.*

perſica 19. Fr. floribus pendulis racemoſo-pyramidatis, foliis verticillatis lanceolatis patentibus obliquis. *Perſia.*

1211. ERYTHRONIUM.

Dens Canis 1. E. petalis lanceolatis acuminatis, ſtigmate 3fido, foliis ovato-oblongis. *Europ. auſtr.*

lanceolatum Purſh. 2. E. petalis lanceolatis obtuſiusculis baſi dilatatis, ſtigmate integro, foliis lanceolatis aſpero-punctatis. *Amer. bor.* (E. americanum Ker.)

albidum Nutt. 3. E. petalis lanceolatis obtuſiusculis, interioribus ſubunguiculatis baſi ecalloſis, ſtigmate 3fido, foliis lanceolatis impunctatis. *Louiſiana.*

grandiflorum Purſh. 4. E. petalis lanceolatis acutis ſubunguiculatis, germine oblongo, foliis lineari-lanceolatis. *Amer. bor. occid.*

1212. ADAMSIA W.

ſcilloides W. *Caucaſ. Creta.* Sieber. Herba Scillae forma, foliis radicalibus geminis, floribus racemoſis coeruleis. (Puſchkinia ſcilloides Adam. M. B.)

1213. GLORIOSA.

ſuperba 1. Gl. foliis cirrhiferis. *Malabar.*
ſimplex 2. Gl. foliis acuminatis. *Senegal.*

1214. HEMEROCALLIS.

flava 1. H. foliis linearibus carinatis, laciniis corollae acutis nervisque indiviſis. *Europ. auſtr.*
fulva 2. H. foliis linearibus carinatis, laciniis corollae interioribus obtuſis undulatis, nervis exteriorum ramoſis. *Europ. auſtr.*

1215. HYACINTHUS.

orientalis 1. H. foliis lanceolatis obtuſis, corollis infundibuliformibus baſi ventricoſis. *Aſia minor. et media.*
amethyſtinus 2. H. foliis linearibus canaliculatis flaccidis, corollis campanulatis, genitalibus tubo brevioribus. *Hiſpan.* (H. hiſpanicus Lam.)
revolutus 3. H. foliis oblongis undulatis, corollis campanulatis revolutis. *C. B. S.*
convallarioides 4. H. foliis ſubulatis, corollis campanulato-ovatis pendulis. *C. B. S.*
flexuoſus Th. 5. H. foliis linearibus ſcapo flexuoſo longioribus, racemo erecto, corollis campanulatis. *C. B. S.*
romanus 6. H. foliis lineari-lanceolatis ſcapo recto longioribus, corollis erectis campanulatis angulatis. *Ital. Sicil.* (H. dubius Guſſon.)
†*ſpicatus* Sm. 7. H. foliis lineari-lanceolatis ſcapum ſubexcedentibus, floribus ſpicatis, filamentis dilatatis. *Zacynth. inf. et Peloponneſ.*
ſulfureus Poir. 8. H. foliis linearibus ſcapo brevioribus, racemo ſpicato, corollis clavato-campanulatis, filamentis tubum ſuperantibus. *Afric. auſtr.*

1216. MUSCARI Desf.

moſchatum W. 1. M. foliis lineari-lanceolatis glaucis, racemo ſpicato, corollis horizontalibus ventricoſo-ovatis fauce clauſis, limbo crenato. *Aſia minor.* (Hyacinthus Muſcari L.)
comoſum W. 2. M. foliis linearibus elongatis flaccidis, racemo elongato, corollis cylindricis angulatis fauce ſubclauſis, ſummis ſterilibus coloratis longius pedicellatis. *Europ. et Aſia med.*

maritimum Desf. 3. M. foliis ſubulatis, racemo tereti, corollis cylindricis, ſummis ſterilibus coloratis ſeſſilibus. *Numidia.* (Hyacinthus maritimus Perſ.)

ciliatum Ker. 4. M. foliis lanceolatis marginato-ciliatis, racemo laxo, corollis cylindricis ore aperto, pedunculis fructiferis horizontalibus longiſſimis. *Italia. Podolia. Tauria. Aſia minor.* (Hyacinthus ciliatus Cyr.)

pallens Beſſ. 5. M. foliis lanceolatis glaberrimis, racemo ſtricto, corollis cylindricis, fauce aperta. *Podolia. Tauria. Caucaſ.* (H. amethyſtinus Pall. pallens MB.)

racemoſum W. 6. M. foliis linearibus laxis pendulis, racemo ſtricto, corollis ovatis confertis, ſummis ſeſſilibus. *Europ. auſtr.*

botryoides W. 7. M. foliis linearibus canaliculatis ſtrictis, corollis globoſis, inferioribus remotioribus. *Europ. auſtr. Afric. bor.* (M. parviflorum Desf.)

ſeſſiliflorum * 8. M. floribus omnibus ſeſſilibus fertilibus, corollis cylindricis, laciniis ſubpatulis. *Ad Syrtim mai. Afric. bor.* (Hyacinthus ſeſſiliflorus Viv.)

1217. SCILLA.

* *Hyacinthoides: corollae campanulatae.*

nutans Sm. 1. Sc. foliis lanceolatis, racemo elongato, corollis cernuis apice revolutis, ſtaminibus tubum aequantibus. *Anglia. Europ. auſtr.* (Hyacinthus non ſcriptus et cernuus L., pratenſis et amethyſtinus Lam.)

campanulata Ait. 2. Sc. foliis lanceolatis flaccidis, racemo multifloro oblongo, bracteis 2partitis pedunculo longioribus, corollis nutantibus apice revolutis. *Hiſpan. Luſitan.* (Sc. hyacinthoides Jacq.)

corymboſa Sims. 3. Sc. foliis linearibus ſcapo longioribus, racemo corymboſo, corollis infundibuliformibus erectis, ſtaminibus alternis brevioribus. *C. B. S.* (Hyacinthus corymboſus L. Maſſonia Sims.)

breviſolia Ker. 4. Sc. foliis lineari-lanceolatis ſcapo brevioribus, racemo ovato cernuo, corollis cylindricis. *C. B. S.* (Hyacinthus brevifolius Th.)

mauritanica Schousb. 5. Sc. foliis linearibus planis apice involutis, racemo erecto, bracteis binis pedunculum aequantibus. *Mauritania.*

tingitana Schousb. 6. Sc. foliis lanceolatis apice involutis, racemo erecto, bracteis ſolitariis pedunculo brevioribus. *Mauritania.*

cernua Red. 7. Sc. foliis oblongis, ſcapo compreſſo paucifloro, bracteis minimis pedicellisque coloratis, corollis nutantibus.. *Ruſſia media.* (Sc. amoena MB., amoenula Hornem., ſibirica Andr., azurea Goldb.)

ſibirica Sims. 8. Sc. foliis obovato-oblongis apice incurvis, racemo multifloro, corollis nutantibus. *Sibir.*

unifolia 9. Sc. folio ſolitario lineari-lanceolato canaliculato ſcapum pauciflorum vaginante, corollis ſpicatis

erectis ſubcampanulatis, bracteis ovato-lanceolatis. *Luſitan.* (Ornithogalum nanum Brot. Sc. paradoxa MB.?)

** *Anthericoides: corollae planae.*

pumila Brot. 10. Sc. folio ſolitario lanceolato vaginante, racemo erecto, bracteis pedunculo multo brevioribus. *Luſitan.*

bifolia 11. Sc. foliis ſubbinis lanceolatis erectis, racemo ſubelongato, pedunculis ebracteatis, bulbo ſolido. *Europ. med.* (Sc. praecox W. ?)

Lilio-hyacinthus 12. Sc. foliis ſubternis lanceolatis humo appreſſis, racemo paucifloro, pedunculis ebracteatis, bulbo ſquamato. *Hiſpan. Gall. auſtr.*

verna 13. Sc. foliis numeroſis linearibus canaliculatis erectis, racemo corymboſo paucifloro, bracteis lanceolatis obtuſis, bulbo ſolido. *Anglia. Hiſpania.*

umbellata Ram. 14. Sc. foliis linearibus, ſcapo tereti, corymbo paucifloro ſubumbellato, bracteis filiformibus pedunculos ſubaequantibus. *Pyren.*

amoena 15. Sc. foliis lanceolatis obtuſis, ſcapo angulato, bracteis obtuſis breviſſimis, pedunculis alternis flore brevioribus. *Europ. med.*

italica 16. Sc. foliis linearibus erectis, racemo conico conferto, bracteis linearibus pedunculos aequantibus, corollis erectis. *Italia. Gallia auſtr.* (Sc. odorata Brot.?)

autumnalis 17. Sc. foliis linearibus obtuſis abbreviatis, ſcapo tereti, racemo ſubcorymboſo, pedunculis ebracteatis ſuberectis flore longioribus. *Anglia. Alſatia. Italia ſuper.*

parviflora Desf. 18. Sc. foliis lineari-lanceolatis acutis erectis ſcapo brevioribus, racemo cylindrico ſubconferto, bracteis minutis, pedunculis flores ſubaequantibus. *Numidia.* (Sc. numidica Poir.)

undulata Desf. 19. Sc. foliis lanceolatis undulatis ſcapo tereti brevioribus, racemo erecto multifloro, bracteis breviſſimis. *Numidia.*

obtuſifolia Poir. 20. Sc. foliis linguaeformibus undulatis ſcapo laterali tereti brevioribus, floribus racemoſis ebracteatis. *Numidia.*

villoſa Desf. 21. Sc. foliis lanceolatis laxis villoſis, racemis corymboſis, bracteis lanceolatis pedunculos aequantibus. *Numidia.*

lingulata Poir. 22. Sc. foliis lanceolatis glabris erectis ſcapo brevioribus, racemo conferto, bracteis linearibus pedunculos aequantibus. *Numidia.*

byzantina Poir. 23. Sc. foliis linearibus obtuſis ſcapum teretem ſubaequantibus, racemo conico multifloro, bracteis lineari-ſubulatis pedunculo longioribus. *Thracia.*

anthericoides Poir. 24. Sc. ſcapo tereti fiſtuloſo baſi ſquamato, racemo elongato, pedunculis bracteas ſubulatas corollasque ſubaequantibus. *Numidia.*

biflora R. et P. 25. Sc. foliis enſiformibus ſtriatis reflexis ſcapo tereti brevioribus, racemo laxo, pedunculis geminis bracteatis. *Peru.*

maritima 26. Sc. foliis oblongis obtuſis glaberrimis, racemo conferto, pedunculis elongatis, bracteis ſubulatis ſubtus calcaratis. *Ad litora maris mediterran.* (Ornithogalum maritimum Brot.)

peruviana 27. Sc. foliis lanceolatis undulatis ciliatis, corymbo conico conferto, bracteis lanceolatis elongatis. *Luſitania. Afric. bor.*

luſitanica 28. Sc. foliis linearibus obtuſis, ſcapo tereti, racemo oblongo multifloro, petalis lineatis. *Luſitan.*

hyacinthoides 29. Sc. foliis lanceolatis canaliculatis, ſcapo elato, corymbi multiflori pedunculis ſubverticillatis coloratis, bulbo tomentoſo. *Madera.*

orientalis Th. 30. Sc. foliis elliptico-enſiformibus, floribus racemoſis, bracteis elongatis. *Japon.*

japonica Th. 31. Sc. ſcapo erecto baſi aphyllo, floribus umbellatis, bracteis lanceolatis elongatis. *Japon.*

tetraphylla L. ſuppl. 32. Sc. acaulis, foliis quaternis ovato-lanceolatis, pedunculis radicalibus filiformibus faſciculatis. *Africa.*

1218. ALOË.

I. *Parviflorae.*

A. *Apiera* W. *Cor. Labiata.*

a. *Acaules.*

* *Foliis integerrimis.*

retuſa 1. A. foliis 5fariis apice retuſo-deltoideis ſupra lineatis viridibus. *Afric. auſtr.* (Haworthia turgida Haw.)

albicans Haw. 2. A. foliis reflexo-patentibus ovatis 3quetris carinatis acutis glabris albicantibus margine carinaque cartilagineis. *C. B. S.*

cymbaeformis Curt. 3. A. foliis ovatis concavis glauceſcentibus apice carinatis obtuſis mucronatis ſubreticulato-lineatis. *C. B. S.*

** *Foliis dentatis vel ciliatis.*

reticulata Haw. 4. A. foliis 3quetris patulis obtuſiusculis glauceſcentibus ſubreticulatis margine carinaque denticulatis. *C. B. S.* (A. Pumilio Jacq.)

translucens Haw. 5. A. foliis patentibus lanceolatis teretiusculis ciliatis apice pellucido-maculatis. *C. B. S.* (Haworthia cuſpidata et limpida Haw.)

arachnoides Th. 6. A. foliis aſcendentibus lanceolatis ſtriatis apice 3gonis margine carinaque dentatis, dentibus cartilagineo-ſetaceis. *C. B. S.* (A. herbacea Cand. Haworthia ſetata et ariſtata Haw.)

venoſa Lam. 7. A. foliis reflexo-patentibus ovato-oblongis acutis glabris apice obtuſe 3quetris margine denti-

culatis ſupra lineatis. *C. B. S.* (A. tricolor Haw. W.)

mirabilis Haw. 8. A. foliis 5fariis 3quetris apice horizontaliter depreſſo-truncatis margine carinaque ciliato-ſpinoſis ſupra glabriusculis ſubtus ſubtuberculatis obſolete reticulatis. *C. B. S.*

lactevirens Link. 9. A. foliis lineari-lanceolatis ſupra concavis lineato-ſubreticulatis margine carinaque ſerrulato-ciliatis. *C. B. S.* (Haworthia Haw.)

*** *Foliis tuberculatis.*

atrovirens Cand. 10. A. foliis patulis lanceolatis 3gonis margine carinaque dentatis, dentibus brevisſimis ſubulatis, tuberculis confertis. *Afric. auſtr.* (A. pumila Haw.)

recurva Haw. 11. A. foliis ſubulatis craſſis erecto-recurvis ſupra concavis ſubtus margineque calloſo-tuberculatis. *Afric. auſtr.*

Radula Jacq. 12. A. foliis patulis oblongo-lanceolatis acuminatis apice ſub-3gonis ſupra planiusculis utrinque tenuiſſime calloſo-tuberculatis. *Afric. auſtr.*

attenuata Haw. 13. A. foliis patulis lanceolatis acuminatis ſupra planiusculis minutiſſime ſubtus groſſe papilloſis. *C. B. S.*

faſciata Salm. 14. A. foliis erectis lanceolatis acuminatis ſupra planis glabris ſubtus convexis groſſe papilloſis, papillis faſcias transverſales formantibus. *C. B. S.*

margaritifera 15. A. foliis erectiusculis ovatis acuminatis apice 3gonis mucronatis ſupra planiusculis utrinque calloſo-tuberculatis. *Afr. auſtr.* (Apicra Granata W.)

ſemimargaritifera Salm. 16. A. foliis erectiusculis, ſenioribus horizontalibus ovatis apice carinatis 3quetris mucronatis ſupra convexiusculis glabris ſubtus margineque calloſo-tuberculatis. *Afric. auſtr.* (Haworthia maxima Haw.)

hybrida Salm. 17. A. foliis ſpiraliter multifariis ovato-lanceolatis, junioribus patulis, ſupra convexiusculis rugoſis ſubtus viridi-tuberculatis. *Afric. auſtr.* (Haworthia ſemiglabrata Haw.)

b. *Caulescentes.*

papilloſa Salm. 18. A. foliis ovato-lanceolatis erectis undique ſeriatim depreſſo-papilloſis. *C. B. S.* (Haworthia erecta Haw.)

aſpera Haw. 19. A. caule ſtricto, foliis 3fariis patulis ovato-orbiculatis acutis concavis ſubtus denſe papilloſis. *C. B. S.*

anomala Haw. 20. A. ſubcauleſcens, foliis 3fariam imbricatis patentibus ovatis 3quetris margine carinaque incraſſatis maculatis. *C. B. S.*

curta * 21. A. ſubcauleſcens, foliis ſpiratim 3fariis 3angularibus patulis ſupra concavis granuloſo-aſperrimis. *C. B. S.* (Haworthia Haw.)

viſcoſa 22. A. foliis 3fariis erecto-patentibus ovatis 3gono-carinatis acutis glabris. *C. B. S.* (Haworthia concinna Haw.)

rigida Cand. 23. A. foliis ſub-3fariis patentibus lanceolatis rigide cuſpidatis utrinque convexiusculis aſpero-rugulosis margine incraſſatis. *C. B. S.* (Apicra patula et expanſa W.)

tortuoſa Haw. 24. A. foliis ſub-3fariis erecto-patulis ſupra convexiusculis apice triquetris aſpero-tuberculoſis, caule tortuoſo. *C. B. S.* (A. pſeudo-tortuoſa Salm. Haworthia tortella Haw.)

B. *Haworthia* Salm. *Corollae limbus regularis.*

folioloſa Haw. 25. A. foliis multifariis breviſſimis confertiſſimis orbiculato-ovatis laevigatis horizontalibus carinatis apice acuto recurvis margine carinaque incraſſatis. *C. B. S.*

imbricata Haw. 26. A. foliis multifariis erectis imbricatis ovatis acutis apice triquetris glabris, corolla transverſim rugoſa. *C. B. S.* (A. ſpiralis Cand.)

ſpiralis 27. A. caulescens tortuoſa, foliis 5fariis patentibus ſpiralibus glabris ſubtus obſolete maculatis. *C. B. S.* (A. 5gona Jacqu. Haw., ſpirella Haw.)

bullulata Jacqu. 28. A. caulescens, foliis 5fariis imbricato-patulis ovatis 3gonis acutis ſupra glabris ſubtus groſſe papilloſis. *C. B. S.*

*bicarinata** 29. A. caulescens, foliis ſubmultifariis cordatis rigidis 2carinatis ſupra laevibus ſubtus tuberculatis margine carinaque aſperrimis. *C. B. S.* (Apicra Haw.)

II. *Curviſlorae* Salm. *Gaſteriae* Haw.

**Foliis diſtichis.*

obliqua Haw. 30. A. caulescens, foliis ſubdiſtichis linearibus inaequilateri-3gonis integerrimis obtuſis mucronatis maculatis, maculis confluentibus. *C. B. S.* (A. maculata W.)

pulcra Jacqu. 31. A. caule ſubdichotomo, foliis ſubdiſtichis linearibus inaequilateri-3gonis glabris integerrimis acuminatis cuſpidatis diſtincte maculatis. *C. B. S.* (A. obliqua Cand.)

excavata W. 32. A. acaulis, foliis diſtichis acinaciformibus margine interrupte cartilagineis acutis maculatis. *C. B. S.* (A. acinacifolia Jacqu.)

obſcura W. 33. A. acaulis, foliis diſtichis patentibus linguaeformibus obtuſis mucronatis utrinque planis margine acutis cartilagineo-denticulatis obſolete maculatis. *C. B. S.*

angulata W. 34. A. acaulis, foliis diſtichis patentibus linguaeformibus baſi convexiusculis albo-maculatis glabris obtuſis mucronatis margine truncatis verrucoſo-cartilagineis denticulatis. *C. B. S.* (A. pſeudo-angulata Salm.)

laevis Salm. 35. A. foliis linguaeformibus patulis hinc truncatis, angulis laevibus basi apiceque incurvis obsoletissime maculatis. *C. B. S.*

nigricans Haw. 36. A. caule simpliciſſimo, foliis exacte distichis linguaeformibus abbreviatis margine cartilagineis integerrimis obsolete maculatis. *C. B. S.* (A. obliqua Jacqu.)

*subnigricans** 37. A. caule stricto, foliis distichis linguaeformibus acutiusculis margine verrucoso-denticulatis. *C. B. S.* (A. pseudo-nigricans Salm.)

Lingua W. 38. A. acaulis, foliis distichis linguaeformibus atroviridibus albo-maculatis obtusis mucronatis margine acutis verrucoso-denticulatis. *C. B. S.* (Gasteria denticulata Haw.)

conspurcata Salm. 39. A. foliis patentibus linguaeformibus viridissimis albo-maculatis apice densissime papillosis margine truncatis verrucoso-denticulatis. *C. B. S.*

subverrucosa Salm. 40. A. foliis distichis linguaeformibus obtusiusculis mucronatis supra planiusculis, papillis serialibus magnis maculaeformibus, marginibus truncatis verrucoso-denticulatis. *C. B. S.*

intermedia Haw. 41. A. foliis distichis patentibus linguae-ensiformibus obtusis mucronatis, verrucis utrinque numerosissimis albidis exiguis. *C. B. S.*

verrucosa 42 A. foliis distichis lineari-ensiformibus acutis margine truncatis utrinque densissime albo-verrucosis. *C. B. S.* (A. carinata Cand.)

* *Foliis spiratim multifariis.*

nitida Salm. 43. A. foliis lato-lanceolatis canaliculato-carinatis acutis obsolete albido-maculatis nitidis margine cartilagineo integerrimis. *C. B. S.*

glabra Salm. 44. A. foliis linguaeformibus acuminatis canaliculato-carinatis maculatis rugosiusculis margine carinaque cartilagineis. *C. B. S.* (Gasteria nitens Haw.)

subcarinata Salm. 45. A. foliis patulis lanceolatis inaequilateri-triquetris albo-papillosis, angulis dense cartilagineo-serratis supra concaviusculis subtus convexis apice oblique flexis obtusis mucronatis. *C. B. S.*

carinata 46. A. foliis patulis oblongo-lanceolatis inaequilateri-triquetris canaliculato-carinatis utrinque papillosis, marginibus tuberculato-scabris. *C. B. S.*

III. *Grandiflorae* Salm.

* *Acaules.*

micracantha Sims. 47. A. foliis linearibus canaliculatis cuspidatis maculatis margine spinuloso-ciliatis. *C. B. S.*

acuminata Haw. 48. A. foliis lineari-lanceolatis acuminatis glaucescentibus supra planis laevibus parce spinosis subtus conferte tuberculatis. *C. B. S.* (A. humilis Sims.)

tuberculata Haw. 49. A. foliis oblongo-lanceolatis acuminatis supra concaviusculis conferte tuberculatis echinato-spinosis. *C. B. S.*

echinata W. 50. A. foliis oblongo-lanceolatis ſpinoſo-dentatis ſubtus albo-verrucoſis, laciniis corollae inaequalibus. *C. B. S.*

humilis Thunb. 51. A. foliis oblongo-lanceolatis ſubulatis ſupra turgidis inerme ſpinoſis ſubtus tuberculatis, laciniis corollae aequalibus. *C. B. S.*

virens Haw. 52. A. ſubacaulis, foliis oblongo-lanceolatis viridibus parce maculatis, marginibus remote ſpinoſis, ſpinis viridibus uncinatis, floribus thyrſo-ſpicatis. *C. B. S.*

** *Cauleſcentes.*

† *Foliis emaculatis.*

prolifera Haw. 53. A foliis lanceolatis acutis glaucis, marginibus carinaque apice ſpinoſis ſubtus ſubtuberculatis. *C. B S.* (A. brevifolia W.)

depreſſa Haw. 54. A. foliis oblongo-ovatis acutis glaucis ſubtus tuberculatis, marginibus carinaque apice cartilagineis albo-dentatis. *C. B. S.* (A. Serra W.)

Serra Cand. 55. A. foliis caeſpitoſis patulis margine ſpinoſis, ſpinis inferioribus approximatis coalitis ſuperioribus remotis medio ſubſpinoſis. *C. B. S.*

† *lineata* Haw. 56. A. foliis viridibus lineatis rubro-ſpinoſis. *C. B. S.*

glauca Haw. 57. A. foliis oblongo-lanceolatis glaucis ſtriatis margine rubro-ſpinoſis. *C. B. S.* (A. rhodacantha Cand W.)

paniculata Jacqu. 58. A. foliis ovato-oblongis planis glaucis ſtriatis cartilagineo-marginatis obſolete denticulatis. *C. B. S.* (A. ſtriata Haw.)

rubeſcens Cand. 59. A. foliis enſiformibus glauco-rubentibus apice recurvis albido-ſerratis obſolete maculatis. *C. B. S.* (A. vera Lam.)

vulgaris Cand. 60. A. foliis lanceolatis patulis glaucis apice ſubrecurvis ſinuato-ſerrato-ſpinuloſis. *Graecia. Inſ. maris aegei. Syria. Ind. occid.* (A. barbadenſis Haw.)

abyſſinica Lam. 61. A. foliis lanceolatis patulis viridibus ſuperne concaviusculis ſinuato-rubro-dentatis. *Afric.* (A. vulgaris Red. ic.)

†† *Foliis maculatis.*

variegata 62. A. foliis imbricato-patulis trifariis ovatis canaliculato-3gonis faſciato-maculatis margine carinaque cartilagineo-crenatis. *C. B. S.*

ſerrulata Sims. 63. A. foliis ovato-lanceolatis apice ſubtriquetris ſeriatim maculatis margine carinaque apice ſerrulatis. *C. B. S.*

tenuifolia Lam. 64. A. foliis lanceolatis patulis tenuibus laete viridibus glabris ſupra lineatis obſolete maculatis tenuiſſime denticulatis. *C. B. S.*

arabica Lam. 65. A. foliis lanceolatis acuminatis recurvis ſupra planis ſubtus convexis maculatis, ſpinis marginalibus fuſcis recurvo-uncinatis. *Arabia.*

umbellata Cand. 66. A. foliis oblongo-lanceolatis ſubglauceſcentibus faſciatim maculatis, ſpinis marginalibus rufeſcen-

tibus, floribus thyrsoideo-capitatis. *C. B. S.* (A. saponaria Haw.)

picta Cand. 67. A. foliis oblongo-lanceolatis glaucescentibus, maculis subrotundo-oblongis sparsis, spinis marginalibus ruberrimis. *C. B. S.* (A. obscura Haw.)

latifolia Haw. 68. A. foliis ovato-lanceolatis virentibus, maculis sparsis fasciatisque subobsoletis, spinis marginalibus rufescentibus, floribus thyrsoideo-capitatis. *C. B. S.*

*** *Fruticosae.*

Socotrina Cand. 69. A. caule dichotomo, foliis ensiformi-lanceolatis erectis subglaucescentibus margine confertim serrulatis albo-spinosis. *Inf. Socotra. Arabia. C. B. S.*

rufo-cincta Haw. 70. A. foliis loriformibus acuminatis viridibus canaliculatis margine roseis albo-cartilagineo-denticulatis. *Ind. or.*

macra Haw. 71. A. foliis loriformibus concavo-canaliculatis patulo-recurvis serrulato-spinulosis viridibus emaculatis. *Inf. Mascaren.*

spicata L. suppl. 72. A. foliis ensiformibus planis maculatis dentatis, floribus spicatis horizontalibus. *C. B. S.*

caesia Salm. 73. A. foliis lanceolatis elongatis apice subrecurvis glaucis emaculatis margine et apice subtus rubro-spinosis. *C. B. S.*

dichotoma L. suppl. 74. A. caule dichotomo, foliis lanceolato-ensiformibus acutiusculis patulis glaucis dentatis, spica paniculata, staminibus corolla longioribus. *Afric. austr.* (Rhipidodendron W.)

plicatilis Ait. 75. A. caule dichotomo, foliis distichis linguaeformibus obtusis laevissimis subintegerrimis apice obsolete serratis, racemo simplici, staminibus corollam aequantibus. *Africa austr.* (Rhipidodendron distichum W.)

frutescens Salm. 76. A. caule humili, propaginibus numerosis, foliis remotis lineari-lanceolatis recurvato-patulis glaucescentibus, spinis marginalibus viridibus. *Patria?*

arborescens Caud. 77. A. caule elato, foliis aggregatis lanceolatis patulis apice recurvis glaucescentibus, dentibus marginalibus viridibus, inferioribus confertis. *C. B. S.* (A. perfoliata β. L.)

africana Haw. 78. A. caule fruticoso simplici foliis ensiformibus glaucis apice reflexis margine apiceque subtus rubro-spinosis. *Afric. austr.*

ferox Cand. 79. A. caule fruticoso simplici, foliis ovato-ensiformibus rigidiusculis glaucis deflexis utrinque spinosissimis. *C. B. S.* (A. perfoliata L.)

*subferox** 80. A. foliis lanceolatis patulis pruinoso-glaucis supra glabris subtus rubro-spinosissimis. *C. B. S.* (A. pseudo-ferox Salm.)

supralaevis Haw. 81. A. foliis oblongo-ensiformibus rigidis incurvis glaucescentibus supra laevibus subtus irregulariter spinosis. *C. B. S.* (A. perfoliata ε. L.)

flaviſpina Haw. 82. A. foliis oblongis acuminatis glaucis patulis, lateribus dorſoque ſpinis interruptis latiſſimis fulvis. *C. B. S.*

albiſpina Haw. 83. A. foliis ovato-acuminatis virescentibus apice ſubflavicantibus marginibus carinaque longe conferteque ſpinoſis. *C. B. S.*

Commelini W. 84. A. foliis ovato-oblongis attennatis patulis glaucescentibus ſupra laevibus margine carinaque ſubtus ſpinoſo-dentatis, ſpinis albicantibus. *C. B. S.* (A. mitraeformis Cand.)

xanthacantha W. 85. A. foliis ovato-acuminatis glaucis patentibus margine dorſoque ſpinoſis, ſpinis flavicantibus. *C. B. S.*

mitraeformis 86. A. foliis ovatis acutis imbricato-erectis ſubglaucescentibus margine carinaque ſubtus ſpinoſis. *C. B. S.* (A. nobilis Haw.)

breviſolia Haw. 87. A. foliis diſtantibus erecto-patulis ovato-acutis ſubtus maculatis margine carinaque ſubtus ſpinoſis, ſpinis demum flavicantibus. *C. B. S.* (A. diſtans Haw.)

1219. LOMATOPHYLLUM W.

borbonicum W. 1. L. foliis lanceolato-linearibus nutantibus ſpinoſo-ſerratis rubro-marginatis, racemis ſub-paniculatis. *Iuſ. Maſcaren.* (Dracaena marginata Ait. Aloë purpurea Lam., marginalis Cand. Phylloma aloiflorum bot. mag. Haw.)

*Jacquini** 2. L. foliis lanceolatis acuminatis glaucescentibus patulis recurvis, ſpinis marginalibus minutis albicantibus, floribus ſpicatis. *Patria?* (Aloë 6petala (Salm.)

1220. TRITOMA Ker.

Uvaria Ker. 1. Tr. foliis margine carinaque ſcabris, corollis clavato-cylindricis. *C. B. S.* (Aloë L., Veltheimia W.)

media Ker. 2. Tr. foliis margine carinaque laevibus, corollis clavato-cylindricis. *C. B. S.* (Aletris ſarmentoſa Andr. Veltheimia W.)

pumila Ker. 3. Tr. foliis margine carinaque ſcabris, corollis inferne cylindricis ſuperne ſubgloboſis. *C. B. S.* (Aletris Ait. Veltheimia W.)

1221. ALETRIS.

alba Mx. 1. A. floribus pedicellatis oblongo-tubuloſis, fructiferis laeviusculis, foliis lato-lanceolatis mucronatis. *Amer. bor.* (A. farinoſa L.)

aurea Mx. 2. A. floribus ſubſeſſilibus ſubcampanulatis fructiferis rugoſis ſcaberrimis, foliis lanceolato-enſiformibus acutis. *Amer. bor.* (Wurmbea bullata W.)

1222. VELTHEIMIA Gled.

viridifolia Jacqu. 1. V. foliis oblongis obtusis undulatis, dentibus limbi corollae rotundatis rectis. *C. B. S.* (Aletris capensis L.)

glauca Jacqu. 2. V. foliis lanceolatis glaucis mucronatis crispo-undulatis, dentibus limbi corollae elongatis patentibus. *C. B. S.* (Aletris glauca Ait.)

1223. DRIMIA Jacqu.

pusilla Jacqu. 1. Dr. foliis lanceolato-linearibus glabris scapum aequantibus, floribus erectis extus virentibus. *C. B. S.*

lanceaefoliae Ker. 2. Dr. foliis oblongis scapo brevioribus, racemi pedunculis elongatis nutantibus, floribus extus rubentibus. *C. B. S.*

undulata Jacqu. 3. Dr. foliis lineari-lanceolatis undulatis scapum aequantibus, racemi pedunculis horizontalibus, floribus extus virentibus. *C. B. S.*

purpurascens Jacqu. 4. Dr. foliis linearibus undulatis marginatis scapo brevioribus, racemi pedunculis abbreviatis erectis, floribus rubentibus. *C. B. S.*

media Jacqu. 5. Dr. foliis lineari-subulatis semiteretibus scapo brevioribus, floribus albis. *C. B. S.*

ciliaris Jacqu. 6. Dr. foliis linearibus carinatis ciliatis scapo brevioribus, floribus albis nutantibus. *C. B. S.*

elata Jacqu. 7. Dr. foliis lineari-lanceolatis oblique flexis glabris, floribus extus virentibus nutantibus. *C. B. S.*

altissima Ker. 8. Dr. foliis oblongis apice convoluto-cuspidatis, racemo longissimo, floribus albis. *C. B. S.* (Ornithogalum altissimum L. suppl. giganteum Jacqu.)

1224. MILLEA Cav.

biflora Cav. *Mexico.* Herba scapo 2furco 2floro, floribus magnis candidis, foliis linearibus canaliculatis.

1225. POLIANTHES.

tuberosa 1. P. foliis lanceolato-linearibus, floribus spicatis subaggregatis, limbi laciniis ovato-oblongis. *Mexico.*

gracilis Link. 2. P. foliis linearibus, floribus racemosis, limbi laciniis linearibus. *Brasil.*

1226. EUCOMIS Herit.

nana Ait. 1. E. scapo clavato, floribus nutantibus, foliis 2fariis lato-lanceolatis acutis. *C. B. S.* (Fritillaria L. Ornithogalum Thunb., Basilaea Poir.)

bifolia Jacqu. 2. E. scapo clavato, floribus erectis, foliis geminis oblongis acutis humo appressis. *C. B. S.* (Basilaea Poir.)

purpureo-caulis Dryand. 3. E. scapo clavato colorato, foliis multifariis expansis orbiculato-spathulatis. *C. B. S.*

regia Ait. 4. E. scapo cylindrico apice comoso, floribus nutantibus, foliis linguaeformibus humo appressis crenulatis. *C. B. S.* (Fritillaria L., Basilaea coronata Lam.)

undulata Ait. 5. E. scapo cylindrico apice longe comoso, foliis ovato-oblongis undulatis patentibus. *C. B. S.* (E. regia Red., Ornithogalum undulatum Thunb.)

punctata Herit. 6. E. scapo cylindrico apice breviter ramoso, racemis longissimis, foliis oblongo-lanceolatis canaliculatis patentibus. *C. B. S.* (Ornithogalum punctatum Thunb. Asphodelus comosus Houtt. Basilaea Poir.)

1227. ERIOSPERMUM Jacqu.

paroifolium Jacqu. 1. E. foliis ellipticis planis, scapo gracili, pedunculis patentissimis elongatis. *C. B. S.*

latifolium Jacqu. 2. E. foliis cordato-subrotundis acutis cucullatis petiolatis, scapo elato, pedunculis elongatis. *C. B. S.* (Ornithogalum capense L.)

lanceaefolium Jacqu. 3. E. foliis ovato-lanceolatis undulatis involutis petiolatis, racemo elongato, pedunculis patentibus. *C. B. S.*

pubescens Jacqu. 4. E. foliis ovatis acutis subcucullatis pubescentibus petiolatis, racemi elongati pedunculis erectis. *C. B. S.*

lanuginosum Jacqu. 5. E. foliis cordatis acutis utrinque lanatis, racemi elongati pedunculis patentibus. *C. B. S.*

foliolíferum Ker. 6. E. sterile caulescens, folio foliolifero, scapo racemoso paucifloro, floribus erectis subsessilibus campanulatis obtusis. *C. B. S.* (Ornithogalum paradoxum Jacqu.)

1228. PHORMIUM.

tenax Forst. *Nov. Zeeland.* Herba foliis lanceolatis rigidis fulvo-marginatis, scapo elato, floribus flavis paniculatis secundis. (Lachenalia ramosa L.)

1229. LACHENALIA Jacqu.

* *Floribus cylindricis.*

pendula Ait. 1. L. floribus pedunculatis pendulis, petalis interioribus bracteisque obtusis, foliis oblongo-lanceolatis. *C. B. S.* (L. 4color Jacqu. var.)

punctata Jacqu. 2. L floribus pedunculatis nutantibus, petalis interioribus inaequalibus obtusis, foliis lanceolatis basi attenuatis strictis. *C. B. S.*

rubida Jacqu. 3. L. floribus breviſſime pedunculatis pendulis, stylo staminibus longiori, foliis oblongis scapoque maculatis. *C. B. S.* (L. tigrina Jacqu.)

tricolor Jacqu. 4. L. floribus pedunculatis pendulis, petalis interioribus emarginatis, bracteis acutis, foliis lanceo-

latis. *C. B. S.* (L. luteola Jacqu. Phormium aloides L. ſuppl.)

iſopetala Jacqu. 5. L. floribus pedunculatis erectis, petalis ſubaequalibus linearibus obtuſis, ſcapo apice angulato, foliis lanceolatis deflexis. *C. B. S.*

unifolia Jacqu. 6. L. floribus pedunculatis erectiusculis, petalis interioribus inaequalibus obtuſis, folio ſolitario lineari-lanceolato canaliculato. *C. B. S.*

puſilla Jacqu. 7. L. floribus pedunculatis erecto-appreſſis, racemo axillari breviſſimo ſeſſili, petalis interioribus obtuſiusculis erectis, foliis ſpathulatis patulis. *C. B. S.*

bifolia Ker. 8. L. floribus pedunculatis diſtantibus ſub-2labiatis, foliis geminis lanceolatis cartilagineo-marginatis. *C. B. S.*

contaminata Ait. 9. L. floribus pedunculatis ſubcylindricis erectis, petalis interioribus obtuſis, foliis lineari-ſubulatis canaliculatis. *C. B. S.* (Phormium orchioides Thunb.)

** *Floribus campanulatis.*

hirta Thunb. 10. L. floribus pedunculatis cernuis, folio ſolitario lineari hirſuto. *C. B. S.* (Phormium hirtum Thunb.)

lanceaefolia Jacqu. 11. L. floribus longe pedunculatis ſubcernuis patentibus, ſcapo axillari aſcendente, foliis oblongis acutis. *C. B. S.*

purpurea Jacqu. 12. L. floribus pedunculatis horizontalibus, petalis interioribus obtuſis erectis, ſtaminibus longe exſertis, foliis lanceolatis cartilagineo-crenatis. *C. B. S.*

violacea Jacqu. 13. L. floribus breviter pedunculatis horizontalibus baſi planis, ſtaminibus exſertis, ſcapo ſuperne angulato, foliis oblongis obtuſiusculis. *C. B. S.*

lucida Ker. 14. L. floribus erectiusculis, petalis ſubaequalibus, foliis binis oblongis obtuſis. *C. B. S.*

fragrans Jacq. 15. L. floribus pedunculatis horizontalibus, petalis interioribus obtuſis, ſtaminibus exſertis, foliis lanceolatis baſi attenuatis ſcabris. *C. B. S.* (L. 1color Jacqu.)

purpureo-coerulea Jacqu. 16. L. floribus pedunculatis patentiſſimis, petalis interioribus ſpathulatis, ſtaminibus exſertis, ſcapo ſuperne angulato, foliis lanceolatis puſtulatis. *C. B. S.* (L. racemoſa Sims.)

puſtulata Jacqu. 17. L. floribus breviſſime pedunculatis, ſcapo triquetro reclinato, foliis lanceolatis puſtulatis ſcapum aequantibus. *C. B. S.*

liliiflora Jacqu. 18. L. floribus pedunculatis patentibus, petalis linearibus, interioribus ſubretuſis, foliis lanceolatis puſtulatis. *C. B. S.*

patula Jacqu. 19. L. floribus pedunculatis patulis, petalis interioribus obovatis, foliis lanceolatis canaliculatis ſcapo tereti brevioribus. *C. B. S.*

nervoſa Ker. 20. L. floribus pedunculatis baſi gibbis, petalis ſubaequalibus, ſtaminibus corolla duplo longioribus, foliis ovatis nervoſis margine cartilagineis. *C. B. S.*

anguſtifolia Jacqu. 21. L. floribus breviſſime pedunculatis, petalis interioribus obovatis, foliis lineari-ſubulatis canaliculatis laxis ſcapo longioribus. *C. B. S.*

hyacinthoides Jacqu. 22. L. floribus breviſſime pedunculatis, petalis interioribus emarginatis, foliis lineari-ſubulatis canaliculatis laxis ſcapo longioribus. *C. B. S.* (L. orthopetala et orchioides Jacqu.)

pallida Ait. 23. L. floribus breviſſime pedunculatis ſuberectis, petalis interioribus obtuſiſſimis, foliis lineari-oblongis laxis ſcapo longioribus. *C. B. S.* (L. mediana Jacqu.)

orchioides Ait. 24. L. floribus ſeſſilibus, petalis interioribus patulis obtuſis, ſtylo ſtamina aequante, foliis oblongo-lanceolatis cartilagineo-crenatis. *C. B. S.* (Hyacinthus orchioides L., Phormium hyacinthoides L. ſuppl.)

glaucina Jacqu. 25. L. floribus ſeſſilibus paucis erectis, petalis interioribus obtuſiſſimis, ſtylo ſtamina ſuperante, foliis lanceolatis glabris. *C. B. S.*

1230. UROPETALUM Ker.

ſerotinum Ker. 1. U. floribus racemoſis ſecundis nutantibus, foliis linearibus canaliculatis ſcapo brevioribus. *Hiſpan. Afric. bor.* (Hyacinthus ſerotinus L., Lachenalia L., Scilla Curt.)

viride Ker. 2. U. floribus breviter pedunculatis erectiusculis racemoſis, petalis exterioribus longe ſubulatis, foliis linearibus ſcapo longioribus. *C. B. S.* (Hyacinthus viridis L. Lachenalia Thunb. Ait. Zuccagnia Thunb.)

glaucum Burch. 3. U. floribus longiſſime pedunculatis nutantibus racemoſis, foliis oblongo-lanceolatis glaucis ſcapo brevioribus. *Afric. auſtr.*

1231. CYANELLA.

alba Thunb. 1. C. foliis lineari-filiformibus ſcapo 1floro brevioribus. *C. B. S.*

lutea Thunb. 2. C. foliis lineari-lanceolatis planis ſcapo ramoſo brevioribus. *C. B. S.*

orchidiformis Jacqu. 3. C. caule folioſo ramoſo, foliis glaucis cartilagineo-denticulatis, radicalibus ovatis, caulinis enſiformibus ſtrictis, racemis erectis. *C. B. S.*

capenſis 4. C. caule folioſo paniculato, foliis lanceolatis undulatis, racemis divaricatis. *C. B. S.*

1232. AGAVE.

* *Staminibus exſertis.*

† *Limbo corollae erecto: acaules.*

americana 1. A. foliis glaucis rigidis dentato-ſpinoſis, ſcapo ramoſo, ſtylo ſtamina ſuperante. *Amer. trop.*

Milleri Haw. 2. A. foliis glaucis rigidis dentato-ſpinoſis, ſcapo ſimpliciſſimo, ſtylo ſtamina aequante. *Carolin. bor.*

flaccida Haw. 3. A. foliis glaucis anguſte lanceolatis flaccidis recurvis, ſpinis marginalibus minutis. *Amer. trop.*

yuccaefolia W. 4. A. foliis glaucis loriformibus canaliculatis erecto-recurvis, ſerrulis marginalibus minutiſſimis albis denſis. *Nov. Hiſpan.*

† *mexicana* Haw. 5. A. foliis glaucis lanceolatis erecto-patulis, ſpinulis marginalibus parvis ſubdiſtantibus pallidis, ſuperne atro-purpureis. *Mexico.*

vivipara 6. A. foliis viridibus lanceolatis dentatis, ſcapo ramoſo, ſtaminibus corollam aequantibus. *Patria?*

virginica 7. A. foliis viridibus lanceolatis cartilagineo-ſerrulatis, ſcapo ſimpliciſſimo, ſtaminibus corollam duplo ſuperantibus. *Virgin. Carolina bor.*

Keratto Haw. 8. A. foliis erectis laete virentibus, marginibus fuſcis integerrimis. *Amer. trop.*

†† *Limbo corollae erecto: cauleſcentes.*

lurida Ait. 9. A. foliis oblongis margine nigricantibus ſpinoſo-dentatis, ſcapo ramoſo, ſtylo ſtaminibus breviori. *Nov. Hiſpan.* (A. Veraecrucis Haw.)

anguſtifolia Haw. 10. A. foliis lineari-lanceolatis glaucis dentato-ſerratis. *Patria?*

††† *Limbo corollae revoluto.*

ſpicata Cand. 11. A. foliis linearibus canaliculatis rigidis acutis integerrimis, ſcapo ſimpliciſſimo, floribus congeſtis ſeſſilibus, ſtaminibus longe exſertis. *Amer. trop.*

geminiflora Ker.? 12. A. foliis linearibus utrinque convexis ancipitibus patentiſſimis apice ſpinoſis, ſcapo ſimpliciſſimo, floribus ſeſſilibus geminis, ſtaminibus longe exſertis. *Amer. auſtr.* (Littaea geminiflora Brignol.)

** *Staminibus incluſis, baſi incraſſatis.* *Fourcroya* Vent.

cubenſis Jacqu. 13. A. acaulis, foliis lanceolatis ciliato-ſpinoſis, corollis 6petalis. *Cuba.*

tuberoſa Mill. 14. A. cauleſcens, foliis lanceolatis dentato-ſpinoſis, radice tuberoſa. *Amer. trop.*

rigida Mill. 15. A. cauleſcens, foliis lineari-lanceolatis baſi ſerrato-ſpinoſis apice integerrimis. *Amer. trop.*

foetida 16. A. cauleſcens, foliis lanceolatis patentiſſimis rigidis integerrimis, ſcapo ramoſo, corollis 6petalis. *Amer. trop.* (Fourcroya gigantea Vent.)

† *madagaſcarenſis* * 17. A. foliis lanceolatis viridibus canaliculatis elongatis patulis, ſpinis marginalibus minutis albis. *Madagaſcar.* (Fourcroea Haw.)

Cantala Wall. 18. A. foliis lanceolatis glaucis planiusculis patentibus, ſpinis marginalibus minutis confertis albis. *China auſtr.*

1233. DORYANTHES Corr.

excelsa Corr. *Nov. Holl.* Planta excelsa (3orgyalis) folioſa, foliis enſiformibus, floribus ſpicato-capitatis puniceis, bracteis coloratis.

1234. ALSTRÖMERIA.

* *Caule erecto.*

Pelegrina 1. A. foliis lineari-lanceolatis lucidis obliquis, corollis patentibus, laciniis exterioribus 3dentatis interioribus mucronatis. *Peru. Chili.*

pulchella 2. A. foliis lineari-lanceolatis obtuſiusculis ſtriatis, pedunculis umbellatis involucro brevioribus, laciniis corollae acutis ſtriatis. *Chili.*

Ligtu 3. A. foliis ſpathulato-oblongis lucidis, perdunculis umbellatis involucro longioribus, laciniis corollae ſuperioribus maculatis, inferioribus ſubulatis. *Lima.*

caryophyllea Jacqu. 4. A. foliis ſpathulato-lanceolatis 3nerviis opacis, caule florifero ſubaphyllo, involucro foliaceo pedunculos aequante, laciniis corollae patentiſſimis. *Patria?*

*Simſii** 5. A. foliis ſpathulatis glaucis ſubtortis ciliatis, umbella multiflora erecta, pedunculis geminis, laciniis corollae ſubſpathulatis apiculatis, lateralibus ſubſerratis, ſuperioribus maculatis. *Chili.* (A. pulchella Sims.)

tricolor Hook. 6. A. foliis linearibus, pedunculis geminis, laciniis corollae ſubconformibus acutiusculis ſerratis. *Chili.*

Flos Martini Ker. 7. A. foliis lineari-lanceolatis, pedunculis ſub-3floris flexuoſis, laciniis corollae obovatis apiculatis ſerratis. *Chili.* (A. pulcra Sims.)

revoluta R. et P. 8. A. foliis lanceolatis, pedunculis umbellatis 2floris, laciniis corollae revolutis, interioribus minoribus. *Chili.*

verſicolor R. et P. 9. A. foliis lanceolato-linearibus, pedunculis ſubternis, laciniis corollae lateralibus anguſtioribus, infimo ovato. *Chili.*

haemantha R. et P. 10. A. foliis lineari-lanceolatis ciliatis, pedunculis 2floris umbellatis, laciniis corollae exterioribus apice denticulatis, ſummo ſubrotundo. *Chili.*

lineatiflora R. et P. 11. A. foliis lanceolatis lucidis nervoſis, pedunculis 2floris umbellatis, laciniis corollae cuneiformibus ſerratis lineatis. *Peru.*

diſtichophylla R. et P. 12. A. caule aſcendente, foliis diſtichis oblongo-lanceolatis petiolatis, pedunculis umbellatis 1floris, laciniis corollae ſubconformibus, interioribus planis latioribus. *Peru.*

ſecundifolia R. et P. 13. A. caule declinato, foliis ſecundis lanceolatis acuminatis ſubtus ſubtomentoſis albidis, umbella 5flora, floribus extus lanatis. *Peru.*

glauceſcens Humb. 14. A. caule apice nutante, foliis lanceolatis rigidis ſtriatis ſubtus glauco-pubeſcentibus, pedunculis umbellatis, laciniis corollae obtuſis ſtriatis. *Quito.*

15.

linifolia Humb. 15. A. caule aſcendente pubeſcente, foliis lanceolatis obtuſis revolutis glabris, pedunculis umbellatis, floribus extus villoſiusculis, laciniis corollae acutiusculis nervoſis. *Peru.*

*braſilienſis** 16. A. caule ſtricto, foliis lanceolatis acutis nervoſis glaberrimis, pedunculis umbellatis 1floris, laciniis corollae lanceolatis acutis integerrimis ſtriatis. *Braſil.* Sello.

**** *Caule ſcandente.***

tomentoſa R. et P. 17. A. caule angulato glabro, foliis lanceolatis revolutis ſubtus ſtriatis tomentoſis, pedunculis 2floris umbellatis, laciniis corollae interioribus ſpathulatis. *Peru.*

ſetacea R. et P. 18. A. caule teretiusculo glabro, foliis lanceolatis ſtriatis ſubtus pubeſcentibus, umbella multiflora, pedunculis pubeſcentibus bracteatis, laciniis corollae conniventibus mucronatis. *Peru.*

denticulata R. et P. 19. A. caule teretiusculo glabro, foliis oblongis acuminatis repando-denticulatis ſubtus pubeſcentibus, pedunculis umbellato-corymboſis bracteatis, laciniis corollae mucronatis. *Peru.*

purpurea R. et P. 20. A. caule pubeſcente, foliis lanceolatis acutis ſtriatis ſubtus villoſiusculis, pedunculis ſubcorymboſis lanatis, laciniis corollae conformibus. *Peru.*

macrocarpa R. et P. 21. A. caule glabro tereti, foliis oblongo-lanceolatis acutis ſubtus pubeſcentibus, umbella multiflora, pedunculis bifloris, laciniis corollae conformibus, capſula turbinata. *Peru.*

cordifolia R. et P. 22. A. caule glabro, foliis cordatis acuminatis lucidis ſubtus ſubpubeſcentibus, pedunculis umbellatis 2floris, laciniis corollae exterioribus elongatis. *Peru.*

formoſa R. et P. 23. A. foliis lanceolatis elongatis acutis, umbella multiflora hemiſphaerica. *Peru.*

***** *Caule volubili.***

Salſilla 24. A. foliis lanceolatis petiolatis acuminatis, pedunculis umbellatis 2floris bracteatis elongatis, laciniis corollae obovatis ſubconformibus. *Lima. Nov. Granat.* (A. edulis Andr.?)

multiflora 25. A. foliis lanceolatis acuminatis petiolatis, pedunculis umbellatis 1floris involucro brevioribus, laciniis corollae alternis truncatis. *Nov. Granat.*

ovata Cav. 26. A. foliis oblongis acuminatis petiolatis ſupra villoſis, pedunculis umbellatis 2floris bracteatis laxis, laciniis corollae conniventibus, *Peru.*

anceps R. et P. 27. A. caule ancipiti, foliis lanceolatis acutis petiolatis, umbella multiflora, laciniis corollae conformibus. *Peru.*

roſea R. et P. 28. A. caule tereti, foliis ovato-lanceolatis acutis ſeſſilibus ſubtus pubeſcentibus, umbella multiflora, involucro amplo, laciniis corollae interioribus maculato-ſtriatis. *Peru.*

crocea R. et P. 29. A. caule tereti, foliis lineari-lanceolatis acuminatis ſeſſilibus ſubtus pubeſcentibus, umbella multiflora, laciniis corollae conformibus. *Peru.*

bracteata R. et P. 30. A. caule tereti ſuperne foliisque lineari-lanceolatis ſubtus pubeſcentibus, pedunculis 2floris umbellatis, bracteis elongatis, laciniis corollae conformibus. *Peru.*

fimbriata R. et P. 31. A. caule glaberrimo, foliis anguſte lanceolatis petiolatis ſubtus pubeſcentibus, umbella multiflora, laciniis corollae interioribus fimbriatis. *Peru.*

latifolia R. et P. 32. A. foliis ovato-oblongis ſubtus pubeſcentibus, umbellae multiflorae pedunculis ſub-3floris, laciniis corollae exterioribus ſtriatis. *Peru.*

hirſuta Kunth. 33. A. caule foliisque oblongis acuminatis rigidiusculis ſubtus hirſutis, umbella multiflora, laciniis corollae exterioribus brevioribus. *Nov. Granat.*

grandifolia Kunth. 34. A. caule glabro, foliis ovatis acuminatis ſubtus pubeſcentibus, pedunculis umbellatis 1floris villoſiusculis, laciniis corollae conformibus. *Peru.*

pauciflora Kunth. 35. A. caule foliisque ovato-lanceolatis rigidiusculis nervoſis, pedunculis ſubumbellatis 2floris bracteatis, laciniis corollae exterioribus longioribus. *Nov. Granat.*

hirtella Kunth. 36. A. caule glabro, foliis oblongis acuminatis ſtriatis petiolatis ſubtus pubeſcentibus, umbella multiflora, laciniis corollae exterioribus brevioribus. *Mexico.*

Caldaſii Kunth. 37. A. caule foliisque ovato-lanceolatis rigidiusculis ſtriatis utrinque glabris, umbella multiflora, pedunculis pubeſcentibus, laciniis corollae exterioribus brevioribus. *Quito. Nov. Granat.* (A. floribunda Kunth.)

torta Kunth. 38. A. caule foliisque lineari-lanceolatis revolutis ſeſſilibus, umbella multiflora, laciniis corollae exterioribus longioribus. *Peru.*

1235. GETHYLLIS.

ſpiralis 1. G. foliis linearibus ſpiralibus glabris. *C. B. S.*
ciliaris 2. G. foliis linearibus ſpiralibus ciliatis. *C. B. S.*
villoſa 3. G. foliis linearibus ſpiralibus villoſis. *C. B. S.*
lanceolata 4. G. foliis lanceolatis planis. *C. B. S.*

1236. ASPHODELUS.

acaulis Desf. 1. A. foliis triquetro-ſubulatis glabris patulis, pedunculis radicalibus confertis abbreviatis, fructiferis reflexis, bracteis flore brevioribus. *Atlas.*

fiſtuloſus 2. A. foliis radicalibus ſemiteretibus ſubulatis ſubfiſtuloſis, ſcapo humili ſimplici. *Europ. auſtr.*

albus W. 3. A. foliis radicalibus linearibus carinatis laevibus, ſcapo ſimplici, pedunculis confertis bracteas aequantibus. *Italia ſuper.* (A. ramoſus β. L.)

weſtivus Brot. 4. A. foliis radicalibus linearibus carinatis glaucis laevibus, ſcapo ramoſo, pedunculis bracteas ſuperantibus, capſula obovato-globoſa. *Luſitania.*

ramosus 5. A. foliis radicalibus ensiformibus carinatis laevibus, scapo ramoso, pedunculis alternis bractea longioribus, capsula subglobosa. *Europ. austr.*

tenuior M. B. 6. A. caule superne nudo, foliis subulato-triquetris striatis, racemo laxo, bracteis flore brevioribus. *Caucas.*

creticus Lam. 7. A. caule folioso superne nudo ramoso, foliis filiformi-subtriquetris striatis subdenticulato-ciliatis, bracteis pedunculo multo brevioribus. *Creta. Istria.* (A. liburnicus Scop.)

proliser M. B. 8. A. caule folioso apice ramoso, foliis filiformibus longissimis striatis laevibus, pedunculis subaggregatis bractea longioribus. *Armenia.* (Anthericum dendroides Stev.)

tauricus M. B. 9. A. caule toto foliis subulato-triquetris striatis vaginato, bracteis lato-lanceolatis imbricatis flores superantibus. *Tauria.*

luteus 10. A. caule toto foliis subulato-triquetris glaucis spiratim vaginato, bracteis lanceolatis imbricatis flore brevioribus. *Europ. austr. Tauria.*

1237. EREMURUS M. B.

spectabilis M. B. *Caucas. Taur.* Planta spedalis, foliis radicalibus linearibus carinatis, scapo racemoso, floribus flavicantibus. (Asphodelus altaicus Pall.)

1238. ANTHERICUM.

* *Foliis filiformibus.*

filifolium Jacqu. 1. A. radice bulbosa, foliis flexuosis glabris scapo longioribus, racemo paucifloro, petalis obtusis alternis angustioribus. *C. B. S.* (Albuca filifolia Ker.)

filiforme Ait. 2. A. radice fasciculata, foliis basi pilosiusculis strictis scapum subramosum aequantibus, racemis elongatis, petalis lanceolatis. *C. B. S.* (A. elongatum W.)

capillare * 3. A. radice fasciculata, foliis striatis cuspidatis glabris scapum subaequantibus, racemo abbreviato, petalis obtusis. *Patria?* (Phalangium capillare Poir.)

spirale 4. A. radice bulbosa, foliis spiralibus striatis scapo flexuoso brevioribus, racemo paucifloro, pedunculis elongatis. *C. B. S.* (A. spiratum Thunb.)

fragrans Jacqu. 5. A. radice bulbosa, foliis subtrigono-filiformibus erectis strictis scapo brevioribus, racemo multifloro, petalis obtusis. *C. B. S.* (Albuca fugax Ker.)

exuviatum Jacqu. 6. A. radicis bulbosae squamis transversim rugosis, foliis lineari-subulatis canaliculatis scapo simplici longioribus. *C. B. S.*

**** *Foliis linearibus.***

flexifolium — 7. A. radice fasciculata, foliis linearibus angustissimis basi ciliatis flexuosis scapum ramosum aequantibus, racemo conferto. *C. B. S.*

ciliatum * — 8. A. radice fasciculata, foliis linearibus canaliculatis ciliatis scapo simplici brevioribus, racemo pauciflоro. *Caracas.* (Phalangium Kunth.)

villosum Labill. — 9. A. radice bulbosa, caule simplici folioso, foliis linearibus floribusque paniculatis extus villosis. *Asia minor.*

hirsutum Thunb. — 10. A. foliis linearibus hirsutis scapo ramoso villosiusculo brevioribus, racemis elongatis. *C. B. S.*

niveum * — 11. A. foliis linearibus basi canaliculatis striatis scapo simplici brevioribus, racemo spicato cylindrico, petalis obtusis. *Ind. or.* (Phalangium Poir.)

revolutum — 12. A. radice fasciculata, foliis linearibus canaliculatis scabris scapo simpliciusculo longioribus, racemis corymbosis, petalis obtusis revolutis. *Afr. austr.*

esculentum * — 13. A. radice bulbosa, foliis linearibus carinatis scapo brevioribus, racemis elongatis, bracteis linearibus pedunculos superantibus, petalo infimo deflexo. *Amer. bor.* (Phalangium Quamash Pursh., esculentum Nutt., Scilla esculenta Sims.)

graecum — 14. A. radice bulbosa, foliis linearibus nervosis glabris erectis scapum simplicem aequantibus, floribus paucis subcorymbosis campanulatis striatis. *Inf. maris aegei.*

trinervium Viv. — 15. A. foliis linearibus canaliculatis abbreviatis, caule sub-3floro, petalis spathulatis 3nerviis. *Ager cyrenaic.* Cella.

graminifolium W. — 16. A. radice fasciculata, foliis linearibus planis depressis scapo ramoso brevioribus, petalis alternis undulatis. *C. B. S.* (A. undulatum Jacqu.)

divaricatum Jacqu. — 17. A. foliis linearibus glabris decumbentibus, scapi paniculati ramis divaricatis. *C. B. S.*

squameum — 18. A. radice tuberosa, foliis radicalibus paucis gramineis, scapo squamis membranaceis tumidis imbricato, floribus racemosis bracteatis infundibuliformibus. *C. B. S.*

longifolium Jacqu. — 19. A. radice fasciculata, foliis linearibus carinatis ciliatis prostratis scapo ramoso flexuoso longioribus. *C. B. S.* (A. fimbriatum Thunb.)

floribundum Ait. — 20. A. foliis linear-lanceolatis glabris scapo simplici brevioribus, racemo multifloro cylindrico compacto. *C. B. S.* (A. Lagopus Thunb.)

ramosum — 21. A. radice fibrosa, foliis linearibus glabris erectis scapo ramoso brevioribus, petalis subreflexis obtusiusculis, stylo recto. *Europ.*

Liliago — 22. A. radice fasciculata, foliis linearibus erectis scapo simpliciſſimo brevioribus, petalis planis lanceolatis acutis, stylo declinato. *Europ.*

triflorum Ait. — 23. A. radice fasciculata, foliis linear-lanceolatis carinatis, scapo simplici racemoso, bracteis remotis sub-2floris. *C. B. S.* (A. 2pedunculatum Jacqu.)

***Foliis latioribus.**

fulfureum Kit. 24. A. radice bulboſa, foliis lineari-lanceolatis canaliculatis ſubglauceſcentibus, ſcapo ſimplici ſtricto elato, petalis oblongis obtuſiusculis. *Thermae Herculis ad fines Walachiae.*

tuberoſum Roxb. 25. A. radice tuberoſa, foliis enſiformibus complicatis, ſcapo tereti paniculato, ſtylo aſcendente. *Ind. or.*

pomeridianum Ker. 26. A. radice bulboſa, foliis lanceolato-loriformibus canaliculatis glaucis, ſcapo ramoſo, petalis ſubreflexis. *C. B. S.?* (Scilla pomeridiana Cand.)

glaucum R. et P. 27. A. radice faſciculata, foliis enſiformibus carinatis glaucis lucidis, racemo ſimplici multifloro longiſſimo, pedunculis fructiferis appreſſis. *Peru.*

ecremorrhizon R. et P. 28. A. radice tuberculoſa, caule folioſo, foliis enſiformibus carinatis ſtriatis, floribus racemoſis, bracteis 3floris. *Peru.*

coeruleum R. et P. 29. A. radice fibroſa, foliis radicalibus paucis enſiformibus erectis ſcapo ramoſo brevioribus, petalis alternis anguſtioribus. *Chili.*

† *breviſolium* Thunb. 30. A. foliis radicalibus lanceolatis carnoſis convolutis breviſſimis, ſcapo filiformi ſimpliciſſimo, floribus racemoſis remotis cernuis. *C. B. S.*

falcatum Thunb. 31. A. foliis enſiformibus ſubcarnoſis ſubfalcatis proſtratis, ſcapo ramoſo, floribus remotis. *C. B. S.*

contortum Thunb. 32. A. caule ancipiti folioſo, foliis enſiformibus glabris, pedunculis capillaribus remotis. *C. B. S.*

veſpertinum Jacqu. 33. A. foliis lineari-enſiformibus carinato-triquetris ſcapo tereti ramoſo brevioribus. *C. B. S.*

japonicum Thunb. 34. A. foliis enſiformibus canaliculato-convolutis ſcapum angulatum flexuoſum aequantibus, floribus racemoſis cernuis. *Japon. China. Java.*

latifolium Kunth. 35. A. radice bulboſa, foliis lanceolatis planis, ſcapo ſimplici, floribus racemoſis remotis. *Nov. Granat.*

1239. BULBINE W.

**Foliis teretibus carnoſis.*

annua W. 1. B. foliis ſubulatis teretiusculis, ſcapo ſubracemoſo. *Afric.* (Anthericum annuum L.)

longiſcapa W. 2. B. foliis ſemiteretibus flexuoſis glaucis ſcapo triplo brevioribus, racemi elongati pedunculis erectis. *C. B. S.* (Anthericum Jacqu. A. favoſum Thunb.)

*aſphodeloides** 3. B. foliis ſemiteretibus ſtrictis aſperiusculis, racemo ſpicato. *Afric. auſtr.* (Anthericum L.)

roſtrata W. 4. B. foliis teretibus glaucis, caule fruticoſo breviſſimo radicante. *Afric. auſtr.* (Anthericum roſtratum Jacqu.)

fruteſcens W. 5. B. foliis ſemiteretibus ſubulatis, caule inferne folioſo fruticoſo ramoſo. *Afric. auſtr.* (Anthericum L.)

pugioniformis Link. 6. B. foliis ſemiteretibus canaliculatis acuminatis abbreviatis, ſcapo racemoſo elato. *Afric. auſtr.* (Anthericum Jacqu.)

*auſtralis** 7. B. radice bulboſa, foliis ſemiteretibus canaliculatis, racemo laxo. *Nov. Holl.* (Anthericum bulboſum R. Br.)

*ſemibarbata** 8. B. radice fibroſa, foliis ſemiteretibus canaliculatis, filamentis exterioribus imberbibus. *Nov. Holl. Terra Diemen.* (Anthericum ſemibarbatum R. Br.)

***Foliis ſubtrigonis.*

*triquetra** 9. B. radice faſciculata, foliis filiformibus triquetris glabris ſcapo ſimplici brevioribus, racemo ovato. *C. B. S.* (Anthericum triquetrum Thunb.)

*ſcabra** 10. B. foliis triquetris ſerrulatis ſcapo ramoſo ſcabro longioribus, racemis ſpicatis, pedunculis fructiferis reflexis. *C. B. S.* (Anthericum ſcabrum Thunb.)

ciliata Link. 11. B. foliis ſubtriquetro-enſiformibus ciliatis elongatis, ſcapo ſimplici, racemo longiſſimo. *C. B. S.* (Anthericum ciliatum Thunb.)

*praemorſa** 12. B. radice tuberoſa praemorſa, foliis ſubtriquetris canaliculatis diſtichis erectis ſcapo brevioribus. *C. B. S.* (Anthericum praemorſum Jacqu.)

*incurva** 13 B. radice faſciculata, foliis abbreviatis 3gonis ſubulatis incurvis, ſcapo ſimplici, racemo oblongo cernuo. *C. B. S.* (Anthericum incurvum Thunb.)

*canaliculata** 14. B. foliis enſiformi-triquetris latere anguſtiori canaliculatis ſcapoque ſimplici piloſis, racemo multifloro. *C. B. S.* (Anthericum canaliculatum Ait.)

***Foliis planis.*

aloides W. 15. B. foliis linguaeformi-lanceolatis carnoſis ſcapo racemoſo ſubbrevioribus. *C. B. S.* (Anthericum aloides L.)

*nutans** 16. B. foliis lanceolatis carnoſis baſi concavis apice reflexis ſcapo brevioribus, racemo ovato apice nutante. *C. B. S.* (Anthericum nutans Thunb.)

*planifolia** 17. B. radice faſciculata, foliis linearibus carinatis membranaceis flaccidis ſcapo ramoſo brevioribus, floribus paniculatis, filamentis medio clavatis apice ſubulatis. *Luſitania. Numidia.* (Anthericum planifolium L., Mattiazzi Vand., bicolor Desf.)

*caudata** 18. B. foliis enſiformibus canaliculatis ſcapo ſimplici longioribus, racemo oblongo erecto. *C. B. S.* (Anthericum caudatum Thunb., Cauda felis L. ſuppl.)

*latifolia** 19. B. foliis oblongo-lanceolatis acuminatis nervoſis ſubcarnoſis ſcapo ſimplici brevioribus, racemo longiſſimo. *C. B. S.* (Anthericum latifolium Thunb.)

*undulata** 20. B. radice faſciculata, foliis enſiformibus undulatis ſcapo piloſo longioribus, racemo multifloro. *C. B. S.* (Anthericum undulatum Thunb.)

*criſpa** 21. B. foliis oblongis criſpis ciliatis erectis ſcapo glabro ramoſo brevioribus, floribus racemoſis remotis. *C. B. S.* (Anthericum criſpum Thunb.)

1240. ARTHROPODIUM R. Br.

** Petalis interioribus undulatis.*

paniculatum R. Br. 1. A. foliis lineari-lanceolatis, floribus paniculatis, pedicellis aggregatis, petalis interioribus crenulatis, capsulis pendulis, radice bulbosa, bulbis pedicellatis. *Nov. Holl.* (Anthericum paniculatum Andr., milleflorum Red.)

pendulum * 2. A. foliis lineari-lanceolatis, floribus laxe racemosis pendulis, pedicellis aggregatis, petalis interioribus undulatis, radice subfibrosa. (Phalangium pendulum Red. Anthericum Horn. W.)

minus R. Br. 3. A. racemo simplici paucifloro, pedicellis solitariis, bulbis sessilibus. *Nov. Holl.*

strictum R. Br. 4. A. racemo subsimplici paucifloro, pedicellis solitariis, capsulis erectis. *Terra Diemen.*

cirrhatum R. Br. 5. A. foliis lato-lanceolatis ensiformibus, floribus paniculatis cernuis, pedicellis aggregatis, bracteis foliaceis, filamentis superne barbatis 2appendiculatis. *Nov. Zeeland.* (Anthericum cirrhatum Forst.)

*** Petalis interioribus fimbriatis.*

fimbriatum R. Br. 6. A. racemo simplici, pedicellis inferioribus geminis, filamentis apice strumosis stuposis. *Nov. Holl.*

**** Petalis subaequalibus.*

*imbricatum** 7. A. foliis imbricatis lineari-ensiformibus distichis, pedicellis corymbosis, floribus nutantibus. *Nov. Holl.* (Stypandra imbricata R. Br.)

*glaucum** 8. A. foliis distinctis lineari-ensiformibus glaucis distichis, baseos margine altero reflexo, pedicellis subumbellatis, floribus nutantibus. *Nov. Holl.* (Stypandra glauca R. Br.)

*scabrum** 9. A. caule folioso, foliis linearibus complicatis, floribus corymbosis, pedicellis bracteatis corollisque hispidulis. *Nov. Holl.* (Stypandra scabra R. Br.)

*umbellatum** 10. A. caule folioso, foliis linearibus margine laevibus, floribus corymbosis, pedicellis umbellatis corollisque glabris. *Nov. Holl.* (Stypandra umbellata R. Br.)

*caespitosum** 11. A. caule folioso, foliis ensiformibus margine scabris, floribus corymbosis, pedicellis aggregatis corollisque laevibus. *Nov. Holl.* (Stypandra caespitosa R. Br.)

*muricatum** 12. A. foliis radicalibus linearibus concaviusculis carnosis striatis elongatis muricatis, scapo ramoso inferne hispido, pedicellis solitariis. *C. B. S.* (Anthericum muricatum Thunb.)

*hispidum** 13. A. foliis radicalibus lineari-ensiformibus canaliculatis hispidis scapo villoso longioribus, floribus racemoso-spicatis. *C. B. S.* (Anthericum hispidum L.)

1241. CHLOROPHYTUM Ker.

laxum R. Br. 1. Chl. acaule, foliis linearibus racemum elongatum ſubaequantibus, pedicellis ſubſolitariis. *Nov. Holl.*

inornatum Ker. 2. Chl. radice fibroſa, caule ſubramoſo hiſpidiusculo, foliis lanceolatis acuminatis nervoſis, floribus paniculato-racemoſis breviſſime pedicellatis. *Sierra Leone.*

elatum R. Br. 3. Chl. radice faſciculata, foliis lanceolatis, ſcapo ramoſo, pedicellis aggregatis. *C. B. S.* (Anthericum elatum Ait.)

Orchidaſtrum Lindl. 4. Chl. radice fibroſa, foliis lanceolatis, panicula racemoſa ſtricta, pedunculis aggregatis bracteatis. *Sierra Leone.*

1242. CAESIA R. Br.

corymboſa R. Br. 1. C. foliis lineari-lanceolatis, ſcapo ſimplici, corymbo paucifloro. *Nov. Holl. Terra Diemen.*

occidentalis R. Br. 2. C. foliis filiformi-canaliculatis, racemis ſubdiviſis, floribus erectis. *Nov. Holl.*

parviflora R. Br. 3. C. radice fibroſa, foliis lineari-lanceolatis, racemis paniculatis, floribus erectis. *Nov. Holl. Terra Diemen.*

vittata R. Br. 4. C. radice bulboſo-faſciculata, foliis lineari-lanceolatis, racemis ſubdiviſis, floribus nutantibus, filamentis vittatis. *Nov. Holl. Terra Diemen.*

*puſilla** 5. C. radice bulboſa, foliis linearibus, ſcapo ſimplici, racemo corymboſo, floribus erectis. *C. B. S.* (Anthericum puſillum Jacqu., pauciflorum Thunb.)

*phyſodes** 6. C. radice bulboſa, foliis oblongis obtuſis lucidis erectis ſcapo ſimplici brevioribus, racemo corymboſo, filamentis papilloſis. *C. B. S.* (Anthericum phyſodes Jacqu., marginatum Thunb.)

*comoſa** 7. C. foliis enſiformibus glabris, ſcapo angulato ramoſo apice comoſo, floribus racemoſis ciliatis, ſtaminibus inaequalibus. *Afric. auſtr.* (Anthericum comoſum Thunb.)

*coarctata** 8. C. radice faſciculata, foliis enſiformibus glaucis medio coarctatis, pedunculis 2fidis paniculatis, pedicellis umbellatis. *Peru.* (Anthericum coarctatum R. et P.)

†*lateriflora* R. Br. 9. C. caule ramoſiſſimo ſtipulato, floribus lateralibus ſubſolitariis nutantibus, capſulis clavatis pendulis ſub-1ſpermis *Nov. Holl.*

1243. TRICORYNE R. Br.

anceps R. Br. 1. Tr. caule ramoſiſſimo aphyllo ſtipulato angulato laevi, ramis ancipitibus, umbellis paucifloris. *Nov. Holl.*

tenella R. Br. 2. Tr. caule filiformi tereti aphyllo ſtipulato dichotomo laevi, umbellis 2-3floris. *Nov. Holl.*

ſcabra R. Br. 3. Tr. caule tereti hiſpido folioſo, ramis paniculatis angulato-ſtriatis ſcabris, foliis planis denticulatis, umbellis 5-7floris. *Nov. Holl.*

elatior R. Br. 4. Tr. caule tereti folioso ramisque laevibus paniculatis angulato-striatis, foliis planis, umbellis 5-7floris. *Nov. Holl.*

simplex R. Br. 5. Tr. caule simplici, foliis planis margine scabriusculis, umbella solitaria multiflora, pedicellis involucro longioribus. *Nov. Holl.*

1244. THYSANOTUS R. Br.

* *Hexandri.*

† *Tuberibus fasciculatis.*

Putersonii R. Br. 1. Th. tuberibus sessilibus, caule laevi basi attenuato superne volubili dichotomo, floribus solitariis, pedicello bracteis obtusis duplo longiori. *Terra Diemen.*

isantherus R. Br. 2. Th. tuberibus pedicellatis, foliis lineari-filiformibus canaliculatis erectis caulem laevem subsimplicem subaequantibus, pedunculis corymbosis 3floris, antheris aequalibus. *Nov. Holl. Terra Diemen.*

tuberosus R. Br. 3. Th. tuberibus pedicellatis, foliis linearibus canaliculatis laxis caulem teretem laevem paniculatum subaequantibus, pedunculis 3floris, antheris inaequalibus. *Nov. Holl.*

Banksii R. Br. 4. Th. foliis linearibus canaliculatis caulem simplicem laevem aequantibus, pedunculis umbellatis, antheris inaequalibus. *Nov. Holl.*

Baueri R. Br. 5. Th. foliis laxis glabris caule tereti simplici brevioribus, umbellis alternis sessilibus paucifloris. *Nov. Holl.*

elatior R. Br. 6. Th. foliis canaliculatis laxis caulem teretem laevem ramosum subaequantibus, pedunculis sub-3floris. *Nov. Holl.*

paniculatus R. Br. 7. Th. foliis canaliculatis laxis caulem teretem laevem paniculatum subaequantibus, pedicellis solitariis. *Nov. Holl.*

†† *Radicibus fibrosis.*

junceus R. Br. 8. Th. foliis linearibus canaliculatis strictis abbreviatis, caule ramoso diffuso tereti, pedunculis subternis. *Nov. Holl.* (Chlamysporum junceum Salisb.)

gracilis R. Br. 9. Th. caule subramoso filiformi laevi stipulato, ramis striato-angulatis, floribus subsolitariis, antheris aequalibus. *Nov. Holl.*

elongatus R. Br. 10. Th. caule ramosissimo laevi striato, ramulis 4gonis sub-1floris, stipulis caulinis scariosis, pedicellis flore brevioribus. *Nov. Holl.*

sparteus R. Br. 11. Th. caule tereti stricto striato superne paniculato, stipulis appressis scariosis, umbellis paucifloris. *Nov. Holl.*

deformis R. Br. 12. Th. caule tereti striato laevi ramoso, ramis falcato-flexuosis, pedunculis sub-3floris. *Nov. Holl.*

volubilis R. Br. 13. Th. caule volubili ſulcato, ramis ſimplicibus angulatis ſtrictis, umbellis paucifloris. *Nov. Holl.*

dichotomus R. Br. 14. Th. foliis radicalibus linear-filiformibus ciliatis, caule dichotome ramoſo paniculato, ramis patentibus 1floris, antheris ſubaequalibus. *Nov. Holl. occid.* (Ornithogalum dichotomum Labill. Thyſ. divaricatus R. Br. var.)

flexuoſus R. Br. 15. Th. foliis radicalibus, filiformibus hiſpidulis, caule dichotome ramoſo, ramis divaricatis angulatis ſcabris, floribus ſolitariis, antheris inaequalibus. *Nov. Holl.*

Menzieſii R. Br. 16. Th. caule ſtriato baſi attenuato ſuperne volubili, ramis 4gonis, floribus ſolitariis, bracteis pedicellos ſubaequantibus. *Nov. Holl.*

***Triandri: radicibus fibroſis.*

triandrus R. Br. 17. Th. foliis radicalibus linearibus ſtriatis ciliatis ſcapum laevem ſimpliciſſimum aequantibus, umbella multiflora, pedunculorum articulo inferiori involucrum ſuperante. *Nov. Holl. occid.* (Ornithogalum triandrum Labill.)

multiflorus R. Br. 18. Th. foliis radicalibus linearibus margine apice ſcabris ſcapum laevem ſimpliciſſimum aequantibus, umbella multiflora, pedunculorum articulo inferiori involucrum ſubaequante. *Nov. Holl.*

pauciflorus R. Br. 19. Th. foliis radicalibus compreſſo-filiformibus laevibus ſcapum ſimpliciſſimum ſubaequantibus, involucro paucifloro. *Nov. Holl.*

hiſpidulus R. Br. 20. Th. foliis radicalibus compreſſo-filiformibus hiſpidulis ſcapo ſcabriuſculo ſimpliciſſimo longioribus, umbella pauciflora. *Nov. Holl.*

1245. NARTHECIUM Möhr.

oſſifragum Hudſ. 1. N. foliis radicalibus linear-lanceolatis nervoſis, ſcapo bracteis veſtito, capſula acuta corollam ſubexcedente. *Europ. bor. paludes.* (Anthericum oſſifragum L. Abama anthericoides Cand.)

americanum Ker. 2. N. foliis linearibus nervoſis ſtrictis elongatis, ſcapo elato bracteis paucis, capſula ſubulata corollam duplo ſuperante. *Nov. Caeſar.*

1246. CZACKJA Andrz.

Liliaſtrum Andrz. *Helvet. Italia ſuper.* Planta pedalis cubitalis, radice faſciculata, foliis radicalibus linearibus nervoſis, ſcapo paucifloro, floribus erectis albis. (Anthericum et Hemerocallis L.)

1247. CONANTHERA R. et P.

biſolia R. et P. 1. C. radice bulboſa, foliis paucis linearibus canaliculatis, caule ſuperne ramoſo, floribus nutantibus, petalis ſubaequalibus. *Chili.*

Echeandia Perſ. 2. C. foliis lato-lanceolatis vaginantibus, caule ſimplici, floribus racemoſis nutantibus, petalis exterioribus anguſtiſſimis. *Patria?* (Anthericum reflexum Cav. Echeandia terniflora Ort. Red.)

*Forſteri** 3. C. radice fibroſa, foliis linearibus canaliculato-triquetris, ſcapo ſuperne paniculato, floribus nutantibus, petalis inaequalibus. *Nov. Caledonia.* (Anthericum Adenanthera Forſt.)

1248. LAXMANNIA R. Br.

minor R. Br. 1. L. foliis filiformibus, ſtipulis 2partitis capillaribus, floribus capitatis, bracteis margine nudis, petalis interioribus brevioribus. *Nov. Holl.*

gracilis R. Br. 2. L. foliis filiformibus, ſtipulis lanceolatis apice 2fidis, floribus capitatis, bracteis margine lanatis, petalis interioribus longioribus. *Nov. Holl.*

1249. BAUMGARTENIA*.

*nitida** 1. B. caule ramoſiſſimo radicante, foliis confertiſſimis aceroſis, floribus capitatis. *Nov. Holl.* (Borya R. Br.)

*ſphaerocephala** 2. B. caule ſimplici erectiusculo, foliis confertiſſimis aceroſis, floribus globoſo-capitatis. *Nov. Holl.* (Borya R. Br.)

1250. XANTHORRHOEA Sm.

arborea R. Br. 1. X. arboreſcens, foliis ſubtriquetris, ſpica longiſſima, bracteis floribusque imberbibus. *Nov. Holl.*

auſtralis R. Br. 2. X. arboreſcens, foliis enſiformibus, ſpica pedunculum excedente, bracteis elongatis. *Nov. Holl.*

Haſtile R. Br. 3. X. caule abbreviato, foliis enſiformibus, pedunculis elongatis, bracteis floribusque apice tomentoſis. *Nov. Holl.* (X. media R. Br.?)

minor R. Br. 4. X. acaulis, foliis triquetris, pedunculis elongatis, bracteis flores aequantibus imberbibus. *Nov. Holl.*

bracteata R. Br. 5. X. acaulis, foliis triquetris, pedunculis elongatis, bracteis lanceolatis divaricatis flores triplo ſuperantibus imberbibus. *Nov. Holl.*

Pumilio R. Br. 6. X. acaulis, foliis inferne ancipitibus ſuperne triquetris, pedunculis elongatis, bracteis floribusque imberbibus. *Nov. Holl.*

1251. HERRERIA R. et P.

ſtellata R. et P. *Chili.* Herba radice fuſiformi, caule flexuoſo, foliis verticillatis octonis linearibus, floribus racemoſis ochroleucis.

1252. DIANELLA Lam.

nemorosa Lam. 1. D. foliis lineari-lanceolatis margine subaculeato-serrulatis, carina glabra. *Ind. or.* (Dracaena ensifolia L.)

coerulea Sims. 2. D. foliis linearibus subtus glaucescentibus margine carinaque aculeato-serrulatis. *Nov. Holl.*

longifolia R. Br. 3. D. foliis linearibus elongatis margine carinaque laevibus, petalis patentibus. *Nov. Holl.*

revoluta R. Br. 4. D. foliis lineari-lanceolatis margine carinaque laevibus, petalis reflexis. *Nov. Holl.* (D. strumosa Ker.)

congesta R. Br. 5. D. foliis ensiformibus carina scabris, floribus alternatim congestis. *Nov. Holl.*

laevis R. Br. 6. D. foliis ensiformibus margine carinaque laevibus, paniculae simplicis pedunculis racemosis. *Nov. Holl.*

divaricata R. Br. 7. D. foliis lineari-ensiformibus margine carinaque laevibus, paniculae decompositae ramis divaricatis, pedicellis laxe racemosis flore longioribus. *Nov. Holl.*

rara R. Br. 8. D. foliis linearibus margine carinaque laevibus, paniculae diffusae ramis strictis, pedicellis laxe racemosis flore longioribus. *Nov. Holl.*

dubia Kunth. 9. D. foliis caulinis oblongo-lanceolatis, panicula diffusa. *Nov. Granat.*

1253. DRACAENA.

* *Arboreae.*

Draco 1. Dr. dichotome ramosa, foliis ensiformibus apice spinosis confertis, panicula terminali, bracteis integerrimis abbreviatis. *Ind. or.*

ensifolia Haw. 2. Dr. foliis late ensiformibus subcarnosis, panicula terminali ramosissima, bracteis elongatis margine subaculeatis. *Nov. Hispan.* (Cordyline parviflora Kunth.)

indivisa Forst. 3. Dr. foliis ensiformibus acutis membranaceis, panicula laterali thyrsoidea. *Nov. Zeeland.*

† *australis* Forst. 4. Dr. foliis ensiformibus acutis, panicula terminali supradecomposita. *Nov. Zeeland.*

† *arborea* Link. 5. Dr. foliis lanceolatis patentibus. *Afric.* (Aletris arborea W.)

fragrans Ker. 6. Dr. cortice annulato laevi, foliis oblongo-lanceolatis reflexis undulatis, paniculae ramis capituliferis. *Africa.* (Aletris fragrans Jacqu. W.)

tessellata W. 7. Dr. cortice tessellato, foliis linearibus cuspidatis patentibus rubro-marginatis. *Madagascar.* (Dr. marginata Lam.)

cernua Jacqu. 8. Dr. foliis lanceolatis cuspidatis basi angustatis oblique flexis, panicula divaricata nutante. *Inf. Mascaren.*

reflexa Lam. 9. Dr. foliis ensiformibus acuminatis striatis inferne angustatis, inferioribus reflexis, racemi termina-

lis pedunculis abbreviatis. *Inf. Maſcaren. Madagaſcar.*

ferrea 10. Dr. foliis lanceolatis utrinque attenuatis rubentibus, paniculae ramis divaricatis racemoſis, floribus horizontalibus breviſſime pedicellatis. *Ind. occid.* et *or. China.* (Dr. terminalis Jacqu.)

umbraculifera Jacqu. 11. Dr. foliis lanceolatis utrinque attenuatis, corymbo terminali breviſſimo multifloro. *Inf. Maſcaren.*

ovata Sims. 12. Dr. foliis confertis oblongis undulatis nervoſis, racemo terminali compoſito. *Sierra Leone.*

** *Fruteſcentes.*

ſtriata L. ſuppl. 13. Dr. caule fruticoſo flexuoſo ramoſo, foliis lineari-lanceolatis falcatis ſtriatis. *C. B. S.* (Aſparagus ſtriatus Thunb.)

mauritiana Lam. 14. Dr. ſcapo ſarmentoſo alterne paniculato, foliis enſiformibus, pedicellis flores ſuperantibus. *Inf. Maſcaren.*

*** *Herbaceae.*

undulata L. ſuppl. 15. Dr. caule angulato ramoſo, foliis ovatis acutis undulatis multinerviis, pedunculis axillaribus 1floris cernuis. *C. B. S.* (Aſparagus undulatus Thunb.)

erecta L. ſuppl. 16. Dr. caule compreſſo ramoſo, foliis lanceolatis acuminatis, pedunculis axillaribus 4floris cernuis. *C. B. S.* (Aſparagus erectus Thunb.)

graminifolia 17. Dr. foliis radicalibus linearibus ſtriatis, ſcapo angulato folia aequante, floribus faſciculato-racemoſis. *Ind. or.* (Aſparagus graminifolius L.)

1254. SANSEVIERA Thunb.

guineenſis W. 1. S. foliis 1formibus late-lanceolatis faſciatis rigidis, floribus ſeſſilibus, bracteis tubo corollae triplo brevioribus, ſtylo ſtamina ſuperante. *Guinea.* (S. thyrſiflora Thunb. Aletris hyacinthoides β. guineenſis L.)

grandicuſpis Haw. 2. S. foliis uniformibus lanceolatis oblique flexis faſciatis ſubmarginatis apice convoluto-cuſpidatis coriaceis. *Patria?*

† *polyphylla* Haw. 3. S. foliis late lanceolato-enſiformibus glaucis rigidis ſuberectis obſolete faſciatis. *Patria?*

glauca Haw. 4. S. foliis late-lanceolatis glaucis ſubflaccidis obſolete faſciatis. *Patria?*

*cannaefolia** 5. S. foliis lanceolatis acuminatis petiolatis, floribus racemoſis, bractea duplici inaequali. *Nov. Holl.* (Cordyline cannaefolia R. Br.)

lanuginoſa W. 6. S. foliis enſiformibus nervoſis ſubtus lanatis, racemis compoſitis, bracteis pedicellos ſuperantibus. *Ind. or. Inf. Maſcaren.* (Cordyline hemichryſa Commerſ. Dianella Lam.)

laete-virens Haw. 7. S. foliis lanceolatis utrinque attenuatis membranaceis glabris nervoſis reflexis, racemis terminalibus, bracteis minutis, ſtylo ſtamina ſuperante. *Cochinchina.* (Aletris cochinchinenſis Lour.)

fulvo-cincta Haw. 8. S. foliis lanceolatis rigidis glabris revolutis fulvo-marginatis, floribus fasciculato-racemosis, bracteis pedicellos superantibus, stylo staminibus subblongiori. *Brasil.*

spicata Haw. 9. S. foliis lanceolatis canaliculatis rigidis, floribus fasciculato-racemosis, bracteis obsoletis, stylo stamina subaequante. *Patria?* (Salmia spicata Cav.)

zeylanica W. 10. S. foliis fasciatis inferioribus oblongis acutis planis, superioribus linearibus canaliculatis, floribus racemosis, bracteis pedicellos aequantibus, stylo stamina superante. *Ceylon.* (Aloë et Aletris hyacinthoides L. S. pumila Haw. var.)

carnea Andr. 11. S. foliis lineari-lanceolatis membranaceis nervosis glaberrimis, spica axillari simplici foliis breviore, bracteis coloratis tubum corollae aequantibus, stylo stamina subaequante. *China.*

1255. LUZURIAGA R. et P.

radicans R. et P. 1. L. caule suffruticoso geniculato flexuoso scandente radicante, foliis alternis lanceolatis obliquis, pedunculis axillaribus divisis. *Chili.*

cymosa R. Br. 2. L. cymis terminalibus 2partitis, ramis teretibus, ramulis striatis laevibus. *Nov. Holl.*

montana R. Br. 3. L. umbellis axillaribus pedunculatis, ramis striatis ramulisque scabris. *Nov. Holl.*

1256. EUSTREPHUS R. Br.

latifolius R. Br. 1. E. caule volubili, foliis ovato-lanceolatis, pedicellis aggregatis, filamentis basi connatis, antheris effoetis apice tortilibus. *Nov. Holl.*

angustifolius R. Br. 2. E. caule volubili, foliis lineari-lanceolatis, pedicellis subsolitariis, filamentis distinctis, antheris effoetis apice strictis. *Nov. Holl.*

1257. ASPARAGUS.

* *Frutescentes armati.*

horridus 1. A. caule 5gono, aculeis solitariis alternis foliaceis elongatis rigidis compresso-4gonis patentibus, pedunculis aggregatis abbreviatis. *Sicilia. Hispan.*

aphyllus 2. A. caule angulato ramoso, aculeis foliaceis subternis divaricatis, pedunculis sub-1floris pendulis. *Europ. austr.* (A. phyllacanthus Lam.)

dependens Thunb. 3. A. caule flexuoso subangulato, ramis reflexo-pendulis, aculeis solitariis rectis, foliis fasciculatis subulatis. *C. B. S.*

albus 4. A. caule albido rigido ramoso, aculeis solitariis patenti-reflexis, foliis fasciculatis 3quetris muticis deciduis, pedunculis aggregatis floriferis erectis. *Europ. austr.*

ſtipularis Forsk. 5. A. caule tereti ſtriato, ramis divaricatis, aculeis ſtipularibus breviſſimis reverſis, foliis remotis ſubternatis angulatis glaucis rigidis pungentibus patentiſſimis, pedunculis ſubgeminis. *Aegypt.* (A. Brouſſoneti Jacq.)

ſtipulaceus Lam. 6. A. caule virgato hiſpidulo, ramis aggregatis abbreviatis, aculeis foliaceis faſciculatis, ſtipulis membranaceis obtuſis laceris. *C. B. S.*

aſiaticus 7. A. caule flexuoſo ramoſo, ramis nodoſis divaricatis, aculeis breviſſimis reverſis, foliis confertim faſciculatis ſubulatis falcatis. *Ind. or.*

africanus Lam. 8. A. caule angulato, ramis teretibus, aculeis ſolitariis ſubreflexis, foliis faſciculatis filiformibus mucronatis ſubincurvis. *C. B. S.*

aethiopicus 9. A. caule ramisque angulatis, aculeis ſtipularibus reverſis, foliis faſciculatis lineari-lanceolatis ſubfalcatis, pedunculis ſolitariis. *C. B. S.* (A. lanceus et ſcandens Thunb.)

capenſis 10. A. caule ramisque teretibus ſtrictis, aculeis ſubternis, medio forti rigido elongato ſubreflexo, foliis confertim faſciculatis filiformibus mucronatis abbreviatis pubeſcentibus, floribus ſolitariis terminalibus ſubſeſſilibus. *C. B. S.*

retrofractus 11. A. ramis tortuoſis reflexis, aculeis ſubternis, medio elongato reflexo, foliis terminalibus ſtellatim faſciculatis rigidis ſetaceis glabris. *Africa auſtr.*

falcatus 12. A. ramis teretibus, aculeis ſubaggregatis minutiſſimis, foliis ſubternis linearibus falcatis elongatis. *Ceylon.*

ſarmentoſus 13. A. caule flexuoſo, aculeis recurvis, foliis ſolitariis lineari-lanceolatis. *Ceylon.*

racemoſus W. 14. A. ramis ſtriatis, aculeis ſolitariis, foliis faſciculatis lineari-ſubulatis falcatis, racemis multifloris axillaribus. *Ceylon.*

faſciculatus R. Br. 15. A. caule decumbente ramoſiſſimo, aculeis ſolitariis divaricatis, foliis faſciculatis filiformibus, floribus racemoſis. *Nov. Holl.*

acutifolius 16. A. caule angulato, ramis divaricatis, foliis faſciculatis rigidis pungentibus patentiſſimis, pedunculis ſolitariis elongatis. *Europ. auſtr.*

** *Herbacei inermes.*

verticillaris 17. A. caule ſubſcandente, ramis divaricatis, foliis faſciculatis rigidis ſubulatis ſubarcuatis, floribus quaternis patulis dioecis. *Tauria. Caucaſ. Ad Volgam.*

maritimus Pall. 18. A. caule ramoſiſſimo ramisque horizontalibus flexuoſis, foliis faſciculatis ſetaceis patentiſſimis pungentibus, floribus campanulatis dioecis, pedunculis geminis reflexis. *Ad mare caſpium et Sibir.*

dauricus Fiſch. 19. A. caule ramoſo, ramis rectis, foliis faſciculatis ſetaceis elongatis, pedunculis ſolitariis nutantibus. *Dauria.*

† *flexuosus* Thunb. 20. A. caule scandente ramoso striato, ramis reflexis, foliis ternis lanceolatis acutis. *C. B. S.*

† *subulatus* Thunb. 21. A. caule flexuoso erecto, ramis reflexis, foliis ternis subulatis, floribus axillaribus sessilibus. *C. B. S.*

decumbens Jacq. 22. A. caule decumbente ramosissimo, ramis flexuosis, foliis setaceis, pedunculis solitariis terminalibus, limbo corollae reflexo. *C. B. S.*

declinatus 23. A. caule tereti, ramis declinatis, foliis subfasciculatis setaceis rigidis patentissimis. *C. B. S.*

sylvaticus Kit. 24. A. caule erecto tereti, foliis subverticillatis setaceis inermibus, stipulis solitariis. *Europ. austr.* (A. tenuifolius Lam.)

officinalis 25. A. caule erecto tereti, foliis fasciculatis setaceis, stipulis paribus basi mucronatis. *Europ.*

amarus Cand. 26. A. caule tereti scabro, foliis confertim fasciculatis setaceis, stipulis spinescentibus patulis subuncinatis, baccis magnis. *Gallia austr. et occid.*

crispus Lam. 27. A. caule tortuoso, ramis incurvis, foliis geminis linearibus, floribus solitariis. *Inf. Mascaren.*

1258. CONVALLARIA.

* *Corolla campanulata.*

majalis 1. C. scapo semitereti, foliis ovato-oblongis, floribus racemosis nutantibus. *Europa. Amer. bor.* (C. Mappi C. C. Gmel.)

** *Corolla infundibuliformi.*

verticillata 2. C. caule angulato, foliis lanceolatis verticillatis subtus glaucis, pedunculis axillaribus aggregatis sub-3floris nutantibus. *Prata alpestria. Saltus.*

cirrhifolia Wall. 3. C. caule scandente, foliis verticillatis linearibus revolutis apice subcirrhiferis, pedunculis axillaribus 3floris. *Nepal.*

oppositifolia Wall. 4. C. caule tereti, foliis petiolatis oppositis oblongis acutis glabris, pedunculis axillaribus multifloris nutantibus. *Nepal.*

Polygonatum 5. C. caule angulato, foliis alternis amplexicaulibus ovato-oblongis, pedunculis solitariis sub-1floris nutantibus. *Europ.*

pubescens W. 6. C. caule teretiusculo sulcato, foliis alternis amplexicaulibus ovatis subtus pubescentibus, pedunculis axillaribus sub-2floris. *Amer. bor.*

canaliculata W. 7. C. caule canaliculato, foliis alternis amplexicaulibus oblongis margine pubescentibus, pedunculis axillaribus 2floris. *Amer. bor.*

angustifolia * 8. C. caule tereti, foliis alternis sessilibus ellipticolanceolatis acutis sub-3nerviis glabris, pedunculis axillaribus elongatis sub-2floris. *America bor.* (C. biflora Walt. Polygonatum angustifolium Pursh.)

hirta Lam. 9. C. caule angulato hispido, foliis alternis subamplexicaulibus ovatis obtusiusculis, pedunculis axillaribus 3floris. *Amer. bor.*

10.

parviflora Poir. 10. C. caule angulato, foliis alternis ſeſſilibus ovato-oblongis glabris, pedunculis cernuis axillaribus 2floris. *Amer. bor.*

multiflora 11. C. caule tereti, foliis alternis ovato-oblongis amplexicaulibus glabris, pedunculis axillaribus nutantibus multifloris. *Europ. nemora.*

latifolia 12. C. caule angulato, foliis alternis ovato-oblongis acuminatis amplexicaulibus glabris, pedunculis axillaribus multifloris pubeſcentibus. *Auſtria. Hungar. Tauria. Amer. bor.*

polyanthema M. B. 13. C. caule tereti, foliis alternis elliptico-lanceolatis acutis ſubtus pubeſcentibus amplexicaulibus, pedunculis axillaribus multifloris. *Caucaſ.*

orientalis Desf. 14. C. caule ſubarcuato, foliis alternis ſubpetiolatis ovato-lanceolatis acutis, pedunculis axillaribus multifloris, limbo corollae patente. *Aſia minor.*

1259. SMILACINA Desf.

borealis Sims. 1. Sm. ſubcauleſcens, foliis elliptico-obovatis ciliatis, ſcapo pubeſcente, umbella corymboſa, pedicellis nudis nutantibus. *Amer. bor.* (Dracaena borealis Ait.)

umbellata Desf. 2. Sm. ſubcauleſcens, foliis oblongis ciliatis, ſcapo pubeſcente, umbella faſtigiata, pedicellis baſi bracteatis. *Amer. bor.* (Convallaria umbellata Mx.)

trifolia Desf. 3. Sm. caule alterne 3foliato pubeſcente, foliis oblongo-lanceolatis, racemo terminali laxo. *Sibir. orient. Amer. bor.* (Convallaria trifolia L.)

ſtellata Desf. 4. Sm. caule folioſo, foliis alternis amplexicaulibus oblongo-lanceolatis, racemo ſimplici terminali. *Amer. bor.* (Convallaria ſtellata L.)

ciliata Desf. 5. Sm. caule folioſo arcuato, foliis ſeſſilibus ovatis ciliatis, panicula terminali conferta, ſtaminibus corollam ſuperantibus. *Amer. bor.*

racemoſa Desf. 6. Sm. caule folioſo, foliis ſeſſilibus oblongis acuminatis pubeſcentibus, panicula racemoſa terminali, ſtaminibus corollam aequantibus. *America bor.*

1260. OPHIOPOGON Ker.

japonicus Ker. 1. O. foliis linearibus ſcapo ancipiti multo longioribus, floribus racemoſis ſecundis. *Japon.* (Convallaria japonica L. ſuppl. Thunb.)

ſpicatus Ker. 2. O. foliis linearibus carinatis ſcapum ſubangulatum aequantibus, floribus faſciculato-racemoſis. *Japon. Nepal. China. Cochinchina.* (Convallaria ſpicata Thunb. Liriope Lour.)

1261. LEDEBOURIA Roth.

hyacinthina Roth. *Ind. or.* Radix bulboſa, folia lanceolata glabra ſcapum pubeſcentem aequantia, flores racemoſi coeruleſcentes. (Erythronium indicum Rottl.)

1262. BURCHARDIA R. Br.

umbellata R. Br. *Nov. Holl.* Radix fasciculata, folia linearia, flores umbellati albi.

1263. SCHELHAMMERA R. Br.

undulata R. Br. 1. Sch. caule ramoso, foliis ovatis undulatis amplexicaulibus, floribus subsolitariis, petalorum unguibus foveolatis. *Nov. Holl.*

multiflora R. Br. 2. Sch. caule simplici flexuoso, foliis breviſſime petiolatis oblongis acuminatis, pedunculis aggregatis, fructiferis recurvis. *Nov. Holl.*

1264. UVULARIA.

perfoliata 1. U. foliis perfoliatis oblongis acutiusculis, corolla campanulata intus scabra, antheris cuspidatis. *Amer. bor.*

flava Sm. 2. U. foliis perfoliatis oblongis obtusis basi undulatis, corolla basi attenuata intus scabra, antheris cuspidatis. *Amer. bor.*

grandiflora Sm. 3. U. foliis perfoliatis oblongis acutis, corolla intus laevi, antheris obtusiusculis, nectariis subrotundis. *Amer. bor.* (U. lanceolata Ait.)

sessilifolia 4. U. caule glabriusculo superne diviso, foliis sessilibus lanceolatis subtus glaucescentibus, corollae laciniis intus laevibus, capsula stipitata. *America bor.*

puberula Mx. 5. U. caule pubescente, foliis subamplexicaulibus ovalibus utrinque concoloribus, corollae laciniis intus laevibus, capsula sessili. *Carolina.*

chinensis Ker. 6. U. caule angulato ramoso, foliis petiolatis ovato-lanceolatis, pedunculis subracemosis, corolla basi gibbosa, filamentis antheras superantibus. *China.*

parviflora Wall. 7. U. foliis petiolatis oblongo-lanceolatis acuminatis, pedunculis oppositifoliis elongatis apice bracteatis, floribus umbellatis. *Nepal.*

umbellata W. 8. U. foliis oblongis acutis subsessilibus, umbellis oppositifoliis pedunculatis bracteatis, pedicellis elongatis bracteatis. *Nepal.*

1265. STREPTOPUS Mx.

distortus Mx. 1. Str. foliis amplexicaulibus ovato-oblongis acuminatis glaberrimis, pedunculis solitariis medio geniculato-refractis. *Silesia. Helvetia. Hungar. Amer. bor. Grönland.* (Uvularia amplexifolia W.)

roseus Mx. 2. Str. foliis semiamplexicaulibus oblongis acuminato-cuspidatis ciliatis, pedunculis solitariis flexuosis. *Amer. bor.*

lanuginosus Mx. 3. Str. foliis sessilibus subcordatis acuminatis lanatis, pedunculis 2floris. *Amer. bor.*

1266. DRYMOPHILA R. Br.

cyanocarpa R. Br. *Terra Diemen.* Herba foliis diſtichis ſeſſilibus, floribus pedunculatis ſolitariis albis.

1267. PHILESIA Juſſ.

buxifolia W. *Ad fretum Magellan.* Frutex ramoſus foliis petiolatis ovatis, floribus pedunculatis bracteatis.

1268. CALLIXENE Juſſ.

marginata Lam. *Ad fretum Magellan.* Frutex ramoſus foliis ellipticis coriaceis ſeſſilibus, floribus terminalibus bracteatis. (Enargea Gärtn. W.)

1269. XEROPHYTA Juſſ.

pinifolia Lam. *Madagascar.* Frutex ramoſus ſquamatus, foliis faſciculatis linearibus acutis, floribus terminalibus pedunculatis.

1270. LAPAGERIA R. et P.

roſea R. et P. *Chili.* Frutex ſcandens, foliis oblongis coriaceis petiolatis, floribus roſeis ſolitariis pedunculatis.

1271. RIPOGONUM Forſt.

parviflorum R. Br. 1. R. caule inermi radicante, foliis oppoſitis ovato-lanceolatis, racemis compoſitis, ſtaminibus corollam ſuperantibus. *Nov. Zeeland.* (Ripogonum ſcandens Forſt. gen. Smilax Ripogonum Forſt. flor.)

album R. Br. 2. R. caule aculeato, ramulis inermibus, foliis alternis oppoſitisve, racemis ſimplicibus, ſtaminibus corollam aequantibus. *Nov. Holl.*

1272. SMILAX.

* *Caule aculeato,*

† *angulato,*

aſpera 1. Sm. foliis haſtato-cordatis lanceolatis 7-9nerviis aculeato-dentatis coriaceis, baccis rubris. *Europ. auſtr. Syria.*

nigra W. 2. Sm. caule ſubaculeato, foliis cordatis oblongis 7nerviis inermibus, baccis nigris. *Hiſpania. Luſitania.*

catalonica Poir. 3. Sm. foliis ample cordatis acutis 7nerviis coriaceis margine dentato-ſpinoſis, floribus racemoſis. *Catalonia.* (Sm. bermudenſis Duham.)

mauritanica Poir. 4. Sm. foliis cordato-lanceolatis luciuis coriaceis 7nerviis ſubinermibus, floribus racemoſis, baccis rubris. *Mauritania.* (Sm. excelſa Duham.)

excelsa — 5. Sm. foliis late cordatis sub-7nerviis obtusiusculis inermibus, baccis rubris. *Caucas. Asia min.*

dentata Humb. — 6. Sm. caule superne aculeato, foliis inferioribus ovatis mucronatis 5nerviis subdentatis superioribus oblongis mucronatis 3nerviis aculeato-dentatis. *Cuba.*

spinosa Poir. — 7. Sm. foliis lanceolatis margine sinuatis dentato-spinosis, floribus umbellatis. *Ind. or.*

horrida Desf. — 8. Sm. aculeis caulinis confertis rectis inaequalibus, foliis ovato-oblongis sub-3lobis 5nerviis inermibus, floribus umbellatis. *Amer. bor.*

papyracea Duham. — 9. Sm. foliis ovato-lanceolatis 3nerviis venoso-reticulatis inermibus membranaceis. *Cayenn.*

zeylanica — 10. Sm. caule sub-4gono, foliis cordato-oblongis 3-5nerviis inermibus coriaceis, petiolis 2dentatis, floribus fasciculato-umbellatis, baccis mucronatis flavis. *Ind. or. Ceylon. Inf. Molucc.*

† *officinalis* Kunth. — 11. Sm. foliis cordato-oblongis acutis coriaceis 5-7nerviis venoso-reticulatis. *Nov. Granat.*

quadrangularis Mühl. W. — 12. Sm. caule 4gono superne inermi, foliis ovatis acutis 5nerviis reticulatis, baccis nigris. *Amer. bor.* (Sm. virginiana Mill.)

longifolia Rich. — 13. Sm. caule 4gono, foliis subhastato-oblongis obtusis mucronatis sub-7nerviis. *Cayenn.*

Sarsaparila — 14. Sm. caule sub-4gono, aculeis incurvis, foliis ovato-lanceolatis cuspidatis inermibus sub-5nerviis subtus glaucescentibus. *Virginia.*

obliquata Poir. — 15. Sm. caule sub-4gono, aculeis sparsis recurvis, foliis oblique 3angularibus lanceolatis acuminatis 3-5nerviis inermibus. *Peru.*

maypurensis Humb. — 16. Sm. caule 4gono, aculeis sparsis uncinatis, foliis ovato-lanceolatis recurvato-acuminatis sub-5nerviis, nervo medio aculeato. *Ad Orinocum.*

oblongata Sw. — 17. Sm. foliis oblongis acuminatis 3nerviis rigidis integerrimis, nervo medio subtus aculeato, baccis nigro-coeruleis. *Inf. Carib.*

brasilienſis * — 18. Sm. aculeis caulinis raris, foliis subellipticis basi attenuatis mucronatis sub-5nerviis, nervis tribus mediis subtus aculeatis, baccis nigris. *Brasil.* Sello.

cercidifolia Pursh. — 19. Sm. foliis orbiculato-cordatis acuminatis 5nerviis reticulato-venosis. *Carolin. austr.*

cordifolia Humb. — 20. Sm. aculeis caulinis raris minutis, foliis ample et profunde cordatis acutis sub-5nerviis nitidis integerrimis subsessilibus. *Nov. Hispan. Guadalupa.*

perfoliata Lour. — 21. Sm. foliis subcordato-ovatis recurvato-acuminatis 5nerviis petiolatis, stipulis cordatis perfoliatis. *Cochinchina.*

pandurata Pursh. — 22. Sm. foliis ovato-panduraeformibus acuminatis 3nerviis lucidis, pedunculis elongatis. *America bor.*

hastata W. — 23. Sm. aculeis caulinis raris, foliis auriculato-hastatis lanceolatis 3nerviis margine aculeato-ciliatis. *Carolin. austr. Florida.* (Sm. Bona nox Mx.)

lanceolata Walt. 24. Sm. foliis anguſte lanceolatis elongatis ſub-3nerviis lucidis integerrimis, baccis rubris. *Amer. boreal.*

lappacea Humb. 25. Sm. aculeis caulinis validis ſubuncinatis confertis, foliis ovato-lanceolatis mucronatis 3nerviis margine nervoque medio ſubtus aculeato-dentatis. *Caracas.*

†† *Caule tereti.*

China 26. Sm. caule teretiusculo, aculeis caulinis ſparſis abbreviatis, foliis cordato-oblongis mucronatis 5nerviis coriaceis venoſo-reticulatis, petiolis 2dentatis, baccis rubris. *China. Cochinchina. Japon.*

cordato-ovata Rich. 27. Sm. caule tereti, foliis cordato-ovatis 5nerviis, umbellis racemoſis. *Cayenn.*

Walteri Pursh. 28. Sm. foliis cordato-ovatis 3nerviis laevibus, baccis acuminatis rubris. *Virgin. Carolina.*

acuminata W. 29. Sm. aculeis caulinis validiſſimis dilatatis recurvis, foliis ſubrotundo-cordatis acuminatis 7-9-nerviis. *Ind. occ.*

glauca Walt. 30. Sm. aculeis caulinis ſparſis, foliis ſubcordato-ovatis acutis ſub-5nerviis ſubtus glaucis, pedunculis ſubumbellatis 2floris. *Carolina.*

auſtralis R. Br. 31. Sm. foliis oblongis acutis 5nerviis glabris integerrimis, petiolis cirrhiferis. *Nov. Holl.*

ſubſeſſiliflora Mx. 32. Sm. aculeis caulinis validis, foliis amplis ovatis obtuſis 3nerviis, umbellis ſeſſilibus. *Braſil.*

rotundifolia 33. Sm. aculeis caulinis ſparſis rectis, foliis ſubcordato-ovatis acuminatis membranaceis 5nerviis, baccis ſphacricis. *Amer. bor.*

cuſpidata Mx. 34. Sm. aculeis caulinis abbreviatis recurvis, foliis oblongo-lanceolatis 5nerviis acutis integerrimis, baccis mucronatis. *Ind. occ. Amer. auſtr.*

laurifolia 35. Sm. ramis inermibus, foliis craſſe coriaceis elliptico-oblongis obtuſis recurvato-mucronatis obſolete 3nerviis, baccis nigris. *Virgin. Carolin.*

ovata Pursh. 36. Sm. ramis inermibus, foliis ovatis acutis cuſpidatis 3nerviis, umbellis breviter pedunculatis, baccis nigris. *Georgia.*

alba Pursh. 37. Sm. ramis inermibus, foliis lanceolatis elongatis coriaceis 3nerviis, umbellis breviſſime pedunculatis, baccis albis. *Carolina.*

ſyphilitica Humb. 38. Sm. aculeis caulinis raris validis, foliis oblongo-lanceolatis cuſpidatis coriaceis 3nerviis. *Amer. auſtr.*

tamnoides 39. Sm. caule herbaceo, foliis longe petiolatis ſubcordato-3angularibus obtuſis 5nerviis, baccis nigris. *Amer. bor.* (Sm. tamnifolia Mx.)

caduca 40. Sm. aculeis caulinis ſparſis rectis, foliis ovatis mucronatis ſub-5nerviis membranaceis, pedunculis paucifloris. *Amer. bor.*

havanenſis Jacq. 41. Sm. caule herbaceo, foliis ſubrotundis emarginatis mucronatis 5nerviis margine dentato-ſpinoſis, petiolis aculeatis. *Cuba.*

subaculeata * 42. Sm. aculeis caulinis raris, ramis flexuosis divaricatis, foliis ovato-oblongis obtusis mucronatis 5nerviis membranaceis integerrimis, umbellis multifloris. *Jamaica.*

** *Caule inermi,*

† *angulato.*

Bona nox 43. Sm. foliis cordato-ovatis acutis 7nerviis aculeato-ciliatis. *Carolina.* (Sm. variegata Walt.)

† *tetragona* L. suppl. 44. Sm. caule 4gono, foliis cordatis 5nerviis acuminatis integerrimis. *Patria?*

anceps W. 45. Sm. caule ancipiti, foliis subcordato-ovatis acuminatis triplinerviis coriaceis, umbellis multifloris. *Inf. Mascaren.*

Alpini W. 46. Sm. foliis basi truncatis panduraeformibus cuspidatis subcoriaceis nitidis 3nerviis subciliatis, umbellis paucifloris. *Graecia.*

latifolia R. Br. 47. Sm. foliis subcordato-ovatis obtusis 5nerviis glabris. *Noc. Holl.*

domingensis W. 48. Sm. foliis oblongis acutis basi subattenuatis coriaceis opacis 3nerviis integerrimis, umbellis sessilibus. *Hispaniola.*

cumanensis Humb. 49. Sm. foliis oblongis acutis cuspidatis membranaceo-subpellucidis 3nerviis reticulatis, baccis scabris acutis rufis. *Cumana. Jamaica.*

scabriuscula Humb. 50. Sm. caule ramisque scabris, foliis ovato-oblongis sub-5nerviis acutis glabris. *Hispaniol. Amer. austr.* (Sm. viscifolia Mx.)

decipiens * 51. Sm. foliis cordatis acuminatis 9nerviis submembranaceis, floribus spicatis androgynis, baccis globis. *Ind. or.*

herbacea 52. Sm. caule herbaceo, foliis ovatis acuminatis 7nerviis, pedunculis compressis elongatis, baccis depresso-globosis. *Amer. bor.*

†† *Caule tereti.*

aristolochiaefolia W. 53. Sm. foliis auriculato-cordatis lanceolatis acuminatis 9nerviis. *Hispaniola.*

peduncularis Mühl. W. 54. Sm. caule herbaceo, foliis cordato-subrotundis acuminatis 9nerviis, umbellis longissime pedunculatis. *Amer. bor.* (Sm. humilis Mill., pulverulenta Mx.)

globifera Meyer. 55. Sm. caule fruticoso, foliis oblongo-lanceolatis coriaceis triplinerviis, umbellis capitatis. *Surinam.*

Berterii * 56. Sm. foliis late ovatis oblique acuminatis subtriplinerviis venoso-reticulatis, umbellis sessilibus. *Hispaniola.* Bertero.

macrophylla W. 57. Sm. foliis profunde cordatis obtusis sub-5nerviis. *Ind. occ.* (Sm. megalophylla Mx.)

Pseudochina 58. Sm. foliis membranaceis, caulinis cordatis, rameis ovato-oblongis 5nerviis. *Virgin. Jamaic.* (Sm. canellaefolia Mill.)

glycyphylla Sw. 59. Sm. foliis oblongo-lanceolatis acutis 3nerviis glabris subtus glaucis. *Nov. Holl.*

canariensis W. 60. Sm. foliis ovato-oblongis acuminatis 5nerviis, petiolis dilatatis canaliculatis. *Teneriffa.*

coriacea * 61. Sm. foliis subcordato-oblongis acutiusculis coriaceis subtriplinerviis utrinque glabris. *Hispaniola.*

elliptica R. Br. 62. Sm. foliis elliptico-ovatis utrinque attenuatis 5nerviis. *Nov. Holl.*

purpurata Forst. 63. Sm. foliis ovato-oblongis recurvato-acutis 3-5plinerviis subtus glaucis coriaceis. *Nov. Caledon.*

obliqua * 64. Sm. caule pubescente, foliis oblongis obliquis acutis 5nerviis, spicis compositis elongatis. *Ind. orient.*

triplinervia Humb. 65. Sm. caule pubescente, foliis cordato-lanceolatis acutis triplinerviis nitidis, nervis subtus pubescentibus. *Ad Orinocum.*

puber Mx. 66. Sm. caule foliisque cordato-oblongis acutis 5nerviis subtus pubescentibus, baccis oblongis acutis rubris. *Carolina. Georgia.*

mollis Humb. 67. Sm. caule foliisque subcordato-oblongis acuminatis 5nerviis subtus villosiusculis, baccis globosis. *Mexico.*

tomentosa Humb. 68. Sm. caule pubescente, foliis cordato-ovatis acuminatis 7nerviis supra pubescentibus subtus ferrugineo-tomentosis. *Nov. Granat.*

1273. ONCUS Lour.

esculentus Lour. *Cochinchina.* Frutex scandens, foliis cordatis acuminatis, floribus spicatis terminalibus.

1274. PELIOSANTHES Andr.

Teta Andr. 1. P. foliis oblongis nervoso-plicatis scapo racemoso brevioribus, corollae laciniis subrotundis marginatis. *Ind. or.*

humilis Sims. 2. P. foliis elliptico-lanceolatis nervoso-plicatis scapo longioribus, corollae laciniis ovato-lanceolatis margine hyalinis. *Peninsul. Malacca.*

1275. JUNCUS.

* *Culmo unifloro.*

magellanicus Lam. 1. J. radice fibrosa, foliis planiusculis subcarinatis culmum angulatum superantibus, flore laterali, capsula sphaerica, placentis futuralibus. *Ad fretum Magellan.* (Rostcovia sphaerocarpa Desv.)

grandiflorus Forst. 2. J. radice repente, culmo aphyllo basi squamato tereti; flore terminali maximo, capsula 3angulari, seminibus utrinque appendiculatis. *Ad fre-*

tum Magellan. (Marsippospermum calyculatum Desv.)

** *Culmo 2–3floro: seminibus utrinque appendiculatis.*

trifidus 3. J. radice repente, culmo filiformi nudiusculo, foliis floralibus ternis canaliculatis elongatis, vaginis ciliato-laceris, floribus solitariis vel ternis pedunculatis. *Alp. Europ.*

stygius 4. J. culmo filiformi foliato, foliis setaceis laxis, floribus ternis bracteas subaequantibus, petalis inaequalibus, capsulis pyramidatis flore longioribus. *Scandinavia arctica. Islandia.*

biglumis 5. J. culmo tereti basi foliato, foliis semiteretibus subulatis strictis, bracteis binis scariosis, altera flores subbinos secundos superante, capsula pyramidata obtusa florem excedente. *Scandinavia. Scotia.*

triglumis 6. J. culmo tereti basi foliato, foliis semiteretibus strictis, floribus ternis quinisve bracteas obtusiusculas aequantibus, capsula obtusa florem obtusiusculum excedente. *Sudetes. Alp. Austr. Helvet. et boreal.*

subtilis Meyer. 7. J. culmo capillari nodoso flexuoso repente foliato, foliis capillaceis subnodulosis vaginantibus, floribus terminalibus subternis nutantibus, sepalis obtusiusculis. *Fluvii Amer. bor.* (J. fluitans Mx.)

*** *Glomeruli capitati.*

† *Seminibus utrinque appendiculatis.*

castaneus Sm. 8. J. culmo tereti foliato, foliis strictis canaliculatis, capitulis binis submultifloris bracteas aequantibus, capsulis prismaticis obtusis flore longioribus. *Alp. Europ. med. et bor. Sibir.* (J. triceps W. Rostc.)

Jacquini 9. J. culmo tereti basi vaginato superne 1folio, folio canaliculato capitulum terminale multiflorum superante, bracteis flore acuto brevioribus, capsula prismatica obtusa. *Alp. Europ. med.* (J. atratus Lam. biglumis Jacq.)

†† *Seminibus excappendiculatis.*

a. *Triandri.*

capitatus Weig. 10. J. culmo aphyllo filiformi, foliis radicalibus lineari-setaceis, glomerulis paucis sub-5floris, folio florali filiformi elongato, sepalis acuminatis capsulam excedentibus. *Europ.* (J. ericetorum Pall., gracilis Roth., mutabilis Cav.)

pygmaeus Thuill. 11. J. culmo filiformi superne diviso, foliis subsetaceis, glomerulis sub-4floris ternis subumbellatis, involucro diphyllo herbaceo elongato, floribus prismaticis capsulam pyramidatam superantibus. *Gallia.* (J. mutabilis Lam.?)

repens Mx. 12. J. culmo repente foliato, foliis linearibus, glomerulis ſubternis ſeſſilibus pedunculatisque paucifloris, ſepalis linearibus elongatis ſubulatis capſula prismatica longioribus, placenta centrali 3alata. *Carolina.* (Cephaloxys flabellata Desv.)

prismatocarpus R. Br. 13. J. culmo compreſſo, foliis alternis verticalibus, glomerulis multifloris cymoſis nudis, capſula prismatica ſepalis ſubulatis longiore. *Nov. Holl.*

planifolius R. Br. 14. J. culmo ſubaphyllo, foliis radicalibus linearibus, glomerulis cymoſis involucratis, capſula triquetra mucronata florem acutum ſubaequante. *Nov. Holl. Terra Diemen.*

valvatus Link. 15. J. culmo foliato aſcendente, foliis ſubcompreſſis noduloſis, glomerulis multifloris compactis, bracteis ariſtatis, ſepalis ſubulatis rigidis capſulam acutam aequantibus. *Luſitania.* (J. echinuloides Brot.)

polycephalus Mx. 16. J. culmo foliato tereti ſtricto, foliis teretiuſculis noduloſis, glomerulis ſubternis pedunculatis 9floris, ſepalis ariſtatis capſulam mucronatam aequantibus. *Amer. bor.* (J. echinatus Mühl.)

uliginoſus Roth. 17. J. culmo filiformi foliato baſi radicante, foliis ſetaceis ſubnoduloſis, glomerulis paucifloris ſubcorymboſis, capſula obtuſa ſepala acuta excedente. *Europ. Amer. bor.* (J. bulboſus L., ſubverticillatus Wulff., verticillatus Perſ., ſtolonifer Wohll., ſupinus Mönch., fluitans Lam., ſetifolius Ehrh.)

marginatus W. Roſtc. 18. J. culmo compreſſo foliato, foliis planiuſculis 3nerviis, glomerulis ſub-10floris ſubpaniculatis, ſepalis obtuſis capſulam obovatam aequantibus. *Penſylvan.*

β. Hexandri.

αα. Culmo aphyllo.

filiformis 19. J. culmo filiformi baſi vaginato, glomerulo laterali paucifloro, ſepalis acutis capſulam ſubgloboſam aequantibus. *Europ.*

arcticus W. 20. J. culmo rigido tereti, glomerulo laterali ſubmultifloro, ſepalis lanceolatis capſula obtuſa brevioribus. *Alp. pennin. cott. Lapponia. Island.* (J. Jacquini L. lapp.)

ββ. Foliis teretibus noduloſis.

punctorius Thb. 26. J. culmo elongato rigido foliato, folio florali revoluto, involucris bracteisque ſubſcarioſis, glomerulis ſubmultifloris ſubcorymboſis, ſepalis ſubulatis capſula globoſa longioribus. *C. B. S.*

Holoſchoenus R. Br. 22. J. culmo 1folio tereti, glomerulis multifloris cymoſis, ſepalis acutis capſulam prismaticam aequantibus. *Nov. Holl.*

nodoſus Mühl. 23. J. culmo tereti fiſtuloſo foliato, glomerulis paucis globoſo-capitatis multifloris, ſepalis ſubulatis rigidis capſulam triquetram acuminatam

aequantibus. *Penſylvan. Carolin. Nov. Hiſpan.* (J. Roſtcovii Meyer. ſcirpoides Lam.)

ſtriatus Schousb. 24. J. culmo foliato, vaginis ſtriatis, glomerulis capitatis ſubcymoſis, ſepalis acuminatis capſulam 3quetram acuminatam ſuperantibus. *Numidia.* (J. ſtellatus Desv. in W. herb.)

faſciculatus Schousb. 25. J. culmo ſtriato 1folio foliisque noduloſis compreſſis ſtrictis, glomerulis capitatis, ſepalis ſubulatis capſulam longe excedentibus. *Numidia.*

† *ebracteatus* Meyer. 26. J. culmo filiformi, glomerulis ebracteatis ſubcymoſis; ſepalis cuſpidatis capſula acuminata brevioribus. *Nov. Hiſpan.*

denſiflorus Humb. 27. J. culmo foliato, foliis teretibus noduloſis culmo brevioribus, glomerulis multifloris capitato-congeſtis involucratis, ſepalis acuminato-ſubulatis capſula obovata mucronata longioribus. *Amer. auſtr.* (J. cyperinus W. herb.)

γγ. *Foliis planis.*

cephalotes Thb. 28. J. culmo tereti aphyllo, foliis radicalibus ſubenſiformibus ſubmarginatis, glomerulis capitatis, bracteis ſepalisque cuſpidatis capſulam ovatam ſuperantibus. *C. B. S.* (J. lomatophyllus *.)

capenſis Thb. 29. J. culmo ſubangulato aphyllo, foliis linearibus canaliculatis, glomerulis ſubcymoſis, ſepalis cuſpidatis capſulam ovatam aequantibus. *C. B. S.* (J. cymoſus Lam.)

**** *Flores cymoſo-paniculati.*

† *Triandri.*

palleſcens Lam. 30. J. culmo foliato, foliis teretiusculis nodoſis, panicula erecta elongata, pedunculis baſi bracteatis, floribus aggregatis ſeſſilibus, ſepalis acuminatis capſula acuta brevioribus. *Amer. bor.* (J. acuminatis Mx., ſylvaticus Mühl.)

Mühlenbergii * 31. J. culmo foliato foliisque lineari-compreſſis nodoſis, paniculae ramis divaricatis, floribus geminis ſeſſilibus, ſepalis lanceolatis obtuſiusculis capſula triquetra mucronata brevioribus. *Nov. Caeſar.* (J. n. 16. Mühl. ?)

† *biflorus* Ell. 32. J. radice ſubtuberoſa, caule tereti foliato, foliis linearibus planis rigidis, floribus geminis laxe paniculatis, capſula obovata ſepalis lanceolatis breviore. *Carolina auſtr.*

ariſtulatus Mx. 33. J. radice ſubtuberoſa, culmo compreſſo foliato, foliis linearibus ſuperioribus canaliculatis, floribus aggregatis paniculatis, ſepalis ariſtatis capſulam obtuſam aequantibus. *Amer. bor.* (J. ariſtatus Perſ. marginatus Mühl.)

†† *Hexandri.*

α. *Culmo aphyllo.*

effuſus 34. J. culmo tereti laevi viridi ſtricto farcto, paniculą laterali patente, floribus ſub-3andris,

capſula obovata ſepalis acutis breviore. *Europ. Aſia. Amer. bor. et auſtr.* (J. conglomeratus L., glomeratus Thb., bogotenſis Humb. varr.)

glaucus Ehrh. 35. J. culmo tereti ſtriato glauco, diſſepimentis medullae transverſis, panicula laterali patente, floribus 6andris, capſula obtuſa mucronata ſepala aequante. *Europ. Aſia. Amer.* (J. diaphramarius Brot.)

balticus Dethard. 36. J. culmo tereti ſtricto rigido, panicula laterali patula ſub-3fida, ſepalis lanceolatis acutis capſulam obtuſam mucronatam ſuperantibus. *Litora maris baltici.* (J. helodes Link.)

compreſſus Humb. 37. J. culmo compreſſo erecto, corymbo laterali, floribus breviter pedicellatis ſubſecundis, ſepalis acuminatis capſulam ſuperantibus. *Nov. Hiſpan.* (J. mexicanus W. herb.)

vaginatus R. Br. 38. J. culmo tereti baſi vaginato, panicula laterali ſubumbellata, umbellis compoſitis, floribus aggregatis, capſula obtuſa ſepala acuta aequantibus. *Nov. Holl.*

pallidus R. Br. 39. J. culmo tereti, panicula laterali, ramis inaequalibus diviſis, ramulis congeſtis, floribus alternis imbricatis, capſulis ovalibus ſepala acuta ſubſuperantibus. *Nov. Holl.*

canarienſis W. herb. 40. J. culmo tereti ſtricto, panicula laterali ſupradecompoſita corymboſa laxa, pedicellis capillaribus, ſepalis acuminatis capſula obovata longioribus. *Inſ. Canar.*

pauciflorus R. Br. 41. J. culmo filiformi baſi vaginato, panicula laterali pauciflora, capſulis obtuſis ſepala acuta excedentibus. *Nov. Holl. Terra Diemen.*

† *rubens* Lam. 42. J. culmo tereti baſi vaginato, floribus geminis cymoſis involucratis terminalibus. *Monte Video.*

β. Foliis teretibus.

capillaceus Lam. 43. J. culmo ſtriato ſetaceo 1folio, cyma breviſſima, capſula truncata tuberculata ſepala acuta ſuperante. *Monte Video.*

ſetaceus W. 44. J. culmo filiformi nutante, foliis caulinis ſetaceis laevibus, cyma laterali ſimplici, bracteis ſubternis, ſepalis interioribus obtuſiusculis capſulam obovatam mucronatam ſuperantibus. *Amer. boreal.*

multiflorus Desf. 45. J. culmo tereti foliato ſtricto, foliis compreſſo-teretiusculis, panicula terminali erecta multiflora decompoſita, floribus ſolitariis ſecundis, ſepalis acutis patulis capſulam obtuſam aequantibus. *Afric. bor.*

acutiflorus Ehrh. 46. J. culmo foliato ſubaſcendente, foliis teretiuſculis compreſſis noduloſis ſtrictis, panicula patente decompoſita, floribus ſubaggregatis, ſepalis acutis capſulam aequantibus. *Europ.* (J. articulatus α, L., aquaticus et ſylvaticus Roth., aſcendens Hoſt., atratus Beſſ.)

lampocarpus Ehrh. Dav. 47. J. culmo foliato foliisque noduloſis, panicula decompoſita erecta, floribus aggregatis, capſula

nitida mucronata ſepala interna obtuſiuscula ſuperantibus. *Europ. prata.* (J. articulatus L.)

obtuſiflorus Ehrh. 48. J. culmo foliato foliisque nodulosis ſtrictis, paniculae decompoſitae ramis divaricatis, floribus aggregatis, ſepalis obtuſis capſulam acutam aequantibus. *Europ.* (J. articulatus *β.* L., retroflexus Rafin.)

fuſco-ater Schreb. 49. J. culmo foliato foliisque tereti-compreſſis nodulosis ſtrictis, panicula erecta patente, ſepalis obtuſis capſula obtuſa mucronata brevioribus. *German. Scotia?* (J. uſtulatus Hopp. polycephalus Hook. *?*)

microcephalus Humb. 50. J. culmo foliato, foliis teretibus nodulosis, corymbo terminali involucrato, floribus aggregatis, ſepalis cuſpidatis capſula obtuſa longioribus. *Nov. Granat.* (J. floribundus Kunth. dichotomus W. herb.)

acutus 51. J. culmo foliato, foliis teretibus enodibus floralibus pungentibus, panicula compacta erecta, ſepalis obtuſiusculis capſula ovata acuta dimidio brevioribus, ſeminibus utrinque appendiculatis. *Anglia. Europ. auſtr. Amer. bor.*

maritimus Lam. 52. J. culmo foliato, foliis teretibus enodibus, floralibus pungentibus, panicula ſupradecompoſita patente erecta, ſepalis acutis capſulam obtuſam mucronatam aequantibus, ſeminibus utrinque appendiculatis. *Anglia. Europ. auſtr. Afric. et Amer. bor.* (J. rigidus Desf.)

γ. Foliis canaliculatis aut planiusculis.

ſquarroſus 53. J. culmo ſtricto ſubangulato aphyllo, foliis radicalibus linearibus anguſtiſſimis ſtrictis, panicula erecta ſimplici, ſepalis acutis capſulam obtuſam aequantibus. *Europ.*

bulboſus 54. J. culmo foliato compreſſo, foliis linearibus canaliculatis, panicula erecta decompoſita, ſepalis obtuſiusculis capſula oblonga obtuſa brevioribus. *Europ.* (J. compreſſus Jacq.)

botnicus Wahlb. 55. J. culmo foliato tereti, foliis linearibus canaliculatis, panicula erecta decompoſita, ſepalis obtuſiusculis capſulam oblongam mucronatam aequantibus. *German. Europ. bor. ſalſa loca.* (J. coenoſus Bicheno.)

Tenageia Ehrh. 56. J. annuus, culmo ſubramoſo foliato gracili, foliis anguſtiſſimis planiusculis abbreviatis, paniculae ramis elongatis, floribus remotis, ſepalis ovatis acutis capſulam ſubgloboſam aequantibus. *Europ. med. et bor.*

gracilis R. Br. 57. J. culmo repente gracili foliato, foliis ſubſetaceis, umbella ſimpliciuscula terminali, floribus aggregatis. *Nov. Holl.*

revolutus R. Br. 58. J. radice repente, culmo compreſſiusculo baſi foliato, foliis anguſtiſſimis margine revolutis, corymbo terminali paucifloro, ſepalis acutis capſulam depreſſam oblongam aequantibus. *Terra Diemen.*

bufonius 59. J. annuus, culmo ſubramoſo, foliis linearibus canaliculatis, panicula dichotoma decompoſita, floribus ſolitariis, ſepalis acuminatis capſulam obtuſam ſuperantibus. *Per omnem terrarum orbem.* (J. parviflorus Poir., prolifer Kunth., plebejus R. Br.)

folioſus Desf. 60. J. culmo ramoſo folioſo, foliis linearibus canaliculatis, panicula erecta, floribus ſolitariis, ſepalis ſubulatis. *Numidia.*

tenuis W. 61. J. culmo teretiusculo folioſo, foliis linearibus canaliculatis, floralibus elongatis, corymbo terminali compoſito, ſepalis acuminatis 2nerviis capſulam obtuſam ſuperantibus. *Amer. bor. et auſtr.* (J. 2cornis Mx. dichotomus Ell. ariſtatus Link.)

Gesneri Sm. 62. J. culmo ſuperne 3gono, foliis linearibus canaliculatis, panicula racemoſa foliis floralibus breviore, ſepalis lanceolatis 3nerviis capſulam ovalem excedentibus. *Scotia.* (J. gracilis Engl. bot. tenuis Hook.)

platycaulos Kunth. 63. J. culmo compreſſo foliato, foliis canaliculatis, cyma terminali congeſta involucrata, ſepalis acuminatis capſulam obtuſam ſuperantibus. *Amer. auſtr.* Humb. (J. coarctatus W. herb.)

xiphioides E. Meyer. 64. J. caule ancipiti foliato nodoſo, foliis enſiformibus vaginantibus, panicula ſupradecompoſita, floribus aggregatis bracteatis, ſepalis acuminatis capſulam acutam aequantibus. *Nov. Hiſpan.* Hänke. *Inſ. Aleut.* (J. enſifolius Wikſtröm. iridifolius W. herb.)

ferratus Thb. 65. J. culmo 3gono craſſo foliato, foliis enſiformibus ſerratis, panicula ſupradecompoſita erecta, ampliſſima, vaginis perfoliatis, capſulae 3quetro-depreſſae ſepalis multo brevioris diſſepimentis verſus ambitum duplicatis. *C. B. S.* (Acorus Palmita Lichtenſt.)

1276. LUZULA Cand.

* *Floribus corymboſis, pedunculis ſubunifloris.*

vernalis Cand. 1. L. foliis lanceolatis piloſis, corymbo ſubſimplici, pedunculis 1floris nutantibus, ſepalis acutis capſula obtuſa brevioribus. *Europ.* (Juncus piloſus L., luzulinus Vill., vernalis Hofm.)

flaveſcens Gaud. 2. L. foliis lineari-lanceolatis ſubpiloſis, corymbo erecto ſubcompoſito, pedunculis lateralibus nutantibus, capſula acuminata ſepala acuta aequante. *Europ. med. ſubalpina.* (Juncus flaveſcens Hoſt. L. Hoſtii Desv.)

Forſteri Gaud. 3. L. foliis linearibus ſubpiloſis, corymbo compoſito, pedunculis omnibus erectis, ſepalis acuminatis capſula depreſſa mucronata longioribus. *Anglia. Gallia. Helvetia.* (Juncus Forſteri Sm.)

parviflora Desv. 4. L. foliis lanceolatis culmoque glaberrimis, vaginarum oris piloſiusculis, paniculae cymoſae

decompositae ramis capillaribus inaequalibus, capsulis oblongis sepala acuta aequantibus. *Suecia bor. Sibir.* (J. parviflorus Ehrh. Retz.)

glabrata **Desv.** 5. L. foliis lanceolatis submarginatis culmoque glaberrimis, corymbo composito divaricato, bracteis scariosis ciliatis, capsula inclusa. *Alp. noric. rhaet. et dinar.* (Juncus glabratus Hopp. intermedius Host.)

gigantea **Desv.** 6. L. foliis lanceolatis acuminatis margine scabris, paniculae secundae ramis dichotomis nutantibus, bracteis ciliatis, sepalis cuspidatis capsula mucronata longioribus. *Nov. Granat.*

melanocarpa **Desv.** 7. L. foliis lanceolatis glabris, corymbi decompositi pedunculis elongatis subtrifloris, sepalis ovatis capsula nitida obtusa brevioribus. *Canada.* (Juncus melanocarpus Mx.)

† ***juncoides*** **Poir.** 8. L. culmo rigido, foliis lanceolatis glabris basi subbulbosis, corymbo decomposito, pedunculis sub-1floris, floribus acutiusculis 3andris. *Carolina.* Bosc.

** *Corymbo paniculato, floribus congestis.*

albida **Cand.** 9. L. foliis lineari-lanceolatis margine vaginarumque oris pilosis, corymbo patulo foliis summis breviori, pedunculis sub-4floris, sepalis lanceolatis capsula longioribus. *Europ. sylvae.* (Juncus pilosus ε. L., albidus Hofm., niveus Leers, nemorosus Poll., leucophobus Ehrh., luzuloides Lam.)

lutea **Cand.** 10. L. foliis lanceolatis rigidis glabris, summis abbreviatis, corymbo conferto, pedunculis 4floris, bracteis glaberrimis, sepalis obtusis mucronatis capsula longioribus. *Alp. rhaet. pennin. Montes Gebennici et Pyren.* (Juncus luteus All. Vill. campestris ε. L.)

spadicea **Cand.** 11. L. foliis lineari-lanceolatis elongatis margine vaginarumque oris pilosiusculis, corymbi pedunculis divaricatis 4floris, bracteis ciliatis, sepalis mucronatis capsula obtusa subbrevioribus. *Alp. graj. pennin. cott. jul. rhaet. noric. et dinar.* (Juncus spadiceus All. Vill., pilosus β. L.)

brevifolia **Desv.** 12. L. foliis linearibus canaliculatis pilosis, summis abbreviatis, corymbo conferto, pedunculis sub-10floris, sepalis obtusiusculis. *Lusitan.* (Juncus brevifolius et lacteus Link., stoechadanthus Brot.)

nivea **Cand.** 13. L. foliis lineari-lanceolatis hirsutis, floralibus elongatis angustissimis, corymbo erecto, bracteis ciliatis, sepalis lanceolatis, internis longioribus capsulam mucronatam longe superantibus. *Alp. Europ. med.* (Juncus niveus L.)

maxima **Cand.** 14. L. foliis lato-lanceolatis margine pilosis, summis abbreviatis obtusiusculis, corymbi supradecompositi pedunculis flaccidis divaricatis 3floris, sepalis aristatis capsulam acutam aequantibus. *Europ. med. et bor. subalpina.* (Juncus maximus

Retz., ſylvaticus Curt., montanus *α*. Lam., piloſus *δ*. L.)

paniculata Desv. 15. L. foliis latiſſimis, panicula erecta elongata, bracteis foliaceis, pedunculis ſub-4floris. *Amer. auſtr.*

arcuata Sw. 16. L. foliis linearibus canaliculatis glabris, vaginis barbatis, corymbi ſimpliciuſculi pedunculis recurvis ſub-4floris, bracteis fimbriatis, ſepalis acuminatis capſula oblonga longioribus. *Lappon. Scotia.* (Juncus arcuatus Wahlb.)

anguſtifolia Poir. 17. L. foliis anguſtiſſimis glaberrimis, corymbi ſimpliciuſculi pedunculis erectis 3floris, bracteis ſetaceis, ſepalis obtuſis capſulam ſubaequantibus. *Carolin.* Boſc.

† *canarienſis* Poir. 18. L. foliis lato-lanceolatis glabris, vaginarum ore piloſo, corymbo glomerato, ſepalis acuminatis lucidis aequalibus. *Inſ. Canar.* Brouſſonet.

**** Floribus ſubſpicato-glomeratis.*

ſpicata Cand. 19. L. foliis linearibus glabriuſculis, vaginarum ore piloſo, ſpica glomerato-racemoſa baſi diviſa nutante, bracteis ariſtatis prominulis, capſula obtuſiſſima ſepala mucronata aequante. *Alp. Europ. med.* (Juncus ſpicatus All.)

pediformis Cand. 20. L. foliis linearibus carinatis ſupra piloſis, ſpica racemoſa flexuoſa cernua, bracteis acutis flores aequantibus, ſepalis acuminatis capſulam acutam ſuperantibus. *Alp. Vocontior. graj.* (Juncus pediformis Vill.)

congeſta Lejeun. 21. L. foliis linearibus piloſis, ſpicis glomerato-capitatis, ſepalis cuſpidatis capſulam obtuſam ſuperantibus. *Sleſvic. Gallia.* (Juncus congeſtus Thuill.)

ſudetica Cand. 22. L. foliis linearibus margine piloſiuſculis, glomerulis racemoſo-ſpicatis nutantibus, bracteis elongatis, ſepalis mucronatis capſulam aequantibus. *Sudet. Alp. noric.* (L. nigricans Desv. Juncus ſudeticus W.)

nivalis Laeſtad. 23. L. radice fibroſa, foliis linearibus glabris, ſpicis ſubracemoſo-glomeratis abbreviatis, bracteis fimbriato-ciliatis, capſula obtuſiſſima ſepala acuta ſubſuperante. *Lappon.*

triſtachya Desv. 24. L. foliis linearibus abbreviatis piloſis, ſpicis ſubternis congeſtis folium florale ſubaequantibus, capſulis obtuſis gibboſis ſepala acuta aequantibus. *Amer. auſtr.*

peruviana Desv. 25. L. foliis linearibus tomentoſis rigidis, ſpicis capitatis, ſepalis mucronatis capſula longioribus. *Peru.*

Alopecurus Desv. 26. L. foliis vaginisque margine lanatis, ſpicis glomeratis alteruis remotiuſculis, ſepalis cuſpidatis ciliatis capſula obtuſa longioribus. *Quito. Mexico.*

campeſtris Cand. 27. L. radice repente, foliis lineari-lanceolatis piloſis, ſpicis umbellatis pedunculatis, intermedia ſeſſili, ſepalis acuminatis capſula mucronata fuſca

longioribus. *Europ. omnis. Amer. bor.* (Juncus campeſtris L., erectus Perſ., nemoroſus Hoſt., intermedius Thuill. L. erecta Desv.)

***multiflora* Lejeun.** 28. L. radice fibroſa, culmo foliato compreſſo, foliis linearibus piloſis, ſpicis umbellatis baſi foliatis, capſulis pallidis obtuſis ſepala cuſpidata ſuperantibus. *Gallia. German. Suecia.* (Juncus multiflorus Hofm., palleſcens Wahlb., campeſtris *β.* L.)

***racemoſa* Desv.** 29. L. foliis linearibus piloſis elongatis, ſpicis compoſitis pedunculatis, ſepalis acutis capſula longioribus. *Amer. auſtr.*

***interrupta* Desv.** 30. L. foliis lanceolatis piloſis, ſpicis compoſitis, media pedunculata, glomerulis remotiuſculis, bracteis ciliatis, ſepalis acutis capſula longioribus. *Amer. auſtr.*

1277. APHYLLANTHES.

monspelienſis *Gallia provinc. et narbon.* Planta facie Dianthi proliferi, caule aphyllo, floribus coeruleis bracteatis.

1278. DASYPOGON R. Br.

***bromelifolius* R. Br.** *Nov. Holl.* Planta ſuffruticoſa ſimpliciſſima piloſa, foliis gramineis, floribus capitatis bracteatis.

1279. CALECTASIA R. Br.

***cyanea* R. Br.** *Nov. Holl.* Fruticulus ramoſiſſimus foliis acerosis confertis veſtitus, floribus ſolitariis terminalibus azureis.

1280. BAMBUSA Schreb.

***arundinacea* W.** 1. B. culmo inermi glabro, foliis late lanceolatis, paniculae ramoſae ſpiculis ſeſſilibus alternis lanceolatis ſub-6floris, valvis intus lanato-ciliatis. *Ind. or.* (Arundo Bambos L. ſp.)

***ſpinoſa* Hamilt.** 2. B. culmo ſpinoſo, vaginis petiolaribus hiſpidis, paniculae laxae ramis pendulis, ſpiculis confertis diſtichis. *Inſ. Molucc. Ceylon.* (Arundo Bambos Burm. ind., A. agreſtis Lour.)

***ſtricta* Roxb.** 3. B. culmi articulis ſubſpinoſis, foliis lanceolatis ſcabris, paniculae ramoſae ſpiculis verticillatis ſub-5floris. *Inſ. Molucc. Cochinchina.* (Arundo multiplex Lour. B. verticillata W.)

1281. NASTUS Juſſ.

* *Floribus hexandris.*

Thouarſii * 1. N. culmo ramoſiſſimo, paniculae erectae ſpiculis ſeſſilibus ſubternis, valvis ſterilibus ovatis, ſtylo 2partito. *Madagaſcar.*

borbonica Kunth. 2. N. culmi ramis verticillatis, ſpiculis paniculatis, flosculo ſterili pedicellato, ſtylo 3partito. *Inſ. Maſcaren.* (Bambuſa alpina Bory. Stemmatoſpermum verticillatum P. B.)

Guadua * 3. N. foliis linearibus margine ſubtusque ſcabris, ſpicis depauperatis longe pedunculatis, ſpiculis cylindricis ſubarcuatis multifloris, ſtylo 3partito. *Quito. Nov. Granat.* (Bambuſa Guadua Humb.)

latifolia * 4. N. foliis oblongo-linearibus glaberrimis, ſpiculis ſubfaſciculatis cylindricis ſubarcuatis multifloris, ſtylo 3partito. *Ad Orinocum.* (Bambuſa latifolia Humb.)

** *Floribus triandris.*

Chuſque Humb. Kunth. 5. N. culmo ſcandente altiſſimo, ramis faſciculatis, foliis lanceolatis cuſpidatis, ſpiculis paniculatis unifloris, ſtylo 2partito. *Quito. Nov. Granat.*

1282. MELOCANNA Trin.

humilis Trin. 1. M. foliis glaucis ſubtus lanatis, fructibus apice comoſis. *Amboina.* (Arundo Fax Lour.)

bambuſoides Trin. 2. M. culmo celſiſſimo ſimplici, foliis glabris, fructibus apice nudis. *Inſ. Molucc. Ind. trans Gangem.* (Bambuſa baccifera Roxb. Arundo maxima Lour.)

1283. GAHNIA Forſt.

procera Forſt. 1. G. culmo tereti, foliis linearibus ſubulatis, paniculа erecta elongata, ſtigmatibus ternis 2fidis. *Nov. Zeeland.*

ſchoenoides Forſt. 2. G. culmo flexuoſo, panicula erecta, ſpiculis ſubſolitariis. *Inſ. ſociet.*

Pſittacorum Labill. 3. G. culmo tereti ſtricto, foliis linearibus ſubulatis elongatis margine ſcaberrimis, panicula decompoſita foliata, ſpiculis confertis baſi attenuatis, ſquamis vacuis acutis, nucibus nitidis mucronatis. *Terra Diemen. Nov. Holl.* (G. erythrocarpa R. Br.)

leucocarpa R. Br. 4. G. panicula decompoſita, ſpiculis baſi attenuatis, ſquamis obtuſiusculis, nucibus opacis apice mucronatis ſphacelatis. *Nov. Holl.*

triſida Labill. 5. G. foliis linearibus ſubulatis elongatis, paniculae elongatae ramis appreſſis, ſpiculis capitato-congeſtis, ſquamis cuſpidatis, ſtigmatibus ſimplicibus. *Terra Diemen.* (Lampocarya hexandra R. Br.)

*aſpera** 6. G. ſpica compoſita foliata, ſpiculis congeſtis, floribus 4andris, ſquamis intimis obtuſis. *Nov. Holl.* (Lampocarya aſpera R. Br.)

melanocarpa R. Br. 7. G. panicula ſubcoarctata compoſita, floribus 3andris, ſtigmatibus indiviſis. *Nov. Holl. Terra Diemen.*

1284. PHARUS.

latifolius 1. Ph. foliis longiſſime petiolatis obovato-oblongis acutis glabris, panicula patula, valvis laevibus. *Jamaica. Amer. auſtr.* (Ph. glaber Humb.)

*pubeſcens** 2. Ph. foliis petiolatis lanceolatis ſubtus ſcabris, paniculae ramis erectis, valvis ſtriatis, germine pubeſcente. *Braſil. Nov. Granat.* (Ph. ſcaber Kunth. lappulaceus Aubl.)

*Bankſii** 3. Ph. foliis lanceolato-enſiformibus, paniculae rarae ramis ſtrictis, rhachi valvisque ſtriatis pubeſcentibus inaequalibus. *Nov. Holl.* (Leptaſpis R. Br.)

1285. EHRHARTA Thunb.

* *Muticae.*

mnemateia Thunb. 1. E. culmo ſimplici, foliis enſiformibus margine cartilagineo-crenulatis, valvis corollae exterioris rugoſis obtuſis. *C. B. S.* (E. capenſis Th., cartilaginea Sm., nutans Lam.)

panicea Sm. 2. E. culmo ſubramoſo, foliis lanceolato-linearibus margine ſcabro-ciliatis, valvis corollae ext. obtuſis glabris, altera rugulosa. *C. B. S.* (E. erecta Lam.)

ramoſa Sw. 3. E. culmo ramoſiſſimo ſuffruteſcente, foliis linearibus glabris, panicula coarctata, valvis cor. ext. retuſis ſcabris calyce vix longioribus. *Afric. auſtr.* (E. 2gyna et Melica ramoſa Thunb.)

melicoides Sw. 4. E. culmo ſimplici glabro, foliis linearibus margine ſcabris, panicula patentiſſima, valvis cor. ext. oblongis obtuſis glaberrimis. *C. B. S.* (Melica capenſis Thunb.)

calycina Sm. 5. E. culmo ſubramoſo glabro, foliis linearibus margine ſcabris, panicula coarctata ſimpliciuscula, valvis cor. ext. piloſiuſculis retuſis mucronatis. *C. B. S.* (Aira capenſis L. ſuppl.)

diſtichophylla Labill. 6. E. culmo ramoſo foliisque diſtichis linearibus villoſiuſculis, floribus racemoſo-ſpicatis 4andris, valvis cor. ext. ſtriatis piloſiuſculis. *Terra Diemen.* (Tetrarrhena R. Br.)

*acuminata** 7. E. culmo ramoſo, foliis vaginisque glabris, floribus 4andris, valvis cor. ext. ſtriatis acutis. *Terra Diemen.* (Tetrarrhena R. Br.)

*juncea** 8. E. culmo ramoſo foliisque ſtrictis glabris, floribus imbricatis 4andris, valvis cor. ext. obtuſis laevibus. *Nov. Holl.* (Tetrarrhena R. Br.)

*laevis** 9. E. culmo ſimplici, foliis glabris laxis, floribus racemoſo-ſpicatis 4andris, valvis cor. ext. obtuſis laevibus. *Nov. Holl.* (Tetrarrhena R. Br.)

** *Ariſtatae.*

geniculata Sw. 10. E. culmo decumbente geniculato, foliis linearibus ſubundulatis, panicula coarctata, valvis cor. ext. hirſutis, altera breviter ariſtata. *C. B. S.* (Melica geniculata Thunb.)

longiflora Sm. 11. E. culmo erecto ſimplici glabro, foliis late lanceolatis margine ſcabris, panicula laxiuscula, valvis cor. ext. rugoſis hiſpidis ariſtatis. *C. B. S.* (E. ariſtata Thunb.)

gigantea Ehrh. 12. E. culmo ſublignoſo elato, foliis lineari-ſubulatis rigidis, panicula coarctata, valvis cor. ext. hirſutis ariſtatis. *C. B. S.* (Melica gigantea Thunb. Aira villoſa L. ſuppl.)

bulboſa Sm. 13. E. radice bulboſa, culmo erecto, foliis lanceolato-linearibus, panicula ſimplici laxa, floribus 3andris, valvis cor. ext. obovatis breviter ariſtatis rugoſis villoſis. *C. B. S.* (Trochera ſtriata Rich.)

ſtipoides Labill. 14. E. culmo ſimplici, foliis anguſtiſſimis glabris, panicula elongata ſubcontracta, floribus 4andris, calyce minuto, corollis pedicellatis, exteriore elongata longe ariſtata. *Terra Diemen. Nov. Holl.* (Microlaena R. Br.)

1286. URANIA Schreb.

ſpecioſa W. *Madagaſcar.* Arbor facie Muſae altiſſima, trunco ſimplici, foliis diſtichis longe petiolatis orgyalibus, ſpadice axillari foliis breviori. (Ravenala madagaſcarenſis Sonner.)

1287. TRADESCANTIA.

* *Pedunculis unifloris.*

fuſcata Ker. 1. Tr. acaulis ferrugineo-hirſuta, foliis ellipticis acutiusculis, pedunculo radicali ſub-1floro. *Braſil.*

malabarica 2. Tr. erecta laevis, pedunculis ſolitariis longiſſimis. *Malabar.*

** *Floribus ſubſeſſilibus glomeratis involucratis.*

tuberoſa Roxb. 3. Tr. caule procumbente radicante, foliis lanceolato-linearibus ciliatis, vaginis bulbi-floriferis, floribus glomeratis, ſolitario ſterili pedunculato. *Ind. or.*

axillaris 4. Tr. caule procumbente radicante, foliis lanceolato-linearibus, vaginis ſpathisque imbricatis ciliatis, floribus ſeſſilibus. *Ind. or.*

ſpecioſa L. ſuppl. 5. Tr. caule erecto flexuoſo, foliis lanceolatis abbreviatis margine carinaque villoſis, floribus axillaribus glomeratis. *C. B. S. Mexico.* (Tr. nodiflora Lam. Commelina Thunb.)

***discolor* Ait.** 6. Tr. ſubacaulis glaberrima, foliis lato-lanceolatis ſubtus purpureis, bracteis ſpathaceis equitantibus, floribus ſubpedicellatis glomeratis. *Amer. tropic.*

papilionacea 7. Tr. caule radicante, foliis lineari-lanceolatis ſubtus piloſis, ſpathis 3phyllis imbricatis. *Ind. or.*

criſtata 8. Tr. caule diffuſo repente, foliis lanceolatis vaginisque laevibus, ſpathis 2phyllis imbricatis. *Ind. or.*

***vaga* Lour.** 9. Tr. caule procumbente hirſuto, foliis oblongis acutis piloſis, ſpathis 2phyllis imbricatis. *China auſtr.*

villoſa* 10. Tr. tota villoſa, caule erecto, foliis lanceolatis mucronatis, pedunculis communibus aggregatis, ſpathis imbricatis. *Patria?*

**** Pedunculis racemoſo-umbellatis.*

***cordifolia* Sw.** 11. Tr. caule repente ramoſo, foliis ſubſeſſilibus cordato-ovatis reticulato-venoſis, pedunculis ſolitariis multifloris, filamentis glabris. *Jamaica.*

***erecta* Cav.** 12. Tr. caule erecto glabro, foliis ovatis planis vaginisque laevibus, pedunculo terminali 2fido racemoſo. *Mexico.* (Tr. bifida Roth.)

***undata* Humb.** 13. Tr. caule erecto hinc piloſo, foliis ovatis undulatis ſupra piloſo-ſcabris, vaginis ciliatis, pedunculo terminali 2fido racemoſo. *Cumana.*

***diuretica* Mart.** 14. Tr. caule erecto glabro, foliis ovato-lanceolatis acuminatis ferrulato-ciliatis ſubtus pubeſcentibus, vaginis ventricoſis hirſutis longe ciliatis, pedunculis geminis terminalibus umbelliferis. *Braſil. Nov. Granat.* (Tr. hirſuta Kunth.)

***ſubaſpera* Ker.** 15. Tr. caule erecto, foliis ovato-lanceolatis recurvis undulatis villoſiusculis, racemis ſeſſilibus ſubumbellatis. *Amer. bor.*

***pulchella* Humb.** 16. Tr. caule procumbente ramoſo foliisque ovato-oblongis acuminatis ferrulatis glabris, vaginis laxis, pedunculis geminis umbelliferis. *Mexico.*

***debilis* Humb.** 17. Tr. caule ſimpliciusculo glabro, foliis ovato-oblongis acutis nervoſis vaginisque ciliatis, pedunculis glabris geminis umbelliferis, calyce apice piloſo. *Quito.*

***gracilis* Humb.** 18. Tr. caule procumbente ramoſo glabro, foliis ovatis acutis nervoſis vaginisque ciliatis, pedunculis pubeſcentibus ſubquaternis umbelliferis, calyce colorato piloſiusculo. *Quito.*

***craſſifolia* Cav.** 19. Tr. caule erectiusculo ramoſo, foliis ovato-oblongis acutis ſubtus margineque lanatis, pedunculis geminis umbelliferis, calyce lanato. *Nov. Hiſpan.*

***elongata* Meyer.** 20. Tr. caule procumbente radicante, foliis lanceolatis glabris, umbellis terminalibus axillaribusque ſubſeſſilibus compoſitis. *Guiana.*

virginica 21. Tr. caule erecto ramoſo, foliis lanceolatis glabris, floribus umbellato-congeſtis terminalibus, pedunculis calycibusque piloſiusculis. *Virgin. Carolina.*

rosea Mx. 22. Tr. caule erecto, foliis linearibus glabris, floribus umbellato-congestis terminalibus, pedunculis calycibusque glabris. *Carolina.*

monandra Sw. 23. Tr. caule radicante ascendente, foliis ovatis acutis glaberrimis, pedunculis axillaribus laxis umbelliferis, floribus monandris. *Hispaniola.*

multiflora Sw. 24. Tr. caule erecto ramoso, foliis cordato-ovatis acutis vaginisque ciliatis, pedunculis axillaribus umbelliferis hirsutis, floribus 3andris. *Jamaica.*

procumbens W. 25. Tr. caule procumbente radicante, foliis ovatis basi ciliatis, pedunculis axillaribus cymosis, floribus 6andris, filamentis inaequalibus, longioribus barbatis. *Caracas.* (Tr. multiflora Jacqu.)

paviflora R. et P. 26. Tr. caule erecto, foliis breviſſime petiolatis ovato-oblongis nitidis ciliatis, floralibus cordatis, pedunculis umbelliferis axillaribus. *Peru.*

latifolia R. et P. 27. Tr. caule simplici erecto hinc piloso, foliis ovato-lanceolatis ciliatis, pedunculis terminalibus umbelliferis villosis, calycibus glanduloso-viscosis. *Peru.*

**** *Floribus paniculatis.*

divaricata Vahl. 28. Tr. caule ramoso, ramis divaricatis, foliis ovato-lanceolatis, vaginis barbatis, floribus terminalibus paniculatis, filamentis breviſſimis glabris. *Guiana. Inſ. Trinit.* (Commelina hexandra Aubl.)

geniculata 29. Tr. caule repente hirsuto, foliis ovatis acutis amplexicaulibus nervosis villosis, floribus paniculatis, petalis crenatis. *Amer. tropic.*

paniculata Roxb. 30. Tr. caule ascendente, foliis lanceolatis, panicula terminali pilosa, petalo inferiori anguſtiori. *Ind. or.*

1288. CAMPELIA Rich.

Zanonia Rich. *Amer. tropic.* Herba erecta cubitalis, foliis lato-lanceolatis subtus pubescentibus, pedunculis lateralibus multifloris bracteatis, floribus albis. (Commelina Zanonia L. Tradescantia Sw.)

1289. DICHORISANDRA Mik.

* *Floribus 6andris.*

thyrsiflora Mik. 1. D. racemi terminalis pyramidalis pedunculis glabris unifloris, foliis oblongis, vaginis glabris. *Brasil.*

gracilis Mart. 2. D. racemi terminalis pedunculis villosis fasciculatis, foliis lineari-lanceolatis ciliatis, vaginis hirsutiusculis. *Brasil.*

** *Floribus 5andris.*

radicalis Mart. 3. D. racemis subradicalibus aphyllis hirsutis, foliis ellipticis acuminatis pubescentibus. *Brasil.*

puberula Mart. 4. D. racemo terminali pubescente, pedunculis abbreviatis, foliis lanceolatis acuminatis supra villosis. *Brasil.*

1290. ORONTIUM.

aquaticum *Amer. bor. aestuaria.* Planta foliis petiolatis ellipticis nervoso-plicatis, spadice nudo longe pedunculato, floribus summis 4fidis.

1291. ROHDEA Roth.

japonica Roth. *Japon. China. Cochinchina.* Planta foliis sessilibus ensiformibus carinatis nervosis, spadice breviter pedunculato basi spatha 2phylla subtento foliis brevioribus. (Orontium japonicum Thunb., cochinchinense Lour.)

1292. TUPISTRA Ker.

squalida Ker. *Amboina.* Herba foliis lanceolatis elongatis nervosis undulatis, scapo spicifero bracteato foliis breviori, floribus lurido-caesiis.

1293. ACORUS.

Calamus 1. A. foliis lanceolato-linearibus, scapi foliacei apice longissimo. *Europ. Asia.*

gramineus Ait. 2. A. foliis linearibus, scapi foliacei apice subelongato. *China.*

† *terrestris* * 3. A. foliis ensiformibus abbreviatis, scapi foliacei apice vix elongato. *Cochinchina.* (A. Calamus Lour.)

1294. TACCA Forst.

pinnatifida Forst. 1. T. foliis ternato-decompositis, foliolis pinnatifidis inaequaliter sinuatis acutis. *Inf. Molucc.* et *oceani pacifici.* (Leontice Leontopetaloides L.)

integrifolia Ker. 2. T. foliis ovato-lanceolatis petiolatis nervosis. *Ind. or.*

1295. BERBERIS.

* *Floribus racemosis.*

† *Foliis simplicibus.*

a. Spinis 3partitis.

vulgaris 1. B. racemis pendulis multifloris, petalis integerrimis, foliis obovatis ferrato-ciliatis. *Europ. Asia med.*

emarginata W. 2. B. racemis cernuis paucifloris, petalis emarginatis, foliis lanceolato-obovatis ciliato-serratis. *Sibir.*

canadensis Mill. 3. B. racemis corymbosis recurvis, sepalis inaequalibus, petalis emarginato-2fidis, foliis obovatis remote serratis. *Amer. bor.*

Chitria Hamilt. 4. B. racemis compositis pendulis, petalis emarginatis, foliis oblongis mucronatis serrato-spinulosis. *Nepal.* (B. aristata Cand.)

cretica 5. B. pedunculis sub-3floris subracemosis abbreviatis, foliis obovatis integerrimis, spinis validis folia excedentibus. *Creta. Asia minor.*

Thunbergii Cand. 6. B. racemis paucifloris corymbosis folio brevioribus, spinis superioribus simplicibus, foliis obovatis mucronatis integerrimis. *Japon.* (B. cretica Thunb.)

glauca Cand. 7. B. racemis compositis multifloris erectis, foliis obovatis subintegerrimis subtus albido-glaucis. *Nov. Granat.* Humb.

monosperma R. et P. 8. B. racemis multifloris nutantibus, baccis 1spermis, foliis obovatis mucronatis, inferioribus dentato-spinosis. *Peru.*

latifolia R. et P. 9. B. pedunculis 8-6floris folio brevioribus, foliis obovatis mucronatis integerrimis subtus pallidis. *Peru.*

flexuosa R. et P. 10. B. racemis aggregatis inaequalibus paucifloris, foliis obovatis mucronatis glaucis integerrimis. *Peru.*

rigidifolia Kunth. 11. B. racemis paucifloris folia aequantibus, foliis oblongis spinoso-mucronatis subdentatis rigidis. *Amer. austr.*

ruscifolia Lam. 12. B. pedunculis brevibus 4-5floris, foliis oblongis basi attenuatis mucronatis subdentato-spinosis. *Buenos Ayres.*

paniculata Juss. 13. B. racemis compositis erectis, foliis lanceolatis mucronatis subdentato-spinulosis. *Peru.*

asiatica Roxb. 14. B. racemis brevibus multifloris corymbosis, baccis globosis, foliis ovalibus mucronatis subtus glaucis subdentato-spinosis. *Ind. or. Nepal.*

ilicifolia Forst. 15. B. racemis paucifloris corymbosis, baccis ovatis, foliis obovatis coriaceis spinoso-dentatis. *Terra ignis.* (B. lagenaria Poir.)

β. Spinis simplicibus aut submullis.

crataegina Cand. 16. B. racemis multifloris confertis abbreviatis, spinis simplicibus, foliis oblongis mucronatis reticulato-venosis subserratis. *Asia minor.*

chinensis Desf. 17. B. racemis subsimplicibus multifloris nutantibus, spinis subsimplicibus, foliis oblongis obtusis subdentatis. *China bor.*

japonica * 18. B. racemis terminalibus multifloris, spinis nullis, foliis ovatis acuminatis dentato-spinosis. *Japon.* (Ilex japonica Thunb. Mahonia Cand.)

quindiensis Kunth. 19. B. racemis erectis pubescentibus multifloris elongatis, spinis nullis, foliis oblongis mucronatis spinuloso-dentatis. *Amer. austr.*

†† *Foliis pinnatis: filamentis subbidentatis.*

fasciculata Sims. 20. B. racemis terminalibus aggregatis erectis, sepalis inaequalibus, internis coloratis petala superantibus, foliis sub-5jugis oblongis cuspidatis sinuato-spinosis. *Nov. Hispan.* (B. pinnata Lag. Mahonia fascicularis Cand.)

Aquifolium Pursh. 21. B. racemis paniculato-congestis, petalis 2fidis, ramis sarmentosis procumbentibus, foliis 3jugis ovato-oblongis basi oblique truncatis repando-dentatis coriaceis venosis. *Amer. bor. occid.* (Mahonia Nutt.)

nervosa Pursh. 22. B. racemis paniculato-cymosis, petalis integerrimis, foliis 6jugis ovato-oblongis sub-5nerviis repando-serratis. *Amer. bor. occid.* (Mahonia Nutt.)

*glumacea** 23. B. racemis subsolitariis elongatis gracilibus, bracteis obtusis persistentibus, foliis sub-7jugis oblongo-lanceolatis repando-dentatis. *Amer. bor. occid.* (Mahonia Cand.)

*nepalensis** 24. B. racemis aggregatis elongatis gracilibus, bracteis pedicellos aequantibus, foliis 6jugis breviter petiolatis ovato-lanceolatis 5nerviis repando-dentatis. *Nepal.* (Mahonia napaulensis Cand.)

** *Pedunculis unifloris.*

† *Spinis tripartitis.*

sibirica Pall. 25. B. pedunculis folio brevioribus, foliis spathulatis ciliato-serratis. *Sibir.*

heterophylla Poir. 26. B. pedunculis folium aequantibus cernuis, foliis junioribus integerrimis, adultioribus 3cuspidatis, filamentis utrinque 2dentatis. *Ad fretum Magellan.* (B. cuneata Cand.)

empetrifolia Lam. 27. B. pedunculis cernuis elongatis, foliis linearibus mucronatis integerrimis revolutis. *Ad fretum Magellan.*

buxifolia Lam. 28. B. pedunculis subternis folio longioribus, foliis obovato-lanceolatis mucronatis subintegerrimis. *Patagonia. Magellan. Terra ignis.* (B. microphylla Forst.)

Wallichiana Cand. 29. B. pedunculis aggregatis, foliis oblongis utrinque attenuatis rigidis glaberrimis ciliato-serratis. *Nepal.*

†† *Spinis nullis.*

lutea R. et P. 30. B. pedunculis aggregatis folium aequantibus, ramulis pubescentibus, foliis obovatis mucronatis dentato-spinulosis. *Quito.* (B. conferta Kunth.)

inermis Pers. 31. B pedunculis solitariis elongatis, foliis ellipticis integerrimis glabris. *Ad fretum Magellan.*

virgata R. et P. 32. B. pedunculis solitariis folia subaequantibus, floribus 5andris, spinis obsoletis, foliis obovatis coriaceis subspinosis. *Peru.*

tomentosa R. et P. 33. B. pedunculis subgeminis nutantibus, ramis glabris, foliis ovalibus subtus tomentosis subintegerrimis. *Chili.*

1296. NANDINA Thunb.

domestica Thunb. *Japon. China.* Frutex suborgyalis, foliis decompositis, foliolis ovato-lanceolatis integerrimis glabris, floribus paniculatis albis.

1297. LEONTICE.

Chrysogonum 1. L. foliis radicalibus pinnatis, foliolis verticillatis cuneiformibus sub-3fidis, scapo paniculato. *Graecia. Asia minor.*

Leontopetalum 2. L. foliis sub-2ternatis, foliolis obovatis obtusis glaucis subconfluentibus, floribus racemosis, bracteis persistentibus. *Neapol. Graecia. Asia minor.*

vesicaria Pall. 3. L. foliis ternatis carnosis, foliolis lobatis obtusis, floribus racemosis, bracteis foliaceis. *Desert. Kirgis.*

altaica Pall. 4. L. folio caulino ternato, foliolis digitato-quinatis oblongis obtusis, floribus racemosis, bracteis ovatis nervosis. *Sibir. Bessarabia.*

thalictroides 5. L. folio caulino 2ternato membranaceo, foliolis late ovatis 3lobis, lobis inciso-dentatis, calyce parvo. *Amer. bor.* (Caulophyllum Mx.)

1298. DIPHYLLEIA Mx.

cymosa Mx. *Carolina.* Herba foliis caulinis subbinis peltatis reniformi-cordatis 2lobis angulato-serrulatis glabris, floribus cymosis candidis.

1299. CLEOME.

*Hexandrae.

† *Siliqua stipitata.*

α. Filamentis stipiti insertis pseudo-monadelphis, =gynandris.

αα. Foliis ternatis.

triphylla 1. Cl. caule annuo subviscoso, foliis omnibus ternatis glabriusculis integerrimis infimis longe petiolatis floralibus sessilibus, siliqua lineari-oblonga elongata. *Ind. occid.*

brachycarpa Vahl. 2. Cl. caule viscoso-pubescente, foliis ternatis quinatisque integerrimis, siliqua ovali-oblonga stipite breviore. *Peru.* (Gynandropsis Cand.)

heterotricha Burch. 3. Cl. caule dupliciter piloso, pilis elongatis glanduliferisque, foliis ternatis quinatisque subintegerrimis. *C. B. S.*

brasiliensis Weinm. 4. Cl. caule fruticoso glanduloso-piloso, foliis ternatis quinatisque margine undulato-crispis, stipulis spinescentibus, foliis floralibus cordatis. *Brasil.* (Cl. psoraleaefolia Cand.)

latifolia Vahl. 5. Cl. caule herbaceo glabro inermi, foliis imis summisque simplicibus, mediis ternatis petiolatis acuminatis. *Guiana.*

longipes Cand. 6. Cl. caule herbaceo glabro, foliis ternatis, ſtipulis aculeatis, ſiliqua cylindrica gracili longiſſime ſtipitata. *Amer. auſtr.*

ββ. Foliis quinatis.

pentaphylla 7. Cl. caule herbaceo ramoſo inermi ſuperne glanduloſo-viſcoſo, foliis imis ſummisque ternatis, mediis quinatis ſubſerrulatis glabris, ſiliqua aſpera lineari-lanceolata ſtipitem ſuperante. *Aegyptus. Arabia. Ind. or.* et *occid.* (Gynandropſis Cand.)

pubeſcens Sims. 8. Cl. caule herbaceo glanduloſo-piloſo, foliis quinato-ſeptenatis, floralibus ſimplicibus cordato-oblongis. *Patria?*

hirſuta R. et P. 9. Cl. foliis quinatis hiſpidis integerrimis, ſiliqua aſpera longe ſtipitata. *Peru.* (Gynandropſis hiſpidula Cand.)

cardinalis Cand. 10. Cl. caule herbaceo glabro, foliis quinatis oblongo-lanceolatis, floralibus ſeſſilibus. *Mexico.*

ſpecioſa Kunth. 11. Cl. caule apice villoſo, foliis quinato-ſeptenatis oblongis acuminatis ſubſerrulatis. *Nov. Granat.*

roſea Vahl. 12 Cl. caule herbaceo inermi glabro, foliis ternatis quinatisque, ſummis ovatis ſeſſilibus, ſiliqua glabra ſtipitem aequante. *Braſil.*

palmipes * 13. Cl. glabriuscula, foliis digitato-palmatis integerrimis. *Cayenna.* (Gynandropſis Cand.)

γγ. Foliis ſeptenatis.

heptaphylla 14. Cl. caule herbaceo aculeato viſcoſo-piloſo, foliis ſeptenatis, floralibus cordato-lunatis, ſiliqua longe ſtipitata. *Ind. or.* et *occid.*

gigantea 15. Cl. caule fruticoſo pubeſcente inermi, foliis longe petiolatis ſeptenatis, floribus racemoſis viridibus. *Amer. auſtr.* (Cl. arborea Kunth., viridiflora Schreb.)

glanduloſa R. et P. 16. Cl. arboreſcens glanduloſo-hiſpida, foliis ſubſeptenatis, ſummis ſimplicibus cordatis. *Peru.*

arborea Weinm. 17. Cl. caule fruticoſo ſimpliciſſimo aculeato, foliis ſeptenatis piloſis. *Braſil.*

anomala Kunth. 18. Cl. caule herbaceo inermi villoſo, foliis ſeptenatis, floralibus ſubrotundo-cordatis, ſiliqua oblonga muricata. *Amer. trop.* Humb.

chilenſis Cand. 19. Cl. caule herbaceo inermi glabro, foliis ſeptenatis, floralibus ternato-quinatis, ſepalis perſiſtentibus, ſiliqua pendula glabriuscula ſtipitem ſubaequante. *Chili.*

β. Filamentis calyci inſertis.

cuneifolia Mühlb. 20. Cl. glaberrima, foliis ſimplicibus cuneato-retuſis, petalis gracillime unguiculatis. *Georgia.*

caneſcens Stev. 21. Cl. herbacea glauceſcens ſubſtrigoſa, foliis ternatis oblongo-linearibus, ſiliquis pubeſcentibus toruloſis. *Tauria auſtr.*

diffuſa Banks. 22. Cl. herbacea glabriuscula, ramis diffuſis, ſtipulis ſpineſcentibus, foliis ternatis, floralibus ſimplicibus ovatis, ſiliqua lineari elongata. *Braſil.* (Cl. affinis Cand.)

rytidoſperma Cand. 23. Cl. herbacea glabra, foliis omnibus ternatis ovali-oblongis, ſiliquis glabris elongatis. *Inſ. Carib.*

Humboldtii Cand. 24. Cl. herbacea glabra, petiolis elongatis aculeatis, foliis ternato-quinatis, floralibus ovatis breviter petiolatis, ſiliquis glabris. *Amer. tropic.* (Cl. parviflora Kunth.)

anguſtifolia Forsk. 25. Cl. caule herbaceo ramoſo ſuperne punctato-ſcabro, foliis omnibus filiformibus, inferioribus ſeptenatis ſuperioribus ternatis, antheris inaequalibus, ſiliquis ſubulatis. *Arabia.* (Cl. filifolia Vahl.)

ſpinoſa 26. Cl. caule herbaceo pubeſcente aculeato, foliis ſeptenatis quinatisque glabris, floralibus ovato-cordatis breviter petiolatis, ſiliqua glabra ſtipitem excedente. *Ind. occid. Braſil.*

pungens W. 27. Cl. caule herbaceo viſcoſo aculeato, foliis ſeptenatis quinatisque glabris, floralibus cordatis ſeſſilibus, ſiliqua glabra ſtipite breviore. *Ind. occid.* (Cl. ſpinoſa Sims.)

†† *Siliqua ſubſeſſili aut ſeſſili: herbaceae omnes.*

α. *Foliis ſimplicibus.*

monophylla 28. Cl. viſcoſo-pubeſcens, caule erecto ſimplici, foliis ovato-lanceolatis integerrimis, pedunculis ſubſolitariis axillaribus. *Ceylon. Malabar. C. B. S.* (Cl. cordata Burch.)

procumbens 29. Cl. caule procumbente glabro diffuſo, foliis lanceolato-linearibus, pedunculis ſolitariis axillaribus. *Jamaica. Hiſpaniola.*

guianenſis Aubl. 30. Cl. caule erecto ramoſiſſimo, foliis linearibus ſubulatis, pedunculis ſolitariis axillaribus, ſiliqua lanceolata. *Guiana.*

raphanoides Cand. 31. Cl. caule erecto ramoſo hiſpido, foliis lanceolato-linearibus acuminatis baſi pinnatifidis, pedunculis axillaribus racemoſis, ſiliqua toruloſa. *Guinea.* (Raphanus piloſus W.)

glauca Cand. 32. Cl. glabra glauca, foliis ovatis petiolatis, floralibus ellipticis, ſiliquis pendulis ſubſeſſilibus. *Arabia. Babylonia.* (Cl. glauceſcens Cand.)

quinquenervia Cand. 33. Cl. ſubpubeſcens glauca, foliis cordatis 5nerviis petiolatis, floralibus minimis, ſiliquis ſeſſilibus ovali-oblongis glanduloſo-aſperis. *Perſia.*

β. *Foliis ternatis.*

tenella L. ſuppl. 34. Cl. ramoſa glabra, foliolis lineari-filiformibus petiolo longioribus, pedunculis ſolitariis. *Ind. or.*

virgata Stev. 35. Cl. caule ramoſo glanduloſo-pubeſcente, foliis inferioribus ternatis ſuperioribus ſimplicibus oblongo-linearibus obtuſis, floribus ſolitariis racemoſisque terminalibus, ſiliquis pendulis ſubſtipitatis toruloſis pedunculum excedentibus. *Iberia. Perſia bor.*

iberica Cand. 36. Cl. caule glanduloſo-pubeſcente, foliis pleriſque ternatis breviter petiolatis acutiuſculis, flori-

bus subracemosis, siliquis pendulis torulosis substi-
pitatis pedunculum aequantibus. *Iberia.* (Cl. or-
nithopodioides M. B.)

Dilleniana Cand. 37. Cl. caule aspero glanduloso, foliis omnibus ternatis petiolatis, foliolis oblongis obtusis glaucis reflexis, siliquis solitariis subsessilibus deflexis. *Asia minor?* (Cl. ornithopodioides L.?)

arabica 38. Cl. caule glanduloso-viscoso, foliis ternatis lanceolatis obtusis, siliquis subsessilibus fusiformibus deflexis viscosis. *Arabia. Africa bor.*

violacea 39. Cl. caule glanduloso-pubescente, foliis ternatis linearibus longe petiolatis, summis simplicibus, pedunculis solitariis axillaribus abbreviatis, siliquis deflexis linearibus apiculatis. *Lusitania. Amer. austr.* (Cl. deflexa Cand.?)

multicaulis Cand. 40. Cl. caule glabro, foliis omnibus ternatis oblongo-linearibus obtusiusculis, siliquis substipitatis. *Mexico.*

folioloſa 41. Cl. glabra glauca, foliis subsessilibus ternatis orbiculatis, siliquis oblongo-linearibus piloso-glandulosis. *Persia.*

parviflora R. Br. 42. Cl. glanduloso-pubescens, foliis ternatis ovato-oblongis, summis simplicibus, siliquis oblongis glanduloso-pubescentibus styliferis pedunculo subbrevioribus. *Abyssinia.*

aspera Kön. 43. Cl. hispida, foliis ternatis oblongis, siliquis teretibus glabris stylo coronatis. *Coromandel.*

flava Banks. 44. Cl. glanduloso-pubescens subglauca, foliis inferioribus quinatis superioribus ternatis oblongis, siliquis striatis glanduloso-pubescentibus. *Nov. Holl.*

polygama 45. Cl. glabra, foliis petiolatis ternatis, inferioribus simplicibus ovato-lanceolatis acuminatis serrulatis, siliquis teretibus glabris. *Ind. occid.* (Cl. serrata L.)

aculeata 46. Cl. glabra, stipulis spinescentibus, foliis ternatis ovatis integerrimis, siliquis teretibus torulosis glabris. *Amer. tropic.*

Houstoni R Br. 47. Cl. glanduloso-villosa, stipulis petiolisque spinescentibus, foliis ternato-quinatis ovali-oblongis, siliquis substipitatis glanduloso-villosis. *Jamaica.*

rubella Burch. 48. Cl. glanduloso-pubescens, foliis ternato-quinatis, foliolis linearibus glabris glaucis, siliquis abbreviatis subpubescentibus. *Afric. austr.*

***Staminum numerus abortu vel coalitu alienus.*

diandra Burch. 49. Cl caule herbaceo glabro aculeato, foliis 7natis lineari-filiformibus, staminibus duobus fertilibus, sex abortientibus, siliqua stipitata pendula. *Afric. austr.* (Polanisia Rafin. Cand.)

tetrandra Banks. 50. Cl. herbacea glabra, foliis ternatis linearibus petiolos triplo superantibus, floribus 4andris, siliquis sessilibus gracilibus. *Nov. Holl.*

droseraefolia Delil. 51. Cl. fruticulosa glanduloſa ramosa, foliis petiolatis orbiculatis 3nerviis, pedunculis axillaribus

ſolitariis, floribus 4andris, ſiliquis ovalibus. *Aegyptus.* (Roridula Forsk.)

ſcapoſa Cand. 52. Cl. herbacea, foliis ſubradicalibus petiolatis rotundato-ovatis ſubſtrigoſis, ſcapo aſpero, bracteis minimis, floribus 4andris, ſiliquis erectis ſeſſilibus glabris. *Aegyptus.*

juncea L. ſuppl. 53. Cl. caule fruticoſo aphyllo ſquamoſo, corymbis lateralibus, floribus 8andris, filamentis ſtipiti germinis inſertis, ſiliqua tomentoſa. *C. B. S.* (Schepperia Neck. Cand. Macromerum Burch.)

dodecandra 54. Cl. humilis pubeſcens, foliis ternatis glabris oblongis ſubintegerrimis, pedunculis ſolitariis axillaribus, floribus 12andris, ſiliquis compreſſis ſubinflatis. *Ind. or.*

viſcoſa 55. Cl. herbacea erecta glandulo'o-viſcoſa, foliis quinatis ternatisque oblongo-lanceolatis, pedunculis axillaribus elongatis, floribus 12andris, ſiliquis oblongis ſtriatis aſperis. *Ind. or. Amer. bor.* (Cl. graveolens Rafin. Cl. icosandra L.)

uniglanduloſa Cav. 56. Cl. herbacea glanduloſo-pubeſcens, foliis ternatis oblongo-lanceolatis, floribus ſub-12andris, ſiliqua ſtylo elongato coronata. *Nov. Hiſpan.*

oxyphylla Burch. 57. Cl. glanduloſo-piloſa, foliis ternato-7natis oblongis glaucis, floribus 12andris, ſiliqua pendula pubeſcente ſtriata. *Afric. auſtr.*

Chelidonii L. ſuppl. 58. Cl. hirſuta, foliis ſeptenato-quinatis obovatis, floribus polyandris, ſiliqua filiformi glaberrima. *Ind. or.*

felina L. ſuppl. 59. Cl. hiſpido-ſtrigoſa, foliis ternatis obovatis retuſis, floribus ſolitariis axillaribus pedunculatis polyandris, ſiliqua lineari glabra. *Ind. or.*

1300. PERITOMA Cand.

ſerrulatum Cand. *Ad fl. Miſſuri.* Herba ramoſa 3pedalis foliis ternatis glaucis, floribus racemoſis violaceis. (Cleome Pursh. Atalanta Nuttall.)

1301. CANARIUM.

commune 1. C. ſtipulis amplexicaulibus ovatis fimbriatis, panicula divaricata. *Inſ. Molucc.*

Pimela Kön. 2. C. ſtipulis nullis, racemis lateralibus. *Inſ. Molucc. Cochinchina.* (C. ſylveſtre W. Pimela nigra Lour.)

1302. COSSINIA Commerſ.

borbonica Cand. *Inſ. Maſcaren.* Frutex foliis pinnatis ternatisque ſubtus tomentoſis, floribus paniculatis albis. (C. triphylla et pinnata Lam.)

1303. MABA Forſt.

buxifolia Perſ. 1. M. fruticoſa, ramis divaricatis, foliis obovato-oblongis coriaceis utrinque glabris, floribus ſoli-

tariis axillaribus ſeſſilibus, filamentis ſimplicibus. *Ind. or.* (Ferreola Roxb. Piſonia Rœtth.)

obovata R. Br. 2. M. foliis obovatis ſubretuſis, junioribus calycibusque pubeſcentibus, filamentis alternis duplicatis. *Nov. Holl.*

humilis R. Br. 3. M. foliis obovatis ſubretuſis glaberrimis, calycibus ſolitariis glabriusculis, baccis ovalibus dimidium folium aequantibus. *Nov. Holl.*

litorea R. Br. 4. M. foliis obovatis ſubretuſis nitidis, baccis ſolitariis ovali-oblongis calycem obſolete lobatum quater excedentibus folio quinquies brevioribus. *Nov. Holl.*

reticulata R. Br. 5. M. foliis obovatis retuſis reticulato-venoſis revolutis glabris, filamentis alternis duplicatis, baccis depreſſiusculo-globoſis. *Nov. Holl.*

laurina R. Br. 6. M. foliis ovali-oblongis venoſis nitidis ramulisque glabris, floribus ſolitariis, filamentis alternis duplicatis. *Nov. Holl.*

geminata R. Br. 7. M. foliis obovatis marginatis ſubvenoſis ramulisque glaberrimis, calycibus geminis ſubpubeſcentibus, baccis ovalibus folio quater brevioribus. *Nov. Holl.*

Ebenus * 8. M. arborea, foliis oblongis acutis ſupra nitidis ſubtus flavidis, floribus terminalibus aggregatis, baccis ovatis. *Inſ. Molucc.* (Ebenus vulgaris Rumph.)

elliptica Forſt. 9. M. foliis obovato-oblongis coriaceis nitidis, floribus ſubaggregatis axillaribus villoſiſſimis 3andris, baccis 2ſpermis. *Inſ. amicorum.*

1304. FLOSCOPA Lour.

ſcandens Lour. *Cochinchina.* Frutex ſcandens, foliis lanceolatis, floribus faſciculato-ſpicatis violaceis.

1305. LINDERA Thunb.

umbellata Thunb. *Japon.* Frutex ramoſus, foliis terminalibus lanceolatis petiolatis, floribus umbellatis.

1306. AMAJOUA Aubl.

guianenſis Aubl. 1. A. foliis ternis oblongis utrinque attenuatis, floribus terminalibus capitato-congeſtis. *Guiana.* (Hamelia glabra Lam., ſeſſiliflora W.)

corymboſa Kunth. 2. A. foliis oppoſitis ovali-oblongis acutis, corymbis 3partitis. *Nov. Granat.* Humb.

africana * 3. A. foliis oppoſitis ovato-lanceolatis, pedunculis axillaribus ſub-1floris, fructibus oligoſpermis. *Afric. ora orient.* (Coffea Zanguebariae Lour.)

1307. ISERTIA Schreb.

coccinea Vahl. 1. I. foliis oppoſitis ternisve oblongis utrinque attenuatis ſubtus villoſis, paniculae terminalis ra-

mis verticillatis dichotomis. *Amer. auſtr.* (Guettarda coccinea Aubl.)

parviflora Vahl. 2. I. foliis oppoſitis oblongis acuminatis ſubtus glabriusculis, inferioribus ſubcordatis, racemo compacto. *Inſ. Carib. Amer. auſtr.*

1308. CASSUPA Humb.

verrucoſa Humb. *Nov. Andaluſ.* Arbor foliis oppoſitis obovato-oblongis tomentoſis, floribus paniculatis bracteatis verrucoſis rubentibus.

1309. RICHARDIA.

ſcabra 1. R. ramis diffuſis hiſpidis, foliis ovali-oblongis ſcabris. *Nov. Hiſpan.*

piloſa R. et P. 2. R. ramis diffuſis hirtis, foliis oblongo-lanceolatis piloſis, corolla apice barbata. *Lima. Nov. Granat. Braſil.* (Richardſonia Kunth. Spermacoce hirſuta W. herb.)

1310. STEVENSIA Poit.

buxifolia Poit. *Hiſpaniola.* Frutex foliis oppoſitis oblongis nitidis ſubtus albidis reticulatis, floribus ſolitariis axillaribus albis.

1311. COUTAREA Aubl.

ſpecioſa Aubl. *Guiana.* Arbor foliis oppoſitis ovatis, floribus corymboſis purpureis magnis ſpecioſis. (Portlandia hexandra L. Jacq.)

1312. HILLIA.

longiflora Sw. 1. H. corollis 6fidis, laciniis lanceolatis revolutis, foliis ovatis acutis. *Jamaica. Braſil.* (H. paraſitica L. Fereira Vand.)

tetrandra Sw. 2. H. corollis 4fidis, laciniis ovatis, foliis obovatis. *Jamaica.*

1313. PSATHYRA Commerſ.

borbonica Gmel. *Inſ. Maſcaren.* Frutex ramis fragilibus, foliis oblongis utrinque attenuatis glabris, floribus corymboſis ſubglobboſis.

1314. SCHRADERA Vahl.

capitata Vahl. 1. Schr. involucro lobato-dentato, calyce integerrimo, foliis ſubellipticis obtuſiusculis. *Inſ. Carib.*

cephalotes W. 2. Schr. involucro integerrimo, calyce dentato, foliis oblongis acuminatis. *Jamaica.* (Fuchſia involucrata Sw.)

1315. LORANTHUS.

* *Hexandri.*

† *Pedunculis axillaribus 1–3floris.*

montevidensis * 1. L. ramis teretibus, foliis spathulato-linearibus mucronatis, floribus solitariis erectis. *Monte Video.* Sello.

nodosus Lam. 2. L. ramis teretibus dichotomis nodosis, foliis ovalibus patentissimis coriaceis 7nerviis, pedunculis 1floris aggregatis petiolos aequantibus. *Peru.*

bisflorus Lam. 3. L. ramis teretibus, foliis petiolatis subrotundo-ovatis, pedunculis subsolitariis 2floris petiolum excedentibus. *Ind. or.*

parvifolius Sw. 4. L. ramis fragilibus, foliis ovatis enerviis membranaceis, pedunculis axillaribus 3floris folio brevioribus. *Jamaica.*

sarmentosus R. et P. 5. L. ramis sarmentosis tuberculosis, foliis oblongo-lanceolatis carinatis, pedunculis axillaribus abbreviatis 3floris bracteatis. *Peru.*

eucalyptifolius Bonpl. 6. L. ramis teretibus laevibus, foliis ovato-subrotundis obtusis coriaceis enerviis, pedunculis axillaribus 3floris ebracteatis folio brevioribus. *Caracas.*

cupulifer Kunth. 7. L. ramis nodosis glabris, foliis oblique ovato-oblongis obtusis reticulatis membranaceis, pedunculis axillaribus 3floris, bractea coriacea pedicellum aequante, bacca cupulata. *Peru.*

microphyllus Kunth. 8. L. ramis incano-hirsutis, foliis oblongis obtusis mucronatis cano-pubescentibus, pedunculis brevissimis 3floris, floribus sessilibus. *Nov. Hispan.*

†† *Floribus cymosis.*

nutans * 9. L. ramis teretibus dichotomis glabris, foliis oblongis utrinque attenuatis laevibus, pedunculis axillaribus geminis cymosis paucifloris reflexis. *Brasil.* Sello.

phillyreoides Kunth. 10. L. ramis filiformibus subradicantibus, foliis oblongis utrinque attenuatis glabris, pedunculis cymosis multifloris folio brevioribus, floribus sessilibus subternis. *Cumana.*

dichotomus R. et P. 11. L. foliis subquaternis oblongis venosis, pedunculis axillaribus geminis dichotomis sub-6floris. *Peru.*

venetus Kunth. 12. L. ramis glabris, foliis obovato-oblongis glaucescentibus coriaceis, pedunculis cymosis axillaribus, floribus sessilibus subternis. *Mexico.*

divaricatus Kunth. 13. L. ramis glabris divaricatis, foliis oblongis obtusis coriaceis glaucescentibus, cymis terminalibus trichotomis, floribus ternis pedicellatis. *Amer. austr.*

Mutisii Kunth. 14. L. ramis glabris rimosis, foliis ternis subsessilibus obovato-oblongis coriaceis, cymis pedunculatis axillaribus ebracteatis paucifloris, corollis longissimis. *Nov. Granat.*

15.

americanus 15. L. foliis elliptico-oblongis coriaceis 3nerviis, cymis geminis pedunculatis axillaribus terminalibusque, corollis curvatis nutantibus. *Ind. occ.*

cochinchinenſis Lour. 16. L. foliis ovato-lanceolatis acutis coriaceis, cymis pedunculatis axillaribus, floribus congeſtis. *Cochinchina.*

acutifolius R. et P. 17. L. foliis lanceolatis acuminatis, cymis axillaribus pedunculatis, floribus pedicellatis ſubternis bracteatis. *Peru.*

cucullaris Lam. 18. L. foliis ovato-lanceolatis ſubfalcatis nervoſis, cymis pedunculatis axillaribus, bracteis cordatis cucullatis ſub-3floris. *Cayenn.*

cuneifolius R. et P. 19. L. foliis ſubſeſſilibus obovatis mucronatis lucidis, pedunculis cymoſis axillaribus nutantibus, bracteis cyathiformibus 3dentatis. *Peru.*

††† *Floribus racemoſis,*

a. axillaribus.

uniflorus 20. L. foliis obovatis mucronatis, racemis axillaribus ſimplicibus corymboſis. *Hiſpaniola.* (L. parviflorus Lam.)

falcatus L. ſuppl. 21. L. foliis linearibus obtuſis ſubfalcatis glaucis eveniis, racemis axillaribus paucifloris. *Ind. or.*

indicus Lam. 22. L. foliis ovato-oblongis obtuſiusculis coriaceis, racemis axillaribus ſimplicibus, baccis ovato-cylindricis. *Ind. or.* (Lonicera zeylanica Gärtn.?)

marginatus Lam. 23. L. foliis ovatis ſubacuminatis margine ſcarioſo-pellucidis, racemis axillaribus ſolitariis folio minoribus, pedicellis oppoſitis 3floris. *Braſil.*

orinocenſis * 24. L. foliis ovato-oblongis acutis venoſis, racemis axillaribus ſtrictis elongatis, pedicellis alternis 3floris. *Ad Orinoc.* (L. marginatus Kunth.)

Stelis 25. L. foliis oblongis coriaceis, racemis axillaribus trichotomis, pedunculis 3gonis, floribus ternis ſeſſilibus. *Amer. auſtr.*

occidentalis 26. L. ramis divaricatis, foliis ovatis, racemis axillaribus ſimpliciusculis, petalis baſi cohaerentibus aſcendentibus. *Amer. auſtr.*

bicolor Roxb. 27. L. foliis lanceolatis ſubeveniis, racemis axillaribus ſecundis, floribus bracteatis. *Ind. or.*

pauciflorus Sw. 28. L. foliis obovatis venoſis, racemis axillaribus 3partitis folio brevioribus. *Ind. occid.* (L. pyrifolius Bonpl.)

pedunculatus Jacq. 29. L. foliis cordato-ovatis venoſis, racemis axillaribus ſimplicibus, floribus ternis pedunculatis. *Amer. auſtr.*

ſeſſilis Jacq. 30. L. foliis ovatis, racemis axillaribus ſub-3partitis, pedicellis apice incraſſatis, floribus ternis ſeſſilibus. *Amer. auſtr.*

aduncus Meyer. 31. L. foliis oblongis apice acuto-aduncis, racemis axillaribus trichotomis, floribus ſubternis ſeſſilibus. *Surinam.*

acuminatus R. et P. 32. L. foliis ovatis elongato-acuminatis, racemis axillaribus folio brevioribus, pedicellis 3floris. *Peru.*

lanceifolius Poir. 33. L. foliis oblongo-lanceolatis, racemis axillaribus folio brevioribus, bracteis ovatis reflexis, pedicellis 3floris. *Peru.* (L. lanceolatus R. et P.)

retroflexus R. et P. 34. L. foliis ovatis acutis reflexis, racemis axillaribus compositis folia superantibus, bracteis ovalibus concavis, pedicellis sub-3floris horizontalibus reflexisve. *Peru.*

orbicularis Kunth. 35. L. ramis 4gonis, foliis orbiculatis acutiusculis coriaceis, racemis axillaribus abbreviatis ebracteatis, floribus sessilibus. *Quito.*

suaveolens Kunth. 36. L. ramis teretibus, foliis ovato-oblongis acuminatis coriaceis, racemis axillaribus geminis vel quaternis, ramulis abbreviatis confertis 3floris, floribus pedicellatis. *Peru.*

eugenioides Kunth. 37. L. arboreus, ramis teretibus, foliis ovato-oblongis acuminatis in petiolum decurrentibus, racemis axillaribus subsolitariis, ramis abbreviatis ebracteatis 3floris. *Peru.*

interruptus Kunth. 38. L. ramis teretibus, foliis alternis oblongis acutis in petiolum decurrentibus, racemis axillaribus subsolitariis, ramis brevissimis distantibus 3floris oppositis, floribus sessilibus. *Mexico.*

β. Racemis terminalibus.

europaeus 39. L. foliis oblongis obtusis in petiolum decurrentibus, racemis simplicibus terminalibus, floribus dioecis. *Austria. Transsylvan.*

brasilienſis Lam. 40. L. foliis ovato-lanceolatis nitidis, racemis terminalibus trichotomis bracteatis, pedicellis turbinatis. *Brasil.*

floribundus Labill. 41. L. arboreus, foliis linearibus obtusis, racemis simplicibus terminalibus aggregatis elongatis, pedicellis alternis 3floris, floribus sessilibus bracteatis. *Nov. Holl. occid.*

punctatus R. et P. 42. L. ramis verticillatis, foliis obovatis punctatis, racemis subterminalibus longissimis, pedicellis subverticillatis 3floris, floribus bracteatis. *Peru.*

heterophyllus R. et P. 43. L. ramis angulatis scabris, foliis ovalibus acutis subcordatisve, racemis subterminalibus solitariis, pedicellis abbreviatis 3floris, floribus bracteatis. *Chili.*

destructor Kunth. 44. L. ramis 4angulis, foliis oblongis acutis eveniis coriaceis, racemis terminalibus, ramulis approximatis secundis 3floris ebracteatis, floribus pedicellatis. *Quito.*

†††† *Floribus paniculatis.*

conduplicatus Kunth. 45. L. ramis 4gonis laevibus, foliis ovatis acutis conduplicato-recurvis glabris, paniculis terminalibus ramosissimis foliatis, ramis geminis 4angulo-ancipitibus, ramulis brevissimis 3floris. *Cumana. Brasil.*

paniculatus Kunth. 46. L. ramis teretibus, foliis oblongis utrinque attenuatis, paniculis terminalibus diffusis, ramis divaricatis, ramulis brevissimis 3floris. *Cumana.*

†††† *Floribus ſpicatis.*

ſpicatus 47. L. foliis ſubovatis obtuſis unctuoſis nervoſis, ſpicis axillaribus ſolitariis abbreviatis 4angulis. *Nov. Granat.*

emarginatus Sw. 48. L. foliis obcordatis enerviis coriaceis, ſpicis axillaribus 4gonis, floribus oppoſitis. *Hiſpaniola.*

ovalifolius R. et P. 49. L. foliis ovalibus ſubeveniis, ſpicis axillaribus ſubſolitariis abbreviatis, floribus confertis. *Peru.*

leptoſtachys Kunth. 50. L. ramis ſub-4gonis, foliis ovato-oblongis acuminatis reticulato-venoſis, ſpicis axillaribus ſubgeminis gracilibus, floribus diſtantibus minutis. *Nov. Granat.*

alveolatus Bonpl. 51. L. ramis teretibus, foliis ſubrotundis obtuſis ſubobliquis nervoſis, ſpicis axillaribus ſubgeminis 4angulis foveolatis. *Quito.*

amplexicaulis Kunth. 52. L. ramis teretibus, foliis amplexicaulibus reniformibus, ſpicis axillaribus geminis. *Caracas.*

** *Tetrandri.*

Scurrula 53. L. foliis ovatis ſubobliquis, pedunculis 1floris congeſtis, corollis hinc fiſſis 4fidis. *Ind. orient. China.*

tetrapetalus Forſt. 54. L. foliis oblongis obtuſis ſubſeſſilibus, floribus ſubſeſſilibus verticillatis regularibus 4fidis. *Nov. Zeeland.*

buddleoides Lam. 55. L. foliis ellipticis nervoſis ſubtus pubeſcentibus, floribus axillaribus pedunculatis congeſtis inaequaliter 4fidis. *Ind. or.*

lucarquenſis Kunth. 56. L. foliis ovato-ſubrotundis acutis ſubmembranaceis, racemis axillaribus terminalibusque paucifloris, floribus ſubſeſſilibus 4fidis. *Peru.*

*** *Pentandri.*

glaucus Thunb. 57. L. foliis ovatis obtuſis glaucis, pedunculis axillaribus 1floris, floribus 5fidis fructibusque farinoſis. *Afric. auſtr.*

claſticus Lam. 58. L. foliis ſeſſilibus ovatis acutis nervoſis, floribus verticillatis ſubſeſſilibus 5fidis revolutis. *Malabar.*

clavatus Lam. 59. L. foliis ovatis obtuſis coriaceis, floribus faſciculato-verticillatis pedunculatis clavatis inaequaliter 5fidis. *Madagascar. Malabar.*

verticillatus R. et P. 60. L. foliis terni-lanceolatis glaucis heteromallis, floribus ſubcapitato-verticillatis 5fidis revolutis. *Chili.*

ſeſſilifolius P. B. 61. L. foliis ſeſſilibus cordatis obtuſis nervoſo-venoſis, floribus verticillatis pedunculatis 5fidis. *Guinea.*

lanceolatus P. B. 62. L. foliis petiolatis cordato-lanceolatis nervoſis acutiusculis, floribus ſubverticillatis pedunculatis pendulis 5fidis. *Guinea.*

loniceroides 63. L. foliis ovato-lanceolatis petiolatis, floribus pedunculatis axillaribus capitato-congeſtis involucratis 5fidis. *Ind. or.* (L. coriaceus Lam.)

farinosus Lam. 64. L. foliis ovato-oblongis petiolatis, racemis axillaribus abbreviatis farinosis, corollis tubuloso-ventricosis 5fidis. *Java.*

pentandrus 65. L. foliis alternis oblongis obtusis petiolatis, racemis axillaribus abbreviatis glabris, corollis 5fidis. *Ind. or.*

longiflorus Lam. 66. L. foliis oblongis nitidis obsolete nervosis, racemis axillaribus, corolla tubuloso-clavata. *Malabar.*

grandiflorus R. et P. 67. L. foliis oblongis nitidis subvenosis, racemis corymbosis axillaribus pendulis, bracteis ovatis concavis, corolla tubulosa elongata. *Peru.*

caesius * 68. L. ramis granulosis, foliis ovato-lanceolatis obtusis mucronatis glaucis, racemis corymbosis erectis subterminalibus. *Peru.* (L. glaucus R. et P.)

longibracteatus Lam. 69. L. foliis lanceolatis subsessilibus enerviis, spicis terminalis bracteatis, corollis subclavatis 5fidis. *Peru.*

**** *Heptandri, octandri.*

ellipticus R. et P. 70. L. foliis oblongis acutis lucidis, racemis terminalibus compositis corymbosis, pedicellis 3floris, bracteis ovatis reflexis, corollis 7fidis. *Peru.*

Tagua Humb. 71. L. arboreus, foliis oblongis utrinque attenuatis subtus punctatis, racemis axillaribus oppositis, pedunculis ternis 3floris 3bracteatis approximatis, corollis 7fidis. *Nov. Granat.*

laurifolius Kunth. 72. L. foliis oblongis obtusiusculis in petiolum decurrentibus nitidis, racemis axillaribus terminalibusque compositis, pedunculis abbreviatis subternis 3floris 3bracteatis, floribus sessilibus 7-8fidis. *Nov. Granat.*

puracensis Kunth. 73. L. arboreus, foliis oblongis utrinque attenuatis nitidis subtus punctatis, racemis terminalibus, pedunculis abbreviatis ternis 3floris 3bracteatis, floribus sessilibus 6-8petalis. *Quito.*

nitidus Bonpl. 74. L. arboreus, foliis ellipticis nitidis, corymbis terminalibus, ramis 3floris 3bracteatis, floribus sessilibus 8petalis. *Quito.*

1316. ACHRAS.

Sapota *Ind. occid. Amer. austr. Nov. Holl.* Arbor foliis elliptico-oblongis obtusiusculis nitidis, pedunculis solitariis 1floris. (A. australis R. Br.)

1317. PRINOS.

* *Foliis annuis.*

verticillatus 1. Pr. foliis obovato-oblongis utrinque attenuatis subduplicato-serratis subtus pubescentibus, floribus ♂ umbellato-pedunculatis petiolum subaequantibus, ♀ subsolitariis. *Amer. bor.* (Pr. padifolius W., ambiguus Pursh. Gronovii Mx.)

ambiguus Mx. 2. Pr. foliis oblongis utrinque attenuatis integerrimis ſubtus glabris, floribus ♂ pedicellatis congeſtis, ♀ ſolitariis longe pedunculatis. *Carolina.*

laevigatus Pursh. 3. Pr. foliis oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis appreſſe ſerratis ſupra nitidis, venis ſubtus ſubpubeſcentibus, floribus ♂ ſparſis, ♀ axillaribus ſolitariis ſubſeſſilibus. *Amer. bor.*

nitidus Vahl. 4. Pr. foliis oblongo-ovatis ſerratis nitidis, floribus ☿ 4andris ſparſis pedunculatis. *Inſ. Carib.*

** *Foliis ſempervirentibus.*

ſideroxyloides Sw. 5. Pr. foliis ſubrotundis obtuſis integerrimis nervoſo-venoſis, floribus ☿ pedunculatis axillaribus 6andris. *Inſ. Carib.*

montanus Sw. 6. Pr. foliis ovatis acutis ſerratis utrinque nitidis rigidis, floribus ☿ pedunculatis axillaribus 6andris. *Jamaica. Hiſpaniola.*

dioecus Vahl. 7. Pr. foliis ovato-oblongis ſubſerratis nitidis, pedunculis axillaribus ſub-1floris, floribus dioecis 4andris. *Inſ. Carib.*

glaber 8. Pr. foliis lanceolatis apice ſubdentatis nitidis, pedunculis axillaribus ſolitariis 3floris. *Amer. bor.*

atomarius Nutt. 9. Pr. foliis obovatis acutis apice ſubſerratis glabris ſubtus punctatis, ramis junioribus viſcoſis, pedunculis axillaribus 1floris. *Carolin. auſtr. Georgia.*

coriaceus Pursh. 10. Pr. foliis ſpathulatis coriaceis nitidis integerrimis, corymbis axillaribus breviſſimis ſeſſilibus multifloris. *Georgia.*

1318. EHRENBERGIA *.

ciliata * *Braſil.* Frutex foliis oppoſitis oblongis, floribus aggregatis pedunculatis hirſutis.

1319. TRIPHASIA Lour.

monophylla Cand. 1. Tr. foliis ſimplicibus oblongis, floribus racemoſis. *Inſ. Timor.*

trifoliata Cand. 2. Tr. foliis ternatis, floribus ſolitariis. *Ind. orient. China. Cochinchina.* (Tr. aurantiola Lour. Limonia trifoliata L.)

1320. AMOORA Roxb.

cucullata Roxb. *Bengal.* Arbor foliis pinnatis glabris obtuſis, floribus paniculatis flavis.

1321. ANOPTERUS Labill.

glandulosa Labill. *Terra Diemen.* Arbor foliis ſparſis oblongis baſi attenuatis glanduloſo-ſerratis, floribus racemoſis.

1322. FRANKENIA.

* *Foliis glabris.*

laevis 1. Fr. foliis verticillatis linearibus acutis revolutis basi ciliatis, ramulis procumbentibus glabris, floribus terminalibus solitariis, petalis dentato-crenatis. *Litora maris mediterr.*

Nothria **Thunb.** 2. Fr. foliis fasciculatis linearibus obtusis revolutis basi ciliatis, ramulis procumbentibus hispidiusculis, floribus terminalibus aggregatis, petalis dentato-crenatis. *C. B. S.* (Nothria repens Berg.)

tetrapetala **Labill.** 3. Fr. foliis oppositis teretiusculis basi solutis punctatis, floribus terminalibus solitariis 4petalis, petalis spathulatis integerrimis. *Terra Diemen.*

thymifolia **Desf.** 4. Fr. caule fruticoso erecto ramosissimo, foliis confertis abbreviatis linear-teretibus rigidulis cinereis, floribus axillaribus sessilibus. *Deserta Afric. bor. Hispania.*

pauciflora **Cand.** 5. Fr. caule erectiusculo canescente, foliis linear-filiformibus revolutis basi ciliatis, floribus sparsis. *Nov. Holl.*

fruticulosa **Cand.** 6. Fr. caule erecto glabro, foliis linearibus acutiusculis revolutis basi laevibus. *Nov. Holl.*

hispida **Cand.** 7. Fr. caule fruticoso suberecto ramisque hispidis, foliis verticillatis linearibus revolutis patentibus basi subciliatis, calycibus terminalibus solitariis hispidis. *Asia minor. Ad Volgam. Sibir.* (Fr. hirsuta Sibth.)

hirsuta 8. Fr. caule fruticoso suberecto ramisque dense hirtis, foliis verticillatis lanceolatis revolutis incurvis basi ciliatis, floribus aggregatis hispidis terminalibus. *Afric. bor. Aegypt.* (Fr. intermedia Cand.)

revoluta **Forsk.** 9. Fr. caule fruticoso diffuso, ramis scabris, foliis verticillatis oblongis abbreviatis revolutis crassis incanis, floribus terminalibus subsolitariis, calycibus glabris. *Aegypt. infer.*

microphylla **Cav.** 10. Fr. caule prostrato ramoso suffruticoso, foliis ovalibus minimis 4fariam imbricatis glabris, floribus subsolitariis terminalibus glabris. *Amer. austr.*

nodiflora **Lam.** 11. Fr. caule prostrato, foliis ovatis petiolatis basi calycibusque laevibus, floribus axillaribus. *Afric. austr.*

portulacaefolia * 12. Fr. caule fruticoso erecto, foliis subrotundis carnosis glabris, stigmate 2fido, capsula 2valvi. *Insul. S. Helen.* (Beatsonia Roxb.)

** *Foliis pubescentibus.*

pulverulenta 13. Fr. caule herbaceo prostrato diffuso, ramis pubescentibus, foliis obovatis retusis subtus pulverulento-subtomentosis, petiolis ciliatis, floribus axillaribus terminalibusque subsolitariis. *Anglia. Europ. austr. Afric. bor. Tauria.* (Fr. canescens Presl.)

corymbosa Desf. 14. Fr. caule fruticoso erecto, ramis velutinis, foliis verticillatis linearibus revolutis pulverulentis, floribus terminalibus corymbosis. *Numidia. Inf. Canar.* (Fr. ericaefolia C. Smith.)

velutina Brouff. 15. Fr. caule fruticoso, foliis lineari-oblongis obtusis utrinque calycibusque villosis. *Mauritania.*

mollis M. B. 16. Fr. caule ramosissimo, foliis ovato-lanceolatis acutis villosis, floribus racemoso-paniculatis. *Caucas.*

1323. CANARINA.

Campanula *Inf. Canar.* Herba e radice tuberosa brachialis ramosa, foliis petiolatis hastatis laevibus, floribus solitariis flammeis speciosis. (C. Zanguebar Lour.?)

1324. PEPLIS.

Portula 1. P. foliis oppositis obovatis, floribus pedunculatis axillaribus geminis corollatis. *Europ. inundata.*

boryslhenica Bess. 2. P. foliis obverse lanceolatis obsoletissime serrulatis, floribus sessilibus solitariis, calycibus 8dentatis, dentibus subulatis. *Ad fl. Boryslhenem.*

occidentalis * 3. P. foliis oppositis lanceolatis obtusis basi attenuatis, floribus sessilibus axillaribus geminis apetalis. *Portorico. Guadalupa.* Bertero.

alternifolia M. B. 4. P. foliis alternis petiolatis lineari-spathulatis, floribus pedunculatis solitariis axillaribus subcorollatis. *Ad Volgam.*

1325. FLÖRKEA W.

paludstris Nutt. *Amer. bor. aestuaria.* Planta tenera subsucculenta, foliis pinnatifidis glabris, laciniis lineari-lanceolatis, floribus solitariis pedunculatis albidis. (Fl. uliginosa Mühl., proserpinacoides W. Nectris pinnata Pursh.)

DIGYNIA.

1326. NECTRIS Schreb.

aquatica W. *Guiana. Carolina austr.* Planta aquatica foliis submersis multifidis capillaceis, emersis peltatis ovalibus, floribus subsolitariis pedunculatis albidis. (Cabomba aquatica Aubl., Aubletii Mx., Nectris peltata Pursh.)

1327. OXYRIA Hill.

reniformis Hook. *Alp. Europ. Regio arctica Europ. Asiae et Amer. bor.* Herba humilis erecta Rumicis facie, foliis sub-

radicalibus reniformibus glabris, pedunculis aggregatis subverticillatis. (Rumex digynus L., Rheum Wahlb. Lapathum Lam.)

1328. ATRAPHAXIS.

spinosa 1. A. ramis spinescentibus, foliis subrotundis glaucis. *Asia media et bor.*

undulata 2. A. ramis inermibus, foliis oblongis acutis undulatis. *C. B. S.* (Polygonum Atraphaxis Thunb.)

1329. ORYZA.

sativa 1. O. foliis linearibus elongatis, paniculae contractae ramis sparsis scabris, floribus 6andris. *Ind. orient.* (Varietates numerosas exhibent Lour. et Desvaux.)

latifolia Desv. 2. O. foliis lanceolato-linearibus, paniculae laxae ramis verticillatis basi barbatis, floribus 3andris. *Noo. Granat.* Humb.

1330. ZIZANIA.

aquatica Lamb. 1. Z. panicula pyramidata superne spicata ♀, flosculis erectis, ramis inferioribus verticillatis horizontalibus ♂, flosculis pendulis, utrisque longe cuspidato-aristatis. *Lacus Amer. bor.* (Z. palustris L., clavulosa Mx.)

miliacea Mx. 2. Z. panicula effusa, flosculis ♀ et ♂ mixtis breviter aristatis. *Carolin. austr. Jamaica.* (Z. aquatica L.)

Retzii * 3. Z. paniculae umbellatae ramis racemosis, pedicellis incrassatis, flosculis ♂ superioribus, utrisque aristatis glabris. *Ind. or.* (Pharus aristatus Retz.)

ciliata * 4. Z. panicula subracemosa, flosculis utrisque muticis ciliatis. *Ind. or.* (Pharus ciliatus Retz.)

fluitans Mx. 5. Z. spicis axillaribus solitariis setaceis sub-4floris, superioribus ♂, utrisque muticis, culmo gracili ramoso. *Ad oras lacus Champlain Americae bor.*

1331. POTAMOPHILA R. Br.

parviflora R. Br. *In fluviis Noo. Holl.* Gramen altum ramosum, foliis angustis, panicula effusa erecta.

TRIGYNIA.

1332. CHAMAEDOREA W.

gracilis W. 1. Ch. frondibus pinnatis, pinnis lato-lanceolatis falcatis, spadicibus ramosis, floribus ♂ nutantibus, fructibus ovatis obtusis. *Amer. austr.* (Borassus pinnatifrons Jacq. Martinezia lanceolata R. et P.)

linearis Mart. 2. Ch. frondibus abrupte pinnatis, pinnis linearibus acutiſſimis, racemo compoſito, ſpicis recurvis. *Peru.* (Martinezia R. et P.)

fragrans Mart. 3. Ch. frondibus furcatis, laciniis enſiformibus extrorſum ſerratis, ſpadicibus ramoſis, ramis ♂ erectis, fructibus ellipticis. *Peru.* (Nunuezharia R. et P. Nunnezia W.)

1333. SABAL Adanſ.

minor Perſ. *Carolina. Georgia.* Palma acaulis, frondibus flabelliformi-palmatis plicatis, ſtipitibus inermibus, ſpadicibus radicalibus. (Corypha minor Jacqu., pumila Walt., Chamaerops acaulis Mx. Rhapis acaulis W.)

1334. MORENIA R. et P.

fragrans R. et P. *Peru.* Palma gracilis, frondibus pinnatis, ſpadicibus ♂ quaternis, ♀ ſolitariis.

1335. RHAPIS L. fil.

flabelliformis Ait. 1. Rh. frondibus palmatis plicatis, plicis marginibusque aculeato-denticulatis. *China. Japon. Afr. orient.?* (Chamaerops excelſa Thunb. Corypha africana Lour.?)

arundinacea Ait. 2. Rh. frondibus ſimplicibus 2partitis, lobis acutis plicatis, plicis ſcabriusculis. *Carolina.*

1336. CHAMAEROPS.

humilis 1. Ch. acaulis, frondibus palmatis plicatis, ſtipitibus ſpinoſis. *Hiſpania. Afric. bor.* (Phoenix humilis Cav.)

ſerrulata Mx. 2. Ch. caudice repente, ſtipitibus aculeato-ſerratis, frondibus palmato-plicatis. *Georgia.*

Hyſtrix Fraſer. 3. Ch. caudice repente, aculeis ſtipitum longiſſimis rigidis, frondibus plicato-palmatis. *Georgia.*

Palmetto Mx. 4. Ch. caudice arboreo, ſtipitibus inermibus, frondibus palmato-plicatis, ſpathis duplicatis. *Carolina. Florida. Mexico.* (Corypha Palmetto Walt. Ch. Mocini Humb. Bonpl.)

1337. LIVISTONIA R. Br.

inermis R. Br. 1. L. ſtipitibus inermibus. *Nov. Holl.*

humilis R. Br. 2. L. ſtipitibus aculeatis. *Nov. Holl.*

1338. CORYPHA.

cerifera Mart. 1. C. caudice annulato, frondibus flabelliformi-multifidis glaucis, ſpadicis ramis floribusque ſericeo-tomentoſis, ſpathis glabris, fructibus obtuſis. *Braſil.*

auſtralis R. Br. 2. C. frondibus flabelliformi-palmatis, ſtipitibus ſpinuloſis, calycibus acutis. *Nov. Holl.*

rotundifolia Lam. 3. C. frondibus peltatis orbiculatis palmato-multifidis, filis intermediis deciduis. *Inſ. Molucc. Cochinchina.* (C. Saribus Lour.)

umbraculifera 4. C. frondibus pinnato-palmatis, filo laciniis interjecto, ſpadice erecto. *Ind. or.*

Utan Lam. 5. C. frondibus flabelliformi-palmatis baſi truncatis, filo laciniis interjecto, ſpadice erecto paniculato. *Inſ. Molucc.*

Licuala Lam. 6. C. caudice humili, ſtipitibus baſi aculeato-ciliatis, frondibus palmato-multifidis, laciniis praemorſis, ſpadice erecto. *Inſ. Molucc.* (C. Pilearia Lour.)

dulcis Humb. 7. C. frondibus flabelliformi-multifidis plicatis, filo laciniis interjecto, ſtipitibus aculeatis lanatis, ſpadice ramoſiſſimo tomentoſo. *Nov. Hiſpan.*

tectorum Humb. 8. C. frondibus plicato-palmatis, ſtipitibus ſpinuloſo-ſerratis, ſpadicibus tomentoſis. *Nov. Granata.*

Pumos Humb. 9. C. frondibus plicato-palmatis multipartitis, filo laciniis 2fidis interjecto, ſtipitibus inermibus, ſpadicibus ramoſis pendulis. *Mexico. Cuba.* (C. maritima Humb.)

Miraguama Humb. 10. C. frondibus plicato-palmatis multipartitis ſubtus argenteis, ſtipitibus compreſſis inermibus. *Cuba.*

† *nana* Humb. 11. C. caudice extus daedaleo-venoſo, frondibus digitato-multifidis ſubtus albidis, ſtipite inermi, ſpatha externe tomentoſa. *Mexico.*

1339. PHOENIX.

dactylifera 1. Ph. pinnis lineari-lanceolatis complicatis ſtrictis. *Aſia med. et trop. Afric. bor.*

reclinata Jacq. 2. Ph. pinnis lineari-3quetris laxe patentibus. *Afr. auſtr.*

farinifera Roxb. 3. Ph. pinnis lineari-ſubulatis complicatis, caudice humili. *Ind. orient. Cochinchina.* (Ph. puſilla Lour.)

acaulis Roxb. 4. Ph. pinnis lineari-enſiformibus complicatis, inferioribus ſpineſcentibus. *Ind. or.*

1340. LEPIDOCARYON Mart.

gracile Mart. 1. L. ſpadicibus tomentoſis, ſpathis laxis, fructibus obovatis, ſquamis convexiusculis. *Braſil.*

tenue Mart. 2. L. ſpadicibus glabriusculis, ſpathis appreſſis, fructibus ellipticis, ſquamis planis. *Braſil.*

1341. METROXYLON Rottb.

Sagus Kön. 1. M. caudice foveolato, frondibus pinnatis, pinnis oblongo-linearibus ſubtus hiſpidis, amentis diſtichis alternis. *Inſ. Molucc.* (Sagus Rumphii W.)

viniferum * 2. M. pinnis ſpinuloſis, fructibus oblongis ſulcatis. *Guinea.* (Raphia P. B. Sagus Palma-Pinus Gärtn.)

Ruffia * 3. M. fructibus turbinatis mucronatis ſulcatis. *Madagasc.* (Sagus Ruffia Jacq. pedunculata Poir.)

lacdigerum * 4. M. fructibus lineari-ellipticis mucronatis ſulcatis. *Braſil.* (Sagus Mart.)

1342. HYPHAENE Gärtn.

coriacea Gärtn. *Aegypt. ſuper.* Palma caudice annulato dichotome ramoſo, frondibus digitato-palmatis, ſtipitibus ſpinuloſis. (Cucifera thebaica Delil.)

1343. LEOPOLDINIA Mart.

pulcra Mart. 1. L. pinnis linearibus acuminatis ſubtus concoloribus, fructuum fibris exterioribus discretis. *Braſilia.*

inſignis Mart. 2. L. pinnis lanceolatis ariſtatis ſubtus glaucis, fructuum fibris denſiſſime compactis, exterioribus reticulatis ligneſcentibus. *Braſil.*

1344. HYOSPATHE Mart.

elegans Mart. *Braſil.* Palma orgyalis, frondibus pinnato-fiſſis, fructibus olivaeformibus.

1345. ARECA.

Catechu 1. A. pinnis plicatis terminalibus praemorſis, ſtipitibus ſpadicibusque ramoſis laevibus, fructibus ſubrotundo-ovatis. *Ind. or.*

luteſcens Bory. 2. A. pinnis plicatis praemorſis, ſtipitibus ſpadicibusque ramoſiſſimis laevibus, fructibus ſubrotundis gibboſis. *Inſ. Mascaren.*

humilis W. 3. A. pinnis cuneiformibus truncatis, ſtipitibus ſpadicibusque ramoſis laevibus, fructibus globoſo-ovatis acutis. *Amboina.*

ſpicata Lam. 4. A. pinnis lineari-lanceolatis acutis, ſtipitibus ſpadicibusque ſimpliciter racemoſis laevibus, fructibus globoſis umbonatis. *Inſ. Moluec.*

glandiformis Lam. 5. A. pinnis linearibus acutis, ſtipitibus ſpadicibusque ſimpliciter racemoſis laevibus, fructibus oblongo-cylindricis. *Inſ. Moluec.*

globulifera Lam. 6. A. pinnis linearibus acutis, ſtipitibus ſpadicibusque ramoſis brevibus, fructibus globoſo-ovatis. *Inſ. Moluec.*

alba Bory. 7. A. pinnis apice ſubinciſis, ſtipitibus ſpadicibusque ramoſis laevibus, fructibus oblongis. *Inſ. Mascaren.*

rubra Bory. 8. A. pinnis ſubtus glaucis, ſtipitibus glabris ſubſpinoſis, ſpadicibus ramoſis recte ſpinoſis. *Inſ. Mascaren.*

crinita Bory. 9. A. ſtipitibus hirſutis, ſpadicibus ramoſis incurvo-ſpinoſis. *Inſ. Mascaren.*

1346. OENOCARPUS Mart.

minor Mart. 1. Oe. caudice nudo tenui, frondibus ſparſis, laciniis calycis ♂ lanceolatis corolla acuta brevioribus, fructibus ovato-ellipticis acutis. *Braſil.*

Bacaba Mart. 2. Oe. caudice nudo, frondibus ſparſis, pinnis lineari-lanceolatis, laciniis calycis ovato-lanceolatis corolla acuta brevioribus, fructibus utrinque attenuatis. *Guiana.*

Bataua Mart. 3. Oe. caudice nudo, frondibus ſparſis, laciniis calycis ♂ 3angularibus corolla acutiuscula brevioribus, fructibus ellipticis obtuſis. *Amer. auſtr.*

diſtichus Mart. 4. Oe. caudice nudo, frondibus diſtichis, laciniis calycis ♂ 3angularibus corolla obtuſa brevioribus, fructibus ellipticis obtuſis. *Amer. auſtr.*

Sancona * 5. Oe. caudice nudo altiſſimo, frondibus pinnatis, pinnis criſpis. *Amer. auſtr.* (Oreodoxa W.)

frigidus * 6. Oe. caudice nudo gracili, frondibus pinnatis, foliolis flexuoſis, laciniis calycis ♂ corolla acuta brevioribus, fructibus globoſis. *Amer. auſtr.* (Oreodoxa Kunth.)

† *regius* * 7. Oe. caudice nudo medio incraſſato, frondibus pinnatis, fructibus ovatis. *Cuba.* (Oreodoxa Kunth.)

circumtextus Mart. 8. Oe. caudice fibrillis obtexto, pinnis oblongo-lanceolatis abrupte acuminatis, laciniis calycis ♂ 3angularibus corolla obtuſiuscula brevioribus, fructibus cylindricis. *Amer. auſtr.*

1347. EUTERPE Gärtn.

oleracea Mart. 1. E. frondibus pectinato-pinnatis glabriusculis, floribus denſe ramos obtegentibus, ſepalis ovatis denticulatis corolla brevioribus, fructibus globoſis. *Braſil.*

enſiformis Mart. 2. E. frondibus pectinato-pinnatis, pinnis ſubenſiformibus acuminatis, floribus laxis, ſepalis corolla 4plo brevioribus, fructibus globoſis. *Peru.* (Martinezia R. et P.)

edulis Mart. 3. E. frondibus pectinato-pinnatis ſubtus lepidotis, floribus laxis, ſepalis orbiculatis corolla brevioribus, fructibus globoſis. *Braſil.*

caribuca * 4. E. frondibus pectinato-pinnatis glabris, floribus laxis, fructibus oblongis ſubincurvis. *Inſ. Carib.* (Areca oleracea Jacq.)

Praga * 5. E. frondibus pinnatis, foliolis multijugis, fructibus globoſis roſtratis. *Nov. Andaluſ.* (Aïphanes Humb.)

† *aculeata* * 6. E. frondibus pinnatis, foliolis 4jugis. *Amer. auſtr.* (Aïphanes W.)

1348. WALLICHIA Roxb.

caryotoides Roxb. *Ind. or.* Palma acaulis, frondibus pinnatis cuneatis, inferioribus faſciculatis, ſpadice pendulo.

1349. GULIELMA Mart.

speciosa Mart. *Nov. Granat. Brasil.* Palma elata caudice stipitibusque spinosissimis, frondibus pinnatis crispis aculeatis. (Bactris Gasipaës Humb.)

1350. ELAEIS Jacq.

guineensis Jacq. 1. E. caudice erecto, stipitibus spinoso-serratis, antheris linearibus, fructibus ovatis subangulatis. *Guinea. Ind. occ.*

melanococca Gärtn. 2. E. caudice ascendente, stipitibus spinoso-serratis, antheris fructibusque ovatis acutis. *Nov. Granat.* (Alphonsia oleifera Humb.)

1351. SYAGRUS Mart.

cocoides Mart. *Brasil.* Palma mediocris, frondibus laxe pinnatis, fructibus lagenaeformibus.

1352. ELATE.

sylvestris *Ind. or.* Palma mediocris, frondibus pinnatis aculeatis.

1353. Cocos.

nucifera 1. C. caudice proceriſſimo flexuoso basi incrassato inaequaliter annulato, frondibus patentibus, floribus ♀ subglobosis, fructibus maximis ovato-3gonis. *Intra tropicos.*

botryophora Mart. 2. C. caudice proceriſſimo gracili annulato, frondibus erectis patulis, pinnis approximatis subcrispis, floribus ♀ globosis, fructibus ovatis obtusis. *Brasil.*

oleracea Mart. 3. C. caudice proceriſſimo annulato, frondibus erecto-patentibus, pinnis subcrispis, floribus ♀ conicis, fructibus ovatis. *Brasil. Cuba?* (C. crispa Kunth.)

capitata Mart. 4. C. caudice crasso annulato, basibus stipitum spinosorum persistentibus capitato, frondibus patentibus strictis subtus glaucis, floribus ♀ ovato-globosis. *Brasil.*

coronata Mart. 5. C. caudice elato annulato, basibus stipitum spinosorum crassis imbricatis capitato, frondibus erectis subtus albis, pinnis subcrispis, floribus ♀ ovato-globosis, fructibus subellipticis. *Brasil.*

flexuosa Mart. 6. C. caudice mediocri incurvo, basibus stipitum squamato, frondibus patentibus, pinnis laxis crispis, floribus ♀ oblongis angulatis, fructibus rostratis. *Brasil.*

campestris Mart. 7. C. caudice interne annulato, frondibus patentirecurvis, pinnis strictis subtus glaucis, floribus ♀ oblongis angulatis. *Brasil.*

Romanzoviana Cham. 8. C. caudice fusiformi, pinnis ensiformibus reduplicatis, spadicibus pluribus. *Inf. S. Catharinae. Brasil.*

† *chilensis* Molin. 9. C caudice inermi, pinnis ensiformibus complicatis, spicis quaternis. *Chili.*

comosa Mart. 10. C. caudice subhumili inferne annulato basi stipitum squamoso, frondibus patentibus abbreviatis, pinnis approximatis latiusculis obtusis, floribus ♀ globosis, fructibus obovato-ellipticis. *Brasil.*

schizophylla Mart. 11. C. caudice humili annulato basibus stipitum serrato-spinosorum capitato, frondibus patentibus, pinnis obtusis mucronatis terminalibus connexis, floribus ♀ subglobosis, fructibus ellipticis. *Brasil.*

1354. MAXIMILIANA Mart.

regia Mart. 1. M. staminibus exsertis, petalis membranaceis. *Brasil.*

insignis Mart. 2. M. staminibus inclusis, petalis carnosis. *Brasil.*

1355. MARTINEZIA R. et P.

caryotaefolia Humb. *Amer. austr.* Palma caudice stipitibus spathisque spinosis, frondibus pinnatis cuneatis apice 3lobis, spadice ramoso inermi.

1356. CAMPYNEMA Labill.

lineare Labill. *Terra Diemen.* Planta gracilis pauciflora, foliis paucis gramineis.

1357. CYMATION *.

undulatum * 1. C. foliis lanceolatis canaliculatis undulatis, pedunculis subracemosis cernuis. *Afr. austr.* (Lichtensteinia W.)

laevigatum * 2. C. foliis lanceolatis canaliculatis planis, pedunculis subracemosis pendulis. *Afric. austr.* (Lichtensteinia W.)

1358. COLCHICUM.

byzantinum Ker. 1. C. foliis oblongis plicatis, spatha multiflora, laciniis corollae oblongo-lanceolatis venosis. *Thracia. Asia minor.* (Flores autumnales)

autumnale 2. C. foliis lanceolatis planis erectis, spatha subiflora, laciniis corollae elliptico-lanceolatis. *Europ. prata.* (Flores autumnales.)

variegatum 3. C. foliis lanceolatis undulatis, spatha sub-1flora, laciniis corollae lanceolatis acutis tessellatis. *Sicil. Creta. Lusitan.* (Flores autumnales.)

arenarium Kit. 4. C. foliis lineari-lanceolatis obtusis canaliculatis, spatha sub-1flora, laciniis corollae sublinearibus. *Hungar. Italia sup. Tauria.* (Flores autumnales.)

montanum 5. C. foliis linearibus patentissimis, spatha sub-1flora, laciniis corollae sublinearibus. *Europ. austr.* (C. bulbocodioides Brot. Merendera Ram. Red.) (Flores autumnales.)

alpinum Cand. 6. C. foliis linearibus, spatha 1flora, laciniis corollae oblongis obtusis, tribus exterioribus longioribus, stylis longe exsertis. *Alp. pennin. cott. jul.* (Flores aestivales.)

caucasicum * 7. C. foliis linearibus canaliculatis, spatha submultiflora, antheris versatilibus, laciniis corollae oblongis striatis. *Caucasus.* (Merendera M. B. Bulbocodium 3gynum Adam.) (Flores vernales.)

1359. ANDROCYMBIUM W.

melanthioides W. 1. A. foliis lineari-lanceolatis basi dilatatis, bracteis coloratis flores subcapitatos obvallantibus. *C. B. S.*

eucomoides W. 2. A. foliis oblongo-lanceolatis cucullatis, caule 3floro, floribus ebracteatis, petalis hastatis. *C. B. S.* (Melanthium eucomoides Jacq.)

1360. SCHEUCHZERIA.

palustris *Europ. et Amer. bor. paludes.* Planta Junci speciem prae se ferens, foliis semiteretibus vaginantibus apice foratis, floribus racemosis virentibus.

1361. TOFIELDIA Hudf.

alpina Sternb. 1. T. scapo nudo, floribus spicato-capitatis ebracteatis, calyculo minimo. *Alp. Europ. med. et bor. Asia et Amer. bor.* (T. palustris Hudf. Sm., borealis Wahlenb., pusilla Pursh. Anthericum calyculatum L. Helonias borealis W.)

palustris Cand. 2. T. scapo subfoliato, floribus racemosis bracteatis, calyculo petalisque obtusiusculis. *Europ. bor. paludes et colles calcarei.* (T. calyculata Wahlb., alpina Sm., rubra Braun., racemosa Hopp. Anthericum calyculatum *α*. L. Hebelia collina et allemannica C. C. Gmel.)

frigida Kunth. 3. T. scapo nudiusculo, floribus racemosis bracteatis, calyculo petalisque striatis acutis. *Alp. Peru.*

stenopetala Sm. 4. T. scapo subfoliato, floribus racemosis, bracteis pedicellos superantibus, petalis lanceolatis acutis. *Amer.-bor.*

cernua Sm. 5. T. scapo nudo, floribus racemosis cernuis, pedicellis horizontalibus elongatis, bracteis brevissimis. *Sibir. Carolin. bor.?* (T. glabra Nutt.)

glaberrima Macbr. 6. T. radice tuberosa, scapo foliato, floribus racemosis, pedicellis aggregatis subverticillatis, calyculo 3dentato, staminibus basi dilatatis petala ovalia superantibus. *Carolin. austr.*

pubens Dryand. 7. T. scapo scabro pulverulento, racemo cylindrico interrupto, pedicellis aggregatis subternis, bracteis minutis. *Amer. bor.* (Narthecium Mx.)

glutinosa Pursh. 8. T. scapo nudo glanduloso-pubescente, racemo ovato coarctato, pedicellis glutinosis, bracteis minutis, staminibus petala spathulata superantibus. *Amer. bor.* (Narthecium Mx. Melanthium aspericaule Poir.?)

1362. HELONIAS.

latifolia Mx. 1. H. scapo nudo, foliis lanceolato-ensiformibus nervosis, racemo ovato conferto, bracteis lineari-lanceolatis. *Amer. bor.* (H. bullata L.)

virescens Kunth. 2. H. foliis linearibus striatis caulem foliatum aequantibus, racemo subcomposito, pedicellis elongatis, bracteis ovato-lanceolatis abbreviatis. *Nov. Hispan.*

erythrosperma Mx. 3. H. caule folioso, foliis lanceolato-linearibus, racemo oblongo, seminibus arillatis. *Amer. bor.* (H. laeta Sims. Melanthium laetum Ait., phalangioides Lam. Anthericum sub-3gynum Jacq.)

angustifolia Mx. 4. H. caule inferne foliato, foliis linearibus elongatis, racemo oblongo laxo, bracteis abbreviatis, seminibus linearibus. *Carolina.*

1363. XEROPHYLLUM Mx.

gramineum Nutt. 1. X. caule foliato, foliis linearibus subtus glaucis, panicula diffusa, petalis lanceolatis, staminibus brevissimis. *Amer. bor.* (Helonias Ker.)

tenax Nutt. 2. X. caule foliato, foliis subulato-setaceis longissimis, racemo laxo, filamentis petala elliptica superantibus. *Amer. bor.* (Helonias Pursh)

asphodeloides Nutt. 3. X. caule foliato, foliis subulato-setaceis, racemo oblongo conferto, bracteis setaceis, filamentis petala aequantibus. *Amer. bor.* (X. setifolium Mx. Helonias L.)

1364. ASTELIA Banks.

alpina R. Br. 1. A. foliis strictis utrinque sericeis, racemo composito, pedunculis paucifloris, baccis 1locularibus. *Terra Diemen.*

Menziesiana Sm. 2. A. foliis strictis subtus sericeis, scapo hirsuto, racemo paniculato, baccis 3locularibus. *Ins. Sandwich.*

pumila * 3. A. foliis lanceolatis rigidis utrinque glaberrimis apice subserrulatis subtus 3nerviis, axillis paleaceis, pedunculis 1floris brevissimis. *Terra ignis.* (Melanthium pumilum Forst. Funckia W.)

† 1365.

† 1365. HYDROMYSTRIA Meyer.

stolonifera Meyer. *Surinam.* Herba aquatica stolonifera, foliis petiolatis suborbiculatis nitidis, floribus albis pedunculatis.

1366. TRIGLOCHIN.

* *Fructu 6partito, s. capsulis sex.*

procerum R. Br. 1. Tr. scapo elongato, floribus racemosis, fructu prismatico stylis linearibus persistentibus coronato. *Nov. Holl. Nov. Hispan. Nov. Caesar.* (Tr. elatum Nutt., mexicanum Kunth.)

maritimum 2. Tr. scapo folia subexcedente, floribus racemoso-spicatis, fructu ovato angulato stylis persistentibus recurvis coronato. *Europ. Amer. bor. salsa.*

** *Fructu 3partito, s. capsulis tribus.*

† *Radice fibrosa.*

palustre 3. Tr. scapo elongato, floribus racemosis, fructu lineari angulato basi attenuato apice nudo. *Europ. Asia. Amer. bor.*

† *dubium* R. Br. 4. Tr. scapo elongato, floribus racemoso-spicatis, fructu lineari angulato, capsula una alterave subabortiente. *Nov. Holl.*

triandrum Mx. 5. Tr. scapo folia aequante, floribus racemosis 1-4-andris, fructu basi gibbo. *Carolina austr.*

striatum R. et P. 6. Tr. scapo filiformi striato folia linearia nervosa aequante, spica simplici coarctata subracemosa, fructu subrotundo. *Peru.*

montevidense * 7. Tr. radice stolonifera, scapo racemoso foliis breviori, fructu globoso 2-3partito. *Monte Video.* Sello.

decipiens R. Br. 8. Tr. fructu subrotundo apice nudo, capsulis ternis alternantibus dissepimentum formantibus. *Nov. Holl. Terra Diemen.*

mucronatum R. Br. 9. Tr. spica pauciflora, fructu subturbinato stylis recurvis coronato, capsulis ternis alternis dissepimentum formantibus. *Nov. Holl.*

ciliatum R. et P. 10. Tr. caule foliato superne torto, foliis alternis vaginantibus ciliatis, spica subramosa, floribus bracteatis, fructu ovato. *Peru.*

†† *Radice bulbosa.*

Barrelieri Lois. 11. Tr. foliis scapum racemosum aequantibus, fructu subprismatico. *Gallia austr. Corsica. Sicilia. Afric. bor.*

bulbosum 12. Tr. foliis scapum racemosum aequantibus, fructu basi gibbo apice attenuato. *C. B. S.*

1367. MELANTHIUM.

uniflorum Jacq. 1. M. foliis lineari-lanceolatis ciliatis caulem pauciflorum superantibus, petalis lanceolatis subunguiculatis. *C. B. S.* (M. gracile Desrouss.? Tulipa Breyniana L.)

punctatum Cav. 2. M. acaule, foliis lanceolatis carinatis imbricatis, floribus sessilibus. *Mauritania.*

gramineum Cav. 3. M. acaule, foliis linearibus carinatis imbricatis, floribus sessilibus, petalis lanceolatis subunguiculatis. *Mauritania.*

junceum Jacq. 4. M. foliis lineari-subulatis superioribus basi latioribus caulem superantibus, spica flexuosa. *C. B. S.* (M. Squetrum Thunb.)

secundum Lam. 5. M. foliis linearibus elongatis punctato-tuberculatis, floribus spicatis secundis ebracteatis. *C. B. S.*

luteum Th. 6. M. foliis lanceolatis planis, floribus spicatis, petalis obtusis. *Japon.*

ciliatum Th. 7. M. foliis ensiformibus cucullatis cartilagineo-ciliatis, floribus spicatis. *C. B. S.*

glaucum Nutt. 8. M. foliis gramineis glaucis marginatis, racemo simplici paucifloro. *Ad lacus magnos Amer. bor.*

sibiricum 9. M. foliis radicalibus linearibus, caule nudiusculo, racemo subcomposito bracteato, petalis subexunguiculatis. *Sibir.*

hybridum Walt. 10. M. foliis oblongo-linearibus subplicatis, panicula racemosa pubescente superne feminea, petalis subrotundis undulatis, glandulis coalitis, stylis uncinatis. *Carolina.* (M. latifolium Lam. racemosum Mx.)

monoecum Walt. 11. M. foliis lineari-lanceolatis, panicula racemosa superne feminea, petalis oblongis planis, stylis abbreviatis. *Carolin.* (M. polygamum Walt.)

virginicum 12. M. foliis lineari-lanceolatis, caule pubescente, panicula pyramidata, floribus omnibus ☿, petalis oblongis subhastatis planis. *Amer. bor.* (Helonias virginica Sims. Leimanthium W.)

1368. ANGUILLARIA R. Br.

uniflora R. Br. 1. A. caule 1floro, foliis laxis basi vaginantibus cucullatis. *Terra Diemen.*

indica R. Br. 2. A. caule sub-1floro foliis linearibus multo brevioribus, foliis floralibus latioribus. *Malabar.* (Melanthium indicum L.)

biglandulosa R. Br. 3. A. spica pauciflora, floribus hermaphroditis, unguibus petalorum 2glandulosis. *Nov. Holl.*

dioeca R. Br. 4. A. floribus spicatis dioecis, unguibus petalorum subvittatis. *Nov. Holl. Terra Diemen.*

capensis * 5. A. foliis lanceolatis basi vaginantibus cucullatis, floribus racemosis, petalis punctatis. *C. B. S.* (Melanthium capense L., aethiopicum Thunb. apud Desrouss.)

cochinchinenſis *6. A. caule procumbente aculeato, foliis ternis triquetris, pedunculis axillaribus 1floris. *Cochinchina.* (Melanthium cochinchinenſe Lour.)

1369. ZIGADENUS Mx.

glaberrimus Mx. 1. Z. caule folioſo, foliis linearibus canaliculatis elongatis, racemo compoſito, bracteis ovatis acuminatis. *Carolina auſtr.* (Melanthium virginicum Walt.? Helonias glaberrima Sims.)

elegans Pursh. 2. Z. caule ſubaphyllo folia radicalia linearia ſuperante, racemo ſubcompoſito, bracteis linearibus. *Amer. bor.*

1370. ORNITHOGLOSSUM Salisb.

viride Salisb. *C. B. S.* Herba caule ſubramoſo foliato, foliis lanceolatis diſtichis, floribus pedunculatis cernuis viridi-purpureis. (Melanthium viride Th.)

1371. CALOCHORTUS Pursh.

elegans Pursh. *Louiſiana.* Herba radice bulboſa, folio radicali ſolitario gramineo, ſcapo 3floro, floribus albis.

1372. NOLINA Mx.

georgiana Mx. *Carolina auſtr. Georgia.* Herba radice bulboſa, foliis linearibus rigidiuſculis, ſcapo ramoſo ſquamato, floribus racemoſis albis. (Phalangium virgatum Lam.)

1373. WURMBEA Thunb.

longiflora W. 1. W. foliis lanceolatis acuminatis vaginantibus erectis ſpica flexuoſa ſubbrevioribus, tubo corollae limbum ſuperante, laciniis patulis oblongis obtuſis. *C. B. S.* (Melanthium Wurmbeum Thunb.)

campanulata W. 2. W. foliis lineari-lanceolatis vaginantibus ſpicam cylindricam denſam aequantibus, tubo corollae campanulato limbum patentem aequante. *C. B. S.* (Melanthium 1petalum L. ſuppl. Ker. W. pumila W. var.)

purpurea Dryand. 3. W. foliis linearibus baſi cucullatis ſpicam ſtrictam ſuperantibus, corollae tubo breviſſimo, laciniis limbi patentiſſimis acutis. *C. B. S.* (Melanthium ſpicatum Houtt. Ker.)

1374. XEROTES R. Br.

* *Flores ♀ capitati: folia apice integerrima.*

flexifolia R. Br. 1. X. foliis diſtichis acutis denticulatis flexuoſis, ſpica mascula ſubramoſa folia ſuperante. *Nov. Holl.* (Dracaena obliqua Thunb.)

mucronata R. Br. 2. X. foliis diſtichis ſtrictis mucronatis denticulatis baſi dilatatis integris ſpica mascula longioribus. *Nov. Holl.*

collina R. Br. 3. X. foliis linearibus ſtrictis denticulatis acutiſſimis baſi dilatatis laceris elongatis, capitulo ♀ ſeſſili. *Nov. Holl.*

glauca R. Br. 4. X. foliis linearibus ſtrictis elongatis obtuſiuſculis denticulatis baſi dilatatis laceris, ſpicae ♂ glomerulis ſeſſilibus. *Nov. Holl.*

leucocephala R. Br. 5. X. foliis anguſte linearibus margine laevibus caule multo longioribus, floribus utrisque capitatis, receptaculo lanato. *Nov. Holl.*

** *Flores utrique racemoſi, vel ♀ ſpicati ♂ paniculati.*

pauciflora R. Br. 6. X. foliis anguſtiſſime linearibus acutis laevibus baſi dilatata integra caule diviſo brevioribus, racemo ♂ paucifloro, verticillis diſtantibus. *Nov. Holl.*

filiformis R. Br. 7. X. foliis filiformi-ſemiteretibus elongatis margine ſcabris ſubtus ſtriatis caule longioribus, racemo ♂ ſubſimplici. *Nov. Holl.*

tenuifolia R. Br. 8. X. foliis filiformibus elongatis ſupra canaliculatis ſubtus ſulcato-ſtriatis, racemis ♂ ſubdiviſis, ramis alternis. *Nov. Holl.*

gracilis R. Br. 9. X. foliis longiſſimis anguſtiſſime linearibus apice planis integerrimis ſupra canaliculatis ſubtus ſtriatis, paniculis ♂ raris, ramis alternis. *Nov. Holl.*

denticulata R. Br. 10. X. foliis elongatis compreſſo-filiformibus canaliculatis apice 2-3dentatis, racemis ♂ ſubdiviſis. *Nov. Holl.*

laxa R. Br. 11. X. foliis elongatis linearibus planis apice integris, paniculis ♂ effuſis, ramis verticillatis, racemis raris, pedicellis ſolitariis perianthio ſubgloboſo brevioribus bracteola longioribus. *Nov. Holl.*

*** *Flores ſpicati ſ. paniculati, ramis oppoſitis verticillatis. Perianthia ♂ ſeſſilia, bracteis imbricata. Capſula laevis. Folia apice denticulata. Acaules.*

rigida R. Br. 12. X. foliis diſtichis cartilagineis ſubtus convexis margine laevibus, apice 2dentato ſemitruncatis, ſcapo ſpicisque abbreviatis, antheris alternis diformibus. *Nov. Holl.* (Lomandra Labill.)

montana R. Br. 13. X. foliis elongatis linearibus planis membranaceis margine laevibus, apicis acuti denticulis lateralibus breviſſimis, ſpica ♀ indiviſa abbreviata. *Nov. Holl.*

fluviatilis R. Br. 14. X. foliis elongatis anguſte linearibus canaliculatis margine laevibus apice 2-3dentatis, ſimul acuto, ſpicis ♀ ſubdiviſis, bracteis elongatis rigidis. *Nov. Holl.*

longifolia R. Br. 15. X. foliis elongatis ſubfalcato-enſiformibus apice exciſis inaequaliter 3dentatis, ſcapo ancipiti, flo-

ribus verticillatis, bracteis rigidis elongatis. *Nov. Holl. Terra Diemen.* (Lomandra Labill.)

Hyſtrix R. Br. 16. X. foliis elongatis linearibus laxis apice ſubdentatis, ſcapo utrinque convexiusculo, verticillis florum approximatis, bracteis foliaceis longiſſimis rigidis. *Nov. Holl.*

arenaria R. Br. 17. X. foliis elongatis linearibus margine laevibus apice eroſo-dentatis, panicula ♂ ſimplici, ramis oppoſitis, glomerulis globoſis, bracteis ſubulatis reflexis, perianthio obtuſo. *Nov. Holl.*

******** *Panicula ♂ verticillata, floribus pedicellatis glomeratis nutantibus. Capſ. rugoſa. Folia apice integra. Acaules.*

diſtans R. Br. 18. X. foliis longiſſimis canaliculatis margine ſcaberrimis, paniculae ♂ ramis indiviſis, glomerulis diſtantibus pedicellis perianthioque brevioribus. *Nov. Holl.*

media R. Br. 19. X. foliis longiſſimis canaliculatis margine laevibus, paniculae ♂ ramis indiviſis, glomerulis ſub-5floris, ſpica ♀ ramoſa, capitulis pedunculatis. *Nov. Holl.*

decompoſita R. Br. 20. X. foliis longiſſimis canaliculatis margine laevibus, paniculae ♂ decompoſitae glomerulis paucifloris. *Nov. Holl.*

multiflora R. Br. 21. X. foliis longiſſimis canaliculatis dorſo margineque glabriusculis, paniculae ♂ ramis indiviſis, glomerulis multifloris, pedicellis perianthio longioribus. *Nov. Holl.* (X. aemula R. Br.)

Bankſii R. Br. 22. X. caulescens, foliis diſtichis planis margine ſcabris, thyrſo ♀ ſcapum ancipitem ſubaequante, ramis 4gonis breviſſimis. *Nov. Holl.*

********* *Spica ♂ et ♀ cylindrica.*

haſtilis R. Br. 23. X. acaulis, ſpica longiſſima, ſcapo tereti, foliis elongatis. *Nov. Holl.*

1375. FLAGELLARIA.

indica *Ind. or. Inſ. Molucc.* Fruticulus ſcandens, foliis diſtichis lanceolatis acuminatis cirrho convoluto terminatis, floribus terminalibus paniculatis albis.

1376. TRILLIUM.

***** *Floribus erectis.*

ſeſſile 1. Tr. flore ſeſſili, petalis lanceolatis erectis (fuſcis) calyce duplo longioribus, foliis ſeſſilibus ovato-oblongis acutis. *Amer. bor.*

petiolatum Purſh. 2. Tr. flore ſeſſili, petalis lineari-lanceolatis erectis calyce ſublongioribus, foliis longiſſime petiolatis ovali-lanceolatis acutis. *Ad fontes fl. Columbiae. Amer. bor. occid.*

ovatum Pursh. 3. Tr. flore pedunculato, petalis oblongis acutis patentibus (purpureis) calyce lineari sublongioribus, foliis ovatis acutis sessilibus. *Ad fl. Columbiam. Amer. bor. occid.*

pusillum Mx. 4. Tr. flore pedunculato, petalis (carneis) calycem aequantibus, foliis ovali-oblongis obtusis sessilibus. *Carolin. austr.* (Tr. pumilum Pursh.)

obovatum Pursh. 5. Tr. flore pedunculato, petalis obovatis obtusiusculis calycem aequantibus (subroseis), foliis ovato-rhombeis acuminatis sessilibus. *Canada. Camtschatca.*

undulatum W. 6. Tr. flore pedunculato erecto, petalis oblongis acutis undulatis calyce angusto longioribus, foliis ovatis acuminatis sessilibus. *Amer. bor.*

** *Floribus cernuis, nutantibus, pendulis.*

erythrocarpon Mx. 7. Tr. pedunculo cernuo, petalis ovali-lanceolatis calyce angusto longioribus acuminatis (albis basi purpureis), foliis subcordato-ovatis petiolatis. *Amer. bor.* (Tr. pictum Pursh.)

grandiflorum Salisb. 8. Tr. pedunculo inclinato, flore cernuo, petalis spathulato-lanceolatis patentibus calycem excedentibus basi conniventibus (albis), foliis late rhombeo-ovatis acutis. *Amer. bor.*

rhomboideum Mx. 9. Tr. pedunculo inclinato, flore nutante, petalis ovatis acuminatis patentibus calycem aequantibus (fusco-purpureis), foliis late rhombeis acuminatis sessilibus. *Amer. bor.* (Tr. erectum L. purpureum Kin. apud Ell.)

cernuum 10. Tr. pedunculo recurvato, petalis lanceolatis acuminatis reflexis calycem aequantibus (albis), foliis late rhombeis acutis breviſſime petiolatis. *Amer. bor.*

Catesbaei Ell. 11. Tr. pedunculo recurvato, petalis lanceolatis acuminatis calycem superantibus (roseis), foliis obovatis acutis basi attenuatis. *Carolin. austr.*

nervosum Ell. 12. Tr. pedunculo recurvato, petalis oblongo-lanceolatis calycem superantibus (roseis), foliis lanceolatis 3nerviis. *Carolina, Georgia.*

styloſum Nutt. 13. Tr. pedunculo recurvo abbreviato, petalis oblongis obtusis undulatis calyce longioribus latioribusque (roseis), stylis coalitis, foliis elliptico-lanceolatis subpetiolatis. *Carolina. Georgia.*

pendulum W. 14. Tr. pedunculo inclinato, flore pendulo, petalis ovatis acutis planis calycem aequantibus (ochroleucis venosis), foliis subsessilibus subrotundo-rhombeis acuminatis. *Pensylvan.*

1377. MEDEOLA.

virginica *Amer. bor.* Herba e radice tuberosa, foliis verticillatis oblongo-lanceolatis acuminatis, floribus pedunculatis aggregatis flavo-virentibus. (Gyromia Nutt.)

1378. MYRSIPHYLLUM W.

asparagoides W. 1. M. foliis ovatis basi subcordatis obliquis. *C. B. S.* (Medeola L.)

angustifolium W. 2. M. foliis ovato-lanceolatis. *C. B. S.* (Medeola L.)

1379. VERATRUM.

nigrum 1. V. panicula supradecomposita, bracteis elongatis, pedicellis tomentosis, petalis patentissimis subintegerrimis, foliis ovato-oblongis plicatis. *Hungar. Sibir.*

album 2. V. panicula decomposita, bracteis flores subaequantibus, pedicellis pubescentibus, petalis erectiusculis obtusiusculis serrulatis, foliis ovato-oblongis plicatis. *Europ. austr.* (V. Lobelianum Bernh. var.)

viride Ait. 3. V. panicula decomposita, bracteis ciliatis pedicellos tomentoso-floccosos aequantibus, petalis patulis acutiusculis serrulatis, foliis ovato-oblongis plicatis. *Amer. bor.* (V. album Mx.)

parviflorum Mx. 4. V. panicula composita, bracteis pedicellos villosos superantibus, petalis patentibus subdenticulatis basi staminiferis, foliis oblongo-lanceolatis planis subtus pubescentibus. *Amer. bor.* (Melanthium bracteolare Desrouss.)

† *Sabadilla* Retz. 5. V. racemo spicato, floribus secundis subnutantibus, petalis ovatis basi staminiferis, capsulis oligospermis. *Patria?*

angustifolium Pursh. 6. V. panicula simplici, petalis linearibus, foliis longissimis linearibus carinatis. *Virginia. Carolina.*

luteum 7. V. racemo elongato nutante, pedicellis aggregatis glabris, petalis linearibus, foliis radicalibus oblongo-lanceolatis obtusiusculis. *Amer. bor.* (Melanthium densum Lam. Helonias lutea Sims., dioeca Pursh., pumila Jacq. Chamaelirium W.)

1380. DIOSCOREA.

* *Foliis compositis.*

pentaphylla 1. D. foliis alternis quinato-ternatis glabris, foliolis oblongo-lanceolatis cuspidatis venosis, caule aculeato bulbifero. *Ind. or. Inf. Molucc.*

triphylla 2. D. foliis alternis ternatis glabris, foliolis ovato-oblongis acuminatis 5nerviis, caule aculeato, racemis paniculatis. *Ind. or. Inf. Molucc.*

trifoliata Humb. 3. D. foliis alternis ternatis glabris, foliolis ovatis acuminatis 3nerviis, caule inermi, spicis ♂ aggregatis simplicibus. *Caracas.*

tomentosa * 4. D. foliis alternis ternatis subtus tomentosis, foliolis oblongis mucronatis, lateralibus obliquis altero latere 3nerviis, spicis masculis compositis,

femineis simplicibus capsulisque tomentosis. *Ind. orient.*

** *Foliis lobatis.*

septemloba Thunb. 5. D. foliis alternis cordatis 7lobis 7nerviis glabris, floribus axillaribus racemosis. *Japon.*

quinqueloba Thunb. 6. D. foliis alternis cordatis 5lobis 9nerviis acuminatis, racemis axillaribus simplicibus filiformibus subgeminis. *Japon.*

† *palmata* Perf. 7. D. foliis palmatis 4-5lobis acuminatis. *Amer. austr.*

trifida L. suppl. 8. D. foliis cordatis 3lobis, lobis lateralibus sinuato-lobatis nervosis glabris, caule 4angulo alato, paniculis axillaribus. *Surinam.*

triloba Lam. 9. D. foliis cordatis 3lobis acutis 5nerviis, petiolis canleque ancipiti-alatis. *Patria?*

brasiliensis W. 10. D. foliis cordatis 3lobis acutis 7nerviis, caule tereti compresso, spicis axillaribus aggregatis abbreviatis. *Brasil.*

*** *Foliis cordatis.*

† *peltata* Perf. 11. D. foliis subpeltatis basi cordato-truncatis oblongis acuminatis. *Patria?*

angustifolia Lam. 12. D. foliis subcordato-lanceolatis 3nerviis caulequе laevibus, racemis simplicibus. *Peru.*

cayennensis Lam. 13. D. foliis cordato-hastatis basi subtruncatis 5nerviis, racemis axillaribus solitariis simplicibus. *Cayenna.*

verticillata Lam. 14. D. foliis ternis longe petiolatis subcordatis margine petiolisque aspero-denticulatis sub-5nerviis, caule sarmentoso muricato. *Java.*

nummularia Lam. 15. D. foliis oppositis cordato-oblongis cuspidatis 5nerviis, spicis compositis verticillatis filiformibus, fructibus suborbicularibus. *Inf. Molucc.*

punctata R. Br. 16. D. foliis oppositis alternisque cordatis acuminatis 5nerviis reticulatis puncticulatis, spicis ♂ fasciculatis, ♀ subsolitariis. *Nov. Holl.*

transversa R. Br. 17. D. foliis alternis truncato-cordatis nitidis puncticulatis acuminatis 5nerviis venosis. *Nov. Holl.*

pilosiuscula Berter. 18. D. foliis subcordato-oblongis cuspidatis 5nerviis subtus pilosiusculis, racemis elongatis simplicibus, capsulis hirsutis. *Hispaniola.*

perforata Bert. 19. D. foliis cordato-oblongis acuminatis 5nerviis foratis subtus ramisque hirsutis. *Guadalupa.*

lutea Meyer. 20. D. foliis cordato-ovatis acuminatis glabris 5nerviis, nervis extimis 2partitis, racemis geminis simplicissimis glaberrimis. *Surinam.*

aculeata 21. D. foliis profunde cordatis acuminatis 7nerviis, caule aculeato bulbifero. *Malabar. Inf. Molucc.*

alata 22. D. foliis oppositis sagittatis cuspidatis 7nerviis, nervis extimis 2partitis, caule alato bulbifero. *Ind. or. Inf. Molucc.*

bulbifera 23. D. foliis alternis profunde cordatis acuminatis 7nerviis, nervis extimis 2fidis, venis transversis

reticulatis, caule bulbifero, spicis ♂ fasciculatis. *Ind. or. Nov. Holl.*

altissima Lam. 24. D. foliis oppositis cordatis subrotundo-ovatis acutis 7nerviis, caule tereti laevi, racemis simplicibus pendulis. *Martinica.* (D. martinicensis*).

eburnea Lour. 25. D. foliis cordatis acuminatis glabris 7nerviis, ramis 4gonis, racemis simplicibus elongatis, floribus hermaphroditis. *Cochinchina.*

trachycarpa Humb. 26. D. foliis cordato-lanceolatis cuspidatis 7nerviis reticulato-venosis, spicis ♀ simplicibus, capsulis papilloso-asperis. *Guiana.*

polygonoides Humb. 27. D. foliis alternis cordato-ovatis acuminatis 7nerviis, lobis baseos distantibus, caule laevi tereti. *Ad Orinocum.*

coriacea Humb. 28. D. foliis cordato-oblongis acuminatis coriaceis 7nerviis, spicis axillaribus elongatis aggregatis, caule tereti laevi. *Quito.*

cuspidata Humb. 29. D. foliis alternis cordato-lanceolatis longissime acuminatis 7nerviis, racemis simplicibus longissimis, caule tereti. *Amer. austr.*

aspera Humb. 30. D. foliis profunde cordatis ovatis acuminatis 7nerviis utrinque glabris subtus nitidis, spicis ♂ geminis simplicibus, caule scabro. *Ad Orinoc.*

scabra Humb. 31. D. foliis truncato-cordatis late ovatis 7nerviis utrinque glabris subtus nitidis, spicis ♂ solitariis 2fidis, caule aspero. *Ad Orinoc.*

pubescens Poir. 32. D. foliis profunde cordatis ovatis acuminatis 7nerviis subtus pubescentibus, racemis axillaribus compositis villosiusculis. *Cayenn.*

rotundata Poir. 33. D. foliis oppositis cordato-subrotundis acuminatis 7nerviis glabris, spicis aggregatis filiformibus folio brevioribus. *Portorico.*

sagittata Poir. 34. D. foliis alternis sagittatis acuminatis 9nerviis reticulatis glabris, spicis ♀ elongatis pedunculatis, capsulis ellipticis. *Cayenn.*

villosa 35. D. foliis alternis oppositis verticillatisque cordatis acuminatis 9nerviis subtus pubescentibus, nervis extimis simplicibus, racemis compositis glabris. *Amer. bor.* (D. quinata Walt., paniculata Mx.)

quaternata Walt. 36. D. foliis quaternis alternisve cordatis acuminatis 9nerviis utrinque glabris, nervis lateralibus 2fidis, racemis compositis. *Amer. bor.*

piperifolia Humb. 37. D. foliis alternis cordatis ovatis acuminatis 9nerviis, lobis baseos approximatis, capsulis ellipticis. *Amer. austr.*

sativa 38. D. foliis alternis cordatis subrotundo-ovatis cuspidatis 9nerviis, lobis baseos approximatis, capsulis obovatis, caule tereti laevi. *Ind. or. Inf. Molucc.*

japonica Thunb. 39. D. foliis suboppositis cordatis oblongis acuminatis 9nerviis, petiolis 4gonis, caule angulato glabro. *Japon.*

lucida R. Br. 40 D. foliis alternis cordatis acuminatis 9nerviis nitidis, venulis parallelis subsimplicibus, ramulis angulato-striatis. *Nov. Holl.*

***Foliis oblongis.*

oppositifolia 41. D. foliis oppositis ovato-oblongis acutis 5nerviis glabris, spicis paniculatis elongatis, caule tereti laevi. *Ind. or.*

cirrhosa Lour. 42. D. foliis oppositis alternisque oblongo-lanceolatis oblique acuminatis glaberrimis 3nerviis, spicis axillaribus compositis, floribus hermaphroditis 3andris, caule cirrhoso. *Ind. or. Cochinchina.*

1381. RAJANIA.

hexaphylla Thunb. 1. R. foliis digitatis senis glabris, foliolis oblongis acutis subtus reticulato-venosis, racemis axillaribus. *Japon.*

quinata Thunb. 2. R. foliis digitatis quinatis, foliolis obovatis emarginatis mucronatis, floribus corymbosis. *Japon.*

quinquefolia 3. R. foliis digitatis quinatis, foliolis oblongo-lanceolatis obtusis 3nerviis, racemis lateralibus simplicibus. *Ind. occid.*

cordata 4. R. foliis subcordato-ovatis acuminatis sub-7nerviis, racemis lateralibus. *Ind. occid. Amer. austr.*

flexuosa Poir. 5. R. foliis cordato-lanceolatis acuminatis reticulato-venosis, racemis flexuosis subcompositis. *Peru.*

lobata Poir. 6. R. foliis cordato-sagittatis acuminatis 3nerviis, lobis baseos sublobatis, racemis compositis elongatis. *Peru.*

hastata 7. R. foliis hastato-lanceolatis mucronatis 3nerviis, racemis axillaribus filiformibus. *Hispaniola.*

ovata Sw. 8. R. foliis ovatis acuminatis 3nerviis, racemis axillaribus subcompositis. *Hispaniola.*

mucronata W. 9. R. foliis oblongo-spathulatis obtusis mucronatis 3nerviis, racemis geminis axillaribus abbreviatis. *Hispaniola.*

angustifolia Sw. 10. R. foliis lineari-lanceolatis basi rotundatis 3nerviis, racemis geminis axillaribus. *Hispaniola.*

1382. MENISPERMUM.

**Hexandra.*

† *Cal.* 3*sepalus bracteatus: cor.* 3*petala.*

a. Nectaria 6. *Cocculus Colebr.*

palmatum Lam. 1. M. foliis cordato-orbiculatis 5fido-palmatis reticulatis rufo-pilosis, racemis axillaribus folio brevioribus. *Afr. or. Inf. Mascaren.*

trilobum Thunb. 2. M. foliis 3lobis nervosis villosis, racemis axillaribus glabriusculis. *Japon. Bengal.* (M. tomentosum Roxb.)

japonicum Thunb. 3. M. foliis peltatis subrotundo-ovatis acuminatis subtus glaucis petiolum aequantibus, floribus umbellatis, fructibus binis. *Japon.*

*Roxburghii** 4. M. foliis peltatis ovatis hinc rotundatis illinc subacutis subtus glaucis nervosis petiolum superantibus, floribus ♀ umbellatis, fructibus subsenis. *Ind. or.* (M. japonicum Roxb.)

malabaricum W. 5. M. foliis cordatis ovatis acuminatis subtus villosis, floribus racemosis hermaphroditis (?) *Malabar.*

*Chondrodendron** 6. M. foliis cordatis subcrenatis acutis subtus tomentosis. *Peru.* (Chondrodendron tomentosum R. et P. Epibaterium Pers.)

*diversifolium** 7. M. foliis inferioribus cordatis, superioribus ovato-oblongis apice truncatis mucronatis, pedunculis subsfloris folio brevioribus. *Mexico.* (Cocculus Cand.)

†*acutum* Thunb. 8. M. foliis cordato-hastatis acuminatis subtus glaucis cauleque striato glabris. *Japon.*

*sagittatum** 9. M. foliis cordato-sagittatis lanceolatis cuspidato-mucronatis glabris, racemis compositis axillaribus. *Montevideo.* Sello.

polycarpon Roxb. 10. M. foliis cordatis acutis nitidis, racemis ♂ compositis, ♀ simplicibus, fructibus subduodenis. *Coromandel.* (Tiliacora racemosa Colebr.)

hexagynum Roxb. 11. M. foliis cordatis paraboliciisque obtusis mucronatis subtus subpubescentibus, paniculis axillaribus villosis, bracteis lanatis, germinibus senis. *China austr.* (Cocculus Colebr.)

villosum Roxb. 12. M. foliis cordatis mucronatis 5nerviis utrinque villosis, paniculis axillaribus folio brevioribus. *Bengal. orient.* (Cocculus Colebr.)

hirsutum 13. M. foliis cordato-oblongis obtusis mucronatis utrinque hirsutis, floribus ♂ racemosis, ♀ solitariis. *Ind. or.* (Cocculus sepium Colebr.)

crispum 14. M. foliis cordato-subrotundis acuminato-cuspidatis glabris, caule 4angulo verrucoso, floribus ♂ fasciculato-racemosis, ♀ simpliciter racemosis. *Bengal.* (M. tuberculatum α. Lam.)

cordifolium W. 15. M. foliis late-cordatis subrotundis acuminatis 5nerviis glabris, racemis axillaribus elongatis, floribus solitariis. *Ind. or.*

acuminatum Lam. 16. M. foliis subcordato-oblongis acuminatis glabris sub-5nerviis, racemis axillaribus elongatis, floribus aggregatis. *Ind. or.*

laurifolium Roxb. 17. M. foliis lanceolatis lucidis 3nerviis, racemis axillaribus compositis abbreviatis. *Nepal.* (Cocculus Colebr.)

*oblongifolium** 18. M. foliis ovato-oblongis obtusis mucronatis 3nerviis glabris, floribus ♂ racemosis, ♀ solitariis *Mexico.* (Cocculus Cand.)

*Limacia** 19. M. foliis ovato-oblongis acuminatis integerrimis glabris, floribus ♂ terminalibus congestis, ♀ axillaribus geminis. *Cochinchina.* (Limacia scandens Lour.)

Icaeba Delil. 20. M. foliis oblongis obtusis mucronatis triplinerviis glaucis glabris, junioribus linearibus, racemis ♂ paucifloris folio brevioribus, floribus ♀ solitariis. *Aegypt. super.*

*Epibaterium** 21. M. foliis oblongis, floribus monoecis. *Inf. maris pacifici.* (Epibaterium pendulum Forst.)

*reniforme** 27. M. foliis ovatis emarginatis, floribus monoecis, ♂ racemosis, ♀ ternis 6gynis, fructibus senis reniformibus. *Cochinchina.* (Nephroia sarmentosa Lour.)

β. Nectaria 0.

fenestratum Gärtn. 23. M. foliis cordatis acutiusculis sub-5nerviis supra nitidis subtus pilosissimis, pedunculis umbellatis. *Ceylon.* (Coscinium Colebr.)

*tinctorium** 24. M. foliis ovatis acutis nervosis, floribus racemosis. *China. Cochinchina.* (Fibraurea tinctoria Lour.)

†† *Cal.* 6*sepalus: cor.* 6*petala.*

peltatum Lam. 25. M. foliis peltatis triangulari-oblongis acuminatis basi subcordato-truncatis, paniculis lateralibus elongatis flaccidis. *Ind. or. Ceylon.*

*rotundifolium** 26. M. foliis subpeltatis subcordato-orbiculatis mucronatis glabris, pedunculis axillaribus racemoso-paniculatis folio brevioribus. *Patria?* (Cocculus Cand.)

*populifolium** 27. M. foliis cordatis acuminatis glabris, paniculis ♀ ramosissimis multifloris. *Inf. Molucc.* (Cocculus Cand.)

orbiculatum 28. M. foliis subcordato-orbiculatis obtusis mucronatis 5—7nerviis subtus cinereo-pubescentibus, pedunculis ♂ subternis subramosis petiolo brevioribus. *Ind. or. Japon?*

glaucum Lam. 29. M. foliis cordato-ovatis acutis subtus pubescentibus glaucis, pedunculis racemoso-corymbosis folio brevioribus. *Inf. Molucc.* (M. Cocculus W.)

lacunosum Lam. 30. M. foliis cordatis acutis subtus glaucis subfurfuraceis, racemis paniculatis pendulis, cortice lacunoso. *Ind. or. Inf. Molucc.* (M. Cocculus Gärtn.)

flavescens Lam. 31. M. foliis subcordatis ovatis obtusiuscule acuminatis, junioribus subpubescentibus orbiculatis, racemis ♀ paniculatis lateralibus folio longioribus. *Inf. Molucc.*

*tamoides** 32. M. foliis basi truncato-cordatis ovatis acuminatis 5nerviis glabris, racemis ♂ gracilibus folia excedentibus. *Cayenn.* (Cocculus Cand.)

carolinum 33. M. foliis cordatis ovatisque obtusiusculis subglobis subtus villosis, racemis ♂ folium aequantibus, ♀ 3fidis 3floris. *Carolina. Georgia.* (Androphylax scandens Wendl., Wendlandia populifolia W. Pursh.)

† *hastatum* Lam. 34. M. foliis cordato-hastatis mucronatis subtus villosis. *Ind. or.*

*Cotoneaster** 35. M. foliis oblongis venosis mucronatis subtus tomentosis, racemis axillaribus folio brevioribus. *Amer. austr.?* (Cocculus Cand.)

ovalifolium Vahl. 36. M. foliis ovali-oblongis retusis basi attenuatis trinerviis glabris, racemi terminalis pedicellis abbreviatis sub-4floris. *Java. China.*

ellipticum Poir. 37. M. foliis ellipticis glabris nervoso-venosis, racemis axillaribus geminis inaequalibus folio brevioribus. *Afric. occid.*

domingense * 38. M. foliis ovali-oblongis acutis sub-3nerviis glabris, petiolis apice incrassatis, paniculis ramosissimis elongatis, pedunculis aggregatis. *Hispaniola.* (Cocculus Cand.).

edule Vahl. 39. M. foliis ovali-oblongis mucronatis nitidis glabris, pedunculis ♂ cymosis, ♀ 1floris. *Arabia.* (Cebatha Forsk.)

radiatum Lam. 40. M. foliis ovato-oblongis acuminatis nervosis glabris, paniculis racemosis axillaribus elongatis. *Ind. or.*

*leptostachyon** 41. M. foliis oblongis acuminatis trinerviis glabris, racemis axillaribus simplicibus gracilibus folium aequantibus. *Inf. Molucc.* (Cocculus Cand.)

*brachystachyon** 42. M. foliis ovatis acutis 3nerviis glabris, racemis ♀ axillaribus petiolo brevioribus. *Inf. Molucc.* (Cocculus Cand.)

*triflorum** 43. M. foliis ovato-lanceolatis acuminatis 3nerviis glabriusculis, pedunculis ♀ axillaribus 3fidis 3floris petiolum aequantibus. *Java.* (Cocculus Cand.)

*milleflorum** 44. M. foliis ovatis obtusis nervosis nitidis, paniculae ♂ terminalis multiflorae ramulis patentibus geminatis. *Madagascar.* (Cocculus Cand.)

*gomphioides** 45. M. foliis oblongis acuminatis coriaceis 3nerviis nitidis, pedunculis ♀ axillaribus racemosis folio duplo longioribus. *Madagascar.* (Cocculus Cand.)

Abuta Lam. 46. M. foliis ovatis acutis nervosis subtus rufo-villosis, pedunculis axillaribus subracemosis folio brevioribus. *Guiana.* (Abuta rufescens Aubl.)

** *Staminum numerus alienus.*

triandrum Roxb. 47. M. foliis ovato-oblongis acutis glabris, floribus racemosis 3partitis 3andris. *Inf. Maldiv.*

canadense 48. M. foliis peltatis cordatis angulato-repandis, racemis compositis, floribus sub-4fidis 12andris. *Amer. bor.* (M. virginicum L. var.)

dauricum Cand. 49. M. foliis peltatis cordatis angulatis acuminatis glaberrimis, racemis geminis capitellatis. *Dauria.*

Lyoni Pursh. 50. M. foliis cordatis palmato-lobatis longissime petiolatis, racemis simplicibus, floribus 6partitis 12andris. *Amer. bor.*

1383. BATSCHIA Thunb.

racemosa Thunb. 1. B. racemis axillaribus solitariis, floribus raris. *Nov. Granat.* (Trichoa Pers.)

conferta Thunb. 2. B. spicis axillaribus solitariis, floribus confertis. *Nov. Granat.* (Trichoa Pers.)

1384. LARDIZABALA R. et P.

biternata R. et P. 1. L. foliis biternatis, foliolis oblongis acutis basi inaequalibus subdentatis coriaceis, pedunculis ♂ racemosis, ♀ solitariis, bracteis cordatis magnis ad basin pedunculorum. *Chili.*

triternata R. et P. 2. L. foliis 3ternatis, foliolis oblongis obtusiusculis, floribus ♂ subspicatis, ♀ solitariis, pedunculis basi 2bracteatis. *Chili.*

trifoliata Cand. 3. L. foliis simpliciter ternatis, foliolis oblongis obtusis subangulatis, pedunculis subcorymbosis, bracteis minimis. *Peru.*

1385. RUMEX.

1. *Flores hermaphroditi.*

* *Valvae granulo notatae,*

† *subintegerrimae.*

Hydrolapathum Hudf. 1. R. valvis ovato-triangularibus subcartilagineis obtusiusculis omnibus graniferis, foliis radicalibus oblongo-lanceolatis in petiolum decurrentibus margine eroso-crispis. *Europ. fossae.* (R. aquaticus Sm. Lam. Cand., longifolius Cand.)

Britannica 2. R. valvis ovatis acutis omnibus graniferis, granis maximis elongatis, foliis omnibus lanceolatis elongatis utrinque attenuatis. *Virgin.*

maximus Schreb. 3. R. valvis cordatis submembranaceis omnibus graniferis, foliis inferioribus subcordato-oblongis, floralibus lanceolatis. *Europ. paludes.*

glomeratus Schreb. 4. R. valvis oblongis obtusis omnibus graniferis, floribus glomerato-verticillatis, foliis inferioribus ovato-oblongis undulatis. *Europ.* et *Chinae uda.* (R. paludosus Wither., acutus Sm., conglomeratus Roth. divaricatus Thuill.)

Nemolapathum Ehrh. 5. R. valvis lineari-oblongis obtusis, unica granifera, foliis inferioribus cordato-oblongis acutis, superioribus ovato-lanceolatis. *Europ. prata.* (R. nemorosus Schrad., condylodes M. B., sanguineus L. var., ferrugineus W. herb.)

crispus 6. R. valvis subcordato-ovatis omnibus graniferis, floribus verticillato-racemosis, foliis lanceolatis acutis undulato-crispis. *Europ. pascua, arva.*

Patientia 7. R. valvis cordato-orbiculatis obtusis venoso-reticulatis subdenticulatis, unica granifera, foliis cordato-ovatis undulatis. *Europ. austr.* (R. confertus W.)

litoralis Humb. 8. R. valvis ovato-oblongis acutis omnibus graniferis, foliis lanceolatis elongatis, radice annua. *Brasil. Peru.* (R. brasilienſis Link.)

verticillatus 9. R. valvis triangularibus acutis omnibus graniferis, foliis inferioribus cordato-oblongis obtusis undulatis, summis lanceolatis elongatis, vaginis cylindricis. *Amer. bor.*

cuneifolius Campd. 10. R. valvis ovato-lanceolatis acutis omnibus graniferis, foliis inferioribus obovatis obtusis, verticillis superioribus aphyllis. *Bonaria. C. B. S.* (R. spathulatus Thunb.?)

linearis Campd. 11. R. valvis triangulari-ovatis obtusiusculis omnibus graniferis, foliis oblongo-linearibus serrulatis. *C. B. S.*

angustifolius Campd. 12. R. valvis inaequalibus, unica maxima orbiculari granifera, reliquis oblongis obtusis, foliis oblongo-linearibus. *Asia minor.*

salicifolius Weinm. 13. R. valvis aequalibus oblongis obtusis, unica grafera, glomerulis spicatis subaphyllis, foliis lanceolatis integerrimis subundulatis, ramis decumbentibus. *California.*

†† *Valvae dentatae, serratae.*

acutus 14. R. valvis inaequalibus, unica maxima triangulari inciso-dentata granifera, reliquis minoribus obsolete callosis dentatisque, foliis inferioribus subcordato-oblongis acuminatis. *Europ. dumeta.* (R. pusillus Arbr.)

laevigatus W. herb. 15. R. valvis subaequalibus ovato-oblongis obtusis reticulato-venosis basi dentatis, unica granifera, grano globuloso laevi, reliquis obsoletis, foliis cordatis obtusissimis. *Patria?*

sylvestris Wallr. 16. R. valvis aequalibus triangulari-oblongis dentatis omnibus graniferis, foliis cordato-oblongis obtusis crenulatis cauleque glaberrimis. *German. mediae nemora et ipsi pagi.* (R. heterophyllus Schultz.?)

obtusifolius 17. R. valvis triangulari-oblongis obtusiusculis basi profunde dentatis omnibus graniferis, foliis radicalibus cordatis obtusiusculis, summis lanceolatis subtus cauleque ramoso hirsutis. *Europ. prata* et *pascua.* (R. purpureus Poir. var.)

*nepalensis** 18. R. valvis ovato-oblongis obtusis fimbriatis, unica granifera, foliis inferioribus cordatis obtusis, summis oblongo-lanceolatis undulatis ramisque patentibus glabris. *Ind. or. Nepal.* (R. tuberosus Roxb. in W. herb.)

palustris Sm. 19. R. valvis ovato-lanceolatis acutiusculis basi subulato-dentatis omnibus graniferis, foliis radicalibus lanceolato-linearibus acuminatis margine crispo-undulatis. *Europ. med.* (R. limosus Thuill.)

maritimus 20. R. valvis ovato-lanceolatis omnibus graniferis subulato-dentatis, subulis longissimis, verticillis densis foliosis, foliis lanceolato-linearibus. *Europ. palud.* (R. aureus With.)

persicarioides 21. R. valvis ovato-oblongis acutiusculis omnibus graniferis subulato-dentatis, subulis valvas subaequantibus, foliis ovato-lanceolatis undulatis, caule ramoso. *Amer. bor. China.* (R. chinensis Campd., denticulatus Dun.)

aegyptiacus 22. R. valvis ovato-acuminatis subulato-dentatis, subulis longissimis rigidis, valva unica in granum

maximum mutata, verticillis denſe confertis ſpicatis, foliis lineari-lanceolatis longiſſime petiolatis. *Aegypt. Ad Volgam.*

dentatus Murr. 23. R. valvis ovato-lanceolatis apice productis omnibus graniferis divaricato-dentatis, verticillis remotis laxis, foliis ovato-lanceolatis margine ſubcriſpis. *Aegypt. Ind. or. Amer. bor.* (R. criſpatulus Mx., ſtrictus Link., undulatus W. herb.)

ucranicus Hornem. 24. R. valvis oblongis acutis ſubulato-dentatis reticulatis omnibus graniferis, ſubulis rigidis divaricatis, verticillis laxis, foliis oblongis undulatis, infimis cordato-ſubhaſtatis. *Ad Tyram, Hypanim, Boryſthenem.* (R. reticulatus Beſſ.)

criſtatus Cand. 25. R. valvis cordatis apice contortis groſſe ſerratis omnibus graniferis, foliis ovato-oblongis. *Patria?*

pulcher 26. R. valvis triangulari-ovatis acutis ſerrato-dentatis inaequaliter graniferis, foliis radicalibus cordato-oblongis panduraeformibus ſubpubeſcentibus. *Anglia. Europ. auſtr. Afric. bor. Caucaſ.* (R. pauciflorus Campd., R. auratus Sm., varietas dioeca.)

divaricatus 27. R. valvis inaequalibus, unica oblonga reticulata obtuſa granifera, grano tuberculato, reliquis minoribus nudiusculis, foliis cordatis obtuſiſſimis. *Italia.*

** *Valvae nudae ſ. grano deſtitutae.*

† *integerrimae.*

aquaticus 28. R. valvis ſubcordato-ovatis reticulato-membranaceis, verticillis approximatis, foliis cordato-ovatis baſi cucullatis. *Europ. foſſae.*

ſcutatus 29. R. valvis ſuborbiculatis obtuſis reticulato-membranaceis, verticillis laxis remotis aphyllis, foliis haſtatis panduraeformibus oleraceis glaucis. *Europ. med.* et *auſtr.* (R. glaucus Jacqu. haſtifolius M. B. aetnenſis Presl., oxyotus Campd.)

veſicarius 30. R. valvis maximis ovalibus reticulato-membranaceis emarginatis, floribus racemoſis, pedicellis ſubgeminis, foliis cordatis oblongis undulatis. *Africa.*

tingitanus 31. R. valvis cordato-orbicularibus integerrimis venoſis, floribus ſubracemoſis, pedicellis nutantibus ſubverticillatis. *Ad litora maris mediterran.*

longifolius Kunth. 32. R. valvis oblongis obtuſis integerrimis, verticillis approximatis, foliis lanceolatis margine criſpo-undulatis. *Amer. auſtr. China.*

cordatus Desf. 33. R. valvis oblongis obtuſis integerrimis, verticillis paucifloris, pedicellis nutantibus, foliis cordatis acutiusculis craſſis, radice tuberoſa. *C. B. S.* (R. ſarcorrhizus Link.)

Burchellii Campd. 34. R. valvis cordato-orbiculatis reticulatis, verticillis paucifloris, pedicellis nutantibus, foliis cordato-ſubhaſtatis ſubſinuatis, caule ſuffruticoſo. *C. B. S.* (R. ſagittatus Thunb.?)

venosus Pursh. 35. R. valvis subreniformi-orbiculatis venosis integerrimis, foliis ovato-lanceolatis acutis, caule herbaceo. *Louisiana.*

nervosus Vahl. 36. R. valvis orbiculatis integerrimis, floribus paniculatis, foliis oblongis 3nerviis glaucis. *Arabia.* (R. persicarioides Forsk.)

Lunaria 37. R. valvis suborbiculatis integerrimis, verticillis paucifloris, foliis cordatis acutiusculis crassis, caule arborescente. *Inf. Canar.*

†† *Valvae dentatae.*

domesticus Hartm. 38. R. valvis subcordato-ovatis obsolete serrulatis, foliis lanceolatis undulato-crispis, infimis cordatis. *Suecia.* (R. alpinus W. herb.)

roseus 39. R. valvis subreniformibus emarginatis denticulatis reticulatis, foliis oblongo-subhastatis integerrimis. *Aegypt. Cyprus.*

lacerus Balb. 40 R. valvis oblongis subdenticulatis reticulatis, foliis hastato-pinnatifidis obtusis carnosis, caule herbaceo ramoso. *Aegypt.* (R. roseus Delil. Sieber.)

bucephalophorus 41. R. valvis ovato-lanceolatis utrinque 8dentatis, floribus racemosis, pedicellis reflexis incrassatis, bracteis scariosis, foliis spathulatis, caule simpliciusculo. *Ad litora maris mediterr.*

fimbriatus Poir. 42. R. valvis triangularibus laciniato-fimbriatis, floribus verticillatis pendulis, foliis cordatis subsinuatis, radice tuberosa. *C. B. S.*

Brownii Campd. 43. R. valvis ovato-acuminatis uncinato-fimbriatis reticulatis, floribus verticillatis, pedicellis reflexis incrassatis, foliis subhastatis oblongo-acuminatis. *Nov. Holl.* (R. fimbriatus R. Br.)

2. *Flores diclini.*

* *Valvae integerrimae.*

Acetosa 44. R. valvis cordato-subrotundis reticulatis, basi squama reflexa munitis, calycibus reflexis, floribus paniculatis, foliis sagittatis ovato-lanceolatis, radice fibrosa, fusiformi vel tuberosa. *Europ. Asia med.* (R. intermedius Cand., tuberosus L.)

Acetosella 45. R. valvis ovatis acutiusculis reticulatis, calycibus appressis, foliis hastatis lanceolato-linearibus. *Europ. Asia med. Amer. bor.* (R. pyrenaicus Lapeyr. R. multifidus L. var. auriculis palmatis.)

abyssinicus Jacqu. 46. R. valvis cordato-orbiculatis integerrimis, verticillis paucifloris, foliis hastato-triangularibus acutis subsinuatis nervosis. *Europ. austr. Afric. bor. med.* (R. tuberosus Poir., thyrsoides Desf., triangularis Cand., arifolius Ait. All.)

arifolius L. suppl. 47. R. valvis subrotundo-ovatis integerrimis, verticillis paucifloris, foliis amplis cordato-subrotundis acutis 5nerviis, caule elato. *Patria?* (R. macrophyllus Campd.)

amplexicaulis Lapeyr. 48. R. valvis cordato-orbiculatis ſubgraniferis, paniculae diffuſae ramis ſubaggregatis, foliis cordato-ovatis obtuſis, ſuperioribus amplexicaulibus. *Pyren. Gallia auſtr.* (R. oblongus et rugoſus Campd.)

luxurians L. ſuppl. 49. R. valvis cordato-orbiculatis integerrimis, floribus paniculatis, foliis cordato-haſtatis ſubundulatis, caule herbaceo angulato, radice tuberoſa. *Italia. Gallia. Anglia.*

alpinus 50. R. valvis cordatis acutiuſculis, unica granifera, verticillis multifloris paniculatis, foliis cordato-ovatis obtuſis undulatis. *Alp. Europ. med. Tauria.*

flexuoſus Forſt. 51. R. valvis lanceolatis integerrimis, verticillis remotis, foliis oblongo-lanceolatis margine criſpis, caule herbaceo, ramis flexuoſis. *Nov. Zeeland.*

† *haſtulatus* Sm. 52. R. valvis obtuſis concavis, verticillis aphyllis, foliis haſtatis obtuſis integerrimis, caule fruticoſo. *Chili.*

bipinnatus L. ſuppl. 53. R. valvis obtuſis, verticillis aphyllis, foliis cordatis 2pinnatis, ſtipulis ſcarioſis patulis, caule herbaceo. *Mauritania.*

fruteſcens Thuar. 54. R. valvis ſubgraniferis, foliis obovato-oblongis retuſis, caule ſuffruticoſo. *Inſ. Triſtan d'Acunha.*

giganteus Ait. 55. R. valvis cordato-ſubrotundis acutis ſinuatis, foliis ovato-oblongis acutis, nervis ſubtus pubeſcentibus, caule arboreo. *Inſ. Sandwich.*

hoſtilis Lour. 56. R. valvis integerrimis, foliis lanceolatis, caule tereti aculeato. *Cochinchina.*

**** *Valvae dentatae.***

Bidens R. Br. 57. R. valvis utrinque 1dentatis haſtatis, foliis lineari-lanceolatis baſi attenuatis. *Terra Diemen.*

graminifolius Lamb. 58. R. valvis crenulatis, floribus paniculatis, foliis lanceolato-linearibus ſubauriculatis. *Ruſſia orient. Camtſchatca. Inſ. Curil.* (R. anguſtiſſimus Ledeb.)

aculeatus 59. R. valvis uncinato-fimbriatis ſubgraniferis, foliis lanceolatis glaucis. *Hiſpania. Creta. Graecia.*

1386. EMEX Neck.

ſpinoſus Campd. *Sicilia. Luſitania. Graecia. Aegypt. C. B. S.* Herba humilis, caule aſcendente, floribus verticillatis polygamis. (Rumex ſpinoſus L.)

1387. PODOPTERUS Humb.

mexicanus Humb. *Mexico.* Frutex ramis ſpineſcentibus, foliis faſciculatis obovatis glabris, floribus faſciculato-racemoſis, pedunculis Salatis.

1388. HYDROGETON Perſ.

feneſtralis Perſ. *Madagaſcar.* Planta aquatica, radice tuberoſa, foliis radicalibus oblongo-linearibus obtuſis feneſtratis, ſcapo polyſtachyo medio inflato, floribus roſeis. (Ouvirandra Thuar.)

TETRAGYNIA.

1389. TETRONCIUM W.

magellanicum W. *Ad fretum Magellan.* Planta 3pollicaris foliis radicalibus linearibus, scapo spicigero. (Triglochin reflexum Vahl.)

HEXAGYNIA.

1390. DAMASONIUM Schreb.

indicum W. *Ind. or. Aegypt.* Planta aquatica, foliis radicalibus reniformi-cordatis obtusis integerrimis, scapo unifloro, flore albo. (Stratiotes alismoides L. Ottelia Pers.

POLYGYNIA.

1391. ALISMA.

Damasonium 1. A. foliis subcordato-oblongis obtusis 3nervibus, floribus 6gynis, capsulis senis basi connatis 2spermis. *Anglia. Gallia.* (Damasonium stellatum Pers.)

*minus** 2. A. capsulis basi connatis octonis, foliis 3nerviis. *Noo. Holl.* (Actinocarpus R. Br.)

cordifolium 3. A. foliis cordatis subrotundis obtusiusculis multinerviis, petiolis 6angularibus, floribus 12andris polygynis, capsulis uncinato-muricatis. *Amer. austr.*

parnassifolium 4. A. foliis cordato-subrotundis acutis 7nerviis, capsulis aristatis. *Italia.*

Plantago 5. A. foliis subcordato-oblongis acutis 5—7nerviis, scapo capsulisque 3gonis. *Europ. Asia med.* (A. lanceolatum Schultz. var. fol. oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis. A. triviale et parviflorum Pursh. varr. fol. obtusis. A. graminifolium Ehrh. var. fol. linearibus.)

sagittifolium W. 6. A. foliis sagittatis subrotundo-ovatis, capsulis obovatis obtusis. *Guinea.*

*Berterii** 7. A. foliis oblongis utrinque attenuatis 3nerviis, scapo 3gono, capsulis cuspidatis. *Guadalupa.* Bertero.

natans 8. A. foliis ellipticis, nervis binis marginalibus, pedunculis 1floris subsolitariis, capsulis mucronatis. *Europ. Amer. bor.*

ranunculoides 9. A. foliis lineari-lanceolatis, scapo umbellifero, capsulis globosis mucronatis. *Europ.*

CLASSIS VII.

HEPTANDRIA.

MONOGYNIA.

* *Flores completi.*

1392. *Trfentalis.* Cal. 7partitus. Cor. 7partita baſi ſtaminifera. Capſ. baccata 1locularis polyſperma. Placenta globoſa centralis. *Primuleae.*

1393. *Disandra.* Cal. 7partitus. Cor. 7partita rotata. Capſ. 2locularis, diſsepimento medio placentifero. *Gentianeae?*

1394. *Aeſculus.* Cal. campanulatus. Petala 4-5 inaequalia. Stamina 7-8 diſco hypogyno inſerta. Capſ. coriacea 2-3locularis oligoſperma. Cotyledones craſſiſſimae. *Hippoceſtaneae* Cand.

1395. *Erythroſpermum* Lam. Cal. 4ſepalus. Petala 4-7. Stam. 4-7, filamentis breviſſimis. Stigmata 3-5. Fructus ſubbaccatus polyſpermus. *Flacourtieae* Cand.

1396. *Petrocarya* Schreb. Cal. 5fidus bracteatus. Cor. 5petala. Stam. 14, 7ſterilia. Drupa nuce 2loculari. *Roſaceae.*

† 1397. *Pancovia* W. Cal. 4partitus. Pet. 4 unguiculata plicato-criſpa cucullata. Stam. aſcendentia. *Familia?*

1398. *Joneſia* Roxb. Cal. 2phyllus. Cor. infundibuliformis, limbo 4fido. Stam. nectario annulato inſerta. Legumen 4-8ſpermum. *Leguminoſae.*

1399. *Tovaria* R. et P. Cal. 7ſepalus. Cor. 7petala. Stamina diſco 7gono ſtellato inſerta. Stigma peltatum. Bacca 1locularis polyſperma. *Meliceae.*

** *Flores incompleti.*

1400. *Buginvillea* Commerſ. Cal. corollinus tubuloſus 10dentatus plicatus bracteae coloratae inſidens. Filamenta baſi in tubum coalita. Achenium calyce tectum. *Nyctagineae.*

1401. *Piſonia.* Flores ſubdioeci. Cal. campanulatus plicatus 5fidus. Stam. (6-10) in plicis limbi, exſerta. Nucula 5gona calyce tecta. *Nyctagineae.*

1402. *Petiveria.* Cal. 4ſepalus. Stigma penicillatum. Caryopſis 4glochidibus. *Chenopodeae.*

DIGYNIA.

1403. *Limeum.* Cal. 5partitus inaequalis. Petala 5 breviſſima. Filamenta baſi connata. Caryopſes duae in fructum coalitae. *Portulaceae.*

1404. *Diplaſia* Rich. Spica ſquamis undique imbricatis. Involucellum glumam 4valvem mentiens. *Cyperaceae.*

TETRAGYNIA.

1405. *Aſtranthus* Lour. Cal. 0. Cor. hypocrateriformis, limbo 14fido. Caryopſis ſupera. *Nyctagineae?*
1406. *Saururus.* Flores ſpicati. Squamae loco calycis corollaeque. Baccae 4 1ſpermae. *Piperaceae.*

HEPTAGYNIA.

1407. *Gilibertia* R. et P. Cal. ſuperus 7dentatus. Pet. 7. Fructus 7locularis 7ſpermus. *Araliceae.*

CLASSIS VII.

HEPTANDRIA.

MONOGYNIA.

1392. Trientalis.

europaea — *Europ. Amer. bor. nemora.* Herba digitalis ſimpliciſſima, foliis verticillatis oblongo-lanceolatis inaequalibus, floribus axillaribus pedunculatis albis. (Tr. americana Pursh.)

1393. Disandra.

proſtrata — *Afric. bor. Madera.* Herba proſtrata pubeſcens, foliis orbiculatis crenatis villoſis, floribus axillaribus pedunculatis luteis. (Sibthorpia peregrina et africana L.)

1394. Aesculus.

* *Capſulis echinatis.*

Hippocaſtanum 1. Ae. corollis 5petalis, foliis 7nato-digitatis obovato-oblongis denticulatis ſubtus glabris. *Tibet.*

rubicunda Cand. 2. Ae. corollis 4petalis, foliis ſub-7nato-digitatis obovato-oblongis duplicato-ſerratis ſubtus glabris. *Patria?*

glabra W. 3 Ae. corollis 4petalis, unguibus calycem aequantibus, ſtaminibus corolla longioribus, foliis digitatis lanceolatis ſerrulatis utrinque glaberrimis. *Amer. bor.* (Ae. ohioenſis Mx.?)

pallida W. 4, Ae. corollis 4petalis, unguibus calyce brevioribus, ſtaminibus corolla duplo longioribus, foliis quinato-digitatis ſerrulatis ſubtus pubeſcentibus. *Amer. bor.*

** *Capſulis inermibus: corollis 4petalis.*

macroſtachya Mx. 5. Ae. fruticoſa, radice ſtolonifera, foliis quinato-digitatis obſolete ſerrulatis ſubtus villoſo-tomentoſis, racemo elongato, ſtaminibus longiſſimis. *Carolina. Georgia.* (Ae. parviflora Walt.)

Pavia 6. Ae. arborea, foliis quinato-digitatis utrinque glabris, axillis venarum ſubtus villoſis, unguibus petalorum calycem aequantibus, ſtaminibus corolla brevioribus. *Amer. bor.* (Pavia rubra Lam.)

discolor Pursh. 7. Ae. fruticosa, foliis quinato-digitatis subtus tomentosis, petalorum inaequalium unguibus calycem excedentibus, staminibus corolla brevioribus. *Georgia.* (Pavia hybrida Cand.)

flava Ait. 8. Ae. arborea, foliis quinato-digitatis subtus pubescentibus, unguibus petalorum inaequalium calyce longioribus, staminibus corolla brevioribus. *Virginia. Carolina.* (Ae. lutea Wangenh. Pavia Poir.)

1395. ERYTHROSPERMUM Lam.

verticillatum Poir. 1. E. foliis ternatis subsessilibus subrotundis coriaceis glabris, pedunculis ternis umbellatis folia aequantibus. *Insul. Mascaren.*

pyrifolium Poir. 2. E. foliis alternis ovali-oblongis coriaceis utrinque lucidis, pedunculis terminalibus laxe racemosis. *Insul. Mascaren.*

ellipticum Poir. 3. E. foliis alternis elliptico-subrotundis coriaceis, pedunculis subracemosis folio longioribus. *Insul. Mascaren. Java.*

paniculatum Poir. 4. E. foliis ovalibus supra opacis subtus nitidis, panicula terminali pauciflora folia superante. *Insul. Mascaren.*

macrophyllum Poir. 5. E. foliis sparsis lanceolatis acutiusculis nitidis, racemis axillaribus folio brevioribus. *Insul. Mascaren.*

amplexicaule Cand. 6. E. foliis sparsis amplexicaulibus cordato-oblongis, pedunculis subumbellatis folio brevioribus. *Insul. Mascaren.*

1396. PETROCARYA Schreb.

montana W. 1. P. foliis ovatis acuminatis. *Guiana.* (Parinarī Aubl.)

campestris W. 2. P. foliis cordatis acutiusculis. *Guiana.* (Parinari Aubl.)

1397. PANCOVIA W.

bijuga W. *Guinea.* Arbor foliis pinnatis 2jugis coriaceis glabris, floribus racemosis.

1398. JONESIA Roxb.

pinnata Roxb. *Ind. or.* Arbor foliis impari-pinnatis glabris, floribus cymosis aurantiacis.

1399. TOVARIA R. et P.

pendula R. et P. *Peru.* Herba foliis ternatis lanceolatis nitidis ciliatis, floribus bracteatis racemosis secundis ochroleucis, fructibus pendulis.

1400. BUGINVILLEA Commerf.

ſpectabilis Juſſ. *Amer. auſtr.* Frutex ſcandens, ramis ſpineſcentibus, foliis ovatis pubeſcentibus, pedunculis axillaribus 3floris, bracteis roſeis. (B. peruviana Bonpl., braſilienſis Neuwied.)

1401. PISONIA.

* *Inermes.*

grandis R. Br. 1. P. arborea, foliis oblongis acuminatis glabris, floribus cymoſis polygamis, perianthiis fructiferis ſpinuloſis. *Nov. Holl.*

pubeſcens Kunth. 2. P. arborea, foliis obovato-oblongis utrinque attenuatis pubeſcentibus ſubtus fuſcis, floribus corymboſis glabris. *Amer. auſtr.*

fragrans Desf. 3. P. arborea, foliis obovato-oblongis acutinsculis utrinque glabris ſupra nitidis coriaceis, floribus paniculatis. *Patria?*

discolor * 4. P. arborea, foliis oblongis obtuſis baſi oblique attenuatis glabris ſubtus discoloribus, racemis compoſitis axillaribus folio brevioribus. *Jamaic.* Bertero.

ſubcordata Sw. 5. P. arborea, foliis cordato-ſubrotundis eveniis, pedunculis cymoſis axillaribus folio brevioribus. *Inſ. Carib.*

nigricans Sw. 6. P. fruticoſa, foliis elliptico-oblongis utrinque glabris, pedunculis paniculatis axillaribus folia ſuperantibus. *Ind. occ.*

coccinea Sw. 7. P. fruticoſa, foliis oblongo-lanceolatis nervoſo-venoſis, pedunculis terminalibus elongatis pendulis ſub-5floris. *Hiſpaniola.*

obtuſata Sw. 8. P. fruticoſa, foliis ovali-oblongis obtuſis coriaceis venoſis, pedunculis cymoſis terminalibus. *Inſ. Carib. Jamaica.*

hirtella Kunth. 9. P. fruticoſa, foliis ovatis acutis membranaceis utrinque appreſſo-piloſis, floribus capitato-umbellatis 10andris. *Mexico.*

Pacurero Humb. 10. P. fruticoſa, foliis elliptico-oblongis utrinque attenuatis, floribus corymboſis 8andris folia aequantibus. *Nov. Andaluſ. Braſil.*

** *Spinoſae.*

aculeata 11. P. ſpinis axillaribus recurvis, foliis ovato-oblongis utrinque attenuatis, pedunculis cymoſis incano-pubeſcentibus. *Ind. occ.*

villoſa Poir. 12. P. ſpinis axillaribus recurvis, foliis ovatis obtuſis, pedunculis cymoſis villoſis. *Ind. or.*

1402. PETIVERIA.

alliacea *Ind. occ.* Frutex ramis ſtrictis pubeſcentibus, foliis alternis ovato-oblongis glabris, floribus terminalibus ſpicatis albidis. (P. octandra Jacq. var.)

DIGYNIA.

1403. LIMEUM.

africanum 1. L. caule proſtrato, foliis ovato-lanceolatis carnoſis petiolatis, floribus paniculatis. *Afr. auſtr.*

capenſe 2. L. caule erecto, foliis ovatis obtuſis ſeſſilibus, floribus ſubumbellatis. *Afr. auſtr.* (L. aphyllum L. ſuppl.)

aethiopicum 3. L. caule proſtrato, foliis lineari-lanceolatis ſubpubeſcentibus, floribus umbellatis. *Afr. auſtr.*

1404. DIPLASIA Rich.

karataefolia Perſ. *Guiana.* Cyperacea, foliis longiſſimis margine carinaque aculeatis, umbellis decompoſitis.

TETRAGYNIA.

1405. ASTRANTHUS Lour.

cochinchinenſis Lour. *Cochinchina.* Arbor foliis alternis ovatis ſerratis lanatis, floribus ſpicatis axillaribus pallidis.

1406. SAURURUS.

cernuus 1. S. foliis opacis. *Virginia.*

lucidus Donn. 2. S. foliis lucidis. *Amer. bor.*

1407. GILIBERTIA R. et P.

umbellata R. et P. *Peru.* Arbor foliis oblongis ſubdentatis lucidis, floribus umbellatis albidis involucratis.

CLASSIS VIII.

OCTANDRIA.

MONOGYNIA.

I. *Flores completi.*

A. *Corolla monopetala.*

a. *infera.*

1408. *Erica.* Cal. 4fepalus. Cor. 4fida. Stam. receptaculo inſerta. Antherae 2fidae. Capſ. 4locularis. *Ericeae.*

1409. *Salaxis* Salisb. Cal. 4fepalus irregularis. Cor. campanulata 4fida. Stigma peltatum. Capſ. drupacea 3locularis 3ſperma. *Ericeae.*

1410. *Menzieſia* Sm. Cal. 1phyllus 4dentatus. Cor. 4fida. Stam. receptaculo inſerta. Capſ. 4locularis, marginibus valvarum inflexis diſsepimenta ſiſtentibus. *Ericeae.*

1411. *Hedwigia* Sw. Cal. 4dentatus. Cor. 4fida. Stylus 0. Capſ. 3cocca. *Tricoccae.*

1412. *Diospyros.* Flores polygami. Cal. 4-6fidus. Cor. urceolata 4-6fida. Stam. baſi corollae inſerta ſub-2antherifera. Stylus 4fidus. Bacca 8locularis, loculis 1ſpermis. *Styraceae.*

1413. *Cargillia* R. Br. Flores polygami. Cal. ſemi-4fidus cupularis. Cor. 4fida. Bacca 4locularis, loculis 2ſpermis. *Styraceae.*

1414. *Elliottia* Mühl. Cal. 4dentatus. Cor. 4partit. Antherae ſagittatae. Stigma capitatum. *Ericeae?*

1415. *Mimoſa* W. Flores polygami. Cal. 4-5dentatus. Cor. 4-5dentata vel 0. Stam. 4, 8, 10. Lomentum. *Leguminoſae.*

1416. *Schrankia* W. Flores polygami. Cal. 5dentatus. Cor. 5fida. Legumen 4valve. *Leguminoſae.*

1417. *Chlora.* Cal. 8partitus. Cor. limbo 8lobo. Stigma 4fidum. Capſ. 2valvis 5locularis. Placentatio valvaris. *Gentianeae.*

1418. *Symphorema* Roxb. Invol. 6-8phyllum 6-8florum. Cal. 6-8dentatus. Cor. tubuloſa, limbo 6-8partito reflexo. Stam. exſerta. Stigma 2fidum. Caryopſis calyce incluſa. *Familia?*

1419. *Mimuſops.* Cal. 6-8partitus. Cor. laciniae duplici ſerie senae vel octonae. Stam. ſterilia cum fertilibus alterna. Bacca oligoſperma. *Sapoteae.*

b. *Corolla supera.*

1420. *Cytinus.* Flores monoeci. Cal. 2phyllus. Cor. cyathiformis e tubulis nectariferis compoſita. Filamenta antheraeque cohaerent. Stigma peltatum. Bacca 8locularis polyſperma. *Ariſtolochieae.*

1421. *Vaccinium.* Cal. 4dentatus. Cor. urceolata ſ. campanulata, limbo 4fido reflexo. Antherae 2cornes. Bacca 4–5locularis. *Ericeae.*

1422. *Neaea* R. et P. Cal. 2–3ſepalus. Cor. tubuloſa. Stamina alterna longiora. Drupa 1ſperma calyce coronata. *Onagrae.*

1423. *Michauxia* Herit. Cal. 8–16fidus. Cor. rotata 8fida, limbo reflexo. Filamenta fornicata. Stigma 8fidum. Capſ. 8locularis. *Campanuleae.*

B. *Corolla pleiopetala.*

a. *infera.*

* *Corolla 4petala.*

1424. *Sweetia* *. Cal. campanulatus repandus. Petala obovata. Stamina imo calyci inſerta. Antherae globoſae. Legumen. *Familia?*

1425. *Sodada* Delil. Cal. 4ſepalus irregularis, ſepalo ſuperiori fornicato. Bacca ſtipitata 8ſperma. *Cappariideae.*

1426. *Phyſoſtemon* Mart. Cal. 4ſepalus. Cor. 4petala. Stamina inaequalia, minora apice inflata. Siliqua 1locularis 2valvis, ſeminibus 2ſeriatis echinatis. *Cappariideae.*

1427. *Saſſia* Molin. Cal. 4ſepalus. Capſ. 2locularis 2ſperma. *Familia?*

1428. *Kölreutera* Laxm. Cal. 5ſepalus. Petala 4 aſcendentia baſi appendiculata. Capſ. 3locularis, loculis 2ſpermis. *Melieae.*

1429. *Xylocarpus* Schreb. Cal. coriaceus 4lobus. Filamenta ſubcoalita. Drupa 4valvis, nucleis 1ſpermis. *Melieae.*

1430. *Vitmannia* Vahl. Cal. 4–5partitus extus glanduloſus. Stamina baſi ſquamulis aucta. Nux compreſſa 1ſperma. *Malpighieae?*

1431. *Elvaſia* Cand. Cal. 4partitus. Antherae 2loculares. Ovarium 4loculare. *Familia?*

1432. *Caſtela* Turp. Cal. 4dentatus. Petala diſco perigyno cum ſtaminibus inſerta. Drupae 4 1ſpermae. *Rhamneae?*

1433. *Roxburghia* Jon. Cal. 4ſepalus. Antherae geminae apice foliolo junctae. Capſ. 1locularis 2valvis polyſperma. *Smilacinae?*

1434. *Tetratheca* Sm. Cal. 4ſepalus. Antherae 4loculares. Capſ. 2valvis, ſeminibus pendulis. *Polygaleae?*

1435. *Boronia* Sm. Cal. 4fidus. Petala 4 perſiſtentia. Stamina ſubabortientia. Stigma 4fidum. Capſ. 4 coalitae 2valves. *Rutaceae.*

1436. *Correa* Sm. Cal. 4dentatus. Petala 4 in tubum conniventia. Capſ. 4locularis, loculis ſub-2ſpermis. *Rutaceae.*

1437. *Jambolifera.* Cal. 4ſepalus inaequalis. Stamina alterna petalorum baſi, alterna receptaculo inſerta. Diſcus perigynus 8angularis. Bacca 4locularis 4ſperma. *Rutaceae.*

1438. *Melicope* Forſt. Cal. 4partitus. Petala unguibus in tubum conniventibus. Glandulae 4 perigynae. Achenia 4. *Rutaceae.*

1439. *Porliera* R. et P. Cal. 4ſepalus. Squamae perigynae ſtamiferae. Drupae 4 connatae. *Zygophylleae.*

1440. *Chitonia* Seſſ. Cal. 4partitus. Petala orbiculata. Stigma peltatum. Capſ. 4locularis 4valvis alato-tetragona 8ſperma. *Zygophylleae?*

1441. *Grislea.* Cal. 4fidus. Petala limbo calycis inſerta. Rima in baſi calycis nectarifera. Stamina exſerta. Capſ. 1locularis polyſperma. *Salicariae.*

1442. *Antichorus.* Cal. 4ſepalus. Capſ. ſubulata 4valvis 4locularis polyſperma. *Tiliaceae.*

1443. *Selas* *. (Gela Lour.) Cal. breviſſimus 4dentatus. Petala linearia glabra. Antherae ſubrotundae. Stigma 2fidum. Drupa 1ſperma. *Familia?*

1444. *Ximenia.* Cal. 4fidus minimus. Petala baſi conniventia vilioſiſſima apice revoluta. Antherae elongatae filamentis adnatae. Drupa ovata 1ſperma. *Santaleis* aff.

1445. *Laxſonia.* Cal. 4fidus. Stamina per paria approximata. Capſ. 4locularis polyſperma globoſa ſtylo coronata. *Salicariae?*

1446. *Amyris.* Cal. 4dentatus. Nectarium perigynum annulatum. Bacca 1ſperma. *Terebinthaceae.*

** *Corolla 5petala.*

1447. *Xanthophyllum* Roxb. Cal. 5ſepalus. Cor. papilionacea. Stamina baſi petalorum receptaculoque inſerta. Bacca 1ſperma ſtipitata. *Capparideae.*

1448. *Euſtathes* Lour. Cal. 5ſepalus. Stam. receptaculo inſerta. Bacca 1locularis 4ſperma. *Rhamneae?*

1449. *Scutula* Lour. Cal. truncatus ſcutiformis intus celluloſus demum baccatus. Petala margini calycis inſerta. Stam. inflexa. Bacca 8 cellulis diſtincta 1ſperma. *Familia?*

1450. *Keithia* *. Cal. 1ſepalus irregulariter fiſſus caducus. Filamenta breviſſima. Antherae elongatae cuſpidatae. Ovarium ſiliquoſum ſubpedicellatum ſtylo coronatum. *Capparideae?*

1451. *Honckenya* W. Cal. 5ſepalus. Nect. ſtaminiformia. Capſ. echinata 5locularis polyſperma. Sem. arillata. *Melieae.*

† 1452. *Hagenia* Lam. Cal. 2ſepalus. Squamae 5 petaloideae nectariferae. Fructus? *Familia?*

1453. *Bäckea.* Cal. campanulatus, limbo 5dentato ampliato. Petala calyci inſerta. Capſ. 3locularis, placenta centrali. *Onagrae.*

1454. *Melicocca.* Flores ſubpolygami. Cal. 4-5partitus. Petala 4. 5, diſco hypogyno inſerta, vel 0. Bacca 1ſperma. *Sapindeae.*

1455. *Hypelate* P. Br. Cal. 4-5ſepalus. Diſcus perigynus ſtamnifer. Drupa 1ſperma. *Sapindeae.*

1456. *Cupania.* Cal. 5fepalus. Petala cucullata vel planiuscula. Stylus 3fidus. Capf. 3locularis 3valvis, valvis feptiferis, loculis 1-2fpermis. Semina arillata. *Sapindeae.*

1457. *Thouinia* Poit. Cal. 4-5partitus. Petala 4-5 medio barbata. Stigmata 3. Achenia 3 famaroidea. *Sapindeae.*

1458. *Euphoria* Commerf. Cal. 5dentatus. Petala 5 medio fubbarbata. Stigmata 2. Baccae 2 1fpermae. *Sapindeae.*

1459. *Schmidelia* Schreb. Flores polygami. Cal. 4partitus. Petala 4 medio barbata. Baccae 2 1fpermae. *Sapindeae.*

1460. *Ephielis* Schreb. Cal. 5partitus. Petala 5 bafi glandulis duabus inftructa. Stigma 1. Capf. 1locularis 2valvis 2fperma. *Sapindeae.*

1461. *Talifia* Aubl. Flores polygami. Cal. 5partitus. Petala 5 bafi glanduloſa. Fructus? *Sapindeae.*

1462. *Phaeocarpus* Mart. Flores polygami. Cal. 5partitus. Cor. 5petala. Squamae 2 perigynae ſtaminibus oppoſitae. Capf. fub-3locularis polyſperma. *Sapindeae.*

1463. *Blighia* Kön. Cal. 5partitus. Petala bafi ſquamis fornicatis inſtructa. Filamenta medio incraſſata. Diſcus perigynus. Capf. carnoſa 3locularis 3fperma. Semina arillo carnoſo cincta. *Sapindeae.*

1464. *Acer.* Flores polygami. Cal. 5partitus. Stamina diſco hypogyno inſerta. Caryopſes 2 alatae. *Acera* Juſſ.

1465. *Luxemburgia* Hilar. Capſ. 5fepalus. Petala 5 inaequalia. Antherae hypogynae ſubſeſſiles 4gonae coalitae. Capſ. 1locularis 3valvis polyſperma. *Ionidia? Frankeniae?*

1466. *Tropaeolum.* Cal. 5partitus calcaratus. Petala 5 inaequalia calyci inſerta. Stamina bafi libera. Baccae 3 1fpermae. *Tropaeoleae* Juſſ.

1467. *Magallana* Cav. Cal. 5lobus calcaratus. Petala 5 inaequalia calyci inſerta. Stam. bafi coalita. Achenium 3alatum. *Tropaeoleae* Juſſ.

*** *Corolla 8petala.*

1468. *Jefferſonia* Bart. Cal. 4-5fepalus coloratus deciduus. Capſ. 1locularis circumſciſſa polyſperma. Semina arillata. *Papavereae.*

b. *Corolla pleiopetala ſupera.*

1469. *Oenothera.* Cal. tubuloſus 4partitus deciduus. Petala 4. Capſ. cylindrica vel prismatica 4locularis. Semina nuda cortice fungoſo placentae columnari centrali affixa. *Onagrae.*

1470. *Juſſieva.* Cal. 4-(5-)partitus perſiſtens. Petala 4. Capſ. prismatica 4locularis. Semina excorticata. *Onagrae.*

1471. *Epilobium.* Cal. tubuloſus 4partitus. Petala 4. Capſ. 4gona 4valvis. Semina comoſa. *Onagrae.*

1472. *Gaura.* Cal. tubuloſus 4partitus. Petala 4. Nux angulata 1fperma. *Onagrae.*

1473. *Fuchſia.* Cal. infundibuliformis coloratus 4fidus. Petala 4 convoluta. Bacca 4locularis polyſperma. *Onagrae.*

1474. *Memecylon.* Cal. ſubdentatus. Petala 4. Antherae laterales. Bacca. *Melaſtomeae? Myrteae?*

1475. *Marlea* Roxb. Cal. 6-8dentatus. Petala 6-8 linearia. Antherae elongatae. Stigma 4dentatum. Drupa nuce 2loculari. *Familia?*

1476. *Rhizophora.* Cal. 4partitus ſemiſuperus. Petala 4. Antherae 2loculares. Stigma 2partitum. Fructus ligneus 1ſpermus, embryone germinante. *Rhizophoreae* R. Br.

II. *Flores incompleti.*

* *Fructus ſuperus.*

1477. *Daphne.* Cal. corollinus infundibuliformis deciduus 4fidus. Stam. tubo corollae inſerta. Drupa 1ſperma. *Thymelaeae.*

1478. *Gnidia.* Cal. corollinus tubuloſus 4fidus. Squamae ad faucem. Antherae tubo inſertae. Nux 1ſperma. *Thymelaeae.*

1479. *Paſſerina.* Cal. corollinus tubuloſus 4fidus marceſcens. Stamina tubo inſerta. Nux 1ſperma. *Thymelaeae.*

1480. *Dirca.* Cal. 0. Cor. campanulata, limbo obſoleto. Stam. corollae inſerta, alterna longiora, exſerta. Bacca 1ſperma. *Thymelaeae.*

1481. *Dodonaea.* Cal. 4partitus deciduus. Stylus ſubtrifidus. Capſ. 2-3locularis alata 2ſperma. *Sapindeae.*

1482. *Llaguno* R. et P. Flores polygami. Cal. 4-5fidus latere fiſſus. Stylus 3ſulcus. Capſ. inflata 3locularis, valvis membranaceis medio ſeptiferis. *Sapindeae.*

1483. *Stadmannia* Lam. Cal. 5dentatus. Stigma 3gonum. Bacca globoſa 1ſperma.

1484. *Pierardia* Roxb. Flores monoeci. Cal. 4partitus ſubtomentoſus. Stigmata 3. Bacca globoſa 3locularis 3ſperma. *Familia?*

1485. *Valentinia* Sw. Cal. 5partitus coloratus. Capſula baccata 3ſperma. *Sapindeae.*

1486. *Cedrela* Schreb. Cal. 6partitus. Stam. receptaculo inſerta. Fructus? *Familia?*

1487. *Baccaurea* Lour. Flores polygami. Cal. 5partitus. Stam. receptaculo inſerta. Bacca 3locularis oligoſperma.

1488. *Shepherdia* Nutt. Flores dioeci. Cal. campanulato-rotatus 4fidus. Stamina cum totidem glandulis ſquamiformibus alternantia. Bacca 1ſperma.

1489. *Aſpidiſtra* Ker. Cor. calycina 6fida. Antherae tubo corollae adnatae 2loculares. Stigma clypeatum latiſſimum. Germen ſub-4loculare. *Aroideae?*

1490. *Populus.* Flores dioeci. Squama cuneata laciniata. Cor. integra. Antherae 2loculares. Stigma 4-6lobum. Capſ. 2-3-valvis. Semina comoſa. *Amentaceae.*

** *Fructus inferus.*

1491. *Grubbia* Berg. Involucrum 2valve 3florum. Cor. 4petala ſupera. Bacca 1locularis. *Thymelaeae?*

1492. *Lagetta* Juſſ. Cal. corollinus urceolatus 4fidus. Glandulae 4 petaliformes calyci adnatae. Drupa piſiformis 1ſperma. *Thymeleaeae.*

DIGYNIA.

1493. *Spallanzania* Pollin. Cal. duplex, ext. campanulatus 10-12-fidus, int. 5fidus. Petala 5 calyci inserta. Caryopsis subsolitaria calyce inclusa. *Rosaceae.*

1494. *Codia* Forst. Flores capitati involucrati. Cal. 4sepalus. Cor. 4petala. Fructus? *Dioscoreae?*

1495. *Weinmannia.* Cal. 4partitus. Cor. 4petala. Stamina disco nectarifero inserta. Folliculi duo connati. Semina pilosa. *Ericeae.*

1496. *Möhringia.* Cal. 4partitus. Cor. 4petala. Capsl. 4valvis 1locularis polysperma. *Caryophylleae.*

1497. *Hermesia* Humb. Flores subdioeci. Cal. 2-4sepalus. Cor. 0. Capsl. 2locularis 2sperma. *Tricoccae.*

1498. *Galenia.* Cal. 4fidus. Cor. 0. Capsl. 2locularis 2sperma. *Chenopodeae.*

1499. *Marathrum* Humb. Involucrum campanulatum. Cor. 0. Capsl. 2locularis polysperma. *Najades.*

TRIGYNIA.

1500. *Cardiospermum.* Cal. 4sepalus. Cor. 4petala. Glandulae nectariferae cum nectarilymatibus labiatis 4. Capsl. inflata 3locularis. *Sapindeae.*

1501. *Urvillea* Kunth. Cal. 5sepalus inaequalis. Cor. 4petala. Glandulae nectariferae 2. Capsl. 3alata 3sperma. *Sapindeae.*

1502. *Seriana* Plum. Cal. 5sepalus. Petala 4, intus appendiculata. Samarae 3 connexae. *Sapindeae.*

1503. *Paullinia.* Cal. 5sepalus inaequalis. Petala 4, intus appendiculata. Capsl. coriacea 3locularis. Semina arillata. *Sapindeae.*

1504. *Sapindus.* Cal. 4-5sepalus coloratus. Petala 4, 5, intus glandulosa s. barbata. Capsl. 3cocca. *Sapindeae.*

1505. *Ponaea* Schreb. Cal. 5partitus. Petala 4, intus nuda. Capsl. 3alata 3sperma. *Sapindeae.*

1506. *Tragopyrum* M. B. Cal. 2sepalus. Petala 3 cum achenio 3quetro coalescentia. *Polygoneae.*

1507. *Pedicellia* Lour. Flores polygami. Cal. 5partitus. Nectarium crenatum carnosum. Capsl. 3valvis 1sperma. Sem. arillatum stipitatum. *Familia?*

1508. *Brunnichia* Banks. Cal. 5partitus coriaceus. Cor. 0. Nux 1sperma. *Polygoneae.*

1509. *Coccoloba.* Cal. 5partitus. Cor. 0. Drupa 1sperma. *Polygoneae.*

1510. *Polygonum.* Cal. corollinus 5sepalus. Achenium 3quetrum. *Polygoneae.*

TETRAGYNIA.

1511. *Verea* Andr Cal. 4partitus. Cor. hypocrateriformis, tubo ventricoso, limbo 4fido. Squamae nectariferae perigynae. Capsl. 4 1loculares polyspermae. *Sedeae.*

1512. *Diamorpha* Nutt. Cal. 4partitus. Pet. 4. Capsl. 4locularis extus dehiscens, loculis 2spermis. *Sedeae.*

1513. *Adoxa.* Cal. 2lepalus. Cor. 4-5fida ſupera. Stamina per paria approximata. Bacca 1locularis 4ſperma. Sem. arillata. *Saxifrageae.*

1514. *Haloragis* Forſt. Cal. 4ſepalus ſuperus. Pet. 4. Drupa 4locularis 4ſperma. *Onagrae.*

1515. *Paris.* Cal. 4ſepalus. Pet. 4 linearia. Antherae apice productae. Bacca 4locularis. *Sarmentaceae.*

1516. *Elatine.* Cal. 3-4partitus. Pet. 3, 4. Stam. numero varia. Capſ. 4locularis polyſperma. *Caryophylleae.*

1517. *Margaritaria* L. ſuppl. Flores dioeci. Cal. 4dentatus. Pet. 4. Bacca 4-5ſperma. *Terebinthaceae?*

1518. *Pythagorea* Lour. Cal. inferus 7-8ſepalus. Cor. ſupera 7-8petala. Capſ. 4locularis polyſperma. *Familia?*

1519. *Francoa* Cav. Cal. ſuperus 4fidus. Petala 4. Glandulae 4 nectariferae. Capſ. 4 carinatae polyſpermae. *Violeae?*

1520. *Galvezia* R. et P. Cal. 4ſepalus. Petala 4. Stam. alterna breviora. Drupae 4 1ſpermae. *Laurinae.*

CLASSIS VIII.

OCTANDRIA.

MONOGYNIA.

1408. Erica.

I. *Tubiflorae, corollis tubulosis apice dilatatis.*

† *Antherae appendiculatae.*

* *Folia terna.*

discolor Andr. 1. E. foliis linearibus patentibus ciliatis, floribus terminalibus ternis, bracteis calyci ferrulato appressis, staminibus inclusis, stylo exserto. *C. B. S.* (E. cupressiformis Salisb.)

rugosa Andr. 2. E. foliis confertis linearibus patenti-reflexis, floribus axillaribus pedunculatis, calycibus foliaceis, corollis rugosis, genitalibus exsertis, appendiculis antherarum subaristatis. *C. B. S.*

densifolia W. 3. E. foliis lineari-oblongis appresso-imbricatis, floribus axillaribus pubescentibus, staminibus inclusis, stylo exserto. *C. B. S.*

Everana Dryand. 4. E. foliis linearibus scabris patentibus, floribus lateralibus solitariis subincurvis pubescentibus, calycibus appressis, staminibus inclusis, stylo exserto incurvo. *C. B. S.* (E. Uhria Andr., decora Salisb.)

cruenta Ait. 5. E. foliis lineari-subulatis glabris patentibus, floribus subaggregatis glabris, calycibus appressis, genitalibus inclusis. *C. B. S.* (E. melliflua Salisb.)

speciosa Andr. 6. E. foliis linearibus pubescentibus patulis, floribus terminalibus subternis villoso-viscosis, calycibus lanceolatis, limbo corollae erecto, antheris tubum aequantibus, stylo exserto. *C. B. S.*

Nicenia Andr. 7. E. foliis linearibus obtusis patentissimis glanduloso-pilosis duplicato-ciliatis, pedunculis terminalibus umbellatis, calycibus foliaceis appressis glandulosis, corollae costatae limbo revoluto, antheris coalitis exsertis. *C. B. S.*

** *Folia quaterna.*

mutabilis Andr. 8. E. foliis linearibus ciliatis patentiſſimis, pedunculis corymboſis glanduloſo-piloſis, corollis ſtriatis, ſtaminibus incluſis, ſtylo exſerto. *C. B. S.* (E. hirta et viridiflora Andr.)

nana Salisb. 9. E. foliis linearibus patentibus, ramis proſtratis, floribus terminalibus, calycibus bracteatis, ſtylo exſerto. *C. B. S.* (E. depreſſa Andr.)

virescens Link. 10. E. foliis linearibus incurvo-erectis hirſutis, floribus terminalibus viſcoſis, calycibus foliaceis bracteatis, ſtaminibus ſubincluſis, ſtylo exſerto incurvo. *C. B. S.*

ambigua Wendl. 11. E. foliis linearibus hirſutiusculis patulis, floribus terminalibus ſubſolitariis ſtriatis glabris, limbo brevi reflexo, calycibus ſubulatis appreſſis, genitalibus incluſis. *C. B. S.* (E. cylindrica Andr.)

clavaeflora Salisb. 12. E. foliis linearibus glabris patulis, floribus axillaribus ſubſeſſilibus, calycibus appreſſis obovatis, genitalibus incluſis. *C. B. S.* (E. ſeſſiliflora Andr.)

Paterſonia Andr. 13. E. foliis linearibus ſtrictis patulis glabris confertis, floribus congeſtis glabris, limbo abbreviato reflexo genitalia aequante, calycibus ovato-ſubulatis. *C. B. S.* (E. abietina L., ſpiciflora Salisb.)

*** *Foliis ſenis, octonis.*

colorans Andr. 14. E. foliis linearibus patulis ciliatis, floribus axillaribus ſubſpicatis, calycibus linearibus appreſſis, genitalibus ſubincluſis. *C. B. S.*

ſpicata 15. E. foliis lineari-ſubulatis hiſpidis patenti-reflexis, floribus axillaribus ſubſeſſilibus verticillato-glomeratis cernuis, ſepalis ſpathulatis unguiculatis, ſtaminibus incluſis. *C. B. S.* (E. ſeſſiliflora L. ſuppl., favoſa Salisb.)

faſcicularis L. ſuppl. 16. E. foliis linearibus obtuſis glanduloſo-ciliatis patulis ſubrecurvis, floribus terminalibus verticillatis horizontalibus, limbo erecto, pedunculis bracteisque glanduloſis, ſtaminibus incluſis. *C. B. S.* (E. octophylla Thunb., coronata Andr., radiiflora Salisb.)

†† *Antherae baſi nudae.*

* *Folia terna.*

coſtata Andr. 17. E. foliis linearibus obtuſiusculis pubeſcentibus patentiſſimis, floribus terminalibus ternis coſtatis, calycibus foliaceis bracteatis ſerrulatis appreſſis, ſtaminibus incluſis. *C. B. S.*

diaphana * 18. E. foliis patentiſſimis glabris, floribus terminalibus ternis pendulis glabris, calycibus foliaceis bracteatis obtuſis, ſtaminibus incluſis. *C. B. S.* (E. transparens Andr.)

clavata Andr. 19. E. foliis linearibus erectis, floribus ternis terminalibus pendulis viridibus, calyce duplici appreſſo, genitalibus exſertis. *C. B. S.*

pallens Andr. 20. E. foliis lineari-oblongis incanis patentiſſimis, floribus terminalibus ſubracemoſis horizontalibus, calycibus bracteatis herbaceis, ſtaminibus incluſis. *C. B. S.*

diclrus * 21. E. foliis linearibus villoſis erectis, floribus ternis terminalibus, calycibus coloratis appreſſis, limbo corollae erecto, ſtaminibus incluſis, ſtylo apice incurvo exſerto. *C. B. S.* (*E.* bicolor Andr.)

perſpicua Wendl. 22. E. foliis linearibus ciliatis faſciculatis, floribus axillaribus ſubſeſſilibus horizontalibus villoſis, calycibus foliaceis ſerratis, genitalibus incluſis. *C. B. S.* (E. Linnaea Andr., lituiflora Salisb.)

nudiflora 23. E. foliis linearibus acutis ciliatis patulis, floribus axillaribus terminalibusque aggregatis erectis tubuloſo-ſubcampanulatis 4gonis, genitalibus exſertis. *C. B. S.* (E. floribunda Wendl., ſertiflora Salisb.)

verſicolor Andr. 24. E. foliis linearibus glabris patulis, floribus terminalibus ternis, calycibus coloratis bracteatis denticulatis, ſtaminibus ſubincluſis, ſtylo exſerto. *C. B. S.*

** *Folia quaterna.*

refulgens Andr. 25. E. foliis linearibus glabris patentibus, floribus quaternis terminalibus cernuis, calycibus coloratis ſubulatis appreſſis, ſtaminibus incluſis, ſtylo exſerto. *C. B. S.*

transparens Thunb. 26. E. foliis linearibus horizontalibus margine hiſpidis, floribus terminalibus pedunculatis ſubincurvis cernuis ſtriatis ſubpellucidis, ſtaminibus incluſis, ſtylo exſerto. *C. B. S.* (E. pellucida Andr., ſtrigiliflora Salisb.)

exſudans Andr. 27. E. foliis linearibus obtuſis glanduloſo-viſcoſis patentibus, floribus terminalibus ſubaggregatis cernuis ſtriatis, bracteis ſpathulatis, ſtaminibus incluſis. *C. B. S.*

ſulfurea Andr. 28. E. foliis linearibus obtuſis villoſis faſciculatis, floribus ſubſeſſilibus axillaribus horizontalibus villoſis, ſtaminibus incluſis. *C. B. S.*

flava Andr. 29. E. foliis filiformibus abbreviatis glabris erectis, floribus ſubgeminis horizontalibus, calycibus foliaceis appreſſis, genitalibus incluſis. *C. B. S.*

Sparrmanni Thunb. 30. E. foliis lineari-lanceolatis hirſutis revolutis patulis, floribus terminalibus ſubternis cernuis hirſutiſſimis conniventibus, genitalibus incluſis. *C. B. S.* (E. aſpera Andr., hyſtriciflora Salisb.)

erubeſcens Andr. 31. E. foliis lineari-lanceolatis margine revolutis hiſpido-ciliatis, ramis floriferis pendulis, calycibus bracteatis dentato-fimbriatis, corollis extus intusque glanduloſo-piloſiſſimis, limbo revoluto, ſtaminibus incluſis. *C. B. S.*

elata Andr. 32. E. foliis filiformibus obtuſiusculis, ramis patentibus, floribus axillaribus confertis horizontali-

bus villosis, limbo revoluto, genitalibus exsertis. *C. B. S.* (E. longiflora Salisb.)

***flammea* Andr.** 33. E. foliis filiformibus suberectis glabris, floribus subsolitariis horizontalibus, calycibus subulatis appressis, staminibus inclusis. *C. B. S.* (E. bibax Salisb.)

***Linnaeana* Dryand.** 34. E. foliis lineari-lanceolatis pilosis patentibus, floribus subsessilibus horizontalibus villosis, calycibus lanceolatis foliaceis, genitalibus inclusis. *C. B. S.* (E. Linnaeoides Andr.)

***calamiformis* Salisb.** 35. E. foliis filiformibus patentibus, floribus terminalibus umbellatis, calycibus foliaceis appressis, limbo revoluto, staminibus inclusis. *C. B. S.* (E. radiata Andr.)

***spuria* Andr.** 36. E. foliis linearibus subciliatis erecto-patulis, floribus subaggregatis terminalibus, limbo corollae revoluto, genitalibus inclusis. *C. B. S.* (E. tubulosa Wendl., culcitaeflora Salisb.)

***exsurgens* Andr.** 37. E. foliis filiformi-subulatis patenti-recurvis, floribus axillaribus confertis horizontalibus, limbo corollae revoluto, genitalibus exsertis. *C. B. S.* (E. pharetraeformis Salisb.)

curviflora 38. E. foliis linearibus patentissimis glabris, floribus terminalibus subsolitariis laevibus, limbo erecto, calycibus foliaceis ovatis serrulatis, staminibus inclusis, stylo exserto. *C. B. S.* (E. fastuosa Salisb.)

***simpliciflora* W.** 39. E. foliis 3gonis erecto-patulis glabris, floribus terminalibus solitariis erectis, calycibus foliaceis lanceolatis appressis, corollae tubulosae medio constrictae limbo patente, genitalibus subexsertis. *C. B. S.*

tubiflora 40. E. foliis linearibus obtusis pubescentibus erectis, floribus terminalibus subsolitariis erectis hirsutis, limbo revoluto, calycibus obtusiusculis ciliatis, staminibus inclusis, stylo exserto. *C. B. S.* (E. tubulosa Sm.)

***ignescens* Andr.** 41. E. foliis linearibus glabris patulis, floribus terminalibus solitariis cernuis, calycibus lanceolatis subciliatis, corollae superne pilosae limbo revoluto, genitalibus subexsertis. *C. B. S.*

***lanata* Wendl.** 42. E. foliis lineari-oblongis villosis erectis imbricatis abbreviatis, floribus terminalibus geminis cernuis pubescentibus, calycibus foliaceis obtusiusculis, limbo corollae erecto, stylo exserto. *C. B. S.*

***sordida* Andr.** 43. E. foliis linearibus obtusis lanatis patulis, floribus terminalibus solitariis cernuis villosis, calycibus foliaceis bracteatis appressis, limbo corollae revoluto, genitalibus longe exsertis. *C. B. S.* (E. laniflora Wendl., floccosa Salisb.)

***serratifolia* Andr.** 44. E. foliis linearibus acutis margine plumosis patentissimis, floribus terminalibus aggregatis, calycibus foliaceis bracteatis appressis glanduloso-ciliatis, corollae glabrae limbo patente, stamini-

bus ſubincluſis, ſtylo exſerto. *C. B. S.* (E. plumoſa Wendl., cylindriflora Salisb.)

Maſſonii L. ſuppl. 45. E. foliis linearibus ſerrulatis hirſutis imbricatis patentibus, floribus axillaribus verticillatis nutantibus viſcoſis, calycibus bracteatis appreſſis villoſis, limbo corollae connivente, genitalibus incluſis. *C. B. S.* (E. lycopodifolia Salisb.)

procera Wendl. 46. E. foliis linearibus erectis pubeſcentibus, floribus terminalibus ſolitariis erectiusculis, calycibus lanceolatis ciliatis, corollae medio conſtrictae tubo patente, ſtaminibus incluſis, ſtylo exſerto. *C. B. S.*

conſpicua Ait. 47. E. foliis lineari - oblongis glabris patentibus, floribus terminalibus ſubaggregatis nutantibus, calycibus foliaceis ovatis, corollae elongato-clavatae villoſiusculae limbo revoluto, ſtylo exſerto. *C. B. S.*

glanduloſa Thunb. 48. E. foliis linearibus acutis glanduloſo-piloſis patentibus remotiusculis, floribus verticillato-congeſtis ſubterminalibus, calycibus bracteatis glanduloſo - ciliatis, corollae ſericeae tubo erecto, ſtylo exſerto. *C. B. S.*

paluſtris Andr. 49. E. foliis linearibus obtuſis pubeſcentibus patulis, ramis divaricatis, floribus terminalibus ternis cernuis, calycibus nudis ſubcoloratis, corollae tubuloſae limbo patulo, ſtylo ſubexſerto. *C. B. S.*

gemmifera Sims. 50. E. foliis oblongis appreſſis ciliato-ariſtatis, ramis apice incraſſatis, floribus nutantibus ſubvilloſis, ſtaminibus incluſis. *C. B. S.*

**** Folia ſena pluraque.*

ſplendens Wendl. 51. E. foliis linearibus obtuſis patulis, floribus verticillatis denſe congeſtis nutantibus, calycibus foliaceis ovatis, corollae pubeſcentis limbo ſubrevoluto, genitalibus exſertis. *C. B. S.*

longifolia W. 52. E. foliis linearibus elongatis incurvo-patentibus margine cartilagineis ſcabris, floribus verticillato - congeſtis nutantibus comoſis tubuloſo-ſubampullaceis pubeſcentibus viſcoſis, calycibus foliaceis anguſtis bracteatis, genitalibus incluſis. *C. B. S.* (E. pinea Wendl.)

veſtita Thunb. 53. E. foliis linearibus erectis margine cartilagineis ſcabris, floribus verticillatis ſubſeſſilibus patentibus clavatis pubeſcentibus, calycibus ovatis glanduloſo-ciliatis, ſtylo exſerto. *C. B. S.* (E. longifolia Salisb. Curt.)

pinea Thunb. 54. E. foliis linearibus obtuſis patentibus, floribus verticillatis ſubſeſſilibus patentibus clavatis glabris, calycibus glanduloſo-ciliatis, limbo corollae ſerrulato patulo, ſtylo exſerto. *C. B. S.* (E. pinifolia Salisb.)

pityophylla * 55. E. foliis filiformibus elongatis glabris patulis, floribus verticillatis congeſtis horizontalibus tomentoſis coſtatis, calycibus bracteatis foliaceis linearibus villoſis, ſtylo exſerto. *C. B. S.* (E. piniſolia Andr.)

***aurea* Andr.** 56. E. foliis linearibus recurvato-patulis, floribus verticillatis horizontalibus, calycibus bracteatis appreſſis, ſtylo exſerto. *C. B. S.*

***viridis* Andr.** 57. E. foliis linearibus patentiſſimis ſubrecurvis, floribus verticillatis horizontalibus tubuloſis coſtatis viſcoſis, limbo revoluto, ſtylo exſerto. *C. B. S.*

***Hibbertia* Andr.** 58. E. foliis linearibus margine revolutis glabris patentibus, floribus verticillatis horizontalibus clavatis viſcoſis, limbo erecto, ſtaminibus incluſis. *C. B. S.*

***onoſmaeflora* Salisb.** 59. E. foliis linearibus patentibus glabris, floribus ſubverticillatis confertis glutinoſis coſtatis, limbo revoluto abbreviato, ſtaminibus incluſis. *C. B. S.* (E. glutinoſa Andr., viſcoſa Wendl.)

***echiiflora* Andr.** 60. E. foliis linearibus margine aſperis confertis patentiſſimis, floribus axillaribus congeſtis tubuloſis horizontalibus coſtatis viſcoſis, genitalibus incluſis. *C. B. S.*

***argentiflora* Andr.** 61. E. foliis linearibus glabris patenti-incurvis, floribus axillaribus horizontalibus ſubpellucidis, ſtylo exſerto. *C. B. S.*

***Archeria* Andr.** 62. E. foliis linearibus ſerrulato-ciliatis patentibus, floribus axillaribus terminalibusque congeſtis horizontalibus villoſo-viſcoſis, calycibus bracteatis ſerrulatis hiſpidis, ſtylo exſerto. *C. B. S.*

***roſea* Andr.** 63. E. foliis filiformibus erectis, floribus ſubterminalibus ſeſſilibus glabris, calycibus ſubulatis appreſſis, genitalibus incluſis. *C. B. S.*

***Salisburia* Andr.** 64. E. foliis linearibus margine revolutis ſubtus albidis erectis, floribus racemoſo-ſpicatis comoſis confertis cernuis, ſtylo exſerto. *C. B. S.*

***grandiflora* Thunb.** 65. E. foliis linearibus cuſpidatis glabris patentiſſimis, floribus axillaribus clavatis ſubincurvis patentibus, calycibus ovato-lanceolatis integerrimis, ſtylo exſerto. *C. B. S.* (E. formoſa Andr.)

***Leea* Andr.** 66. E. foliis lineari-filiformibus rigidis obtuſis patentibus, floribus axillaribus tubuloſo-4gonis coſtatis, limbo patente, ſtylo exſerto. *C. B. S.* (E. coſtaeflora Salisb.)

coccinea 67. E. foliis linearibus cuſpidatis ciliatis patentibus, floribus axillaribus confertis incurvo-clavatis, calycibus villoſo-tomentoſis, limbo corollae erectiusculo, ſtylo exſerto. *C. B. S.* (E. frondoſa Salisb.)

***purpurea* Andr.** 68. E. foliis linearibus ciliatis patentiſſimis remotiusculis, floribus verticillatis horizontalibus tubuloſo-clavatis glabris, calycibus bracteatis lanceolatis ſerrulatis, limbo corollae patulo, genitalibus exſertis. *C. B. S.* (E. phylicifolia Salisb.)

***concinna* Ait.** 69. E. foliis linearibus ſubvilloſis erectis, floribus verticillatis clavatis pubeſcentibus, calycibus bracteatis denticulatis villoſis, limbo corollae patulo, genitalibus incluſis. *C. B. S.* (E. abietina Andr., paludoſa Salisb.)

II. *Coniflorae, corollis tubulosis apice constrictis.*

† *Antherae appendiculatae.*

* *Folia terna.*

halicacaba 70. E. foliis linearibus glabris patentibus, floribus terminalibus subternis pendulis ovato-tubulosis inflatis glabris, genitalibus inclusis. *C. B. S.* (E. rupestris Salisb.)

Monsoniana Thunb. 71. E. foliis oblongis margine revolutis erectis 4fariam positis, floribus terminalibus aggregatis nutantibus oblongis conniventibus, calycibus bracteatis, genitalibus inclusis. *C. B. S.* (E. variifolia Salisb.)

lanuginosa Andr. 72. E. foliis linearibus ciliatis patentissimis, floribus subsolitariis axillaribus cernuis, calyce duplici colorato corollaque conica connivente tomentosis, genitalibus inclusis. *C. B. S.*

alopecuroides Wendl. 73. E. foliis linearibus erectis ramisque virgatis pubescentibus, floribus axillaribus aggregatis ovato-oblongis, calycibus coloratis ciliatis patentibus, genitalibus inclusis. *C. B. S.*

cinerea 74. E. foliis linearibus fasciculatis, ramis pubescentibus, floribus axillaribus aggregatis suberectis ovato-oblongis, limbo abbreviato subrevoluto, staminibus inclusis. *Anglia. Norvegia. Europ. austr.*

** *Folia quaterna.*

gilva Wendl. 75. E. foliis lineari-3quetris rigidis glabris patulis, floribus axillaribus verticillatis pendulis ventricoso-cylindricis, calycibus appressis abbreviatis, genitalibus inclusis. *C. B. S.* (E. gelida Andr., alveiflora Salisb.)

mammosa 76. E. foliis lineari-subulatis glabris erectis, floribus axillaribus umbellatis nutantibus, calycibus coloratis bracteatis, genitalibus inclusis. *C. B. S.* (E. abietina Thunb., verticillata Andr.)

cerinthoides 77. E. foliis linearibus reflexis ciliatis apice barbatis, floribus terminalibus congestis nutantibus piloso-viscosis, calycibus bracteatis, genitalibus inclusis. *C. B. S.* (E. crinifolia Salisb.)

tumida Ker. 78. E. foliis linearibus obtusis hirsutis reflexis, floribus subquaternis pedunculatis oblongo-cylindricis pubescentibus, calycibus foliaceis bracteatis patulis, stylo exserto. *C. B. S.* (E. splendens Andr.)

†† *Antherae basi nudae.*

* *Folia terna, subquaterna. Antherae in filamenta decurrentes.*

Petiverii 79. E. foliis lineari-subulatis ciliatis erectis, floribus terminalibus ternis pendulis, calycibus bracteatis subrotundis coloratis ciliatis, genitalibus longe exsertis. *C. B. S.* (E. baculiflora Salisb.)

foccíflora Salisb. 80. E. foliis ſubquaternis linearibus ſquarroſis arcuatis, floribus terminalibus ternis pendulis, calycibus bracteatis obtuſis ſcarioſis glabris, genitalibus longe exſertis, capſula ovata. *C. B. S.* (E. Sebana viridis Andr.)

follicularis Salisb. 81. E. foliis quaternis ſubulatis rigidis recurvis, floribus terminalibus ſubſolitariis ſeſſilibus pendulis, calycibus imbricatis, genitalibus longe exſertis, antheris ſubcoalitis. *C. B. S.* (E. Petiveriana et Melaſtoma Andr.)

Sebana Ait. 82. E. foliis lineari-filiformibus ſquarroſis, ramulis confertiſſimis, floribus ſubaggregatis pendulis, calycibus bracteatis coloratis, corollae tubo apice incraſſato, genitalibus longe exſertis. *C. B. S.* (E. coccinea L. ſpec., cothurnalis Salisb.)

monadelpha Andr. 83. E. foliis ternis obtuſis erectis pubeſcentibus, floribus terminalibus ternis pendulis, calycibus imbricatis coloratis, genitalibus longe exſertis, filamentis geniculatis inferne coalitis. *C. B. S.* (E. furfuroſa Salisb.)

Plukneti 84. E. foliis ternis lineari-ſubulatis patulis, floribus axillaribus pendulis, calycibus ebracteatis anguſtis, genitalibus longe exſertis. *C. B. S.* (E. fuſiformis, var. ε, Salisb.)

pudibunda Salisb. 85. E. foliis ſubquaternis linearibus ſubglutinoſis patulis, floribus terminalibus ternis pendulis, calycibus ciliatis, antheris clavatis, genitalibus exſertis. *C. B. S.* (E. nutans Wendl.)

** *Folia terna, ſubquaterna.*
Antherae discretae.

flexuoſa Andr. 86. E. foliis linearibus glabris erectis abbreviatis, floribus terminalibus ſubternis ſuberectis, calycibus bracteatis coloratis, genitalibus exſertis. *C. B. S.* (E. divaricata Wendl.)

Broadleyana Andr. 87. E. foliis ternis linearibus faſciculatis patulis, floribus axillaribus longe pedunculatis nutantibus, calycibus foliaceis anguſtis, ſtylo exſerto. *C. B. S.*

Juliana Noiſ. 88. E. foliis lineari-3gonis erectis lucidis abbreviatis, floribus terminalibus aggregatis, ſepalis dilatatis ciliatis, genitalibus incluſis. *C. B. S.*

armata * 89. E. foliis linearibus erectis ſubquinis ſpinuloſis, floribus aggregatis terminalibus flavo-ſtrigoſis, calycibus ſpinoſis foliaceis, ſtylo exſerto. *C. B. S.*

notabilis Wendl. Lichtſt. 90. E. foliis lineari-oblongis ſerrulato-ciliatis appreſſis abbreviatis, ramis gracilibus flexuoſis, floribus minutis terminalibus aggregatis reſinoſo-viſcoſis, genitalibus incluſis. *C. B. S.*

latifolia Andr. 91. E. foliis oblongo-lanceolatis ſupra villoſis ſubtus albidis, ramis flexuoſis, pedunculis axillaribus aggregatis, floribus globoſo-conicis pendulis, genitalibus exſertis. *C. B. S.*

horizontalis Andr. 92. E. foliis quaternis linearibus patentiſſimis, floribus terminalibus ternis ſubſeſſilibus cernuis, ſe-

palis ſpathulatis ſerratis, genitalibus incluſis. *C. B. S.*

ciliaris 93. E. foliis ternis ovatis glanduloſo-ciliatis patentiſſimis remotiuſculis, floribus ſubracemoſis ſecundis, ſepalis ſpathulatis ciliatis patentibus, limbo corollae contracto irregulari, ſtylo ſubexſerto. *Luſitania.*

**** Folia ſena.*

recurvata Andr. 94. E. foliis linearibus flexuoſis recurvis imbricatis, floribus terminalibus ſubſeſſilibus pendulis, ſtaminibus incluſis, ſtylo longe exſerto. *C. B. S.*

III. *Ampullaceae: corolla oblonga fauce conſtricta, limbo patente.*

† *Antherae appendiculatae.*

** Folia oppoſita.*

glutinoſa Berg. 95. E. foliis linearibus glanduloſo-piloſis, pedunculis verticillatis, ſtaminibus incluſis, appendiculis ſerratis. *C. B. S.* (E. droſeroides Andr., Andromeda droſeroides L.)

lutea 96. E. foliis linearibus appreſſis glabris, ramis gracilibus flexuoſis, floribus faſciculatis, calycibus coloratis, genitalibus incluſis. *C. B. S.* (E. imbellis Salisb.)

*** Folia terna.*

Comptoniana Andr. 97. E. foliis ſubulatis glabris patenti-recurvis, floribus terminalibus aggregatis pedunculatis, genitalibus incluſis. *C. B. S.*

Sainsburiana Andr. 98. E. foliis filiformibus elongatis glabris erecto-patulis, floribus terminalibus umbellatis, calycibus anguſtis, limbo corollae abbreviato, genitalibus incluſis. *C. B. S.*

Irbyana Andr. 99. E. foliis ternis margine ſcabris cuſpidatis erectis, floribus terminalibus umbellatis glutinoſiſſimis, calycibus foliaceis ebracteatis, ſtaminibus incluſis, ſtylo exſerto. *C. B. S.*

glauca Andr. 100. E. foliis linearibus glaucis erecto-patulis, pedunculis terminalibus umbellatis bracteatis, calycibus coloratis ovatis patulis, genitalibus incluſis, appendiculis antherarum latis obtuſis. *C. B. S.*

infundibuliformis Andr. 101. E. foliis filiformibus obtuſis glabris erectis, floribus terminalibus aggregatis anguſtis, genitalibus incluſis, antheris apice appendiculatis. *C. B. S.*

Aitonia Andr. 102. E. foliis linearibus ſerrulatis patentibus, floribus terminalibus ſubternis, calycibus foliaceis appreſſis, antheris incluſis, appendiculis abbreviatis. *C. B. S.*

Shannoneana Andr. 103. E. foliis lineari-lanceolatis rigidis patulis, floribus terminalibus umbellatis cernuis, calyce colorato, ſtaminibus incluſis, ſtylo exſerto. *C. B. S.*

***Folia quaterna.

stricta Don. 104. E. foliis linearibus obtusis glabris patentibus, floribus terminalibus umbellatis, calyce colorato, limbo corollae abbreviato, staminibus inclusis, stylo exserto. *Italia. Corsica.* (E. ramulosa Viv., corsica Cand., multicaulis Salisb.)

densa Andr. 105. E. foliis linearibus subimbricatis patulis, floribus axillaribus confertis subsessilibus, calycibus foliaceis appressis, limbo corollae abbreviato, genitalibus inclusis. *C. B. S.*

inflata Thunb. 106. E. foliis linearibus glabris, floribus umbellatis ventricosis elongatis, calycibus subulatis, genitalibus inclusis. *C. B. S.* (E. amabilis Salisb., glabra Link.)

ventricosa Andr. 107. E. foliis linearibus ciliatis recurvo-patentibus floralibus latioribus margine scariosis, floribus congestis terminalibus, calycibus angustis appressis, genitalibus inclusis. *C. B. S.* (E. translucens Wendl., venusta Salisb.)

retorta 108. E. foliis ovatis squarroso-recurvis calycibusque fimbriato-ciliatis aristatis, pedunculis terminalibus umbellatis erectis, antheris utrinque barbatis inclusis, stylo exserto. *C. B. S.* (E. gorteriaefolia Salisb.)

****Folia sena.

imperialis Andr. 109. E. foliis filiformibus erectis imbricatis, floribus terminalibus corymbosis cernuis, limbo discolore, genitalibus inclusis. *C. B. S.*

blanda Andr. 110. E. foliis linearibus patenti-reflexis imbricatis, floribus aggregatis horizontalibus, appendiculis antherarum brevissimis, genitalibus inclusis. *C. B. S.*

††*Antherae basi nudae.*

*Folia opposita.

rubella Ker. 111. E. foliis linearibus appressis imbricatis, umbellis terminalibus multifloris calycibus bracteatis, staminibus inclusis. *C. B. S.*

**Folia terna.

albens 112. E. foliis subulato-3gonis scabris patentibus, floribus axillaribus sparsis folio brevioribus, pedunculis bracteatis, calycibus ovatis appressis, genitalibus inclusis. *C. B. S.* (E. viminalis Salisb.)

jasminiflora Andr. 113. E. foliis lineari-oblongis serrulatis recurvis 6fariam imbricatis, floribus terminalibus aggregatis erectis, calycibus coloratis obtusiusculis, corollae costatae limbo expanso obtuso, staminibus inclusis, stylo exserto. *C. B. S.* (E. lagenaeformis Salisb.)

Bandonia Andr. 114. E. foliis lineari-lanceolatis glabris patulis, floribus umbellatis longe pedunculatis terminalibus erectis, staminibus inclusis, stylo exserto. *C. B. S.*

aristata Andr. 115. E. foliis oblongis subrecurvis hispidis apice aristatis imbricatis, floribus terminalibus aggregatis, genitalibus inclusis. *C. B. S.*

magnifica Andr. 116. E. foliis linearibus obtuſis patentiſſimis, floribus terminalibus ternis pendulis, calycibus coloratis, limbo corollae erectiusculo, genitalibus incluſis. *C. B. S.*

tetragona Thunb. 117. E. foliis linearibus acuminatis ciliatis erecto-patulis, floribus axillaribus erectis 4gonis, calycibus ciliatis, genitalibus incluſis. *C. B. S.*

Bankſii W. 118. E. foliis ſub-3gonis erectis glabris, caule depreſſo, floribus terminalibus ſubgeminis ſeſſilibus pendulis, calycibus bracteatis obtuſiusculis, genitalibus exſertis, antheris in filamenta decurrentibus. *C. B. S.* (E. fragilis Salisb.)

*** *Folia quaterna pluraque.*

ſtelliſera Andr. 119. E. foliis lineari-lanceolatis ſubulatis piloſis patentiſſimis, floribus axillaribus terminalibusque racemoſis erectis, calycibus foliaceis, limbo corollae 6fido, ſtaminibus incluſis. *Hybrida?*

Lawſonia Andr. 120. E. foliis filiformibus patulis glabris, floribus axillaribus ſparſis, calycibus corollisque anguſtis, genitalibus incluſis. *C. B. S.*

ſtellaris Noiſ. 121. E. foliis linearibus patentibus ſubincurvis villoſo-hirſutis, floribus ſubſeſſilibus confertis terminalibus, ſepalis linearibus ciliatis, antheris exſertis in filamenta productis. *C. B. S.*

metulaeflora Sims. 122. E. foliis ſubulatis ciliato-ſpinuloſis, floribus terminalibus umbellatis, calycibus bracteatis, genitalibus incluſis. *C. B. S.*

praeſtans Andr. 123. E. foliis linearibus erectis glabris, floribus terminalibus aggregatis, calycibus margine ſcarioſis tubum corollae aequantibus, ſtylo exſerto. *C. B. S.* (E. daphnaeflora Salisb.)

Coventria Andr. 124. E. foliis linearibus patenti-reflexis glabris, ramis flexuoſis, floribus terminalibus aggregatis ſeſſilibus, calycibus foliaceis anguſtis, genitalibus incluſis. *C. B. S.*

acuminata Andr. 125. E. foliis 3gonis cuſpidatis recurvis confertis, floribus terminalibus glomeratis ſubſeſſilibus, calycibus foliaceis acuminatis, limbo abbreviato revoluto, genitalibus incluſis. *C. B. S.*

ferruginea Andr. 126. E. foliis linearibus recurvis ferrugineo-ciliatis, pedunculis terminalibus umbellato-radiatis horizontalibus, calycibus apice barbatis, corollis ore turgidis, genitalibus incluſis. *C. B. S.*

hyacinthoides Andr. 127. E. foliis linearibus nitidis patentibus, floribus terminalibus aggregatis erectis, calycibus foliaceis bracteatis fimbriatis, ſtaminibus incluſis. *C. B. S.*

praegnans Andr. 128. E. foliis lineari-ſubulatis patenti-recurvis, floribus terminalibus congeſtis, calycibus foliaceis linearibus, laciniis limbi acutis, genitalibus incluſis. *C. B. S.*

princeps Andr. 129. E. foliis linearibus hirſuto-ciliatis recurvis, floribus terminalibus aggregatis, calycibus foliaceis bracteatis hirtis, genitalibus incluſis. *C. B. S.*

faſtigiata 130. E. foliis linearibus nitidis erectis imbricatis, floribus terminalibus congeſtis ſeſſilibus erectis,

calycibus bracteatis ferrulatis, genitalibus inclusis. *C. B. S.* (E. denticulata L., dentata Thunb. Wendl., primuloides *β*. Wendl., E. Walkeria Andr.)

ampullacea Curt. 131. E. foliis linearibus ciliatis reflexis, floribus terminalibus subquaternis pedunculatis, calycibus bracteatis acutis ciliatis, corollae striatae limbo obtuso, genitalibus inclusis. *C. B. S.* (E. obbata Andr.)

tenuiflora Andr. 132. E. foliis linearibus glabris patulis, floribus terminalibus subquaternis erectis angustе ampullaceis, calycibus foliaceis bracteatis, genitalibus inclusis. *C. B. S.* (E. cylindrica Thunb., fistulaeflora Salisb.)

comosa 133. E. foliis linearibus abbreviatis erecto-patulis, floribus terminalibus aggregatis erectis, calycibus bracteatis ciliatis coloratis, genitalibus inclusis. *C. B. S.* (E. transparens Berg., galiiflora Salisb.)

mundula Andr. 134. E. foliis linearibus subulatis patentissimis laevidis glabris, floribus terminalibus quaternis sessilibus erectis angustis, genitalibus inclusis. *C. B. S.*

Muscari Andr. 135. E. foliis linear-3gonis glabris patulis, floribus terminalibus quaternis sessilibus, calycibus foliaceis subulatis, limbo corollae abbreviato obtuso, genitalibus inclusis. *C. B. S.* (E. fragrans Salisb.)

Swainsonia Andr. 136 E. foliis linearibus obtusis confertis erectis, floribus terminalibus umbellatis, calycibus lanceolatis, genitalibus subinclusis. *C. B. S.*

IV. *Urceolatae: corolla basi ventricosa, ovato-subglobosa, ore contracto, limbo patulo.*

† *Antherae appendiculatae.*

* *Folia sparsa vel opposita.*

obliqua Thunb. 137. E. foliis linearibus truncatis arcuatis margine glandulosis, floribus terminalibus umbellatis viscosis, stylo incluso. *C. B. S.*

togata Sims. 138. E. foliis oppositis appressis, calycibus cyathiformibus amplis coloratis, bracteis remotis, antheris inclusis. *C. B. S.*

Ollula Andr. 139. E. foliis confertis linearibus glabris erectis, floribus terminalibus umbellatis, calycibus appressis foliaceis, genitalibus inclusis. *C. B. S.*

unica * 140. E. foliis confertis linearibus ciliatis erectis, floribus terminalibus corymbosis cernuis, calycibus coloratis, genitalibus inclusis. *C. B. S.* (E. pedunculata Andr.)

** *Folia terna.*

depressa 141 E. foliis linearibus patentibus glabris, ramis decumbentibus, floribus sparsis, genitalibus inclusis. *C. B. S.* (E. rupestris Andr., humilis Salisb.)

adenophora * 142 E. foliis linear - oblongis margine revolutis glanduloso-hispidis patulis remotiusculis, floribus

terminalibus aggregatis glabris, calycibus viſcidis coloratis appreſſis, ſtaminibus incluſis, ſtylo exſerto. *C. B. S.*

nigrita 143. E. foliis lineari-triquetris glabris patentiſſimis, floribus terminalibus ſubternis, pedicellis piloſis, calycibus bracteatis coloratis, genitalibus exſertis. *C. B. S.* (E. laricina Berg., volutaeflora Salisb.)

aggregata Wendl. 144. E. foliis linearibus hirſutis patentibus, floribus aggregato-racemoſis pubeſcentibus, limbo corollae erectiusculo, ſtylo exſerto. *C. B. S.*

urceolaris Ait. 145. E. foliis lineari-lanceolatis pubeſcentibus patulis, floribus terminalibus aggregatis pubeſcentibus, limbo corollae erectiusculo, ſtylo incluſo. *C. B. S.* (E. caffra L., lamellaris Salisb.)

marifolia 146. E. foliis ovato-ellipticis pubeſcentibus ſubtus albidis patentiſſimis, floribus terminalibus aggregatis ſcabris, limbo corollae ſubcontracto, calycibus foliaceis, ſtylo exſerto. *C. B. S.*

planifolia 147. E. foliis ovatis ciliatis remotiusculis, floribus axillaribus ternis cernuis limbo contractis, calycibus patentibus glanduloſo-ciliatis, genitalibus exſertis. *C. B. S.* (E. thymifolia Wendl.)

thymifolia Andr. 148. E. foliis ſubcordato-ovatis ciliatis ſubtus glaucis, floribus axillaribus ſolitariis, antheris incluſis obſolete appendiculatis, ſtigmate exſerto. *C. B. S.*

*ſeucriifolia** 149. E. foliis lanceolatis villoſiuſculis ſubtus albidis patentiſſimis, floribus axillaribus cymoſis, calyce anguſto patulo, genitalibus incluſis. *C. B. S.*

hirta Thunb. 150. E. foliis linearibus hiſpidis, floribus terminalibus umbellatis longe pedunculatis ſubvilloſis, genitalibus incluſis. *C. B. S.* (E. urceolaris Salisb.)

ſanguinolenta Ker. 151. E. foliis linearibus mucronulatis patentibus, floribus terminalibus globoſis hirſutis, ſtylo exſerto. *C. B. S.*

regerminans 152. E. foliis linearibus margine revolutis erectis ſubimbricatis, floribus axillaribus confertiſſimis cernuis, genitalibus incluſis, appendiculis antherarum elongatis. *C. B. S.* (E articularis Thunb., pulchella Andr., retroflexa Wendl., caduceifera Salisb.)

incana Wendl. 153. E. foliis lineari-oblongis obtuſis ſubtus albidis patentibus, floribus terminalibus aggregatis pubeſcentibus, ſtylo exſerto. *C. B. S.*

aſperifolia Salisb. 154. E. foliis linearibus margine revolutis ciliatis patentiſſimis, floribus terminalibus ternis, ſtaminibus incluſis. *C. B. S.* (E. ſetacea Andr.)

ſcarioſa Wendl. 155. E. foliis lineari-oblongis margine revolutis glabris erectis, floribus terminalibus aggregatis, calycibus coloratis bracteatis, limbo corollae erectiusculo, genitalibus exſertis. *C. B. S.*

bicolor Thunb. 156. E. foliis ovatis villoſis patentiſſimis 4fariam ſubimbricatis, floribus terminalibus ſubternis glabris, ſtaminibus corollae limbum erectiusculum aequantibus. *C. B. S.* (E. calathiflora Salisb.)

pubeſcens 157. E. foliis linearibus erecto-patulis ramisque hirſutis, floribus faſciculatis terminalibus pubeſcen-

tibus, genitalibus inclusis. *C. B. S.* (E. pallida Salisb.)

***globosa* Andr.** 158. E. foliis lineari-oblongis duplicato-ciliatis recurvis, floribus terminalibus aggregatis cernuis globosis, calycibus coloratis glanduloso-pilosis, staminibus inclusis, appendiculis exiguis. *C. B. S.*

campylophylla* 159. E. foliis lineari-subfalcatis margine revolutis ciliatis, floribus terminalibus subternis globosis, calycibus ciliatis, stylo exserto. *C. B. S.* (E. incurva Andr.)

***nitida* Andr.** 160. E. foliis linearibus obtusis scabris patentibus, floribus terminalibus subracemosis cernuis, pedicellis tomentosis, calycibus bracteatis, staminibus inclusis. *C. B. S.*

***Lambertia* Andr.** 161. E. foliis lineari-lanceolatis glabris patentibus, pedunculis axillaribus subternis coloratis bracteatis, limbo corollae globosae erectiusculo, genitalibus inclusis. *C. B. S.*

***formosa* Thunb.** 162. E. foliis oblongis obtusis patentibus, floribus subaggregatis cernuis, calycibus patentibus, corollis glutinosis demum fissis, genitalibus inclusis. *C. B. S.*

***resinosa* Sims.** 163. E. foliis lineari-oblongis scabris patentissimis, floribus aggregatis glutinosissimis, calycibus coloratis appressis, limbo corollae viridi erecto, staminibus inclusis. *C. B. S.* (E. Vernix Andr.)

***ardens* Andr.** 164. E. foliis linearibus patentissimis rigidis glabris, floribus aggregatis axillaribus pendulis, genitalibus inclusis. *C. B. S.*

***reflexa* Link.** 165. E. foliis lineari-oblongis obtusis patentissimis glanduloso-ciliatis, ramis reflexis sub-3floris, calycibus patulis coloratis, corollis viscosissimis, staminibus inclusis. *C. B. S.*

******Folia quaterna.***

***gracilis* Wendl.** 166. E. foliis linearibus glabris erecto-patulis, floribus terminalibus aggregatis erectis urceolato-campanulatis, genitalibus inclusis. *C. B. S.* (E. Bonplandiana Ker.?)

***racemifera* Andr.** 167. E. foliis linearibus confertis quaternis semiserectis, floribus axillaribus dense verticillatis, genitalibus inclusis. *C. B. S.*

***Savileia* Andr.** 168. E. foliis linearibus glabris erectis, pedunculis laxe racemosis coloratis, calycibus foliaceis angustis, genitalibus inclusis. *C. B. S.*

***subulata* Wendl.** 169. E. foliis linearibus subulatis subincurvis elongatis, ramis hirsutiusculis, floribus terminalibus conferte glomeratis, calycibus subulatis appressis, staminibus inclusis, stylo exserto. *C. B. S.*

***verecunda* Salisb.** 170. E. foliis linearibus cuspidatis incurvo-patulis, ramis hirsutis, pedunculis umbellatis coloratis cernuis, calycibus fimbriato-ciliatis, limbo corollae erectiusculo, staminibus inclusis. *C. B. S.* (E. cernua Andr.)

***tenuissima* Wendl.** 171. E. foliis linearibus filiformibus glabris erectis subimbricatis, floribus terminalibus aggregatis,

calycibus breviſſimis nudis, limbo corollae erectiusculo, genitalibus incluſis. *C. B. S.*

tenella Andr. 172. E. foliis linearibus patentibus glabris abbreviatis, ramis divaricatis, floribus terminalibus umbellatis, calycibus foliaceis appreſſis, limbo corollae reflexo, genitalibus incluſis. *C. B. S.*

floridа Thunb. 173. E. foliis linearibus piloſis, floribus terminalibus umbellatis glabris, calycibus villoſis reflexis, genitalibus incluſis. *C. B. S.*

mucoſa 174. E. foliis linearibus erectis glabris cartilagineo-ſerrulatis, floribus terminalibus umbellatis mucoſis, pedunculis bracteatis, calyce colorato appreſſo ovato, genitalibus incluſis. *C. B. S.*

Tetralix 175. E foliis linearі-oblongis ciliatis remotiusculis, floribus terminalibus cernuis ovato-oblongis, limbo abbreviato patulo, ſtaminibus incluſis, ſtylo ſubexſerto. *Europ. paludes.*

Bergiana 176. E. foliis linearі-oblongis hirſutis patentiſſimis, pedunculis terminalibus umbellatis bracteatis pendulis, calycibus reflexis, corollis glabris, genitalibus incluſis. *C. B. S.* (E. quadriflora W. Andr., lacunaeflora Salisb., nitens Lee Kenned.)

rubens Thunb. 177. E. foliis linearibus hiſpidis patulis, pedunculis terminalibus aggregatis bracteatis, calycibus foliaceis ſubappreſſis, ſtylo exſerto. *C. B. S.* (E. pedunculariſ Salisb.)

ramentacea 178. E. foliis linearі-3gonis patentibus ſtrictis glabris, pedunculis terminalibus umbellatis bracteatis, limbo corollae contracto, genitalibus incluſis. *C. B. S.* (E. bullularis Salisb.)

Blandfordia Andr. 179. E. foliis linearibus obtuſis patentibus, floribus terminalibus ſubſolitariis, calycibus bracteatis, genitalibus incluſis. *C. B. S.*

Solandra Andr. 180. E. foliis linearibus hiſpidis, caule ſuffruticoſo, ramis flexuoſis decumbentibus, floribus terminalibus umbellatis, calycibus coloratis longe ciliatis, ſtaminibus incluſis. *C. B. S.*

mollis Lee et Kenned. 181. E. foliis teretiusculis hiſpidis petiolatis erectis, floribus ſubterminalibus aggregatis, calycibus minutis appreſſis, corollis villoſis, genitalibus incluſis. *C. B. S.*

lateralis W. 182. E. foliis linearі-3gonis patentiſſimis glabris, floribus axillaribus ſubverticillatis nutantibus, calycibus ciliatis appreſſis, ſtaminibus incluſis. *C. B. S.* (E. incarnata Andr., guttaeflora Salisb.)

barbata Andr. 183. E. foliis oblongis ciliatis, ramis hirſutis, floribus terminalibus umbellatis cernuis, calycibus obtuſiusculis ciliatis, ſtaminibus incluſis. *C. B. S.*

tomentoſa Salisb. 184. E. foliis oblongis obtuſis ſubimbricatis incano-tomentoſis ciliatis craſſiusculis patulis, floribus ſubternis terminalibus, calycibus plumoſo-fimbriatis, genitalibus incluſis. *C. B. S.*

margaritacea 185. E. foliis linearі-3gonis erectis glabris, floribus axillaribus terminalibusque aggregatis cernuis, calycibus ovatis appreſſis, ſtylo exſerto. *C. B. S.* (E. obeſa Salisb.)

acuta Andr. 186. E. foliis lineari-cuſpidatis rigidis glabris patulis, floribus terminalibus ternis nutantibus, calycibus coloratis ciliatis, ſtaminibus incluſis. *C. B. S.*

incurva Andr. 187. E. foliis lineari-ſubfalcatis mucronatis hirſutiusculis, floribus terminalibus ſubaggregatis pubeſcentibus, pedunculis bracteatis, ſtaminibus incluſis. *C. B. S.*

pendula Wendl. 188. E. foliis lineari-oblongis glabris patentiſſimis, pedunculis terminalibus aggregatis bracteatis, calycibus lanceolatis appreſſis, coroſlis cernuis, genitalibus incluſis. *C. B. S.*

cernua 189. E. foliis linearibus patulis oblongo-linearibus incano-villoſiusculis apice ſubariſtatis, pedunculis terminalibus umbellatis bracteatis cernuis, genitalibus incluſis. *C. B. S.*

phyſodes 190. E. foliis linearibus obtuſis viſcoſis patulis, pedunculis axillaribus ſubaggregatis bracteatis, calycibus ovatis ciliatis appreſſis, corollis glutinoſis, genitalibus incluſis. *C. B. S.* (E. ſequax Salisb.)

†† *Antherae baſi nudae.*

* *Folia terna.*

umbellata 191. E. foliis linearibus abbreviatis erectis, floribus terminalibus umbellatis, genitalibus exſertis. *C. B. S.* (E. lentiformis Salisb.)

ſcoparia 192 E. foliis lineari-lanceolatis glabris, floribus racemoſis ſecundis, genitalibus incluſis. *C. B. S.* (E. fucata Thunb.)

axillaris Thunb. 193. E. foliis 3gonis glabris, ramis tomentoſis, floribus axillaribus pedunculatis ſubſolitariis, genitalibus incluſis. *C. B. S.*

† *totta* Thunb. 194. E. foliis oblongis patenti-reflexis hiſpidis, floribus terminalibus ſubſolitariis, calycibus bracteatis ciliatis, genitalibus incluſis. *C. B. S.* (E. ferox Salisb.)

hiſpidula L. ſuppl. 195. E. foliis ovato-ſubrotundis ciliatis patentiſſimis remotiusculis, floribus axillaribus terminalibusque ſubſolitariis erectis, ſtaminibus incluſis, ſtigmate peltato coronato exſerto. *C. B. S.* (E. hiſpida Thunb.)

dumoſa Andr. 196. E. foliis ovalibus margine revolutis patentibus hiſpidis, ramis flexuoſis, floribus terminalibus longe pedunculatis corymboſis pendulis, calycibus appreſſis foliaceis ebracteatis, genitalibus exſertis. *C. B. S.*

Colleter * 197. E. ramis ſtrictis hirſutis, foliis lineari-oblongis obtuſis revolutis hiſpidiusculis patentibus, floribus axillaribus cernuis viſcoſis, ſtylo exſerto, ſtigmate peltato. *C. B. S.* Berg.

villoſa Andr. 198. E. foliis linearibus remotiusculis patentibus hirſuto-ciliatis, pedunculis axillaribus terminalibusque ſubternis cernuis, calycibus ovatis villoſis, limbo corollae ſubconnivente, genitalibus exſertis. *C. B. S.*

cordata Andr. 199. E. foliis ſubcordatis ſupra villoſis ſubtus lanatis, ramis divaricatis hirſutis, floribus terminalibus glomeratis, ſtylo exſerto. *C. B. S.*

** *Folia quaterna.*

odorata Andr. 200. E. foliis lineari-oblongis margine revolutis glanduloſo-ciliatis patentiſſimis, pedunculis umbellato-verticillatis cernuis coloratis, corolla viſcoſa, genitalibus incluſis. *C. B. S.*

cruciformis Andr. 201. E. foliis linearibus glabris patentibus, floribus terminalibus quaternis decuſſatis, genitalibus incluſis. *C. B. S.*

conferta Andr. 202. E. foliis lineari-ſubulatis elongatis rigidis patenti-reflexis, floribus capitatis ſubſeſſilibus, ſtaminibus exſertis. *C. B. S.*

flexicaulis Dryand. 203. E. foliis lineari-oblongis patentiſſimis glanduloſo-ciliatis, ramis flexuoſis, floribus terminalibus umbellatis, calycibus coloratis glanduloſo-ciliatis, genitalibus incluſis. *C. B. S.* (E. glanduloſa Andr.)

*tricolor** 204. E. foliis lineari-filiformibus horizontalibus ramisque ſcabris, floribus aggregatis terminalibus ſuberectis, calycibus bracteatis coloratis, corollae limbo connivente producto, ſtaminibus incluſis, ſtylo exſerto. *C. B. S.* (E. lactiflora Hort. angl. Otto.)

hiſpida Andr. 205. E. foliis linearibus obtuſis hiſpido-ciliatis patentiſſimis, floribus racemoſis pendulis ebracteatis, genitalibus exſertis. *C. B. S.*

racemoſa 206. E. foliis linearibus patentibus glanduloſo-piloſis, ramis villoſis, floribus racemoſis nutantibus, calycibus foliaceis glanduloſo-ciliatis, ſtaminibus incluſis, ſtylo exſerto. *C. B. S.*

decora Andr. 207. E. foliis ſenis linearibus elongatis recurvatis, floribus racemoſis comoſis nutantibus, calycibus foliaceis bracteatis, genitalibus incluſis. *C. B. S.*

V. *Campanulatae: corolla ſenſim in limbum dilatata.*

† *Antherae appendiculatae.*

* *Folia oppoſita.*

vulgaris 208. E. foliis lineari-triquetris ſagittatis 4fariam imbricatis, floribus racemoſis, ſtylo exſerto. *Europ.* (E. ciliaris Hudſ. var.)

** *Folia terna.*

paniculata 209. E. foliis lineari-triquetris glabris, ramis hirſutis, floribus faſciculatis, ſtaminibus incluſis, ſtylo exſerto. *C. B. S.* (E milleflora Salisb.)

phylicoides W. 210. E. foliis lineari-3gonis 6fariam imbricatis, floribus axillaribus nutantibus, bracteis remotiusculis, calycibus elongatis, genitalibus incluſis. *C. B. S.*

laevis Andr. 211. E. foliis lineari-filiformibus glabris patentibus, ramis virgatis gracilibus, floribus terminalibus

ſubternis pendulis, ſtaminibus incluſis. *C. B. S.* (E. odorata *).

emarginata Andr. 212. E. foliis oblongis canaliculatis recurvis ciliatis, floribus terminalibus ſubternis, calycibus bracteatis ciliatis, genitalibus incluſis. *C. B. S.*

tenuis Salisb. 213. E. foliis filiformibus glabris, floribus terminalibus ſubſolitariis, ſtaminibus incluſis, ſtylo exſerto. *C. B. S.*

pygmaea Andr. 214. E. foliis ſubulatis ſquarroſo-flexuoſis glabris, ramis decumbentibus, floribus terminalibus corymboſis pubeſcentibus, calycibus abbreviatis appreſſis, genitalibus incluſis. *C. B. S.*

procumbens Loddig. 215. E. ramis erectis, foliis linearibus patulis glabris, floribus terminalibus ſubaggregatis denſe villoſis, calycibus abbreviatis, genitalibus incluſis. *C. B. S.*

calloſa Wendl. 216. E. foliis lineari-oblongis margine revolutis ſubtus albidis patulis, floribus terminalibus ſubternis erectiusculis, calycibus coloratis viſcidis, genitalibus incluſis, appendiculis antherarum abbreviatis. *C. B. S.* (E. canaliculata minor Andr.)

leucanthera L. ſuppl. 217. E. foliis linearibus glabris erectis, ramis virgatis flexuoſis, floribus terminalibus cernuis, genitalibus incluſis. *C. B. S.* (E. ſpinaeflora Salisb.)

nigricans Loddig. 218. E. ramis flexuoſis, foliis patentiſſimis ſubrefleXis linearibus apice ariſtatis glabris, floribus terminalibus ſubternis, pedunculis bracteatis calycibusque coloratis viſcidulis, corolla campanulato-rotata, limbo revoluto, genitalibus exſertis. *C. B. S.*

laxa Andr. 219. E. foliis linearibus ciliatis patulis, floribus terminalibus ſeſſilibus, calycibus bracteatis coloratis, ſtaminibus incluſis. *C. B. S.*

lucida Andr. 220. E. foliis filiformibus lucidis erectis, ramis patentibus ſtrictis, floribus terminalibus ternis, calycibus coloratis bracteatis ſerrulatis, ſtaminibus incluſis, ſtylo exſerto. *C. B. S.*

pumila Andr. 221. E. foliis linearibus patulis glabris, caule ſuffruticoſo, ramis divaricatis, floribus terminalibus ternis cernuis, calycibus bracteatis coloratis, genitalibus incluſis. *C. B. S.*

incarnata Thunb. 222. E. foliis ovatis glabris, ramis villoſis, floribus umbellatis, calycibus appreſſis, genitalibus incluſis. *C. B. S.* (E. amoena Salisb.)

****** Folia quaterna.***

auſtralis 223. E. foliis linearibus mucronatis ſcabris patentibus, floribus terminalibus aggregatis, bracteis calycibusque hirſutiusculis, ſtaminibus incluſis, ſtylo exſerto. *Europ. auſtr.* (E. piſtillaris Salisb.)

perſoluta 224 E. foliis linearibus glabris erectis ſubimbricatis, floribus terminalibus aggregatis cernuis, calycibus minutis, genitalibus incluſis. *C. B. S.* (E. prolifera Salisb., ſtrigoſa Wendl., caffra Andr.)

strigosa Ait. 225. E. foliis lineari-oblongis obtusiusculis ramisque subvillosis, floribus terminalibus aggregatis, calycibus appressis, stylo exserto. *C. B. S.* (E. axillaris Salisb.)

confertifolia Wendl. 226. E. foliis lineari-oblongis lucidis appressis dense imbricatis, floribus axillaribus umbellato-verticillatis, calycibus bracteatis coloratis, genitalibus inclusis. *C. B. S.*

arborea 227. E. foliis linearibus scabriusculis patulis, ramis incano-tomentosis, floribus racemosis subglobosis, staminibus inclusis, stylo exserto. *Europ. austr.* (E. scoparia Thunb., procera Salisb.)

pilulifera Thunb. 228. E. foliis linearibus ciliatis erecto-patulis, ramis divaricato-flexuosis hirsutis, floribus terminalibus aggregatis, calycibus patulis hirsutis, stylo exserto. *C. B. S.* (E. nudicaulis Berg.)

amoena Wendl. 229. E. foliis linearibus hirsutis erectis imbricatis, ramis strictis, floribus axillaribus verticillatis, calycibus hirsutis, genitalibus inclusis. *C. B. S.* (E. plumosa Andr.)

mitraeformis Salisb. 230. E. foliis linearibus hirsutis, floribus terminalibus umbellatis pubescentibus, genitalibus inclusis. *C. B. S.* (E. parviflora L., hirtiflora Sims.)

canescens Wendl. 231. E. foliis linearibus obtusis canescentibus erectis, floribus terminalibus sessilibus urceolato-campanulatis, calycibus foliaceis appressis, genitalibus inclusis. *C. B. S.* (E. pubescens Andr.)

congesta Wendl. 232. E. foliis linearibus dense pilosis patulis, floribus axillaribus terminalibusque congestis cernuis, calycibus foliaceis, genitalibus inclusis. *C. B. S.*

pedunculata Wendl. 233. E. foliis lineari-trigonis glabris incurvis imbricatis, ramis flexuosis, pedunculis terminalibus umbellatis patulis 2bracteatis, staminibus inclusis, stylo subexserto. *C. B. S.*

cubica 234. E. foliis 3gono-subulatis incurvo-patentibus glabris, floribus terminalibus umbellatis cernuis, pedunculis pubescentibus, sepalis ovatis coloratis serrulatis, genitalibus inclusis. *C. B. S.* (E. hottoniaeflora Salisb.)

*expromta** 235. E. ramis lanatis, foliis linearibus patenti-reflexis hirsutis apice barbatis, floribus aggregatis terminalibus cernuis, genitalibus longe exsertis. *C. B. S.* Berg.

*lasiophylla** 236. E. foliis linearibus scabris glanduloso-ciliatis apice aristatis patentibus, ramis hirsutis, floribus racemosis cernuis, calycibus appressis, genitalibus inclusis. *C. B. S.* Berg.

****Folia sena.*

empetrifolia 237. E. foliis oblongis obtusis ciliatis erectis, floribus verticillato-glomeratis, bracteis calycibusque lanceolatis, staminibus inclusis, stylo exserto. *C. B. S.*

empetroides Andr. 238. E. foliis linearibus glaucescentibus ciliatis patenti-reflexis, floribus imbricato-subspicatis comosis, bracteis calycibusque hirsutis, coroilae ab-

breviatae limbo erecto crenato, genitalibus inclusis, appendiculis antherarum latissimis. *C. B. S.*

†† *Antherae basi nudae.*

* *Foliis oppositis alternisque.*

*Aphanes** 239. E. ramis hirsutis, foliis linear-3gonis obtusiusculis scabris, floribus axillaribus terminalibusque, genitalibus inclusis. *C. B. S.*

pilosa Loddig. 240. E. foliis linearibus patulis pilosis, floribus subsolitariis pedunculatis erectis villosis, calycibus patulis villosissimis, genitalibus exsertis. *C. B. S.*

** *Folia terna.*

campanulata Andr. 241. E. foliis subulatis glabris erectis remotiusculis, calycibus foliaceis ciliatis, floribus terminalibus solitariis cernuis, genitalibus inclusis. *C. B. S.*

canaliculata Andr. 242. E. foliis linearibus margine revolutis erecto-patulis, pedunculis terminalibus ternis bracteatis pubescentibus, calycibus coloratis, corollis campanulato-rotatis, genitalibus subexsertis. *C. B. S.*

patens Andr. 243. E. foliis ovali-oblongis ciliatis patentibus, ramis hirtis, floribus terminalibus subternis, calycibus coloratis ciliatis, corollis campanulato-rotatis, antheris inclusis conniventibus scabris. *C. B. S.*

*anthina** 244. E. ramis hispidis, foliis linearibus obtusis patentibus glabriusculis, floribus subternis terminalibus cernuis, bracteis calycibusque laxis abbreviatis, antheris scabris inclusis, stylo subexserto. *C. B. S.* (E. florida Hort. angl.)

coarctata Wendl. 245. E. foliis linearibus subciliatis erecto-patulis, floribus geminatis axillaribus erectis subpedunculatis folia aequantibus, calyce foliaceo exiguo, stigmate umbraculiformi longe exserto. *C. B. S.*

absynthioides 246. E. foliis linearibus scabris patentibus remotiusculis, floribus geminatis axillaribus pedunculatis cernuis folia superantibus, calyce foliaceo appresso, stigmate 4fido peltato longe exserto. *C. B. S.* (E. fucata et virgulata Wendl., exsecta Hortul., Actaea Link.)

concava Ker. 247. E. foliis linearibus patulis, ramis ternatis, floribus axillaribus, antheris subexsertis. *C. B. S.*

*Rastellum** 248. E. ramis flexuosis hispidiusculis, foliis linearibus subfasciculatis reflexis, floribus terminalibus subcernuis 4gonis, calycibus coloratis appressis, genitalibus exsertis. *C. B. S.*

complanata Noisl. 249. E. ramis flexuosis, foliis patenti-reflexis linearibus rigidis junioribus glanduloso-ciliatis, floribus subracemosis lateralibus, calycibus appressis coloratis viscosis, corolla subrotata, genitalibus inclusis. *C. B. S.*

approximata Schlechtend. 250. E. ramis virgatis hirsutiusculis, foliis petiolatis teretiusculis abbreviatis glabris remotis patulis,

floribus ſubracemoſis glabris, calycibus coloratis appreſſis, ſtaminibus incluſis. *C. B. S.* Berg.

virgata Wendl. 251. E. foliis ovalibus patentibus glanduloſo-ciliatis, ramis hirſutis, floribus terminalibus ternis ſeſſilibus erectis, calycibus foliaceis pubeſcentibus, ſtigmate peltato longe exſerto. *C. B. S.*

melanthera 252. E. foliis linearibus obtuſis laevibus patulis, floribus terminalibus ſubumbellatis nutantibus, bracteis calycibusque coloratis, genitalibus exſertis, ſtigmate obtuſo. *C. B. S.*

Puſſerina Thunb. 253. E. foliis ovatis glabris, floribus terminalibus ſubſolitariis, pedunculis calycibusque tomentoſis, ſtaminibus incluſis, ſtylo exſerto. *C. B. S.*

thalictriflora Loddig. 254. E. ramis hirſutis ſtrictis, foliis linearibus minutis glabris erectis, floribus terminalibus glomerato-capitatis erectis, genitalibus exſertis. *C. B. S.*

bryantha Thunb. 255. E. foliis oblongis obtuſis, caule caeſpitoſo decumbente, pedunculis terminalibus corymboſis, ſtylo exſerto. *Sibiria. Camtſchatca.* (Andromeda L. Pall.)

Stelleriana W. 256. E. foliis ovalibus confertis, floribus terminalibus geminis ſubſeſſilibus cernuis, genitalibus incluſis. *Camtſchatca.* (Andromeda Pall.)

*** *Folia quaterna.*

herbacea 257. E. foliis linearibus acutis patulis glabris, floribus axillaribus racemoſis ſubſecundis cernuis, calycibus coloratis acuminatis, corolla tubuloſo-campanulata, genitalibus exſertis. *German. auſtr. Europ. auſtr.* (E. ſaxatilis Salisb.)

vagans 258. E. foliis lineari-lanceolatis obtuſiuſculis glabris patulis, floribus axillaribus ſubgeminis campanulato-abbreviatis, calycibus coloratis, genitalibus exſertis. *Cornubia. Gallia auſtr. Afric. bor.*

multiflora 259. E. foliis ſubquaternis linearibus glabris patentibus, floribus axillaribus racemoſo-corymboſis nutantibus campanulato-tubuloſis, genitalibus exſertis. *Europ. auſtr.* (E. peduncularis Presl., E. purpuraſcens L.?)

ſicula Guſſ. 260. E. foliis lineari-oblongis obtuſis patentibus canescentibus, floribus terminalibus quaternis erectis, bracteis remotis calycibusque coloratis lanceolatis, corolla campanulato-urceolata, ſtaminibus incluſis, ſtylo exſerto. *Sicil.*

*bella** 261. E. foliis lineari-filiformibus glabriuſculis patentibus apice incurvis, pedunculis terminalibus racemoſis hiſpidulis erectis, calycibus reflexis, ſtylo filiformi exſerto. *C. B. S.* (E. pulchella Hort. angl.)

mediterranea 262. E. foliis linearibus glabris patentibus, floribus axillaribus racemoſis nutantibus, calycibus coloratis ebracteatis, genitalibus exſertis. *Europ. auſtr.* (E. lugubris Salisb.)

pyramidalis Ait. 263. E. foliis linearibus pubeſcentibus patulis, floribus terminalibus ternis campanulato-elongatis,

calycibus foliaceis, ſtaminibus incluſis, ſtylo exſerto. *C. B. S.*

pyramidiformis Wendl. 264. E. foliis linearibus hiſpidis patulis, floribus terminalibus ſubternis erectis, calycibus appreſſis hiſpidis, ſtylo exſerto, ſtigmate 4fido. *C. B. S.*

viſcaria 265. E. foliis linearibus glabris patentiſſimis, floribus axillaribus verticillatis cernuis glutinoſo-pubeſcentibus, calycibus foliaceis ciliatis, genitalibus incluſis. *C. B. S.*

propendens Andr. 266. E. foliis linearibus pubeſcentibus patulis, ramis flexuoſis divaricatis, floribus terminalibus ternis pendulis, calycibus coloratis ſerrulatis, ſtaminibus incluſis, ſtylo ſubexſerto. *C. B. S.*

mellifera 267. E. foliis linearibus hiſpidis patentiſſimis remotiusculis, floribus terminalibus aggregatis, calycibus foliaceis, ſtylo capitato exſerto. *C. B. S.*

microſtoma Berg. 268. E. ramis hirſuto-lanatis, foliis lanceolato-linearibus acuminatis hiſpido-ciliatis patulis, floribus axillaribus pedunculatis aggregatis, genitalibus longe exſertis. *C. B. S.*

ſtylaris * 269. E. foliis linearibus obtuſis patentiſſimis ramisque hiſpidis, floribus terminalibus glomeratis erectiusculis, calycibus coloratis patulis ciliatis, ſtylo longe exſerto, ſtigmate capitato. *C. B. S.* Berg.

jubata Loddig. 270. E. foliis lineari-filiformibus ſubglutinoſis incurvo-patentibus, pedunculis terminalibus corymboſis hiſpidis, calycibus 4gonis coloratis ſerrulatis, corolla campanulato-rotata, ſtylo exſerto. *C. B. S.*

VI. *Calycinae: calycibus corollas aequantibus vel ſuperantibus.*

† *Antherae appendiculatae.*

* *Folia terna.*

elegans Andr. 271. E. foliis linearibus glaucis patulis, floribus ſubcapitatis cernuis involucratis, involucris calycibusque coloratis patulis corollam urceolatam ſubaequantibus, genitalibus incluſis. *C. B. S.*

lachnaea Andr. 272. E. foliis ovalibus pubeſcentibus imbricatis, floribus aggregatis terminalibus, calycibus bracteatis, corolla ſubcampanulato-rotata, genitalibus incluſis. *C. B. S.*

coriifolia 273. E. foliis linearibus glabris erecto-appreſſis, floribus terminalibus faſciculato-racemoſis, calycibus patentibus corollam urceolatam aequantibus, genitalibus incluſis. *C. B. S.* (E. articularis L., calycina Andr.)

ſexfaria Ait. 274. E. foliis linearibus glabris patulis 6fariam poſitis, floribus terminalibus ſubſeſſilibus cernuis, calycibus obtuſis corollam ſubcampanulatam aequantibus, genitalibus exſertis. *C. B. S.* (E. ſpumoſa Thunb.)

rigidifolia Wendl. 275. E. foliis linearibus rigidis nitidis erecto-patulis, floribus terminalibus aggregatis cernuis, calycibus coloratis corollam subcampanulatam aequantibus, staminibus inclusis, stylo exserto. *C. B. S.*

pachyphylla * 276. E. foliis petiolatis ellipticis crassis abbreviatis glaberrimis nitidis margine scabris, floribus aggregatis terminalibus glabris, calycibus corollam urceolatam aequantibus, genitalibus inclusis. *C. B. S.* Berg.

pallida Wendl. 277. E. foliis linearibus appressis concavis subtus canaliculatis glabris acutis glaucis, floribus terminalibus erectis, bracteis coloratis amplis laxis, calycibus corollam urceolatam superantibus. *C. B. S.* Lichtenst.

gnaphalodes 278. E. foliis ovatis glabris appressis imbricatis, floribus terminalibus fasciculatis, calycibus ciliatis corollam campanulatam subaequantibus, genitalibus inclusis. *C. B. S.* (E. teretiuscula Wendl. var.)

calycina 279. E. foliis linearibus subtus albidis appressis imbricatis glabris, floribus terminalibus fasciculatis, calycibus patulis coloratis corollam urceolatam aequantibus, genitalibus inclusis. *C. B. S.* (E. gnidiaefolia Salisb.)

flagellaris Link. 280. E. foliis lineari-oblongis obtusis appressis ciliatis, ramis virgatis flexuosis, floribus terminalibus subternis erectis, calycibus bracteatis patulis corollam multo superantibus. *C. B. S.*

triflora 281. E. foliis linearibus elongatis patulis glabris, floribus terminalibus aggregatis, calycibus bracteatis corollam urceolatam aequantibus, genitalibus inclusis. *C. B. S.* (E. pyrolaeflora Salisb.)

andromedaeflora Andr. 282. E. foliis linearibus ciliatis rigidis patentibus, floribus axillaribus, calycibus coloratis amplis corollam campanulatam aequantibus, genitalibus inclusis. *C. B. S.*

** *Folia quaterna.*

baccans 283. E. foliis linear-3gonis obtusiusculis glabris erectis imbricatis, pedunculis terminalibus subumbellatis bracteatis, calycibus coloratis amplis corollam urceolatam subaequantibus, genitalibus inclusis. *C. B. S.*

squamosa Andr. 284. E. foliis linearibus obtusis serrulatis erectis imbricatis, floribus terminalibus aggregatis cernuis, calycibus imbricatis corollam urceolatam aequantibus, genitalibus inclusis. *C. B. S.*

†† *Antherae basi nudae.*

* *Folia opposita.*

oppositifolia Andr. 285. E. foliis filiformibus appressis, floribus terminalibus congestis erectis, calycibus patulis corol-

lam ampullaceam aequantibus, genitalibus inclusis. *C. B. S.*

tenuifolia 286. E. foliis linearibus appreſſis, floribus terminalibus aggregatis ſubſeſſilibus, calycibus coloratis corollam ovatam ſubaequantibus, ſtaminibus incluſis. *C. B. S.* (E. linifolia Salisb.)

aperta * 287. E. foliis linearibus cuſpidatis margine ſcarioſis glaberrimis erectis, floribus terminalibus aggregatis, bracteis calycibusque coloratis, corolla rotata, genitalibus exſertis. *C. B. S.*

** *Folia terna.*

bracteata Thb. 288. E. foliis lanceolatis glabris appreſſis, floribus terminalibus umbellatis, bracteis calycibusque coloratis elongatis, genitalibus incluſis. *C. B. S.* (E. obvallaris Salisb.)

Thunbergii L. ſuppl. 289. E. foliis linearibus glabris erectis, floribus terminalibus umbellatis, calycibus bracteatis corollam urceolatam limbo diſcolore ſuperantibus, ſtylo exſerto. *C. B. S.* (E. medioliflora Salisb.)

velleriflora Salisb. 290. E. foliis linearibus hirſutis patentibus remotiuſculis, floribus terminalibus ternis, calycibus villoſiſſimis corollam urceolatam ſubſuperantibus, genitalibus exſertis. *C. B. S.* (E. villoſa Wendl., capitata Thunb., bruniades Andr.)

bruniades 291. E. foliis lineari-oblongis abbreviatis villoſis erectis, floribus terminalibus ſubumbellatis cernuis, calycibus villoſiſſimis corollam pubeſcentem ſubcampanulatam aequantibus, genitalibus exſertis. *C. B. S.* (E. carbaſina Salisb.)

capitata 292. E. foliis lineari-oblongis villoſis erectis, floribus ſubſolitariis terminalibus, calycibus inflatis villoſis corollam pubeſcentem urceolatam aequantibus, genitalibus incluſis, antheris baſi productis. *C. B. S.* (E. byſſina Salisb.)

tiaraeflora Andr. 293. E. foliis linearibus rigidis patentiſſimis, floribus terminalibus glomeratis cernuis, calycibus bracteatis coloratis, tubo corollae baſi dilatato, antheris conniventibus exſertis. *C. B. S.* (E. placentaeflora Salisb.)

fragrans Andr. 294. E. foliis ſubulatis glaucis erectis, floribus ſubternis cernuis, calycibus laxis coloratis corollam campanulatam ſubaequantibus, antheris baſi bifidis. *C. B. S.*

fimbriata Andr. 295. E. foliis lineari-oblongis craſſis appreſſis ciliatis, floribus terminalibus glomeratis, calycibus bracteatis coloratis fimbriatis, corolla ſubgloboſa, genitalibus incluſis. *C. B. S.*

glomerata Andr. 296. E. foliis lineari-ſubulatis appreſſis glabris, floribus terminalibus glomeratis, calycibus coloratis bracteatis corollam urceolatam aequantibus, genitalibus incluſis. *C. B. S.*

moſchata Andr. 297. E. foliis linearibus obtuſis patentibus, floribus terminalibus faſciculatis, calycibus bracteatis coloratis corollam campanulatam aequantibus, genitalibus incluſis. *C. B. S.*

mucronata Andr. 298. E. foliis lineari-lanceolatis cuſpidatis patentibus glabris, pedunculis terminalibus racemoſis, calycibus bracteatis coloratis corollam campanulatam ſubaequantibus, ſtaminibus incluſis. *C. B. S.*

imbricata 299. E. foliis linearibus erectis imbricatis, ramis hirſutiusculis, floribus terminalibus ſubaggregatis erectiusculis, calycibus glabris imbricatis corollam urceolatam aequantibus, genitalibus exſertis. *C. B. S.*

ſtaminea Andr. 300. E. foliis linearibus glabris erectis, floribus axillaribus ſparſis, calycibus bracteatis corollam ſubrotatam aequantibus, ſtaminibus divaricatis longe exſertis. *C. B. S.*

caeſia Salisb. 301. E. foliis linearibus abbreviatis glabris erectis, ramis ſtrictis, floribus terminalibus geminis erectis, calycibus bracteatis corollam campanulatam aequantibus, genitalibus exſertis. *C. B. S.*

petiolata Thb. 302. E. foliis lanceolatis craſſiusculis patentibus longe petiolatis, ramis confertis, floribus terminalibus ternis, calycibus bracteatis corollam urceolatam aequantibus, ſtylo exſerto. *C. B. S.*

penicilliflora Salisb. 303. E. foliis lineari-ſubulatis ciliatis erectis, floribus terminalibus ſubaggregatis pedunculatis, calycibus bracteatis ciliatis corollam urceolatam aequantibus, antheris longe exſertis baſi productis conniventibus. *C. B. S.* (E. calyculata Wendl.)

taxifolia 304. E. foliis 3gonis glabris patentibus, floribus terminalibus aggregatis erectis, calycibus bracteatis coloratis corollam ampullaceam ſubaequantibus, genitalibus incluſis. *C. B. S.*

† *obcordata* Link. 305. E. foliis lanceolatis carinatis margine ſcariosis erectis, floralibus dilatatis, calycibus patentibus corollam urceolatam aequantibus, genitalibus inclùſis. *C. B. S.*

ſpumoſa 306. E. foliis ſub-3gonis glabris patentibus, floribus terminalibus ſubternis erectis, calycibus patulis corollam ovalem aequantibus, genitalibus exſertis. *C. B. S.*

triceps Link. 307. E. foliis ſub-3gonis ciliatis erecto-patulis, ramis pubeſcentibus, floribus terminalibus ternis pedunculatis, calycibus patulis corollam ſubaequantibus, antheris ciliatis baſi productis ſtyloque capitato longe exſertis. *C. B. S.*

nivea Loddig. 308. E. foliis ternis quaternis linearibus obtuſis appreſſis glabris, floribus terminalibus ſubaggregatis cernuis, calycibus patulis obtuſis corollam ſubcampanulatam aequantibus, ſtaminibus incluſis, ſtylo exſerto. *C. B. S.*

croſſota * 309. E. foliis oppoſitis terniſque linearibus cuſpidato-ariſtatis glabris patulis, floribus terminalibus ſubternis cernuis, pedunculis bracteis calycibusque fimbriatis, corolla conica, genitalibus incluſis. *C. B. S.*

1409. SALAXIS Salisb.

arboreſcens W. 1. S. foliis ternis appreſſis teretiusculis, floribus lateralibus ſubterminalibus, pedunculis pubeſcentibus. *Inſ. Mascaren.*

montana W. 2. S. foliis ternis appreſſis 4gonis, floribus lateralibus ſubterminalibus, pedunculis glabris. *Inſ. Mascaren.*

abietina W. 3. S. foliis ſubſenis linearibus patentibus, floribus lateralibus ſubterminalibus. *Inſ. Mascaren.*

1410. MENZIESIA Sm.

coerulea Wahlb. Sw. 1. M. foliis confertis linearibus obtuſis ciliatis patentibus, pedunculis aggregatis, calycibus acutiſſimis patentibus, floribus decandris. *Lappon. Grönland. Sibir. Amer. bor.* (Erica coerulea W. Andromeda L.)

empetriformis Sm. 2. M. foliis confertis linearibus ſerrulatis ſubtus convexis, pedunculis terminalibus aggregatis, calycibus obtuſis, floribus decandris. *Amer. bor. occident.*

aleutica * 3. M. foliis imbricatis linearibus ſerrulatis ſubtus planis, pedunculis terminalibus aggregatis floccoſis, calycibus acutis, floribus 8andris. *Inſ. Aleut.*

Bruckenthalii Baumg. 4. M. foliis confertis linearibus glanduloſo-ciliatis, floribus racemoſis terminalibus campanulatis 8andris, calycibus denticulatis appreſſis, ſtylo exſerto. *Alp. dinar.*

globularis Salisb. 5. M. foliis lanceolatis piloſis ſubtus glaucis, floribus globoſis 8andris. *Virgin. Carolin.* (M. Smithii Mx., piloſa Juſſ.)

polifolia Juſſ. 6. M. foliis alternis oblongis ſubtus tomentoſis, floribus campanulatis 8andris pendulis, genitalibus incluſis. *Hibernia.* (Erica et Andromeda Daboecia L. E. Dabeoci Sm. Vaccinium cantabricum Hudſ.)

ferruginea Sm. 7. M. foliis ſpathulatis ſerrulato-ciliatis ſubtus glabris, floribus urceolatis 8andris. *Amer. bor. ora occid.*

triflora Bert. 8. M. foliis alternis ſpathulato-oblongis utrinque nitidis, pedunculis aggregatis reflexis, calycibus obtuſis. *Jamaica.* (Andromeda 8andra Sw.)

1411. HEDWIGIA Sw.

balſamifera Sw. *Hiſpaniol.* Arbor excelſa, foliis pinnatis glabris integerrimis, floribus racemoſis albidis.

1412. DIOSPYROS.

* *Foliis utrinque glabris.*

virginiana 1. D. foliis elliptico-oblongis obtuſis utrinque concoloribus nitidis, petiolis pubeſcentibus. *Amer. boreal.*

reticulata W. 2. D. foliis elliptico-oblongis obtusis coriaceis utrinque nitidis subtus tenuissime reticulatis, calycibus villosis. *Inf. Mascaren.* (D. tessellaria Poir.)

Ebenaster Retz. 3. D. foliis elliptico-oblongis obtusis coriaceis utrinque reticulatis, calycibus gemmisque glabris. *Bengal.* (D. Ebenum L. suppl.)

Melanoxylon Roxb. 4. D. foliis oblongo-lanceolatis apice rotundatis basi attenuatis nitidis, gemmis pubescentibus. *Ind. or.*

Ebenum Retz. 5. D. foliis ovato-lanceolatis acuminatis glaberrimis, gemmis hirtis. *Ceylon. Madagascar.* (D. glaberrima Rottb., lanceolata Poir.)

montana Roxb. 6. D. foliis ovato-oblongis acutis, floribus ♂ corymbosis, ♀ solitariis. *Ind. or.*

obovata Jacq. 7. D. foliis obovato-oblongis nervoso-venosis, pedunculis axillaribus 3floris, fructibus 4spermis. *Jamaica. Hispaniola.* (D. 4sperma Sw. revoluta Poir.)

obtusifolia Humb. 8. D. foliis oblongis elongatis obtusis subtus pallidis, pedunculis sub-5floris, floribus 5fidis 10andris. *Mexico.*

Sylvatica Roxb. 9. D. foliis oblongis utrinque attenuatis, floribus ♂ cymosis, ♀ solitariis 3gynis. *Ind. or.*

digyna Jacq. 10. D. foliis oblongis utrinque attenuatis, floribus solitariis 2gynis, corolla calycem multo superante. *Celebes.*

lycioides Desf. 11. D. foliis lanceolatis obtusis mucronatis perennantibus, floribus solitariis 5fidis. *Patria?*

Embryopteris Perf. 12. D. foliis oblongo-lanceolatis acutis subtus glaucis, floribus ♂ subcorymbosis polyandris. *Ind. orient. Inf. Philippin.* (Embryopteris glutinifera Roxb. peregrina Gärtn. Cavanillea philippensis Lam. D. discolor W.)

Melanida Poir. 13. D. foliis ovatis subtus pallidis, floribus 5fidis, fructibus 10spermis. *Inf. Mascaren.*

leucomelas Poir. 14. D. foliis subcordatis oblongis coriaceis lucidis subtus pallidis, floribus 6fidis, fructibus 12spermis. *Inf. Mascaren.*

nodosa Poir. 15. D. foliis ovato-lanceolatis coriaceis nitidis, ramis nodosis, floribus 5fidis. *Inf. Mascaren.* (D. angulata Poir.)

chrysophyllos Poir. 16. D. foliis ovato-oblongis obtusis subtus fulvo-splendentibus, floribus 5fidis. *Inf. Mascaren.*

lobata Lour. 17. D. foliis ovato-lanceolatis, floribus solitariis ♀ 4fidis. *Cochinchina.*

dodecandra Lour. 18. D. foliis oblongo-lanceolatis, floribus 4fidis 12andris, fructibus lentiformibus 8spermis. *Cochinchina.*

** *Foliis subtus pubescentibus.*

Lotus 19. D. foliis oblongis acuminatis subtus pubescentibus, gemmis interne hirsutis. *Europ. austr. Afric. bor.*

orixensis Klein. 20. D. foliis ovato-oblongis acutiusculis subtus villosis. *Ind. or.*

Kaki L. suppl. 21. D. foliis oblongis utrinque attenuatis subtus pubescentibus, ramis tomentosis, pedunculis 2floris. *Japon.*

hirsuta L. suppl. 22. D. foliis oblongis obtusis subtus ramisque villosis, floribus congestis sessilibus. *Ceylon.*

salicifolia Humb. 23. D. foliis spathulatis subtus pubescentibus, ramis cinereis. *Amer. austr.*

Chloroxylon Roxb. 24. D. foliis ovatis acutis subtus villosis, ramis spinosis, floribus aggregatis. *Ind. or.* (D. tomentosa Poir.)

cordifolia Roxb. 25. D. foliis cordato-oblongis acuminatis subtus pubescentibus, ramis spinosis. *Ind. or.*

rugulosa R. Br. 26. D. foliis ovato-oblongis acuminatis subtus tomentosis rugulosis, floribus 4fidis. *Nov. Holl.*

†*pubescens* Pursh. 27. D. foliis oblongis acutis subtus pubescentibus, fructibus oligospermis. *Amer. bor.*

1413. CARGILLIA R. Br.

laxa R. Br. 1. C. foliis oblongis subundulatis glabris concoloribus, ramis laxis, calycibus tubo corollae brevioribus, stylo 3-4partito. *Nov. Holl.*

australis R. Br. 2. C. foliis oblongis basi attenuatis subtus pallidis, calycibus tubum corollae aequantibus, stylo indiviso. *Nov. Holl.*

1414. ELLIOTTIA Mühl.

racemosa Mühl. *Georgia.* Frutex ramis virgatis, foliis lanceolatis integerrimis alternis subtus glaucescentibus, floribus racemosis albis.

1415. MIMOSA W.

* *Foliis conjugato-pinnatis.*

hirsuta * 1. M. inermis, stipulis linearibus, pinnis 12jugis, foliolis ovalibus marginatis ciliatis, petiolo communi hirsuto. *Monte Video.* Sello.

viva 2. M. inermis herbacea, pinnis 4jugis, foliolis subrotundis, lomento 1articulato. *Jamaica.*

floribunda W. 3. M. aculeata, pinnis 2jugis, foliolis subdimidiato-ovatis subtus strigosis, intimis minimis, ramis retrorsum hirsutis, capitulis paniculatis. *Caracas.*

sensitiva 4. M. aculeata, pinnis 2jugis, foliolis subdimidiato-ovatis acutis subtus pubescentibus, intimis minimis, floribus 5andris. *Brasil.* (M. obtusifolia W.)

albida Humb. 5. M. aculeata, pinnis 2jugis, foliolis inaequilateris acutis cano-pubescentibus, intimis minimis, capitulis geminis, floribus 4andris, lomentis hispidis. *Peru.*

strigosa W. 6. M. aculeata, ramis ferrugineo-tomentosis, pinnis 2jugis, foliolis subdimidiatis ovato-oblongis

acutis utrinque ſtrigoſis, intimis minimis ovatis cuſpidatis. *Amer. auſtr.*

debilis Humb. 7. M. aculeata herbacea, pinnis 2jugis, foliolis obovatis mucronatis utrinque pubeſcentibus, intimis minimis, capitulo ſolitario. *Amer. auſtr.*

† *caſta* 8. M. aculeata, pinnis 4jugis, foliolis oblongis inaequilateris ſubaequalibus utrinque glabris, floribus 10andris. *Ind. or.*

ciliata * 9. M. aculeis ſparſis horizontalibus, ramis ſtrigoſis, ſetis deorſum appreſſis, pinnis 6jugis, foliolis ſubdimidiatis ovato-oblongis nervoſis baſi ciliatis, floribus axillaribus ſeſſilibus 5andris. *Monte Video.* Sello.

polycarpa Humb. 10. M. aculeis horizontalibus oppoſitis, pinnis multijugis, foliolis linearibus ſubtus piloſis, capitulis ſeſſilibus, floribus 4andris, lomentis 3articulatis ſetoſo-ſpinuloſis. *Peru.*

** *Foliis ſubdigitato-pinnatis.*

tomentoſa Humb. 11. M. inermis, pinnis quaternis multijugis, foliolis linearibus obtuſis lanatis, floribus 4andris, bracteis ſpathulatis ciliatis. *Ad Orinocum.*

pectinata Humb. 12. M. ſpinis ſparſis horizontalibus validis, ramis hiſpidis, foliolis pectinatis linearibus ſetoſo-ciliatis, floribus 4andris. *Quito.*

brevifolia Humb. 13. M. ſpinis patentibus, pinnis quaternis 2jugis, foliolis ovalibus caneſcentibus, lomentis digitatis glabris. *Amer. auſtr.*

tetrandra Humb. 14. M. aculeis ſparſis recurvis, pinnis quaternis multijugis, foliolis linearibus ſetoſo-ciliatis, capitulis oblongis geminatis, floribus 4andris, lomentis ſetoſo-ciliatis. *Amer. auſtr.*

pudibunda W. 15. M. aculeis ſubgeminatis uncinatis, ſtipulis fimbriatis, pinnis quaternis multijugis, foliolis linearibus hirſutis, capitulis geminis. *Braſil.*

pudica 16. M. ramis hirto-aculeatis, pinnis quaternis multijugis, foliolis hirſutis, lomentis congeſtis margine ſetoſis. *Amer. auſtr.*

polydactyla Humb. 17. M. ramis hiſpido-aculeatis, pinnis octonis multijugis, foliolis linearibus acutis ciliatis, petiolis elongatis, capitulis geminatis petiolo longe brevioribus, floribus 4andris. *Amer. auſtr.*

*** *Foliis 2pinnatis.*

† *Inermes.*

polyſtachya 18. M. foliis cirrho terminatis, partialibus 3-4-, propriis 6jugis oblongis obtuſis glabris, ſpicis teretibus elongatis. *Ind. occ.*

† *diſtachya* Cav. 19. M. foliis partialibus propriisque 4jugis remotis obovatis, ſtipulis linearibus, ſpicis geminis cylindricis axillaribus. *Nov. Hiſpan.*

multiglandulosa Humb. 20. M. foliis partialibus 4-propriis multijugis linearibus imbricatis glabris, petiolis ramulisque

glanduloſo-piloſis, capitulis terminalibus racemoſis. *Amer. auſtr.*

microcephala Humb. 21. M: foliis partialibus 16-propriis multijugis, linearibus ciliatis, capitulis oblongis racemoſis, lomentis ſtrigoſis. *Amer. auſtr.*

†† *Aculeatae ſ. ſpinoſae.*

ſemiſpinoſa 22. M. aculeis ſuperne confertis, foliis partialibus 3-, propriis 4jugis remotiusculis ovalibus ciliatis, petiolis divaricatis pubeſcentibus ſubaculeatis, lomentis glabris. *Nov. Granat.*

armata Rottl. 23. M. aculeis confertis horizontalibus, foliis partialibus 4-propriis 8jugis oblongis ſericeis, pedunculis incano-pubeſcentibus, capitulis axillaribus ſubſolitariis, lomentis falcatis pubeſcentibus margine aculeatis. *Ind. or.* (M. hamata W.)

intermedia Humb. 24. M. ramis petiolisque hiſpidis aculeatis, foliis partialibus ſub-4-propriis 12jugis linearibus obtuſis glabris, lomentis obovatis ſub-2articulatis ſtylo mucronatis glabris. *Caracas.*

humilis Humb. 25. M. aculeis ſubulatis rectis oppoſitis, foliis partialibus 4-propriis 10jugis linearibus 3nerviis ciliatis, ramis ſtrigoſis, capitulis geminis, lomentis 2articulatis ſtrigoſo-hirtis. *Amer. auſtr.*

ſomnians Humb. 26. M. aculeis ſparſis baſi dilatatis uncinatis, foliis partialibus 4-propriis multijugis linearibus glabris, capitulis longiſſime pedunculatis, lomentis linearibus hiſpidulis. *Nov. Granat.*

palpitans Humb. 27. M. aculeis ſparſis rectis abbreviatis, foliis partialibus 5-propriis multijugis minutis linearibus, lomentis linearibus margine ſetoſis. *Amer. auſtr.*

Rottleri * 28. M. aculeis ſparſis recurvis, foliis partialibus 6-propriis 10jugis remotiusculis ovalibus glabris, capitulis paniculatis, lomentis falcatis glabris. *Ind. orient.* (M. ſpinoſiliqua Rottl., rubicaulis Lam.)

agreſtis Sieb. 29. M. aculeis ramorum horizontalibus rectis, ramis incanis, foliis partialibus 6-propriis 10jugis pubeſcentibus, racemis ſpicatis folia ſuperantibus. *Palaeſtina.*

dormiens Humb. 30. M. aculeis petiolorum oppoſitis ſubulatis elongatis, partialium baſi ſpina recta, ramis hirſutis, foliis partialibus 6-propriis multjjugis, capitulis ſolitariis axillaribus. *Amer. auſtr.*

aſperata 31. M. aculeis petiolorum uncinatis, partialium baſi ſpina recta, ramis hirtis, foliis partialibus 8-propriis multijugis, lomentis hirtis. *Ind. occ.* (M. pigra L.)

caneſcens W. 32. M. aculeis uncinatis ſparſis, ramulis petiolisque ſetoſo-hiſpidis, foliis partialibus 8-propriis multijugis linearibus incano-piloſis, capitulis ſolitariis axillaribus. *Guinea.*

aemula * 33. M. aculeis confertiſſimis rectis ſubflexuoſis, foliis partialibus 8-propriis ſub-12jugis ſubrotun-

dis ſtellato-pubeſcentibus ſubtus tomentoſis, capitulis corymboſis hirtis. *Braſil.* Sello.

abſtergens Roxb. 34. M. aculeis ramorum confertis ſubrecurvis, ramis punctatis, ramulis villoſis, foliis partialibus 8-propriis multijugis linearibus ciliatis, petiolis inermibus pubeſcentibus baſi glanduloſis, capitulis paniculatis. *Ind. or.*

mascarenenſis * 35. M. aculeis ramorum ſparſis ſubreflexis, foliis partialibus 10-propriis multijugis minutis linearibus ramulisque villoſis, pedunculis lateralibus ſubgeminis. *Inſ. Mascaren.*

rugata Lam. 36. M. aculeis ramorum ſparſis ſubreflexis, foliis partialibus 10-propriis multijugis linearibus obtuſis, glandula petioli baſilari, lomentis latis rugoſis. *Ind. or.*

Habbas Delil. 37. M. aculeis petioli axillaribus rectis elongatis, interaxillaribus oppoſitis horizontalibus, foliis partialibus 10-propriis multijugis ramisque hirſutis, lomentis hirtis. *Aegypt.* (M. pigra W. herb.)

latiſpinoſa Lam. 38. M. aculeis oppoſitis latis compreſſis, ramis angulatis petiolisque pubeſcentibus, foliis partialibus propriisque 10jugis lineari-oblongis ciliatis. *Madagascar.*

hiſpida W. 39. M. aculeis ſparſis uncinatis, petiolis ſtrigoſis ſubaculeatis, foliis partialibus 10-propriis multijugis linearibus ſtrigilloſis, lomentis ſetoſis. *Caracas.*

pelhia Humb. 40. M. aculeis ſparſis compreſſis uncinatis, ſubulato recto ad baſin petioli, ramis teretiusculis ſetoſo-hiſpidis, foliis partialibus 12-propriis multijugis linearibus ciliatis, lomentis denſiſſime hirtis. *Amer. auſtr.*

angulata * 41. M. aculeis ramorum ſparſis uncinatis, ramis angulatis, petiolis inermibus villoſiſſimis glanduloſis, foliis partialibus propriisque multijugis linearibus ciliatis, capitulis paniculatis. *Braſil.*

braſilienſis * 42. M. aculeis ſtipularibus oppoſitis erectis, petiolis hirſutis ſubinermibus, foliis partialibus propriisque multijugis linearibus imbricatis, capitulis folio brevioribus. *Braſil.*

ferruginea Rottl. 43. M. aculeis ramorum petiolorumque pubeſcentium recurvis, foliis partialibus propriisque multijugis linearibus dimidiatis imbricatis glabris, glandula oblonga ad baſin petioli, capitulis paniculatis terminalibus. *Ind. or.*

† *ſinuata* Lour. 44. M. caule ſcandente aculeato, foliis 2pinnatis multijugis linearibus, capitulis axillaribus ſolitariis longe pedunculatis, leguminibus ſinuoſis compreſſis. *Cochinchina.*

1416. SCHRANKIA W.

aculeata W. 1. Schr. caule 4gono, aculeis uncinatis compreſſis, foliis 2pinnatis, partialibus 3-propriis multijugis, leguminibus aculeatis acutis. *Nov. Hiſpan.* (Mimoſa 4valvis L.)

***hamata* Humb.** 2. Schr. caule 5gono, aculeis confertis uncinatis, foliis 2pinnatis, partialibus 4-propriis multijugis, leguminibus roſtrato-acuminatis. *Amer. auſtr.*

***uncinata* W.** 3. Schr. caule 5gono, aculeis confertis compreſſis uncinatis, foliis 2pinnatis, partialibus 6-propriis multijugis obtuſis, capitulis geminis axillaribus, leguminibus acuminatis denſe aculeatis. *Florida.* (Mimoſa horridula Mx. Vent. Intſia Walt.)

1417. CHLORA.

***ſeſſilis* W.** 1. Chl. foliis ovatis 5nerviis, floribus ſeſſilibus 4fidis 8andris intus villoſis. *Buenos Ayres.* (Gentiana ſeſſilis L.)

imperfoliata 2. Chl. foliis ſeſſilibus cordato-ovatis, flore ſubſolitario 6fido. *Italia ſup.* (Chl. dubia Lam.)

perfoliata 3. Chl. foliis connato-perfoliatis ovatis glaucis, floribus 8fidis. *Anglia. Europ. auſtr.* (Gentiana perfoliata L.)

1418. SYMPHOREMA Roxb.

***involucratum* Roxb.** *Ind. or.* Arbor ſcandens, ramis brachiatis, foliis oppoſitis oblongis ſerratis pubeſcentibus, pedunculis aggregatis, involucris villoſis, floribus albis.

1419. MIMUSOPS.

Elengi 1. M. foliis ovato-oblongis acutis coriaceis nitidis, pedunculis ſolitariis glabris petiolos aequantibus, corollae laciniis ſubtriplici ſerie. *Ind. or. Inſ. Molucc.* (M. lucida Poir.)

***parvifolia* R. Br.** 2. M. foliis ovato-oblongis acuminatis glabris, pedunculis tomentoſis petiolos ſuperantibus. *Nov. Holl.*

***diſſecta* *** 3. M. foliis ſpathulatis emarginatis coriaceis, pedunculis ſolitariis, corollae laciniis triplici ſerie, floribus 6andris. *Inſ. Amic.* (Achras diſſecta Forſt.)

***hexandra* Roxb.** 4. M. foliis obovatis emarginatis, pedunculis geminis, floribus 6andris. *Ind. or.*

Kauki 5. M. foliis obovatis obtuſiſſimis ſubtus argenteis, pedunculis ſubternis tomentoſis, laciniis corollae 4plici ſerie. *Arabia. Inſ. Mascaren. Molucc. Ind. or. Nov. Holl.* (M. obtuſifolia Lam. Binectaria Forsk.)

***Imbricaria* W.** 6. M. foliis oblongis venoſis nitidis glabris, pedunculis confertis, laciniis corollae 3fidis, fructibus 4ſpermis. *Ind. or. Inſ. Mascaren.* (Imbricaria maxima Poir.)

1420. CYTINUS.

Hypociſtis *Europ. auſtr.* Planta annua in Ciſtorum radicibus paraſitica aphylla ſquamoſa, floribus faſciculatis luteſcentibus.

1421. VACCINIUM.

* *Foliis deciduis.*

† *Corolla campanulata.*

α. *Flores racemoſi.*

Arctoſtaphylos 1. V. caule arboreo, foliis ovatis mucronatis utrinque glabris, floribus racemoſis, calycibus obtuſis, corollis venoſis. *Armenia. Cauca.*

maderenſe Link. 2. V. caule arboreſcente, foliis oblongis utrinque attenuatis ſubtus pubeſcentibus ſerrulatis, floribus racemoſis pendulis, calycibus acutiusculis, corollis 1coloribus. *Madera.* (V. Arctoſtaphylos Andr.)

arboreum Mx. 3. V. caule arboreſcente, foliis ovatis mucronatis glanduloſo-ſerratis ſupra nitidis ſubtus pubeſcentibus, racemis bracteatis nutantibus, laciniis corollae acutis, antheris incluſis. *Carolin. Florida.* (V. diffuſum Ait.)

ramoſum Andr. 4. V. caule fruticoſo, ramis reſinoſo-punctatis pubeſcentibus, foliis obovato-oblongis mucronatis integerrimis ſubtus concoloribus, racemis bracteatis, laciniis corollae rotundatis, antheris incluſis. *Amer. bor.* (V. hirtellum Ait., frondoſum Mx.)

frondoſum 5. V. caule fruticuloſo, foliis elliptico-oblongis obtuſis integerrimis glabris ſubtus glaucis reſinoſo-punctatis, racemis bracteatis laxis, pedicellis filiformibus, laciniis corollae acutis. *Amer. bor.* (V. venuſtum Ait., glaucum Mx.)

† *pallidum* Ait. 6. V. foliis ovatis acutis ſerrulatis glabris, racemis bracteatis, corollis cylindrico-campanulatis. *Amer. bor.*

β. *Flores ſolitarii.*

mucronatum 7. V. foliis oblongis mucronatis integerrimis glabris, pedunculis ſimpliciſſimis 1floris folio ſubbrevioribus. *Amer. bor.*

erythrocarpon Mx. 8. V. ramis flexuoſis divaricatis, foliis oblongis acuminatis ſerrulato-ciliatis pubeſcentibus, pedunculis 1floris, corollae laciniis revolutis, antheris exſertis dorſo muticis. *Carolina.* (Oxycoccus erectus Pursh.)

ſtamineum 9. V. foliis oblongis acutis integerrimis ſubtus incano-pubeſcentibus, pedunculis abbreviatis, laciniis corollae oblongis acutis, antheris exſertis dorſo ariſtatis, baccis pyriformibus (albis). *Amer. bor. Mexico.*

album 10. V. foliis ovato-oblongis acuminatis subtus ramulisque incano-pubescentibus, pedunculis subsolitariis, laciniis corollae ovatis acutis, antheris exsertis dorso aristatis, baccis globosis (albis). *Amer. bor.* (V. stamineum Andr.)

hirtum Thunb. 11. V. ramis divaricatis, junioribus villosis, foliis ovatis acutis serratis utrinque pubescentibus, laciniis corollae revolutis. *Japon.*

†† *Corolla urceolata.*

α. *Flores racemosi, fasciculati.*

bracteatum Thunb. 12. V. ramis divaricatis, foliis ovatis acutis serrulatis, racemis foliatis secundis, bracteis setaceis. *Japon.*

ciliatum Thb. 13. V. ramulis erectis villosis, foliis ovatis acutis integerrimis hispidis, racemis foliatis secundis. *Japon.*

resinosum Ait. 14. V. foliis oblongis obtusiusculis subtus resinoso-punctatis, venis subtus pubescentibus, racemis aggregatis corymbosis abbreviatis aphyllis bracteolatis, corollis 5gonis. *Amer. bor.* (V. parviflorum Andr. Andromeda baccata Wangenh.)

corymbosum 15. V. foliis oblongis acutis integerrimis subtus subtomentosis, racemis aphyllis corymbosis, bracteis squamaceis, corollis subglobosis. *Amer. bor.* (V. album Lam., disomorphum Mx.)

amoenum Ait. 16. V. foliis oblongis utrinque attenuatis integerrimis glabris, venis subtus subpubescentibus, racemis confertis bracteatis, corollis subcylindricis. *Amer. bor.* (V. disomorphum var. Mx.)

virgatum Ait. 17. V. foliis oblongis utrinque attenuatis serrulatis glabris, ramis floriferis aphyllis elongatis, racemis sessilibus corymbosis abbreviatis, corollis cylindricis, stylo subexserto. *Amer. bor.*

fuscatum Ait. 18. V. foliis oblongis mucronatis serrulatis glabris, venis subtus ramulisque pubescentibus, racemis compositis aphyllis, pedicellis secundis nutantibus elongatis, corollis cylindricis, stylo subexserto. *Amer. bor.* (V. formosum Andr.)

galezans Mx. 19. V. foliis spathulatis sessilibus subserrulatis venosis pubescentibus, floribus fasciculatis subsessilibus, calycibus acuminatis, corollis ovatis fauce constrictis, stylo exserto. *Amer. bor.*

ligustrinum 20. V. ramis angulatis strictis, foliis lanceolatis subsessilibus serrulatis venosis pubescentibus, fasciculis gemmaceis sessilibus, corollis oblongis. *Amer. bor.*

tenellum Ait. 21. V. ramis angulatis, foliis ovato-lanceolatis mucronatis serrulatis utrinque lucidis sessilibus, fasciculis florum sessilibus confertis, corollis ovatis. *Amer. bor.* (V. pensylvanicum Lam.)

β. *Flores subsolitarii.*

geminiflorum Kunth. 22. V. ramis strictis, foliis oblongis mucronatis crenulatis glabris, floribus axillaribus geminis

nutantibus ovatis 10andris, calycibus repandis, antheris dorso 2aristatis. *Mexico.*

Myrtillus 23. V. ramis angulatis patentibus, foliis ovatis mucronatis serrulatis glabris, pedunculis 1floris nutantibus. *Europ.*

uliginosum 24. V. foliis obovatis mucronatis integerrimis subtus reticulato-venosis glaucescentibus subpubescentibus, pedunculis aggregatis nutantibus abbreviatis, corolla urceolato-campanulata. *Europ. et Amer. bor.* (V. pubescens fl. dan.)

angustifolium Ait. 25. V. foliis lanceolatis subintegerrimis subtus pubescentibus, pedunculis sparsis subsolitariis. *Canada.* (V. myrtilloides Mx.)

caespitosum Mx. 26. V. caule brevissimo caespitoso glaberrimo, foliis obovatis serratis, pedunculis solitariis brevissimis. *Ad sinum Hudson.*

** *Foliis sempervirentibus.*

† *Corolla campanulata.*

Vitis idaea 27. V. caule basi repente, foliis obovatis emarginatis revolutis subserrulatis coriaceis supra lucidis subtus punctatis, racemis terminalibus nutantibus. *Europ. et Amer. bor.*

myrtifolium Mx. 28. V. caule basi repente, foliis ovalibus lucidis revolutis subdenticulatis, fasciculis axillaribus pauciflоris subsessilibus. *Carolina.* (Fructus nigri.)

crassifolium Andr. 29. V. ramis ascendentibus, foliis oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis rigidis glabris serratis, racemis terminalibus corymbosis pauciflоris bracteatis, floribus nutantibus. *Carolina.*

penaeoides Kunth. 30. V. caule basi repente, foliis oblongis subimbricatis acutis crenulatis glabris subciliatis, floribus solitariis pedunculatis, calycibus 2bracteatis. *Quito.*

alaternoides Kunth. 31. V. caule subarborescente, foliis subrotundo-ellipticis acutiusculis integerrimis glabris sub-3nerviis, floribus axillaribus subgeminis sessilibus, calycibus 2bracteatis. *And. Peru.*

confertum Kunth. 32. V. caule ramosissimo, foliis ovato-oblongis crenulatis glabris, floribus axillaribus subcymosis folium aequantibus 10andris, calycibus ebracteatis, antheris dorso muticis. *Mexico.*

caracasanum Kunth. 33. V. foliis oblongis acutis crenulatis glabris supra nitidis, racemis axillaribus secundis folia superantibus, antheris dorso 2aristatis. *Caracas.*

†† *Corolla urceolata.*

acuminatum Bonpl. 34. V. caule arboreo, foliis confertis ovatis acuminatis integerrimis glaberrimis, floribus axillaribus brevissime pedunculatis subgeminis, calycibus 2bracteatis. *Nov. Granat.*

empetrifolium Kunth. 35. V. caule repente, foliis imbricatis ovalibus exiguis integerrimis glaberrimis subvenosis, flo-

ribus ſolitariis pedunculatis cylindrico-urceolatis, calycibus 2bracteatis. *And. Peru.*

floribundum Kunth. 36. V. caule fruticoſo erecto, foliis oblongis utrinque attenuatis crenulatis glabris ſubtus punctatis, racemis terminalibus aggregatis nutantibus ſecundis, pedicellis baſi bracteatis. *Peru.*

meridionale Sw. 37. V. caule arboreo, foliis ovatis acuminatis exiguis ſerrulatis venoſis glabris nitidis, racemis terminalibus aphyllis, antheris dorſo ariſtatis. *Jamaica.*

braſilienſe * 38. V. foliis ovalibus mucronatis integerrimis glaberrimis ſubtus venoſis, racemis terminalibus aggregatis bracteatis, corollis cylindrico-urceolatis, antheris muticis. *Braſil.* Sello.

cereum Forſt. 39. V. foliis ovatis acutiusculis glanduloſo-ſerrulatis utrinque glabris ſubtus reticulato-venoſis, pedunculis confertis, corolla 5gona, antheris dorſo ariſtatis. *Inſ. Amicorum.*

orientale Sw. 40. V. caule arboreſcente, foliis ovato-lanceolatis ſerratis, racemis ſpicatis terminalibus, floribus 10andris. *Cochinchina.* (Acoſta ſpicata Lour.)

nitidum Andr. 41. V. caule fruticoſo ramoſiſſimo, ramis diſtichis, foliis obovatis acutis ſerratis glabris ſupra nitidis, racemis terminalibus corymboſis bracteatis nutantibus, coroll. cylindricis. *Carolina.*

Myrſinites Mx. 42. V. caule fruticoſo ramoſiſſimo, foliis ſeſſilibus oblongis mucronatis ſerrulatis ſupra lucidis ſubtus ſcabro-punctatis, faſciculis gemmaceis lateralibus. *Carolina. Florida.*

buxifolium Andr. 43. V. humile, foliis obovatis crenulatis glabris, faſciculis congeſtis ſubſeſſilibus, filamentis glanduloſis. *Virginia.* (V. brachycerum Mx.)

ovatum Pursh. 44. V. foliis petiolatis ovatis acutis revolutis ſerratis glabris, racemis abbreviatis bracteatis, calycibus acutis, corollis cylindricis. *Amer. bor. occid.*

obtuſum Pursh. 45. V. caule repente, foliis ovalibus exiguis mucronatis integerrimis glabris, pedunculis axillaribus ſolitariis 1floris. *Amer. bor. occid.*

††† *Corolla ſubrotata.*

Oxycoccus 46. V. caule repente, ramis filiformibus proſtratis, foliis ovato-oblongis acutiusculis integerrimis ſupra lucidis ſubtus albidis, pedunculis elongatis, laciniis corollae oblongis. *Europ. Amer. bor.* (Oxycoccus paluſtris Perſ.)

macrocarpon Ait. 47. V. caule repente, ramis aſcendentibus, foliis ovalibus obtuſis integerrimis ſupra lucidis ſubtus albidis, pedunculis elongatis, laciniis corollae lanceolatis acuminatis. *Amer. bor.* (Oxycoccus Perſ.)

hiſpidulum 48. V. caule repente filiformi hiſpido, foliis ovatis integerrimis, floribus ſubſeſſilibus ſolitariis. *Amer. bor.* (Arbutus filiformis Lam. Gaultheria ſerpyllifolia Pursh.)

1422. NEAEA R. et P.

verticillata R. et P. 1. N. foliis quaternis lanceolatis. *Peru.*

oppositifolia R. et P. 2. N. foliis oppositis oblongis acuminatis. *Peru.*

1423. MICHAUXIA Herit.

campanuloides Herit. 1. M. foliis radicalibus pinnatifidis, caulinis cordatis, caule strigoso. *Syria.*

laevigata Vent. 2. M. foliis radicalibus ovatis, caulinis oblongis, caule laevi. *Persia.*

1424. SWEETIA *.

fruticosa * *Brasil.* Frutex spithameus, ramis virgatis verrucosis aphyllis, floribus racemosis secundis flavis.

1425. SODADA Forsk.

decidua Forsk. *Arabia. Aegypt.* Frutex orgyalis, ramis spinescentibus subaphyllis, floribus rubris.

1426. PHYSOSTEMON Mart.

lanceolatus Mart. 1. Ph. foliis lanceolatis, siliquis elongatis tenuibus subteretibus. *Brasil.*

tenuifolius Mart. 2. Ph. foliis linearibus, siliquis ovatis compressis. *Brasil.*

rotundifolius Mart. 3. Ph. foliis ovatis acutis, siliquis ovatis compressis. *Brasil.*

1427. SASSIA Molin.

tinctoria Mol. 1. S. foliis ovatis, scapo multifloro. *Chili.*

perdicaria Mol. 2. S. foliis cordatis, scapo 1floro. *Chili.*

1428. KÖLREUTERA Laxm.

paniculata Laxm. *China.* Arbuscula foliis pinnatis, foliolis oblongis obtusis laciniato-dentatis, floribus paniculatis flavis. (Sapindus chinensis L.)

1429. XYLOCARPUS Schreb.

Granatum Kön. 1. X. foliis sub-3jugis ovatis acutis, racemis pendulis. *Inf. Moluce.* (Carapa moluccensis Lam.)

Carapa * 2. X. foliis multijugis oblongis glabris, paniculis aggregatis erectis. *Hispaniola. Guiana.* (Carapa guianensis Aubl. Persoonia guareoides W.)

1430. VITMANNIA Vahl.

elliptica Vahl. *Ceylon.* Arbor foliis oblongis obtusis, floribus umbellatis. (Samadera Gärtn. Niota 4petala Lam. et 5petala Poir.)

1431. ELVASIA Cand.

calophyllea Cand. *Brasil.* Frutex foliis oblongis parallele venosis, floribus paniculatis.

1432. CASTELA Turp.

depressa Turp. 1. C. spinis axillaribus, foliis subcordato-oblongis sessilibus. *Hispaniola.*

erecta Turp. 2. C. spinis infraaxillaribus, foliis lanceolatis petiolatis. *Inf. Carib.*

1433. ROXBURGHIA Jon.

gloriosoides Roxb. *Ind. or.* Herba radice tuberosa, caule scandente ramoso, foliis cordatis acuminatis nervosis, calyce flavo, corolla rubra.

1434. TETRATHECA Sm.

ericaefolia Sm. 1. T. foliis verticillatis linearibus revolutis scabris, ramis glabris, calycibus ovatis acutiusculis. *Nov. Holl.*

pilosa Labill. 2. T. foliis verticillatis sparsisve ovatis dentatis vel linearibus integerrimis revolutis hispidulis, ramis pubescentibus, calycibus orbiculatis glandulosis. *Terra Diemen.* (T. glandulosa Sm.)

juncea Sm. 3. T. foliis alternis lanceolatis ramisque angulatis glabris elongatis. *Nov. Holl.*

thymifolia Sm. 4. T. foliis verticillatis lanceolatis ciliatis, ramis pilosiusculis, calycibus lanceolatis acutis ciliatis. *Nov. Holl.*

glandulosa Labill. 5. T. foliis alternis ovato-oblongis dentatis ramisque glanduloso-pilosis, calycibus ovato-lanceolatis. *Terra Diemen.*

1435. BORONIA Sm.

* *Folia impari-pinnata.*

pseoraleoides Cand. 1. B. foliis subbijugis ramulisque glabris punctato-glandulosis, foliolis linearibus obtusis, floribus solitariis 4andris. *Nov. Holl. austr.*

pinnata Sm. 2. B. foliis 4jugis ramulisque glaberrimis, foliolis linearibus acutis, pedunculis 2fidis, floribus 8andris. *Nov. Holl.*

tetrandra Labill. 3. B. foliis 4jugis linearibus obtusis glabris, ramis pilosis, floribus solitariis 4andris. *Nov. Holl. occ.*

pilosa Labill. 4. B. foliis 4jugis ramulisque pilosiusculis, foliolis linearibus approximatis, floribus solitariis 8andris. *Nov. Holl.*

alata Sm. 5. B. foliis 4jugis subtus pilosis crenatis revolutis, pedunculis dichotomis, bracteis fimbriatis. *Nov. Holl. occid.*

** *Folia simplicia.*

serrulata Sm. 6. B. foliis trapezoideis acutis antice serrulatis glabris punctato-glandulosis, pedunculis aggregatis terminalibus. *Nov. Holl.*

crenulata Sm. 7. B. foliis obovatis mucronulatis crenulatis, pedunculis 1floris, calycibus fimbriatis, filamentis apice obtusis glandulosis. *Nov. Holl.*

denticulata Sm. 8. B. foliis linearibus retusis denticulatis, pedunculis corymbosis, filamentis apice obtusis glandulosis. *Nov. Holl.*

parviflora Sm. 9. B. foliis obovato-lanceolatis obsolete crenatis, pedunculis 1floris bracteolatis, filamentis clavatis glandulosis. *Nov. Holl.*

tetratheccoides Cand. 10. B. foliis linearibus acutis integerrimis glabris subrevolutis, pedunculis axillaribus 1floris 2bracteolatis, filamentis hispidis. *Nov. Holl.* (Tetratheca oppositifolia Pers.)

pilonema Labill. 11. B. foliis oblongo-linearibus utrinque attenuatis integerrimis, pedunculis terminalibus solitariis ebracteatis subturbinatis, filamentis glabris. *Nov. Holl. austr.*

polygalaefolia Sm. 12. B. foliis lineari-lanceolatis integerrimis verticillato-alternis, pedunculis axillaribus 1floris, filamentis glabris. *Nov. Holl.*

ledifolia Gay. 13. B. foliis lineari-lanceolatis integerrimis subtus tomentosis, pedunculis axillaribus 1floris, filamentis hispidis. *Nov. Holl.* (Lasiopetalum ledifolium Vent.)

1436. CORREA Sm.

* *Breviflorae, petalis subdistinctis.*

alba Andr. 1. C. foliis ovatis subtus tomentosis, dentibus calycis acutis. *Nov. Holl.* (C. cotinifolia Salisb.)

rufa Gärtn. 2. C. foliis ovato-oblongis subtus rufo-tomentosis, dentibus calycis latis obtusis. *Nov. Holl.* (Mazeutoxeron Labill.)

** *Longiflorae, petalis coalitis.*

speciosa Andr. 3. C. foliis ovatis obtusis supra asperis subtus ramisque stellato-tomentosis, calycibus truncatis, floribus erectis. *Nov. Holl.* (C. rubra Sm.)

virens Sm. 4. C. foliis cordato-oblongis subdenticulatis glanduloso-tomentosis, calycibus denticulatis, floribus pendulis tomentosis. *Nov. Holl.* (C. viridiflora Andr., reflexa Pers. Mazeutoxeron Labill.)

1437. JAMBOLIFERA.

pedunculata 1. J. foliis elliptico-oblongis glabris, floribus paniculatis, petalis lineari-lanceolatis calyce longioribus. *Ceylon.*

chinenſis * 2. J. foliis ovatis emarginatis, floribus racemoſo-corymboſis. *China auſtr.* (J. pedunculata Lour.)

odorata Lour. 3. J. foliis ovatis baſi oblique truncatis ſubtus punctatis, floribus racemoſo-corymboſis. *Cochinchina.*

reſinoſa Lour. 4. J. foliis oblongis, pedunculis axillaribus multifloris. *Cochinchina.*

1438. MELICOPE Forſt.

ternata Forſt. *Nov. Zeeland.* (Entoganum laevigatum Gärtn.)

1439. PORLIERA R. et P.

hygrometrica R. et P. *Peru. Chili.* Frutex foliis abrupte pinnatis linearibus.

1440. CHITONIA Seſſ.

mexicana Seſſ. *Mexico.* Frutex foliis impari-pinnatis ovatis, floribus ſolitariis rubris.

1441. GRISLEA.

ſecunda 1. Gr. foliis petiolatis oblongo-lanceolatis glabris, corymbis axillaribus ſecundis. *Cumana.*

tomentoſa Roxb. 2. Gr. foliis ſeſſilibus cordato-lanceolatis ſubtus tomentoſis, corymbis axillaribus patulis. *Ind. or.* (Woodfordia floribunda Salisb. Lythrum fruticoſum L.)

1442. ANTICHORUS.

depreſſus *Arabia.* (Juſſieva edulis Forsk.) Planta annua puſilla, foliis alternis ovatis ſerratis glabris, floribus axillaribus geminis oppoſitis luteis.

1443. SELAS *. (Gela Lour.)

lanceolatum * *Cochinchina.* Arbuscula foliis ovato-lanceolatis integerrimis lucidis, floribus axillaribus corymboſis luteſcentibus.

1444. XIMENIA.

americana 1. X. pedunculis ſub-4floris ſpineſcentibus, foliis oblongis obtuſis membranaceis, ramis glabris, fructibus ſtylo coronatis. *Ind. occ.* (X. mulaflora Jacq. Heymaſſoli ſpinoſa Aubl.)

†*ferox* Poir. 2. X. pedunculis ſubumbellatis, ramis ſpinoſis, foliis ſubrotundis coriaceis ſubſeſſilibus pubeſcentibus. *Hiſpaniola.*

elliptica Forſt. 3. X. pedunculis ſub-4floris inermibus, foliis ellipticis ſubcoriaceis, ramis verrucoſis, fructibus ſtylo coronatis. *Nov. Caledon. Hiſpaniola.* Bert.

inermis 4. X. pedunculis 1floris, foliis oblongo-lanceolatis acutiusculis coriaceis, ramis glabris, fructibus apice obtuſiusculis. *Ind. occ.*

1445. LAWSONIA.

alba Lam. 1. L. foliis obovatis ſubſeſſilibus glaberrimis integerrimis, ramis ſubſpineſcentibus, panicula ramoſiſſima. *Ind. or. Aegypt. Arabia.* (L. inermis et ſpinoſa L.)

purpurea Lam. 2. L. foliis lanceolatis elongatis ſubſeſſilibus, floribus corymboſis. *Ind. or.*

Acronychia Forſt. 3. L. foliis petiolatis ſpathulato-oblongis, floribus cymoſis. *Nov. Caledon.*

falcata Lour. 4. L. foliis petiolatis falcatis acuminatis ſubcrenatis, floribus corymboſis. *Cochinchina.*

1446. AMYRIS.

* *Foliis ſimplicibus.*

polygama Cav. 1. A. foliis ſpathulato-lanceolatis nitidis integerrimis, racemis axillaribus aggregatis. *Chili.*

Lunani * 2. A. foliis oblongo-ellipticis coriaceis opacis, racemis terminalibus ſubſolitariis. *Jamaica:* culta.

** *Foliis ternatis.*

diatrypa * 3. A. foliolis ſubrotundis obtuſis emarginatis integerrimis pellucido-punctatis ſupra lucidis, paniculis axillaribus paucifloris folio brevioribus. *Hiſpaniola.*

braſilienſis * 4. A. foliolis lanceolatis baſi attenuatis apice rotundatis mucronatis integerrimis venoſis ſupra nitidis ſubtus discoloribus, petiolis 3quetris, paniculis axillaribus folio brevioribus. *Braſil.* Sello.

ſyloatica Jacq. 5. A. foliolis ſubcordato-ovatis acutis crenatis nitidis, paniculis axillaribus. *Cumana.*

Kataf Forsk. 6. A. foliolis ovatis apice ſerratis, pedunculis terminalibus dichotomis. *Arabia. Afric. orient. et occid.* (A. Kafal Forsk. var.)

gileadenſis 7. A. foliolis obovatis integerrimis petiolatis, pedunculis ſubaggregatis 1floris. *Arabia.* (nec Palaeſtina nec Aegyptus.)

*** *Foliis pinnatis.*

† *integerrimis.*

Opobalſamum 8. A. foliis ternatis pinnatisque, foliolis obovatis integerrimis ſeſſilibus, pedunculis terminalibus 1floris. *Arabia.*

heterophylla W. 9. A. foliis ternatis pinnatisque, foliolis ovatis oblongisque acuminatis venoſis coriaceis, lateralibus minimis, racemis axillaribus abbreviatis. *Guiana. Guadalupa.* (Icica Aracouchini Aubl.)

enneandra W. 10. A. foliis ternatis pinnatisque, foliolis oblongis utrinque attenuatis venoſis, petiolis medio nodoſis, paniculis axillaribus elongatis. *Guiana.* (Icica 9andra Aubl.)

ambroſiaca 11. A. foliis 3jugis, foliolis oblongis acuminatis integerrimis glabris, pedunculis cymoſis congeſtis axillaribus. *Guiana. Braſil.* (Icica guianenſis et 7phylla Aubl.)

decandra W. 12. A. foliis 3jugis, foliolis oblongis utrinque attenuatis, paniculis axillaribus divaricatis. *Guiana.* (Icica 5andra Aubl.)

altiſſima W. 13. A. foliis 3jugis, foliolis oblongis utrinque attenuatis, racemis axillaribus. *Guiana.* (Icica Aubl.)

toxifera 14. A. foliis 3jugis, foliolis ovatis acuminatis, panicula axillari elongata. *Carolina.*

zeylanica Retz. 15. A. foliis 3jugis, foliolis ovatis acutis venoſis, racemis axillaribus interruptis, floribus involucratis tomentoſis 6andris. *Ceylon.*

Protium 16. A. foliis 3jugis, foliolis lanceolatis inaequilateris longe acuminatis undulatis, paniculae diffuſae ramis incanis. *Java.*

balſamifera 17. A. foliis 2pinnatis, partialibus 3jugis, foliolis ovatis acuminatis, racemis laxis. *Jamaica.*

†† *Foliis crenatis, dentatis.*

maritima 18. A. foliis ternatis pinnatisque 3jugis, foliolis oblongis obtuſis apice crenatis baſi attenuatis opacis glabris, paniculis axillaribus. *Ind. occid. Braſil.*

dentata W. 19. A. foliis pinnatis 4jugis, foliolis ſubalternis ovatis dentatis emarginatis punctatis membranaceis, racemis axillaribus. *Ind. or.*

aniſata W. 20. A. foliis pinnatis 6jugis, foliolis ovato-lanceolatis baſi inaequalibus obſolete dentatis, paniculis axillaribus corymboſis. *Guinea.*

capenſis * 21. A. foliis pinnatis 5jugis, foliolis ovatis obtuſis crenatis ſubſeſſilibus, ramis flexuoſis aculeatis, floribus paniculatis. *C. B. S.* (Fagara capenſis Thunb.)

† *inaequalis* * 22. A. foliis pinnatis multijugis, petiolis teretibus inermibus pubeſcentibus, foliolis baſi inaequalibus ovatis crenatis glabris pellucido-punctatis, racemis paucifloris folio brevioribus. *Afr. auſt.* (Elaphrium inaequale? Cand. Burchell.)

armata * 23. A. foliis pinnatis multijugis, petiolis subangulatis glabris aculeatis, foliolis lanceolatis crenatis nitidis pellucido-punctatis parallele venosis, floribus cymosis sub-4andris. *Afric. austr.* (Fagara armata Thunb.)

Elaphrium * 24. A. foliis pinnatis 5jugis, petiolo marginato, foliis ovato-oblongis crenatis glaberrimis, racemis paucifloris folia superantibus. *Nov. Granat.* (Elaphrium glabrum Jacq. Fagara W.)

tomentosa * 25. A. foliis pinnatis 4jugis, petiolo marginato, foliolis ovatis obtusis crenatis utrinque tomentosis, racemis paucifloris folio brevioribus. *Curaçao.* (Elaphrium tomentosum Jacq. Fagara 8andra W.)

copallifera * 26. A. foliis pinnatis pubescentibus, petiolo marginato, foliolis ovatis dentatis, racemis interruptis folia aequantibus, pedicellis confertis breviffimis. *Mexico.* (Elaphrium copalliferum Seff.)

penicillata * 27. A. foliis pinnatis glabriusculis, petiolo marginato barbato, foliolis oblongis acuminatis dentatis, racemis paucifloris folio brevioribus. ***Mexico.*** (Elaphrium penicillatum Seff.)

1447. XANTHOPHYLLUM Roxb.

virescens Roxb. 1. X. foliis eglandulosis, paniculis interfoliaceis, germinibus 4spermis. *Silhet, prov. Ind. or.*

flavescens Roxb. 2. X. foliis basi 2glandulosis, paniculis axillaribus, germinibus 8-10spermis. *Bengal.*

1448. EUSTATHES Lour.

sylvestris Lour. *Cochinchina.* Arbor magna, foliis ovato-oblongis acuminatis glabris integerrimis, floribus racemosis albis.

1449. SCUTULA Lour.

fasicellata Lour. 1. Sc. pedunculis lateralibus multifloris, baccis compressis. *Cochinchina.*

umbellata Lour. 2. Sc. floribus terminalibus umbellatis, baccis subrotundis. *Cochinchina.*

1450. KEITHIA *.

brasiliensis * *Brasil.* (N. Entd. 3. 57.)

1451. HONCKENYA W.

ficifolia W. *Guinea.* Frutex foliis lobatis dentatis fulvo-tomentosis, floribus terminalibus ternis violaceis.

†1452. HAGENIA Lam.

abyſſinica W. *Abyſſinia.* Arbor ramis angulatis, foliis interrupte pinnatis, foliolis ovato-lanceolatis ſeſſilibus argute ſerratis, floribus paniculatis purpureis. (Cuſſo Bruce.)

1453. BÄCKEA.

frutescens 1. B. foliis oppoſitis linearibus, pedunculis axillaribus ſolitariis. *China.*

linifolia Rudg. 2. B foliis oppoſitis lineari-filiformibus, pedunculis ſolitariis 1floris. *Nov. Holl.*

virgata Ker. 3. B. foliis oppoſitis confertisque lineari-lanceolatis punctatis, floribus corymboſis ſub-5andris. *Nov. Caledon.* (Leptoſpermum virgatum et Melaleuca virgata Forſt.)

denſifolia Sm. 4. B. foliis 4fariam imbricatis obtuſis reflexo-mucronatis. *Nov. Holl.*

dioſmaefolia Rudg. 5. B. foliis 4fariam imbricatis obovatis punctatis pellucido-marginatis calycibusque ſerrulatis, pedunculis axillaribus confertis 1floris. *Nov. Holl.*

1454. MELICOCCA.

bijuga 1. M. foliis 2jugis ovali-oblongis utrinque attenuatis, racemis compoſitis. *Ind. occ.* (M. carpoodea Juſſ., olivaeformis Kunth.)

geniculata * 2. M. foliis ternatis pinnatisque 2jugis, petiolis apice nodoſis geniculatis, foliolis oblongo-lanceolatis acuminatis, paniculis axillaribus patentiſſimis. *Braſil.*

paniculata Juſſ. 3. M. foliis 2jugis, foliolis oblongo-lanceolatis ſubſeſſilibus, panicula corymboſa terminali trichotoma, floribus 10andris, fructibus ſubglobooſis. *Hiſpaniola.*

dentata Juſſ. 4. M. foliis ſub-5jugis, foliolis alternis obovato-oblongis apice dentatis obtuſis, pedunculis axillaribus paucifloris, floribus 10andris, fructibus ſubgloboſis. *Inſ. Mascaren.*

1455. HYPELATE P. Br.

trifoliata Sw. *Jamaica.* Arbuscula foliis ternatis, foliolis obovatis nitidis integerrimis, racemis compoſitis corymboſis, floribus albis parvis polygamis.

1456. CUPANIA.

* *Petala apice convoluta cucullata.*

tomentoſa Sw. 1. C. foliis pinnatis ſub-3jugis, foliolis obovato-oblongis emarginatis apice crenato-repandis ſubtus ſubtomentoſis, paniculis terminalibus diffuſis tomentoſis. *Ind. occ.* (C. latifolia Kunth. Trigonis tomentoſa Jacq.)

excelsa Kunth. 2. C. foliis pinnatis sub-5jugis, foliolis oblongis obtusiusculis remote denticulatis coriaceis supra glabriusculis subtus pubescentibus. *Mexico.*

scrobiculata Kunth. 3. C. foliis pinnatis sub-4jugis oblongis retusis remote dentatis submembranaceis glabris, axillis venarum subtus scrobiculatis. *Nov. Granat.*

glabra Sw. 4. C. foliis pinnatis 4jugis obovato-oblongis repando-crenatis utrinque glabris supra nitidis, racemis compositis axillaribus, fructibus glaberrimis. *Ind. occid.*

Saponaria Pers. 5. C. foliis pinnatis 6jugis, foliolis oblongis utrinque attenuatis integerrimis subtus scabris, racemis terminalibus compositis. *Ind. occid.* (C. saponarioides Sw. Ornitrophe macrophylla Poir.)

geminata Poir. 6. C. foliis binatis ovato-oblongis integerrimis supra glaucis subtus pubescentibus. *Cayenn.*

** *Petala planiuscula. Molinaea* Juss.

canescens Pers. 7. C. foliis 2jugis elliptico-oblongis integerrimis glabris nitidis, racemis compositis. *Ind. or.* (Molinaea Roxb.)

laevis Pers. 8. C. foliis 3jugis oblongis integerrimis coriaceis laevibus, corymbis paniculatis, fructibus subalatis. *Inf. Mascaren.* (Molinaea laevis et alternifolia W.)

venulosa Cand. 9. C. foliis 2jugis oblongis integerrimis laevibus subtus reticulato-venosis. *Inf. Mascaren.*

lentiscifolia Pers. 10. C. foliis 3jugis oblongo-lanceolatis acutis integerrimis glabris, panicula terminali. *Inf. amicorum.* (Guioa Cav.)

† *dentata* Sess. 11. C. foliis sub-6jugis ovali-oblongis petalisque crenato-dentatis. *Mexico.*

1457. THOUINIA Poit.

integrifolia * 1. Th. foliis simplicibus ovato-oblongis acutis glabris subtus discoloribus, racemis terminalibus paniculatis. *Brasil.* Sello.

simplicifolia Poit. 2. Th. foliis simplicibus lanceolatis acutis dentato-serratis subtus subtomentosis, racemis simplicibus. *Hispaniola.*

trifoliata Poit. 3. Th. foliis ternatis supra nitidis, axillis venarum subtus barbatis, foliolis obovatis subserratis, racemis simplicibus. *Hispaniola.*

† *villosa* Sess. 4. Th. foliis ternatis ovatis acutis apice serratis villosis, racemis paniculatis. *Nov. Hispan.*

pinnata Turp. 5. Th. foliis pinnatis obovatis emarginatis, floribus paniculatis 5petalis. *Hispaniola.*

polygama Meyer. 6. Th. foliis pinnatis ovali-oblongis acutiusculis integerrimis glaberrimis, floribus racemosis polygamis. *Guiana.*

decandra Humb. 7. Th. foliis pinnatis lanceolatis dentatis, floribus paniculatis 10andris. *Mexico.*

1458. EUPHORIA Commerſ.

Litchi Desf. 1. E. foliis pinnatis 4jugis, foliolis lanceolatis ſubtus glaucis, racemis laxis, fructibus ſquamoſis. *Ind. or. Cochinchina. China.* (E. punicea Lam. Dimocarpus Litchi Lour. Scytalia chinenſis Gärtn.)

Longan Lam. 2. E. foliis pinnatis 3jugis, foliolis oblongis ſubtus pubeſcentibus venoſis, floribus laxe paniculatis, fructibus laevibus. *China. Cochinchina.* (Dimocarpus Lour.)

informis Cand. 3. E. foliis pinnatis, foliolis oblongis, racemis pauciſloris, fructibus tuberculoſis. *Cochinchina.* (Dimocarpus Lour.)

Nephelium Cand. 4. E. foliis pinnatis 2jugis, foliolis lanceolatis glabris, fructibus crinitis. *Java. Cochinchina.* (Dimocarpus crinitus Lour. Nephelium lappaceum L.)

1459. SCHMIDELIA Schreb.

* *Foliis ſimplicibus.*

rigida Sw. 1. Schm. foliis ovatis acuminatis ſpinuloſo-denticulatis rigidis ſubtus cinereo-pubeſcentibus, floribus racemoſis. *Hiſpaniola.* (Ornitrophe W.)

Allophylus Cand. 2. Schm. foliis oblongis acuminatis integerrimis glabris, racemis breviſſimis. *Ceylon.* (Allophylus zeylanicus L.)

** *Foliis ternatis.*

Cobbe Cand. 3. Schm. foliolis petiolatis ovatis acutis ſerratis ſubtus ad venas pubeſcentibus, racemis axillaribus ſimplicibus tomentoſis, petalis glabris. *Ceylon. Nov. Caledon. Braſil. Cochinchina.* (Rhus L. Ornitrophe W. Toxicodendron Gärtn. Pometia et Aporetica ternata Forſt. Allophylus ternatus Lour. Schm. guaranitica Hilar. var.)

cochinchinenſis * 4. Schm. foliolis petiolatis ovato-lanceolatis inaequaliter ſerratis glabris, ſpicis axillaribus polygamis, petalis piloſis. *Ind. or. Cochinchin.* (Gemella trifolia Lour. Aporetica gemella Cand. Schm. diſtachya Cand.)

racemoſa 5. Schm. foliolis petiolatis oblongis utrinque attenuatis ſubſerratis glabris, floribus verticillato-racemoſis. *Ind. or.* (Uſubis triphylla Burm.)

ſerrata Cand. 6. Schm. foliolis petiolatis oblongis utrinque attenuatis ſerrulatis glabriuſculis, petiolis pedunculisque racemoſis pubeſcentibus. *Ind. or.* (Ornitrophe Roxb.)

Cominia Sw. 7. Schm. foliolis petiolatis oblongis utrinque attenuatis ſerratis villoſis, racemis paniculatis tomentoſis. *Jamaica. Nov. Granat.* (Schm. mollis Kunth., Rhus L., Ornitrophe W.)

africana Cand. 8. Schm. foliolis petiolatis oblongis utrinque attenuatis ſerratis glabris, racemis compoſitis, petalis piloſis. *Guinea. Inſ. Molucc.* (Allophylus P. B., Schm. racemoſa Afz., timorienſis Cand.)

glabrata Kunth. 9. Schm. foliolis petiolatis ellipticis mucronatis integerrimis glabris, racemis ternatis. *Nov. Granat.*

integrifolia Cand. 10. Schm. foliolis petiolatis ovato-lanceolatis integerrimis, racemis subsimplicibus. *Inf. Mascaren.* (Ornitrophe Lam. W.)

occidentalis Sw. 11. Schm. foliolis sessilibus oblongis utrinque attenuatis apice serratis supra ad venas subtusque villosiusculis, racemis simplicibus, petalis pilosis. *Ind. occid.* (Ornitrophe W., O. spicata Poir.)

*** *Foliis pinnatis.*

pinnata Cand. 12. Schm. foliolis sub-5jugis ovato-lanceolatis glabris, racemis compositis pubescentibus, floribus fasciculatis. *Nov. Hebrid.* (Pometia Forst. Ornitrophe Poir.)

1460. EPHIELIS Schreb.

fraxinea W. 1. E. foliis abrupte pinnatis 3jugis oblongis glabris, petiolo aequali, panicula terminali. *Guiana. Portorico. Hispaniola.* (Mataïba guianensis Aubl.)

Patrisiana * 2. E. foliis impari-pinnatis 2jugis subtus villosis, petiolo subalato, racemis simplicibus. *Guiana?* (Matayba Cand.)

† *Vouarana* * 3. E. foliis impari-pinnatis 3jugis, foliolis alternis oblongis glabris, racemis simplicibus. *Guiana.* (Vouarana Aubl.)

1461. TALISIA Aubl.

hexaphylla Vahl. 1. T. foliis pinnatis 3jugis, foliolis oblongo-lanceolatis nitidis glabris, racemis simplicibus, calycibus corollam aequantibus. *Inf. Carib.*

rosea Vahl. 2. T. foliis pinnatis multijugis, foliolis oblongis acuminatis subtus ad venas hirsutis, racemis decompositis, calycibus corolla brevioribus. *Guiana.* (T. guianensis Aubl.)

glabra Cand. 3. T. foliis pinnatis multijugis, foliolis ovato-lanceolatis acuminatis coriaceis utrinque glaberrimis. *Guiana.*

acladodes Cand. 4. T. trunco simplici, foliis abrupte pinnatis, foliolis oblongo-linearibus acuminatis, racemo terminali. *Peru.* (Acladodea pinnata R. et P.)

1462. PHAEOCARPUS Mart.

campestris Mart. *Brasil.* Arbor foliis impari-pinnatis, floribus paniculatis, capsula globoso-3gona.

1463. BLIGHIA Kön.

sapida Kön. *Guinea.* Arbor excelsa ramosa, foliis pinnatis glabris, floribus racemosis albis, fructibus pomaceis. (Akeesia africana Tuss. Bonannia nitida Rafin.)

1464. ACER.

* *Foliis indivisis.*

oblongum Wall. 1. A. foliis oblongis acuminatis integerrimis glabris subtus glaucescentibus, racemis compositis, fructibus glabris. *Nepal.*

tataricum 2. A. foliis cordatis subincisis inaequaliter dentatis, corymbis erectis, fructibus glabris. *Asia bor.*

** *Foliis trilobis, trifidis.*

heterophyllum W. 3. A. foliis sempervirentibus integris 3lobisque obsolete denticulatis glabris, breviſſime petiolatis. *Asia minor?* (A. sempervirens L.)

obtusifolium Sm. 4. A. foliis rotundatis obtuse 3lobis denticulato-crenatis petiolos aequantibus. *Creta.*

creticum 5. A. foliis sempervirentibus basi attenuatis 3fidis, laciniis subdenticulatis lateralibus brevioribus, corymbis paucifloris erectis, fructibus glabris. *Creta. Graecia.*

monspessulanum 6. A. foliis annuis cordatis 3lobis, lobis subintegerrimis aequalibus, corymbis paucifloris erectis, fructibus glabris. *Europ. austr.* (A. commutatum Presl.)

ibericum M. B. 7. A. foliis obtuse 3lobis subdentatis nitidis subtus glaucis reticulato-venosis. *Caucas.*

trifidum Thunb 8. A. foliis 3fidis integerrimis utrinque glabris subtus pallidis. *Japon.*

pensylvanicum 9. A. foliis cordatis 3fidis acuminatis serratis glabris, racemis simplicibus elongatis pendulis, ramis striatis. *Amer. bor.* (A. striatum du Roi. Lam. hybridum Bosc.)

barbatum Mx. 10. A. foliis breviter 3lobis serratis utrinque glabris, pedunculis ♂ ramosis ♀ simpliciſſimis, calycibus ♂ intus dense pilosis. *Carolina.* (A. carolinianum Walt.)

*** *Foliis 5lobis, 5fidis.*

montanum Ait. 11. A. foliis sub-5lobis acutis serratis subtus pubescentibus, racemis compositis erectis. *Amer. bor.* (A. spicatum Lam. parviflorum Ehrh.)

obtusatum Kit. 12. A. foliis cordatis leviter obtusiſſime 5lobis subtus pubescentibus, lobis repandis, umbellis pendulis, pedunculis fructibusque pilosis. *Hungaria. Italia.*

opulifolium Vill. 13. A. foliis cordatis 5lobis subtus glaucescentibus reticulato-venosis, lobis obtusis crenato-dentatis, umbellis pendulis, pedunculis fructibusque glabris. *Gallia occid. Ital. sup. Pyren.* (A. hispanicum Pourr.)

Opalus Ait. 14. A. foliis longe petiolatis subrotundis coriaceis obtuse 5lobis subtus pallidis, lobis obtuse dentatis, corymbis erectis, fructibus glabris. *Italia.* (A. rotundifolium Lam. italum Lauth. villosum Presl.)

15.

campeſtre 15. A. foliis cordatis obtuſe 5lobis nitidis ſubtus glabris, lobis ſubintegerrimis, corymbis erectis, fructuum alis divaricatis. *Europa. Tauria.* (A. auſtriacum Trattin.)

nigrum Mx. 16. A. foliis cordatis 5lobis ſubtus pubeſcentibus, corymbis feſſilibus nutantibus, fructuum glabrorum alis divergentibus. *Amer. bor.*

Pſeudoplatanus 17. A. foliis cordatis 5lobis ſubtus glauceſcentibus glabriusculis, lobis inaequaliter dentatis, racemis pendulis, fructibus glabris. *Europ.*

ſaccharinum 18. A. foliis ſubcordatis acute 5lobis ſubtus pubeſcentibus, lobis ſubintegerrimis, corymbis praecocibus laxis nutantibus, pedunculis piloſis, floribus apetalis. *Amer. bor.*

platanoides 19. A. foliis cordatis 5fidis glabris, laciniis acuminato-cuſpidatis ſubdentatis, corymbis erectiusculis fructibusque glabris. *Europ.* (A. laciniatum du Roi. criſpum Lauth. varr.)

rubrum Ehrh. 20. A. foliis longe petiolatis ſubcordatis 5fidis glabris ſubtus glaucis, laciniis acuminatis inciſo-dentatis, umbellis erectis, fructuum glabrorum alis divergentibus. *Amer. bor.*

daſycarpon Ehrh. 21. A. foliis cordatis 5fidis ſubtus albidis glabriusculis, laciniis acuminatis inciſo-dentatis, floribus capitato-umbellatis, germinibus lanatis. *Amer. bor.* (A. eriocarpon Mx., glaucum Marsh.)

macrophyllum Pursh. 22. A. foliis digitato-5fidis, laciniis ſub-3fidis repando-dentatis ſubtus pubeſcentibus, racemis erectis, germinibus hirſutiſſimis. *Amer. bor. ora occid.*

****** *Foliis multifidis.***

pictum Thunb. 23. A. foliis 7fidis glabris (albo-variegatis), laciniis acuminatis ſubintegerrimis. *Japon.*

ſeptemlobum Thunb. 24. A. foliis 7fidis utrinque glabris ſubtus pallidis, laciniis acuminatis aequaliter argute ſerratis. *Japon.*

circinatum Pursh. 25. A. foliis ſubcordato-orbiculatis 7lobis glabris, axillis venarum ſubtus piloſis, lobis inaequaliter acute dentatis. *Amer. bor. ora occid.*

palmatum Thunb. 26. A. foliis palmato-7fidis utrinque glabris, laciniis lanceolatis aequaliter argute ſerratis, floribus umbellatis. *Japon.*

japonicum Thunb. 27. A. foliis cordato-ſubrotundis multipartitis utrinque villoſis, corymbis erectis, fructibus lanatis. *Japon.*

diſſectum Thunb. 28. A. foliis multipartito-palmatis glabris, laciniis lanceolatis ſubpinnatifidis ſerratis, floribus umbellatis. *Japon.*

******* *Foliis compoſitis.***

Negundo 29. A. foliis ternatis pinnatisque inciſo-ſerratis, floribus dioecis, ♂ corymboſis ſub-4andris, ♀ racemoſis pendulis. *Amer. bor.* (A. fraxinifolium Nuttall. Negundo aceroides Mönch.)

pinnatum Lour. 30. A. foliis impari-pinnatis sub-4jugis ovato-oblongis integerrimis glabris, floribus paniculatis. *Cochinchina.*

1465. LUXEMBURGIA Hilar.

octandra Hil. 1. L. foliis subsessilibus lineari-lanceolatis, floribus 8andris. *Brasil.*

polyandra Hil. 2. L. foliis petiolatis oblongis, floribus polyandris. *Brasil.*

1466. TROPAEOLUM.

* *Foliis simplicibus peltatis sublobatis.*

minus 1. Tr. foliis peltatis orbiculatis subrepandis, nervis margine mucronatis, petalis acuminato-setaceis. *Peru.*

majus 2. Tr. foliis peltatis orbiculatis repandis, nervis margine petalisque obtusis. *Peru.* (Tr. hybridum L. *ἀναμόρφωσις.*)

pinnatum Andr. 3. Tr. foliis peltatis reniformi-orbiculatis repandis, nervis apice mucronatis, petalis cuneatis crenato-incisis. *Patria?*

pubescens Kunth. 4. Tr. foliis basi truncatis obsolete acute 5lobis subtus pubescentibus, petalis lobato-2aristatis calycem subaequantibus. *Peru.*

tuberosum R. et P. 5. Tr. foliis basi truncatis 5lobis glabris, petalis subdentatis calycem aequantibus, radice tuberosa. *Peru.*

ciliatum R. et P. 6. Tr. foliis 5-7lobis, stipulis bracteisque ciliatis, petalis integerrimis calycem aequantibus. *Peru.*

bicolor R. et P. 7. Tr. foliis basi truncatis 7lobis, petalis incisociliatis inaequalibus. *Peru.*

dipetalum R. et P. 8. Tr. foliis basi truncatis 5lobis subtus glaucis, lobis obtusis mucronatis, petalis duobus majoribus spathulatis inciso-crenatis. *Peru.*

peregrinum 9. Tr. foliis palmatis, petalis omnibus lobatis fimbriatis, calcare recto corollam excedente. *Nov. Granat.*

aduncum Sm. 10. Tr. foliis subcordato-peltatis 5-7lobis subtus glaucis, lobis incisis obtusis, petalis majoribus lobatis, minoribus inciso-fimbriatis, calcare adunco petala majora aequante. *Peru. Mexico.* (Tr. peregrinum Jacq. Ker. Kunth.)

** *Foliis compositis.*

pentaphyllum Lam. 11. Tr. foliis quinato-digitatis, foliolis oblongis acutis integerrimis, petalis omnibus sessilibus acutis calyce brevioribus subintegerrimis. *Mont. Video.*

polyphyllum Cav. 12. Tr. foliis deno-digitatis, foliolis obovatis subdentatis oblongisque integerrimis, petalis unguiculatis spathulatis calyce longioribus integerrimis. *Chili.*

1467. MAGALLANA Cav.

perifolia Cav. *Patagonia.* Herba ſcandens foliis 3partitis linearibus pellucido-punctatis, floribus axillaribus ſolitariis pedunculatis luteis.

1468. JEFFERSONIA Bart.

diphylla Perſ. *Amer. bor.* Herba acaulis, pedunculis radicalibus 1floris, floribus albis, foliis cordatis 2lobis ſubtus glaucis. (Podophyllum diphyllum L.)

1469. OENOTHERA.

* *Fructibus cylindricis ſ. prismaticis aequalibus.*

† *Floribus flavis.*

biennis 1. Oen. caule herbaceo erecto ramoſo hirſutiuſculo, foliis ovato-lanceolatis dentatis, floribus ſeſſilibus ſubſpicatis, ſtaminibus corollam ſubaequantibus, capſulis ſubcylindricis apice 4dentatis. *Amer. bor.* (Oen. muricata Murr., gauroides Horn.)

parviflora 2. Oen. caule herbaceo ſubvilloſo, foliis lanceolatis dentatis, floribus ſeſſilibus ſubſpicatis, ſtaminibus corolla longioribus, capſulis cylindricis apice 8dentatis. *Amer. bor.*

grandiflora Ait. 3. Oen. caule ſuffruticoſo glabro ramoſo, foliis oblongis ſubpetiolatis, floribus axillaribus ſeſſilibus, petalis ampliſſimis integerrimis, ſtaminibus declinatis, capſulis ſubcylindricis hirſutiuſculis. *Amer. bor.* (Oen. ſuaveolens Perſ.)

longiflora Jacq. 4. Oen. caule herbaceo hirto, foliis caulinis ſeſſilibus ovato-oblongis nervoſo-venoſis denticulatis utrinque villoſis, petalis 2lobis, capſulis ſeſſilibus ſubcylindricis hirtis. *Buenos Ayres.*

corymboſa Lam. 5. Oen. caule ſtricto hiſpido ſulcato, foliis lanceolatis ſubpetiolatis repando-dentatis, floribus ſubaggregatis ſeſſilibus, ſtaminibus corolla brevioribus, capſulis ſubcylindricis abbreviatis hirtis apice 4lobis. *Mexico.* (Oen. ſpectabilis Horn.)

villoſa Thunb. 6. Oen. caule herbaceo ramoſo hirto, foliis ſubpetiolatis lanceolatis denticulatis villoſis, floribus ſeſſilibus, capſulis cylindricis lanatis. *C. B. S.*

† *albicans* Lam. 7. Oen. caule villoſo, foliis lanceolatis glaucis dentatis, floribus ſeſſilibus, petalis dentatis, capſulis cylindricis apice 4dentatis. *Peru.*

nocturna Jacq. 8. Oen. caule herbaceo foliisque lanceolatis repando-dentatis nervoſis pubeſcentibus, petalis rotundatis, capſulis cylindricis. *Patria?* (Oen. ſtriata Ledeb.)

ſinuata 9. Oen. caule ramoſo piloſo, foliis ſubpetiolatis oblongis ſinuato-dentatis glabriuſculis, floribus ſeſſilibus, capſulis cylindrico-prismaticis hirſu-

tis apice 4lobis. *Amer. bor. auſtr.* (Oen. laciniata Hill, proſtrata R. et P.)

odorata Jacq. 10. Oen. caule herbaceo ramoſo, foliis lanceolatis ſemiamplexicaulibus undulatis calloſo-denticulatis, petalis emarginatis, capſulis cylindricis ſulcatis villoſiusculis. *Patagon.* (Oen. undulata Dryandr.)

ſerrulata Nutt. 11. Oen. caule ſuffruticoſo humili, foliis oblongo-linearibus ſerrulatis ſubtus pubeſcentibus, petalis integris ſtamina ſuperantibus, capſula prismatica gracili ſeſſili. *Amer. bor.*

tenuifolia Cav. 12. Oen. caule herbaceo erecto ramoſo, foliis linearibus integerrimis, floribus ſeſſilibus, petalis crenulatis ſtamina ſuperantibus, capſulis tereti-prismaticis. *Chili.* (Oen. ſtrigoſa W. herb. Nee?)

dentata Cav. 13. Oen. caule fruticoſo ramoſo, foliis linearibus denticulatis, floribus axillaribus ſeſſilibus, ſtaminibus corolla brevioribus, capſulis gracilibus 4gonis. *Chili.* (Oen. Chamiſſonis Link.)

micrantha Horn. 14. Oen. caule ramoſo proſtrato hirto, foliis ſubpetiolatis lanceolatis denticulatis hirſutis, floribus ſeſſilibus minutis, capſulis curvatis angulatis. *California.* (Oen. hirta Link.)

cheiranthifolia Horn. 15. Oen. caule ramoſiſſimo aſcendente hirſuto, foliis ſeſſilibus ſpathulatis obtuſis ſubintegerrimis villoſis, floribus ſeſſilibus, capſulis curvatis angulatis acutis hirſutis. *Chili.*

minima Purſh. 16. Oen. caule ſimplici 1floro, foliis lanceolatis integerrimis piloſis, floribus hirſutis exiguis, capſulis prismaticis. *Georgia.*

†† *Floribus violaceis aut albis.*

purpurea Curt. 17. Oen. caule glabro ſubramoſo, foliis lanceolatis acutiuſculis glauceſcentibus integerrimis, floribus ſeſſilibus, capſulis angulatis ſulcatis. *Amer. bor. ora occid.*

Romanzovii Ledeb. 18. Oen. caule ramoſo incano-pubeſcente, foliis lanceolatis acutiuſculis glauceſcentibus ſubintegerrimis, floribus ſeſſilibus, capſulis cylindricis cano-tomentoſis. *Amer. bor. ora occid.*

tenella Cav. 19. Oen. caule herbaceo ſimplici erecto, foliis ſpathulatis ſubvilloſis integerrimis, floribus axillaribus, antheris alternis ſeſſilibus corolla brevioribus, capſula ſubprismatica ſericea. *Chili.*

humifuſa Nutt. 20. Oen. caule proſtrato ramoſo villoſo, foliis lineari-lanceolatis ſubdentatis ſericeis, floribus ſeſſilibus, petalis obcordatis ſtamina aequantibus. *Florida.*

albicaulis Fraſ. 21. Oen. caule ſimpliciuſculo erecto albido, foliis lineari-lanceolatis ſubſerrulatis ſubtus villoſiuſculis, petalis integris. *Louiſiana.*

molliſſima 22. Oen. caule herbaceo villoſiuſculo, foliis lanceolatis acuminatis denticulatis ſubundulatis glabriuſculis, capſula teretiuſcula ſulcata hirſuta apice 4loba. *Buenos Ayres.* (Oen. nocturna W. herb.)

pubescens W. herb. 23. Oen. caule simplici erecto; foliis oblongo-lanceolatis obsolete dentatis pubescentibus; capsulis curvatis cylindricis sericeo-villosis. *Amer. austr.* Humb.

pinnatifida Nutt. 24. Oen. caule decumbente pubescente, foliis radicalibus subintegerrimis, caulinis pinnatifidis linearibus, petalis obcordatis staminа superantibus, capsula prismatica sulcata. *Ad fl. Missuri.*

** *Fructibus obovatis s. clavatis.*

† *Floribus flavis.*

fruticosa 25. Oen. caule basi ramoso, ramis divaricatis pubescentibus, foliis lanceolatis acutis subdentatis, petalis obcordatis, capsulis pedicellatis clavato-oblongis angulatis. *Virginia.* (Oen. tetragona Roth.)

glauca Mx. 26. Oen. glaberrima ramosa, foliis oblongis utrinque attenuatis glaucescentibus obsolete denticulatis, floribus terminalibus subracemosis, petalis emarginatis, capsula pedicellata obovata 4gona. *Amer. bor.*

Fraseri Pursh. 27. Oen. caule simpliciusculo glabro superne ramoso, foliis ovatis petiolatis glanduloso-denticulatis, floribus racemosis, capsula pedicellata obovata 4gona. *Carolin. austr.*

ambigua Nutt. 28. Oen. caule simplici piloso, foliis ovato-lanceolatis acutis subdenticulatis punctatis, laciniis calycinis abbreviatis, capsula subsessili clavata 4alata. *Pensylvan.*

chrysantha Mx. 29. Oen. caule debili pubescente, foliis lanceolatis obtusiusculis integerrimis, laciniis calycinis tubum excedentibus, capsula sessili clavata 4angula. *Amer. bor.*

riparia Nutt. 30. Oen. caule ramoso glabro, foliis lineari-lanceolatis acutis nitidiusculis remote denticulatis, floribus racemosis, capsula pedicellata obovata 8angula alata. *Carolin. bor.*

macrocarpa Pursh. 31. Oen. caule caespitoso, foliis longe petiolatis lanceolatis glanduloso-denticulatis margine nervisque sericeo-albidis, floribus sessilibus, calycis tubo longissimo, petalis obcordatis, capsula ampliissima coriacea compressa 4alata. *Louisiana.* (Oen. missurensis Sims., alata Nutt.)

hybrida Mx. 32. Oen. caule erecto villoso, foliis lanceolatis undulatis remote subdentatis utrinque pubescentibus, capsula pedicellata obovato-4gona. *America bor.*

incana Bart. 33. Oen. caule erecto foliisque oblongis integerrimis incano-hirsutis, floribus racemosis, capsula subsessili obovato-oblonga 4angula. *Mariland.*

multicaulis R. et P. 34. Oen. caule colorato, foliis ovato-lanceolatis pubescentibus, floribus secundis, petalis calycem aequantibus, capsulis clavatis 8gonis. *Peru.* (Oen. aurantia W. herb.)

ascendens W. herb. §5. Oen. caule debili ascendente ramoso, foliis lanceolatis dentatis pubescentibus, capsulis sessilibus clavatis curvatis. *Amer. austr.* Humb.

linearis Mx. §6. Oen. caule pubescente, foliis lineari-lanceolatis utrinque attenuatis subintegerrimis hirsutis, floribus terminalibus aggregatis, capsula pedicellata clavata 4gona villosa. *Carolina.*

pumila §7. Oen. caule ascendente superne glanduloso-pubescente, ramis flexuosis, foliis lanceolatis obtusis integerrimis, capsula subsessili obovata 4gona. *Amer. bor.*

pusilla Mx. §8. Oen. caule simpliciusculo erecto, foliis lanceolatis obtusiusculis integerrimis, capsula clavato-turbinata 8gona. *Amer. bor.*

rhizocarpa * §9. Oen. acaulis, foliis lanceolatis elongatis glabris basi pinnatifidis repando-denticulatis, floribus radicalibus sessilibus, tubo calycis longissimo, petalis integris stamina aequantibus, capsula ovata 4alata reticulata. *Louisiana.* Nuttall.

†† *Floribus albis vel rubris.*

caespitosa Sims. 40. Oen. acaulis, foliis oblongo-lanceolatis incisodenticulatis decurrentibus, pedunculis radicalibus 1floris, tubo calycis longissimo, petalis obcordatis, capsula oblonga, valvarum marginibus cristato-muricatis. *Ad fl. Missuri.* (Oen. scapigera Pursh.)

acaulis Cav. 41. Oen. caule abbreviato pubescente, foliis lyratopinnatifidis hirsutiusculis, floribus axillaribus subsessilibus, petalis rotundatis stamina superantibus, capsula obovata 4angula. *Chili.* (Oen. grandiflora R. et P.)

tetraptera Cav. 42. Oen. caule herbaceo, foliis lanceolatis basi pinnatifido-dentatis, petalis emarginatis, capsula pedicellata obovata 4alata. *Nov. Hispan.*

speciosa Nutt. 43. Oen. caule suffruticoso, foliis oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis serratis nervosis subtus pubescentibus, floribus subracemosis, petalis obcordatis stamina aequantibus, capsulis obovatis angulatis. *Louisiana.*

rosea Ait. 44. Oen. caule ramoso pubescente, foliis oblongis utrinque attenuatis subdentatis glabris, capsula pedicellata obovata 4angula glabriuscula. *Peru.* (Oen. rubra Cav.)

subulata R. et P. 45. Oen. caule suffruticoso villoso, foliis subulatis, floribus sessilibus, petalis 2fidis, capsula clavata 8angula superne alata. *Chili.*

virgata R. et P. 46. Oen. caule decumbente radicante, ramis virgatis, foliis lyratis lanceolatisque dentatis, floribus subracemosis, capsula pedicellata clavata 8angula. *Peru.*

1470. JUSSIEVA.

* *Floribus octandris.*

villosa Lam. 1. J. caule suffruticoso ramoso, foliis lanceolatis subsessilibus integerrimis utrinque villosis, capsulis subsessilibus striatis. *Ind. or. Moluc. Cochinchina.* (J. suffruticosa L. Epilobium fruticosum Lour.)

caryophyllea Lam. 2. J. caule herbaceo ramoso superne angulato, foliis petiolatis lanceolatis integerrimis glabris, capsulis subsessilibus turbinatis abbreviatis. *Ind. or.*

† *tetragona* * 3. J. caule herbaceo 4gono, foliis subsessilibus lineari-lanceolatis integerrimis glabris, capsulis cylindricis elongatis. *China. Cochinchina.* (Epilobium tetragonum Lour.)

hirta 4. J. caule suffruticoso hirsuto, foliis petiolatis oblongis utrinque attenuatis parallele venosis villosis, floribus pedunculatis amplis, capsulis turbinatis villosissimis. *Ind. occid.*

octonervia Lam. 5. J. caule herbaceo foliisque lanceolatis integerrimis venosis glabris, petalis emarginatis, capsulis elongatis cylindricis 8nerviis glaberrimis. *Ind. occ.* (J. octovalvis Sw. Oenothera L.)

acuminata Sw. 6. J. caule herbaceo subangulato superne hirsutiusculo, foliis oblongis utrinque attenuatis venosis glabriusculis, capsulis elongatis hirsutis 8nerviis. *Ind. occid. Brasil.* (J. scabra W.)

erecta 7. J. caule herbaceo 4gono foliisque lanceolatis petiolatis venosis glaberrimis, petalis calycem subaequantibus, capsulis cylindricis. *Ind. or. et occ. Virgin. Carolina.* (J. angustifolia Lam., nervosa Poir., palustris Meyer.)

inclinata 8. J. caule basi radicante, foliis petiolatis obovatis, floribus pedunculatis. *Surinam.*

sagittata Poir. 9. J. caule sub-4gono glabro, foliis sessilibus oppositis lineari-sagittatis integerrimis, capsulis sessilibus subgloboso-4gonis. *Hispaniola.*

linifolia Vahl. 10. J. caule herbaceo glabro angulato, foliis sessilibus lineari-lanceolatis integerrimis, capsulis sessilibus teretibus gracilibus. *Amer. austr.*

linearis W. 11. J. caule tereti glabriusculo, foliis linearibus elongatis capsulisque teretibus hispidis. *Guinea.*

subacaulis Pursh. 12. J. caule glabro repente, foliis lineari-lanceolatis repando-dentatis, floribus pedunculatis. *Ad fl. Missuri.*

sedoides Humb. 13. J. caule simplici herbaceo, foliis spathulatis congestis apice dentatis subcarnosis petiolatis, capsulis elongatis. *Amer. austr.*

natans Humb. 14. J. caule natante glabro, foliis suborbiculatis subdentatis glabris, petiolis tuberculatis, floribus longe pedunculatis, capsulis elongatis. *Nov. Granat.*

** *Floribus decandris.*

grandiflora Mx. 15. J. radice repente, caule ſuffruticoſo hirſuto, foliis ſpathulato-lanceolatis ſubſeſſilibus glabriusculis, pedunculis calycibusque villoſis. *Carolina. Georgia.*

peruviana 16. J. caule ſuffruticoſo, foliis ſeſſilibus oblongis integerrimis ſcabris, pedunculis apice 2bracteatis, capſulis ſubclavatis. *Lima.*

montevidenſis * 17. J. caule herbaceo aſcendente ſuperne hirſuto, foliis longe petiolatis oblongis venoſis ſubtus pubeſcentibus, pedunculis medio 2bracteatis. *Monte Video.* Sello.

pubeſcens 18. J. caule ſuffruticoſo hirto, foliis lanceolatis integerrimis utrinque attenuatis ſubſeſſilibus hirſutis, pedunculis ſubebracteatis calycibusque hirſutis. *Amer. auſtr.*

leptocarpa Nutt. 19. J. caule herbaceo ſimplici angulato hirſuto, foliis lanceolatis glabriusculis utrinque attenuatis, floribus ſeſſilibus, capſulis teretibus gracilibus. *Ad fl. Miſſiſippi.*

variabilis Meyer. 20. J. caule aſcendente glabro, foliis ſubpetiolatis lanceolatis obſolete ſerratis, pedunculis apice 2bracteatis, capſulis 4gonis. *Guinea.*

repens 21. J. caule repente aſcendente glabro herbaceo, foliis ſubſpathulatis integerrimis petiolatis, capſulis pedunculatis teretiusculis. *Ind. or. occid.* (J. aſcendens L. Cuboſpermum paluſtre Lour.)

1471. EPILOBIUM.

* *Petalis integris, ſtigmate 4fido ſubdeclinato.*

anguſtiſſimum Ait. 1. E. foliis linearibus eveniis ſubintegerrimis. *Alp. Europ.* (E. anguſtifolium Lam., rosmarinifolium Hänk., Halleri Retz.)

anguſtifolium 2. E. radice repente, caule glabro, foliis linearilanceolatis integerrimis venoſis glabris. *Europa. Amer. bor. China.* (E ſpicatum Lam., latifolium Schmidt.)

latifolium 3. E. foliis oblongo-lanceolatis ſubintegerrimis eveniis incano-pubeſcentibus, floribus amplis. *Regio arctica.* (In Aſia boreali et inſulis Aleutis glabreſcit: E. humile W. herb.)

** *Petalis emarginatis ſ. obcordatis, ſtigmatibus rectis.*

† *Stigmate 4fido.*

hirſutum 4. E. caule tereti ramoſo villoſo, foliis oblongis ſemiamplexicaulibus utrinque attenuatis denticulatis ſubtus hirſutis, floribus amplis. *Europ. Aſia et Amer. bor.* (E. amplexicaule Lam., tomentoſum Vent., incanum Perſ.)

molle Lam. 5. E. caule tereti villoſo, foliis lanceolatis ſeſſilibus denticulatis pubeſcentibus, floribus corymboſis,

petalis calycem ſuperantibus. *Europ. Afr. auſtr.* (E. villoſum Thunb., parviflorum Schreb., pubeſcens Roth.)

virgatum Lam. 6. E. caule erecto tereti pubeſcente, foliis ſeſſilibus oppoſitis oblongo-lanceolatis denticulatis glabris, floribus axillaribus breviter pedunculatis. *Ager romanus.* (E. lanceolatum Sebaſt.)

junceum Forſt. 7. E. caule tereti fiſtuloſo ſuperne incano pubeſcente, foliis ſeſſilibus lanceolatis acutis denticulatis glabriusculis, calycibus acuminatis corollam ſubſuperantibus. *Nov. Zeeland. Amer. auſtr.* (E. denticulatum R. et P.)

luteum Pall. 8. E. caule 4gono glabro, foliis oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis ſerrulatis, pedunculis axillaribus elongatis, calycibus corollam aequantibus. *Inſ. Aleut.*

montanum 9. E. caule tereti glabro, foliis ovato-oblongis acutis ſubſeſſilibus dentatis. *Europ. Caucaſ.*

ſtrictum Mühlb. 10. E. caule ſtricto foliisque linearibus venoſis integerrimis venoſis, floribus axillaribus, capſulis gracilibus incano-villoſis. *Penſylvan.*

†† *Stigmate indiviſo.*

alſinifolium Vill. 11. E. radice repente, caule aſcendente 4gono glabro, foliis ſubpetiolatis ovato-oblongis denticulatis. *Europ. med. Scotia. Caucaſ.* (E. origanifolium Lam., algidum M. B.)

alpeſtre Schmidt. 12. E. caule teretiusculo glabro, foliis ternis quaternis ſeſſilibus oblongis denticulatis glabris, floribus ſubracemoſis, petalis calycem ſuperantibus. *Europ. med.*

roſeum Schreb. 13. E. caule obſolete 4gono ſubpubeſcente, foliis oblongis utrinque attenuatis denticulatis, petalis calycem ſubaequantibus. *Europ. humida.* (E. Otites Hofmannsegg. in W. herb.?)

glabellum Forſt. 14. E. caule teretiusculo aſcendente, foliis oblongis obtuſis dentatis glabris, floribus axillaribus. *Nov. Zeeland.*

coloratum Mühlb. 15. E. caule tereti glabro, foliis petiolatis lanceolatis denticulatis venoſis, ramis ſuperne incano-pubeſcentibus, petalis calycem ſubſuperantibus. *Amer. bor.*

alpinum 16. E. caule baſi repente aſcendente paucifloro, foliis elliptico-ſubrotundis ſubintegerrimis ſubſeſſilibus. *Europ. et Amer. bor.* (E. anagallidifolium Lam., pumilum Perſ., nutans fl. dan.)

tetragonum 17. E. caule ſub-4gono glabro, foliis anguſte lanceolatis ſerrulatis ſeſſilibus, floribus racemoſis. *Europ. et Amer. bor.* (E. trigonum Hortul., flaccidum Brot., Chamaenerion obſcurum Schreb.)

paluſtre 18. E. caule tereti pubeſcente, foliis linearibus ſubintegerrimis. *Europ. et Amer. bor.*

dauricum Fisch. 19. E. caule tereti ſuperne pubeſcente, foliis linearibus obſolete denticulatis, floribus racemoſis minutis. *Dauuria.*

squamatum Nutt. 20. E. radice bulboſa ſquamata, caule tereti ramoſo incano-pubeſcente, foliis linearibus integerrimis ſubrevolutis, floribus minutis. *Penſylvan.* (E. lineare Mühlb., rosmarinifolium Pursh, oliganthon Mx.?)

*** *Dubium.*

rotundifolium Forſt. 21. E. foliis oppoſitis ſubrotundis denticulatis. *Nov. Zeeland.*

1472. GAURA.

biennis 1. G. caule herbaceo elato villoſo, foliis ſeſſilibus lanceolatis denticulatis, floribus racemoſis. *America bor.*

mutabilis Cav. 2. G. caule ſuffruticoſo pubeſcente, foliis petiolatis ovatis dentatis, floribus ſpicatis. *Nov. Hiſpan.* (Oenothera anomala Curt.)

fruticoſa Jacq. 3. G. caule fruticoſo glabro, foliis lineari-lanceolatis denticulatis, floribus racemoſis. *Amer. auſtr.*

chinenſis Lour. 4. G. caule ſuffruticoſo 4gono hiſpido, foliis lanceolatis ſerratis ſeſſilibus, floribus racemoſo-ſpicatis. *China auſtr.*

tripetala Cav. 5. G. caule herbaceo hirſuto, foliis lanceolatis denticulatis, floribus ſpicatis 3petalis 6andris. *Mexico.*

coccinea Fraſ. 6. G. caule herbaceo ſericeo, foliis lineari-lanceolatis ſubdenticulatis, floribus laxe racemoſis. *Louiſiana.*

1473. FUCHSIA.

* *Foliis ternis-oppoſitisque.*

coccinea 1. F. foliis ſubcordato-ovatis denticulatis, pedunculis axillaribus 1floris nutantibus. *Chili. Patagonia.* (F. magellanica Lam.)

macroſtemma R. et P. 2. F. foliis ovatis ſubſinuato-dentatis, pedunculis axillaribus 1floris, fructibus 4gonis. *Chili.*

decuſſata R. et P. 3. F. foliis oblongo-lanceolatis denticulatis utrinque pubeſcentibus, pedunculis axillaribus 1floris, ramis decuſſatis ſublanatis. *Peru.*

denticulata R. et P. 4. F. foliis oblongo-lanceolatis denticulatis ſubtus villoſis, pedunculis axillaribus 1floris. *Peru.*

ſerratifolia R. et P. 5. F. foliis oblongis ſerratis ſubtus pubeſcentibus, pedunculis axillaribus abbreviatis 1floris. *Peru.*

lycioides Andr. 6. F. foliis ternis oppoſitis ſubfaſciculatis oblongis integerrimis, pedunculis axillaribus ſubaggregatis patentibus, calycibus reflexis. *Chili. Amer. bor. ora occid.?* (F. roſea R. et P.?)

ovalis R. et P. 7. F. foliis ternis oppositisque amplis ovalibus pubescentibus supra nitidis, pedunculis axillaribus racemosis foliosis. *Peru.*

corymbiflora R. et P. 8. F. foliis subternis oppositisque oblongo-lanceolatis subintegerrimis pubescentibus, floribus corymbosis, petalis acutis. *Peru.*

simplicicaulis R. et P. 9. F. foliis subquaternis lineari-lanceolatis obsolete denticulatis, pedunculis terminalibus quaternis 1floris involucratis, calycibus pubescentibus. *Peru.*

** *Foliis alternis sparsisque.*

exsorticata 10. F. foliis ovato-oblongis obsolete denticulatis subtus albidis, pedunculis axillaribus 1floris, calycibus campanulatis patentibus. *Nov. Zeeland.* (Skinnera Forst.)

apetala R. et P. 11. F. foliis ovatis acuminatis integerrimis subtus discoloribus, floribus corymbosis apetalis. *Peru.*

1474. MEMECYLON.

edule Roxb. 1. M. foliis oblongis nitidis, umbellis corymbosis. *Ind. or.*

cordatum Lam. 2. M. foliis cordatis subamplexicaulibus integerrimis retusis, umbellis pedunculatis compositis subglobosis. *Inf. Mascaren.*

capitellatum 3. M. foliis oblongis integerrimis obtusiusculis petiolatis, umbellis capitatis axillaribus subsessilibus. *Ceylon.*

tinctorium W. 4. M. foliis ovato-oblongis petiolatis, corymbis axillaribus. *Ind. or.*

grande Retz. 5. M. foliis ovatis acuminatis integerrimis, corymbis axillaribus pedunculatis. *Ind. or.*

1475. MARLEA ROXB.

begonifolia Roxb. *Bengal. China austr.* Frutex ramosus, foliis alternis inaequaliter ovatis acuminatis, pedunculis axillaribus cymosis abbreviatis, floribus luteis. (Stylidium chinense Lour.)

1476. RHIZOPHORA.

Mangle 1. Rh. foliis oblongis acutiusculis eveniis glaberrimis coriaceis, ramis radicantibus, pedunculis 2-3fidis, fructibus clavato-subulatis. *Ind. or. et occ.*

mucronata Lam. 2. Rh. foliis ovatis obtusis mucronatis subtus venosis punctatis, pedunculis dichotomis. *Inf. Mascaren.*

racemosa Meyer. 3. Rh. foliis obovatis obsolete venosis subtus scabris, pedunculis dichotomis. *Guiana.*

cylindrica 4. Rh. foliis oblongis utrinque attenuatis, pedunculis sub-1floris, fructibus cylindricis obtusis. *Inf. Moluce.*

Candel 5. Rh. foliis obtusis, pedunculis 2geminis folio longioribus, fructibus subulatis. *Ind. or.*

conjugata 6. Rh. foliis ovato-oblongis obtusiusculis, floribus sessilibus, fructibus cylindrico-subulatis. *Ind. orient.*

1477. DAPHNE.

* *Floribus lateralibus.*

Mezereum 1. D. floribus sessilibus subternis pubescentibus, laciniis corollae ovatis acutis, foliis lanceolatis basi attenuatis glaberrimis. *Europ. Asia borcal.* (D. Liottardi Vill.)

Laureola 2. D. racemis axillaribus paucifloris nutantibus, floribus glabris bracteatis, laciniis corollae obtusis, foliis lanceolatis basi attenuatis glaberrimis. *Europ. med.*

pontica 3. D. pedunculis elongatis 2floris, floribus ebracteatis glabris, laciniis corollae lanceolatis longe acuminatis, foliis obovato-lanceolatis glaberrimis. *Asia minor.*

triflora Lour. 4. D. capitulis 3floris sessilibus congestis, involucro 3phyllo, foliis lanceolatis subpetiolatis. *China austr.*

pendula Sm. 5. D. capitulis multifloris longissime pedunculatis nutantibus, involucro diphyllo, corollae sericeae laciniis ovatis acutis, foliis lanceolatis glabris. *Java.* (Scopolia composita L. suppl.)

involucrata Wall. 6. D. capitulis multifloris pedunculatis erectis, floribus sericeis, foliis oblongo-lanceolatis acuminatis petiolatis subtus glaucescentibus. *Ind. or.*

Gardneri Wall. 7. D. capitulis multifloris pedunculatis globosis sericeis, laciniis corollae subrotundis alternis crenulatis, foliis lanceolatis petiolatis subtus villosis. *Nepal.*

mexicana * 8. D. capitulis multifloris pedunculatis sericeis nudis, laciniis corollae obtusis, foliis lanceolatis obtusiusculis petiolatis utrinque glaberrimis. *Mexico.* (D. salicifolia Kunth.)

cestrifolia Kunth. 9. D. capitulis multifloris pedunculatis pubescentibus, corollae sericeae laciniis acutis, foliis obovato-lanceolatis subcoriaceis utrinque glabris. *Nov. Granat.*

** *Floribus terminalibus.*

tinifolia Sw. 10. D. floribus terminalibus aggregatis subracemosis, pedunculis sub-3fidis, corollae villosae laciniis obtusis, foliis spathulato-oblongis glabris. *Jamaica.*

Gnidium 11. D. floribus paniculatis congestis sericeis, laciniis corollae obtusis, foliis confertis linearilanceolatis acuminato-cuspidatis. *Europ. austr. Afric. bor.*

indica 12. D. floribus congestis sessilibus sericeo-pubescentibus, laciniis corollae lanceolatis acuminatis, foliis oppositis oblongis acutiusculis glabris. *China.*

Inſ. Amicorum. Nov. Holl. (D. foetida Forſt. Capura purpurata L.)

rotundifolia Forſt. 13. D. floribus congeſtis ſeſſilibus ſericeo-pubeſcentibus, laciniis corollae obtuſis, foliis oppoſitis ſubrotundis petiolatis glabris, ramis incano-tomentoſis. *Inſ. Amicorum.*

odora Thunb. 14. D. floribus aggregatis ſeſſilibus glabris, laciniis corollae cordato-ovatis obtuſis, foliis confertis oblongis glabris nitidis. *Japon.*

chinenſis Lam. 15. D. floribus aggregatis breviſſime pedunculatis ſubpubeſcentibus, laciniis corollae lanceolatis acuminatis, foliis ſeſſilibus oblongis glabris nitidis. *China.* (D. odora Lour.)

cannabina Lour. 16. D. floribus umbellatis, laciniis corollae ovatis, foliis oblongo-lanceolatis oppoſitis. *Cochinchina. Nepal.*

occidentalis Sw. 17. D. floribus umbellatis dioecis incano-villoſis, laciniis lanceolatis acutis, foliis lanceolatis ſubtus incanis pubeſcentibus. *Jamaica.*

alpina 18. D. floribus aggregatis ſeſſilibus ſericeo-pubeſcentibus, laciniis corollae lanceolatis acutis, foliis lanceolatis obtuſiusculis ſubtus obſolete lanatis. *Alp. Europ. med.*

altaica Pall. 19. D. floribus aggregatis ſubſeſſilibus glabris, laciniis corollae ovatis obtuſis, foliis lanceolatis obtuſiusculis mucronatis glabris. *Sibir.*

Cneorum 20. D. floribus aggregatis ſeſſilibus extus incano-pubeſcentibus, laciniis corollae obtuſis, foliis ſubſpathulato-linearibus ſeſſilibus mucronulatis glabris. *Montes Europ. med.*

ſtriata Trattin. 21. D. floribus aggregatis ſeſſilibus glabris ſtriatis, laciniis corollae acutis, foliis ſubſpathulato-linearibus ſeſſilibus mucronulatis glabris. *Helvet. Hungar.*

glomerata Lam. 22. D. floribus glomerato-faſciculatis glabris, laciniis corollae acuminatis, foliis obovatis nitidis utrinque glabris. *Caucaſ.* (D. comoſa Adam.)

collina Sm. 23. D. floribus faſciculatis ſericeo-lanatis, laciniis corollae obtuſis, foliis ſpathulatis coriaceis ſupra nitidis ſubtus ſubpiloſis. *Italiae colles.*

buxifolia Vahl. 24. D. floribus aggregatis villoſis, laciniis corollae obtuſiusculis, foliis obovatis opacis ſupra glabris ſubtus pubeſcentibus. *Aſia minor.*

ſericea Vahl. 25. D. floribus aggregatis villoſis, laciniis corollae obtuſis, foliis lanceolatis obtuſiusculis ſupra glabris ſubtus villoſis. *Creta. Aſia minor.* (D. oleaefolia Lam.)

oleoides Schreb. 26. D. floribus geminis ſericeo-pubeſcentibus, laciniis corollae lanceolatis acuminatis, foliis lanceolatis utrinque glabris. *Creta. Caucaſ.*

jaſminea Sm. 27. D. floribus geminis glabriusculis, foliis ſpathulatis glabris, caule ramoſiſſimo depreſſo. *Graecia.*

glandulosa Bertol. 28. D. floribus ſubternis, foliis oblongis obtuſis ſubtus glanduloſo-punctatis. *Apennin.*

ſalicifolia Lam. 29. D. floribus aggregatis ſeſſilibus pubeſcentibus, laciniis corollae lanceolatis acuminatis, foliis li-

neari-lanceolatis obtusis mucronatis utrinque glabris. *Caucas.* (D. caucasica Pall.)

macrophylla Kunth. 30. D. capitulis multifloris pedunculatis congestis, floribus sericeo-hirsutis, laciniis acutis, foliis oblongis coriaceis subtus pubescentibus. *Quito.*

anomala Kunth. 31. D. capitulis multifloris pedunculatis, floribus sericeis dioecis, laciniis acutis, foliis obovato-oblongis utrinque glabris. *Nov. Granat.*

1478. GNIDIA.

*Foliis angustis.

pinifolia 1. Gn. foliis linearibus subulatis patulis glabris, floralibus sublanceolatis, floribus capitatis villosis, squamis petaloideis hirsutis lacinias corollae subaequantibus. *C. B. S.* (Gn. radiata Wendl.)

imberbis Dryand. 2. Gn. foliis lineari-triquetris acutis glabris, floralibus sublanceolatis, floribus capitatis villosis, squamis octonis imberbibus minutis. *C. B. S.* (Gn. pinifolia Wendl. simplex Andr.)

simplex 3. Gn. foliis linearibus acutis concavis, floralibus capitulum aequantibus, squamis quaternis corollisque glabris. *C. B. S.*

juniperifolia 4. Gn. foliis linearibus subulatis ramisque glaberrimis, floralibus similibus, floribus subgeminis glabris. *C. B. S.* (Gn. pinifolia L. suppl., acerosa Gmel.)

biflora Thunb. 5. Gn. foliis lanceolatis carinatis acutis patulis ramisque glabris, floralibus linearibus, floribus lateralibus subgeminis glabris, laciniis corollae acutis. *C. B. S.* (Gn. carinata Thunb. prodr. acutifolia Wikstr.)

scabra Thunb. 6. Gn. foliis linearibus obtusis subtus convexis ramisque villosiusculis, floribus aggregatis villosis, laciniis oblongis obtusis. *C. B. S.*

linoides Wikstr. 7. Gn. foliis oppositis sessilibus lineari-lanceolatis subulatis glabris subtus 3nerviis, floribus solitariis terminalibus sericeis, laciniis corollae lanceolatis acutis. *C. B. S.* (Passerina Thunb.)

nana Wikstr. 8. Gn. foliis sparsis sessilibus linearibus obtusis subtus convexis glabriusculis, floribus terminalibus aggregatis villosis tandris, laciniis corollae lanceolatis acutis. *C. B. S.* (Struthiola Thunb.)

**Foliis latioribus.

oppositifolia 9. Gn. foliis oppositis oblongo-lanceolatis acutis glabris, floribus aggregatis terminalibus pubescentibus, laciniis corollae oblongis obtusis. *C. B. S.* (Gn. laevigata Thunb., Passerina laevigata L., Nectandra Berg.)

racemosa Thunb. 10. Gn. foliis spathulato-lanceolatis glabris confertis, floribus subracemosis villosis, laciniis corollae minutis obtusis. *C. B. S.*

stricta Wikstr. 11. Gn. foliis minutis oblongis acutiusculis utrinque subvillosis, ramulis brevibus rigidis verrucosis,

floribus terminalibus aggregatis pubescentibus, laciniis corollae linearibus obtusis. *C. B. S.* (Passerina Thunb.)

setosa Wikstr. 12. Gn. foliis sparsis lanceolatis acutis subtus 5nerviis glabris, floribus terminalibus fasciculatis extus setosis, laciniis corollae oblongis obtusis. *C. B. S.* (Passerina Thunb.)

virescens Wikstr. 13. Gn. foliis sparsis oblongis obtusis pubescentibus, floribus terminalibus subaggregatis villosis, laciniis corollae lanceolatis obtusiusculis. *C. B. S.* (Passerina anthylloides *α*. Thunb.)

tomentosa 14. Gn. foliis sparsis ovalibus margine scabris glabriusculis, floribus terminalibus aggregatis villosis, laciniis corollae lanceolatis acutis. *C. B. S.*

argentea Thunb. 15. Gn. foliis obovatis submucronatis argenteo-villosis, floribus terminalibus aggregatis villosis, laciniis corollae obtusis. *C. B. S.*

sericea 16. Gn. foliis obovatis confertis ramisque villosiusculis, floribus terminalibus aggregatis sericeo-villosis, laciniis corollae lanceolatis acutis. *C. B. S.* (Passerina L. Nectandra Berg.)

imbricata L. fil. 17. Gn. foliis oblongis obtusis utrinque villosis subtus nervosis, floribus aggregatis sericeis, laciniis corollae lanceolatis acuminatis. *C. B. S.*

filamentosa L. fil. 18. Gn. foliis ovalibus glaberrimis, floribus capitatis villoso-hirsutis, laciniis corollae lanceolatis acuminatis, genitalibus exsertis. *C. B. S.* (Gn. glauca Sims., Lachnaea buxifolia Lam., glauca Salish.)

1479. PASSERINA.

* *Foliis angustis.*

annua Wikstr. 1. P. caule glabro ramoso, foliis sparsis linearibus patulis, floribus axillaribus subsolitariis incano-pubescentibus, laciniis corollae conniventibus. *Europ. med. Caucas. Afric. bor.* (Stellera Passerina L.)

uniflora 2. P. caule suffruticoso glabro, foliis oppositis sessilibus linearibus acutis erectis glaberrimis, superioribus sublanceolatis, floribus terminalibus solitariis sericeis, laciniis corollae acutis. *C. B. S.*

laxa L. fil. 3. P. ramis laxis tenuibus pilosis, foliis sparsis sessilibus linearibus acutis glabris, superioribus lanceolatis obtusiusculis pubescentibus, floribus terminalibus aggregatis hirsutiusculis, corollae tubo medio coarctato, laciniis obtusiusculis subconniventibus. *C. B. S.* (P. tenuiflora W. ?)

linearifolia Wikstr. 4. P. ramulis verrucosis, foliis sparsis sessilibus linearibus obtusis subtus convexis, floribus terminalibus villosis, laciniis corollae lato-lanceolatis acutis. *C. B. S.*

filiformis 5. P. ramis subtomentosis, foliis linear-subulatis subtus convexis glabris appressis, floribus axillaribus pubescentibus, laciniis corollae patentibus acutiusculis. *C. B. S.*

eriocephala Thunb. 6. P. ramis virgatis glabriuſculis, foliis oppoſitis linearibus obtuſiuſculis glabris patulis, floribus terminalibus aggregatis bracteatis denſe lanatis, laciniis corollae lanceolatis patentibus. *C. B. S.* Lachnaea L. Andr., P. cephalophora Thunb.)

conglomerata Thunb. 7. P. ramulis flexuoſis, foliis 4fariam imbricatis linearibus truncatis, floribus terminalibus confertis capitatis bracteatis lanatis, laciniis corollae obtuſis. *C. B. S.* (Lachnaea L.)

capitata 8. P. ramis ſtrictis, foliis ſparſis linearibus erectis glabris, capitulis terminalibus pedunculatis villoſis, laciniis corollae acutis. *C. B. S.*

theſioides Wikſtr. 9. P. ramis pubeſcentibus, foliis ſparſis linearibus obtuſis glabris, floribus axillaribus ſubgeminis pubeſcentibus, laciniis corollae obtuſiuſculis. *Hiſpan.* (Daphne Lam.)

coriſolia Wikſtr. 10. P. ramis laxis pubeſcentibus, foliis ſparſis linearibus obtuſiuſculis glabris, floribus axillaribus ſolitariis pubeſcentibus 2bracteatis, laciniis corollae obtuſis. *Hiſpan.* (Daphne coridifolia Lam. D. pubeſcens L.)

calycina Cand. 11. P. ramis divaricatis, foliis confertis linearibus acutis ſubtus convexis nitidis, floribus axillaribus ſubſolitariis breviter pedunculatis dioecis 2bracteatis, laciniis corollae obtuſis. *Pyren.* (Daphne Lapeyr.)

† *nivalis* Ram. 12. P. ramis proſtratis, foliis linearibus obtuſiuſculis carnoſis ſubciliatis, floribus axillaribus dioecis glabris bracteatis. *Pyren.* (Daphne calycina Lam. Paſſ. juniperifolia *β*. Lapeyr.)

nitida Desf. 13. P. foliis ſubfaſciculatis linearibus obtuſiuſculis utrinque ſericeis, floribus aggregatis pubeſcentibus baſi ventricoſis. *Afr. bor.* (Daphne nitida Vahl., argentata Lam.)

**** *Foliis latioribus.***

dioeca Ram. 14. P. ramis verrucoſis, foliis confertis cuneiformibus glabris, floribus axillaribus ſubſolitariis dioecis baſi ſquamatis glabris, laciniis corollae acutis. *Alp. cott. pyren.* (P. empetrifolia Lapeyr., Daphne dioeca Gouan., calycina Berger.)

tinctoria Pourr. 15. P. ramis ſublanatis, foliis lineari-lanceolatis obtuſis abbreviatis tenuiſſime lanatis, floribus axillaribus ſubſolitariis 2bracteatis glabris, laciniis corollae acutis. *Gallia narbon. Hiſpan. Luſit.* (P. hirſuta Aſſ. Brot. Daphne vermiculata Vahl.)

hirſuta 16. P. ramis laxis pendulis tomentoſis, foliis ovatis obtuſis ſubtus glabris ſupra albo-tomentoſis, floribus aggregatis ſeſſilibus villoſis ſubdioecis, laciniis corollae obtuſis. *Europ. auſtr. Afric. bor.*

ſtriata Lam. 17. P. ramis piloſiuſculis, foliis oppoſitis lanceolatis acutis glabris ſubtus ſtriatis, floribus axillaribus ſubaggregatis pedunculatis pubeſcentibus, laciniis corollae lanceolatis acutis. *C. B. S.* (P. nervoſa Thunb.)

Thymelaea Cand. 18. P. ramis ſtrictis glabris, foliis ſparſis oblongo-lanceolatis mucronatis glaucis, floribus axillaribus ſeſſilibus glabriusculis, laciniis corollae acuminatis. *Gallia auſtr. Hiſpan.* (Daphne L.)

Tartonraira Schrad. 19. P. foliis ſpathulato-oblongis nervoſo-venoſis incanis ſericeo-tomentoſis, floribus axillaribus glomeratis dioecis villoſis baſi ſquamatis, laciniis corollae obtuſis. *Gallia auſtr. Italia.* (Daphne L.)

Stelleri Wikſtr. 20. P. caulibus caeſpitoſis glabris, foliis ſparſis lanceolatis obtuſiusculis glabris, floribus capitato-racemoſis 10andris glabris, laciniis corollae obtuſis. *Sibir.* (Stellera Chamaejasme L.)

racemoſa Wikſtr. 21. P. caule annuo ramoſo, foliis ſparſis ſpathulato-lanceolatis breviſſime petiolatis glabris, floribus racemoſis laevibus, tubo corollae articulato, laciniis conniventibus minutis linearibus. *Sibir.* (Stellera altaica Perſ.?)

ericoides 22. P. ramulis tomentoſis, foliis oblongis obtuſis ſubtus convexis carinatis glabris, floribus axillaribus ſolitariis ſubpubeſcentibus, laciniis corollae orbiculatis. *C. B. S.*

rigida Wikſtr. 23. P. ramis rigidis, foliis 4fariam imbricatis ovatis obtuſis ſubtus glabris, floribus axillaribus ſolitariis pubeſcentibus, laciniis corollae obtuſis. *C. B. S.*

globoſa Lam. 24. P. foliis imbricatis obovatis ſericeo-villoſis, floribus aggregatis dioecis villoſis. *C. B. S.*

cuneata 25. P. ramis ſuperne pubeſcentibus, foliis ſparſis oblongo-lanceolatis obtuſiusculis ciliatis glabriusculis, floribus axillaribus ſolitariis ſericeis, laciniis corollae acutis. *C. B. S.*

villoſa 26. P. ramis piloſis, foliis oblongis obtuſis floribusque axillaribus villoſis, laciniis corollae obtuſis. *Europ. auſtr. Aſia minor.* (Daphne villoſa L., tomentoſa Lam., orientalis W.)

Leſſertii Wikſtr. 27. P. ramis ſuperne villoſis, foliis oblongis obtuſiusculis utrinque pubeſcentibus, floribus racemoſis villoſis, laciniis corollae lanceolatis obtuſis. *Perſia.*

virgata Desf. 28. P. ramis virgatis foliisque alternis lanceolatis villoſis, floribus axillaribus aggregatis ſeſſilibus, laciniis corollis ovatis obtuſis. *Afric. bor.*

caneſcens Schousb. 29. P. ramis lanatis, foliis imbricatis ovatis acutis utrinque lanuginoſis, floribus terminalibus aggregatis villoſis dioecis, laciniis corollae obtuſis. *Hiſpan. auſtr. Afric. bor.*

Thunbergii Wikſtr. 30. P. ramulis pubeſcentibus ſemi-amplexicaulibus oppoſitis oblongis obtuſis utrinque villoſiusculis, floribus terminalibus ſubgeminatis ſericeis, laciniis corollae acutis. *C. B. S.* (Gnidia oppoſitifolia Thunb.)

grandiflora L. fil. 31. P. foliis oppoſitis oblongis obtuſis glabris ſubtus convexis, floribus terminalibus ſolitariis ſeſſilibus campanulatis ſericeis, laciniis corollae oblongis obtuſis. *C. B. S.*

spicata L. fil. 32. P. ramis ſtrictis, foliis imbricatis ſubellipticis pubeſcentibus, floribus axillaribus ſolitariis ſeſſilibus pubeſcentibus, laciniis corollae patentibus obtuſis. *C. B. S.*

anthylloides L. fil. 33. P. ramis ſuperne villoſiſſimis, foliis imbricatis oblongis obtuſis ſubtus villoſis, floribus terminalibus capitatis 10andris. *C. B. S.*

1480. DIRCA.

paluſtris *Amer. bor.* Frutex ſuborgyalis, foliis obovato-oblongis glabris integerrimis, floribus gemmaceis ſubternis nutantibus ochroleucis. Eximia ligni tenacitas appellationem *Leatherwood* genuit.

1481. DODONAEA.

viſcoſa 1. D. foliis obovato-oblongis obtuſis baſi attenuatis viſcoſis, floribus racemoſis. *Ind. occid. Afric. occid.*

ſpathulata Sm. 2. D. foliis ſpathulato-linearibus viſcidis, floribus racemoſis dioecis. *Inſ. ocean. auſtr.*

microcarpa Cand. 3. D. foliis ſpathulato-linearibus ſubemarginatis laevibus, floribus racemoſis, fructibus pedicello brevioribus. *Inſ. Maſcaren.*

cuneata Sm. 4. D. foliis ſpathulatis acutiusculis mucronatis apice ſub-3dentatis, junioribus viſcoſis, pedunculis ſubaggregatis abbreviatis. *Nov. Holl.* (D. oblongifolia Link.)

aſplenifolia Rudg. 5. D. foliis ſpathulatis apice 3dentatis viſcoſis, ramis 3quetris, floribus ſubracemoſis. *Nov. Holl.*

triquetra Andr. 6. D. foliis oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis ramis 3gonis, floribus axillaribus cymoſis dioecis. *Nov. Holl. Ind. or.* (D. dioeca Roxb.)

eriocarpa Sm. 7. D. foliis oblongo-lanceolatis undulatis, ramulis fructibusque piloſis, ſepalis reflexis. *Inſ. Sandwich.*

Burmanniana Cand. 8. D. foliis oblongo-lanceolatis obtuſiusculis baſi attenuatis viſcoſis, floribus terminalibus paucis. *Ind. or.* (D. anguſtifolia Roxb.)

bialata Kunth. 9. D. foliis lanceolatis utrinque attenuatis viſcoſis, racemis compoſitis, fructibus bialatis. *Nov. Granat.*

jamaicenſis Cand. 10. D. foliis oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis ſubviſcoſis, ramis triquetris ſquamuloſis, floribus ſubracemoſis. *Jamaica. Hiſpaniola.* (D. elaeagnoides Rud., anguſtifolia Sw., ſalicifolia Cand.

1482. LLAGUNOA R. et P.

nitida R. et P. 1. Ll. foliis ovatis acutis ſerratis baſi ſub-3lobis glabris, pedunculis 3fidis. *Peru.* (Amirola Perſ.)

prunifolia Kunth. 2. Ll. foliis ovato-ellipticis argute dentatis ſubtus pubeſcentibus. *Peru.*

mollis Kunth. 3. Ll. foliis ellipticis ſerratis ſupra pubeſcentibus ſubtus tomentoſis. *Peru.*

1483. STADMANNIA Lam.

*pubescens** 1. St. foliis impari-pinnatis bijugis, foliolis obtusissimis pubescentibus, petiolo communi tomentoso. *Ind. or.* (Schleichera Roth.)

*trijuga** 2. St. foliis abrupte pinnatis 3jugis, foliolis oblongis obtusis subundulatis glabriusculis, floribus fasciculato-racemosis. *Ceylon. Insul. Molucc.* (Schleichera W., Melicocca Juss.)

Sideroxylon Lam. 3. St. foliis impari-pinnatis sub-4jugis, foliolis alternis acutis oblongis nitidis, racemis paniculatis terminalibus. *Insul. Mascaren. Molucc.*

*diversifolia** 4. St. foliis abrupte pinnatis 2- vel 7jugis, foliolis ovalibus integerrimis, floribus axillaribus glomeratis. *Insul. Mascaren.* (Melicocca Juss.)

1484. PIERARDIA Roxb.

dulcis Jack. *Sumatra.* Arbor foliis alternis obovatis, floribus racemosis flavis.

1485. VALENTINIA Sw.

ilicifolia Sw. Frutex 3pedalis, foliis alternis ovato-lanceolatis coriaceis undulato-spinosis, floribus umbellatis coccineis. *Cuba. Hispaniola.*

1486. CEDROTA Schreb.

longifolia W. *Guiana. Martinica.* Arbor excelsa, foliis oppositis lanceolatis elongatis integerrimis, floribus paniculatis viridibus. (Aniba guianensis Aubl.)

1487. BACCAUREA Lour.

ramiflora Lour. 1. B. ramis floriferis, foliis oblongis fructibusque glabris. *Cochinchina.*

cauliflora Lour. 2. B. trunco basi florifero, foliis oblongis fructibusque glabris. *Cochinchina.*

Sylvestris Lour. 3. B. ramis floriferis, foliis oblongis subtus pubescentibus, fructibus tomentosis. *Cochinchina.*

1488. SHEPHERDIA Nutt.

argentea Nutt. 1. Sh. foliis oblongis obtusis utrinque argenteo-lepidotis. *Ad fl. Missuri.* (Hippophaë Pursh.)

canadensis Nutt. 2. Sh. foliis oblongis supra glabriusculis subtus stellato-pubescentibus rufo-lepidotis. *Canada.* (Hippophaë L.)

1489. ASPIDISTRA Ker.

lurida Ker. *Patria?* Herba acaulis, foliis lanceolatis nervosis, floribus radicalibus solitariis fuscis. (Macrogyne convallariaefolia Link.)

1490. POPULUS.

graeca Ait. 1. P. foliis basi truncato-subcordatis acutis appresso-serratis subtus candicantibus ramisque glaberrimis. *Graecia. Inf. maris aegei.*

candicans Ait. 2. P. foliis cordatis ovatis acuminatis inaequaliter serratis subtus albidis reticulato-venosis, petiolis hirsutis, gemmis resinosis. *Canada.* (P. canadensis et latifolia Mönch.)

balsamifera 3. P. foliis ovatis acuminatis appresso-serratis subtus albidis reticulato-venosis, gemmis resinosis. *Amer. bor. Sibir.* (P. Tacamahaca Mill.)

heterophylla 4. P. foliis subauriculato-cordatis ovatis obtusis uncinato-dentatis subtus subpubescentibus, ramis teretibus. *Amer. bor.* (P. cordifolia Burgsd.)

angulata Ait. 5. P. foliis junioribus ampliffimis cordatis, adultis deltoideo-ovatis acuminatis obtuse uncinato-dentatis utrinque concoloribus glabris, ramis alato-angulatis. *Virgin. Florida.* (P. heterophylla du Roi, balsamifera Mill.)

laevigata Ait. 6. P. foliis subcordatis deltoideo-ovatis inaequaliter serratis basi ad petiolum supra 2glandulosis utrinque laevibus, ramis junioribus angulatis. *Amer. bor.* (P. canadensis Mx.)

trepida W. 7. P. foliis suborbiculatis acuminatis uncinato-dentatis ciliatis ad petiolum supra 2glandulosis utrinque glabris, junioribus sericeis, petiolis compressis, gemmis resinosis. *Amer. bor.* (P. tremuloides Mx.)

tremula 8. P. foliis subrotundo-ovatis obtusiusculis repando-dentatis basi eglandulosis utrinque glabris, junioribus pubescentibus, petiolis compressis. *Europ.*

nigra 9. P. foliis deltoideo-ovatis acuminatis glandulose-dentatis utrinque glabris, petiolis subcompressis, gemmis resinosis. *Europ.*

dilatata Ait. 10. P. foliis lato-deltoideis acuminatis undique basique crenulatis laevibus, petiolis compressis, ramis erectis. *Italia.* (P. italica du Roi, fastigiata Desf., pyramidata Mönch.)

monilifera Ait. 11. P. foliis subcordato-deltoideis acuminatis cartilagineo-uncinato-dentatis ciliatis, basi supra 2glandulosis utrinque glabris, petiolis compressis, ramis teretibus. *Amer. bor.* (P. glandulosa et carolinensis Mönch.)

betulifolia Pursh. 12. P. foliis rhomboideis acuminatis dentatis glabris, ramulis junioribus pilosis. *Ad lacus magnos Canadae.* (P. nigra et hudsonica Mx.)

†*grandidentata* Mx. 13. P. foliis subrotundo-ovatis acutis inaequaliter sinuato-dentatis glabris basi glandulosis, junioribus villosis, petiolis superne compressis. *Canada.*

†*marilandica* Bosc. 14. P. foliis amplis ovato-subrotundis membranaceis crenatis utrinque glabris, petiolis compressis, ramis striatis. *Marilandia.*

alba 15. P. foliis subrotundis angulato-dentatis subtus tomentosis. *Europ. Asia.* (P. nivea W. et canescens Sm., hybrida M. B.)

1491. GRUBBIA Berg.

rosmarinifolia Berg. *C. B. S.* Frutex ramosus, foliis oppositis linearibus revolutis subtus tomentosis, floribus axillaribus sessilibus albidis hirsutis. (Ophira stricta L.)

1492. LAGETTA Juss.

linearia Juss. *Ind. occid.* Arbor excelsa, libro textili, foliis alternis petiolatis subcordato-ovatis integerrimis glabris, floribus racemoso-paniculatis albis. (Daphne Lagetto Sw.)

DIGYNIA.

1493. SPALLANZANIA Pollin.

agrimonioides Pollin. *Italia.* Herba foliis interrupte pinnatis superioribus ternatis, floribus subsolitariis luteis. (Agrimonia agrimonoides L. Aremonia Neck. Amonia Nestl.)

1494. CODIA Forst.

montana Forst. *Nov. Caledon.* Frutex foliis ellipticis coriaceis glabris, pedunculis axillaribus hirsutis, floribus capitatis parvis hirsutis lana fulva involutis.

1495. WEINMANNIA.

glabra L. fil. 1. W. foliis impari-pinnatis 6jugis glabris, foliolis obovato-ellipticis serratis, petiolo communi alato articulato, articulis obovatis, ramis hirsutis, floribus fasciculatis racemosis. *Ind. occid.*

trichosperma Cav. 2. W. foliis impari-pinnatis 5jugis supra nitidis subtus ferrugineis, foliolis obovatis serratis, petiolo communi alato articulato, articulis 4angulis, ramis hirsutis, floribus racemosis. *Chili.*

hirta Sw. 3. W. foliis impari-pinnatis supra nitidis subtus villosis, foliolis obovatis crenatis, petiolo communi alato articulato, articulis subcordatis, ramis hirsutis, floribus verticillato-racemosis. *Jamaica.*

tomentosa L. fil. 4. W. foliis impari-pinnatis 6jugis subtus tomentosis, foliolis ovalibus integerrimis, petiolo communi alato articulato, articulis ovalibus, floribus spicato-racemosis. *Nov. Granat.*

trifoliata L. fil. 5. W. foliis ternatis glabris, foliolis ellipticis serrulatis nervosis, petiolo filiformi, floribus paniculatis. *Afric. austr.*

racemosa Forst. 6. W. foliis simplicibus obovato-ellipticis crenatis utrinque glabris venosis, racemis subgeminis simplicibus. *Nov. Zeland. Peru.* (W. ovata Cav.)

paniculata Cav. 7. W. foliis simplicibus lanceolatis serratis glabris subtus glaucis, floribus paniculatis. *Chili.*

parviflora Forſt. 8. W. foliis ſimplicibus oblongis acutis uncinato-dentatis glabris, racemis paniculatis hirſutis. *Inſ. ſociet.*

1496. MÖHRINGIA.

muſcoſa *Ad fontes Europ. med. et auſtr.* Plantula Arenariae forma, foliis linearibus oppoſitis, floribus pedunculatis ſolitariis albis.

1497. HERMESIA Humb.

caſtaneaefolia Humb. 1. H. foliis alternis lanceolatis mucronato-ſerratis utrinque glabris, floribus ſpicato-paniculatis. *Amer. auſtr.*

*bankſiaefolia** 2. H. foliis oppoſitis lanceolatis mucronato-ſerratis ſubtus tomentoſis, floribus capitatis. *Patria?*

1498. GALENIA.

linearis Thunb. 1. G. foliis linearibus, caule erecto. *Afric. auſtr.* (G. africana L.)

procumbens L. ſuppl. 2. G. foliis obovatis reflexis ſubcarnoſis, caule procumbente. *Afric. auſtr.*

1499. MARATHRUM Humb.

foeniculaceum Humb. *Nov. Granat.* Planta ſingularis, tuberibus ad rupes inundatas fixa, foliis decompoſitis linearibus ſetaceis ſerrulatis, pedunculis vaginatis, floribus ſpathaceis, antheris roſeis.

TRIGYNIA.

1500. CARDIOSPERMUM.

*** Glandulae hypogynae rotundatae abbreviatae.**

Halicacabum 1. C. foliis 2ternatis inciſo-dentatis caule fructibusque glabris. *India utraque.*

molle Kunth. 2. C. foliis 2ternatis inciſo-dentatis caule fructibusque pubeſcentibus *Ind. occid.* (C. microcarpon Kunth, pubeſcens Lag.)

***loxenſe* Kunth.** 3. C. foliis 2ternatis crenatis ſubtus ſericeo-canescentibus, ramis lanatis, capſulis pubeſcentibus. *Peru.*

Corindum 4. C. foliis 2ternatis ſubcordatis inciſis obtuſis ſubtus tomentoſis. *Braſil.*

**** Glandulae hypogynae lineares elongatae.**

***hirſutum* W.** 5. C. foliis 2ternatis inciſo-dentatis glabriusculis, ramis hirſutis. *Afric. occid. Amer. auſtr.* (C. hirſutum Kunth.)

grandiflorum Sw. 6. C. foliis 3ternatis incisis acuminatis subtus sericeo-tomentosis, capsulis acuminatis tomentosis. *Jamaica.*

elegans Kunth. 7. C. foliis 2ternatis inciso-serratis capsulisque subglobosis glabris. *Peru.*

calutenides Kunth. 8. C. foliis 2ternatis inciso-crenatis subtus pubescentibus, capsulis glabris. *Amer. austr.* (C. macrophyllum Kunth.)

1501. URVILLEA Kunth.

ulmacea Kunth. 1. U. foliis ternatis subtus pubescentibus, foliolis ovatis acuminatis serratis. *Amer. austr.* (Köllreutera triphylla Pers.)

Berteriana Cand. 2. U. foliis ternatis subtus glabriusculis, foliolis ovatis acuminatis irregulariter dentatis. *Amer. austr.* Bertero.

1502. SERIANA Plum.

*Foliis ternatis.

*Plumeriana** 1. S. foliolis oblongis obtusis repando-sinuatis ramisque glabris. *Ind. occid.* (Paullinia Seriana L.)

sinuata Schum. 2. S. foliolis oblongo-lanceolatis mucronato-dentatis basi attenuatis supra lucidis, ramis hirsutis. *Hispaniola.*

mollis Kunth. 3. S. foliolis ovatis crenatis sericeis, extremo 3lobo, fructibus hirlutis. *Peru.*

emarginata Kunth. 4. S. foliolis ovatis oblongis emarginatis subauriculatis, lateralibus apice obsolete crenatis, fructibus glabris. *Mexico.* (S. acapulcensis Kunth.)

**Foliis biternatis.

spectabilis Schum. 5. S. foliolis obovato-oblongis integerrimis utrinque glabris, extremo retuso, petiolis alatis, fructuum alis basi dilatatis. *Amer. austr.*

mexicana W. 6. S. foliolis obovatis subintegerrimis subemarginatis glabris, petiolis alatis, caule aculeato, racemis compositis. *Mexico.* (Paullinia L.)

lupulina Schum. 7. S. foliolis crenatis subtus ferrugineis, terminali rhombeo, lateralibus ovatis, petiolis subalatis, racemis simplicibus. *Amer. austr.*

*dubia** 8. S. foliolis obovato-oblongis lucidis mucronato-dentatis, petiolis subalatis, racemis compositis. *Portorico.*

divaricata Schum. 9. S. foliolis ovatis acutis integerrimis lucidis, petiolis nudis, paniculae ramis divaricatis. *Jamaica.* (Paullinia Sw.)

caracasana W. 10. S. foliolis oblongis lucidis remote dentatis, medio utrinque attenuato, lateralibus rotundatis, petiolis nudis, racemis paniculatis. *Cuba. Amer. austr.* (Paullinia Jacqu. Ser. glabrata Kunth. ossana et paucidentata Cand., lucida Schum.)

racemosa Schum. 11. S. foliolis ovatis acutis profunde serratis, petiolis subnudis, floribus racemosis. *Nov. Hispan.*

pubescens Kunth. 12. S. foliolis ovato-oblongis obtusis submucronatis subintegerrimis subtus pubescentibus, petiolis nudis, ramis villosis. *Amer. austr.*

paniculata Kunth. 13. S. foliolis oblongis acuminatis crenatis glabris, axillis venarum subtus barbatis, racemis paniculatis, fructibus apice pubescentibus. *Amer. austr.*

oxyphylla Kunth. 14. S. foliolis ovato-oblongis cuspidatis remote serratis glabris, medio 3fido, fructibus glabriusculis. *Peru.*

angustifolia W. 15. S. foliolis lineari-lanceolatis acutis integerrimis, petiolis alatis, racemis simplicibus. *Ind. occid.* (Paullinia mexicana Jacqu.)

*** *Foliis triternatis.*

triternata W. 16. S. foliolis ovato-oblongis obtusis repandis, petiolis submarginatis, racemis paniculatis. *Ind. occ.* (Paullinia 3ternata L., diversifolia Jacqu.)

**** *Foliis pinnatis.*

† *australis** 17. S. foliis impari-pinnatis 6jugis pilosis, petiolo interrupte alato. *Nov. Holl.* (Dodonaea pinnata Sm.)

parviflora Kunth. 18. S. foliis impari-pinnatis, foliolis 3jugis, lateralibus ternatis ovato-oblongis crenato-serratis mucronatis subtus pubescentibus. *Amer. austr.*

heterophylla Cand. 19. S. foliis inferioribus 2jugis, superioribus 2ternatis, foliolis ovatis subdentatis glabris, petiolis apice subalatis. *Amer. austr.* Bertero.

1503. PAULLINIA.

* *Foliis ternatis.*

Cururu 1. P. foliolis ovali-oblongis obtusis mucronato-dentatis, petiolo alato, fructibus pyriformibus mucronatis. *Ind. occid.*

riparia Kunth. 2. P. foliolis oblongis acutis grosse serratis nitidis, petiolo alato, fructibus pyriformibus. *Amer. austr.*

nitida Kunth. 3. P. foliolis oblongis acutis crenatis lucidis, petiolo nudo, fructibus pyriformibus. *Amer. austr.*

turbacensis Kunth. 4. P. foliolis oblongis acuminatis dentatis nitidis, petiolo nudo, fructibus pyriformibus villosissimis. *Nov. Granat.*

nodosa Jacqu. 5. P. foliolis ovatis subdentatis glabris, medio obovato, petiolo nudo, racemis nodosis. *Inf. Antill.*

densiflora Sm. 6. P. foliolis ovatis subserratis, petiolis alatis, ramis triangulis, floribus thyrsoideis axillaribus. *Nov. Granat.*

** *Foliis biternatis.*

velutina Berter. 7. P. foliolis lanceolatis utrinque attenuatis dentatis capsulisque alatis tomentosis, petiolo nudo. *Nov. Granat.*

barbadensis Jacqu. 8. P. foliolis ovalibus subintegerrimis coriaceis, petiolo submarginato, capsulis ovatis villosiusculis. *Inf. Carib.*

curaſſavica 9. P. foliolis oblongis obtuſis repando-dentatis, medio baſi attenuato, petiolo marginato, capſulis ſubrotundo-ovalibus. *Ind. occid.*

carthagenenſis Jacqu. 10. P. foliolis obovato-oblongis crenatis nitidis, petiolo ſuperne marginato, ramis inermibus ſulcatis glabris. *Ind. occid.* (P. 3ternata Kunth.)

caribaea Jacqu. 11. P. foliolis obovato-oblongis apice dentatis, petiolis marginatis, ramis aculeatis. *Inſ. Carib. Amer. auſtr.*

pubeſcens Kunth. 12. P. foliolis ovato-oblongis acutis dentatis ſubtus villoſo-tomentoſis, petiolis ſubmarginatis. *Amer. auſtr.* (P. mollis Kunth.?)

*** *Foliis pinnatis.*

capanifolia Rich. 13. P. foliis bijugis glaberrimis, foliolis ſeſſilibus ovato-oblongis remote crenatis, petiolo ſuperne marginato. *Guiana.*

connarifolia Rich. 14. P. foliis bijugis glabris coriaceis ſubtus ferrugineis, foliolis ſeſſilibus ovatis mucronatis ſubintegerrimis, petiolo nudo, pedunculis ecirrhoſis. *Guiana.* (P. rufeſcens Rich.)

fibulata Rich. 15. P. foliis bijugis ſubcoriaceis ſubtus ferrugineo-tomentoſis, foliolis ſubpetiolatis ovatis denticulatis, pedunculi cirrhis incraſſatis fibuliformibus. *Guiana.*

pinnata 16. P. foliis bijugis glabris, foliolis oblongis elongatis remote dentatis, petiolis marginatis, capſulis pyriformibus ſub-3cornibus. *Ind. occid. Braſil. Afric. aequinoct.* (P. macrophylla Kunth.)

Veſpertilio Sw. 17. P. foliis bijugis nitidis glabris, foliolis oblongis acutis remote dentatis, petiolis nudis, capſulis alatis. *Inſ. Carib.*

tetragona Aubl. 18. P. foliis ſub-2jugis integerrimis, petiolis nudis, capſulis ſubalatis, caule 4gono. *Guiana.*

acutangula Perſ. 19. P. foliis 2jugis, foliolis ovato-oblongis acuminatis dentato-ſerratis, capſulis obovatis triangulo-alatis. *Peru.* (Semarillaria R. et P.)

obovata Perſ. 20. P. foliis 2jugis, foliolis lanceolatis ſerratis, capſulis obovatis. *Peru.* (Semarillaria R. et P.)

tomentoſa Jacqu. 21. P. foliis 2jugis capſulisque obovatis tomentoſis, foliolis ovato-rhombeis repandis obtuſis, petiolo marginato. *Ind. occid.*

ſenegalenſis Juſſ. 22. P. foliis 2jugis, foliolis ſeſſilibus ovatis remote crenatis, petiolis marginatis, caule angulato ſubtomentoſo, capſulis ovatis 3gonis. *Senegambia.*

Cupana Kunth. 23. P. foliis 2jugis glabris, foliolis ovato-oblongis acuminatis crenato-ſerratis coriaceis, capſulis ovatis acutis. *Ad Orinocum.*

ſphaerocarpa Rich. 24. P. foliis 2jugis glabris, foliolis ſubſeſſilibus ovatis remote crenatis obtuſiusculis, capſulis globoſis laevibus. *Guinea.*

ſubrotunda Perſ. 25. P. foliis 2jugis, foliolis oblongis apice ſerratis, capſulis ſubrotundis. *Peru.* (Semarillaria R. et P.)

pteropoda Cand. 26. P. foliis 2jugis villoſis, foliolis ovatis dentatis, petiolis marginatis, capſulis ſubglobboſis 3ſulcis. *Mexico.*

meliaefolia Juſſ. 27. P. foliis 3jugis ſubtus pubeſcentibus, foliolis ſubſeſſilibus lanceolatis remote dentatis, capſulis pyriformibus apice 3alatis. *Braſil.*

ingaefolia Rich. 28. P. foliis 3jugis coriaceis glabris, petiolo apice marginato, ramis ſtriatis ſcabris. *Guiana.*

**** *Foliis bipinnatis aut ſupradecompoſitis.*

japonica Thunb. 29. P. foliis 2pinnatis, foliolis ovatis ternatis inciſis, petiolis marginatis, floribus paniculatis, caule herbaceo. *Japon.*

cauliflora Jacqu. 30. P. foliis 2pinnatis, foliolis ternatis, petiolis ſuperne marginatis, floribus corymboſo-capitatis. *Amer. auſtr.*

bipinnata Poir. 31. P. foliis 2pinnatis, foliolis ſubſeſſilibus ovatis apice ſubcrenatis, petiolis nudis ramisque ſubtomentoſis, capſulis alatis. *Braſil.*

hiſpida Jacqu. 32. P. foliis inferioribus 2pinnatis, foliolis lanceolatis acuminatis ſubſerratis, ramis angulatis hiſpidis, ſtipulis ovatis ciliatis, racemis aggregatis. *Amer. auſtr.*

thalictrifolia Juſſ. 33. P. foliis ſub-3pinnatis, petiolis divaricatis ſubmarginatis, foliolis minutis ovato-ſubrotundis angulatis, capſulis alatis. *Hiſpaniola. Braſil.*

polyphylla Schum. 34. P. foliis ſupradecompoſitis ſubtus villoſis, foliolis ovato-cuneatis apice crenatis, capſularum valvis obovatis. *Ind. occid.*

1504. SAPINDUS.

* *Petiolo communi alato.*

Saponaria 1. S. petiolo late alato, foliis 3jugis lanceolatis acuminatis. *Inſ. Carib. Amer. auſtr.*

marginatus W. 2. S. petiolo ſuperne anguſte marginato, foliis 6jugis lanceolatis. *Georgia.* (S. Saponaria Mx.)

Forſythii Cand. 3. S. petiolo anguſte marginato, foliis 4jugis oblongis utrinque attenuatis coriaceis. *Inſ. Carib.*

ſenopterus Cand. 4. S. petiolo anguſte marginato, foliis 4jugis lanceolatis acuminatis, panicula ramoſiſſima. *Hiſpaniola.*

** *Petiolo communi nudo.*

rigidus Ait. 5. S. foliis 3jugis ovato-oblongis acuminatis. *Ind. occid.*

inaequalis Cand. 6. S. foliis 4jugis inaequilateris ovato-oblongis acutis coriaceis nitidis, paniculae ramis divaricatis. *Guadalupa.* Bertero.

laurifolius Vahl. 7. S. foliis 3jugis ovato-oblongis acuminatis glabris, panicula laxa, petalis margine tomentoſis. *Madagaſcaria.*

arboreſcens Aubl. 8. S. foliis 3jugis oblongis acutiuſculis venoſis, racemis axillaribus ſubſimplicibus. *Guiana. Afric. occid.* (S. ſenegalenſis Poir.)

tetraphyllus Vahl. 9. S. foliis bijugis oblongo-lanceolatis glabris, racemis ſubſimplicibus, petalis glabris. *Ind. or.*

falcifolius Cand. 10. S. foliis 2jugis lineari-lanceolatis acuminatis glabris, racemis compositis, petalis intus barbatis. *Inf. Timor.*

angulatus Poir. 11. S. foliis 3jugis late ovatis obtusis coriaceis lucidis subtus pubescentibus, fructibus dorso angulato-carinatis. *Patria?*

longifolius Vahl. 12. S. foliis 5jugis lanceolatis glabris, racemis paniculatis, floribus extus tomentosis. *Ind. or.*

emarginatus Vahl. 13. S. foliis sub-3jugis oblongis emarginatis subtus villosis, paniculis ramosissimis pubescentibus, petalis margine tomentosis. *Ind. or.*

rubiginosus Roxb. 14. S. foliis 4jugis oblongo-lanceolatis acutis subtus villosis, paniculis terminalibus, petalis glabris. *Ind. or. Inf. Molucc.* (S. fraxinifolius Cand.)

frutescens Aubl. 15. S. foliis 7jugis oblongo-lanceolatis acuminatis glabris, racemis axillaribus. *Guiana.* (S. surinamensis Poir.)

Mukarossi Gärtn. *Rarak* Cand. 16. S. foliis 6jugis ovato-lanceolatis membranaceis, fructibus globosis. *Japon.*

17. S. foliis 10jugis oblongis subfalcatis acutis membranaceis glaberrimis, floribus paniculatis glabris. *Inf. Molucc. Cochinchina.*

† *abruptus*, 18. S. foliis abrupte pinnatis lanceolatis integerrimis glabris, floribus racemosis. *China austr.*

1505. PONAEA Schreb.

saponarioides W. *Guiana.* Arbor foliis abrupte pinnatis 8jugis inaequilateris oblongis, floribus spicato-paniculatis albidis. (Toulicia guianensis Aubl.)

1506. TRAGOPYRUM M. B.

pungens M. B. 1. Tr. ramis rigidis subspinescentibus, foliis subspathulatis mucronatis, vaginis subulatis internodio brevioribus, stylis basi coalitis. *Sibir.*

lanceolatum M. B. 2. Tr. ramis divaricatis, foliis lanceolatis utrinque attenuatis, vaginis subulatis internodio brevioribus, stylis distinctis. *Sibir.* (Polygonum frutescens L.)

glaucum * 3. Tr. ramis erectis strictis, foliis lanceolatis utrinque attenuatis glaucis, vaginis subulatis. *Sibir.*

grandiflorum M. B. 4. Tr. foliis ovato-oblongis acutis margine revolutis, vaginis lanceolatis internodia aequantibus, floribus maximis. *Armenia.* (Polygonum grandiflorum W.)

luxifolium M. B. 5. Tr. foliis subrotundis mucronatis undulato-crispis, vaginis subulatis internodio brevioribus. *Caucas. Sibir.* (Polygonum frutescens Güldenst., crispulum Sims., caucasicum Hofm.)

polygamum * 6. Tr. foliis spathulato-linearibus, vaginis lanceolatis internodio brevioribus, racemis filiformibus ramosis, floribus polygamis, stylis distinctis. *Carolina.* (Polygonum polygamum Vent., parvifolium Nutt.)

1507. PEDICELLIA Lour.

oppoſitifolia Lour. *Cochinchina.* Arbor foliis lanceolatis oppoſitis integerrimis, floribus racemoſis pallidis.

1508. BRÜNNICHIA Banks.

cirrhoſa Gärtn. *Georgia. Inſ. Baham.* Frutex ſcandens, foliis cordatis acutis, floribus racemoſis ſecundis. (Rajania ovata Walt.)

1509. COCCOLOBA.

* *Foliis coriaceis.*

uviſera 1. C. foliis ſuborbiculatis obtuſiſſimis nitidis, racemis ſpicatis elongatis fructiferis nutantibus. *Ind. occid. Amer. auſtr.*

pubeſcens 2. C. foliis ampliſſimis cordato-ſubrotundis ſubſeſſilibus venoſis ruguloſis utrinque hirſutiuſculis. *Ind. occid.*

excoriata 3. C. foliis cordato-oblongis acutiuſculis glabris, racemis ſpicatis elongatis, ramis ſubexcoriatis. *Ind. occid.*

nivea Jacqu. 4. C. foliis ovato-oblongis utrinque attenuatis ſupra nitidis glabris, racemis ſpicatis erectiuſculis. *Ind. occid.* (C. nitida Kunth.)

punctata 5. C. foliis ovato-oblongis acuminatis elongatis nitidis, ſpicis abbreviatis erectis, fructibus calyce coronatis. *Ind. occid.* (C. coronata Jacqu.)

diverſifolia Jacqu. 6. C. foliis adultioribus ſubcordato-ovatis, junioribus ovato-oblongis integerrimis nitidis, racemis erectis. *Hiſpaniola*

flaveſcens Jacqu. 7. C. foliis cordato-oblongis obtuſis mucronatis, racemis erectis. *Hiſpaniola.*

obtuſifolia Jacqu. 8. C. foliis elliptico-oblongis obtuſis, racemis erectis, fructibus pendulis. *Amer. auſtr.* (C. gracilis Kunth.)

microſtachya W. 9. C. foliis ovatis obtuſis inaequilateris glaberrimis, racemis abbreviatis nutantibus. *Ind. occid.* (C. parvifolia Poir.)

obovata Kunth. 10. C. foliis ſubcordato-obovatis acutis nitidis, racemis erectis fructiferis nutantibus. *Amer. auſtr.* (C. nutans Kunth.)

barbadenſis Jacqu. 11. C. foliis ſubrotundo-ellipticis emarginatis undulatis glaberrimis, racemis erectis elongatis. *Ins. Carib. Amer. auſtr.*

emarginata Jacqu. 12. C. foliis ſubrotundis exciſo-emarginatis. *Amer. auſtr.*

*braſilienſis** 13. C. foliis oblongis utrinque attenuatis obtuſe serrulatis, vaginis truncatis approximatis, racemis erectis compoſitis. *Braſil.* Sello.

** *Foliis membranaceis.*

latifolia Lam. 14. C. foliis latiſſimis ſubrotundo-ovalibus baſi attenuatis venoſis. *Amer. auſtr.*

acuminata Kunth. 15. C. foliis oblongo-lanceolatis acuminatis, venis subtus petiolisque pubescentibus, racemis pendulis. *Nov. Granat.*

tenuifolia 16. C. foliis subrotundis utrinque subattenuatis, racemis erectis, fructibus 3gonis. *Jamaica.*

sagittifolia Ort. 17. C. foliis subsagittatis ovato-oblongis, racemis axillaribus. *Peru. Brasil.* (C. sagittata Poir. Polygonum acetosaefolium Vent.)

1510. POLYGONUM.

**Floribus octandris.*

† *trigynis.*

α. *Floribus spicatis.*

Bistorta 1. P. caule simpliciſſimo monostachyo, foliis ovato-oblongis undulatis in petiolum decurrentibus. *Europae, Asiae med.* et *Amer. bor. prata.* (P. bistortoides Pursh.)

ellipticum W. herb. 2. P. caule simpliciſſimo 1stachyo, foliis spathulato-ellipticis subtus hirsutiusculis, inferioribus longe petiolatis, summis amplexicaulibus, stipulis laxis truncatis. *Ad fl. Lenam in Sibir. or.* Pall.

viviparum 3. P. caule simpliciſſimo 1stachyo, foliis lanceolatis. *Europ.* et *Asiae med. alpes.*

setaceum Baldw. 4. P. caule erecto polystachyo, spicis geminis interruptis hirsutis, foliis lanceolatis, vaginis ciliatis. *Georgia.*

hirsutum Walt. 5. P. caule suberecto ramoso rufo-hirto, foliis lanceolatis hirsutis, spicis filiformibus continuis. *Carolina austr.*

Loureirii Poir. 6. P. caule 4gono simplici, foliis ovato-lanceolatis glabris, spicis breviſſimis. *China austr.* (P. ciliatum Lour.)

odoratum Lour. 7. P. caule basi repente, foliis lanceolatis glabris, spicis elongatis strictis. *Cochinchina.*

acre Kunth. 8. P. caule suffruticoso ramoso, foliis lanceolatis ciliatis, spicis filiformibus. *Amer. austr.*

β. *Floribus racemosis.*

mite Pers. 9. P. caule foliato erecto, foliis lanceolatis elongatis, stipulis ciliatis, racemis paniculatis erectis terminalibus. *Amer. bor.* (P. hydropiperoides Mx. barbatum Walt.)

tenuiflorum Presl. 10 P. caule glabro erecto, stipulis truncatis integerrimis, foliis lanceolatis maculatis glabris margine scabris, petiolis asperis, racemis ramosis elongatis, pedunculis laevibus. *Sicil. Ind. or.* (P. nutans Roxb. in W. herb.)

punctatum Ell. 11. P. caule erecto ramoso, foliis lanceolatis pellucido-punctatis, stipulis ciliatis, floribus fasciculato-racemosis. *Amer. bor.*

tenerum * 12. P caule ramoſo, foliis ſpathulatis glaucis, racemis filiformibus, pedicellis nutantibus. *Georgia.* (P. gracile Baldw.)

ſericeum Pall. 13. P. caule decumbente, foliis ovato-ellipticis ſupra villoſis ſubtus incano-ſericeis, ſtipulis acutis fiſſis, racemis laxis. *Sibir.*

ſcandens 14. P. caule herbaceo ſcandente, foliis cordato-ſagittatis acuminatis laevibus, racemis axillaribus, fructu alato. *Amer. bor.*

Fagopyrum 15. P. caule herbaceo erecto, foliis cordato-ſagittatis, fructibus 3quetris. *Japon. Sibir.*

emarginatum Roth. 16. P. caule herbaceo erecto, foliis cordato-ſagittatis, fructibus apice emarginatis 3quetris, angulis cartilagineis. *China.*

tataricum 17. P. caule herbaceo erecto, foliis cordato-haſtatis, fructibus oblongis 3quetris, angulis dentatis. *Tatar.*

Convolvulus 18. P. caule herbaceo volubili angulato, foliis cordato-ſagittatis, laciniis calycinis obtuſe carinatis. *Europ. Aſia. Amer. bor.*

dumetorum 19. P. caule herbaceo volubili laevi, foliis cordatis acuminatis, floribus carinato-alatis. *Europ. Aſia.*

ciliinode Mx. 20. P. caule herbaceo ſcandente pubeſcente, ſtipulis baſi ciliatis, foliis cordatis, fructibus apteris. *Canada.*

corymboſum W. 21. P. foliis oblongo-lanceolatis ſubſeſſilibus, ſtipulis minutis ciliatis, pedunculis glanduloſo-piloſis corymboſis. *Java.*

appreſſum Labill. 22. P. foliis ſubcordato-ſubrotundis acutiuſculis crenulatis, racemis axillaribus ſpicatis ſimplicibus. *Nov. Holl. Terra Diemen.*

γ. Floribus glomeratis.

ſagittatum 23. P. caule herbaceo retrorſum aculeato ſcandente, foliis ſagittatis, ſtipulis integerrimis lanceolatis, floribus glomeratis pedunculatis. *Amer. boreal. Sibir. Japon.*

chinenſe 24. P. caule angulato flexuoſo, foliis late ovato-oblongis acutis, ſtipulis lanceolatis, floribus racemoſo-faſciculatis. *Ins. or. China. Japon.*

brachiatum Lam. 25. P. caule flexuoſo ſuperne ſcabro, foliis baſi truncatis ovatis acutis, ſtipulis lanceolatis laceris, pedunculis aculeatis, glomerulis paniculatis. *Monte Video. Ind. or.*

δ. Floribus paniculatis.

multiflorum Thunb. 26. P. radice tuberoſa, caule angulato volubili, foliis cordatis acuminatis, panicula patentiſſima. *Japon.*

tammifolium Humb. 27. P. caule fruticoſo volubili, foliis cordato-ovatis acutis glabris, ſtipulis truncatis glabris, pani-

culis axillaribus patulis. *Noo. Granat. Nov. Zeeland.* (Coccoloba auſtralis Forſt.)

elegans Tenor. 28. P. caule ſuffruticoſo flexuoſo, foliis oblongo-lanceolatis, ſtipulis ciliatis, floribus ſpicato-paniculatis. *Neapol.*

alpinum All. 29. P. caule ramoſo erecto, foliis ovato-lanceolatis glabris ciliatis, floribus racemoſo-paniculatis. *Italia. Helvetia.*

undulatum Murr. 30. P. caule ramoſo baſi pubeſcente, foliis lanceolatis undulatis ſupra ſcabris ſubtus piloſis, floribus racemoſo-paniculatis. *Sibir.* (P. ciliatum W. herb. acidum Pall.)

diffuſum Pall. in W. herb. 31. P. caule diffuſe ramoſo hirſuto, foliis ovato-lanceolatis hiſpidis, ſtipulis truncatis laxis, floribus imbricato-paniculatis. *Sibir.*

divaricatum 32. P. caule ramoſiſſimo glabro, ramis divaricatis, foliis lanceolatis laevibus, floribus racemoſo-paniculatis. *Sibir.*

ſalignum W. 33. P. caule ramoſo, foliis lineari-lanceolatis acuminatis ſtipulisque ciliatis, floribus racemoſo-paniculatis. *Sibir.*

acidulum W. 34. P. caule ramoſo, ramis divaricatis, foliis linearibus elongatis margine ſtipulisque glaberrimis, floribus racemoſo-paniculatis. *Sibir.*

articulatum 35. P. caule herbaceo erecto, foliis linearibus anguſtiſſimis, ſtipulis truncatis integerrimis, paniculae ramis articulatis. *Amer. bor.*

huſtatum Murr. 36. P. caule decumbente herbaceo, foliis oblongo-lanceolatis craſſiusculis ſubhaſtatis glabris, ſtipulis abbreviatis truncatis, floribus glomerato-paniculatis terminalibus. *Sibir.* (P. craſſifolium W. rumicifolium Pall. in W. herb.)

coarctatum W. herb. 37. P. caule erecto foliisque oblongo-lanceolatis glaberrimis, ſtipulis truncatis laxiusculis, panicula coarctata. *Sibir. orient.*

ε. *Floribus axillaribus.*

aviculare 38. P. caule procumbente herbaceo, foliis lanceolatis margine ſcabris, ſtipulis paucinerviis. *Europ. Aſia. Amer. bor.*

Dryandri * 39. P. caule proſtrato, foliis eveniis. *Ind. or.* (P. elegans Dryand.)

arenarium Kit. 40. P. caule herbaceo angulato aſcendente diffuſo, foliis lineari-lanceolatis, ſtipulis laceris. *Hungaria.*

flagellare Bertol. Sebaſt. 41. P. caule ſuffruticoſo proſtrato, foliis lanceolato-linearibus, ſtipulis laceris, pedunculis flore longioribus. *Italia. Sicilia.* (P. litorale Link.)

Bellardi All. 42. P. caule herbaceo erecto ramoſo, foliis lanceolatis acutis, ſtipulis fiſſis laceris, floribus ſubſeſſilibus ſolitariis. *Italia. Tauria.* (P. patulum MB. geniculatum Poir.)

maritimum 43. P. caule ſuffruticoſo aſcendente, foliis ellipticis ſubcarnoſis margine revolutis glaucis, ſtipulis fiſſis elongatis. *Europ. auſtr. Amer. bor.* (P. glaucum Nutt.)

lacerum Kunth. 44. P. caule ſuffruticoſo erectiusculo, foliis lanceolatis, ſtipulis elongatis integris lacerisque, floribus pedunculatis. *Peru. Monte Video.* (P. miſerum W. herb.)

acetoſum MB. 45. P. caule procumbente ramoſo, foliis oblongo-lanceolatis glaucis, ſtipulis abbreviatis fiſſis ſubdentatis. *Deſerta maris caſpii.*

affine Steph. in W. herb. 46. P. caule erecto ramoſo baſi fruticoſo, foliis obovatis mucronatis, ſtipulis laxis membranaceis laceris. *Sibir.*

erectum 47. P. caule erecto ſimpliciusculo glabro, foliis ovali-oblongis petiolatis laevibus, ſtipulis laceris. *Amer. bor.*

tenue Mx. 48. P. caule herbaceo gracili erecto ramoſo, foliis linearibus acuminatis ſtrictis, ſtipulis tubuloſis ciliatis, floribus alternis ſubſolitariis. *Amer. bor.* (P. linifolium Mühl.)

Laxmanni Lepech. 49. P. caule herbaceo erectiusculo ramoſiſſimo, ramis patentibus, foliis lineari-lanceolatis ſtrigoſis, ſtipulis late-ovatis villoſiusculis, floribus pedunculatis aggregatis. *Sibir.* (P. davuricum W. herb.)

ſetoſum Jacq. 50. P. caule ſuffruticoſo erecto, foliis linearibus ſubulatis, ſtipulis ciliatis, floribus ſubſolitariis. *Aſia minor.*

herniarioides Delil. 51. P. caule ſuffruticoſo erecto, foliis ſpathulatis abbreviatis, ſtipulis ciliato-villoſis, floribus pedunculatis ſubaggregatis. *Aegypt.*

†† *Floribus octandris digynis.*

penſylvanicum 52. P. caule herbaceo erecto, foliis oblongo-lanceolatis acuminatis margine ſcabris, pedunculis glanduloſo-hiſpidis, floribus racemoſo-ſpicatis. *Amer. bor.*

acuminatum Kunth. 53. P. caule erecto herbaceo, foliis lanceolatis longiſſime acuminatis ſtrigoſis, ſtipulis ciliato-villoſis, floribus faſciculato-ſpicatis, bracteis longiſſime ciliatis. *Amer. auſtr.* (P. cuſpidatum W. herb.)

ſerrulatum * 54. P. caule erecto herbaceo, foliis lanceolatis acuminatis aculeato-ſerrulatis, ſtipulis approximatis ſubmuticis, racemis ſpicatis filiformibus. *Ind. or. Inſ. Molucc. Madagascar.* (P. ſerratum Poir.)

ſcabrum Poir. 55. P. caule elato glabro, ramis patentibus, foliis lanceolatis margine ſcabris, ſtipulis longe barbatis, floribus racemoſo-ſpicatis. *Afric. bor.* (P. ſerratum L.?)

attenuatum R. Br. 56. P. foliis lanceolatis utrinque attenuatis elongatis pubeſcentibus, ſtipulis ciliatis petiolos aequantibus, ſpicis cylindricis ſtrictis. *Nov. Holl.*

† *glandulosum* Poir. 57. P. foliis lanceolatis glabris margine ſcabris, ſtipulis campanulatis ciliatis, floribus ſubracemoſis axillaribus terminalibusque, calycibus glanduloſis. *Ad Fulgerias in Armorica.*

** *Floribus heptandris digynis.*

orientale 58. P. caule herbaceo hirſuto, foliis ovatis acuminatis ciliatis, ſtipulis ſubcampanulatis villoſis, floribus racemoſo-ſpicatis. *Aſia media. Amer. bor. Nov. Holl.*

ſegetum Humb. 59. P. caule procumbente herbaceo, ramulis glanduloſis, foliis lanceolatis acuminatis glabris, ſtipulis truncatis ſtriatis, floribus racemoſo-ſpicatis. *Nov. Granat.*

*** *Floribus hexandris.*

† *trigynis.*

barbatum 60. P. caule erecto herbaceo rufo, foliis lanceolatis ſubſeſſilibus ſupra ſcabris, ſtipulis longiſſime ciliato-ſetoſis appreſſis, racemis ſpicatis terminalibus. *China. Japon.*

tomentoſum W. 61. P. foliis ovato-oblongis acuminatis utrinque villoſo-tomentoſis, ſtipulis truncatis hiſpidis ciliato-ſetoſis, ſpicis virgatis. *Ceylon.*

tinctorium Lour. Ait. 62. P. foliis ovatis acutiusculis oleraceis glabris, ſtipulis truncatis arctis ciliatis, ſpicis virgatis. *China auſtr.*

decipiens R. Br. 63. P. foliis lanceolatis acuminatis laevibus, ſtipulis ciliatis, ſpicis ſubfiliformibus. *Nov. Holl.*

floribundum Schlechtend. in W. herb. 64. P. caule erecto ramoſo, ramis ſtriatis, foliis oblongis acutis glaberrimis, ſtipulis laceris, racemis ſpicatis faſtigiatis. *Sibir.* Pallas.

†† *Floribus hexandris digynis.*

Perſicaria 65. P. foliis lanceolatis ſubmaculatis, ſtipulis ciliatis, pedunculis laevibus, racemis ſpicatis oblongis erectis. *Europ. Aſia. Amer. bor.* (P. incanum Schmidt. var. foliis ſubtus pubeſcentibus. P. nodoſum Perſ. alia varietas, ſpica ſubramoſa.)

lapathifolium 66. P. foliis oblongo-lanceolatis ſcabris, ſtipulis truncatis, pedunculis aſperis, racemis ſpicatis oblongis erectis. *Europ.* (P. penſylvanicum Curt.)

perſicarioides Kunth. 67. P. caule erectiusculo glabro, foliis lanceolatis ſupra ſcabris, ſtipulis piloſiusculis ſtriatis ciliatis, racemis gracilibus, pedunculis glabris, pedicellis aggregatis. *Mexico.*

Hydropiper 68. P. foliis lanceolatis undulatis glabris, ſtipulis ſubciliatis, ſpicis gracilibus laxis nutantibus. *Europ.*

ſalicifolium Brouſſ. Delil. 69. P. ramis patentibus, foliis lineari-lanceolatis elongatis glabris, ſtipulis ciliatis, racemis gracilibus erectis, floribus diſtantibus. *Inſ. Canar. Aegypt.*

glabrum W. 70. P. foliis lanceolatis acuminatis canleque glaberrimis, ſtipulis truncatis integerrimis, ſpicis aggregatis virgatis, bracteis truncatis flores ſubimbricatos ſuperantibus. *Ind. or.*

minus Hudſ. 71. P. caule baſi repente, foliis lineari-lanceolatis ſubeveniis, ſtipulis ciliatis, ſpicis filiformibus erectiusculis. *Europ.* (P. ſtrictum All. angustifolium Roth.)

anguſtifolium Poir. 72. P. caule glabro, ramis divaricatis, foliis linearibus anguſtiſſimis, ſtipulis breviſſimis integerrimis, racemis axillaribus paucifloris. *Patria?*

equiſetiforme Sm. 73. P. caule ſuffruticoſo aſcendente, foliis oblongo-lanceolatis rigidiusculis glabris, ſtipulis ſtriatis lacero-capillaribus, racemis ſpicatis terminalibus elongatis, bracteis albidis villoſis. *Creta. Aegypt.*

incarnatum Ell. 74. P. caule herbaceo geniculato ſuperne glanduloſo, foliis lanceolatis ſupra pubeſcentibus, ſtipulis glabris, floribus faſciculato-paniculatis glanduloſis, pedunculis punctatis. *Carolina auſtr.*

arifolium 75. P. caule retrorſum aculeato angulato ſcandente, foliis haſtatis acuminatis ſcabris, ſtipulis ciliatis, floribus ſubracemoſis terminalibus glabris, pedunculis glanduloſo-hiſpidis. *Amer. bor. Japon. Nov. Holland. Terra Diemen.* (P. ſtrigoſum R. Br.)

auſtrale * 76. P. caule glabro, foliis lanceolatis acuminatis elongatis pubeſcentibus, ſtipulis glabris ciliatis, floribus ſpicatis, pedunculis piloſis. *Nov. Holl.* (P. articulatum R. Br. auſtrale Perſ.?)

adenophorum * 77. P. foliis lanceolatis acuminatis elongatis ſubtus glanduloſis margine ſcabris, ſtipulis truncatis, ſpicis alternis cylindricis, pedunculis glabris. *Nov. Holl.* (P. glanduloſum R. Br.)

elatius R. Br. 78. P. caule ſcabriusculo, foliis oblongo-lanceolatis acuminatis in petiolum decurrentibus, ſtipulis ciliatis, ſpicis alternis cylindricis, pedunculis bracteisque glanduloſo-pubeſcentibus. *Nov. Holl.*

lanigerum R. Br. 79. P. foliis lanceolatis acuminatis lanatis, ſtipulis truncatis, ſpicis cylindricis alternis. *Nov. Holl.*

arcticum Pall. in W. herb. 80. P. caule baſi radicante erecto ramoſo herbaceo, foliis lanceolato-oblongis baſi attenuatis obtuſiusculis glaberrimis, ſtipulis abbreviatis laceris, racemis terminalibus, floribus polygamis. *mare glaciale in Sibir.*

****** *Floribus pentandris*,**

† *trigynis.*

ocreatum 81. P. foliis linearibus margine revolutis flaccidis piloſiusculis, ſtipulis amplis laxis truncatis, caule ramisque baſi villoſis, ſpicis confertis ſubracemoſis. *Sibir.*

plebejum R. Br. 82. P. caule diffuſo, foliis linearibus ſubſeſſilibus, ſtipulis fiſſo-ciliatis, floribus axillaribus ſubgeminis. *Nov. Holl.*

†† *Floribus pentandris digynis.*

virginianum 83. P. foliis amplis ovatis venoſis acutis ciliatis, racemis elongatis filiformibus, floribus diſtantibus. *Amer. bor.*

amphibium 84. P. foliis oblongis glabris, ſpica oblonga. *Europ. Aſia.* (Varietas terreſtris folia habet acuminata piloſiuscula.)

coccineum Mühlb. W. 85. P. foliis ovato-oblongis ſtipulisque truncatis glabris, racemo ſpicato ſtricto, pedunculo hiſpidiusculo. *Amer. bor.* (Varietas terreſtris habet folia acuminata.)

perfoliatum 86. P. caule retrorſum aculeato, foliis ſangulari-ſagittatis ſubpeltatis, bracteis orbiculatis perfoliatis horizontalibus, floribus racemoſis. *Ind. or. Japon.*

hiſpidum Kunth. 87. P. caule erectiusculo hirto, foliis ovato-oblongis acuminatis ſtipulisque glutinoſo-hiſpidis, floribus racemoſo-ſpicatis. *Nov. Granat.* (P. hirtum W. herb.)

† *viridiflorum* Poir. 88. P. foliis lineari-lanceolatis elongatis glabris, ſtipulis ovato-ſubulatis, floribus racemoſis pendulis ſubbulbiferis. *Amer.?*

proſtratum R. Br. 89. P. caule proſtrato piloſo, foliis lanceolatis margine ſcabris, ſtipulis ciliatis, ſpicis axillaribus pedunculatis. *Nov. Holl. Terra Diemen.*

ſubſeſſile R. Br. 90. P. foliis lanceolatis elongatis pubeſcentibus ſubſeſſilibus, ſtipulis ſtrigoſo-ciliatis, ſpicis cylindricis pedunculatis. *Nov. Holl. Terra Diemen.*

filiforme Thb. 91. P. caule erecto ſtrigoſo, foliis ovatis petiolatis villoſis, ſtipulis truncatis ciliatis, ſpicis filiformibus elongatis. *Japon.*

ſubfuscineum M. B. 92. P. caule erecto ramoſiſſimo, foliis lineari-ſubulatis, ſtipulis ciliatis, floribus axillaribus. *Ad Volgam. Caucaſ.*

******* *Floribus tetrandris.***

gracile R. Br. 93. P. caule erecto, foliis lanceolatis acuminatis glabris margine ſcabris pellucido-punctatis, ſtipulis ciliatis, ſpica filiformi rara nutante, floribus glandulosis. *Nov. Holl.*

****** *Floribus triandris.*

ramosissimum Mx. 94. P. caule erecto ramosissimo, foliis lanceolatis, stipulis laceris, floribus axillaribus aggregatis. *Amer. bor.*

TETRAGYNIA.

1511. VEREA Andr.

alternans * 1. V. foliis orbiculato-spathulatis integerrimis carnosis, paniculae ramis alternis. *Arabia. C.B.S.* (Cotyledon orbiculata Forsk., alternans Vahl.)

nudicaulis * 2. V. foliis spathulato-ovatis subcrenatis, paniculae dichotomae ramis oppositis. *Aegypt. China?* (Cotyledon L. Calanchoë aegyptiaca et spathulata Cand.)

acutiflora Andr. 3. V. foliis lato-lanceolatis crenatis, floribus paniculatis, laciniis corollae acutis. *Ind. or.*

crenata Andr. 4. V. foliis obovatis duplicato-crenatis, floribus cymoso-paniculatis. *Afric. occid.* (Calanchoë crenata Cand. Cotyledon Ait.)

lanceolata * 5. V. foliis lanceolatis apice serratis, floribus paniculatis villosis. *Arabia.* (Cotyledon Forsk. Vahl.)

laciniata W. 6. V. foliis 3partitis, laciniis lanceolatis dentatis, superioribus pinnatifidis integrisque linearibus, floribus cymosis. *Ind. or.* (Cotyledon L. Calanchoë Cand.)

pinnata * 7. V. foliis quinato-pinnatis, foliolis obovatis crenatis, crenis filamentoso-barbatis, floribus paniculatis pendulis. *Inf. Mascaren.* (Cotyledon Lam. Bryophyllum calycinum Salisb.)

1512. DIAMORPHA Nutt.

pusilla Nutt. *Carolina bor.* Herba exilis succulenta, foliis teretibus alternis, floribus terminalibus cymosis minutis. (Sedum pusillum Mx. Tillaea cymosa Nutt.)

1513. ADOXA.

Moschatellina *Europ. Caucas.* Herba tenera moschum redolens, radice bulbosa, foliis ternato-pinnatifidis obtusis, floribus capitatis virescentibus pedunculatis, primariis 4fidis reliquis 5fidis.

1514. HALORAGIS Forst.

Cercodia Ait. 1. H. foliis ovato-oblongis serratis, floribus pedunculatis verticillatis, fructibus angulato-ala-

tis. *Nov. Zeeland.* (Tetragonia ivaefolia L. ſuppl. Cercodia erecta Murr. Haloragis Tetragonia Herit., alata Forſt. Jacq.)

racemoſa Labill. 2. H. foliis lineari-lanceolatis utrinque attenuatis ſerrulatis, floribus racemoſis, fructibus angulato-alatis. *Nov. Holl. occid. auſtr.*

Gonocarpus * 3. H. foliis ovato-oblongis ſerrulatis, floribus axillaribus ſeſſilibus ſolitariis, fructibus globoſo-angulatis. *Nov. Holl. bor.* (Gonocarpus 4gyna Labill.)

proſtrata Forſt. 4. H. foliis oblongis integerrimis, floribus axillaribus pedunculatis ſolitariis, fructibus globoſis. *Inſ. botan. Nov. Caledon.*

digyna Labill. 5. H. foliis linearibus acutis, floribus verticillato-racemoſis nutantibus digynis, fructibus globoſis. *Nov. Holl. occid. auſtr.*

1515. PARIS.

quadrifolia * 1. P. foliis quaternis, ſepalis linearibus petala ſuperantibus. *Europ. ſylvae umbroſae.*

verticillata MB. 2. P. foliis octonis, ſepalis lanceolatis petala 3plo ſuperantibus. *Sibir. orient. Nepal.* (P. polyphylla Sm.)

incompleta MB. 3. P. foliis ſubdenis, ſepalis lanceolatis nervoſis, petalis nullis, antheris apice non productis. *Armenia. Iberia.* (P. apetala et Demidovia polyphylla Hofm.)

1516. ELATINE.

Hydropiper 1. E. caule proſtrato radicante, foliis oppoſitis oblongis utrinque attenuatis glabris, floribus pedunculatis alternis 4fidis 8andris. *Europae inundata.*

tripetala Sm. 2. E. caule proſtrato radicante, foliis oppoſitis ſpathulatis ſcabris, floribus alternis oppoſitisque 3fidis 3-6andris. *Europ. inundata.* (E. Hydropiper Engl. bot., 3andra Schk. Hofm., 6andra Cand. Birolia paludoſa Bellard. Tillaea 6andra Lapierre.)

Alſinaſtrum 3. E. caule erecto, foliis oblongo-lanceolatis, floribus 4fidis ſeſſilibus verticillatis. *Europ. aquae.*

1517. MARGARITARIA L. ſuppl.

nobilis L. ſuppl. *Ind. occ. Amer. auſtr.* Arbor foliis oppoſitis ovatis integerrimis, floribus paniculatis dioecis.

1518. PYTHAGOREA Lour.

cochinchinenſis Lour. *Cochinchina.* Arbuscula ramoſiſſima, foliis ovato-lanceolatis ſerratis, floribus racemoſis albis.

1519. FRANCOA Cav.

appendiculata Cav. 1. Fr. acaulis, foliis cordatis ovatis obtuse angulatis, floribus racemosis, petalis appendiculatis. *Chili.*

sonchifolia * 2. Fr. caulescens, foliis lyratis tomentosis decurrentibus, floribus racemosis. *Chili.* (Llaupanke Feuill. Panke sonchifolia Molin.)

1520. GALVEZIA R. et P.

punctata R. et P. *Chili.* Arbor foliis oblongo-lanceolatis serratis pellucido-punctatis aromaticis, floribus paniculatis albis. (Pitavia punctata Molin.)

CLASSIS IX.

ENNEANDRIA.

MONOGYNIA.

Laurinae.

1521. *Laurus.* Flores diclini. Cal. corollinus 6fidus. Stamina 12, quorum 3 ſterilia: filamenta utrinque glandulosa: antherae a baſi ſurſum dehiſcentes 2loculares. Bacca nuda 1ſperma.

1522. *Tetranthera* Jacqu. Character Lauri, praeter antheras 4loculares.

1523. *Perſea* Gärtn. Flores ☿. Char. Lauri, praeter antheras 4loculares, glandulas germini circumſtantes et drupam calycis baſi ſuffultam.

1524. *Cryptocarya* R. Br. Flores ☿. Cal. corollinus 6fidus, limbo deciduo, tubo perſiſtente. Stamina 12, quorum 3 ſterilia. Antherae 2loculares. Glandulae 6 cum filamentis interioribus alternantes. Drupa tubo baccato calycis incluſa.

1525. *Cuſſyta.* Flores ☿. Cal corollinus 6fidus omnis perſiſtens. Stam. 12, quorum 6 ſterilia, 3 baſi 2glandulosa. Antherae 2loculares. Fructus baccatus calyce tectus, ejusque laciniis coronatus.

1526. *Anacardium.* Flores diclini. Cal. 5partitus. Petala 5. Stamina 10, unico abortiente. Nux reniformis receptaculo carnoſo ſuffulta. *Terebinthaceae.*

1527. *Plegorrhiza* Molin. Cor. 1petala. Capſ. 1ſperma. *Familia?*

1528. *Thalesſia* Banks. Flores dioeci ſpathacei. Cal. 3ſepalus. Cor. 0. Antherae ſeſſiles. ♀ ignoti. *Familia?*

DI - TRIGYNIA.

1529. *Mercurialis.* Cal. 3ſepalus. Cor. 0. Antherae 2loculares. Cocci 2, 3 1ſpermi. *Tricoccae.*

1530. *Rheum.* Cal. corollinus 6partitus. Nux 3quetro-alata. *Polygoneae.*

1531. *Eriogonum* Mx. Involucrum campanulatum ſub-6florum. Cal. corollinus campanulatus 6fidus. Semen calyce tectum triquetrum. *Polygoneae.*

1532. *Plcea* Mx. Flores ſpicati ſpathacei. Cor. 6partita patens. Capſ. 3locularis polyſperma. Semina ad margines valvarum. *Aſphodeleae.*

1533. *Triplaris.* Flores dioeci. Cal. 3partitus. Cor. 8petala. Capſ. 3valvis 1ſperma. *Polygoneae.*

HEXAGYNIA.

1534. *Butomus.* Cal. corollinus 6ſepalus. Capſ. 6 polyſpermae, ſemina ad parietes valvarum. *Hydrocharides.*

1535. *Hydrocharis.* Cal. 3partitus. Cor. 3petala. Nectaria inciſa. Capſ. 6locularis polyſperma. *Hydrocharides.*

CLASSIS IX.

ENNEANDRIA.

MONOGYNIA.

1521. LAURUS.

* *Foliis perennantibus.*

nobilis 1. L. foliis oblongo-lanceolatis ſubundulatis venoſis, floribus axillaribus umbellato-racemoſis folio brevioribus, calycibus 4fidis. *Europ. auſtr.*

Culilaban 2. L. foliis oppoſitis ovato-acuminatis 3plinerviis ſubtus glauceſcentibus, floribus corymboſis, calycibus 6partitis. *Inſ. Molucc. Cochinchina.* (L. Caryophyllus Lour.)

Beiolgota Hamilt. 3. L. foliis oblongis utrinque attenuatis 3plinerviis ſubtus glaucis venoſo-reticulatis, ramis 4gonis, panicula trichotoma, floribus ternis. *Ind. orient.* (L. Malabathrica Roxb.?)

coriacea Sw. 4. L. foliis ovato-oblongis acuminatis ſubcoriaceis reticulato-venoſis nitidis, racemis axillaribus compoſitis folio brevioribus. *Jamaica. Hiſpaniola.*

ſalicifolia Sw. 5. L. foliis alternis lato-lanceolatis acutis nervoſo-venoſis, racemis axillaribus folio brevioribus. *Ind. occid.*

Catesbiana Mx. 6. L. foliis ovato-lanceolatis nitidis, panicula terminali, fructu ovato. *Georgia. Florida.*

carolinenſis Catesb. 7. L. foliis ovali-lanceolatis ſubtus glauceſcentibus ſubpubeſcentibus, glomerulis florum pedunculatis axillaribus. *Carolina. Louiſiana.* (L. axillaris Lam.)

thyrſiflora Poir. 8. L. foliis ovato-oblongis acuminatis nervoſo-venoſis, panicula elongata terminali, pedicellis 1floris. *Madagascar.*

punctata * 9. L. foliis alternis oblongis utrinque attenuatis nitidis venoſis margine pellucido-punctatis, paniculis axillaribus folia aequantibus. *Braſil.* Sello.

** *Foliis annuis.*

Benzoin 10. L. foliis oblongis utrinque attenuatis venoſis enerviis, pedunculis aggregatis 1floris. *Amer. bor.*

pendula Sw. 11. L. foliis oblongis utrinque attenuatis nervoso-venosis subtus glaucescentibus, paniculis axillaribus folia aequantibus, fructibus pendulis. *Jamaica.*

divaricata Poir. 12. L. foliis oblongis acuminatis nervosis subtus reticulatis, panicula laxa terminali, pedunculis divaricatis. *Cayenn.*

*** *Dubiae.*

Chloroxylon 13. L. foliis subellipticis utrinque attenuatis rigidis 3nerviis, pedunculis solitariis 1floris, calycibus 5fidis 5andris 3gynis. *Jamaica.*

martinicensis Jacq. 14. L. foliis oblongis acuminatis coriaceis, racemis paniculatis, pedunculis calycibusque tomentosis. *Martinic.*

glauca Thunb. 15. L. foliis lanceolatis acuminatis nervosis subtus glaucis, ramis tuberculatis, pedunculis brevissimis sub-1floris. *Japon.*

pedunculata Thunb. 16. L. foliis oppositis oblongis acutis nervosis, pedunculis sparsis solitariis 1floris. *Japon.*

lucida Thunb. 17. L. foliis ovato-oblongis acutis obsolete serratis lucidis, floribus solitariis subsessilibus. *Japon.*

umbellata Thb. 18. L. foliis ovatis obtusis serratis nervosis, ramulis umbellatis, floribus racemosis. *Japon.*

polyadelpha Lour. 19. L. foliis lanceolatis integerrimis coriaceis sub-3nerviis, floribus corymbosis, staminibus 3adelphis. *Cochinchina.*

Soncaurium Hamilt. 20. L. foliis oblongis utrinque attenuatis subtripli-nerviis subtus venosis. *Emodi montes.*

Tazia Hamilt. 21. L. foliis lanceolatis acuminatis 3plinerviis, ramis 4angulis. *Ind. or.*

sailiana Hamilt. 22. L. foliis oblongis utrinque attenuatis quintuplo-nerviis subtus glaucis. *Emodi montes.*

floribunda Sw. 23. L. foliis annuis ovato-lanceolatis venosis, floribus racemoso-paniculatis. *Jamaica.*

1522. TETRANTHERA Jacq.

* *Foliis perennantibus.*

laurifolia Jacq. 1. T. foliis obovato-oblongis integerrimis, floribus involucratis subumbellatis, pedicellis filamentisque pilosis. *Japon.* (Tomex tetrantheva W. Litsea chinensis Lam. Sebifera glutinosa Lour.)

japonica * 2. T. foliis oblongis obtusis venosis subtus tomentosis, floribus glomeratis pedunculatis villosis. *Japon.* (Tomex japonica Thunb. Litsea Persl.)

citrifolia * 3. T. foliis ovatis obtusis venosis nitidis, floribus involucratis subumbellatis indivisis. *Ora Coromandel. Noo. Holl.* (T. apetala Roxb. Litsea citrifolia Juff.)

trinervia * 4. T. foliis oblongis acuminatis 3plinerviis subtus glaucis, floribus involucratis congestis brevissimis

pedunculatis. *Ind. or. China. Cochinchina.* (Laurus Myrrha Lour. Litsea zeylanica Nees.)

sclifera * 5. T. foliis oblongis obtusis enerviis subtus pubescentibus, floribus ♂ capitatis involucratis, ♀ paniculatis, pedunculis lanatis divaricatis 1floris. *Ind. or.* (Tomex W. Laurus involucrata Retz.)

ferruginea R. Br. 6. T. foliis oblongis acutis 1nerviis subtus ramisque ferrugineo-tomentosis, floribus umbellatis involucratis. *Cochinchina. Nov. Holl.* (Hexanthus umbellatus Lour.)

decalbata R. Br. 7. T. foliis oblongis acuminatis 3plinerviis subtus albidis, petiolis ramisque tomentosis, floribus glomeratis involucratis sessilibus. *Nov. Holl.*

tersa * 8. T. foliis lanceolatis attenuatis venosis supra nitidis subtus subtomentosis, floribus ♂ capitatis (staminibus polyadelphis), ♀ solitariis axillaribus breviſſime pedunculatis. *Inſ. Molucc.* (Glabraria tersa L.)

glaucescens * 9. T. foliis oblongo-lanceolatis acuminatis reticulato-venosis subtus glaucis, floribus involucratis ♂ corymbosis, ♀ paucis. *Mexico.* (Litsaea glaucescens ♀ et Cervantesii ♂ Kunth.)

Berterii * 10. T foliis oblongo-lanceolatis elongatis utrinque attenuatis venosis opacis glaberrimis, floribus subcymoso-glomeratis breviſſime pedunculatis axillaribus polygamis. *Amer. austr.* Bertero.

** *Foliis annuis.*

aestivalis * 11. T. foliis lanceolatis obtusiusculis glabris basi subtus barbatis, ramis divaricatis, floribus umbellatis polygamis. *Carolina.* (Laurus aestivalis L., geniculata Walt. Mx.)

Diospyros * 12. T. foliis oblongis subtus venosis pubescentibus, ramis virgatis, gemmis pedunculisque villosis, floribus glomerato-umbellatis. *Carolina.* (Laurus Diospyroides Mx. Diospyrus Pers., meliſſaefolia Walt.)

pilosa * 13. T. foliis oblongis pilosis enerviis, floribus racemosis polygamis. *Cochinchina.* (Laurus pilosa Lour.)

albida * 14. T. foliis integris sub-3lobisque glaberrimis venosis, floribus dioecis. *Carolina.* (Evosmus albida Nutt.)

1523. PERSEA Gärtn.

* *Foliis perennantibus,*

† *nervosis.*

Cinnamomum * 1. P. foliis elliptico-oblongis obtusiusculis 3plinerviis ramulisque glaberrimis, floribus paniculato-corymbosis axillaribus folia superantibus. *Ceylon. Cochinchina.* (Laurus L.)

Cassia * 2. P. foliis oblongo-lanceolatis obtusiusculis 3plinerviis, petiolis ramulisque sericeo-tomentosis,

floribus racemoſo-paniculatis folia aequantibus. *Ind. or. Cochinchina.* (Laurus L.)

dulcis * 3. P. foliis oblongo-lanceolatis acutis triplinerviis petiolis ramulisque glabris, corymbis ſtipitatis pauciflоris. *Java. Ind. orient.* (Laurus dulcis Roxb. L. Burmanni Nees excl. ſyn. Burm.)

Tamala * 4. P. foliis lanceolatis utrinque attenuatis triplinerviis, panicula terminali. *Emodi montes.* (Laurus Hamilt.)

Camfora * 5. P. foliis ovato-oblongis acuminatis triplinerviis, paniculis axillaribus multifloris folio brevioribus. *Japon. China.* (Laurus L.)

montana * 6. P. foliis ovato-acuminatis triplinerviis rigidis nitidis, floribus paniculatis pubeſcentibus. *Ind. occid.* (Laurus montana Sw., paniculata Poir.)

curvifolia * 7. P. foliis oblongis acuminatis incurvis reflexis obſolete 3nerviis, floribus racemoſis. *Cochinchina.* (Laurus Lour.)

†† *cenoſis.*

indica * 8. P. foliis oblongo-lanceolatis acutis glaberrimis opacis coriaceis, corymbis pedunculatis axillaribus, calycibus incanis. *Inſ. Canar. Japon.* (Laurus L.)

foetens * 9. P. foliis oblongis acutis glabris, axillis venarum ſubtus villoſis, paniculis axillaribus elongatis. *Inſ. Canar.* (Laurus Ait. L. maderenſis Lam. Till Poir.)

canarienſis * 10. P. foliis oblongis utrinque attenuatis nitidis, pedunculis axillaribus elongatis 3-4floris. *Inſ. Canar.* (Laurus W. L. reticulata et Tenerifae Poir.)

gratiſſima Gärtn. 11. P. foliis elliptico-oblongis obtuſiuſculis ſubtus pubeſcentibus glauceſcentibus, corymbis axillaribus, calycibus tomentoſis, fructu pyriformi. *Amer. aequinoct.* (Laurus Perſea L.)

exaltata * 12. P. foliis ovato-lanceolatis acuminatis nitidis, racemis corymboſis axillaribus, fructu ovali. *Jamaica. Amer. auſtr.* (Laurus exaltata Sw. Ocotea turbacenſis Kunth.)

alpigena * 13. P. foliis oblongis obtuſis ſubrevolutis coriaceis ſubtus venoſis glauceſcentibus, racemis erectis folio longioribus. *Jamaica. Amer. auſtr.* (Laurus Sw. Ocotea obtuſifolia Kunth.)

Leucoxylon * 14. P. foliis oblongo-lanceolatis elongatis acuminatis glaberrimis ſupra nitidis, pedunculis axillaribus abbreviatis ſubracemoſis fructiferis cum calyce incraſſatis verrucoſis. *Ind. occid.* (Laurus Sw. Perſea cinnamomifolia et macropoda Kunth. varr.?)

Borbonia * 15. P. foliis oblongis utrinque attenuatis coriaceis nitidis, racemis axillaribus abbreviatis, calycibus fructiferis ſubbaccatis. *Amer. bor. et auſtr.* (Laurus L. Ocotea Cymbarum Kunth.)

ſanguinea * 16. P. foliis ovato-lanceolatis acuminatis ſubtus venoſo-reticulatis, racemis erectis folio brevio-

ribus, calycibus turbinatis. *Surinam.* (Nectandra ſanguinea Rottb.)

ſurinamenſis * 17. P. foliis ovato-lanceolatis acuminatis utrinque glaberrimis, ramis patentiſſimis, paniculis filiformibus elongatis, floribus glomeratis. *Surinam. Braſil.* (Laurus Sw., Nectandra bijuga Rottb.)

cupularis * 18. P. foliis elliptico-oblongis utrinque attenuatis ſupra nitidis, paniculis ſeſſilibus terminalibus, calycibus turbinatis. *Inſ. Mascaren.* (Laurus cupularis Lam.)

globoſa * 19. P. foliis ovatis glabris ſubtus glauceſcentibus, cymis pedunculatis axillaribus, fructibus globoſis. *Ind. occid.* (Laurus Lam.)

cauſtica * 20. P. foliis oblongis utrinque attenuatis ſubtus reticulato-rugoſis, pedunculis 1floris, fructibus ſubreniformibus. *Chili.* (Laurus cauſtica Molin.)

Cubeba * 21. P. foliis oblongo-lanceolatis ſubeveniis nitidis, floribus congeſtis pedunculatis, fructibus globoſis minimis. *Cochinchina.* (Laurus Lour.)

craſſifolia * 22. P. foliis ovato-oblongis ſupra nitidis ſubtus caneſcentibus, fructibus ovatis pubeſcentibus. *Cayenn.* Richard. (Laurus Poir.)

retroflexa * 23. P. foliis lanceolatis nitidis glabris, floribus racemoſis axillaribus, calycibus fructiferis dureſcentibus reflexis. *Hiſpaniol.* Poiteau. (Laurus Poir.)

laevigata Kunth. 24. P. foliis ovalibus utrinque glabris ſubtus reticulatis, paniculis axillaribus folio brevioribus, calycibus incano-pubeſcentibus. *Nov. Granat.*

Mutiſii Humb. 25. P. foliis ellipticis coriaceis ſubtus glauco-pruinoſis, corymbis axillaribus, calycibus patentiſſimis ferrugineis, fructibus globoſis. *Nov. Granat.*

ſericea Kunth. 26. P. foliis ellipticis ſubtus ferrugineo-ſericeis, pedunculis axillaribus ſub-6floris, calycibus ſericeis, fructibus ovatis. *Peru.*

ferruginea Kunth. 27. P. foliis ovatis acutis ſupra nitidis ſubtus ferrugineo-tomentoſis, corymbis axillaribus dichotomis. *Peru.*

Pichurim * 28. P. foliis oblongis utrinque acuminatis coriaceis ſupra nitidis ſubtus reticulatis piloſiuſculis, paniculis axillaribus folio brevioribus, fructibus oblongis. *Amer. auſtr.* (Ocotea Kunth.)

Boſo * 29. P. foliis oblongis utrinque attenuatis glabris ſubtus reticulato-venoſis, floribus paniculatis axillaribus pubeſcentibus, calycibus acutis. *Ad fl. Amazonum.* (Ocotea Kunth.)

umbroſa * 30. P. foliis oblongis utrinque attenuatis glabris ſubtus reticulato-venoſis, floribus paniculatis axillaribus pubeſcentibus, calycibus obtuſis. *Ad fl. Amazonum.* (Ocotea Kunth.)

Phyllotrioides * 31. P. foliis lanceolatis acuminatis ſubtus incano-pubeſcentibus, paniculis folio brevioribus, calyce pubeſcente. *Mexico.* (Ocotea Kunth.)

argentea * 32. P. foliis oblongis utrinque attenuatis coriaceis ſubtus argenteo-ſericeis, paniculis folio brevioribus, calyce pubeſcente. *Nov. Granat.* (Ocotea ſericea Kunth.)

tigricida * 33. P. foliis oblongis utrinque attenuatis subtus calycibusque fusco-tomentosis, paniculis axillaribus folia aequantibus. *Nov. Granat.* (Laurus Matis. Ocotea discolor et rigida Kunth.)

mollis * 34. P. foliis subcordato-oblongis acuminatis utrinque villosissimis, paniculis folio brevioribus, calycibus ferrugineo-tomentosis. *Nov. Granat.* (Ocotea Kunth.)

*** Foliis annuis.*

membranacea * 35. P. foliis oblongis utrinque attenuatis venosis glabris nitidis, paniculis axillaribus folio brevioribus. *Ind. occid.* (Laurus Sw.)

patens * 36. P. foliis oblongis utrinque attenuatis venosis glabris opacis, ramis patentibus, paniculis axillaribus folia superantibus. *Ind. occ.* (Laurus Sw.)

parviflora * 37. P. foliis elliptico-oblongis acutis utrinque glabris opacis, paniculis axillaribus folio brevioribus. *Jamaica.* (Laurus Sw.)

Sassafras * 38. P. foliis ovatis obtusiusculis integris 3lobisque 3nerviis subtus pubescentibus, racemis corymbosis folio brevioribus. *Amer. bor.* (Laurus L.)

*** Dubiae.*

petiolaris Kunth. 39. P. foliis ovato-oblongis acutis subtus tenuissime pubescentibus, petiolis elongatis verrucosis, pedunculis oligocarpis incrassatis. *Amer. austr.*

longifolia * 40. P. foliis oblongo-lanceolatis elongatis utrinque attenuatis subtus petiolis paniculisque folio brevioribus pubescentibus, fructibus ovatis. *Nov. Granat.* (Ocotea Kunth.)

latifolia * 41. P. foliis obovatis coriaceis supra nitidis subtus reticulatis, paniculis folio brevioribus, fructibus oblongis. *Nov. Granat.* (Ocotea Kunth.)

macrophylla * 42. P. foliis oblongis utrinque attenuatis coriaceis supra nitidis subtus tomentosis, paniculis folio brevioribus, fructibus oblongis. *Nov. Granata.* (Ocotea Kunth.)

lineata * 43. P. foliis oblongis utrinque attenuatis coriaceis parallele venosis subtus incano-pubescentibus, paniculis folio brevioribus, fructibus subglobosis. *Ad fl. Orinocum.* (Ocotea Kunth.)

salicifolia * 44. P. foliis lanceolatis utrinque attenuatis coriaceis glaberrimis, pedunculis axillaribus racemosis folio brevioribus. *Mexico.* (Ocotea Kunth.)

1524. CRYPTOCARYA R. Br.

glaucescens R. Br. 1. Cr. foliis ovali-oblongis acutiusculis glabris subtus glaucis, paniculis axillaribus. *Nov. Holl.*

triplinervia R. Br. 2. Cr. foliis oblongo-lanceolatis acuminatis triplinerviis subtus subpubescentibus, paniculis axillaribus terminalibusque. *Nov. Holl.*

obovata R. Br. 3. Cr. foliis obovato-oblongis obtusissimis utrinque glabris, paniculis terminalibus. *Nov. Holl.*

† *mucronata* * 4. Cr. foliis oblongis acuminatis glabris ſubtus reticulato-rugulosis, fructibus oblongis mucronatis. *Cayenn.* (Laurus mucronata Poir.)

† *dubia* Kunth. 5. Cr. foliis obovato-oblongis utrinque reticulato-venosis glabris, corymbis axillaribus pauciforis folio brevioribus. *Nov. Granat.* Mutis. *Brasilia.* Sello.

1525. CASSYTA. (Aphyllae volubiles parasiticae.)

filiformis 1. C. glaberrima, spicis indivisis, fructibus distantibus globosis. *Intra tropicos Asiae, Africae et Americae.*

glabella R. Br. 2. C. glaberrima, spicis indivisis glomeratis. *Nov. Holl. Terra Diemen.*

melantha R. Br. 3. C. glabra, spicis indivisis, floribus imbricatis nigro-pubescentibus. *Nov. Holl.*

paniculata R. Br. 4. C. glabriuscula, spicis divisis, floribus distantibus glabris, fructibus angulatis. *Nov. Holl.*

pubescens R. Br. 5. C. pubescens, spicis indivisis, floribus distantibus globosis. *Nov. Holl. Terra Diemen.*

1526. ANACARDIUM.

occidentale *Ind. or. et occid.* Arbor foliis alternis obovato-oblongis, floribus paniculato-congestis albido-rubescentibus. (Cassuvium pomiferum Lam.)

1527. PLEGORRHIZA Molin.

adstringens W. Molin. *Chili. Buenos Ayres.* Frutex ramosus, foliis oblongis, floribus corymbosis virescentibus.

1528. THALASSIA Banks.

testudinum Kön. 1. Th. foliis sessilibus sublinearibus obtusissimis multinerviis, stipite basi radicante. *Mare caribaeum.*

ciliata Kön. 2. Th. foliis sessilibus linearibus retusis multinerviis ciliato-serrulatis, stipite basi vaginis imbricato. *Mare rubrum.* (Zostera ciliata Forsk.)

stipulacea Kön. 3. Th. foliis petiolatis oblongo-lanceolatis obtusis 3nerviis, stipulis oppositis complicatis. *Mare rubrum.* (Zostera stipulacea Forsk.)

DI-TRIGYNIA.

1529. MERCURIALIS.

* *Suffruticosae.*

tomentosa 1. M. lanato-tomentosa, foliis oblongis utrinque attenuatis apice serratis, pedunculis axillaribus paucifloris. *Gallia austr. Hispan.*

elliptica Lam. 2. M. glabra, ramis brachiatis, foliis ellipticis glanduloso-ſerratis, ſtipulis reflexis, fructibus ſubſeſſilibus. *Inſ. balear. Luſitan. Madera.*

indica Lour. 3. M. glaberrima, foliis lanceolatis ſerratis, calycibus ♂ polyandris. *Cochinchina.*

** *Herbaceae.*

perennis 4. M. caule ſimpliciſſimo, foliis ovato-oblongis ſerratis hirſutiusculis, fructibus pedunculatis hirſutis. *Europ.* (M. ovata Sternb.)

annua 5. M. caule brachiato, foliis ovato-oblongis ſerratis ciliatis. *Europ.* (M. ambigua L. fil. varietas androgyna.)

1530. RHEUM.

palmatum 1. Rh. foliis palmato-multifidis glabriusculis, laciniis acuminatis. *Emodi montes. Mongolia flava. Tibetanum regnum.*

compactum 2. Rh. foliis ſublobatis ſubcoriaceis nitidis argute denticulatis. *Tibet. Mongolia.* (Rh. tataricum L. ſuppl., leucorrhizon Pall.)

hybridum Ait. 3. Rh. foliis repandis acutis ſupra glabris ſubtus piloſiusculis. *Mongolia.*

undulatum 4. Rh. foliis undulatis ſubvilloſis. *Aſia media.*

Rhaponticum 5. Rh. foliis undulatis glabris, venis ſubtus piloſiusculis. *Thracia. Deſerta Sibiriae.*

Ribes 6. Rh. foliis ſubrotundis verruculoſo-aſperis. *Syria. Perſia.*

1531. ERIOGONUM Mx.

tomentoſum Mx. 1. E. caule erecto dichotomo, foliis ſubtus tomentoſis, inferioribus ſpathulatis in petiolum decurrentibus, ſuperioribus ſubverticillatis oblongis, faſciculis florum ſeſſilibus axillaribus ſolitariis. *Carolina. Georgia. Nov. Hiſpania.* (Chryſoſplenium oppoſitifolium Walt. Eſpinoſa verticillata Lag.)

flavum Fraſ. 2. E. caule ſimplici nudo, foliis inferioribus oblongo-lanceolatis utrinque villoſo-lanatis, faſciculis florum pedunculatis umbellatis ſericeis. *Ad fl. Miſſuri.* (E. ſericeum Pursh.)

latifolium Sm. 3. E. caule ſuffruticoſo ramoſo, foliis alternis cordatis obtuſis undulatis ſupra lanatis ſubtus tomentoſis, faſciculis florum glomeratis. *California.*

parvifolium Sm. 4. E. caule ſuffruticoſo ramoſo, foliis alternis petiolatis ovatis obtuſis ſupra glabris nitidis ſubtus ferrugineo-lanatis, florum faſciculis glomeratis. *California.*

pauciflorum Pursh. 5. E. caule ſimplici baſi folioſo, umbellis pauciflo ris, floribus ſubſeſſilibus, foliis lineari-lanceolatis utrinque cano-tomentoſis. *Louiſiana.*

1532. PLEEA Mx.

tenuifolia Mx. *Carolina.* Herba Antherici facie, foliis linearibus glabris, floribus ſpicatis flavis.

1533. TRIPLARIS.

americana 1. Tr. foliis oblongis acutis nervoſis venoſis, racemis axillaribus terminalibusque brachiatis. *Amer. auſtr.* (Tr. pyramidalis Jacq.)

ramiflora Vahl. 2. Tr. foliis ovatis acuminatis enerviis venoſis, racemis lateralibus ſimplicibus ſubſolitariis. *America auſtr.*

HEXAGYNIA.

1534. BUTOMUS.

umbellatus *Europ. Aſia bor.* Herba ſuborgyalis, foliis radicalibus linearibus, ſcapo tereti, floribus umbellatis rubris.

1535. HYDROCHARIS.

Morſus ranae 1. H. foliis cordato-orbiculatis ſubnervoſis, floribus dioecis. *Europ. fluvii.*

Spongia Boſc. 2. H. foliis cordato-ovatis enerviis ſubtus ſpongioſis, floribus monoecis. *Carolinae aquae.*

CLASSIS X.

DECANDRIA.

MONOGYNIA.

1. *Flores perfecti.*

A. *Corolla monopetala.*

a. *Fructus ſupèrus.*

1536. *Panzera* W. Cal. 4partitus. Petalum 1cucullatum ſubrotundum. Stamina elongata, alterna abortientia. Legumen oblongum compreſſum 3ſpermum. *Leguminoſae.*

1537. *Cyrta* Lour. Cal. 5dentatus. Cor. campanulata 5fida. Antherae dorſo filamentorum adnatae. Drupa incurva 1ſperma. *Styraceae?*

1538. *Inocarpus* Forſt. Cal. 2partitus. Cor. infundibuliformis. Antherae ſubſeſſiles duplici ſerie in tubo corollae. Drupa 1ſperma, nuce fibroſa reticulata. *Sapoteae.*

1539. *Styrax.* Cal. 5dentatus. Cor. infundibuliformis 5partita. Stamina baſi ſubcoalita. Drupa ſub-2ſperma. *Styraceae.*

1540. *Potalia* Aubl. Cal. 4partitus. Cor. 10fida. Filamenta annulo nectarifero inſerta. Bacca 3locularis polyſperma. *Familia?*

1541. *Arbutus.* Cal. 5partitus. Cor. urceolata, limbo reflexo 5dentato. Antherae dorſo biariſtatae. Bacca 6locularis, placentis laminas polyſpermas ſiſtentibus. *Ericeae.*

1542. *Arctoſtaphylos* Adanſ. Cal. 5partitus. Cor. urceolata, limbo reflexo 5dentato. Antherae dorſo biariſtatae. Drupa 5locularis, ſeminibus 5 axi centrali affixis. *Ericeae.*

1543. *Encyanthus* Lour. Bracteae ante antheſin coloratae imbricatae. Cal. parvus perſiſtens. Cor. campanulata 5fida. Foveae nectariferae 5 in baſi corollae. Antherae bicornes. Bacca 5locularis. *Ericeae.*

1544. *Gaultheria.* Cal. 5fidus 2bracteatus. Cor. urceolato-ovata. Antherae apice bicornes. Capſ. 5locularis calyce baccato veſtita. *Ericeae.*

1545 *Epigaea.* Cal. 5partitus 3bracteatus. Cor. hypocrateriformis. Antherae nudae. Capſ. 5locularis, valvis inflexis diſſepimentiformantibus, columna centrali 5partita. *Ericeae.*

1546. *Andromeda.* Cal. 5partitus. Cor. ſubcampanulata limbo reflexo. Antherae bicornes. Capſula 5locularis, marginibus valvarum nudis, columna centrali 5loba. *Ericeae.*

1547. *Lyonia* Nutt. Cal. 5dentatus. Cor. ſubgloboſa. Antherae nudae. Capſ. 5locularis, marginibus ope valvarum acceſſoriarum clauſis. *Ericeae.*

1548. *Rhododendron.* Cal. 5fidus. Cor. infundibuliformis. Stamina declinata. Capſ. 5locularis, valvis inflexis diſſepimenta formantibus: columna centralis 5loba. Semina membrana involuta. *Ericeae.*

1549. *Kalmia.* Cal. 5fidus. Cor. ſubhypocrateriformis, intus foveolis antheras recipientibus extus 10 tuberculis. Capſ. 5locularis ſimillima fructui Rhododendri. *Ericeae.*

1550. *Pteroſpora* Nutt. Cal. 5partitus. Cor. ovata, limbo reflexo 5dentato. Antherae peltatae biſetae. Capſ. 5locularis polyſperma. Semina alata. *Monotropeae.*

1551. *Codon.* Cal. 10partitus. Cor. campanulata 10fida. Capſula 2locularis polyſperma. *Familia?*

b. *Fructus inferus.*

1552. *Ceratoſtemma* Juſſ. Cal. 5fidus perſiſtens. Cor. tubuloſa coriacea. Antherae elongatae 2furcae medio affixae. Capſ. 5locularis. *Ericeae.*

1553. *Thibaudia* Pav. Cal. 5fidus perſiſtens. Cor. tubuloſa. Antherae elongatae 2furcae baſi affixae. Bacca 5locularis, loculis polyſpermis. *Ericeae.*

1554. *Luſſacia* *. Cal. 5fidus perſiſtens. Cor. tubuloſa. Antherae elongatae bifurcae baſi affixae. Drupa 5locularis, loculis 1ſpermis. *Ericeae.*

1555. *Polyphragmon* Desf. Cal. 5dentatus perſiſtens. Cor. infundibuliformis, limbo 10fido. Stamina in medio tubo. Stigma 6fidum. Bacca multilocularis. *Rubiaceae.*

B. *Corolla pleiopetala.*

a. *regularis.*

α. Fructus ſuperus.

1. *Melaſtomeae.*

1556. *Melaſtoma.* Cal. 5–4fidus perſiſtens. Petala calycis limbo inſerta. Antherae refractae. Bacca 3–4locularis calyce veſtita. Semina reniformia in pulpa nidulantia.

1557. *Triſtemma* Juſſ. Cal. 5fidus extus duplici corona membranaceo-ciliata prope limbum cincta. Petala unguiculata calyci inſerta. Bacca 5locularis.

1558. *Rhexia.* Cal. 5–4fidus perſiſtens. Petala calyci inſerta. Antherae baſi appendiculatae. Capſ. 3–4–5locularis, placentis demum liberis in quovis loculo.

1559. *Osbekia.* Cal. 5–4fidus. Petala calyci inſerta. Capſ. 4–5locularis, placentis columnae centrali affixis.

2. *Terebinthaceae.*

1560. *Boswellia* Colebr. Cal. 5dentatus. Petala 5. Urceolus glanduloſus crenulatus perigynus. Capſ. 3quetra 3locularis. Sem. hinc alata.

1561. *Garuga* Roxb. Cal. 5dentatus. Petala 5 calyci inſerta. Glandulae 5 nectariferae. Stamina calyci inſerta. Stigma 5lobum. Drupa ſub-2ſperma.

1562. *Buchanania* Roxb. Cal. 5dentatus. Petala 5. Nectarium duplex, ext. urceolatum, int. dentibus ſubulatis perigynis. Drupa nuce 2valvi.

1563. *Burſeria* Jacq. Cal. 5-5dentatus. Petala 3-5. Stam. 6-10. Stigma ſeſſile 3lobum. Capſ. 3valvis 1ſperma. Semen arillatum.

† 1564. *Baraultia* Steud. Cal. urceolatus 5fidus. Pet. 5 minima bifida unguiculata calyci inſerta. Filamenta baſi dilatata, 5 petalis oppoſita longiora. Annulus glanduloſus ſtamina ambiens. Fructus?

3. *Aurantia.*

1565. *Feronia* Corr. Cal. 5fidus. Petala 5. Filamenta baſi dilatata in receptaculo carnoſo. Stigma 5lobum. Pomum 5loculare, loculis polyſpermis.

1566. *Glycosmis* Corr. Cal. 5fidus. Petala 5. Filamenta aequalia. Stigma ſimplex. Fructus carnoſus 1-2locularis.

1567. *Limonia.* Cal. 5fidus. Petala 5. Filamenta aequalia. Pomum 5loculare 5ſpermum.

1568. *Cookia* Sonner. Cal. 5ſepalus. Petala 5 navicularia. Pomum 5loculare 5ſpermum.

1569. *Murraya.* Cal. 5partitus. Petala 5. Nectarium ſubcampanulatum. Bacca ſub-1ſperma.

4. *Ericeae.*

1570. *Ledum.* Cal. 5dentatus. Pet. 5. Stigma 5lobum. Capſ. 5locularis baſi dehiſcens. Sem. membrana reticulata obvoluta.

1571. *Leiophyllum* Perſ. Cal. 5partitus. Pet. 5. Capſ. 5locularis apice dehiſcens.

1572. *Clethra.* Cal. 5fidus. Pet. 5. Stigmata 3. Capſ. 3locularis, placentis liberis in quovis loculo.

1573. *Cliftonia* Banks. Cal. 5partitus. Pet. 5. Filamenta medio dilatata. Stigma ſeſſile. Capſ. 4alata 4locularis.

1574. *Pyrola.* Cal. 5fidus. Pet. 5 rotundata. Filamenta aſcendentia. Antherae baſi 2cornes 2loculares. Stigma 5lobum. Capſ. 5locularis, angulis dehiſcens. Sem. membrana obvoluta.

1575. *Chimaphila* Pursh. Cal. 5fidus. Petala 5 rotundata. Filamenta medio in diſcum dilatata. Antherae baſi 2cornes. Stigma 5lobum. Capſ. 5locularis apice dehiſcens.

1576. *Monotropa.* Cal. 4-5ſepalus. Pet. 4-5 baſi ſaccata. Stigma peltatum. Capſ. 4-5locularis polyſperma. Semina membrana obvoluta. *Monotropeae Ericeis affines.*

5. *Ochneae.*

1577. *Gomphia* Schreb. Cal. 5ſepalus. Pet. 5. Antherae ſeſſiles elongatae apice 2poroſae. Drupae ſubquinae in receptaculo carnoſo.

1578. *Quaſſia.* Cal. 5partitus. Pet. 5. Filamenta baſi ſquamis ſuffulta. Stylus gynobaſi inſiſtens. Capſ. 5 bivalvis 1ſpermae.

1579. *Zwingera* Schreb. Cal. 5fidus. Pet. 5. Filamenta baſi dilatata ſquamata. Stigmata 5. Capſ. 5 monoſpermae.

6. *Rutaceae.*

1580. *Ruta.* Cal. 5partitus perſiſtens. Pet. 5 unguiculata. Pori nectariferi ad baſin ovarii. Capſ. 5locularis.

1581. *Dictamnus.* Cal. 5partitus deciduus. Pet. 5 unguiculata. Genitalia declinata. Filamenta glanduloſa. Folliculi 5 2ſpermi intus debiſcentes.

1582. *Erioſtemon* Sm. Cal. 5partitus. Pet. 5. Filamenta (in pleris-que) piloſa. Folliculi 5 ſub-2ſpermi baſi nexi.
1583. *Crowea* Sm. Cal. 5partitus. Pet. 5 ſeſſilia. Filamenta latiuscula pilis intertextis nexa, media interna parte antheras foventia. Stylus breviſſimus. Folliculi 5 1ſpermi coaliti.
1584. *Choiſia* Kunth. Cal. 5ſepalus. Pet. 5. Stigma 5lobum. Capſ. 5locularis 5roſtrata.
1585. *Guaiacum*. Cal. 5partitus. Pet. 5. Stamina libera. Capſula 5locularis 5ſperma: ſemina axi affixa.
1586. *Zygophyllum*. Cal. 5partitus. Pet. 5. Fornix ſquamaceus filamentis nexus. Capſ. prismatica 5locularis, loculis polyſpermis.
1587. *Larrea* Cav. Cal. 5ſepalus. Pet. 5. Filamenta intus ſquamis aucta. Capſ. 5 1ſpermae coalitae.
1588. *Fagonia*. Cal. 5ſepalus deciduus. Pet. 5 unguiculata. Capſ. ſubrotunda 5locularis 5ſperma.
1589. *Tribulus*. Cal. 5ſepalus deciduus. Pet. 5. Stigma 5fidum. Nuces 5 ſpinoſae 4 loculares àxi annexae.

7. *Leguminoſae*.

1590. *Entada* Adanſ. Flores polygami. Cal. campanulatus 5dentatus. Pet. 5. Lomentum grande ſubcompreſſum: ſemina glutine obvoluta.
1591. *Deſmanthus* W. Flores polygami. Cal. campanulatus 5dentatus. Pet. 5. Legumen continuum 1loculare exſuccum.
1592 *Prosopis*. Cal. 5dentatus. Pet. 5 linearia patentia. Antherae apice glanduloſae. Stylus incurvus. Legumen multiloculare non dehiſcens reſinoſo-gummoſum.
1593 *Sclutia* Jacqu. Cal. campanulatus coloratus 5fidus. Pet. 5 conniventia calyci inſidentia. Legumen 2ſpermum.
1594. *Omphalobium* Jacqu. fil. Cal. herbaceus 5partitus. Pet. 5 patentia receptaculo inſerta. Filamenta baſi nexa. Legumen 2ſpermum. Arillus dimidiatus ſeminum.
1595. *Cynometra*. Cal. 4partitus. Pet. 4. Antherae apice fiſſae. Legumen ſemilunare 1ſpermum carnoſum.
1596. *Gymnocladus* Lam. Cal. infundibuliformis 5fidus. Pet. 5 rotundata calyci inſerta. Stam. corolla breviora. Legumen pleioſpermum carnoſum intus pulpoſum ſeptatum.
1597. *Guilandina*. Cal. hypocrateriformis 5fidus. Pet. calyci inſerta. Legumen latum oligoſpermum, ſeminibus oſſeis.
1598. *Hyperanthera* Vahl. Cal. 5partitus. Pet. 5 calyci inſerta ſubinaequalia. Legumen elongatum 3valve polyſpermum: ſemina 3alata.
1599. *Adenanthera*. Cal. 5dentatus. Pet. 5. Stamina apice glanduloſa medio antherifera. Legumen compreſſum membranaceum polyſpermum.
1600. *Cadia* Forsk. Cal. 5fidus. Pet. 5 obcordata. Legumen inflatum polyſpermum.
1601. *Haematoxylon*. Cal. urceolatus coloratus, limbo 5fido. Pet. 5 calyci inſerta. Legumen capſulare.
1602. *Baryxylon* Lour. Cal. 5ſepalus reflexus deciduus. Pet. 5 ſubrotunda plicata patentia receptaculo inſerta. Antherae 4loculares. Stigma concavum. Legumen craſſum teres polyſpermum.
1603. *Zuccagnia* Cav. Cal. turbinatus limbo 5partito. Pet. 5 calyci inſerta. Stigma infundibuliforme. Legumen 1ſpermum crinitum.

8. *Malpighieae.*

1604. *Bunchosia* Juſſ. Cal. 5partitus extus glanduloſus. Pet. 5 unguiculata. Stam. baſi nexa. Stylus ſimplex aut apice 2-3fidus. Drupa ſub-2ſperma.

1605. *Thryallis*. Cal. 5partitns perſiſtens. Pet. 5 ſubrotunda. Capſ. 3quetra 3locularis, loculis extus dehiſcentibus.

1606. *Hiptage* Gärtn. Cal. 5partitus baſi glanduloſus. Pet. 5 fimbriata. Stam. unicum ceteris longius. Fructus 3 1ſpermi 4alati, alis inaequalibus.

1607. *Zygnum* Nor. Juſſ. Cal. 5fidus. Pet. 5 unguiculata inflexa. Stam. alterna minora. Ovarium poris 3 impreſſum. Fructus 3 1ſpermi appendiculati.

1608. *Dionaea*. Cal. 5ſepalus. Pet. 5. Antherae lateraliter dehiſcentes. Stigma orbiculatum. Capſ. 1locularis 5valvis polyſperma. *Hypericeae*.

1609. *Hydropityon* Gärtn. Cal. 5ſepalus. Pet. 5 rotundata. Filamenta craſſa piloſa: antherae cordatae. Stigma orbiculatum. Capſ. 1ſperma. *Caryophylleae?*

1610. *Balanites* Delil. Cal. 5partitus. Pet. 5. Drupa 1ſperma, nucleo pentagono. *Familia?*

1611. *Chilmoria* Hamilt. Flores polygami. Cal. 5ſepalus, Pet. 5, cum ſquamis totidem alternantia. Stam. 5-15. Stigma peltatum ſeſſile. Bacca lignoſa 1locularis polyſperma. *Familia?*

1612. *Godoya* R. et P. Cal. coloratus 5ſepalus. Pet. 5 pilorum ope cum calyce nexa. Stamina receptaculo inſerta, antheris apice 2poroſis. Stigma ſeſſile 3angulum. Capſ. 3locularis 3valvis polyſperma, ſeminibus alatis. *Guttiferae?*

1613. *Leptochlaena* Thuar. Calyx duplex, ext. urceolatus, int. 3ſepalus. Pet. 5 baſi cohaerentia. Stigma 3lobum. Capſ. 1ſperma. *Chlaenaceae* Thuar.

1614. *Heiſteria*. Cal. 5fidus, demum ampliatus. Pet. 5. Stigma 3fidum. Drupa 1ſperma. *Santaleae?*

1615. *Ceratopetalum* Sm. Cal. 5partitus ſtaminifer perſiſtens. Pet. 5 pinnatifida. Antherae calcaratae. Capſ. 2locularis. *Familia?*

1616. *Viviania* Cav. Cal. 5ſepalus. Pet. 5. Stamina alterna ſquamis nectariferis inſerta. Stigmata 3. Capſ. 5locularis. *Familia?*

β. Fructus inferus.

1617. *Petaloma* Sw. Cal. urceolatus 5dentatus. Pet. 5 cum ſtaminibus calyci inſerta. Antherae apice 2poroſae. Bacca ſeminifera ſub-4ſperma. *Melaſtomeae?*

1618. *Combretum*. Cal. campanulatus 5dentatus. Petala 5 calyci inſerta. Stamina longiſſima. Caryopſis 4alata. *Combreteae.*

1619. *Quisqualis*. Cal. longiſſime tubuloſus, limbo 5dentato. Pet. 5 oblonga. Stamina calyci inſerta. Drupa 5gona 1ſperma. *Combreteae.*

1620. *Guiera* Juſſ. Cal. cylindricus 4dentatus. Petala 4 parva. Stamina longe exſerta. Capſ. 5gona 1locularis 5ſperma, ſeminibus exilibus filo pendulis. *Combreteae.*

1621. *Schousboea* W. Cal. campanulatus, limbo 5fido deciduo. Pet. 5. Stam. exſerta. Capſ. ſubbaccata 5angula 1ſperma. *Combreteae.*

1622. *Chamaelaucium* Desf. Flos ante anthesin calyptra circumscissa tectus. Cal. 5fidus. Pet. 5. Stam. fertilia cum totidem abortientibus alterna basi nexa. Capf. 1locularis oligosperma. *Myrteae.*

b. *Corolla irregularis.*

1623. *Rhodora.* Cal. 5dentatus. Cor. 2labiata, lab. sup. 2-3fidum, inf. 2dentatum. Stam. declinata inaequalia receptaculo inserta, antheris geminis. Stigma 5lobum. Capf. 5locularis, placenta centrali, seminibus membrana laxa obvolutis. *Ericeae.*

1624. *Lacara*.* Cal. campanulatus 5dentatus. Pet. 5 unguiculata, summum imumque concava. Stam. fundo calycis inserta. Capf. pilosa. *Familia?*

1625. *Reichardia* Roth. Cal. campanulatus margine crenato. Cor. 6petala subpapilionacea. Stam. declinata basi villis nexa. Samara in alam oblongam desinens. *Leguminosae?*

Leguminosae.

1626. *Bauhinia.* Cal. irregularis 5fidus basi hians deciduus. Pet. 5 calyci inserta unguiculata, suprema majora. Stam. declinata, unico majori: saepe 5, 7 vel 9 abortiunt. Legumen elongatum polyspermum.

1627. *Cassia.* Cal. 5sepalus. Pet. 5, inferiora declinata. Stamina declinata inaequalia, inferiorum antherae elongatae apice poro gemino hiscentes. Legumen compressum subseptatum, interdum pulpa repletum.

1628. *Caesalpinia.* Cal. 5fidus inaequalis. Pet. 5, unicum insigne. Stamina basi pilosa. Legumen compressum oligospermum.

1629. *Hofmannseggia* Cav. Cal. 5partitus. Pet. 5, unguibus glanduloso-pilosis, supremum insigne. Stam. glanduloso-pilosa, unico abortiente. Stigma clavatum. Legumen gracile compressum.

1630. *Mezoneuron* Desf. Cal. 5partitus, lacinia infima maxima. Pet. 5, summum minus ceteris. Stam. declinata. Legumen membranaceum non dehiscens, nervo longitudinali percursum, ad quem figuntur semina.

1631. *Cubaea* Scop. Cal. 5lobus inaequalis persistens. Cor. 5petala subpapilionacea. Stamina inaequalia. Legumen compressum oligospermum.

1632. *Parkinsonia.* Cal. 5partitus. Pet. 5, infimum reniforme. Stam. subaequalia. Legumen moniliforme elongatum.

1633. *Afzelia* Sm. Cal. 4partitus. Pet. 4, supremum maximum. Stam. 2 abortientia. Legumen multiloculare, semina membrana obvoluta.

1634. *Hymenaea.* Cal. 4partitus. Cor. 5petala subpapilionacea, imo carinato. Pistillum setaceum elongatum. Legumen ligneum 1loculare, seminibus in pulpa farinosa nidulantibus.

1635. *Myrospermum* Jacqu. Cal. campanulatus, limbo obsolete dentato. Cor. 5petala subpapilionacea, supremo maximo obcordato. Stam. declinata. Legumen apice tumidum oligospermum basi membranaceum.

1636. *Anagyris.* Cal. 2labiatus 5dentatus. Cor. papilionacea, vexillo abbreviato, carina 2petala elongata. Legumen polyspermum.

1637. *Cercis.* Cal. urceolatus 5dentatus. Alae insignes divaricatae. Stam. inaequalia. Legumen compressum futura alata.

1638. *Anthonotha* P. B. Cal. 2lobus. Pet. 5, in quibus vexillum maximum, carina longe unguiculata 2loba. Stam. inaequalia, 3 majora perfectiora. Legumen magnum polyspermum.

Cor. papilionacea.

1639. *Sophora.* Cal. 5dentatus. Legumen moniliforme polyſpermum.

1640. *Podaliria* Lam. Cal. 5fidus inaequalis baſi intruſa. Stamina perſiſtentia baſi ſubconnata. Legumen ventricoſum polyſpermum.

1641. *Baptiſia* Vent. Cal. 2labiatus. Vexillum lateribus reflexis. Stamina decidua. Legumen ventricoſum polyſpermum.

1642. *Virgilia* Lam. Cal. 5fidus. Pet. longitudine aequalia. Vexillum planum. Stigma imberbe. Legumen compreſſum oblongum polyſpermum.

1643. *Cyclopia* Vent. Cal. 5fidus inaequalis baſi intruſa. Vexillum rugis longitudinalibus: alae plica transverſa. Stamina decidua. Stigma hinc barbatum. Legumen compreſſum polyſpermum.

1644. *Thermia* Nutt. Cal. 2labiatus. Petala longitudine ſubaequalia. Vexillum lateribus reflexis, carina obtuſa. Stamina perſiſtentia. Legumen lineare compreſſum polyſpermum.

1645. *Edwardſia* Salisb. Cal. 5dentatus. Legumen 4pterum polyſpermum.

1646. *Chorizema* Labill. Cal. 2labiatus. Carina ventricoſa alis brevior. Stylus uncinatus, ſtigmate oblique obtuſo. Legumen ventricoſum polyſpermum.

1647. *Podolobium* R. Br. Cal. 2labiatus. Carina compreſſa alas aequans. Stylus aſcendens. Legumen ſtipitatum lineari-oblongum.

1648. *Oxylobium* Andr. Cal. 5partitus. Carina compreſſa alas aequans. Stylus aſcendens. Legumen ovatum acutum polyſpermum.

1649. *Gompholobium* Sm. Cal. 5partitus ſubaequalis. Vexillum planum. Legumen ſubgloboſum obtuſiſſimum polyſpermum.

1650. *Sphaerolobium* Sm. Cal. 2labiatus. Stylus apice hinc membrana acutus. Legumen globoſum 1ſpermum.

1651. *Gaſtrolobium* R. Br. Cal. 2labiatus. Petala longitudine aequalia. Stylus ſubulatus aſcendens. Legumen ventricoſum. Semina 2ſtrophiolata.

1652. *Calliſtachys* Vent. Cal. 2labiatus. Vexillum erectum. Legumen ſtipitatum lignoſum polyſpermum apice dehiſcens, ante maturitatem multiloculare.

1653. *Euchilos* R. Br. Cal. 2labiatus, lab. ſup. maximo, baſi 2bracteatus. Germen ſtipitatum. Legumen compreſſum ſub-1ſpermum. Strophiolus ſeminis lobis poſticis integris.

1654. *Pultenaea* Sm. Cal. 5fidus 2bracteatus. Germen ſeſſile. Legumen 2ſpermum. Strophiolus ſeminis lobis poſticis inciſis.

1655. *Sclerothamnus* R. Br. Cal. 2labiatus 2bracteatus. Germen pedicellatum. Legumen ventricoſum 1ſpermum.

1656. *Daviesia* Sm. Cal. 5fidus ebracteatus. Carina petalis reliquis minor. Germen pedicellatum. Legumen compreſſum angulatum elaſtice dehiſcens 1ſpermum. Strophiolus ſeminis poſtice integer.

1657. *Eutaxia* R. Br. Cal. 2labiatus. Vexillum latum. Stylus uncinatus. Stigma capitatum. Legumen ventricoſum ſub-1ſpermum. Semina ſtrophiolata.

1658. *Dillwynia* Sm. Cal. 2labiatus. Stamina et petala tubo calycis medio inſerta. Vexillum latum divaricato-bilobum. Stylus uncinatus. Legumen ventricoſum 2ſpermum. Semina ſtrophiolata.

1659. *Aotus* Sm. Cal. 2labiatus. Stamina decidua. Stylus filiformis. Legumen 2ſpermum.

1660. *Viminaria* Sm. Cal. 5dentatus angulatus. Legumen coriaceum evalve farctum 1ſpermum.

1661. *Jackſonia* R. Br. Cal. 5partitus. Stam. decidua. Legumen 2valve ovatum 1ſpermum, valvis intus pubeſcentibus.

1662. *Burtonia* R. Br. Cal. 5partitus. Petala longitudine aequalia. Legumen ſubrotundum 1ſpermum intus laeve.

1663. *Brachyſema* R. Br. Cal. baſi ventricoſus 5fidus. Vexillum breviſſimum. Germen ſtipitatum baſi vaginulatum. Legumen ventricoſum polyſpermum.

1664. *Mirbelia* Sm. Cal. 2labiatus. Legumen 2loculare 2ſpermum, ſutura inflexa.

1665. *Ormoſia* Jackſ. Cal. 2labiatus. Stigmata 2, inferius incurvum. Legumen compreſſum lignoſum ſub-2ſpermum.

II. *Flores imperfecti.*

1. *Fructus ſuperi.*

1666 *Samyda*. Cal. coloratus perſiſtens 5fidus. Urceolus ſtriatus ſtaminifer. Capſ. 4-5valvis polyſperma. *Samydeae*.

1667. *Caſearia*. Cal. ſub-4fidus perſiſtens. Urceolus ſtaminifer glandulis totidem ſtipitatis interruptus. Stigma 3lobum. Capſ. baccata 3valvis. Semina baccata. *Samydeae*.

1668. *Augea* Thunb. Cal. 5partitus. Urceolus ſtaminifer ſubcontinuus. Capſ. 10locularis. *Familia?*

1669. *Aquilaria* Cav. Cal. 5partitus. Urceolus crenatus, intus ſtamina ſetacea gerens. Capſ. 2locularis 2valvis 2ſperma: ſemina in pulpa fungoſa. *Samydeae*.

1670. *Daïs*. Flores capitati involucrati. Cal. baſi ventricoſus tubuloſus, limbo ſub-5fido. Stam. tubo inſerta. Bacca 1ſperma. *Thymelaeae*.

1671. *Rhynchotheca* R. et P. Cal. 5ſepalus. Stylus breviſſimus, ſtigmatibus 5 elongatis. Cocci 5 1ſpermi ſuperne caudati. *Geranieae*.

1672. *Heterodendron* Desf. Cal. urceolatus margine repando. Filamenta breviſſima. Antherae 4gonae 2loculares. Styl. 0. Germina 4 globoſa. *Terebinthaceae*.

1673. *Stylobaſium* Desf. Flores polygami. Cal. urceolatus 5lobus. Antherae 4loculares (?) Stylus lateralis ſtigmate capitato. Drupa ſub-1ſperma. *Terebinthaceae*.

1674. *Calpidia* Thuar. Cal. campanulatus coloratus baſi perſiſtens. Stam. baſi calycis inſerta. Antherae 2lobae. Nux 1ſperma calycis baſi formata. *Nyctagineae*.

1675. *Darwinia* Rudg. Cal. corollinus tubuloſus, limbo 5fido. Antherae duplici ſerie fauci corollae inſertae, filamentis breviſſimis. Stylus longiſſime exſertus. Germen ſuperum. *Familia?*

1676. *Hardwickia* Roxb. Cal. corollinus 5ſepalus. Stam. alterna longiora. Stylus aſcendens. Legumen lanceolatum 1ſpermum. *Leguminoſae*.

1677. *Copaifera*. Cal. 4partitus patens. Antherae 2loculares. Legumen oligoſpermum. *Leguminoſae*.

1678. *Crudia* Schreb. Cal. 4partitus. Legumen maximum elatum. *Leguminoſae*.

1679. *Diplochlaena* R. Br. Involucrum multiflorum ext. 5partitum, int. 10phyllum. Cal. 5paleaceus. Filamenta elongata baſi piloſa perſiſtentia. Folliculi 5 1ſpermi. *Rutaceae*.

1680. *Adenoſtemon* Perſ. Cal. corollinus 7ſepalus. Stamina triplici ſerie ſenſim minora. Glandulae duae ad baſin filamenti. Stigma diviſum. Drupa nuce 2-3loculari. *Familia?*

1681. *Queria* Löfl. Cal. 5partitus. Stam. inaequalia, ſaepe alterna abortientia. Capſ. 1locularis 3valvis 1ſperma. *Paronychiae.*

2. *Fructus inferi.*

1682. *Terminalia.* Flores polygami. Cal. 5fidus interne piloſus. Drupa 1ſperma. *Bucideae.*

1683. *Bucida.* Flores ☿. Cal. campanulatus 5dentatus. Stamina duplici ſerie, alterna longiora. Antherae geminae. Drupa 1ſperma. *Bucideae.*

1684. *Gimbernatia* R. et P. Flores polygami. Cal. campanulatus 5fidus. Drupa 1ſperma inaequaliter alata. *Bucideae.*

1685. *Getonia* Roxb. Cal. 5ſepalus perſiſtens. Filamenta alterna latiora, et in limbo calycis. Achenium 5ſtriatum calyce coronatum. *Onagrae?*

DIGYNIA.

1686. *Royena.* Cal. urceolatus 5fidus. Cor. urceolata 5loba. Stam. corollae inſerta. Styli coaliti. Bacca ſupera 4locularis ſubdiſperma. *Styraceae.*

1687. *Turaria* Molin. Cal. tubuloſus 5fidus. Cor. 1petala. Antherae didymae. Capſ. 2locularis 2ſperma. *Styraceae.*

1688. *Adraſtea* Cand. Cal. 5ſepalus cuſpidatus. Pet. 5. Antherae loculis lateralibus elongatis. Fructus? *Dilleniceae.*

1689. *Recchia* Seſſ. Cal. 5ſepalus. Pet. 5. denticulata. Stigmata capitata. Fructus? *Dilleniceae.*

1690. *Hydrangea.* Cal. 5dentatus. Pet. 5. Stam. alterna longiora. Capſ. 2locularis calyce ſtylisque coronata. *Saxifrageae?*

1691. *Cunonia.* Cal. 5ſepalus. Pet. 5. Antherae didymae. Folliculi 2 connati ſtylis coronati: ſemina triquetra. *Ericeae.*

1692. *Tiarella.* Cal. corollinus 5partitus. Pet. 5 anguſta longe unguiculata. Capſ. 1locularis 2valvis. *Saxifrageae.*

1693. *Mitella.* Cal. ventricoſus 5dentatus. Pet. 5 pinnatifida. Stigmata 2 ſeſſilia. Capſ. 1locularis 2valvis obtuſa. *Saxifrageae.*

1694. *Saxifraga.* Cal. 5fidus perſiſtens. Pet. 5. Capſ. 2roſtris, diſſepimento placentifero, ſeminifera. *Saxifrageae.*

1695. *Gypſophila.* Cal. angulatus 5fidus. Pet. 5. Capſ. 1locularis 5valvis. *Caryophylleae.*

1696. *Saponaria.* Cal. cylindricus baſi nudus. Petala 5 unguiculata. Capſ. oblonga 1locularis.

1697. *Dianthus.* Cal. tubuloſus baſi ſquamis ſuffultus. Pet. 5. Stamina tum petalorum baſi tum annulo perigyno inſerta. Capſ. 1locularis apice dehiſcens. *Caryophylleae.*

1698. *Trianthema.* Cal. corollinus 5fidus ſub apice mucronatus. Styli ſaepe connati. Capſ. circumſciſſa 2locularis. *Portulaceae.*

1699. *Scleranthus.* Cal. urceolatus 5fidus. Caryopſis 1 in baſi calycis perſiſtentis. *Chenopodeae.*

1700. *Chryſoſplenium.* Cal. corollinus ſuperus 4-5lobus. Capſ. 2partibilis polyſperma, ſeminibus fundo affixis. *Saxifrageae.*

1701. *Pachynema* R. Br. Cal. 5ſepalus perſiſtens. Pet. 5 (ex ic. Leſſert.) 0 (e Cand.) Filamenta craſſiſſima. Ovaria 2 ſupera. *Dilleniceae.*

TRIGYNIA.

1702. *Bombix* Lour. Cal. inferus 2partitus. Pet. 5. Stam. alterna longiora: antherae 2loculares. Bacca ovata 3locularis. *Familia?*

1703. *Deutzia* Thunb. Cal. inferus campanulatus 5fidus. Pet. 5 obtusa. Filamenta apice 3fida. Capf. 3locularis polyfperma. *Familia?*

1704. *Malpighia*. Cal. 5partitus extus glandulofus. Pet. unguiculata. Stamina bafi fubconnata. Drupa 3pyrena. *Malpighieae.*

1705. *Galphimia* Cav. Cal. 5partitus eglandulofus. Pet. unguiculata. Capf. 3cocca, coccis dorfo dehifcentibus. *Malpighieae.*

1706. *Banifteria*. Cal. 5partitus extus glandulofus. Pet. unguiculata. Styli apice plani. Samarae 3 1alatae. *Malpighieae.*

1707. *Vargafia* Berter. Cal. 5partitus eglandulofus. Pet. fubfeffilia. Styli bafi connati apice revoluti. Samara apice alata. *Malpighieae.*

1708. *Triopteris*. Cal. 5partitus extus glandulofus. Pet. unguiculata. Samarae 3-4alatae. *Malpighieae.*

1709. *Hiraea* Jacqu. Cal. 5partitus glandulofus f. eglandulofus. Pet. unguiculata. Achenia 3 dorfo criftata, ala membranacea cincta. *Malpighieae.*

1710. *Erythroxylon*. Cal. 5partitus. Pet. bafi fquama plicata aucta. Staminа bafi cohaerentia. Drupa 1fperma. *Familia?*

1711. *Schinus*. Flores dioeci. Cal. 5partitus. Pet. 5. Stylus 0. Stigmata 3. Bacca 3locularis 3fperma. *Terebinthaceae.*

1712. *Stellaria*. Petala 2fida. Capf. 1locularis fub-6valvis polyfperma. *Caryophylleae.*

1713. *Arenaria*. Petala integra. Capf. 1locularis femi-3-5-6-valvis polyfperma. *Caryophylleae.*

1714. *Cucubalus*. Petala 2fida. Capf. baccata. *Caryophylleae.*

1715. *Silene*. Petala 2fida, fauce (plerumque) coronata. Capf. bafi 3locularis. *Caryophylleae.*

1716. *Cherleria*. Cal. 5fepalus. Pet. minima emarginata. Capf. 3valvis oligofperma. *Caryophylleae.*

1717. *Garidella*. Cal. corollinus 5fepalus. Nectaria petaloidea 2labiata 2fida. Capf. 2-3 polyfpermae connatae. *Ranunculeae.*

1718. *Diaphora* Lour. Flores androgyni. Cal. 3valvis, interiore criftata. Cor. 2valvis calyce longior. Antherae fubfeffiles apice caudatae receptaculo paleaceo, infertae. Styl. 0. Stigmata 3. *Gramen.*

TETRAGYNIA.

1719. *Micropetalon* Perf. Cal. 5fepalus. Pet. 5 minutiffima aut 0. Stigmata 4 feffilia. Capf. ovata 4valvis. *Caryophylleae.*

PENTAGYNIA.

1720. *Ceraftium*. Cal. 5partitus. Pet. 2fida. Capf. 1locularis apice 10dentata. *Caryophylleae.*

1721. *Lychnis*. Cal. tubulofus 5dentatus. Petala unguiculata fauce (plerumque) coronata. Capf. 1locularis. *Caryophylleae.*

1722. *Spergula*. Cal. 5partitus. Pet. integra. Capf. 1locularis apice profunde dentata. *Caryophylleae.*

1723. *Bergia*. Cal. 5partitus. Pet. 5. Capf. 5locularis 5valvis. *Caryophylleae.*

1724. *Oxalis.* Cal. 5ſepalus. Pet. 5. Stamina alternà longiora. Capſ. 5gona 5locularis 5valvis, ſeminibus arillatis ad angulos loculorum fixis. *Oxalideae.*

1725. *Ledocarpon* Desf. Cal. 5partitus bracteis ſuffultus. Pet. 5. Stam. alterna longiora. Capſ. 5locularis, valvis introrſum flexis, polyſperma. *Oxalideae.*

1726. *Lancretia* Delil., Cal. 4-5ſepalus. Pet. 4-5. Stam. alterna breviora. Capſ. 5locularis 5valvis. *Hypericeae.*

1727. *Droſophyllum* Link. Cal. 5ſepalus. Pet. 5. Capſ. 1locularis 5valvis. *Droſereae.*

1728. *Grielum.* Cal. 5partitus. Pet. 5. Stam. perſiſtentia. Utriculi 5. *Geranieae.*

1729. *Penthorum.* Cal. 5partitus. Pet. 5 aut 0. Capſ. 5locularis 5roſtris, ſeminibus ad diſſepimenta fixis. *Sedeae.*

1730. *Sedum.* Cal. 5-6partitus. Pet. 5, 6. Squamae nectariferae ad baſin petalorum. Capſ. 5-6 aut plures discretae folliculares, ſeminibus ad ſuturam fixis. *Sedeae.*

1731. *Cotyledon.* Cal. 5partitus. Cor. 5partita. Squamae nectariferae in fundo corollae. Capſ. 5 folliculares, ſeminibus ad ſuturam fixis. *Sedeae.*

1732. *Suriana.* Cal. 5ſepalus. Pet. 5. Styli laterales. Capſ. 5 1ſpermae. *Roſaceae.*

1733. *Bieberſteinia* Steph. Cal. 5ſepalus irregularis perſiſtens. Petala 5 unguiculata. Styli centrales. Capſ. 5 1ſpermae. *Roſaceae.*

1734. *Joncquetia* Schreb. Cal. 5ſepalus. Pet. 5. Capſ. 1locularis 5valvis 5cocca. *Terebinthaceae.*

1735. *Robergia* Schreb. Cal. 5partitus. Pet. 5. Drupa 1ſperma, nuce 2valvi. *Terebinthaceae.*

1736. *Cneſtis* Juſſ. Cal. 5partitus. Pet. 5. Capſ. 5 2valves 1ſpermae. *Terebinthaceae.*

1737. *Spondias.* Cal. 5dentatus. Pet. 5. Drupa nuce 5locular, putamine echinato. *Terebinthaceae.*

1738. *Averrhoa.* Cal. 5ſepalus. Pet. 5. Stamina alterna longiora baſi annulo juncta. Bacca 5locularis, loculis oligoſpermis. *Terebinth.* — *Oxalid.*

1739. *Kiggelaria.* Flores dioeci. Cal. 5partitus. Pet. 5. Glandulae nectariferae 5 3lobae. Antherae apice foratae. Capſ. 1locularis 5valvis polyſperma. *Terebinthaceae.*

1740. *Smegmaria* W. Cal. 5partitus. Pet. 5, 6. Diſcus ſtelliformis nectarifer. Stam. 5 nectario, 5 receptaculo inſerta. Capſ. 5 ſtellatae 1loculares 2valves polyſpermae. *Familia?*

1741. *Coriaria.* Flores ſubdioeci. Cal. campanulatus 10fidus duplici ordine. Pet. 0. Styl. 0. Stigmata 5 ſubulata. Nuculae 1ſpermae. *Familia?*

DECAGYNIA.

1742. *Nevrada.* Cal. 5partitus. Pet. 5. Capſ. 10locularis calyce veſtita. *Portulaceae.*

1743. *Gaſtonia* Commerſ. Cal. ſuperus 1ſepalus truncatus. Pet. 5. Capſ. baccata 10locularis. *Aralicae.*

1744. *Phytolacca.* Cal. 5partitus inferus. Genitalia numero varia. Pet. 0. Bacca ſub-10locularis, loculis 1ſpermis. *Chenopodeae.*

CLASSIS X.

DECANDRIA.

MONOGYNIA.

1536. Panzera W.

falcata W. *Guiana.* Arbor excelſa, foliis pinnatis, floribus paniculatis. (Eperua Aubl.)

1537. Cyrta Lour.

agreſtis Lour. *Cochinchina.* Arbuscula, foliis ovatis ſerratis, floribus ſubracemoſis albis.

1538. Inocarpus Forſt.

edulis Forſt. *Inſ. Molucc. et ocean. auſtr.* Arbor, foliis alternis ovato-oblongis elongatis coriaceis integerrimis, floribus racemoſis albis.

1539. Styrax.

officinalis 1. St. foliis ovatis utrinque ſubattenuatis ſubtus villoſiusculis, racemis ſimplicibus paucifloris. *Aſia minor. Syria. Graecia.*

tomentoſus Humb. 2. St. foliis ovato-oblongis membranaceis acutis ſubtus tomentoſis, racemis ſimplicibus ſub-8floris. *Quito.*

albus Mart. 3. St. foliis oblongis utrinque attenuatis coriaceis ſubtus reticulatis tomentoſis, pedunculis paucifloris abbreviatis. *Braſil.*

Benzoin Dryand. 4. St. foliis oblongis acuminatis ſubtus tomentoſis, racemis compoſitis folia aequantibus. *Sumatra.*

grandifolius Ait. 5. St. foliis obovatis ſubtus villoſis, pedunculis inferioribus 1floris ſuperioribus racemoſis. *Amer. bor.* (St. officinalis Walt.)

pulverulentus Mx. 6. St. foliis ſubſeſſilibus obovatis obtuſis ſubtus pulverulento-tomentoſis, floribus axillaribus breviſſime pedunculatis. *Carolina.* (St. laevigatus Sims.)

laevigatus Ait. 7. St. foliis ovatis denticulatis glabris, axillis venarum subtus barbatis, pedunculis axillaribus 1floris calycibusque pubescentibus. *Carolina.* (St. glabrum Cav., americana Lam., laeve Walt.)

1540. POTALIA Aubl.

amara Aubl. *Guiana.* Arbuscula foliis oppositis oblongis, floribus corymbosis albo-luteis. (Nicandra Schreb. W.)

1541. ARBUTUS.

* *Arboreae.*

Unedo 1. A. foliis oblongis coriaceis glabris crenato-serratis, ramulis glanduloso-pilosis, paniculis terminalibus laevibus pendulis. *Europ. austr. Hibernia.*

canariensis Lam. 2. A. foliis oblongo-lanceolatis serratis subtus glaucis, paniculis erectis hispido-glutinosis. *Inf. Canar.*

hybrida Ker. 3. A. foliis oblongis acutis serratis glabris, ramulis pilosis, paniculae terminalis pendulae pedunculis pubescentibus, calycibus glabris. *Patria?* (A. andrachnoides Link.)

Andrachne 4. A. foliis oblongis obtusiusculis integerrimis subserratisque, panicula erectiuscula viscido-pubescente. *Graecia. Tauria. Asia minor.* (A. integrifolia Lam.)

laurifolia L. suppl. 5. A. foliis oblongis utrinque attenuatis argute serratis glabris, racemis axillaribus simplicissimis secundis. *Amer. bor.*

petiolaris Kunth. 6. A. foliis longe petiolatis oblongis mucronatis denticulatis membranaceis subtus tomentosis, racemis congestis abbreviatis. *Mexico.*

densiflora Kunth. 7. A. foliis oblongis acutis argute dentatis coriaceis subtus fusco-villosiusculis, panicula erecta terminali thyrsoidea. *Mexico.*

mollis Kunth. 8. A. foliis oblongis acutis argute dentatis coriaceis supra villosis subtus incano-tomentosis, panicula terminali thyrsoidea. *Mexico.*

phillyreaefolia Pers. 9. A. ramis divaricatis, foliis lanceolatis acuminatis glabris argute serratis, floribus axillaribus. *Peru.*

xalapensis Kunth. 10. A. foliis oblongis acutis integerrimis supra glabris subtus fusco-tomentosis, panicula erecta pubescente. *Mexico.*

ferruginea L. suppl. 11. A. foliis oblongis obtusis glabris integerrimis, racemis terminalibus. *Nov. Granat.*

Menziesii Pursh. 12. A. foliis ovalibus integerrimis glabris longe petiolatis, paniculis axillaribus congestis. *Ora occid. Amer. bor.*

** *Frutescentes.*

tomentosa Pursh. 13. A. foliis subcordato-oblongis acutis subtus tomentosis, racemis subcapitatis pedunculatis axillaribus. *Ora occid. Amer. bor.*

mucronata Forst. 14. A. foliis ovato-oblongis cuspidatis serratis rigidis utrinque nitidis, pedunculis axillaribus 1floris cernuis. *Ad fretum Magellan.*

microphylla Forst. 15. A. foliis ovatis acutis serratis, pedunculis axillaribus abbreviatis. *Ad fretum Magellan.* (A. serpyllifolia Lam.)

pumila Forst. 16. A. caule prostrato, foliis alternis distichis oblongis subintegerrimis, pedunculis axillaribus 1floris elongatis. *Ad fretum Magellan.* (Andromeda empetrifolia Lam.)

1542. ARCTOSTAPHYLOS Adans.

Uva ursi * 1. A. caule procumbente fruticoso, foliis obovatis integerrimis coriaceis nitidis, floribus fasciculatis. *Europ. et Amer. bor.* (Arbutus L.)

alpina * 2. A. caule fruticoso, foliis deciduis oblongis serratis reticulato-rugosis subtus albidis, racemis terminalibus. *Alp. Helvet. Regio arctica Europ. Asiae et Amer.* (Arbutus L.)

pungens Kunth. 3. A. caule erecto fruticoso, foliis ovato-oblongis acutis mucronatis coriaceis utrinque tenuissime pubescentibus, racemis terminalibus. *Mexico.*

glaucescens Kunth. 4. A. caule fruticoso, foliis oblongis obtusis mucronatis coriaceis subtus glaucis, racemis terminalibus secundis. *Mexico.*

polifolia Kunth. 5. A. caule erecto fruticoso, foliis lineari-lanceolatis margine revolutis integerrimis subtus glauco-pubescentibus, racemis terminalibus. *Mexico.*

1543. ENCYANTHUS Lour.

quinqueflorus Lour. 1. E. caule arboreo, floribus quinis. *China austr.*

biflorus Lour. 2. E. caule fruticoso, floribus geminis. *China austr.*

1544. GAULTHERIA.

* *Pedunculis unifloris.*

procumbens 1. G. foliis oblongis utrinque attenuatis mucronatis subserratis coriaceis utrinque glabris, caule decumbente, pedunculis nutantibus. *Amer. bor.*

buxifolia W. 2. G. foliis subrotundo-ovatis obtusis dentatis coriaceis subtus punctato-scabris, caule erecto, ramis hirtis, pedunculis filiformibus. *Caracas.*

anastomosans Kunth. 3. G. foliis ovatis acutis obsolete denticulatis supra nitidis subtus reticulato-venosis strigoso-hirsutis, pedunculis pilosis. *Amer. austr.* (Andromeda anastomosans Mut. L. suppl. glomerata Cav.)

purpurascens Kunth. 4. G. foliis elliptico-oblongis utrinque attenuatis serrulatis subtus purpurascentibus pedunculisque hirsutis. *Nov. Granat.*

myrsinoides Bonpl. 5. G. foliis ovato-oblongis acutis apice crenato-denticulatis supra nitidis, pedunculis pubescentibus. *Nov. Granat.*

** *Floribus racemosis.*

scabra W. 6. G. foliis cordato-ovatis acutis denticulatis scabris subtus reticulato-venosis, racemis simplicibus, calycibus glanduloso-pilosis. *Caracas.*

odorata W. 7. G. foliis subcordato-oblongis cuspidatis argute denticulatis supra nitidis subtus scabris, ramis racemisque glanduloso-pilosis. *Nov. Granat.*

erecta Vent. 8. G. foliis ovatis mucronatis ferrugineo-hirsutis, ramis racemisque glanduloso-viscosis. *Peru.*

Shallon Pursh. 9. G. foliis subcordato-ovatis acutis coriaceis serrulatis utrinque glabris, racemis ferrugineo-pubescentibus. *Ora occid. Amer. bor.*

fragrantissima Wall. 10. G. foliis ovato-lanceolatis serratis subtus reticuloso-punctatis, ramis flexuosis, racemis pubescentibus. *Nepal.*

hispida * 11. G. foliis oblongis utrinque rotundatis apice callosis integerrimis margine revolutis utrinque hispidulis, ramis hirtis, racemis terminalibus strictis secundis viscoso-pilosis. *Brasil.* Sello.

tomentosa Kunth. 12. G. foliis oblongis acutis subintegerrimis margine revolutis supra glabris subtus ferrugineo-tomentosis, racemis terminalibus erectis floribusque tomentosis. *Quito.* (Andromeda bractea-ta Cav.?)

rigida Kunth. 13. G. foliis subcordato-oblongis acutis argute denticulatis utrinque glabris, racemis pubescentibus. *Cumana.*

cordifolia Kunth. 14. G. foliis profunde cordatis ovatis acutis serrulatis coriaceis subtus racemisque glanduloso-pilosis, corollis glutinosis. *Nov. Granat.*

coccinea Kunth. 15. G. foliis subrotundo-ovatis acutiusculis denticulatis supra nitidis subtus scabris, racemis corollisque glanduloso-pilosis. *Caracas.*

reticulata Kunth. 16. G. foliis oblongis utrinque attenuatis crenulato-serratis supra nitidis subtus reticulato-venosis, racemis pubescentibus, corollis glabris. *Quito.*

antipoda Forst. 17. G. foliis ovato-subrotundis denticulatis utrinque reticulato-venosis glaberrimis, ramis tomentosis, racemis paniculatis subhirsutis, corollis glabris. *Nov. Zeeland.*

1545. EPIGAEA.

repens 1. E. caule repente fruticoso ferrugineo-hirsuto, foliis cordato-oblongis obtusiusculis integerrimis hirsutis, racemis subspicatis, corollis cylindricis. *Amer. bor.*

cordifolia Sw. 2. E. caule erectiusculo fuſco-ſtrigoſo, foliis cordato-ſubrotundis rigidis hiſpidis venoſis ſerrulato-ſetoſis, racemis ſubſpicatis, corollis ovatis. *Guadalupa. Cayenna.* (Gaultheria ſphagnicola Rich.)

1546. ANDROMEDA.

* *Pedunculis ſolitariis uniflöris.*

† *Foliis imbricatis.*

tetragona 1. A. foliis 4fariam imbricatis appreſſis ſub-3quetris obtuſis glabris, pedunculis elongatis, corollis campanulatis. *Regio arctica Europ. Aſiae et Amer.*

lycopodioides Pall. 2. A. foliis 4fariam imbricatis appreſſis obtuſiusculis abbreviatis, pedunculis geminis axillaribus, corollis campanulatis. *Camtſchatca. Inſ. Aleut.*

faſtigiata Wall. 3. A. foliis 4fariam imbricatis lanceolato-ſagittatis revolutis, floribus axillaribus. *Nepal. Mongolia.*

cupreſſiformis Wall. 4. A. foliis 4fariam imbricatis ovatis 3gonis margine membranaceis apice ariſtatis, pedunculis villoſis. *Nepal.*

ericoides Pall. 5. A. foliis appreſſis convexis ſetaceo-ciliatis, corollis globoſis (Sandris?). *Dauuria. Camtſchatca.*

hypnoides 6. A. foliis conferto-imbricatis erectis lineari-ſubulatis, pedunculis elongatis, corollis campanulatis. *Regio arctica Europ. Aſiae et Amer.*

†† *Foliis ſparſis.*

calyculata 7. A. foliis ovali-oblongis obtuſis obſolete ſerrulatis ſubmucronatis utrinque lepidotis, pedunculis axillaribus ſecundis abbreviatis. *Boruſſia orient. Ruſſia. Sibiria. Amer. bor.*

myrſinites Lam. 8. A. foliis ovato-oblongis argute ſerratis glabris, pedunculis axillaribus breviſſimis. *Ad fretum Magellan.*

criſpa Desf. Link. 9. A. foliis ſpathulato-lanceolatis undulato-criſpis ſubtus ferrugineo-lepidotis, pedunculis abbreviatis. *Carolina.* (A. anguſtifolia Pursh.)

proſtrata Cav. 10. A caule fruticoſo proſtrato, foliis ovatis acutis ſubſerratis glabris, pedunculis axillaribus abbreviatis. *Peru.*

** *Pedunculis uniflöris aggregatis.*

polifolia 11. A. fruticoſa, foliis lineari-lanceolatis margine revolutis ſupra nitidis ſubtus glaucis, pedunculis terminalibus ſubumbellatis coloratis corolla ter longioribus, laciniis calycinis ovatis. *Europ. Aſia et Amer. bor.*

rosmarinifolia Pursh. 12. A. fruticoſa, foliis linearibus margine revolutis ſubtus glaucis, pedunculis terminalibus ſubaggregatis corolla longioribus. *Amer. bor.* (A. glaucophylla Link.)

jamaicenſis Sw. 13. A. fruticoſa, foliis oblongis obtuſis ſubcoriaceis ſupra nitidis ſubtus ſublepidotis, pedunculis confertis aggregatis calycibusque ſquamatis. *Jamaica.*

mariana 14. A. fruticoſa, foliis oblongis utrinque attenuatis integerrimis deciduis, pedunculis ramorum aphyllorum aggregatis, calycibus foliaceis elongatis, corollis ovato-cylindricis. *Amer. bor.*

ſpecioſa Mx. 15. A. fruticoſa, foliis ovato-oblongis ſerratis ſempervirentibus reticulato-venoſis ſubtus glaucescentibus, pedunculis ramorum aphyllorum aggregatis, corollis campanulatis. *Amer. bor.* (A. caſſinaefolia Vent., pulverulenta Bartr.)

† *rhomboidalis* Ham. 16. A. fruticoſa, ramis floriferis Squetris, foliis ſubrhomboideo-oblongis cartilagineis glabris ſubtus ferrugineis integerrimis apice calloſis, pedunculis axillaribus elongatis filiformibus. *Florida.*

**** Floribus racemoſis ſ. paniculatis.*

faſciculata Sw. 17. A. arborea, foliis oblongis obtuſis ſubcrenulatis coriaceis, racemis petiolo brevioribus, pedunculis aggregatis deflexis. *Jamaica.*

ſalicifolia Lam. 18. A. arborea, foliis lanceolatis acuminatis integerrimis ſubtus albidis 3nerviis, racemis terminalibus ſecundis. *Inſ. Mascaren.*

buxifolia Lam. 19. A. fruteſcens, foliis cordato-ovatis integerrimis mucronulatis ſubtus albido-tomentoſis, racemis terminalibus ſecundis. *Inſ. Mascaren.*

rupeſtris Forſt. 20. A. fruteſcens, foliis oblongis ſerrulatis, racemis ſimpliciſſimis bracteatis, corollis campanulatis. *Nov. Zeeland.*

nitida Mx. 21. A. fruticoſa, ramis ſub-3quetris, foliis oblongis acuminatis integerrimis coriaceis nitidis, racemis axillaribus, corollis cylindricis. *Carolina. Florida.* (A. coriacea Ait., lucida Lam., mariana Jacq.)

acuminata Ait. 22. A. fruticoſa, foliis ovato-lanceolatis acuminatis ſubſerrulatis coriaceis nitidis reticulato-venoſis, racemis corymboſis axillaribus breviſſimis, pedicellis nutantibus. *Georgia. Florida.* (A. lucida Jacq., populifolia Lam., laurina Mx., reticulata Walt.)

ſpinuloſa Pursh. 23. A. fruticoſa, foliis ovato-oblongis acuminatis ſubſerrulatis, ſerraturis appreſſo-ſpinuloſis, racemis ſubſpicatis axillaribus bracteatis ſecundis. *Carolin. auſtr.* (A. Catesbaei Walt.)

axillaris Ait. 24. A. fruticoſa, foliis oblongis utrinque attenuatis cartilagineo-ſerratis coriaceis glabris lucidis, petiolis ramulisque glanduloſo-piloſis, racemis ſpicatis axillaribus bracteatis, floribus confertis. *Amer. bor.* (A. Walteri W.)

racemoſa 25. A. fruticoſa, foliis oblongo-lanceolatis acutis ſerrulatis membranaceis glabris, racemis terminalibus elongatis ſubſimplicibus bracteatis, co-

rollis cylindricis, antheris apice geminatim 4aristatis. *Amer. bor.* (A. paniculata Walt.)

bracamorensis Kunth. 26. A. arborescens, foliis ovato-oblongis obtusiusculis integerrimis margine revolutis coriaceis utrinque glabris, racemis erectis subsolitariis. *Nov. Granat.* Humb.

revoluta * 27. A. foliis ovato-oblongis obtusis mucronatis coriaceis margine revolutis integerrimis utrinque glabris, racemis axillaribus nutantibus. *Brasil.*

pubescens Poir. 28. A. foliis ovatis obtusis coriaceis integerrimis supra nitidis subtus pubescentibus, racemis brevissimis fasciculatis. *Inf. Carib.* (A. rubiginosa Pers.)

eriophylla Vand. 29. A. foliis subrotundo-ovatis integerrimis apice callosis supra tomentosis subtus lanatis, racemis terminalibus secundis bracteatis. *Brasil.*

ilicifolia Pers. 30. A. foliis late cordatis basi subdentatis coriaceis glaberrimis, floribus racemoso-paniculatis. *Peru.*

pyrifolia Pers. 31. A. foliis ovatis acuminatis integerrimis paniculaque glabris. *Inf. Mascaren.*

japonica Thb. 32. A. foliis lanceolatis basi attenuatis apice crenulatis glaberrimis, racemis aggregatis terminalibus. *Japon.*

arborea 33. A. foliis oblongis acuminatis mucronato-serratis glabris, paniculis terminalibus, corollis pubescentibus, antheris muticis. *Amer. bor.*

floribunda Pursh. 34. A. foliis ovato-oblongis acutis serrulatis appresso-ciliatis glabris coriaceis, racemis secundis congesto-paniculatis, pedicellis 2bracteatis. *Georgia.*

1547. LYONIA Nutt.

ferruginea Nutt. 1. L. fruticosa, foliis obovatis integerrimis coriaceis margine revolutis subtus squamoso-farinosis reticulato-venosis, pedunculis axillaribus aggregatis 1floris furfuraceis. *Georgia. Florida.* (Andromeda Walt.)

rigida Nutt. 2. L. arborescens, foliis spathulato-lanceolatis integerrimis margine revolutis subtus lepidoto-tomentosis coriaceis, pedunculis axillaribus aggregatis 1floris furfuraceo-ferrugineis, corollis globosis, antheris muticis. *Carolina.* (Andromeda ferruginea Ait.)

paniculata Nutt. 3. L. foliis lanceolatis basi attenuatis subintegerrimis floribusque pubescentibus, paniculae ramis aggregatis. *Amer. bor.* (Andromeda paniculata L., racemosa Lam.)

frondosa Nutt. 4. L. foliis spathulatis serrulatis furfuraceo-hispidulis, ramis floriferis foliosis, glomerulis axillaribus paucifloris subsessilibus. *Amer. bor.* (Andromeda frondosa Pursh., racemosa Walt.)

1548. RHODODENDRON.

* *Arborea.*

maximum 1. Rh. foliis oblongis acutis ſubtus discoloribus glabris, umbellis terminalibus, calycis lacinis obtuſis ſubelongatis, corollis campanulatis. *Amer. boreal.*

ponticum 2. Rh. foliis oblongis glabris ſubtus concoloribus, corymbis terminalibus, calycis dentibus abbreviatis acutis, corollis campanulato-rotatis. *Aſia minor ad pontum.*

punctatum Andr. 3. Rh. foliis oblongis utrinque attenuatis glabris ſubtus ferrugineis reſinoſo-punctatis, umbellis terminalibus, calycis dentibus breviſſimis, corollae infundibuliformis laciniis obtuſis undulatis. *Amer. bor.*

arboreum Sm. 4. Rh. foliis oblongo-lanceolatis nitidis ſubtus pubeſcentibus, racemis terminalibus, capſulis loculicidaribus. *Ind. or.*

azaleoides Desf. 5. Rh. foliis oblongis opacis utrinque pubeſcentibus, corymbis terminalibus, laciniis calycis inaequalibus, corolla infundibuliformi. *Patria?*

** *Fruticoſa.*

dauricum 6. Rh. foliis oblongis utrinque attennatis glabris ſubtus ferrugineo-punctatis, floribus terminalibus ſubaggregatis, corollis rotatis. *Sibir.*

ferrugineum 7. Rh. foliis oblongis utrinque attenuatis ſupra glabris ſubtus ferrugineo-lepidotis, floribus ſubumbellatis, laciniis calycinis dentato-ciliatis, corollis infundibuliformibus. *Alp. Europ. et Aſiae med.*

chrysanthum Pall. 8. Rh. foliis oblongis ſubtus venoſo-reticulatis discoloribus glabris, umbellis terminalibus, corollis rotatis ſubirregularibus. *Dauuria.*

caucaſicum Pall. 9. Rh. foliis oblongis ſupra nitidis ſubtus evenis ferrugineo-tomentoſis, umbellis terminalibus, corollis rotatis. *Caucaſ.*

campanulatum Wall. 10. Rh. foliis elliptico-oblongis mucronulatis ſupra glabris ſubtus tomentoſis, corollae campanulatae laciniis planis integerrimis. *Emodi montes.*

anthopogon Wall. 11. Rh. ramulis villoſis, foliis ovalibus ſubtus dense tomentoſis, floribus capitatis, corollae hypocrateriformis fauce barbata, genitalibus inclusis. *Emodi montes.*

ſetoſum Wall. 12. Rh. ramulis undique ſetoſis, foliis ovalibus obtuſiſſimis ſubtus margineque ſetoſis, pedicellis glanduloſo-ſetoſis, dentibus calycinis breviſſimis. *Emodi montes.*

hirſutum 13. Rh. foliis ſubovalibus crenulatis ciliatis ſubtus reſinoſo-punctatis, floribus corymboſis, laciniis calycinis fimbriato-barbatis, corollis campanulatis. *Alp. Europ. med.*

catawbiense Mx. 14. Rh. foliis ovalibus glabris subtus discoloribus, corymbis compactis terminalibus, calycibus elongatis, corollis campanulatis. *Carolina.*

camtschaticum Pall. 15. Rh. foliis obovatis ciliatis nudis, pedunculis hirsutis subgeminis, calycibus amplis foliaceis, corollis rotatis. *Camtschatca. Ins. Aleut.*

Chamaecistus 16. Rh. foliis oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis rigidiusculis ciliatis, pedunculis subgeminis calycibusque glanduloso-pilosis, corollis rotatis. *Alp. rhaet. noric. carn. dinar.*

linearifolium Poir. 17. Rh. foliis linearibus coriaceis obtusis margine revolutis subtus ferrugineo-pubescentibus, floribus corymbosis, calycibus minutis obtusis velutinis. *Ind. or.*

lapponicum Wahlenb. 18. Rh. foliis oblongis obtusis rigidis foveolato-punctatis subtus discoloribus lepidotis, ramis divaricatis procumbentibus, pedunculis umbellatis, corollis campanulatis sub-5andris. *Regio arctica Europ. Asiae et Amer. bor.* (Azalea L.)

1549. KALMIA.

latifolia 1. K. foliis longe petiolatis subternis oblongis utrinque glabris subconcoloribus, corymbis terminalibus viscido-pubescentibus. *Amer. bor.*

glauca Ait. 2. K. foliis oppositis subsessilibus oblongis glabris margine revolutis subtus glaucis, corymbis terminalibus bracteatis, pedunculis calycibusque glaberrimis. *Amer. boreal.* (K. polifolia Wangenh.)

angustifolia 3. K. foliis petiolatis ternis oblongis obtusis subtus subferrugineis, corymbis lateralibus, bracteis linearibus, pedunculis calycibusque glanduloso-pubescentibus. *Amer. bor.*

cuneata Mx. 4. K. foliis sparsis sessilibus cuneato-oblongis apice subaristatis subtus pubescentibus, corymbis lateralibus paucifloris. *Carolina.*

hirsuta Walt. Lam. 5. K. foliis sparsis subsessilibus ellipticis calycibusque hirsutissimis, pedunculis axillaribus solitariis 1floris folia superantibus. *Carolin. austr.*

1550. PTEROSPORA Nutt.

andromedea Nutt. *Ad cataractas Niagarae et in insula fluvii Hudson.* Herba pedalis aphylla viscido-pilosa, floribus racemosis rubentibus.

1551. CODON.

Royeni *Rarissima Africae australis.* Burchell. Herba ramosa, foliis cordato-ovatis coriaceis repandis glabris, floribus solitariis albidis. (C. Royeni Thb. longe aliena planta.)

1552. CERATOSTEMMA Juss.

peruvianum Pers. — *Peru.* Frutex ramosus, foliis ovalibus coriaceis sessilibus, floribus paniculatis.

1553. THIBAUDIA Pav.

* *Floribus glabris.*

madagascarense * — 1. Th. foliis ovatis alternis, floribus axillaribus racemosis. *Madagascar.* (Cavinium Aub. Thuar.)

floribunda Mut. — 2. Th. foliis lanceolatis acuminatis elongatis venosis glabris, racemis axillaribus multifloris erectis. *Nov. Granat.*

longifolia Kunth. — 3. Th. foliis ovato-lanceolatis acuminatis elongatis coriaceis 3-5plinerviis, racemis axillaribus folio brevioribus. *Nov. Granat.* (Th. macrophylla et falcata Kunth.)

rupestris Kunth. — 4. Th. foliis spathulato-lanceolatis reticulato-venosis subtus ramisque pubescentibus, racemis axillaribus. *Nov. Granat.*

nitida Kunth. — 5. Th. foliis oblongis utrinque rotundatis coriaceis supra nitidis subtus punctatis, racemis axillaribus folio brevioribus. *Nov. Granat.*

melastomoides Kunth. — 6. Th. foliis subcordato-oblongis acutis supra glaberrimis subtus reticulato-5plinerviis punctatis, racemis axillaribus folio brevioribus bracteatis. *Nov. Granat.* (Th. strobilifera Kunth.)

Quereme Humb. — 7. Th. foliis ovato-oblongis utrinque attenuatis 5plinerviis, racemis elongatis laxis, bracteis nervosis. *Choco Amer. austr.*

ardisiaefolia Kunth. — 8. Th. foliis oblongis obtusis reticulato-costatis, racemis axillaribus pendulis. *Nov. Granat.*

** *Floribus pubescentibus.*

cordifolia Kunth. — 9. Th. foliis subcordato-oblongis obtusis coriaceis glaberrimis 5plinerviis, racemis terminalibus compactis bracteatis. *Nov. Granat.*

scabriuscula Kunth. — 10. Th. foliis subcordato-oblongis acuminatis 5plinerviis asperiusculis, nervis subtus pubescentibus, racemis terminalibus compactis bracteatis. *Nov. Granat.*

pubescens Bonpl. — 11. Th. foliis ovato-oblongis acuminatis 5plinerviis subtus pubescentibus, racemis axillaribus bracteatis. *Nov. Granat.*

1554. LUSSACIA *.

buxifolia * — *Nov. Granat.* Frutex ramosus, foliis confertis oblongis obtusis utrinque glandulosо-pubescentibus apice callosis, floribus racemosis bracteatis pilosis coccineis. (Gaylussacia Humb. Kunth.)

1555. POLYPHRAGMON Desf.

laricum Desf. *Inf. Timor.* **Frutex ramoſus, foliis oppoſitis oblongis utrinque attenuatis venoſis ſubtus ſericeis, pedunculis axillaribus ſolitariis 1floris.**

1556. MELASTOMA.

I. *Decandra.*

* *Foliis tri-triplinerviis.*

† *Floribus axillaribus.*

crenatum Vahl. 1. M. hiſpidum, foliis ſubcordatis oblongis acuminatis crenatis, racemis axillaribus paucifloris petiolos acquantibus. *Amer. auſtr.* (M. pauciflorum Desrouſſ.)

ledifolium Desr. 2. M. foliis oblongo-lanceolatis integerrimis glabriusculis ſubtus flavido-tomentoſis, pedunculis axillaribus 1floris 2bracteatis. *Peru. Braſil.* Sello.

ſeſſilifolium 3. M. foliis oblongis baſi attenuatis ſeſſilibus integerrimis ſubtus tomentoſis, pedunculis lateralibus aggregatis 1floris. *Jamaica.*

involucratum Desr. 4. M. foliis ellipticis ſerrulatis glabris ſubtus pallidis, floribus axillaribus pedunculatis involucratis. *Hiſpaniola.*

marginatum Desr. 5. M. foliis ovato-lanceolatis acuminatis marginato-ciliatis ſubtus purpuraſcentibus hirſutiusculis, pedunculis brevibus paucifloris, calyce echinato. *Braſil.*

ramiflorum Sw. 6. M. foliis oblongis utrinque attenuatis ſupra aureis laevibus ſubtus ferrugineo-tomentoſis, pedunculis 1floris confertis. *Jamaica. Hiſpaniola.*

ſuccoſum Aubl. 7. M. foliis oblongis utrinque attenuatis integerrimis ſubtus tomentoſis, floribus lateralibus confertis ſeſſilibus, petalis denticulatis. *Guiana.*

albeſcens Aubl. 8. M. foliis ovatis acutis integerrimis glabris, cymis lateralibus bracteatis. *Guiana.*

†† *Floribus terminalibus.*

cabelioides Ker. 9. M. foliis oblongis ciliatis ſubtus pallidis, floribus terminalibus aggregatis, calycibus apice ſetoſis. *Inf. Mascaren.*

ſtrigoſum 10. M. caule fruticoſo foliisque ovatis obſolete 3nerviis ſtrigoſo-lineatis, floribus terminalibus ſolitariis, calycibus hirtis. *Nov. Granat. Guadalupa in cacumine vulcani.* Bertero. *Martinic.*

grossularioides 11. M. foliis ſubrotundo-ovatis acuminatis denticulatis glabris, floribus racemoſis. *Surinam.*

aſperum 12. M. foliis ovato-lanceolatis acutis ſcabris ſubtus flaveſcentibus, ramis aſperis, floribus ſubracemoſis paucis terminalibus. *Ind. or.*

hiſpidum Sw. 13. M. foliis cordato-ovatis rigidis ſubdenticulatis glabris ſubtus ſcabris, panicula terminali trichotoma ferrugineo-hirta. *Jamaica.*

denſiflorum Vahl. 14. M. foliis oblongis utrinque attenuatis ſerrulatis ciliatis ſupra glaberrimis, petiolis villoſis, pani-

culae ramis ſpicato-glomeratis. *Guiana. Portorico.* (M. racemoſa Aubl.)

montanum **Sw.** 15. M. foliis oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis crenulatis glabris, panicula erecta trichotoma, calycibus truncatis. *Jamaica. Hiſpaniola.*

procerum **Sw.** 16. M. foliis ovato-oblongis acuminatis elongatis glaberrimis ſubintegerrimis, panicula elongata diffuſa, calycibus truncatis. *Ind. occid.* (M. trichotomum Desr. Matuba N. E.)

aſcendens **Sw.** 17. M. caule fruticoſo ſcandente, foliis ovato-oblongis acuminatis denticulatis glabris, panicula compacta ovata ferruginea, antheris vaginatus. *Jamaica. Portorico.* (M. portoricenſe N. E.)

holoſericeum 18. M. foliis cordato-oblongis integerrimis ſupra lucidis ſubtus incano-ſericeis, ſpicis paniculatis 2partitis, floribus confertis 2ſeriatis. *Braſil.*

† ***velutinum*** **W.** 19. M. foliis ovatis acutis integerrimis ſeſſilibus rigidoſo-ſericeis, racemis brachiatis, ramis 2partitis, caule 4quetro. *Jamaica. Braſil.* (M holoſericeum Sw.)

lanceolatum **Desr.** 20. M. foliis anguſte lanceolatis denticulatis ſubtus ramisque ferrugineo-tomentoſis, panicula terminali trichotoma. *Hiſpaniola.*

glabrum **Forſt.** 21. M. foliis oblongis utrinque attenuatis integerrimis glabris, nervis ſolis binis marginalibus, floribus racemoſis. *Inſ. Societ.* (Conoſtegia Don.)

chryſophyllum **Desr.** 22. M. foliis ovato-oblongis acutis integerrimis ſubundulatis glaberrimis ſubtus auratis, panicula terminali. *Madagascar.*

quadrangulare **Sw.** 23. M. foliis late lanceolatis utrinque attenuatis elongatis integerrimis glaberrimis ſubtus pallidis, nervis ſanguineis, floribus ſpicato-verticillatis paniculatis. *Jamaica.* (M. trinervium Sw.)

punctatum **Desr.** 24. M. foliis lanceolatis integerrimis ſubtus furfuraceo-ochroleucis foveolato-punctatis, panicula terminali, floribus ſecundis. *Hiſpaniola.*

cornifolium **Desr.** 25. M. foliis ovatis acuminatis integerrimis ſubtus reticulato-venoſis, panicula terminali, calycibus turbinatis circumſciſſis. *Martinica.*

myricoides **Desr.** 26. M. foliis ovatis acutis denticulatis villoſiuſculis, panicula terminali trichotoma, fructibus granuloſis. *Inſ. Antill.*

pallens * 27. M. foliis oblongis acuminatis integerrimis incano-ſubtomentoſis, panicula trichotoma terminali, calycibus turbinatis truncatis. *Hiſpaniola.*

aſtrolaſion * 28. M. foliis ovato-oblongis coriaceis integerrimis ſtellato-pubeſcentibus ſupra nitidis ſubtus ferrugineo-tomentoſis, paniculae terminalis ramis verticillatis tomentoſis. *Hiſpaniola.* Bertero.

paroiflorum **Aubl.** 29. M. foliis oblongo-lanceolatis elongatis utrinque attenuatis denticulatis glabris, panicula terminali diffuſa, floribus exiguis. *Guiana. Braſil.*

longifolium **Aubl.** 30. M. foliis ſuperioribus quaternis oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis elongatis integerrimis glabris, panicula ſupradecompoſita terminali. *Guiana.*

praſinum Sw. 31. M. foliis lato-lanceolatis utrinque glabris integerrimis lividis, panicula ramoſiſſima terminali. *Guiana. Ind. occid.* (M. laevigatum Aubl.)

mexicanum Humb. 32. M. foliis lanceolatis utrinque attenuatis denticulatis glabris, panicula terminali, calycibus irregulariter fiſſis. *Mexico.*

reclinatum Humb. 33. M. foliis ovali-oblongis ſubintegerrimis glaberrimis patenti-reflexis, panicula terminali recurva. *Peru.*

loxenſe Humb, 34. M. foliis oblongis acutiusculis ſerrulatis ſubtus floccoſo-pulverulentis, panicula racemoſa terminali. *Peru.*

ſemicrenatum Rich. 35. M. foliis oblongo-lanceolatis acuminatis apice crenatis glabriusculis, panicula terminali, calycibus circumſciſſis. *Guadalupa.* (M. acuminatum Desrouſſ.)

bracteolatum Humb. 36. M. foliis oblongo-lanceolatis acuminatis integerrimis ſubtus ferrugineo-tomentoſis, ſpicis paniculatis terminalibus, bracteis linearibus elongatis. *Loxa.*

aſpergillare Humb. 37. M. foliis ovalibus utrinque attenuatis ſerrulatis ſubtus rufo-tomentoſis, pube aſpergilliformi, panicula rigida thyrſoidea, floribus ſubſeſſilibus. *Quito.*

tomentoſum Rich. 38. M. foliis amplis ovali-oblongis utrinque attenuatis ſubtus rufo-tomentoſis, panicula terminali, floribus ſubſeſſilibus aggregatis. *Guiana.*

caudatum Bonpl. 39. M. foliis oblongis longiſſime acuminatis integerrimis ſubtus rufo-pulverulentis, panicula terminali pyramidata, floribus faſciculatis. *Nov. Granat.*

caelatum Bonpl. 40. M. foliis oblongis crenulatis ſupra bulloſo-caelatis ſubtus rubiginoſo-lanatis, panicula thyrſoidea, floribus glomeratis. *Loxa.*

haplaſtachy Bonpl. 41. M. foliis lanceolatis ſupra laevibus ſubtus rufo-tomentoſis, ſpica verticillata terminali. *Ad Orinocum.*

Lima Desr. 42. M. foliis ſubellipticis rigidis ſupra aſperrimo-hiſpidis ſubtus villoſis, panicula terminali hirſuta, floribus glomeratis bracteatis. *Braſil.* Sello.

braſilienſe * 43. M. foliis lanceolatis acuminatis integerrimis ſubtus ramis calycibusque incanis ſtellato-pubeſcentibus, paniculae terminalis ramis divaricatis. *Braſilia.* Sello.

cinnamomifolium Jacq. 44. M. foliis oblongis utrinque attenuatis glaberrimis integerrimis, floribus umbellatis terminalibus, calycibus truncatis. *Inſ. Antill.*

** *Foliis quinque-quintuplinerviis.*

† *Floribus lateralibus.*

ſaccſcens Aubl. 45. M. foliis ſubellipticis utrinque attenuatis integerrimis ſupra flavidis ſubtus incanis, corymbis lateralibus. *Guiana.*

hirtum 46. M. ramis patentibus teretibus fuſco-hirtis, foliis ſubcordato-oblongis obtuſiusculis crenulatis

membranaceis utrinque hirſutis, corymbis pauci-floris axillaribus abbreviatis hirtis. *Ind. occid.*

ſpicatum Aubl. 47. M. ramis 4gonis hirtis, foliis oblongis acuminatis ſubdenticulatis ferrugineo-hirſutis, racemis axillaribus ſubſpicatis fulvo-hirtis. *Guiana. Braſil.*

Acinodendron 48. M. foliis oblongis acuminatis ſerrulatis aſperis membranaceis, pedunculis axillaribus ſubcymoſis paucifloris divaricatis. *Guadalupa. Martinica.*

elegans Aubl. 49. M. ramis hirtis, foliis cordato-ovatis duplicato-crenatis ferrugineo-villoſis, cymis axillaribus paucifloris. *Guiana.* (Clidemia Don.)

Mayeta Desr. 50. M. ramis villoſis, foliis ſubſeſſilibus, altero minori, oblongis acutis integerrimis piloſis, nervo medio ad baſin inflato, floribus axillaribus ſolitariis ſubſeſſilibus bracteatis. *Guiana.* (Tococa Aubl. Don.)

heterophyllum Desr. 51. M. ramis villoſis, foliis disparibus, altero petiolato oblongo acuminato, nervo medio ad baſin utrinque inflato, folio altero ſeſſili cordato, cymis lateralibus. *Peru.* (Tococa Aubl. Don.)

diverſifolium Humb. 52. M. foliis ovatis crenulatis ciliatis in petiolum decurrentibus, altero minori, ramis pulveraceis, floribus cymoſis axillaribus. *Ad fl. Magdalenae.*

nodoſum Desr. 53. M. foliis ellipticis coriaceis ſerrulatis glabris, corymbis trichotomis hiſpidis, ramis nodoſis. *Inſ. Antill.*

macrophyllum Desr. 54. M. foliis amplis cordato-oblongis denticulatis ſubtus ferrugineo-tomentoſis, cymis axillaribus ferrugineis, floribus ſeſſilibus. *Ind. occ.* (M. impetiolare Sw.)

ſtrigilloſum Sw. 55. M. foliis ſubcordato-oblongis ſerrulatis ſupra ſtrigoſo-hiſpidiſſimis fulvidis ſubtus reticulato-venoſis tomentoſis, racemis axillaribus abbreviatis hirſutiſſimis, laciniis calycinis ſubulatis elongatis. *Jamaica. Hiſpaniola.*

capitellatum Bonpl. 56. M. foliis ſubrotundo-ovatis acuminatis crenulatis papilloſo-hirtis, verticillis axillaribus pedunculatis multifloris remotis. *Nov. Granat.*

biglomeratum Humb. 57. M. foliis oblongo-lanceolatis integerrimis ſubtus reticulato-venoſis rufis, floribus verticillatis, verticillis binis remotis. *Ad Orinocum.*

†† *Floribus terminalibus,*

α. congeſtis, corymboſis.

groſſum Mut. 58. M. foliis cordato-ovatis integerrimis hiſpidis, floribus terminalibus ſubſeſſilibus ſtrigoſis. *Nov. Granat.*

Cardinalis * 59. M. foliis orbiculatis ſubſeſſilibus integerrimis ſupra ſtrigoſo-hiſpidis ſubtus ſericeis luteſcentibus, floribus terminalibus ſeſſilibus congeſtis, calycibus hiſpidiſſimis. *Braſil.* (Rhexia Kunth.)

obvolutum Jack. 60. M. foliis ovatis ſtrigoſis, pedunculis terminalibus ternis, bracteis perſiſtentibus calycem ſquamoſum obtegentibus. *Sumatra.*

decemfidum Roxb. 61. M. foliis ovato-lanceolatis acuminatis ſpinuloſo-ciliatis piloſiusculis, floribus terminalibus ſolitariis, calyce 10fido echinato-ſetoſo. *Inſ. ad oram Malaccae.*

Fontaneſii * 62. M. foliis oblongo-lanceolatis acuminatis ſupra nitidis hiſpidiusculis ſubtus pannoſo-lanatis, floribus corymboſis, laciniis calycinis oblongis reflexis. *Braſil.* (M. granuloſum Desr. Rhexia Fontaneſii Kunth. Pleroma Don.)

malabathricum 63. M. foliis lanceolatis integerrimis ſtrigoſis, corymbis terminalibus, bracteis calycibusque appreſſis. *Ind. or. Inſ. Molucc.*

erectum Jack. 64. M. foliis oblongis utrinque attenuatis villoſis, corymbis terminalibus, calycibus hiſpidis. *Sumatra. Cochinchina?* (M. ſeptemnervium Lour.)

cymoſum Wendl. 65. M. foliis cordato-oblongis ſerrulatis piloſis, ramis rufeſcentibus, cyma terminali glabriuscula, ſtaminibus 5 ſterilibus. *Portorico.* Bertero.

ſcandens Aubl. 66. M. caule ſcandente, foliis ovato-oblongis integerrimis hirſutis, corymbo paucifloro bracteato. *Guiana.*

ruſeſcens Aubl. 67. M. caule ſtricto 4gono hirto, foliis cordatis crenulatis ſubtus rufo-villoſis, floribus terminalibus glomerato-ſpicatis. *Guiana.*

capitatum Vahl. 68. M. foliis ovato-lanceolatis integerrimis ſupra aſperis ſubtus glabris flavicantibus, capitulis terminalibus pedunculatis involucratis. *Ind. occid.*

β. Floribus terminalibus paniculatis.

agreſte Aubl. 69. M. foliis ovato-lanceolatis denticulatis ferrugineo-villoſis, panicula corymboſa. *Cayenn.* (Clidemia Don.)

alatum Aubl. 70. M. caule 4quetro alato, foliis ſeſſilibus oblongis acuminatis integerrimis ſubtus incano-tomentoſis, paniculae ramis patulis, floribus glomeratis. *Guiana.*

dichotomum Desr. 71. M. foliis cordatis acutis ſerrulatis hiſpidulis, paniculae folioſae ramis dichotomis. *Braſil.*

heteromallum Don. 72. M. foliis cordato-ovalibus integerrimis ſupra ſubſtrigoſis ſubtus floccoſo-lanatis, panicula corymboſa, petalis emarginatis. *Braſil.* (Pleroma Don.)

Tococa Desr. 73. M. foliis ovato-oblongis acutis ſubcrenulatis fulvo-hirſutis, petiolis utrinque veſiculoſis, panicula ſtricta racemoſa. *Guiana.* (Tococa guianenſis Aubl., M. Phyſiphora Vahl.)

purpureum W. 74. M. foliis lanceolatis acuminatis ſubdenticulatis piloſis ruſeſcentibus, paniculae ramis patentibus villoſis. *Guiana.* (M. purpuraſcens Aubl.)

argenteum Sw. 75. M. foliis ovato-oblongis acutis ſubdenticulatis glaberrimis ſubtus candidis tomentoſis, paniculae ramis oppoſitis, floribus minutis. *Ind. occid.*

elatum Sw. 76. M. foliis oblongis acutis coriaceis glabris ſubtus ferrugineo-tomentoſis ſerrulatis, paniculae ramis brachiatis, floribus ſeſſilibus confertis. *Ind. occid.* (M. ferrugineum Desr.)

fragile 77. M. foliis ovatis ſerrulato-ciliatis glabris fragilibus, paniculae ramis brachiatis 5fidis, floribus pedicellatis. *Braſil. Mexico.*

coriaceum Sw. 78. M. foliis ovatis acutis coriaceis flaveſcentibus glabris rugulosis cartilagineo-ſerrulatis, ramulis ſtrigoſis, paniculae ramis 4gonis, floribus ſubſeſſilibus. *Guadalupa.* (M. cymbifolium Rich.)

Swartzianum Rich. 79. M. foliis oblongo-lanceolatis acuminatis integerrimis ſubtus incano-tomentoſis, paniculae ramis patentibus, calycibus bracteatis dentatis. *Inſ. Antill.* (M. Tamonea Sw.)

Fothergilla Rich. 80. M. foliis oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis integerrimis ſubtus rufeſcentibus, panicula diffuſa, calycibus bracteatis ſuberenatis. *Amer. auſtr.* (Fothergilla mirabilis Aubl. M. rubiginoſum Humb. Chitonia Don.)

albicans Sw. 81. M. foliis oblongis acutis integerrimis ſubtus albo-tomentoſis, paniculae ramis ſtrictis rufeſcentibus, floribus ſeſſilibus ſubſecundis. *Ind. occid. Braſil.*

ſplendens Sw. 82. M. foliis oblongis acuminatis utrinque glabris ſupra nitidis integerrimis, paniculae pyramidalis ramis ferrugineis ſubumbellatis. *Jamaica.*

laevigatum 83. M. foliis ovato-oblongis acuminatis integerrimis laevibus, paniculae glabrae ramis horizontalibus. *Jamaica. Braſil.* (M. ſtamineum Desr.)

alpeſtre Jack. 84. M. foliis ovato-oblongis crenulatis glaberrimis, paniculae ramis divaricatis. *Sumatra.*

laxum Desr. 85. M. foliis cordato-ovatis ſerrulatis reticulato-rugoſis fuſco-piloſis, panicula laxa folioſa. *Peru.*

tunicatum Bonpl. 86. M. foliis oblongis acuminatis integerrimis glabris, panicula pyramidali, dentibus calycis irregularibus. *Peru.*

pyramidale Desr. 87. M. foliis oblongis acuminatis denticulatis ſubtus villoſiusculis, panicula pyramidali elongata, calycibus ſuperne conſtrictis. *Ind. occ. Amer. auſtr.*

lacerum Bonpl. 88. M. foliis oblongo-lanceolatis acuminatis ramisque hirtis, racemis paniculatis terminalibus, floribus ſecundis, calycibus fimbriatis. *Nov. Granat.*

lappaceum Desr. 89. M. foliis cordatis acuminatis ſubtus reticulato-tomentoſis, paniculae trichotomae ramis divaricatis, calycibus uncinato-ſetoſis. *Patria?*

coronatum Humb. 90. M. foliis oblongis utrinque attenuatis integerrimis ſubtus ramisque pulverulentis, panicula trichotoma, fructu laciniis calycinis coronato. *Nov. Granat.*

fuvoſum Desr. 91. M. foliis cordato-ovatis ſubdenticulatis coriaceis ſupra aſpero-bullatis ſubtus foveolatis rufo-furfuraceis, panicula corymboſa, calycibus glabris. *Hiſpaniola.*

ſerrulatum * 92. M. foliis oblongis acutis ſerrulato-ciliatis utrinque ramisque fulvo-hirſutis, paniculae terminalis trichotomae ramis divaricatis, floribus glomeratis. *Braſil.* Sello.

papilloſum Desr. 93. M. foliis ſubcordato-oblongis crenulatis ſupra tuberculatis ſubtus foveolatis rufeſcentibus tomentoſis, paniculae ramis trichotomis. *Peru.*

theaezans Bonpl. 94. M. foliis oblongis acuminatis glaberrimis ſerratis utrinque concoloribus, paniculae terminalis floribus glomeratis. *Nov. Granat.*

nicotianaefolium Desr. 95. M. foliis longe petiolatis oblongis ſubdentatis glabriusculis, panicula brachiata terminali pubeſcente. *Hiſpaniola.*

xalapenſe Humb. 96. M. foliis oblongo-lanceolatis acuminatis ſerrulatis ſubtus ramisque flavo-tomentoſis, panicula terminali, calycibus circumſciſſis. *Mexico.*

floribundum Humb. 97. M. foliis ſubellipticis integerrimis glabris 7plinerviis, panicula trichotoma elongata ſtricta, ſtigmate peltato. *Peru.*

obſcurum Humb. 98. M. foliis ovato-oblongis integerrimis tuberculoſo-hiſpidis 5plinerviis, panicula terminali, floribus glomeratis, calycibus tomentoſis. *Peru.*

guayaquilenſe Humb. 99. M. foliis cordato-oblongis 5plinerviis integerrimis glabris, panicula terminali thyrſoidea, calycibus pulverulentis. *Nov. Granata.* (Miconia Don.)

ibaguenſe Humb. 100. M. foliis lanceolatis utrinque attenuatis 5nerviis integerrimis rufo-hirſutis, panicula pauciflora terminali. *Nov. Granat.*

pendulifolium Rich. 101. M. foliis oblongo-lanceolatis acuminatis ſerrulatis ſubtus discoloribus glabriusculis, panicula terminali pyramidata. *Guadalupa.*

ſtenobotryon Rich. 102. M. foliis ovato-lanceolatis acuminatis ſub-5nerviis denticulatis glaberrimis, paniculae terminalis ſtrictae ramis remotis, bracteis coloratis deciduis. *Hiſpaniola.*

ciliatum Rich. 103. M. foliis oblongis utrinque attenuatis ſub-5nerviis glabris ſerrulato-ciliatis, ſpicis paniculatis terminalibus. *Guiana.* (M. articulatum Desr. purpuraſcens Vahl.)

ambiguum Humb. 104. M. foliis oblongis utrinque attenuatis 5nerviis denticulato-ciliatis glabris, panicula terminali pauciflora, calycibus campanulatis brevidentatis. *Cumana.*

minutiflorum Humb. 105. M. foliis lanceolatis acuminatis 5nerviis glaberrimis integerrimis, panicula terminali, floribus exiguis. *Cumana.*

lutescens Humb. 106. M. foliis oblongis acutis 5nerviis dentatis ſupra nitidis ſubtus vernicoſis, panicula terminali. *Loxa.*

fulvum Rich. 107. M. foliis lanceolatis acuminatis elongatis crenatis 5nerviis ſubtus fulvo-lepidotis, paniculae terminalis ramis filiformibus. *Guiana.*

granuloſum Humb. 108. M. foliis oblongis utrinque attenuatis revolutis ſubtus fulvis ramisque granuloſo-pulverulentis, paniculae terminalis floribus faſciculatis. *Nov. Granat.*

II. *Dodecandra, polyandra.*

calyptratum Vahl. 109. M. foliis oblongo-lanceolatis acuminatis flaveſcentibus obſolete crenatis glaberrimis, panicula terminali laevi, calycibus circumſciſſis. *Martinica. Guadalupa.* (Conoſtegia Don.)

croceum Desr. 110. M. foliis oblongis utrinque attenuatis 3-5nerviis ſerrulato-ciliatis ſubtus flavis glabriusculis, panicula terminali pyramidali. *Peru. Hiſpaniola.*

mucronatum Desr. 111. M. foliis ovalibus abrupte mucronatis 3-5nerviis ſubtus ferrugineo-tomentoſis integerrimis, panicula terminali, calycis truncati apice ciliato. *Cayenn.*

patens Sw. 112. M. foliis cordatis acuminatis ſubdenticulatis 5nerviis ſubtus incano-tomentoſis, racemis trichotomis paucifloris fructibusque hirtis. *Jamaica. Hiſpaniola.* (M. crotonifolium et niveum Desr.)

ſanguineum Ker. 113. M. foliis ovato-lanceolatis ſub-5nerviis aſperis ſubtus rufis, pedunculis terminalibus ſolitariis, fructibus hiſpidis. *China.*

ſetinode Bonpl. 114. M. foliis oblongo-lanceolatis 5nerviis ſpinuloſo-ſerratis, nodis ramorum barbatis, panicula terminali thyrſoidea, floribus 6petalis. *Nov. Granat.*

octonum Bonpl. 115. M. foliis cordato-ſubrotundis acutis 7nerviis crenulatis ſupra papilloſo-hiſpidis ſubtus bulloſo-reticulatis, paniculis axillaribus hirtis, floribus 8petalis. *Nov. Granat.*

Mutiſii Humb. 116. M. foliis cordato-ovatis denticulatis 7plinerviis ſupra nitidis ſubtus pubeſcentibus, ramis hirtis, calycibus circumſciſſis, pedunculis 3floris, floribus 6petalis. *Nov. Granat.*

exſtinctorium Humb. 117. M. foliis oblongis acuminatis 5plinerviis repando-dentatis ſupra nitidis ſubtus ramisque pulverulentis, panicula terminali, calyce circumſciſſo, floribus 6petalis. *Nov. Granat.*

III. *Octandra.*

* *Foliis 3-5plinerviis.*

† *Floribus lateralibus.*

rubrum Aubl. 118. M. foliis oblongis acuminatis ſerrato-ciliatis 3-5nerviis rufo-hirſutis, floribus lateralibus aggregatis. *Guiana. Cayenn.* Richard.

hirſutum Sw. 119. M. foliis ovato-lanceolatis acuminatis denticulatis rufo-hirſutiſſimis, pedunculis axillaribus 3fidis divaricatis. *Jamaica.*

microphyllum Sw. 120. M. caule fruticoſo humili, ramis ferrugineo-hirſutis, foliis ovatis obtuſis ſupra hiſpidis ſubtus ferrugineo-tomentoſis, pedunculis 3fidis axillaribus abbreviatis. *Jamaica. Braſil.* Sello.

micranthum Sw. 121. M. foliis oblongis utrinque attenuatis denticulatis glabris, racemis axillaribus reclinatis trichotomis. *Jamaica.*

capillare Sw. 122. M. foliis lanceolatis longe acuminatis integerrimis ſubtus pallidis glabris, pedunculis axillaribus capillaribus 3floris, fructibus hiſpidis. *Jamaica.*

hirtellum Sw. 123. M. foliis ovato-lanceolatis acuminatis integerrimis ſubtus ramisque hirſutiusculis, pedunculis axillaribus 3floris. *Jamaica. Hiſpaniola.*

triflorum Vahl. 124. M. foliis oblongo-lanceolatis integerrimis ſubtus luteo-ſtrigoſis, pedunculis axillaribus breviſſimis 3floris. *Inſ. Carib.*

fuſciculare Sw. 125. M. foliis ovatis acutis integerrimis ſubtus hiſpidiusculis, pedunculis confertis abbreviatis 1floris. *Jamaica.*

purpuraſcens Sw. 126. M. foliis oblongis acutis integerrimis glaberrimis nervoſo-ſtriatis, racemis lateralibus trichotomis ſubpaniculatis. *Jamaica.*

verticillatum Vahl. 127. M. foliis oblongis acuminatis denticulatis ſupra ſcabris ſubtus villoſis, racemis axillaribus, floribus verticillatis. *Inſ. Carib.*

lateriflorum Vahl. 128. M. foliis obovatis acutiusculis baſi attenuatis glabriusculis denticulato-ſetaceis, pedunculis lateralibus aggregatis 1floris. *Inſ. Carib.*

multiflorum Desr. 129. M. foliis lanceolatis ſerratis ſupra nitidis ſubtus rufeſcentibus, paniculis lateralibus divaricatis. *Hiſpaniola.*

amygdalinum Desr. 130. M. foliis oblongo-lanceolatis complicatis ſerratis glaberrimis, cymis lateralibus breviusculis. *Hiſpaniola. Portorico.*

ſtellulatum Jack. 131. M. foliis ovato-oblongis integerrimis ferrugineo-tomentoſis, pedunculis axillaribus paucifloris, calyce ſetis elongatis ſpineſcentibus apice ſtellato-multifidis. *Sumatra.*

rubicundum Jack. 132. M. foliis ovato-oblongis integerrimis glaberrimis, cymis axillaribus dichotomis, floribus glabris ſubpellucidis. *Sumatra.*

ſcabroſum 133. M. foliis ovatis denticulatis ſcabris ſubtus hirſutis, floribus axillaribus ſeſſilibus aggregatis. *Jamaica.*

virgatum Sw. 134. M. foliis ovato-lanceolatis integerrimis glaberrimis, ramis virgatis floriferis, racemis decuſſatis diffuſis. *Jamaica.*

vaccinioides Bonpl. 135. M. foliis ovalibus parvis integerrimis ſubtus pallidis, pedunculis axillaribus ſubſolitariis 1floris, calyce ſubtruncato. *Peru.* (Cremanium Don.)

ſeſſile * 136. M. foliis ſemiamplexicaulibus cordato-ſubrotundis acutis integerrimis obſolete triplinerviis utrinque glanduloſo-villoſis, ramis virgatis, floribus ſubſeſſilibus axillaribus. *Braſil.*

oxypetalum * 137. M. foliis ovato-lanceolatis acuminatis integerrimis rufo-hirſutis, floribus axillaribus ſubſeſſilibus, petalis acutis. *Hiſpaniola.* (M. acutipetala Rich.)

†† *Floribus terminalibus.*

rubens Sw. 138. M. ramis, petiolis pedunculisque rubris, foliis ovato-lanceolatis denticulatis glaberrimis ſubcoloratis, floribus paniculatis confertis dioecis. *Jamaica.*

glabratum Sw. 139. M. caule fruticoſo humili, foliis ovatis utrinque attenuatis glaberrimis coriaceis, pedunculis terminalibus 1floris reflexis. *Jamaica.*

† *glanduloſum* Sw. 140. M. foliis ovatis acutis ſupra ſtrigoſis ſubtus glanduloſo-hiſpidis, panicula thyrſoidea. *Jamaica.*

octandrum 141. M. foliis ovato-lanceolatis integerrimis glabris, margine nervisque ſubtus hiſpidis, floribus terminalibus. *Ceylon.*

divaricatum W. 142. M. foliis ovatis acutis integerrimis ſupra nitidis ſubtus fuſco-tomentoſis, panicula terminali divaricata, calycibus truncatis. *Ind. or.*

anguſtifolium Sw. 143. M. foliis lineari-lanceolatis integerrimis ſupra rugoſis ſubtus incanis, ramis virgatis, paniculа terminali. *Ind. occid.*

† *acuminatum* Vahl. 144. M. foliis ovatis acuminatis apice denticulatis ſubtus incanis, corymbis terminalibus faſtigiatis. *Inſ. Carib.*

elaeagnoides Sw. 145. M. foliis lato-lanceolatis acuminatis integerrimis ſubtus albido-tomentoſis, pedunculis terminalibus trichotomis, floribus ſolitariis. *Ind. occ.*

gracile Jack. 146. M. foliis ovatis acuminatis glabris, ramis compreſſis, paniculae terminalis ramis gracilibus. *Sumatra.*

pulverulentum Jack. 147. M. foliis ovatis obtuſis baſi 2tuberculatis glabris, ramis furfuraceis, panicula terminali corymboſa, floribus pulverulentis. *Sumatra.*

** *Foliis 5nerviis.*

† *Floribus lateralibus.*

rariflorum Humb. 148. M. foliis ovato-oblongis acuminatis glabris integerrimis, racemis axillaribus paucifloris hirſutiusculis. *Cumana.*

umbroſum Sw. 149. M. foliis ampliſſimis ovatis acuminatis crenatis utrinque hirtis, ramis patentiſſimis, cymis axillaribus, laciniis calycinis ſetaceis. *Inſ. Carib.* (M. latifolia Desr.)

ſeſſiliflorum Vahl. 150. M. foliis ovato-lanceolatis longe acuminatis denticulatis utrinque hirſutis, floribus axillaribus ſeſſilibus ſubverticillatis, laciniis calycinis ſubulatis incurvis villoſiſſimis. *Amer. auſtr. Jamaica.* (M. plumoſa Desr.)

piloſum Sw. 151. M. foliis oblongis acutis ſerrulatis piloſis, racemis 3partitis hirſutiusculis, floribus minutis. *Jamaica. Hiſpaniola.*

discolor 152. M. foliis oblongis acuminatis denticulatis coriaceis glabris ſubtus flavicantibus, racemis corymboſis, calycibus obtuſe lobatis. *Inſ. Antill. Carib.*

nemoroſum Jack. 153. M. foliis ovato-lanceolatis integerrimis ſubtus ferrugineo-villoſis, pedunculis axillaribus 1-3floris. *Sumatra et inſ. finitimae.*

rotundifolium Jack. 154. M. foliis maximis ſubrotundis acutis 7nerviis ſubtus ferrugineis, capitulis axillaribus pedunculatis involucratis. *Sumatra.*

†† *Floribus terminalibus.*

calycopteron Rich. 155. M. foliis cordato-oblongis integerrimis ſubtus rufo-tomentoſis, floribus ternis terminalibus, calycibus dorſo alatis. *Hiſpaniola.*

156.

hispidum Sw. 156. M. foliis ovatis acuminatis denticulatis supra strigoso-hispidis subtus incano-tomentosis, panicula terminali divaricata. *Jamaica.*

corymbosum Sims. 157. M. foliis cordato-ovatis acutis serratis glabris, corymbo paniculato terminali. *Sierra Leone.*

coccineum Vahl. 158. M. foliis oblongis acuminatis glaberrimis integerrimis, panicula thyrsoidea, pedicellis nodosis hispidis. *Inf. Carib.*

bracteatum Jack. 159. M. foliis cordato-ovatis acuminatis subtus stellato-pilosis, paniculae terminalis bracteis magnis ovatis, calycibus subintegris. *Inf. ad oras Malacc.*

exiguum Jack. 160. M. foliis longe petiolatis ovatis acuminatis glabris integerrimis, panicula terminali, floribus exiguis, calycibus 4dentatis. *Inf. ad oras Malacc.*

pallidum Jack. 161. M. foliis subcordato-ovatis acuminatis integerrimis glabris subtus punctatis, paniculis axillaribus terminalibusque, antheris supra basin affixis. *Inf. ad oras Malacc.*

viminale Jack. 162. M. foliis cordato-oblongis supra glabris subtus stellato-pubescentibus, paniculis axillaribus terminalibusque corymbosis, bracteis oblongis ciliatis, staminibus alternis sterilibus. *Sumatra.*

eximium Jack. 163. M. foliis ampliſſimis subellipticis utrinque attenuatis coriaceis integerrimis glaberrimis, paniculae ramis verticillatis bracteatis. *Sumatra.*

IV. *Tetrandra.*

tetrandrum Sw. 164. M. foliis oblongis acutis integerrimis glabris 3nerviis subtus pallide ferrugineis, panicula terminali, calycibus fructiferis truncatis. *Jamaica. Hispaniola.*

glaucum Jack. 165. M. foliis cordato-oblongis acuminatis integerrimis glaberrimis stellato-pubescentibus, panicula terminali glauca, filamentis binis sterilibus. *Inf. ad oram Malacc.*

fallax Jack. 166. M. foliis cordato-ovatis acuminatis integerrimis subtus ferruginec-tomentosis, panicula terminali, antheris erectis infra medium affixis. *Sumatra.*

1557. TRISTEMMA Juss.

mauritianum Juss. *Inf. Mascaren.* Herba foliis ovalibus, floribus axillaribus capitatis.

1558. RHEXIA.

I. *Decandrae.*

* *Fruticosae.*

† *Melastomoides, foliis latioribus nervosis.*

aquatica 1. Rh. foliis cordato-oblongis serrulatis 5nerviis petiolatis, ramis hirsutis, paniculae terminalis trichotomae aphyllae ramis filiformibus patentibus. *Ind. occid.* (Melastoma aquatica Aubl.)

cordata * 2. Rh. foliis ſubſeſſilibus cordato-ovatis glabriusculis punctatis 5nerviis ciliatis, floribus axillaribus ſolitariis pedunculatis, calycibus glanduloſo-piloſis, capſula 3loculari. *Braſil.* Sello.

viminea Don. 3. Rh. foliis petiolatis ſubcordato-oblongis 5nerviis utrinque hirſutiusculis, ramis deorſum hiſpidis, floribus paniculatis, antheris armatis baſi 2tuberculatis. *Braſil.*

oxypetala R. et P. 4. Rh. foliis petiolatis lanceolatis acutis 5nerviis integerrimis ſubtus villoſis, ramis patulis hirſutis, pedunculis axillaribus 3floris, calycibus bracteatis, petalis mucronatis. *Peru.*

flexuoſa R. et P. 5. Rh. foliis lanceolatis ſerrulatis acutis 5nerviis, ramis flexuoſis divergentibus, pedunculis axillaribus dichotomo-corymboſis, petalis reflexis. *Peru.*

echinata R. et P. 6. Rh. foliis ovatis acutis integerrimis 5nerviis ſupra aſperrimis ſubtus lanatis, pedunculis axillaribus ſub-3floris, calycibus hirſutiſſimis, petalis cuneatis. *Peru.*

lepidota Bonpl. 7. Rh. foliis oblongo-lanceolatis ſubdentatis 5nerviis ſubtus lepidotis, floribus faſciculatis, calycibus obtuſis ſquamuloſis bracteatis. *Quito.*

leucantha Sw. 8. Rh. arboreſcens, ramis 4gonis, foliis petiolatis oblongis acuminatis 3nerviis cartilagineo-denticulatis lucidis, pedunculis 1floris, bracteis geminis lanceolatis petiolatis, laciniis calycinis baſi ſubdentatis. *Jamaica.* (Rh. ſpecioſa Berter. Meriania leucantha Sw. fl. ind. occ. M. roſea Tuſſ.)

purpurea Sw. 9. Rh. arboreſcens, ramis teretibus, foliis petiolatis ovali-oblongis utrinque glabris 3nerviis denticulatis, pedunculis 1floris axillaribus, bracteis quaternis ſeſſilibus lanceolatis. *Jamaica.* (Meriania Sw. Tuſſ.)

longifolia Vahl. 10. Rh. caule fruticoſo ramoſo foliisque lanceolatis 5nerviis integerrimis piloſis, pedunculis axillaribus terminalibusque dichotomis, petalis ciliatis. *Amer. auſtr.*

aſpera W. 11. Rh. caule fruticoſo ramoſo muricato-hiſpido, foliis ovatis 5nerviis ſquamato-aſperis, pedunculis terminalibus 3floris, calycibus ſquamatis bracteatis. *Guiana.* (Tibouchina aſpera Aubl.)

inconſtans Vahl. 12. Rh. caule fruticoſo ramoſo hiſpido, foliis ovatis acuminatis 3nerviis integerrimis ſupra hiſpidis ſubtus incanis, pedunculis terminalibus umbellatis, calycibus ſtrigoſis. *Inſ. Carib.* (Melaſtoma ornata Sw.)

ornata Rich. 13. Rh. foliis ovatis triplinerviis ſtrigoſis, pedunculis terminalibus ſubcorymboſis, calycibus glabris, petalis fimbriatis. *Martinica.* (Osbekia ornata Sw.)

mollis Bonpl. 14. Rh. foliis ovato-oblongis acuminatis 5nerviis villoſiusculo-tomentoſis, floribus paniculatis terminalibus, petalis cuſpidatis, antheris baſi nudis. *Peru.*

ſtricta Bonpl. 15. Rh. ramis ſtrictis gracilibus, foliis lanceolatis acutis coriaceis 3nerviis ſubtus piloſis, floribus ſubſeſſilibus cernuis, petalis ciliatis. *America auſtr.*

ſarmentoſa Bonpl. 16. Rh. ramis ſarmentoſis foliisque ſubcordato-oblongis acutis 7nerviis villoſis, floribus faſciculatis terminalibus, laciniis calycis villoſiſſimi lanceolatis. *Peru.*

reticulata Bonpl. 17. Rh. ramis teretibus pubeſcentibus, foliis oblongis acutis coriaceis ſerrulatis ſupra bulloſo-hiſpidis ſubtus reticulatis, floribus terminalibus ſolitariis, petalis ciliatis, appendiculis antherarum elongatis. *Amer. auſtr.*

caneſcens Bonpl. 18. Rh. ramis teretibus piloſis, foliis oblongis acutis 3nerviis ſubtus caneſcentibus, floribus terminalibus ſubternis, calycibus hiſpidis coloratis, antheris ſubindiviſis. *Nov. Granat.*

ſpecioſa Bonpl. 19. Rh. ramis decuſſatis, foliis oblongo-lanceolatis triplinerviis glabris ciliatis, floribus ſubſeſſilibus terminalibus cernuis, calycibus pubeſcentibus. *Nov. Granat.*

muricata Bonpl. 20. Rh. ramis decuſſatis hirſutis, foliis oblongis 5plinerviis ſupra bullato-muricatis ſubtus ſericeis, floribus terminalibus ſolitariis, calycibus hiſpidis. *Amer. auſtr.*

holoſericea Bonpl. 21. Rh. ramis 4angulis, foliis cordato-oblongis ſub-5nerviis utrinque ſericeo-tomentoſis ſubtus argenteis, floribus paniculatis terminalibus, pedicellis 3floris, calycibus clavatis ſericeis. *Braſilia.* (Melaſtoma Desr.)

diffuſa * 22. Rh. foliis oblongo-lanceolatis triplinerviis ſubdenticulatis utrinque ramisque fulvo-villoſis, floribus axillaribus polygamis, ♂ longe pedunculatis pendulis, ☿ ſeſſilibus. *Jamaica.* (Melaſtoma Desr.)

rotundifolia Bonpl. 23. Rh. ramis teretibus, foliis ſubrotundis obtuſis integerrimis venoſis glabris ſubtus pulverulentis, panicula terminali, calycibus truncatis. *Nov. Granat.*

Leuzeana Kunth. 24. Rh. caule fruticoſo ſimplici 4gono glabro, foliis obovato-oblongis 5nerviis reticulatis denticulatis ſubtus pallidis glanduloſis, floribus corymboſis, calycibus 10coſtatis, capſula 3loculari. *Braſil.*

princeps Kunth. 25. Rh. ramis 4gonis tomentoſis, foliis ſubcordato-oblongis acuminatis 7nerviis ſerrulatis rigidis ſubtus fuſco-tomentoſis, pedunculis ſubcorymboſis, calycibus glanduloſo-hiſpidis. *Braſil.*

†† *Ericoides, foliis ſub-enerviis minoribus.*

Eſpora Hilar. 26. Rh. ramis ſtrictis glabris, foliis faſciculatis cordato-ovatis integerrimis enerviis, floribus racemoſis terminalibus, capſula 3valvi. *Braſil.*

Adamantum Hilar. 27. Rh. ramis glanduloſo-piloſis, floribus faſciculatis lanceolatis ſerrulato-ciliatis enerviis, floribus corymboſis terminalibus, capſula 3loculari. *Braſil.*

fasciculata * 28. Rh. foliis fasciculatis lineari-oblongis utrinque 1dentatis enerviis glaberrimis, racemis subdichotomis terminalibus, calycibus 10striatis strigillosis. *Brasil.* Sello.

setosa * 29. Rh. foliis subsessilibus lineari-oblongis punctatis glaberrimis sub-3nerviis subaristatis, floribus axillaribus terminalibusque solitariis pedunculatis, laciniis calycinis seta terminatis. *Brasil.* Sello.

suberosa * 30. Rh. foliis subsessilibus fasciculatis linearibus involutis glaberrimis, pedunculis terminalibus subcorymbosis glanduloso-pilosis, capsula 3locular. *Brasil.* (Rh. Hilariana Kunth.)

scoparia Hilar. 31. Rh. foliis sessilibus linearibus acutis glabris, floribus terminalibus sessilibus solitariis, laciniis calycis glabri linearibus elongatis. *Brasil.*

armata * 32. Rh. foliis 4fariam imbricatis appressis linearibus glaberrimis margine nervoque incrassatis, calycibus terminalibus solitariis sessilibus apice setosis. *Brasil.* Sello.

fulva * 33. Rh. ramis dichotomis pubescentibus, foliis oblongis minutis subenerviis fulvo-hispidulis, floribus terminalibus solitariis, laciniis calycinis subulatis. *Brasil.* Sello.

conferta Bonpl. 34. Rh. foliis confertis petiolatis ellipticis sub-trinerviis strigillosis, floribus solitariis cernuis, calycibus bracteatis petala obtusa, subaequantibus. *Peru.*

** *Herbaceae.*

uniflora Vahl. 35. Rh. caule 4gono alato glanduloso-viscoso, foliis ovatis sub-3nerviis glanduloso-ciliatis serrulatis, calycibus pilosis. *Cayenn.*

hypericoides W. 36. Rh. caule 4gono ramoso foliisque ovatis acutis nervosis villosissimis, floribus racemosis, appendiculis antherarum ascendentibus. *Cayenn.* (Rh. villosissima Rich. Melastoma villosa Aubl.)

trivalvis Vahl. 37. Rh. caule alato superne ramoso, foliis linearibus sessilibus supra punctatis integerrimis incanis, pedunculis corymbosis, laciniis calycinis subulatis elongatis, capsula 3valvi. *Guiana.* (Melastoma Aubl.)

bivalvis Vahl. 38. Rh. caule alato, foliis sessilibus ovalibus 3nerviis glabris, pedunculis terminalibus 1floris, capsula 2valvi. *Guiana.* (Melastoma Aubl.)

Acisanthera 39. Rh. caule angulato ramoso, nodis barbatis, foliis oblongis utrinque attenuatis crenulatis sub-3nerviis, floribus axillaribus solitariis pedunculatis. *Jamaica. Hispaniola.*

serrulata Rich. 40. Rh. foliis lanceolatis serrulatis 3nerviis subpubescentibus, ramis glutinosis, floribus axillaribus subsessilibus, staminibus alternis sterilibus. *Guiana.*

gracilis Kunth. 41. Rh. foliis lanceolatis subundulatis nervosis caulesque tereti hispidis, pedunculis axillaribus sub-3floris, laciniis calycinis antherisque aequalibus abbreviatis. *Brasil.*

stachyoides Kunth. 42. Rh. foliis oblongis acutis 5nerviis ramisque hirsutis, floribus fasciculato-verticillatis, antheris basi 5aristatis, capsula 5loculari. *Brasil.*

nymphaeaefolia Kunth. 43. Rh. caule simplici humili, foliis cordato-orbiculatis crenulato-ciliatis 7-9nerviis subtus albidis glandulosis, pedunculis terminalibus corymbosis, calycibus truncatis, capsula 3loculari. *Brasil.* (Bertolonia Radd.)

II. *Octandrae.*

**Fruticosae.*

villosa Aubl. 44. Rh, caule 4gono decumbente hirsuto, foliis subrotundo-ovatis 5nerviis serrulatis utrinque rufo-villosis, pedunculis aggregatis terminalibus. *Guiana.*

latifolia Aubl. 45. Rh. caule 4gono erecto, foliis subrotundo-ovatis 3nerviis serrulatis utrinque villosis, pedunculis subsolitariis terminalibus. *Guiana.*

strigosa W. herb. 46. Rh. foliis ovatis 3nerviis strigosis, pedunculis axillaribus corymbosis, calycibus hirtis. *Cayenn.*

*incana** 47. Rh. foliis ovato-subrotundis 5nerviis canescentibus ciliatis, pedunculis axillaribus solitariis, laciniis calycinis abbreviatis. *Amer. austr.* (Rh. canescens 2. Bonpl.)

*helvola** 48. Rh. foliis confertis sessilibus ovalibus integerrimis nervosis utrinque helvolo-hispidis, pedunculis axillaribus cymosis, calycibus hispidissimis. *Brasil.* Sello.

microphylla Bonpl. 49. Rh. foliis subrotundo-ovatis 3nerviis pilosis subtus flavescentibus, pedunculis axillaribus terminalibusque subternis, calycibus ciliatis, petalis mucronato-piliferis. *Nov. Granat.*

myrtoides Bonpl. 50. Rh. foliis oblongis 5nerviis glabris, ramis teretibus incanis, pedunculis axillaribus solitariis, calycibus laevibus. *Mexico.*

decumbens Poir. 51. Rh. caule ascendente, ramis 4gonis, foliis ovato-lanceolatis sub-5nerviis serrulatis, floribus terminalibus solitariis. *Guinea.* (Melastoma P. B.)

campanularis Bonpl. 52. Rh. caule ramosissimo, ramis teretibus pilosis, foliis oblongis integerrimis 5plinerviis subtus tomentosis, pedunculis subternis terminalibus, corollis campanulatis. *Peru*

quinquenervis R. et P. 53. Rh. foliis oblongo-lanceolatis acutis 5nerviis supra lucidis subtus flavido-villosis, pedunculis axillaribus 3floris. *Peru.*

lutescens R. et P. 54. Rh. foliis ovatis 3nerviis integerrimis rugosis supra lucidis, pedunculis axillaribus 3floris pendulis, calycibus hispidis. *Peru.*

dicrananthera R. et P. 55. Rh. foliis ovatis 5nerviis integerrimis pilosis, pedunculis axillaribus 3floris, antheris furcatis. *Peru.*

Radula Kunth. 56. Rh. foliis ellipticis integerrimis coriaceis 5nerviis supra strigoso-hispidis subtus ramisque ferrugineo-hirsutis, floribus paniculatis, bracteis coloratis. *Brasil.*

berberifolia Kunth. 57. Rh. caule ramosissimo, foliis obovato-oblongis 3nerviis serrulato-ciliatis hispidulis, floribus axillaribus solitariis, capsula 2loculari. *Brasil.*

nummularioides Bonpl. 58. Rh. caule ramosissimo decumbente, foliis orbiculatis crenatis 5nerviis subtus tomentosis, floribus axillaribus solitariis subsessilibus, calycibus obtusiusculis. *Ad Orinoc.*

rosmarinifolia R. et P. 59. Rh. foliis lineari-oblongis 3nerviis margine revolutis hirsutis, pedunculis sub-5floris pendulis, petalis convolutis. *Peru.*

ericoides * 60. Rh. foliis sessilibus oppositis subdecurrentibus linearibus complicatis ciliatis, floribus solitariis terminalibus sessilibus, calycibus apice setoso-barbatis. *Brasil.*

taxifolia Hilar. 61. Rh. foliis sessilibus cordato-sagittatis lanceolatis revolutis incanis subenerviis, ramis glanduloso-pilosis, floribus axillaribus solitariis pedunculatis erectis. *Brasil.*

juniperina Humb. in W. herb. 62. Rh. foliis sessilibus linearibus subsagittatis incanis, ramis pubescentibus, floribus axillaribus sessilibus glomeratis. *Ad Orinoc. Brasil.* Sello.

** *Herbaceae.*

virginica 63. Rh. caule alato angulato, foliis oblongo-lanceolatis sessilibus nervosis serrulato-ciliatis supra hispidis, pedunculis terminalibus solitariis, calycibus glanduloso-pilosis. *Amer. bor.* (Rh. 7nervia Walt., serrulata Nutt.)

mariana 64. Rh. caule tereti sulcato, foliis subpetiolatis lanceolatis 3nerviis serrato-ciliatis, pedunculis terminalibus corymbosis. *Amer. bor.*

glomerata Rottb. 65. Rh. caule tereti hirsutissimo, foliis subpetiolatis ellipticis 3nerviis hirsutis, floribus terminalibus glomeratis, pilis calycis ramoso-stellatis. *Surinam. Brasil.* (Rh. capitata Rich.)

trichotoma Rottb. 66. Rh. caule 4gono trichotomo, ramis strigosis, foliis lanceolatis integerrimis 3nerviis hirsutis, floribus pedunculatis e dichotomia ramorum, pilis calycis fasciculatis. *Surinam. Brasil.*

ciliosa Mx. 67. Rh. caule sub-4angulo glabro, foliis subsessilibus oblongis supra hirsutiusculis ciliatis subtus glabris, floribus terminalibus solitariis involucratis. *Carolin. austr.*

angustifolia Nutt. 68. Rh. caule tereti foliisque lineari-lanceolatis hirsutis, pedunculis 2fido-cymosis, calycibus glabris. *Georgia. Carolina.*

glabella Mx. 69. Rh. caule tereti glabro, foliis lanceolatis sessilibus laevibus obsolete serrulatis 3nerviis, corymbi laxi pedicellis compressis apice dilatatis, calycibus glanduloso-glutinosis. *Carolina. Georgia.*

stricta Pursh. 70. Rh. caule 4gono alato stricto, nodis barbatis, foliis sessilibus erectis lineari-lanceolatis acuminatis 3nerviis utrinque glabris, corymbo dichotomo, calycibus glabriusculis. *Georgia. Carolina.*

lutea Mx. 71. Rh. caule ſub-4angulo foliisque ſpathulato-linearibus 3nerviis hirſutiusculis, floribus ſubſolitariis terminalibus. *Carolina.* (Rh. linearifolia Poir.)

circaeaefolia Kunth. 72. Rh. foliis cordato-oblongis acuminatis 5nerviis ſerrulato-ciliatis nitidis, paniculae terminalis ramis divaricatis piloſis, capſula globoſa 2loculari. *Braſil.*

polyſtachya Kunth. 73. Rh. foliis cordato-ovatis acutis 5nerviis ſerrulato-ciliatis, ramis glanduloſo-piloſis, racemis terminalibus paniculatis, floribus minutis, capſula 2valvi. *Braſil.*

diverſifolia Domb. 74. Rh. foliis ovatis acutis 5nerviis ſerrulato-ciliatis glabro, altero minori, pedunculis terminalibus corymboſis divaricatis, calycibus glabris. *Peru.*

thymifolia Kunth. 75. Rh. foliis ovatis 3nerviis ſerrulato-ciliatis utrinque ramisque glanduloſo-piloſis, floribus racemoſis ſecundis, calycibus glutinoſis, capſula 3valvi. *Cayenn.*

indecora Kunth. 76. Rh. foliis cordato-ovatis 5nerviis utrinque ramisque hirſutis, paniculae ramoſiſſimae ramis divaricatis, calycibus pedicellatis glanduloſo-piloſis. *Braſil.*

ſileniflora Kunth. 77. Rh. foliis ſubcordato-oblongis 5nerviis ſerrulato-ciliatis glabris, paniculae terminalis ramis divaricatis, calycibus globoſis ſeſſilibus venoſis obſolete dentatis. *Braſil.*

ladanoides Rich. 78. Rh. foliis oblongo-lanceolatis acuminatis 5nerviis utrinque hiſpidis, pedunculis terminalibus ternis. *Guiana.*

anguſturenſis Bonpl. 79. Rh. foliis lanceolatis acuminatis 3nerviis piloſis, ramis teretibus, pedunculis 1floris, calycibus ſtellato-pubeſcentibus. *Ad Orinocum.*

leptophylla Bonpl. 80. Rh. foliis linearibus enerviis calycibusque apice ſetoſo-denticulatis, pedunculis terminalibus. *Ad Orinocum.*

tenella Bonpl. 81. Rh. foliis ſubcordato-ovatis acuminatis 5nerviis hiſpidulis ciliatis, ramis gracilibus patentibus, calycibus glanduloſo-piloſis. *Nov. Granat.*

piloſelloides Bonpl. 82. Rh. caule ſubſcapiformi paucifloro, foliis radicalibus oblongis 7nerviis ciliatis, calycibus bracteatis campanulatis, petalis criſtatis. *Nov. Granat.*

lanceolata Lam. 83. Rh. caule ſimplici ſub-4angulo, foliis ſeſſilibus oppoſitis lineari-lanceolatis crenulatis 3nerviis, floribus ſolitariis axillaribus, calycibus glabris. *Amer. auſtr.*

recurva Poir. 84. Rh. caule 4angulo ramoſo apice recurvo, foliis ovatis crenulatis ſubpubeſcentibus ſubtus incanis, floribus terminalibus ſubſolitariis. *Cayenn.*

1559. OSBEKIA.

* *Decandrae.*

Aubletiana * 1. O. caule fruticoſo, foliis cordatis acuminatis multinerviis hirſutis, pedunculis axillaribus termina-

libusque bracteatis 2fidis paucifloris, ſtaminibus 5 ſterilibus. *Guiana.* (Melaſtoma Aubl. Vahl. Rhexia Bonpl.)

*cernua** 2. O. caule fruticoſo, ramis 4gonis ſtrigoſis, foliis oblongis ſubdentatis 5nerviis ſubtus hirſutis, floribus terminalibus ſubternis pedunculatis cernuis. *Peru.* (Rhexia Bonpl.)

*tortuoſa** 3. O. caule fruticoſo, ramis tortuoſis, foliis lanceolatis 3nerviis hirſutiusculis, floribus ſparſis, calycibus hiſpidis. *Nov. Hiſpan.* (Rhexia Bonpl.)

*Langsdorffiana** 4. O. caule fruticoſo, ramis 4angulo-alatis, foliis oblongis 5nerviis ſubtus ſericeis, panicula terminali ampla, petalis ciliatis, capſula 5loculari. *Braſil.* (Rhexia Kunth.)

nepalenſis Hook. 5. O. caule ſuffruticoſo, foliis ſeſſilibus lanceolatis 5nerviis, floribus corymboſis, calyce ciliato-ſquamoſo. *Nepal.*

chinenſis 6. O. caule ſuffruticoſo, foliis petiolatis oblongis 3nerviis hirſutiusculis, floribus faſciculatis terminalibus, calycibus glabris. *China.*

*excelſa** 7. O. ramis 4gonis, foliis ovato-oblongis 5plinerviis crenulatis ſubtus discoloribus, pedunculis ſubcorymboſis terminalibus 3floris. *Loxa.* (Rhexia Bonpl.)

*lanceolata** 8. O. foliis lanceolatis acuminatis 5nerviis rufo-villoſis, floribus paniculatis, petalis ciliatis mucronatis. *Peru.* (Rhexia Bonpl.)

*divaricata** 9. O. ramis gracilibus 4gonis hiſpidis, foliis lineari-lanceolatis 3nerviis ciliatis remotis, pedunculis terminalibus dichotomis divaricatis, calycibus angulatis, petalis ciliatis mucronatis. *Ad Orinoc.* (Rhexia Bonpl.)

*heteranthera** 10. O. caule repente, foliis obovatis 3nerviis ciliatis, floribus terminalibus, calycibus hiſpidiſſimis, antheris 5 heteromorphis. *China.* (Melaſtoma repens Lam. Rhexia Bonpl.)

grandiflora Sm. 11. O. foliis ſubſeſſilibus oblongis 5nerviis hirſutis, floribus terminalibus paniculatis bracteatis, calycibus faſciculato-ſetoſis, laciniis elongatis obtuſis. *Sierra Leone.* Afzel.

multiflora Sm. 12. O. foliis petiolatis ovatis acutis 5nerviis hiſpidis, floribus racemoſis, calycibus ſetoſis. *Sierra Leone.* Afzel.

tubuloſa Sm. 13. O. foliis ovatis acutis 5nerviis hirſutis, floribus ſubracemoſis, calycis collo tubuloſo elongato, ſetis duplicibus. *Sierra Leone.* Afzel.

rotundifolia Sm. 14. O. foliis ſubrotundo-ovatis 3nerviis, calycibus globoſis ſtellato-ſetoſis. *Sierra Leone.* Afzel.

antennina Sm. 15. O. foliis ovatis 5nerviis ſetoſis, pedunculis elongatis terminalibus, laciniis calycinis plumoſo-ariſtatis. *Sierra Leone.* Afzel.

** *Octandrae.*

zeylanica 16. O. caule fruticoſo ſtrigoſo, foliis oblongis 3nerviis, floribus ſubſolitariis axillaribus terminalibusque, pilis calycis multifido-ſtellatis. *Ind. or.*

stellata Hamilt. 17. O. caule fruticoso, foliis oblongo-lanceolatis 5nerviis hispidis, floribus axillaribus terminalibusque subsolitariis, calycibus apice stellato-setaceis glandulosis. *Nepal.*

glutinosa * 18. O. caule fruticoso sulcato, foliis oblongis 3nerviis laevibus, floribus paniculato-congestis, ramis glutinosis. *Nov. Granat.* (Rhexia Mut.)

Bonplandiana * 19. O. foliis lanceolatis 7nerviis utrinque pilosis, floribus paniculatis, antheris basi aristatis. *Amer. austr.* (Rhexia Bonpl.)

1560. BOSWELLIA Colebr.

turifera Colebr. 1. B. foliolis glabris oblongis obtusis serrulatis, racemis paniculatis. *Ind. or. Persia austr. Arabia orient.* (B. glabra Roxb.)

balsamifera * 2. B. foliolis glabris ovatis acuminatis integerrimis, racemis abbreviatis paucifloris. *Inf. Molucc.* (Canarium balsamiferum W.)

hirsuta * 3. B. foliolis hirsutis oblongo-lanceolatis integerrimis, racemis elongatis multifloris. *Inf. Molucc.* (Canarium hirsutum W.)

1561. GARUGA Roxb.

pinnata Roxb. *Bengal.* Arbor magna, foliis pinnatis, foliolis oblongis glabris crenato-serratis, floribus paniculatis.

1562. BUCHANANIA Roxb.

angustifolia Roxb. *Ind. or. Cochinchina.* Arbor foliis oblongis obtusis, floribus paniculatis. (Tolvifera cochinchinensis Lour.?)

1563. BURSERA Jacq.

gummifera Jacq. 1. B. foliolis ovato-oblongis acuminatis nitidis, racemis axillaribus. *Ind. occ.* (B. acuminata W.)

paniculata Lam. 2. B. foliolis ovatis acutis, ramis tuberculosis, racemis paniculatis terminalibus. *Inf. Mascaren.*

obtusifolia Lam. 3. B. foliolis ovato-oblongis obtusis, racemis paniculatis terminalibus. *Inf. Mascaren.*

† 1564. BARAULTIA Steud.

madagascarensis * *Madagascar.* Frutex ramosus, foliis glaberrimis subdentatis pellucido-punctatis, pedunculis subtrifloris, floribus parvis globulosis. (Barraldeia Thuars.)

1565. FERONIA Corr.

Elephantum Roxb. 1. F. foliolis opacis, petiolo communi marginato glabro. *Ind. or.*

pellucida Roth. 2. F. foliolis punctato-pellucidis, petiolo communi tereti pubescente. *Ind. or.*

1566. GLYCOSMIS Corr.

arborea Corr. 1. Gl. foliolis oblongo-linearibus denticulatis. *Ind. or. Inf. Mascaren.* (Limonia arborea Roxb.)

pentaphylla Corr. 2. Gl. foliolis ovatis integerrimis. *Ind. or.* (Limonia 5phylla Roxb.)

1567. LIMONIA.

* *Foliis pinnatis.*

acidissima 1. L. spinis axillaribus, foliis sub-2jugis obovatis emarginatis crenulatis, petiolo communi alato, fructibus ovatis. *Ind. or.*

crenulata Roxb. 2. L. spinis axillaribus, foliis sub-2jugis ellipticis crenulatis, petiolo communi alato, floribus 4fidis 8andris, fructibus globosis. *Ind. or.*

minuta Forst. 3. L. foliis 5jugis alternis, foliolis ovato-oblongis acuminatis integerrimis, petiolo communi tereti pubescente, racemis corymbosis terminalibus. *Inf. Amicorum.*

madagascarensis Lam. 4. L. foliis 3jugis alternis, foliolis lanceolatis deptatis, paniculis axillaribus abbreviatis. *Madagascar.*

parviflora Sims. 5. L. foliis 2jugis elliptico-lanceolatis integerrimis, corollis campanulatis, fructibus subglobosis obliquis. *China.*

** *Foliis ternatis.*

† *mauritiana* Lam. 6. L. foliis subternatis ovatis acutiusculis, paniculis axillaribus, floribus 4fidis 8andris. *Inf. Mascaren.*

citrifolia W. 7. L. foliis simplicibus ternatisque, foliolis ovato-oblongis acuminatis, floribus axillaribus solitariis breviſſime petiolatis. *China.*

*** *Foliis simplicibus.*

lucida Forst. 8. L. foliis oblongis nitidis, pedunculis axillaribus. *Nov. Hebrid.*

Laureola Wall. 9. L. foliis lanceolatis coriaceis glaberrimis, floribus terminalibus corymboso-capitatis 5andris. *Nepal.*

1568. COOKIA Sonner.

punctata Sonner. 1. C. foliis pinnatis, foliolis ovatis acutis integerrimis, panicula diffusa terminali. *China austr. Inf. Moluce.* (Quinaria Lansium Lour.)

falcata Cand. 2. C. foliis pinnatis, foliolis lanceolatis falcatis crenatis, racemis terminalibus. *Cochinchina.* (Aulacia falcata Lour.)

1569. MURRAYA.

exotica

1. M. foliolis obovatis integerrimis, pedunculis corymbosis. *Ind. or. China.* (Chalcas japonensis Lour.)

paniculata Cand.

2. M. foliolis ovato-lanceolatis undulatis, panicula terminali diffusa. *Cochinchina. China. Inf. Moluc.* (Chalcas paniculata Lour.)

*Burmanni**

3. M. foliolis ovato-oblongis acuminatis pubescentibus, floribus paniculatis octandris. *Java.* (Glaucena excavata N. L. Burm.)

*Königii**

4. M. foliolis ovato-lanceolatis serratis, racemis corymbosis. *Ind. or.* (Bergera L.)

1570. LEDUM.

palustre

1. L. foliis linearibus margine revolutis subtus ramisque ferrugineo-tomentosis, floribus 10andris. *Europ., Asia* et *Amer. bor.*

latifolium Ait.

2. L. foliis elliptico-oblongis utrinque rotundatis subtus ramisque ferrugineo-tomentosis, floribus sub-5andris. *Amer. bor.* (L. grönlandicum Retz.)

1571. LEIOPHYLLUM Pers.

thymifolium Pers.

Amer. bor. Fruticulus foliis ellipticis utrinque glaberrimis nitidis integerrimis, floribus terminalibus fasciculato-corymbosis albido-rubris. (Ledum thymifolium Lam., buxifolium Berg., Ammyrsine Pursh., Fischera Sw.)

1572. CLETHRA.

alnifolia

1. Cl. foliis obovatis acutis utrinque glabris concoloribus apice serratis, racemis spicatis simplicibus bracteatis cano-tomentosis. *Amer. bor.*

tomentosa Lam.

2. Cl. foliis obovatis acutis apice serratis subtus racemisque villoso-tomentosis. *Amer. bor.* (Cl. pubescens W.)

scabra Pers.

3. Cl. foliis obovatis acutis uncinato-serratis utrinque scabris, racemo spicato subpaniculato bracteato subtomentoso. *Georgia.*

acuminata Mx.

4. Cl. foliis ovato-oblongis acuminatis serratis utrinque glabris subtus glaucis, racemis spicatis subsolitariis bracteatis tomentosis. *Carolina.*

fagifolia Kunth.

5. Cl. foliis obovatis dentatis coriaceis glabris, racemis fasciculatis terminalibus tomentosis. *Amer. austr.* (Cuellaria obovata R. et P.)

bicolor Kunth.

6. Cl. foliis oblongis obtusis undulato-crenatis glanduloso-denticulatis coriaceis subtus albo-tomentosis, racemis fasciculatis ferrugineo-tomentosis. *Nov. Granat.*

fimbriata Kunth.

7. Cl. foliis oblongis obtusiusculis undulatis coriaceis subtus incano-tomentosis, racemis fasciculatis

ferruginec-tomentoſis, petalis fimbriatis. *Noc. Granat.*

paniculata Ait. 8. Cl. foliis lanceolatis ſerratis utrinque glabris, paniculae terminalis, elongatae ramis racemoſis tomentoſis. *Carolina.*

arborea Ait. 9. Cl. foliis oblongis utrinque attenuatis argute ſerratis ſubtus villoſiusculis, racemis paniculatis ebracteatis pubeſcentibus. *Madera.*

tinifolia Sw. 10. Cl. foliis oblongis obtuſis integerrimis ſubtus incano-tomentoſis, racemis paniculatis elongatis pubeſcentibus. *Jamaica.*

†*ferruginea* Link. 11. Cl. foliis ſubcordato-oblongis acuminatis integerrimis ſubtus ferrugineis. *Peru.* (Cuellaria R. et P.)

†*revoluta** 12. Cl. foliis ſubcordato-oblongis denticulatis margine revolutis. *Peru.* (Cuellaria R. et P.)

1573. CLIFTONIA Banks.

liguſtrina Sims. *Georgia.* Frutex ramoſus foliis ſubſpathulato-lanceolatis utrinque glabris ſubtus glaucis, floribus racemoſis bracteatis albis. (Mylocaryum W.)

1574. PYROLA.

**Stylo erecto.*

uniflora 1. P. ſcapo uniflore, foliis ſuborbiculatis dentatis. *Europ. Amer. bor.*

ſecunda 2. P. racemo ſecundo, foliis ovatis ſerratis. *Europ. Amer. bor.*

minor 3. P. racemo aequali, corollis campanulatis, foliis ovatis acutis dentatis. *Europ. Sibir. Amer. bor.* (P. roſea Sm.)

***Stylo declinato.*

media Sw. 4. P. racemo aequali, corollis ſubgloboſis, ſtylo declinato recto, ſtaminibus conniventibus, foliis ſubrotundis crenato-dentatis. *German. med. Suecia. Anglia.* (P. rotundifolia fl. dan.)

rotundifolia 5. P. racemo aequali, laciniis calycinis lanceolatis, ſtylo recurvo elongato, ſtaminibus aſcendentibus, foliis ſubrotundis obtuſis crenatis nitidis. *Europ. Amer. bor.* (P. grandiflora Rad.)

elliptica Nutt. 6. P. racemo paucifloro, laciniis calycinis ovatis, ſtylo recurvo elongato, ſtigmate tuberculato, foliis ellipticis mucronatis crenatis. *Penſylvan.*

aſarifolia Mx. 7. P. racemo aequali, laciniis calycinis ovatis appreſſis, ſtylo recurvo clavaeformi germen duplo excedente, ſtaminibus ſubaſcendentibus, foliis reniformibus repando-crenatis petiolo dilatato brevioribus. *Amer. bor.*

chlorantha Sw. 8. P. racemo paucifloro, laciniis calycis breviſſimis obtuſis, ſtigmate clavato, antheris tubuloſis, foliis orbiculatis obſolete crenatis petiolo anguſto

brevioribus. *Suecia. Canada ſuper.* (P. convoluta Bart. minor Pursh.)

occidentalis R. Br. 9. P. racemo paucifloro, laciniis calycis oblongis obtuſis, ſtigmate annulato 5lobo, antheris breviter foratis, foliis ſubrotundis membranaceis obſolete denticulatis petiolo brevioribus. *Ora occid. Amer. bor.*

dentata Sm. 10. P. racemo ſtricto, ſtaminibus aſcendentibus, ſtylo falcato, ſtigmate cylindrico 5fido, foliis obovatis obtuſis dentatis. *Ora occid. Amer. bor.*

picta Sm. 11. P. racemo ſecundo, ſepalis patulis, ſtylo incurvo, foliis ovatis obtuſis ſubſerratis maculatis. *Ora occid. Amer. bor.*

aphylla Sm. 12. P. ſcapo aphyllo ſquamato ſubracemoſo, floribus globoſis pendulis, laciniis calycis ovatis acutis crenulatis, antheris roſtratis, ſtylo incurvo. *Ora occid. Amer. bor.*

1575. CHIMAPHILA Pursh.

umbellata Nutt. 1. Ch. floribus umbellatis, foliis ſpathulato-lanceolatis acutis ſerratis. *Europ. Aſia* et *Amer. bor.* (Ch. corymboſa Pursh. Pyrola umbellata L.)

maculata Pursh. 2. Ch. ſcapo ſub-2floro, ſtaminibus baſi villoſis, foliis lanceolatis ſerratis albo-vittatis. *Amer. bor.* (Pyrola L.)

*Menzieſii** 3. Ch. pedunculo ſub-2floro gracili, bracteis ſubrotundis, laciniis calycis acutis, ſtaminibus medio barbatis, ſtylo elongato, foliis lanceolatis acuminatis coriaceis ſerrulatis ſubtus discoloribus. *Ora occident. Amer. bor.* (Pyrola Menzieſii R. Br. Don.)

1576. MONOTROPA.

Hypopitys 1. M. racemo multifloro, petalis villoſis integerrimis ſtylum pubeſcentem ſuperantibus. *Europ., Aſia* et *Amer. bor.* (Hypopitys europaea Nutt. Monotropſis odorata Schweinitz. Elliott.)

*Hypoxya** 2. M. racemo paucifloro, petalis glabris laceris ſtylum glaberrimum ſubaequantibus. *Sylvae fageae Europ.* (M. hypophegea Wallr.)

lanuginoſa Mx. 3. M. racemo laxo paucifloro, bracteis petalisque dentato-laceris fimbriato-barbatis ſtylo longioribus. *Amer. bor.*

Moriſoniana Mx. 4. M. ſcapo elongato 1floro, ſquamis diſtantibus, flore erecto. *Amer. bor.*

uniflora 5. M. ſcapo brevi 1floro, ſquamis patentibus, flore cernuo campanulato. *Amer. bor.*

1577. GOMPHIA.

* *Foliis integerrimis.*

grandiflora Cand. 1. G. foliis ovato-oblongis acuminatis, panicula terminali ſtricta, petalis ſubrotundis calyce longioribus. *Braſil.* (Correia n. 2. Velloz. Vandell.)

aquatica Kunth. 2. G. foliis ovato-oblongis acutiusculis obſolete venoſis, racemis ſubſimplicibus elongatis, petalis calycem ſubaequantibus. *Ad Orinocum.*

laurifolia Sw. 3. G. foliis oblongis utrinque attenuatis nitidis, panicula diffuſa, petalis ſubrotundis calycem aequantibus. *Ind. occid.*

oleaefolia Hilar. 4. G. foliis oblongo-lanceolatis obtuſiusculis margine revolutis pubeſcentibus, floribus paniculatis. *Braſil.*

longifolia Lam. 5. G. foliis ſubcordato-oblongis acutis elongatis glaberrimis, panicula diffuſa. *Guadalupa. Guiana.* (Ouratea guianenſis Aubl.)

guianenſis Rich. 6. G. foliis oblongis obtuſis ſubemarginatis ſubintegerrimis, paniculae ramis faſciculatis, ſepalis oblongis obtuſiusculis. *Guiana.*

obtuſifolia Cand. 7. G. foliis ſpathulato-oblongis obtuſis, racemi ſubcompoſiti ramis 3fidis, ſepalis lanceolatis acuminatis. *Madagaſcar.* (Ochna obtuſifolia Lam., laevigata Vahl.)

caſſinaefolia Cand. 8. G. foliis cordato-ovatis obtuſis, racemo ſimplici terminali. *Braſil.*

** *Foliis ſubſerratis, ſerratis, dentatis.*

pariflora Cand. 9. G. foliis lanceolatis utrinque attenuatis obſolete crenatis, floribus paniculatis, petalis calycem aequantibus. *Braſil.*

ceylanica Cand. 10. G. foliis oblongis utrinque attenuatis ſubdenticulatis, racemis elongatis terminalibus, drupis globoſis. *Ceylon.* (Ochna ceylanica Lam.)

dependens Cand. 11. G. foliis oblongo-lanceolatis elongatis ſubdenticulatis, ſtipulis perſiſtentibus lanceolatis, racemis ſimplicibus pendulis longiſſimis. *Madagaſcar.*

angulata Cand. 12. G. foliis obovato-oblongis baſi attenuatis ſubcordatis ſerratis, racemi ſubcompoſiti elongati ramis angulatis. *Madagaſcar.*

† *malabarica* Cand. 13. G. foliis oblongis utrinque attenuatis denticulatis eveniis nitidis, racemis paniculatis. *Ind. or.*

anguſtifolia Vahl. 14. G. foliis lanceolatis ſubſeſſilibus apice ſerratis reticulato-venoſis, floribus paniculatis. *Ind. or.*

glaberrima P. B. 15. G. foliis oblongo-lanceolatis acuminatis apice ſerratis ſubeveniis nitidis, racemis ſimplicibus. *Guinea.*

mexicana Humb. 16. G. foliis oblongis utrinque attenuatis ſerratis, racemis brevibus confertis. *Mexico.*

reticulata P. B. 17. G. foliis oblongo-lanceolatis acutis ſerratis reticulato-venoſis, floribus paniculatis. *Guinea.*

cardioſperma Cand. 18. G. foliis oblongo-lanceolatis ſerrulatis venoſis, panicula ſtricta, fructibus obcordato-2lobis. *Guianu.* (Ochna cardioſperma Lam.)

acuminata Cand. 19. G. foliis oblongis utrinque attenuatis ſubtus pallidis apice ſerratis, floribus paniculatis. *Braſil.*

nitida Sw. 20. G. foliis ovali-oblongis acuminatis ſubſerratis utrinque lucidis ſubtiliſſime venoſiſſimis, panicula terminali ſtricta. *Jamaica.*

squamosa Cand. 21. G. foliis oblongo-lanceolatis subserratis venosis, stipulis confertis persistentibus aristatis, racemis subpaniculatis. *Inf. Carib.*

Jabotapita 22. G. foliis oblongo-lanceolatis argute serrulatis nitidiusculis venosis, racemis simplicibus, petalis calyce triplo longioribus. *Brasil. Ind. occid.*

castaneaefolia Cand. 23. G. foliis oblongis acutis argute serratis, panicula ramosissima, petalis calycem aequantibus. *Brasil.* (Correia 1. Vandell.)

ilicifolia Cand. 24. G. foliis ovali-oblongis spinoso-dentatis glaberrimis, panicula pyramidata terminali. *Hispaniola.*

1578. QUASSIA.

amara 1. Qu. floribus ☿ racemosis, foliis pinnatis 2jugis oblongis nitidis, petiolo communi alato. *Surinam.*

excelsa Sw. 2. Qu. floribus polygamis paniculatis 5andris, foliis opposite pinnatis 5jugis, petiolis teretibus stipulatis, foliolis oblongis acutis nervoso-venosis. *Jamaica. Inf. Carib.*

Simaruba 3. Qu. floribus monoecis 10andris paniculatis, foliis alternatim pinnatis, petiolis teretibus, foliolis oblongis acutiusculis subtus pubescentibus. *Guiana. Inf. Carib.* (Simaruba amara Aubl. officinalis Cand.)

*glauca** 4. Qu. floribus monoecis 10andris paniculatis, foliis alternatim pinnatis, petiolis teretibus, foliolis oblnogis subtus glabris glaucis. *Cuba.* (Simaruba Kunth.)

1579. ZWINGERA Schreb.

*Aruba** 1. Zw. foliis ternatis lanceolatis acuminatis, racemis terminalibus. *Guiana.* (Aruba guianensis Aubl.)

amara W. 2. Zw. foliis ternato-pinnatis bijugis, foliolis lanceolatis emarginatis, pedunculis lateralibus subracemosis. *Guiana.* (Simaba guianensis Aubl.)

*orinocensis** 3. Zw. foliis ternato-pinnatis bijugis, foliolis oblongis obtusis, racemis terminalibus. *Ad Orinoc.* (Simaba Kunth.)

*floribunda** 4. Zw. foliis impari-pinnatis, foliolis oblongis obtusiusculis lucidis, panicula terminali pyramidata pubescente. *Brasil.* (Simaba Hilar.)

*ferruginea** 5. Zw. foliis impari-pinnatis, foliolis oblongis obtusiusculis subtus ramisque ferrugineo-pubescentibus, panicula terminali subsessili. *Brasil.* (Simaba Hilar.)

*juaceolens** 6. Zw. foliis abrupte pinnatis, foliolis ellipticis obtusissimis glabris, floribus paniculatis glanduloso-pubescentibus. *Brasil.* (Simaba Hilar.)

*trichilioides** 7. Zw. foliis pinnatis sub-4jugis, foliolis ellipticis obtusis mucronatis supra pubescentibus subtus tomentosis, floribus paniculato-glomeratis rufo-tomentosis. *Brasil.* (Simaba Hilar.)

1580. RUTA.

*Foliis decompositis.

graveolens — 1. R. foliolis lateralibus oblongis terminali obovato glaberrimis, petalis subdentatis, germine glabro punctato. *Europ. austr.*

divaricata Tenor. — 2. R. foliolis obovatis aequalibus, petalis fimbriatis. *Italia. Graecia. Tauria.*

bracteosa Cand. — 3. R. foliolis oblongis obtusis subaequalibus, bracteis subcordatis maximis, petalis fimbriatis. *Sicilia. Inf. maris aegei.*

corsica Cand. — 4. R. foliolis obovatis aequalibus, pedunculis elongatis racemosis rigidis divaricatis, petalis integerrimis. *Corsica.* (R. divaricata Salzm.)

macrophylla Ker. — 5. R. foliolis inferioribus 3partitis, terminali maximo obovato, petalis fimbriatis. *Afric. bor. Syria.* (R. chalepensis *α.* L.)

albiflora Hook. — 6. R. foliolis obovatis glaucis pubescentibus subauriculatis, terminali maximo obcordato, paniculae ramis bracteatis cernuis, staminibus petala integerrima superantibus, germine pedicellato. *Nepal.*

angustifolia Pers. — 7. R. foliolis oblongo-linearibus subaequalibus, bracteis minimis, petalis subfimbriatis. *Europ. austr. Asia minor.* (R. chalepensis *β.* L., crithmifolia Moricand.)

montana — 8. R. foliolis linearibus acutis glaucis subdivaricatis, petalis oblongis obtusis integerrimis. *Europ. austr. Afric. bor.* (R. legitima Jacqu. tenuifolia Desf.)

**Foliis pinnatis.

pinnata — 9. R. foliis pinnatis 3jugis, foliolis lanceolatis obtusiusculis subdentatis subtus pallidis, pedunculis subcorymbosis, petalis undulatis. *Inf. Canar.*

***Foliis ternatis.

patavina — 10. R. foliis lineari-lanceolatis acutis glabris petalisque integerrimis, corymbo conferto, calycibus villosis. *Montes Euganei prope Patav.*

pubescens W. — 11. R. foliis ternatis simplicibusque lanceolatis pubescentibus, corymbo multifloro, calycibus germinibusque villosis. *Hispan.* (R. patavina Poir.)

dichotoma Cand. — 12. R. foliis ternatis linearibus integerrimis, corymbo dichotome paniculato, staminibus basi dilatatis, calycibus subciliatis. *Persia.*

****Foliis simplicibus.

acutifolia Cand. — 13. R. foliis oblongis utrinque attenuatis subpetiolatis glabris, panicula dichotoma corymbosa, calycibus acutissimis subciliatis, capsulis glabris. *Persia.*

glabra Cand. — 14. R. foliis lineari-oblongis integerrimis glabris subtus glandulosis, calycibus laevibus, petalis oblongo-linearibus. *Persia.*

15.

fruticulosa Labill.

15. R. foliis oblongis obtusiusculis calycibusque villosis, corymbo paucifloro, petalis oblongis, germinibus villosissimis. *Syria. Palaestina.* (R. villosa Sieb.)

villosa M. B.

16. R. foliis oblongo-linearibus pubescentibus, floribus racemosis parvis, calycibus germinibusque glanduloso-tuberculatis hirsutis, petalis oblongis. *Caucas. Bessarabia.*

tuberculata Forsk.

17. R. foliis lineari-lanceolatis pilosis subtus tuberculosis, panicula dichotoma corymbosa, capsulis tuberculatis pilosis. *Arabia. Aegypt.*

linifolia

18. R. foliis oblongo-lanceolatis glabriusculis, floribus corymbosis, calycibus ciliatis, ovariis villosis. *Hispan. Africa bor.*

Buxbaumii Poir.

19. R. foliis lanceolatis basi attenuatis caulesque superne pubescentibus, floribus paniculato-corymbosis, staminibus calycibusque ciliatis, capsulis aspero-tuberculatis. *Tauria. Bessarabia. Asia minor.* (R. linifolia M. B., suaveolens Cand.)

linearis Cand.

20. R. foliis linearibus glabris subtus punctatis, corymbis paucifloris dichotomis, petalis linearioblongis, capsulis glabris 3lobis. *Sibir. austr.*

† *rosmarinifolia* Pers.

21. R. foliis linearibus subtus punctatis, caule ramosissimo. *Hispan.*

dauurica Cand.

22. R. foliis lineari-lanceolatis glabris, corymbo coarctato, sepalis subrotundis staminibusque basi ciliatis, petalis ovatis, germinibus glabris. *Asia bor.* (Peganum dauricum β. L. R. thesioides Fisch.)

1581. DICTAMNUS.

albus

Europ. med. Herba cubitalis et altior, foliis pinnatis ovatis serratis nitidis, racemo terminali glanduloso-resinoso, floribus roseis.

1582. ERIOSTEMON Sm.

buxifolius Sm.

1. E. foliis obovato-oblongis mucronatis crenato-glanduloſis glabris, ramis teretibus pilosis, floribus axillaribus sessilibus glabris, filamentis hispidis. *Nov. Holl.*

salicifolius Sm.

2. E. foliis lineari-lanceolatis integerrimis glabris, ramulis 3quetris, floribus axillaribus subsessilibus bracteolatis solitariis, calycibus petalisque extus canescentibus, filamentis hispidis. *Nov. Holl.*

paradoxus Sm.

3. E. foliis simplicibus ternatis pinnatisque lanceolatis margine revolutis subtus hirsutis, floribus axillaribus 4petalis. *Nov. Holl.*

myoporoides Sm.

4. E. foliis lineari-lanceolatis integerrimis apice callosis glanduloso-punctatis, pedunculis axillaribus 3floris, filamentis ciliatis. *Nov. Holl.* (E. linearifolius Cand.)

squameus Labill. 5. E. foliis lanceolatis integerrimis subtus rufo-lepidotis, ramulis angulatis, pedunculis axillaribus 3floris, filamentis glabris. *Nov. Holl.*

lepidotus * 6. E. foliis lineari-oblongis acutis subtus floribusque lepidotis, staminibus glabriusculis exsertis. *Nov. Holl.* (Phebalium squamulosum Vent.)

anceps * 7. E. foliis spathulato-lanceolatis glabriusculis, floribus corymbosis lepidotis, staminibus glabris corolla brevioribus. *Nov. Holl.* (Phebalium anceps Cand.)

1583. CROWEA Sm.

saligna Sm. *Nov. Holl.* Fruticulus foliis lanceolatis integerrimis, floribus axillaribus solitariis roseis.

1584. CHOISIA Kunth.

ternata Kunth. *Mexico.* Frutex foliis ternatis glanduloso-punctatis, floribus fasciculatis albis.

1585. GUAIACUM.

dubium Forst. 1. Gu. foliis binatis oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis supra nitidis subtus pallidis, racemo paucifloro. *Inf. Amicorum.*

officinale 2. Gu. foliis 2jugis nitidis, foliolis aequalibus obovatis obtusis, pedunculis geminis. *Jamaica. Hispaniola.* (Flores subcoerulei.)

Breynii * 3. Gu. foliis 2-3jugis nitidiusculis, foliolis inaequalibus, extremis oblongo-ellipticis inaequilateris, mediis obovatis, infimis subrotundis, pedunculis umbellatis. *Ad fl. Magdalenae.* Bertero. (Flores flavi.)

verticale Ort. 4. Gu. foliis 5jugis opacis, foliolis oblongis obtusis mucronatis, pedunculis subgeminis, petalis verticalibus. *Nov. Hispan. Hispaniola.* (Flores coerulei.)

sanctum 5. Gu. foliis 5jugis nitidulis, foliolis obovatis aequalibus, pedunculis binis, petalis fimbriatis. *Brasil.*

arboreum Kunth. 6. Gu. foliis multijugis, foliolis subalternis lineari-oblongis obtusis mucronatis inaequilateris nervosis, petiolis ramulisque subpubescentibus, pedunculis subcorymbosis. *Amer. austr.* (Zygophyllum arboreum Jacq.)

1586. ZYGOPHYLLUM.

* *Foliis pinnatis.*

coccineum 1. Z. foliolis teretibus carnosis laevibus, pedunculis subsolitariis, petalis acuminatis, capsulis cylindricis. *Aegypt. Afric. bor.* (Z. desertorum Forsk.)

album 2. Z. foliolis clavatis carnosis incano-lanatis, pedunculis subsolitariis, petalis obtusis, capsulis 5gonis. *Aegypt. Afric. bor. Inf. Canar.* (Z. proliferum Forsk.)

spinosum 3. Z. foliolis linearibus carnosis sessilibus supra planis, stipulis quaternis subulatis, petiolis spinescentibus. *C. B. S.*

maculatum Ait. 4. Z. foliolis lineari-lanceolatis petiolatis, floribus maculatis. *C. B. S.*

sessilifolium 5. Z. foliolis sessilibus quaternis obovatis margine scabris, stipulis brevissimis scariosis, ramis angulatis, capsula 5gona. *C. B. S.*

decumbens Delil. 6. Z. foliolis petiolatis spathulatis carnosis, caule decumbente, ramis floriferis dichotomis, capsula turbinato-sphaerica. *Aegypt.*

foetidum Wendl. 7. Z. foliolis petiolatis subrotundo-obovatis, pedunculis nutantibus, petalis reflexis subincisis maculatis. *C. B. S.* (Z. retrofractum Thunb.?)

Fabago 8. Z. foliolis petiolatis obovatis inaequilateris, pedunculis geminis erectis, calycibus glabris, petalis integerrimis, capsulis 5gonis. *Syria. Tauria. Africa bor.*

Morgsana 9. Z. foliolis petiolatis obovato-oblongis carnosis laevibus, stipulis linearibus reflexis, pedunculis geminis nutantibus, capsulis inflatis alatis. *C. B. S.*

microphyllum Thunb. 10. Z. foliolis sessilibus obovatis emarginatis glabris, capsulis alatis, caule fruticoso. *Afr. austr.* (Z. capense Lam.)

prostratum Thunb. 11. Z. foliolis subpetiolatis ovatis mucronatis scabris, caule decumbente ramoso, geniculis hirtis, pedunculis solitariis. *Afric. austr.*

tridentatum Sess. 12. Z. foliolis subsessilibus obovatis villosis, petalis staminumque squamis apice 3dentatis, capsula hirsutissima. *Nov. Hispan.*

† *aestuans* 13. Z. foliolis sessilibus obovatis retusis, caule herbaceo. *Surinam.*

Billarderii Cand. 14. Z. foliolis petiolatis oblongis carnosis, caule herbaceo decumbente, calycibus elongatis reflexis, capsulis turbinatis. *Nov. Holl. austr.*

fruticulosum Cand. 15. Z. foliolis petiolatis oblongis carnosis, caule fruticoso erecto, pedunculis brevissimis, staminibus exappendiculatis. *Nov. Holl.*

** *Foliis simplicibus.*

simplex 16. Z. foliis sessilibus clavato-cylindricis, caule lignoso, capsulis angulatis stylo persistente coronatis. *Aegypt. Arab.* (Z. portulacoides Forsk.)

cordifolium L. suppl. 17. Z. foliis sessilibus cordato-orbiculatis carnosis glabris, pedunculis filiformibus, caule fruticoso. *C. B. S.*

1587. LARREA Cav.

nitida Cav. 1. L. foliis impari-pinnatis 8jugis lucidis, foliolis ſpathulatis, ſtipulis linearibus, ramis glutinoſis hirſutis, pedunculis axillaribus 1floris, fructibus glabris. *Buenos Ayres.*

divaricata Cav. 2. L. foliis oppoſitis 2lobis villoſis, lobis lanceolatis acutis nervoſis divaricatis, ſtipulis tuberculatis, pedunculis axillaribus 1floris, fructibus hirſutis. *Buenos Ayres.*

cuneifolia Cav. 3. L. foliis oppoſitis cuneatis apice 2lobis medio mucronatis, lobis acutis, ſtipulis abbreviatis craſſis. *Buenos Ayres.*

1588. FAGONIA.

* *Foliis ternatis.*

cretica 1. F. foliolis lineari-lanceolatis cuſpidatis, ſtipulis abbreviatis recurvis rigidis, pedunculis pubeſcentibus ſolitariis, fructibus glabris. *Europ. auſtr. Afric. bor.* (F. hiſpanica L. varietas.)

arabica 2. F. foliolis lineari-lanceolatis ſubtus convexis cuſpidatis ſcabris abbreviatis, ſtipulis ſpinoſis horizontalibus elongatis, caule lignoſo ramoſiſſimo, fructibus villoſis. *Arab. Aegypt.*

mollis Delil. 3. F. foliolis ovatis mucronatis villoſis, ſtipulis ſubulato-ſpinoſis horizontalibus foliola ſubaequantibus, caule fruticoſo diffuſo, fructibus hiſpidis. *Aegypt.*

glutinoſa Delil. 4. F. foliolis obovatis mucronatis villoſiusculo-glutinoſis, ſtipulis ſubulatis rectis petiolo brevioribus, caule proſtrato dichotomo fructibusque viſcoſis. *Aegypt.* (F. ſcabra Forsk.)

latifolia Delil. 5. F. foliolis lateralibus ſpathulato-lanceolatis, medio maximo ſuborbiculato mucronato, ſtipulis ſubulatis abbreviatis, caule herbaceo piloſo. *Aegypt.*

** *Foliis ſimplicibus.*

perſica Cand. 6. F. foliis oppoſitis ſubſeſſilibus ovali-oblongis glabris, ſtipulis ſubulatis erectis, caule herbaceo. *Perſia.* Garcin. (F. indica N. L. Burm. L. Oliverii Cand.)

Bruguieri Cand. 7. F. foliis oblongis cuſpidatis, ſtipulis ſpinoſis foliis longioribus, ramis 4gonis, pedunculis breviſſimis, fructibus pubeſcentibus. *Ad Euphrat. et in Ind. or.* (F. myſorenſis Roth.)

1589. TRIBULUS.

ciſtoides 1. Tr. foliis ſub-8jugis ſubtus ſericeis, foliolis ſubaequalibus oblongis obtuſis mucronatis, pedunculis folia aequantibus, fructibus villoſis. *Ind. orient.*

albus Poir. 2. Tr. foliis ſub-8jugis utrinque villoſis, foliolis ſubaequalibus ovalibus, pedunculis folio brevioribus, fructibus villoſis. *Senegambia.*

terreſtris 3. Tr. foliis 6jugis ſubtus villoſis, foliolis ſubaequalibus oblongo-lanceolatis, pedunculis folio brevioribus, fructu 4corni. *Europ. auſtr. Aſia med. Africa.*

alatus Delil. 4. Tr. foliis ſub-6jugis utrinque albido-villoſiſſimis, pedunculis abbreviatis, fructu acerato alato. *Aegypt.*

lanuginoſus 5. Tr. foliis ſub-5jugis utrinque villoſiusculis, foliolis ſubaequalibus lineari-oblongis, pedunculis folio brevioribus, fructibus 2cornibus. *Ceylon.*

maximus 6. Tr. foliis ſub-3jugis exterioribus majoribus, pedunculis folio brevioribus, fructibus inermibus 10ſpermis. *Ind. occ.*

trijugatus Nutt. 7. Tr. foliis 3jugis ſubtus pubeſcentibus exterioribus majoribus, fructibus muricatis 5ſpermis. *Georgia.*

1590. ENTADA Adanſ.

Parrana * 1. E. foliis conjugato-pinnatis cirrho terminatis, pinnis 4jugis, foliis bifformibus, caule ſcandente. *Ind. or. et occid.* (Mimoſa ſcandens L. Acacia W.)

Rheedii * 2. E. foliis 2pinnatis cirrho terminatis, partialibus 2-propriis 4jugis emarginatis, ſpicis cylindricis, caule ſcandente. *Ind. or.* (Mimoſa Entada L.)

1591. DESMANTHUS W.

(Folia omnium 2pinnata.)

lacuſtris W. 1. D. foliis partialibus 3 propriis multijugis, foliolis linearibus obtuſis, ſpicis ovatis, pedunculis bracteatis, caule repente tereti. *Amer. austr.*

natans W. 2. D. foliis partialibus 3-propriis 13jugis, ſpicis oblongis interruptis, pedunculis nudis, caule repente tumido ſubcarnoſo. *Ind. or. Cochinchina.* (Mimoſa natans Vahl. Neptunia oleracea Lour.)

triquetrus W. 3. D. foliis partialibus 3-propriis 12jugis, ſpicis globoſis, pedunculo bracteato, caule proſtrato ſuperne 3quetro. *Ind. or.* (Mimoſa natans L., 3quetra Vahl.)

plenus W. 4. D. foliis partialibus 3-propriis 12jugis, ſpicis ovatis, pedunculo bracteato, caule proſtrato compreſſo. *Nov. Hiſpan.* (Mimoſa plena L.)

depreſſus Humb. 5. D. foliis partialibus 2-propriis 12jugis, ſpicis pauciflоris globoſis, pedunculo nudo, caule diffuſo ſuperne 4gono. *Amer. auſtr.*

diffuſus W. 6. D. foliis partialibus 4-propriis 12jugis, ſpicis pauciflоris capitatis 5andris, caule proſtrato. *Amer. auſtr.* (Mimoſa pernambucana L.)

virgatus W. 7. D. foliis partialibus 4-propriis 12jugis, ſpicis paucifloris capitatis, caule erecto angulato. *Ind. or.* (Mimoſa virgata L.)

punctatus W. 8. D. foliis partialibus 4-propriis multijugis, ſpicis ovatis, pedunculo baſi bracteato, legumine oblongo obtuſo, caule erecto calloſo-punctato. *Jamaica.* (Mimoſa punctata L.)

1592. PROSOPIS.

* *Inermes.*

ſpicigera 1. Pr. foliis conjugato-pinnatis, foliolis 8jugis linearibus obtuſis, ſpicis axillaribus elongatis. *Ind. or.*

cumanenſis Kunth. 2. Pr. foliis conjugato-pinnatis, foliolis 11jugis linearibus remotiusculis, glandula baſilari ſeſſili, ſpicis filiformibus, caule erecto, ramis teretibus. *Cumana.* (Acacia cumanenſis W.)

dulcis Kunth. 3. Pr. foliis conjugato-pinnatis, foliolis multijugis glabris, petiolo glanduloſo, ſpicis filiformibus, caule erecto tuberculato. *Nov. Hiſpan.* (Acacia laevigata et edulis W.)

pallida Kunth. 4. Pr. foliis conjugato-pinnatis, foliolis 12jugis pubeſcentibus, petiolo glanduloſo, ſpicis filiformibus elongatis, caule erecto tuberculato. *Amer. auſtr.* (Acacia pallida W.)

** *Spinoſae.*

affinis * 5. Pr. foliis conjugato-pinnatis, foliolis multijugis remotiusculis glaberrimis, petiolo eglanduloſo, ramis tuberculoſis, ſpinis rectis, ſpicis filiformibus conjugatis. *Monte Video.*

horrida Kunth. 6. Pr. foliis 2pinnatis partialibus ſub-3jugis, propriis ſub-10jugis oblongis pubeſcentibus, petiolo glanduloſo, ſpinis ſtipularibus geminis longiſſimis. *Amer. auſtr.*

Stephaniana Kunth. 7. Pr. foliis 2pinnatis, partialibus 5-propriis 10jugis ſubtus pubeſcentibus, ſpicis filiformibus elongatis, aculeis compreſſis ſparſis ſubuncinatis. *Perſia bor. Caucaſ.* (Mimoſa et Lagonychium MB. Acacia W.)

1593. SCHOTIA Jacqu.

ſpecioſa Jacq. 1. Sch. foliis ſub-8jugis ovali-lanceolatis mucronatis nitidis, ſtipulis ſubulatis. *Afric. auſtr.* (Guaiacum afrum L.)

tamarindifolia Afzel. 2. Sch. foliis ſub-8jugis ellipticis retuſis altero margine excavatis. *C. B. S.*

ſtipulata R. Br. 3. Sch. foliis 5jugis oblongis acutis cuſpidatis, ſtipulis dimidiato-ovatis falcatis mucronatis. *C. B. S.*

1594. OMPHALOBIUM Jacqu. fil.

Schotia Jacq. *C. B. S.* Frutex foliis 3jugis obovato-oblongis obtusissimis, floribus racemosis roseis. (Schotia latifolia Jacq.)

1595. CYNOMETRA.

cauliflora 1. C. foliis binatis oblongis inaequilateris, trunco florifero. *Inf. Molucc.*

ramiflora 2. C. foliis binatis lanceolatis acuminatis, ramis floriferis. *Inf. Molucc. Ind. or.*

polyandra Roxb. 3. C. foliis abrupte pinnatis 2jugis, ramulis floriferis, floribus polyandris. *Silhet, Ind. or.*

† *Agallocha* * 4. C. foliis simplicibus lanceolatis, pedunculis multifloris terminalibus, fructibus sublignosis. *Cochinchina.* (Aloëxylum Agallochum Lour.)

1596. GYMNOCLADUS Lam.

canadensis Lam. *Canada.* Arbor foliis 2pinnatis, foliolis sub-10jugis ovatis acutis subtus pubescentibus, floribus racemosis albis. (Guilandina dioeca L.)

1597. GUILANDINA.

Bonduc 1. Gu. foliis 2pinnatis, foliolis ovatis basi aculeatis, floribus subspicatis. *Ind. or. et occ.* (Gu. Bonduccella L. var.)

gemina Lour. 2. Gu. foliis pinnatis, foliolis ovatis obtusis basi aculeatis, floribus paniculatis, fructibus geminis echinatis. *Cochinchina.*

paniculata Lam. 3. Gu. foliis pinnatis, foliolis ovalibus basi aculeatis, floribus paniculatis, fructibus laevibus. *Malabar.*

axillaris Lam. 4. Gu. foliis pinnatis basi aculeatis, floribus axillaribus subsolitariis, fructibus villosis. *Malabar.*

echinata * 5. Gu. caule ramisque aculeatis, foliis 2pinnatis, foliolis ellipticis obtusis, racemis simplicibus, fructibus echinatis. *Brasil.* (Caesalpinia echinata Lam.)

1598. HYPERANTHERA Vahl.

decandra W. 1. H. floribus 10andris, foliis subbipinnatis, foliolis ovatis inferioribus ternatis, leguminibus sub-8gonis. *Ind. or.* (Anoma Moringa Lour.)

Moringa Vahl. 2. H. floribus semi-10andris, foliis subbipinnatis, foliolis subrotundis obtusis, inferioribus ternatis, leguminibus 3gonis. *Ind. or. et occid. Aegypt.* (Guilandina Moringa L. Moringa zeylanica Lam. Anoma Morunga Lour.)

peregrina Forsk. 3. H. floribus semi-10andris, foliis 2pinnatis, apice simpliciter pinnatis, leguminibus 6sulcis. *Arabia.*

(H. ſemi-10andra Vahl. Gymnocladus arabica Lam.)

† *cochinchinenſis* W. 4. H. floribus ſemi-10andris, foliis 2pinnatis tomentoſis, leguminibus 2valvibus, ſeminibus nudis. *Cochinchina.* (Anoma Lour.)

1599. ADENANTHERA.

pavonina 1. A. foliis decompoſitis utrinque glabris. *Ind. or.*

falcata 2. A. foliis decompoſitis ſubtus tomentoſis. *Ind. orient.*

† *ſcandens* Forſt. 3. A. foliis pinnatis 2jugis, foliolis ovatis obliquis glabris, cirrhis terminalibus 2fidis. *Nov. Hebrid.* (Entada Adanſ.?)

1600. CADIA Forsk.

purpurea Forsk. *Arabia.* Arbuscula foliis pinnatis oblongis glabris, pedunculis axillaribus 3floris, floribus rubris.

1601. HAEMATOXYLON.

campechianum *Amer. tropic.* Arbor grandis ſpinoſa, foliis abrupte pinnatis 3jugis, foliolis obovatis retuſis oblique ſtriatis ſupra nitidis, floribus racemoſis flavis.

1602. BARYXYLON Lour.

rufum Lour. *Cochinchina.* Arbor magna, foliis pinnatis paucijugis, foliolis oblongis obtuſis integerrimis, floribus racemoſis luteis.

1603. ZUCCAGNIA Cav.

punctata Cav. *Chili.* Frutex foliis pinnatis glutinoſis punctatis, floribus racemoſis croceis.

1604. BUNCHOSIA Juſſ.

* *Foliis, petiolis pedicellisve glanduloſis.*

glanduloſa Cand. 1. B. foliis ovato-ellipticis acuminatis glabris, petiolis apice 2glanduloſis, racemis ſimplicibus folio brevioribus. *Ind. occid.* (Malpighia glanduloſa Cav.)

glandulifera Kunth. 2. B. foliis elliptico-ovatis breviſſime petiolatis undulatis utrinque pubeſcentibus baſi ſubtus 4glanduloſis, racemis ſimplicibus, pedicellis uniglanduloſis. *Guadalupa. Caracas.* (Malpighia glanduloſa Jacq.)

cornifolia Kunth. 3. B. foliis oblongis utrinque attenuatis ſericeis baſi 2glanduloſis, racemis ſimplicibus, pedicellis uniglanduloſis. *Nov. Granat.*

polyſtachya Cand. 4. B. foliis oblongis acutis nitidis ſubtus baſi 2glandulosis, racemis ſubpaniculatis, pedicellis 1glandulosis, ſtigmate capitato 2lobo. *Ind. occ.* (Malpighia polyſtachya Andr.)

media Cand. 5. B. foliis oblongo-lanceolatis acutis glabris, ſubtus medio ad coſtam 2glandulosis, racemis ſimplcibus, pedicellis 1glandulosis. *Ind. occ.* (Malpighia media R. Br.)

piloſa Kunth. 6. B. foliis ſubſeſſilibus ovato-oblongis acutis piloſis ſubtus caneſcentibus margine glandulosis, racemis ſimplicibus, pedicellis 1glandulosis. *Nov. Granat.*

tuberculata Cand. 7. B. ramis tuberculatis, foliis ovato-lanceolatis ſubpubeſcentibus, racemis folio 3plo brevioribus, pedicellis 1glandulosis. *Caracas.* (Malpighia tuberculata Jacq.)

argentea Cand. 8. B. foliis oblongo-lanceolatis acuminatis ſubtus ſericeis margine glandulosis, racemis oppoſitis pubeſcentibus, pedicellis 1glandulosis. *Amer. auſtr.* (Malpighia argentea Jacqu. Bunchoſia glauca Kunth.)

** *Foliis, petiolis pedicellisque eglandulosis.*

nitida Cand. 9. B. foliis oblongo-lanceolatis acuminatis glaberrimis, racemis ſimplicibus folio brevioribus. *Ind. occid.* (Malpighia nitida L.)

Armeniaca Cand. 10. B. foliis elliptico-oblongis acutis coriaceis glabris, racemis axillaribus ſimplicibus folia aequantibus. *Peru.* (Malpighia Armeniaca Cav.)

odorata Cand. 11. B. foliis ovatis emarginatis utrinque tomentoſis, racemis oppoſitis, ſtigmate 2-3fido. *Amer. auſtr.* (Malpighia odorata Jacqu.)

1605. THRYALLIS.

braſilienſis *Braſil.* Fruticulus, ramis articulatis, foliis ovatis, ſtipulis bracteisque ſetaceis, floribus racemoſis luteis.

1606. HIPTAGE Gärtn.

Madablota Gärtn. 1. H. foliis ovato-lanceolatis acuminatis, racemis terminalibus. *Ind. or.* (Baniſteria bengalenſis L., 1capſularis Lam. Molina racemoſa Cav. Gärtnera racemoſa Roxb.)

obtuſifolia Cand. 2. H. foliis obovatis ſubmucronatis, racemis axillaribus terminalibusque. *China.* (Gärtnera obtuſifolia Roxb.)

1607. ZYMUM Nor. Juſſ.

madagascarenſe Juſſ. *Madagascar.* Frutex ſcandens, foliis inferioribus verticillatis ſuperioribus oppoſitis baſi glandulosis, floribus racemoſis luteis. (Triſtellateia Aub. Thuar.)

1608. DIONAEA.

Muſcipula — *Carolina bor.* Herba mirabilis. Folia radicalia, petiolis ſpathulato-alatis, laminis 2lobis ciliatis diſco ſpinuloſis, conduplicandis ut inſecta aut peregrina tangunt, ad lucem ſolarem mire irritabilibus: flores corymboſi albi.

1609. HYDROPITYON Gärtn.

ceylanicum Gärtn. — *Ceylon.* Herba erecta, foliis verticillatis pinnatifidis linearibus, floribus axillaribus pedunculatis ſolitariis. (Hottonia indica L.)

1610. BALANITES Delil.

aegyptiaca Del. — *Africa med.* Arbor ramis ſpinoſis, foliis conjugatis oblongis, floribus axillaribus cymoſis virescentibus. (Ximenia aegyptiaca L., ferox Poir. varietas forte ab Aethiopibus ſervis in Hiſpaniolam allata. Delil.)

1611. CHILMORIA Hamilt.

dodecandra Hamilt. — 1. Ch. foliis oblongis integerrimis, floribus ſolitariis 12andris. *Ind. or. transganget.*

pentandra Hamilt. — 2. Ch. foliis oblongis ſerratis, floribus ſolitariis 5andris. *Malabar.*

1612. GODOYA R. et P.

obovata R. et P. — 1. G. foliis obovatis crenatis, floribus 10andris. *Peru.*

ſpathulata R. et P. — 2. G. foliis ſpathulatis crenatis, floribus polyandris. *Peru.*

1613. LEPTOCHLAENA Thuar.

multiflora Thuar. — *Madagascar.* Arbuscula, foliis alternis oblongis undulatis glabris, floribus paniculatis albidis.

1614. HEISTERIA.

coccinea — 1. H. foliis ovato-ellipticis lucidis, floribus axillaribus, calyce fructifero patente ſublobato. *Martinica.*

parvifolia Sm. — 2. H. foliis ovatis acutis lucidis, floribus axillaribus, calyce fructifero patente profunde lobato. *Sierra Leone.*

cauliflora Sm. — 3. H. foliis obovato-oblongis, caule ramisque floriferis, calyce fructifero clauſo profunde lobato. *Guiana.*

1615. CERATOPETALUM Sm.

gummiferum Sm. *Noo. Holl.* Arbor procera, foliis ſeſſilibus ternatis lanceolatis ſerratis, floribus paniculatis flavis.

1616. VIVIANIA Cav.

marifolia Cav. *Ad Acapulco.*

1617. PETALOMA Sw.

myrtilloides Sw. 1. P. pedunculis ſolitariis 1floris, foliis ſubſeſſilibus ovatis acuminatis baſi obliquis. *Jamaica. Hiſpaniola.*

Muriri Sw. 2. P. pedunculis confertis axillaribus, foliis petiolatis ovatis acuminatis. *Guiana.* (Mouriri guianenſis Aubl.)

1618. COMBRETUM.

* *Floribus decandris.*

laxum 1. C. foliis oblongis acuminatis baſi inaequalibus, racemis aggregatis ebracteatis aequalibus, calycibus interne villoſis. *Hiſpaniola. Amer. auſtr.*

purpureum Vahl. 2. C. foliis elliptico-oblongis acutis, racemis laxe paniculatis ebracteatis ſecundis, ſtaminibus elongatis, calycibus glabris. *Madagascar.* (C. coccineum Lam.)

Roxburghii * 3. C. foliis oblongis acuminatis, racemis laxe paniculatis bracteatis, bracteis flore longioribus, floribus diſtichis, ſtaminibus ſubexſertis. *Ind. or.* (C. decandrum Roxb.)

trifoliatum Vent. 4. C. foliis ternis oblongis acuminatis, racemis paniculatis bracteatis, bracteis villoſis flore brevioribus. *Java.*

alternifolium Jacq. 5. C. foliis ſubalternis ovatis pubeſcentibus, ramis aculeatis, floribus racemoſis. *Amer. auſtr. Senegambia.* (C. aculeatum Vent.)

** *Floribus octandris.*

ſecundum Jacq. 6. C. foliis oblongis acutis, ramis ſubverticillatis ſtrictis ſecundis ebracteatis, calycibus lepidotis, ſtaminibus longiſſimis. *Hiſpaniol. Amer. auſtr.* (C. laxum Aubl.)

1619. QUISQUALIS.

pubeſcens Burm. 1. Qu. foliis oblongis acutis bracteisque rhomboideis villoſis, floribus villoſiſſimis. *Inſ. Molucc. Java.* (Qu. indica L.)

villoſa Roxb. 2. Qu. foliis ſubcordato-oblongis bracteisque lineari-lanceolatis villoſis, floribus pubeſcentibus. *Pegu.*

glabra Burm. 3. Qu. foliis ovatis acutis bracteisque minutis glaberrimis, floribus corymbosis. *Amboina. Cochinchina. China austr.* (Qu. indica Lour.)

ebracteata P. B. 4. Qu. foliis ovato-oblongis acutis, floribus spicatis ebracteatis. *Guinea.*

1620. GUIERA Juss.

senegalensis Juss. *Senegambia.* Frutex foliis oblongis obtusis pubescentibus, floribus capitatis involucratis.

1621. SCHOUSBOA W.

coccinea W. 1. Sch. foliis cordato-oblongis acutis, floribus racemosis bracteatis, staminibus aequalibus. *Guiana.* (Cacoucia coccinea Aubl.)

commutata * 2. Sch. foliis oblongis obtusis, floribus subspicatis ebracteatis, staminibus alternis inclusis. *Ind. occid. Amer. austr.* (Conocarpus racemosa L. Jacqu.)

1622. CHAMAELAUCIUM Desf.

ciliatum Desf. 1. Ch. foliis lineari-3quetris obtusis glandulosopunctatis, floribus axillaribus breviter pedunculatis, calycibus ciliatis, staminibus alternis brevioribus. *Nov. Holl. versus Africum.*

plumosum Desf. 2. Ch foliis 3quetris acutiusculis glandulosopunctatis, floribus terminalibus subcorymbosis, laciniis calycinis 5partitis plumosis, staminibus aequalibus. *Nov. Holl. ad Africum.*

Brownii Desf. 3. Ch. foliis oppositis 3quetris obtusis punctatis appressis, floribus corymbosis terminalibus. pedunculis glandulosis, laciniis calycinis multipartitis subulato-plumosis, staminibus aequalibus. *Nov. Holl. austr.*

1623. RHODORA.

canadensis *Canada.* Frutex foliis alternis oblongo-lanceolatis margine revolutis, floribus umbellatis terminalibus violaceis.

1624. LACARA *.

triplinervia * *Brasil.* Frutex foliis alternis oblongis coriaceis 3plinerviis, floribus racemosis.

1625. REICHARDIA Roth.

hexapetala Roth. 1. R. corolla 6petala, foliis 2pinnatis cauleque aculeatis. *Ind. or.*

decapetala Roth. 2. R. corolla 10petala, foliis abrupte pinnatis cauleque aculeatis. *Ind. or.*

1626. BAUHINIA.

* *Foliis bilobis.*

† *Inermes.*

scandens 1. B. foliis cordatis subtus nitide rufis, lobis acutis, caule cirrhifero, floribus racemosis 3andris. *Ind. or. Cochinchina.* (Phanera coccinea Lour.)

racemosa Lam. 2. B. foliis cordatis subtus tomentosis, lobis obtusis, floribus racemosis 3andris pubescentibus. *Ind. or.*

tomentosa 3. B. foliis basi truncatis subtus albido-villosis, lobis obtusis, pedunculis 2floris, petalis obovatis striatis, caule erectiusculo. *Ind. or.*

purpurea 4. B. foliis cordatis utrinque glabris, lobis obtusis, floribus racemosis 3andris. *Ind. or.* (B. retusa Poir.)

variegata 5. B. foliis basi truncatis subtus glabriusculis, lobis ellipticis obtusissimis conniventibus, floribus subracemosis axillaribus 5andris, calyce lateraliter fisso. *Ind. or. et occ.* (B. candida Ait. var.)

parviflora Vahl. 6. B. foliis subrotundis utrinque glabris subtus glaucis, lobis rotundatis distantibus, floribus racemosis 10andris. *Ind. or.* (B. spicata Rottl.)

ungulata 7. B. foliis ovatis glabris, lobis oblongis acutis parallelis, floribus corymbosis 10andris, petalis linearibus. *Amer. tropic.* (B. aurita Ait. Pauletia inermis Cav.)

porrecta Ait. 8. B. foliis cordato-oblongis subtus villosis, lobis lanceolatis acutis, floribus corymbosis. *Ind. occid.*

acuminata 9. B. foliis basi truncatis oblongis, lobis elongatis acutiusculis, floribus racemosis. *Ind. or. et occ.*

Anguina Roxb. 10. B. foliis cordatis acutis, floribus racemosis 3andris, caule scandente plano. *Ind. or.*

divaricata 11. B. foliis ovatis glabris, lobis acuminatis divaricatis. *Amer. tropic.*

Lunaria Cav. 12. B. foliis subcordato-reniformibus glabris, lobis rotundatis distantibus, floribus racemosis 1andris, reliquis filamentis sterilibus coalitis, unguibus petalorum hirsutis. *Nov. Hispan.*

subrotundifolia Cav. 13. B. foliis basi truncatis subrotundis subtus tomentosis, lobis rotundatis, floribus racemosis 1andris. *Humb. Nov. Hispan.*

latifolia Cav. 14. B. foliis cordatis subquadratis, lobis abbreviatis acutis divaricatis, floribus racemosis 1andris. *Nov. Hispan.*

Pes caprae Cav. 15. B. foliis cordatis subtus glaucis, lobis oblongis porrectis distantibus, floribus corymbosis 1andris, unguibus petalorum elongatis hirsutis. *Nov. Hispan.*

latisiliqua Cav. 16. B. foliis subcordato-oblongis, lobis porrectis acutis conniventibus, siliquis ellipticis. *Insul. Philippin.* (B. macrophylla Juss. Poir.)

†† *Aculeatae ſ. ſpinoſae.*

aculeata 17. B. foliis ſubcordato-ſubrotundis membranaceis utrinque glabris, lobis brevibus obtuſiſſimis, aculeis ramorum geminis recurvis, floribus ſubſolitariis, petalis ſinuatis. *Amer. tropic.*

panamenſis * 18. B. foliis baſi truncatis ſubrotundis glabris, lobis abbreviatis obtuſiusculis, aculeis ramorum geminis, pedunculis 2floris, petalis linearibus elongatis, ſtaminibus alternis abortientibus. *Panama.* (Pauletia aculeata Cav.)

forficata Link. 19. B. foliis baſi ſubtruncatis ſubtus glabriusculis, lobis lanceolatis acutiusculis ſubdiſtantibus, aculeis ramorum ſparſis ſolitariis rectis, ramis pubeſcentibus, pedunculis 3floris. *Braſil.*

grandiflora Juſſ. 20. B. foliis cordatis ſubrotundis ſubtus tomentoſis, lobis obtuſis, ſpinis ad baſin petiolorum geminis, pedunculis 2floris. *Peru.*

** *Foliis conjugatis.*

heterophylla Link. 21. B. foliis inferioribus conjugatis, ſummis 2lobis cordatis ſubtus pubeſcentibus, ramulis calycibusque ferrugineo-ſericeis, floribus racemoſis. *Caracas.*

rufeſcens Lam. 22. B foliis conjugatis ſemiorbiculatis obtuſiſſimis glabris. *Africa.*

guianenſis Aubl. 23. B. foliis conjugatis oblongis acutis conniventibus ſubtus ſubauratis. *Guiana.* (B. Outimouta Aubl. var.)

1627. CASSIA.

I. *Calyx obtuſus.*

* *Semina horizontalia pulpa obducta.*

† *Legumen lignoſum: antherae birimoſae.*

braſiliana Lam. 1. C. foliis 12-20jugis, foliolis ovali-oblongis aequilateris villoſiusculis, petiolo eglanduloſo, racemis axillaribus, leguminibus compreſſis rugoſis longiſſimis. *Ind. occ. Amer. auſtr.* (C. grandis L. ſuppl., mollis Vahl., javanica Aubl. Cathartocarpus Perſ.)

javanica 2. C. foliis 12-15jugis, foliolis ovatis obtuſis glabris, petiolis eglanduloſis, racemis axillaribus, leguminibus ſubcylindricis longiſſimis ſubtoroſis. *Java. Inſ. Molucc.*

ſulfurea Cand. 3. C. foliis 6jugis, foliolis ovato-lanceolatis obtuſiusculis glabris, glandula tereti obtuſa inter paria 4 inferiora, racemis axillaribus. *Amer. auſtr.*

Fiſtula 4. C. foliis 5jugis eglanduloſis, foliolis oblongis utrinque attenuatis glabris, leguminibus teretibus rectis obtuſiusculis laevibus. *Aegypt. Ind. or. Cochinchina.* (Cathartocarpus Perſ. Bactyrilobium W.)

fiſtuloides Collad. 5. C. foliis conjugato-pinnatis, pinnis 5jugis eglandulosis, foliolis ovatis acutiusculis glabris, racemis erectis, leguminibus teretibus obtusis. *Mexico.*

bacillaris 6. C. foliis 2jugis, foliolis ovato-oblongis acutis obliquis glabris, glandula obtusa inter infima paria, racemis axillaribus. *Amer. tropic.* (Cathartocarpus Perſ.)

macrophylla Kunth. 7. C. foliis 2jugis oblongis obtusis ſubtus hirſutiusculis, glandula ad baſin petioli, floribus racemosis. *Nov. Granat.*

oxyphylla Kunth. 8. C. foliis 2jugis inaequilateris acuminato-cuſpidatis utrinque pubeſcentibus, ſuperioribus oblongis inferioribus ovatis, glandula inter infimum par, racemis paucifloris. *Nov. Granat.*

fruticeſcens Bert. 9. C. foliis 2jugis ovato-oblongis apice attenuatis obtuſiusculis utrinque glaberrimis, glandula tereti ſubelongata inter infimum par, racemis compoſitis terminalibus. *Jamaica.*

†† *Legumen membranaceum: antherae biporoſae.*

Sophera 10 C. foliis 10jugis lanceolatis cuſpidatis ſubaequalibus glabris, glandula oblonga ad baſin petioli. *Ind. or. China auſtr. Aegypt.*

coromandeliana Jacqu. 11. C. foliis 10jugis lanceolatis acutis glabris, glandula ovata craſſa ad baſin petioli, leguminibus teretibus laevibus. *Ora Coromandel.*

dumetorum Berter. 12. C. foliis ſub-6jugis ovali-oblongis utrinque rotundatis ramisque pubeſcentibus, petiolo eglandulosо, leguminibus compreſſis laevigatis elongatis. *Ad fl. Magdalenae.*

toroſa Cav. 13. C. foliis ſub-6jugis ovato-lanceolatis glabris, glandula ad baſin petioli, leguminibus cylindricis torulosis. *China bor.* (C. chinenſis Jacq., torulosa et indica Poir.)

gigantea Bert. 14. C. foliis ſub-5jugis ellipticis ſubretuſis utrinque glaberrimis, petiolo eglandulosо, racemis paniculatis, leguminibus compreſſis. *Jamaica.*

chinenſis Lam. 15. C. foliis ſub-4jugis ovato-oblongis acutiusculis margine pubeſcentibus, glandula ad baſin petioli, pedunculis paucifloris. *China.* (C. grandiflora Perſ.)

laevigata W. 16. C. foliis 4jugis ovato-oblongis acutis glaberrimis, glandula oblonga acuta inter omnia paria, leguminibus teretibus ſtylo perſiſtente terminatis. *Mexico.* (C. ſeptentrionalis Zucc.)

floribunda Cav. 17. C. foliis ſub-4jugis oblongo-lanceolatis glabris, glandula oblonga inter infima, pedunculis multifloris, leguminibus ſubcylindricis. *Nov. Hiſpan.* (C. corymboſa Ort.)

crotalarioides Kunth. 18. C. foliis ſub-4jugis oblongis acutis ſubtus ſericeis, petiolo glandulosо, pedunculis axillaribus ſubracemoſis, leguminibus inflatis piloſis. *Mexico.*

corymboſa Lam. 19. C. foliis 3jugis oblongo-lanceolatis ſubfalcatis glabris, glandula oblonga inter infima, pedunculis 3-5floris, leguminibus cylindricis. *Buenos Ayres.* (C. craſſifolia Ort.)

inflata * 20. C. foliis ſub-3jugis obovato-ſubrotundis glaberrimis ſubtus glaucis, glandula clavata inter infima, racemis paniculatis, legumine inflato. *Ad fl. Magdalenae.* Bertero.

††† *Legumen utrinque alatum.*

alata 21. C. foliis ſub-10jugis obovato-oblongis utrinque glabris, ſummis majoribus, infimis ſeſſilibus, petiolis eglandulosis, floribus racemoſis bracteatis. *Ind. occid.* (C. herpetica Jacq.)

bracteata 22. C. foliis 10jugis oblongis obtuſis ſubtus incano-villoſis, petiolis eglandulosis. *Surinam.*

** *Semina verticalia pulpa deſtituta. Stamina inaequalia.*

a. Folia multijuga.

Richardiana Kunth. 23. C. foliolis oblongis mucronatis ſubtus pubeſcentibus, glandula inter infimum par, paniculis terminalibus, leguminibus compreſſis transverſe venoſis. *Ad Orinocum.*

Mutiſiana Kunth. 24. C. foliolis oblongo-linearibus obtuſis ſubtus pubeſcentibus, glandula inter omnia paria, racemis axillaribus ſolitariis. *Nov. Granat.*

marginata W. 25. C. foliolis lineari-oblongis cartilagineo-marginatis ciliatis, glandula ſubulata inter omnia paria. *Surinam.*

nigricans Vahl. 26. C. foliolis lineari-oblongis obtuſiſſimis mucronatis baſi obliquis glabris, glandula oblonga inter infimum par, ramulis hirtis, pedunculis breviſſimis axillaribus ſubgeminis. *Arabia.* (C. procumbens Forsk.)

Brownіana Kunth. 27. C. foliolis oblongis mucronatis glabris ciliatis, petiolo eglandulosо, racemis axillaribus, leguminibus compreſſo-planis margine membranaceis. *Mexico.* (C. polyantha Collad.)

calliantha Meyer. 28. C. foliolis oblongo-linearibus glabris mucronatis, glandula ſubulata inter infima, panicula terminali, leguminibus linearibus. *Surinam.*

β. Folia 10juga.

ſpectabilis Cand 29. C. foliolis ovato-oblongis acutis mucronatis eglandulosis glabris, panicula terminali pyramidata. *Caracas.* (C. cuſpidata Humb.)

reticulata W. 30. C. foliolis oblongis obtuſis ſubtus incano-pubeſcentibus eglandulosis, extimis majoribus, leguminibus compreſſis. *Braſil.*

montana Roxb. 31. C. foliolis ellipticis ſubemarginatis glabris glaucеſcentibus eglandulosis, racemis axillaribus. *Ind. or.*

anguſtiſiliqua Lam. 32. C. foliolis ovatis mucronatis ſubtus pubeſcentibus, petiolis incraſſatis breviſſimis, glandula ſtipitata inter infima paria, leguminibus linearibus compreſſis. *Hiſpaniola.*

auriculata 33. C. foliolis oblongis obtuſis mucronatis glabris, glandulis ſubulatis pluribus, ſtipulis reniformibus. *Ind. or. Inſ. Molucc.*

polyphylla Jacq. 34. C. foliolis ellipticis ſubmucronatis glabris, glandula oblonga ſeſſili inter infimum par, pedunculis 2floris folio brevioribus. *Portorico.*

γ. Folia 9juga.

ſuffruticoſa Kön. 35. C. foliolis ovalibus ſubſericeis ſubtus glaucis, glandulis binis inter inferiora paria, ſtipulis linearibus ſubfalcatis, corymbis faſtigiatis. *Ind. orient.*

marilandica 36. C. foliolis oblongis utrinque rotundatis mucronatis ciliatis, glandula clavata ad baſin petioli, leguminibus linearibus hiſpidulis. *Amer. bor.*

robinioides W. 37. C. foliolis lanceolatis acuminatis glabris, glandula ſeſſili ad baſin petioli. *Amer. auſtr.*

frondoſa Ait. 38. C. foliolis ellipticis ſubmucronatis glaberrimis, glandula ſubclavata inter infimum par, racemis axillaribus folio brevioribus. *Amer. tropic.* (C. Criſta Jacq.)

faſtigiata Vahl. 39. C. foliolis oblongis obtuſis glabris, glandula pedicellata inter omnia paria, racemis faſtigiatis, calycibus villoſis. *Ind. or.*

δ. Folia 8juga.

ſtipulacea Ait. 40. C. foliolis ovato-lanceolatis glabris, glandula inter inferiora, ſtipulis ovatis maximis, leguminibus oblongis oligoſpermis. *Chili.*

ſulcata Cand. 41. C. foliolis ovali-oblongis obtuſiusculis ſubtus margineque pubeſcentibus, glandula depreſſa ad baſin petioli, ramis ſulcatis. *Amer. auſtr.* (C. cernua Balb.)

ſiamea Lam. 42. C. foliolis ovato-oblongis emarginatis glabris, petiolis eglandulоſis, leguminibus compreſſis marginatis. *Ind. or. transganget.*

ε. Folia 7juga.

florida Vahl. 43. C. foliolis ovali-oblongis emarginatis glabris, petiolis eglandulоſis, panicula diffuſa terminali, bracteis ſpathulatis ariſtatis. *Ind. or.*

anguſtifolia Vahl. 44. C. foliolis lanceolatis mucronatis glabris ſupremis majoribus, petiolis eglandulоſis, floribus racemoſis, leguminibus rhombeo-oblongis oligoſpermis. *Arabia.*

liguſtrina 45. C. foliolis lanceolatis acuminatis ſubciliatis, glandula tereti ad baſin petiolorum. *Amer. trop. Virginia.*

mexicana Jacq. 46. C. foliolis ovali-oblongis obtuſiusculis puheſcentibus, glandula cylindrica inter infima. *Mexico.*

ζ. Folia 6juga.

ruſcifolia Jacq. 47. C. foliolis remotis lanceolatis glabris, glandula tereti appreſſa ad baſin petioli, pedunculis 3floris axillaribus, leguminibus compreſſis marginatis. *Madera.*

caracaſana Jacq. 48. C. foliolis ovato-lanceolatis acutis villoſis, glandula ovata ſeſſili ad baſin petiolorum, floribus corymboſis, leguminibus angulatis. *Amer. auſtr.* (C. Ganca Cav.)

patula Ait. 49. C. foliolis oblongis acutiusculis glabris, glandula ad baſin petiolorum, ramis laevibus. *Ind. occid.*

linearis Mx. 50. C. foliolis lanceolatis acuminatis glabris, glandula ad baſin petioli, pedunculis ſubbifloris axillaribus terminalibusque, leguminibus linearibus compreſſis. *Carolina.*

aegyptiaca W. 51. C. foliolis lanceolatis acutis, ſupremis majoribus, glandula petiolari, pedunculis 2floris. *Aegypt.*

tomentoſa 52. C. foliolis oblongis mucronatis ſubtus ſulfureo-tomentoſis, glandulis ſubulatis inter omnia paria, leguminibus compreſſis villoſis. *Amer. auſtr.* (C. multiglanduloſa Jacq. albida Ort.)

biflora 53. C. foliolis obovato-oblongis glabriusculis, glandula ſubulata inter infimum par, pedunculis abbreviatis ſubbifloris. *Ind. occ.* (C. Marimari Aubl. geminiflora Collad.)

obovata Collad. 54. C. foliolis obovatis retuſis glabriusculis, petiolo eglanduloſo, leguminibus compreſſis arcuatis. *Aegypt.* (C. Senna var. *β.* L. Senna Lam.)

η. Folia 5juga.

dispar W. 55. C. foliolis oblongis obtuſis, ſupremis majoribus, glandulis elongatis inter omnia paria. *Amer. auſtr.*

glauca Lam. 56. C. foliolis obovato-ellipticis emarginatis glaberrimis ſubtus glaucis, glandulis binis oblongis inter infima paria, leguminibus compreſſis mucronatis. *Ind. or.* (C. arboreſcens Vahl. coluteoides Collad.)

occidentalis 57. C. foliolis ovato-lanceolatis acuminatis ciliatis, glandula obtuſa ſeſſili ad baſin petioli, pedunculis brevibus paucifloris, leguminibus compreſſis marginatis. *Ind. occ. Amer. auſtr.*

hirſuta 58. C. foliolis ovatis acuminatis hirſutis, glandula ad baſin petioli. *Amer. auſtr.*

planiſiliqua 59. C. foliolis ovato-lanceolatis glabris, glandula ad baſin petioli, leguminibus compreſſis elongatis. *Amer. auſtr. Ind. occ.*

nutans Collad. 60. C. foliolis oblongis utrinque attenuatis glabris, infimis minoribus, petiolis eglanduloſis, ramis tuberculatis, racemis nutantibus. *Mexico.*

atomaria 61. C. foliolis ovatis tomentoſis, petiolis teretibus eglanduloſis ferrugineis. *Amer. tropic.*

3. *Folia 4juga.*

pubeſcens Jacq. 62. C. foliolis ovato-lanceolatis acuminatis ſubtus margineque pubeſcentibus, glandula ovata craſſa ad baſin petioli. *Patria?*

falcata 63. C. foliolis ovato-lanceolatis retro falcatis ſupremis majoribus, glandula ad baſin petioli. *Amer. auſtr.*

longiſiliqua 64. C. foliolis ovato-oblongis glabris ſupremis lineari-lanceolatis, glandula ſubulata inter ſuprema imaque. *Amer. tropic.*

pendula Humb. 65. C. foliolis obovatis ſupremis majoribus, glandula inter infima, leguminibus ſeſſilibus pendulis. *Amer. auſtr.*

emarginata 66. C. foliolis ellipticis obſolete retuſis ſubtus ramulisque villoſis, petiolis eglandulosis, ſtipulis ſubulatis perſiſtentibus, racemis axillaribus paucifloris. *Ind. occid.*

fericea Sw. 67. C. foliolis ovalibus fericeo-hirſutis, glandulis ſubulatis inter omnia paria, leguminibus 4gonis articulatis, caule herbaceo. *Ind. occid. Amer. auſtr.* (C. ſenſitiva Jacq. ornithopoides Lam.)

lanceolata Forsk. 68. C. foliolis ovali-lanceolatis acutis glabriusculis, petiolis glandulosis, leguminibus plano-compreſſis medio tumidulis. *Aegypt. ſuper.* (C. Senna *α.* L., acutifolia Delil.)

4. *Folia 3juga.*

obtuſifolia 69. C. foliolis obovatis obtuſis ſubtus pubeſcentibus, glandula ſtipitata inter par infimum, ſtipulis lineari-ſubulatis, leguminibus elongatis recurvis, caule herbaceo. *Cuba. Jamaica.*

gallinaria Cand. 70. C. foliolis obovatis mucronulatis glabris, glandula oblonga inter par infimum, pedunculis axillaribus 1floris, leguminibus rectis, caule herbaceo procumbente. *Inſ. Molucc. Cochinchina. China auſtr.* (C. obtuſifolia Lour.?)

humilis Collad. 71. C. foliolis obovatis obtuſis, glandula oblonga inter par infimum, petiolo apice mutico, leguminibus arcuatis compreſſis margine calloſis. *Amer. tropic.* (C. Tora Aubl., Tora *β.* L.)

Tora Ait. 72. C. foliolis obovatis obtuſis, glandulis oblongis inter duo paria inferiora, petiolo apice ariſtato, leguminibus rectis compreſſis margine calloſis. *Ind. or. Arabia. Japonia.*

† *limenſis* Lam. 73. C. foliolis obovatis obtuſiſſimis glabris, racemis axillaribus multifloris folium ſubaequantibus. *Peru.*

ciliaris Collad. 74. C. foliolis ſemiorbiculatis venoſis, duobus exterioribus majoribus, ſtipulis cordato-lanceolatis ciliatis, caule procumbente. *Ind. or.* (C. Tagera L.)

Tagera Lam. 75. C. foliolis obovatis, pedunculis breviſſimis 1floris, leguminibus rectis linearibus. *Ind. or.*

Apoucouita Aubl. 76. C. foliolis ovatis acuminatis glabris, petiolo marginato apice ariſtato glanduloſo, racemis axillaribus. *Guiana.* (C. acuminata W.)

ſennoides Jacq. 77. C. foliolis obovato-ſubrotundis glabris, glandula oblonga ſeſſili inter infimum par, ſtipulis lineari-ſubulatis patentibus. *Ind. or.*

bicapſularis 78. C. foliolis obovato-ſubrotundis glabris, glandula globoſa ſtipitata inter par infimum, ſtipulis lineari-ſubulatis patentibus, leguminibus teretibus 2locularibus. *Amer. trop. Madera.*

x. Folia 2juga.

viminea 79. C. foliolis ovato-oblongis acuminatis, glandula inter infima, petiolo apice ariſtato, ſquama ſubpetiolari calloſa 3dentata. *Jamaica.*

chryſotricha Collad. 80. C. foliolis ovato-oblongis acutis, glandula oblonga inter infima, petiolo apice mutico, ſtipulis ſubulatis, ſquama ſubpetiolari 3dentato-ſpinoſa, leguminibus flavo-pubeſcentibus. *Guiana.* (C. chryſocarpa Desv.)

macranthera Cand. 81. C. foliolis ovali-oblongis acutis glabris, glandula ovata inter infima, petiolo apice ſetaceo, panicula ramoſiſſima, antheris craſſis oblongis apice mucronatis. *Braſil.*

λ. Aphylla.

aphylla Cav. 82. C. caule fruticoſo aphyllo, ramis ſpineſcentibus, pedunculis corymboſis, leguminibus linearibus. *Buenos Ayres.*

**** Stamina aequalia.*

cytiſoides Cand. 83. C. foliis 3jugis obovato-orbiculatis glabris, glandula ſeſſili inter duo paria inferiora, leguminibus compreſſis incurvis. *Braſil.*

Abſus 84. C. foliis 2jugis obovatis glabris, glandula petioli ſubnulla, ramis leguminibusque piloſis, racemis paucifloris petiolo inſidentibus. *Ceylon. Afric. inter.*

II. *Calyx acutus. Chamaecriſtae.*

** Foliis conjugatis.*

diphylla 85. C. foliolis obovatis nervoſis ramisque glabris, ſtipulis cordato-lanceolatis baſi ciliatis appreſſis, pedunculis 1floris elongatis apice bracteatis. *Ind. occid.*

bifoliolata Cand. 86. C. foliolis obovato-ſubrotundis nervoſis, ramis villoſis, ſtipulis cordato-lanceolatis ciliatis, pedunculis 1floris capillaribus. *Braſil. Monte Video.*

bauhinifolia Kunth. 87. C. foliolis obovatis emarginatis undulato-repandis pubeſcentibus, ramis villoſis, pedunculis 1floris elongatis apice 2bracteatis. *Ad Orinoc.*

**** *Foliis 2jugis.***

hiſpida Collad. 88. C. foliolis obovatis obtuſis glabris, ramis leguminibusque hirtis, racemis elongatis aphyllis terminalibus. *Cayenn.* (C. Abſus Aubl.)

rotundifolia Perſ. 89. C. foliolis obovato-ſubrotundis pubeſcentibus, ramis procumbentibus villoſis, ſtipulis ovatis ciliatis, pedunculis 1floris capillaribus elongatis. *Braſil.*

Perſoonii Collad. 90. C. foliolis obovatis venoſis utrinque glabris, ſtipulis lanceolatis appreſſis folia aequantibus. *Cayenn.*

brevipes Cand. 91. C. foliolis oblongis glaberrimis baſi multinerviis, petiolis tomentoſis apice ariſtatis, ſtipulis cordatis nervoſis, pedunculis ſolitariis 1floris abbreviatis. *Panama.*

gracilis Kunth. 92. C. foliolis obovato-oblongis obtuſis glabris, glandula peltata ad baſin petioli, pedunculis ſolitariis 1floris 2bracteatis. *Ad Orinocum.* (C. uniflora N. E.)

***** *Foliis 3-5jugis.***

mucronata * 93. C. foliis 3jugis oblongo-ellipticis mucronatis glabris, glandula urceolata inter par infimum, pedunculis axillaribus 1floris. *Braſil.*

lineata Cand. 94. C. foliis 5-6jugis obovato-oblongis mucronatis lineatis utrinque hiſpidis, glandula ſubſeſſili inter par infimum, pedunculis 1floris leguminibusque villoſis. *Cuba. Hiſpaniola.* (C. grammica N. E.)

lineata Sw. 95. C. foliis 5jugis oblongis obtuſis mucronatis ſubtus pubeſcentibus, glandula ſeſſili ad baſin petioli, ramis glabris, pedunculis 1floris, leguminibus hirſutis. *Jamaica.*

proſtrata Humb. 96. C. foliis 5jugis linearibus obtuſis incanis, glandula petiolari ſtipitata, pedunculis axillaribus 1floris, caule proſtrato. *Amer. auſtr. Hiſpaniola.* Bertero.

piloſa 97. C. foliis 5jugis oblongis obtuſis mucronatis ciliatis, petiolo eglanduloſo apice ariſtato, ſtipulis falcatis, caule ſuperne hirſuto. *Jamaica.*

****** *Foliis 5-10jugis.***

venoſa Caſtigl. 98. C. foliolis obovatis retuſis lineato-venoſis glaberrimis, glandula ſeſſili infra par infimum, pedunculis ſupraxillaribus 3-5floris, caule frutiçoſo. *Guadalupa.* Bertero.

ſerpens 99. C. foliolis ſubfalcatis oblongis mucronatis, glandulis ſeſſilibus infra foliola, floribus ſolitariis 5andris, caule proſtrato filiformi herbaceo. *Jamaica.*

faſciculata Mx. 100. C. foliolis oblongo-linearibus mucronatis, glandula petiolari ſeſſili, faſciculis multifloris lateralibus, leguminibus glabellis arcuatis. *Amer. boreal.*

***** *Foliis 10-20jugis.*

Otterbeimii Meyer. 101. C. foliolis oblongo-linearibus glabris mucronatis, glandula ſtipitata inter par infimum, ramis piloſis, pedunculis ſubbifloris, leguminibus nitidis. *Surinam.*

virgata Sw. 102. C. foliolis ovato-lanceolatis mucronatis ſubtus villoſiusculis, glandula ſtipitata in medio petiolo, ſtipulis lanceolatis, pedunculis 1floris filiformibus elongatis. *Jamaica. Hiſpaniola.*

calycioides Cand. 103. C. foliolis linearibus obliquis mucronatis ramisque glabriusculis, glandulis ſtipitatis ad baſin petioli, ſtipulis linearibus cuſpidatis, pedunculis 1floris folio brevioribus. *Cayenna. Portorico.* Bertero.

capenſis Thb. 104. C. foliolis linearibus acutis ſubtus nervoſis imbricatis, glandulis binis ad baſin petioli, ramis villoſis, pedunculis axillaribus folia aequantibus. *C. B. S.*

Patellaria Cand. 105. C. foliolis linearibus obliquis mucronatis ſubtus petiolis ramisque pubeſcentibus, glandulis binis ſcutellatis ad baſin petioli, ſtipulis linearifubulatis, pedunculis 1floris abbreviatis, leguminibus hirtis. *Cuba. Amer. auſtr.*

pumila Lam. 106. C. foliolis linearibus mucronatis ciliatis, glandula pedicellata infra par infimum, pedunculis folio brevioribus, caule diffuſo herbaceo. *Ind. or. China. Japon.* (C. procumbens L. ſp. ed. 1.)

Aeſchynomene Cand. 107. C. foliolis linearibus mucronatis glabris, glandula ſubſeſſili infra par infimum, ſtipulis ſubulatis, pedunculis aggregatis folio brevioribus. *Hiſpaniola.*

nictitans 108. C. foliolis lineari-oblongis obtuſis mucronatis, glandula ſubſtipitata in medio petiolo villoſo, floribus 5andris, caule erectiusculo herbaceo. *Amer. bor. Ind. occid.*

Chamaecriſta 109. C. foliolis oblongo-linearibus mucronatis, glandula ſubſtipitata infra par infimum, pedunculis geminis ſupraxillaribus, leguminibus hiſpidulis. *Amer. tropic.*

glanduloſa 110. C. foliolis oblongis mucronatis, glandulis ſtipitatis plurimis petiolaribus, pedunculis axillaribus abbreviatis, leguminibus glabris. *Ind. occ.*

breviſolia Lam. 111. C. foliolis oblongis obtuſis 3nerviis, petiolo eglanduloſo, ſtipulis ſemicordatis, pedunculis 1floris folia ſuperantibus. *Madagascar.*

****** *Foliis 20-50jugis.*

aſpera Mühlb. 112. C. foliolis lineari-lanceolatis ciliatis ramisque ſtrigoſis, glandula urceolata infra infimum par, pedunculis paucifloris, floribus 7andris, antheris inaequalibus. *Carolina.*

microphylla W. 113. C. foliolis linearibus anguſtiſſimis imbricatis, glandula ſeſſili baſilari, ſtipulis ſubulatis elongatis, ramis aſperis, pedunculis 1floris, leguminibus villoſis. *Inſ. Carib.*

mimosoides 114. C. foliolis linearibus nervosis glabris, glandula petiolari obsoleta, stipulis subulatis, pedunculis axillaribus geminis, leguminibus glabris. *Ind. or. Ceylon.*

flexuosa 115. C. foliolis linearibus 3nerviis, stipulis dimidiato-cordatis, pedunculis axillaribus solitariis, caule flexuoso herbaceo. *Brasil.*

angustissima Lam. 116. C. foliolis linearibus angustissimis imbricatis ramisque villosis, stipulis lanceolatis, pedunculis geminis, caule recto hirsuto. *Java.*

procumbens 117. C. foliolis linearibus, petiolis eglandulosis, caule procumbente herbaceo. *Virgin. Carolin.*

hecatophylla Cand. 118. C. foliolis oblongo-linearibus mucronatis, petiolo marginato aristato basi glanduloso, stipulis subulatis 3nerviis, pedunculis geminis 1floris supraxillaribus, caule erecto herbaceo pubescente. *Insul. Carib.*

1628. CAESALPINIA.

* *Inermes.*

elata Sw. 1. C. foliis 2pinnatis, foliolis multijugis linearibus obtusis, corymbis compositis, calycibus tomentosis subaequalibus, petalis fimbriatis, staminibus longissimis. *Ind. or.*

glandulosa * 2. C. foliis 2pinnatis, foliolis 7jugis oblongis mucronatis punctatis, stipulis pinnatis, floribus racemosis, calycibus glanduloso-pilosis, staminibus corolla subbrevioribus. *Nov. Hispan.* (Pomaria Cav.)

punctata W. 3. C. foliis 2pinnatis, partialibus 2-3-propriis 3-4-jugis, foliolis ellipticis retusis subtus pallidis punctatis. *Brasil.*

thomaea * 4. C. foliis 2pinnatis, partialibus 6-propriis 12jugis, foliolis linearibus obtusis glabris punctatis, racemis compositis, calycibus glabris. *Insul. S. Thomae.* Bertero.

Coriaria W. 5. C. foliis 2pinnatis, partialibus 8-propriis 20jugis, foliolis linearibus obtusis glabris epunctatis, racemis compositis, calycibus glabris. *Hispaniola. Amer. austr.*

dubia * 6. C. foliis 2pinnatis, partialibus 12-propriis 24jugis, foliolis oblongis obliquis mucronatis subtus discoloribus, racemis paniculatis calycibusque ferrugineis, leguminibus 1spermis? *Brasil. Hispaniola.*

brasiliensis Sw. 7. C. foliis 2pinnatis, partialibus 3-propriis 12jugis, foliolis ovato-oblongis acutiusculis basi inaequalibus, petiolo fulvo-tomentoso, floribus racemosis, calycibus obtusissimis rufo-tomentosis, staminibus corolla brevioribus. *Brasil. Jamaic.*

procera Pöppig. 8. C. foliis pinnatis multijugis, foliolis oblongo-linearibus obtusis glabris, racemis paucifloris, staminibus corollam aequantibus. *Cuba.*

** *Aculeatae.*

bijuga Sw. 9. C. foliis duplicato-2jugis, foliolis obcordatis calycibusque glabris, ſtaminibus corollam aequantibus, leguminibus ſub-2ſpermis. *Jamaica.* (C. veſicaria et Poinciana 2juga L.)

inſignis * 10. C. foliis 2pinnatis 2jugis, foliolis obovatis, petiolo inermi, ramis teretibus aculeatis verrucoſis, racemis terminalibus compoſitis. *Ad fl. Amazonum.* Humb. (Poinciana Kunth.)

caſſioides W. 11. C. foliis 2pinnatis, partialibus 2-propriis 6jugis, foliolis oblongis retuſis glabris, petiolis piloſiusculis, ſtipulis ſpineſcentibus. *Amer. auſtr.*

mucronata W. 12. C. foliis 2pinnatis, partialibus 3-propriis 7jugis, foliolis oblongis obtuſis mucronatis, petiolis aculeatis. *Braſil.*

bahamenſis Lam. 13. C. foliis 2pinnatis, partialibus 5-propriis 12jugis, foliolis obovatis emarginatis glabris, ramis aculeatis, floribus racemoſis. *Inſ. Baham.* (C. braſilienſis L.?)

Criſta 14. C. foliis 2pinnatis, partialibus propriisque ſub-3jugis, foliolis ovato-ſubrotundis glaberrimis, aculeis ramorum confertis, racemis terminalibus, calycibus truncatis, ſtaminibus 5 elongatis. *Ind. occid. Japon.* (? Thunb.)

glanduloſa Bertero. 15. C. foliis 2pinnatis, partialibus 3-propriis 5jugis, foliolis oblique cordato-ovalibus obtuſis margine punctatis, petiolis ramisque retrorſum aculeatis, petalis glanduloſis calycem ſubaequantibus. *Hiſpaniola.*

Sappan 16. C. foliis 2pinnatis, partialibus propriisque ſub-7jugis, foliolis oblongis inaequilateris obtuſis, petiolis ramulisque inermibus, ramorum aculeis confertis, ſtaminibus elongatis. *Ind. orient. Inſ. Moluce.*

pulcherrima Sw. 17. C. foliis 2pinnatis, partialibus 6-propriis 10jugis, foliolis oblongis obtuſis mucronatis, ſtipulis ſubſpineſcentibus, floribus corymboſis, petalis fimbriatis, ſtaminibus longiſſimis. *Ind. or. et occid.* (Poinciana L.)

Nuga R. Br. 18. C. foliis 2pinnatis, foliolis oblongis acutis, petiolis aculeatis, racemis compoſitis, caule frutiCoſo inermi, ramis decumbentibus. *Amboina.* (Guilandina Nuga L.)

† *mimoſoides* Lam. 19. C. foliis pinnatis partialibus propriisque 10jugis, foliolis oblongis obtuſis, petiolis ramisque racemi aculeatis, leguminibus lanatis. *Malabar.*

1629. HOFMANNSEGGIA Cav.

Falcaria Cav. 1. H. caule ſuffruticoſo erecto, foliis 2pinnatis, foliolis ovalibus glaucis, leguminibus arcuatis glabris. *Chili. Buenos Ayres.*

trifoliata Cav. 2. H. ſubacaulis, foliis ternatis, foliolis pinnatis incano-tomentoſis, leguminibus rectis villoſis. *Patagonia.*

1630. MEZONEVRON Desf.

glabrum Desf. 1. M. aculeatum, foliis 2pinnatis glabris, leguminibus applanatis membranaceis. *Timor.*

pubescens Desf. 2. M. aculeatum, foliis 2pinnatis pubescentibus, leguminibus medio inflatis reticulatis. *Java.*

1631. CUBAEA Scop.

bijuga * 1. C. foliis 2jugis oblongo-ellipticis supra nitidis reticulatis subtus glaucis, floribus racemosis, leguminibus villosis. *Brasil.* (Cassia 4phylla Desv. Desvauxii Collad.)

trigona W. 2. C. foliis pinnatis sub-6jugis, foliolis oblongis acutis glabris, ramulis petiolisque 3gonis, floribus paniculatis, leguminibus villosis. *Guiana.* (Tachigali paniculata et 3gona Aubl.)

emarginata * 3. C. foliis pinnatis sub-4jugis, foliolis ellipticis emarginatis coriaceis subtus discoloribus, racemis compositis pubescentibus. *Brasil.* Sello.

1632. PARKINSONIA.

aculeata 1. P. spinis ramorum validis, foliis pinnatis multijugis, petiolis applanatis elongatis, foliolis supinis. *Ind. occid.*

inermis * 2. P. inermis, foliis 2pinnatis, petiolis teretibus glanduloso-viscosis, foliolis oblongo-linearibus mucronatis. *Monte Video.* Sello.

1633. AFZELIA Sm.

africana Sm. *Afric. occid.* Frutex aut arbor foliis abrupte pinnatis, floribus racemosis rubris.

1634. HYMENAEA.

(Folia conjugata.)

Courbaril 1. H. foliolis coriaceis subeveniis basi inaequalibus, paniculae floribus pedunculatis. *Amer. austr.*

venosa Vahl. 2. H. foliolis membranaceis venosis basi subaequalibus, paniculae floribus subsessilibus. *Cayenna.*

verrucosa Gärtn. 3. H. foliolis venosis basi inaequalibus, panicula flexuosa divaricata, pedunculis multifloris, legumine verrucoso. *Madagascar.*

1635. MYROSPERMUM Jacqu.

toloiferum * 1. M. foliis impari-pinnatis 5jugis, foliolis alternis oblongis obtusis mucronatis, floribus axillaribus fasciculatis. *Amer. austr.* (Tolvifera Balsamum L.)

pedicellatum Lam. 2. M. foliis impari-pinnatis 6jugis, foliolis alternis oblongis retusis reticulato-venosis pellucido-punctatis, pedunculis spicatis axillaribus. *Peru.* Jos. Jussieu.

frutescens Jacq. 3. M. foliis impari-pinnatis 7jugis, foliolis alternis oblongis retusis pellucido-punctatis, racemis terminalibus laxis. *Amer. austr.* (Myroxylon peruiferum L. suppl. ad mancum exemplar.)

1636. ANAGYRIS.

foetida 1. A. foliis ternatis, foliolis oblongis mucronatis subtus sericeis, pedunculis axillaribus sub-2floris. *Europ. austr.* (A. latifolia Brouss. W. var.)

chinensis * 2. A. foliis impari-pinnatis multijugis, foliolis ovato-lanceolatis glabris, floribus paniculatis. *China austr.*. (A. foetida Lour.)

inodora Lour. 3. A. foliis impari-pinnatis, foliolis oblongis acuminatis glabris, floribus racemosis, calycibus inflatis coloratis. *Cochinchina.*

1637. CERCIS.

Siliquastrum 1. C. foliis cordatis orbiculatis utrinque glaberrimis. *Europ. austr. Tauria. Japon.*

canadensis 2. C. foliis cordatis acuminatis subtus ad axillas venarum pubescentibus. *Amer. bor.*

1638. ANTHONOTHA P. B.

macrophylla P. B. *Guinea.* Arbor foliis sub-2jugis oblongis acuminatis, floribus axillaribus paniculatis.

1639. SOPHORA.

tomentosa 1. S. arborea, foliolis subrotundis ovalibusve obtusissimis utrinque calycibusque tomentosis, racemo terminali elongato. *Ind. or. occid.* (S. occidentalis L.)

japonica 2. S. arborea, foliolis ovato-oblongis acutis leguminibusque glabris. *Japon. China.*

heptaphylla 3. S. arborea, foliolis ovatis margine revolutis subtus leguminibusque lanatis. *Ceylon. Insul. Moluc.*

alopecuroides 4. S. herbacea, foliolis oblongis incanis subtus sericeis, racemis spicatis terminalibus. *Asia minor. Caucas.*

sericea Nutt. 5. S. herbacea, foliolis obovato-ellipticis subtus sericeis, floribus spicatis axillaribus. *Ad fl. Missuri.* (Astragalus carnosus Pursh.)

flavescens Ait. 6. S. herbacea, foliolis ovato-oblongis glabris, racemis laxis terminalibus. *Sibiria.*

† *obliqua* Pers. 7. S. foliis abrupte pinnatis subtus ferrugineo-villosis, foliolis obliquis, pedunculis verrucosis. *Amer. austr.?*

1640. PODALIRIA Lam.

myrtillifolia W. 1. P. foliis obovato-oblongis retusis utrinque calycibus sericeis, pedunculis 1floris folia subaequantibus. *C. B. S.* (Sophora biflora L., myrtillifolia Retz., rotundifolia Thunb.)

sericea R. Br. 2. P. foliis obovato-oblongis utrinque calycibusque sericeis, pedunculis 1floris folio brevioribus. *C. B. S.* (Sophora sericea Andr. Podaliria cuneifolia Vent.)

syracifolia Sims. 3. P. foliis obovato-oblongis mucronatis ramisque sericeis, pedunculis 1floris folia subaequantibus, calycibus reflexis. *C. B. S.*

biflora W. 4. P. foliis ovalibus utrinque sericeis pedunculo 2floro brevioribus, calycibus tomentosis scabris. *C. B. S.* (Sophora biflora Retz. Hypocalyptus pedunculatus Thunb. Podaliria argentea Salisb.)

bracteata Roxb. 5. P. foliis ovalibus reticulato-venulosis glabris, pedunculis bracteatis, bracteis nervosis calycem occultantibus. *Silhet, proc. Ind. or.*

calyptrata W. 6. P. foliis obovato-ellipticis pubescentibus subtus reticulatis, pedunculis 1floris folia subaequantibus, calycibus villosis, limbo scarioso reflexo. *C. B. S.* (Sophora calyptrata Retz. Thunb. Hypocalyptus Thunb.)

hirsuta W. 7. P. foliis ovato-subrotundis petiolatis calycibusque villosis, pedunculis 1floris, laciniis calycinis lanceolatis alas aequantibus. *C. B. S.* (Sophora hirsuta Ait.)

cordata R. Br. 8. P. foliis cordatis subrotundis subsessilibus villosissimis, pedunculis 2floris, alis corollae lacinias calycis villosi superantibus. *C. B. S.* (Sophora cordata Thunb.)

buxifolia W. 9. P. foliis ovalibus supra glabris subtus sericeis, pedunculis 1floris calycibusque rufo-tomentosis folia aequantibus. *C. B. S.* (Sophora buxifolia Retz. Hypocalyptus glaucus Thunb.)

1641. BAPTISIA Vent.

* *Foliis simplicibus.*

perfoliata R. Br. 1. B. foliis perfoliatis cordato-ovatis, pedunculis 1floris axillaribus. *Carolina.* (Crotalaria L. Rafnia W.)

** *Foliis ternatis.*

uniflora Nutt. 2. B. foliis sessilibus lanceolatis obtusis pubescentibus, stipulis setaceis, pedunculis 1floris axillaribus. *Carolina. Georgia.* (Podaliria uniflora Mx. Sophora lanceolata Walt.)

australis R. Br. 3. B. foliis petiolatis spathulato-lanceolatis glabris, stipulis lanceolatis petiolo longioribus, racemis terminalibus. *Carolina.* (Sophora australis L., Podaliria W., P. coerulea Mx. Pursh.)

tinctoria R. Br. 4. B. foliis petiolatis obovatis ſubemarginatis glabris, ſtipulis ſubnullis, racemis laxis ſubſecundis. *Amer. bor.* (Sophora L., Podaliria W. Mx.)

alba R. Br. 5. B. foliis petiolatis elliptico-oblongis mucronatis glabris, ſtipulis ſubulatis petiolo brevioribus, racemis terminalibus. *Amer. bor.* (Crotalaria et Sophora L., Podaliria W. Mx.)

leucophaea Nutt. 6. B. foliis ſeſſilibus rhomboideo-obovatis ramisque villoſiusculis, ſtipulis ovatis latis foliaceis, racemis axillaribus multifloris ſecundis. *Georgia. Louiſiana.*

bracteata Ell. 7. B. foliis petiolatis lanceolatis obtuſiusculis pubeſcentibus, ſtipulis lanceolatis petiolum ſuperantibus, ramis divaricatis, racemis axillaribus reclinatis, bracteis ovatis perſiſtentibus. *Georgia.*

villoſa Ell. 8. B. foliis ſubſeſſilibus ovali-oblongis obtuſis ſubtus ramisque villoſis, ſtipulis linearibus, racemo terminali ſubſpicato, calycibus ſemi-4fidis. *Carolina. Georgia.* (Sophora Walt. Podaliria Mx.)

1642. VIRGILIA Lam.

capenſis Lam. 1. V. foliis pinnatis, foliolis lanceolatis mucronatis ſubtus ſericeis, racemis axillaribus, leguminibus tomentoſis. *C. B. S.* (Sophora L., Podaliria W.)

aurea Lam. 2. V. foliis pinnatis, foliolis ellipticis acutiusculis ſubtus leguminibusque glabris. *Abyſſinia.* (Sophora Ait., Podaliria W., Robinia ſubdecandra Herit.)

ſecundiflora Cav. 3. V. foliis pinnatis, foliolis ovali-oblongis coriaceis laevibus, racemis denſis terminalibus, calycibus rufo-tomentoſis. *Nov. Hiſpan.* (Brouſſonetia ſecundiflora Ort.)

intruſa R. Br. 4. V. foliis ternato-pinnatis, foliolis obovato-ovalibus mucronatis glabris, racemo terminali, calycis baſi intruſa, leguminibus glabris. *C. B. S.* (Crotalaria cordifolia L.? Hypocalyptus obcordatus Thunb.)

1643. CYCLOPIA Vent.

geniſtoides Vent. *C. B. S.* Frutex ramis angulatis, foliis ſeſſilibus ternatis rigidis, foliolis linearibus margine revolutis glabris, floribus axillaribus pedunculatis purpureis. (Sophora geniſtoides L., galioides Berg. Podaliria W. Galega geniſtoides Thunb.)

1644. THERMIA Nutt.

lupinoides Nutt. 1. Th. foliis ternatis utrinque villoſis oblongo-lanceolatis, ſtipulis oblongis foliaceis petiolo longioribus, pedunculis verticillatis. *Sibir. Camtſchatca.* (Sophora L. Podaliria W. Thermopſis R. Br.)

rhombifolia Nutt. 2. Th. foliis ternatis rhombeo-ovatis ſubcuneatis ſubtus ſericeis, ſtipulis oblique ovatis petiolo brevioribus, verticillis racemoſis. *Louiſiana ſuper.* (Cytiſus rhombifolius Fraſ. Pursh.)

1645. EDWARDSIA Salisb.

grandiflora Salisb.
1. E. arborea, foliis pinnatis, foliolis oblongo-lanceolatis glabris. *Nov. Zeeland.* (Sophora tetraptera Ait.)

microphylla Salisb.
2. E. arboreſcens, foliis pinnatis, foliolis obovato-ſubrotundis ſubemarginatis glabriusculis. *Nov. Zeeland.* (Sophora tetraptera Forſt.)

chryſophylla Salisb.
3. E. arboreſcens, foliis pinnatis, foliolis ellipticis ciliatis. *Inſ. Sandwich.*

1646. CHORIZEMA Labill.

ilicifolium Labill.
1. Ch. foliis oblongis ſinuato-pinnatifidis dentato-ſpinoſis ſubcoriaceis, pedunculis racemoſis apice bracteatis. *Nov. Holl.*

nanum Sims.
2. Ch. foliis oblongis obtuſis ſinuato-dentatis ſpinoſis, pedunculis racemoſis baſi bracteatis. *Nov. Holl. ad Africum.* (Pultenaea nana Andr.)

rhombeum R. Br.
3. Ch. foliis integerrimis planis mucronatis, inferioribus rhombeo-orbiculatis, ſummis elliptico-lanceolatis, pedunculis paucifloris. *Nov. Holl. ad Africum.* (Ch. ſcandens Sm.)

1647. PODOLOBIUM R. Br.

trilobatum R. Br.
Nov. Holl. Fruticulus foliis 3lobis ſpinoſo-dentatis, pedunculis racemoſis. (Chorizema trilobum Sm. Pultenaea ilicifolia Andr.)

1648. OXYLOBIUM Andr.

arboreſcens R. Br.
1. O. foliis lineari-lanceolatis mucronatis ciliatis, floribus corymboſis, bracteis calyci proximis perſiſtentibus, leguminibus calycem ſubaequantibus. *Terra Diemen.*

ellipticum R. Br.
2. O. foliis ovali-oblongis, floribus corymboſis, bracteis a calyce remotiusculis caducis, leguminibus calycem duplo ſuperantibus. *Terra Diemen.* (Gompholobium Labill. Calliſtachys Vent.)

cordifolium Andr.
3. O. foliis cordato-ovatis piloſiusculis, umbellis terminalibus ſeſſilibus. *Nov. Holl.*

1649. GOMPHOLOBIUM Sm.

* *Foliis ternatis.*

latifolium Sm.
1. G. foliolis oblongo-linearibus, ramulis angulatis glabris, carina fimbriata, calyce fructifero reflexo. *Nov. Holl.* (G. fimbriatum Sm., pſoraleaefolium Salisb.)

marginatum R. Br.
2. G. foliolis obovatis marginatis, ſtipulis petiolum aequantibus, corolla calycem aequante. *Nov. Holl. ad Africum.*

polymorphum R. Br. 3. G. foliis ternatis quinatisque, foliolis linearibus margine revolutis, caule procumbente. *Nov. Holl. ad Africum.*

minus Sm. 4. G. foliolis linearibus aduncis, ramulis teretibus hirtis. *Nov. Holl.*

grandiflorum Sm. 5. G. foliolis lineari-subulatis strictis, ramis angulatis glabris, calycibus margine lanatis. *Nov. Holland.*

** *Foliis pinnatis.*

tomentosum Labill. 6. G. foliis sub-4jugis lineari-subulatis scabris, pedunculis solitariis, calycibus hirsutis legumine brevioribus, carina sericeo-ciliata. *Nov. Holland. bor.*

venustum R. Br. 7. G. foliis multijugis lineari-subulatis margine revolutis venosis calycibusque glabris, pedunculis corymbosis. *Nov. Holl. austr.* (G. pinnatum Sm.)

1650. SPHAEROLOBIUM Sm.

vimineum Sm. 1. Sph. caule aphyllo ramoso, ramis superne squamatis, floribus flavis. *Nov. Holl. Terra Diemen.* (Sph. minus Labill.)

medium R. Br. 2. Sph. caule aphyllo ramoso, ramis superne nudis, floribus rubris. *Nov. Holl. ad Africum.*

1651. GASTROLOBIUM R. Br.

bilobum R. Br. *Nov. Holl. ad Africum.* Fruticulus foliis sessilibus subverticillatis spathulatis emarginato-2lobis sericeis, floribus racemosis luteis.

1652. CALLISTACHYS Vent.

lanceolata Vent. *Nov. Holl.* Frutex ramosus, foliis ternis subsessilibus lanceolatis acutis sericeis subtus incanis, stipulis scariosis, floribus racemosis fulvis.

1653. EUCHILOS R. Br.

obcordatum R. Br. *Nov. Holl. ad Africum.* Fruticulus foliis oppositis obcordatis ciliatis, floribus axillaribus subsessilibus fulvis.

1654. PULTENAEA Sm.

* *Capitulis terminalibus.*

daphnoides Sm. 1. P. foliis spathulatis mucronatis glabris. *Nov. Holland.*

obcordata Andr. 2. P. foliis obcordatis glaberrimis mucronato-pungentibus. *Terra Diemen.*

stricta Curt. 3. P. foliis obovatis mucronatis glaberrimis, caule stricto, calycibus leguminibusque pilosis. *Terra Diemen.*

biloba R. Br. 4. P. foliis cuneiformibus apice dilatato-2lobis mucronatis ſupra aſperis ſubtus ſericeis, capitulis paucifloris. *Nov. Holl.*

ſcabra R. Br. 5. P. foliis cuneiformibus truncatis ſetaceo-mucronatis margine revolutis ſupra ſcabris ſubtus villoſis, ſtipulis ſetaceis recurvis. *Nov. Holl.*

retuſa Sm. 6. P. foliis cuneato-linearibus retuſis glabris, capitulis paucifloris, bracteis ſubrotundis calyce brevioribus. *Nov. Holl.*

linophylla Sm. 7. P. foliis linearibus mucronatis margine revolutis ſubtus ſericeis, bracteis abbreviatis. *Nov. Holl.*

dentata Labill. 8. P. foliis linearibus punctato-aſperis, bracteis dentatis calycem ſubaequantibus. *Nov. Holl. ad Africum.* (P. paleacea W.)

tenuifolia R. Br. 9. P. foliis linearibus ſubtus convexis ramulisque piloſis, capitulis 2floris, fructibus lateralibus. *Terra Diemen.*

ſtipularis Sm. 10. P. foliis linearibus acutis junioribus ciliatis, ſtipulis imbricatis 2fidis, capitulis multifloris, bracteis calyces aequantibus. *Nov. Holl.*

** *Floribus axillaribus.*

villoſa Sm. 11. P. foliis oblongo-linearibus ſupra ſubconcavis ſubtus ramisque villoſis, pedunculis 1floris axillaribus, bracteis ovatis calyce brevioribus. *Nov. Holland.*

flexilis Sm. 12. P. foliis oblongo-linearibus mucronatis glaberrimis. *Nov. Holl.*

veſtita R. Br. 13. P. foliis lineari-lanceolatis mucronatis glabris, ſtipulis imbricatis ciliatis, calycibus bracteisque ariſtatis. *Nov. Holl. auſtr.*

ferruginea Rudg. 14. P. foliis obovatis punctatis piloſis, ſtipulis imbricatis ſubulatis, bracteis calycem ſubaequantibus. *Nov. Holl.*

elliptica Sm. 15. P. foliis confertis elliptico-linearibus concavis ſupra glabris ſubtus punctatis ſericeis, ſtipulis villoſis, floribus ſubſeſſilibus. *Nov. Holl.*

polygalaefolia Rudg. 16. P. foliis lineari-oblongis mucronatis ferrugineis, ſtipulis ſparſis ſubulatis. *Nov. Holl.*

juniperina Labill. 17. P. foliis linearibus cuſpidato-ariſtatis, ſtipulis ſubulatis, floribus ſeſſilibus. *Nov. Holl. bor.*

1655. SCLEROTHAMNUS R. Br.

microphyllus R. Br. *Nov. Holl. auſtr.*

1656. DAVIESIA Sm.

juncea Sm. 1. D. caule aphyllo tereti ſulcato nudo, umbellis lateralibus, bracteis calyceque imberbibus. *Nov. Holl. auſtr.*

alata Sm. 2. D. caule aphyllo alato, umbellis lateralibus, bracteis calyceque fimbriatis. *Nov. Holl.* (Viminaria lateriflora Link.)

acicularis Sm. 3. D. foliis linearibus revolutis pungentibus denticulato-ſcabris, floribus axillaribus ſolitariis. *Nov. Holl.*

ulicina Sm. 4. D. foliis lineari-lanceolatis laevibus pungentibus, ramis ſpineſcentibus glabris patulis, pedunculis axillaribus 1floris, bracteis imbricatis. *Nov. Holl.* (D. ulicifolia Andr.)

reticulata Sm. 5. D. foliis lanceolatis pungentibus utrinque reticulato-venoſis, ſtipulis intrafoliaceis geminis, floribus axillaribus ſolitariis. *Nov. Holl.*

umbellata Sm. 6. D. foliis lanceolatis pungentibus, pedunculis axillaribus umbelliferis 4floris, calyce truncato. *Nov. Holl.*

corymboſa Sm. 7. D. foliis lineari-oblongis muticis, pedunculis axillaribus geminis corymboſis multifloris, calyce regulari. *Nov. Holl.*

mimoſoides R. Br. 8. D. foliis lanceolatis elongatis cuſpidatis, corymbis axillaribus, bracteis appreſſis, labio calycis ſuperiori retuſo. *Nov. Holl.* (D. corymboſa Andr.)

incraſſata Sm. 9. D. foliis cuneato-linearibus compreſſis oblique verticalibus incraſſatis ſpinoſis, floribus axillaribus ſolitariis. *Nov. Holl.*

ſquarroſa Sm. 10. D. foliis cordatis pungentibus reflexis margine ſcabris, pedunculis axillaribus 1floris ſubſolitariis. *Nov. Holl.*

cordata Sm. 11. D. foliis cordatis amplexicaulibus reticulato-venoſis, pedunculis axillaribus aggregatis corymboſis multifloris, calyce truncato. *Nov. Holl.*

latifolia R. Br. 12. D. foliis obovato-ellipticis venoſis, racemis axillaribus multifloris. *Nov. Holl.*

1657. EUTAXIA R. Br.

myrtifolia R. Br. *Nov. Holl. auſtr.* Fruticulus foliis ſpathulato-lanceolatis mucronatis glabris, floribus axillaribus geminis fulvis. (Dillwynia obovata Labill., myrtifolia Sm.)

1658. DILLWYNIA Sm.

parvifolia R. Br. 1. D. foliis decuſſatim confertis linearibus patentibus, floribus ſubcapitatis, pedunculis 2bracteatis. *Nov. Holl.*

cineraſcens R. Br. 2. D. foliis filiformibus inermibus patentibus, ramulis calycibusque ſericeis, corymbis terminalibus. *Terra Diemen.*

ericaefolia Sm. 3. D. foliis ſubulatis pungentibus punctato-ſcabris divaricatis ſubtortis, ramulis puheſcentibus, corymbis terminalibus ſeſſilibus. *Nov. Holl.* (Pultenaea retorta Wendl.)

glaberrima Sm. 4. D. foliis filiformibus laevibus apice recurvo-mucronatis, corymbis terminalibus pedunculatis. *Nov. Holl.*

floribunda Sm. 5. D. foliis ſubulatis mucronatis, floribus axillaribus geminis. *Nov. Holl.*

1659. Aotus Sm.

cilloſa Sm. *Nov. Holl. Terra Diemen.* Frutex foliis petiolatis linearibus obtuſis ſparſis, ramis hirſutis, ramulis ferrugineis, floribus axillaribus ſolitariis fulvis. (A. ferruginea Labill. Pultenaea ericoides Vent.)

1660. Viminaria Sm.

denudata Sm. *Nov. Holl. Terra Diemen.* Fruticulus aphyllus, ramis filiformibus, floribus racemoſis flavis. (Daviesia denudata Vent. Sophora juncea Schrad.)

1661. Jacksonia R. Br.

ſcoparia R. Br. 1. J. arboreſcens inermis, ramulis angulatis, racemis terminalibus. *Nov. Holl.*

ſpinoſa R. Br. 2. J. fruticoſa, ramulis ſpineſcentibus divaricatis dichotomis aphyllis, pedunculis ſolitariis lateralibus. *Nov. Holl. ad Africum.* (Gompholobium ſpinoſum Labill.)

1662. Burtonia R. Br.

ſcabra R. Br. *Nov. Holl. ad Afric.* (Gompholobium ſcabrum Sm.)

1663. Brachysema R. Br.

latifolium R. Br. 1. Br. foliis ſubcordato-ovatis mucronatis ſubtus albido-pubeſcentibus, vexillo oblongo obovato. *Nov. Holl.*

undulatum Ker. 2. Br. foliis ſubellipticis mucronatis undulatis ſubtus ſericeis, vexillo oblongo apice convoluto. *Nov. Holl.*

1664. Mirbelia Sm.

reticulata Sm. 1. M. foliis lineari-lanceolatis venoſis, floribus axillaribus glomeratis. *Nov. Holl.* (Pultenaea rubiaefolia Andr.)

dilatata R. Br. 2. M. foliis cuneiformibus apice ſſidis. *Nov. Holl. ad Africum.*

1665. Ormosia Jackſ.

daſycarpa Jackſ. *Ind. occid.* Arbor ramis ferrugineo-tomentoſis, foliis impari-pinnatis glabris, floribus paniculatis coeruleis. (Sophora monoſperma Sw.)

1666. Samyda.

* *Decandrae.*

glabrata Sw. 1. S. foliis ovato-oblongis integerrimis ſupra nitidis ſubtus glabris ſubtiliter punctatis, pedunculis 1floris ſolitariis axillaribus. *Jamaica.*

affinis * 2. S. foliis oblongis utrinque attenuatis ſubintegerrimis opacis glabris, pedunculis axillaribus ſubaggregatis. *Hiſpaniola.*

ſpineſcens Sw. 3. S. foliis oblongis obtuſis crenatis glaberrimis, ramis ſpineſcentibus, floribus ſubſeſſilibus terminalibus. *Hiſpaniola.*

Selloi * 4. S. foliis ovato-oblongis baſi inaequalibus ſerratis ſupra nitidis ſubtus glabris, pedunculis aggregatis e pulvillis axillaribus, floribus polygamis. *Braſil.* Sello. (Bigelovia braſilienſis N. E.)

† *grandiflora* * 5. S. foliis oblongis utrinque attenuatis ſubſeſſilibus obſolete ſerratis ſupra opacis ſubtus nitidis discoloribus, floribus aggregatis axillaribus. *Braſ.* Sello.

decurrens * 6. S. foliis oblongis utrinque attenuatis in petiolum decurrentibus crenulatis glaberrimis opacis, cymis axillaribus pedunculatis paucifloris. *Braſ.* Sello.

ſpinuloſa Vent. 7. S. foliis ovali-oblongis coriaceis ſpinuloſo-ſerrulatis ſupra glaberrimis pellucido-punctatis, pedunculis pubeſcentibus ſubſolitariis e pulvillis axillaribus. *Inſ. Carib.*

villoſa Sw. 8. S. foliis ovato-oblongis baſi obliquis ſubſerratis ſubtus ferrugineo-villoſis, pedunculis axillaribus ſolitariis. *Jamaica.*

** *Floribus dodecandris.*

pubeſcens 9. S. foliis obovato-ellipticis obtuſis ſupra opacis rugoſis ſubtus flavido-villoſis, pedunculis axillaribus ſubaggregatis. *Hiſpaniola.*

ſerrulata 10. S. foliis ovato-oblongis acutis ſerrulatis coriaceis ſupra rugoſis nitidiuſculis ſubtus ferrugineo-villoſis, pedunculis axillaribus 1floris. *Ind. occ.*

tinifolia Vent. 11. S. foliis obovatis glabris integerrimis, pedunculis axillaribus 1floris petiolo longioribus. *Ind. or.*

*** *Floribus octandris.*

nitida 12. S. foliis cordatis crenatis nitidis, racemis axillaribus. *Jamaica.*

macrophylla W. 13. S. foliis ovatis acutis ſubcrenulatis utrinque glabris, axillis venarum ſubtus villoſis, pedunculis corymboſis terminalibus. *Ind. or. et occid.* (Samyda viridiflora Poir.)

multiflora Cav. 14. S. foliis oblongis utrinque attenuatis dentatis ſubtus tomentoſis, pedunculis axillaribus aggregatis. *Inſ. Carib.*

1667. CASEARIA.

* *Floribus decandris.*

Meliſtaurum * 1. C. foliis amplis ovato-oblongis obtuſis integerrimis coriaceis nitidis, floribus axillaribus ſeſſilibus minutis diclinis. *Nov. Caledon.* (Meliſtaurum diſtichum Forſt. Samyda polyandra W.)

ſylveſtris Sw. 2. C. foliis ovato-oblongis acuminatis baſi ſubattenuatis integerrimis utrinque glaberrimis nitidis, pedunculis axillaribus confertiſſimis. *Ind. occid.*

fragilis Poir. 3. C. foliis ovato-lanceolatis craſſiusculis integerrimis nitidis, pedunculis axillaribus 1floris. *Ind. orient.* (Samyda Vent.)

parviflora W. 4. C. foliis oblongis acuminatis crenatis utrinque glaberrimis, pedunculis axillaribus 1floris confertis. *Ind. occid.* (Samyda L.)

parvifolia W. 5. C. foliis ovatis acutis ſerratis utrinque glabris, pedunculis lateralibus 1floris ſubaggregatis. *Martinica.* (C. decandra Jacq.)

punctata * 6. C. foliis ovato-oblongis acuminatis ſerratis utrinque glaberrimis nitidis pellucido-punctatis, pedunculis axillaribus confertis. *Ind. occid. Peru.* (Chaetocrater faſciculatus R. et P. Crateria Perſ.)

capitata * 7. C. foliis oblongis acuminatis ſerratis, floribus capitatis. *Peru.* (Chaetocrater capitatus R. et P. Crateria Perſ.)

macrophylla Vahl. 8. C. foliis ellipticis utrinque attenuatis glabris obſolete crenatis, floribus axillaribus aggregatis tomentoſis ſubſeſſilibus. *Ind. occ.* (Pitumba guianenſis Aubl.)

obliqua * 9. C. foliis oblongo-lanceolatis acuminatis inaequilateris ſerrulatis 3plinerviis utrinque glaberrimis ſupra nitidis pellucido-punctatis, floribus ſubſeſſilibus ſolitariis axillaribus minutis. *Braſil.* Sello.

ſerrulata Sw. 10. C. foliis oblongis obtuſis ſerrulatis utrinque glaberrimis, ramulis flexuoſis, pedunculis axillaribus confertiſſimis. *Ind. occid.*

incana Bert. 11. C. foliis lanceolatis acuminatis argute ſerrulatis ſubtus incano-tomentoſis, pedunculis axillaribus ſubcymoſis, floribus majusculis. *Portorico.*

elliptica W. 12. C. foliis oblongis elongatis obtuſis obſolete ſerratis ſubtus ſubpubeſcentibus, pedunculis axillaribus confertis breviſſimis. *Ind. or.* (Anavinga lanceolata Lam.)

hirſuta Sw. 13. C. foliis ovatis acuminatis dentato-ſerratis ſupra pubeſcentibus ſubtus villoſis; pedunculis lateralibus confertis. *Ind. occid.*

ſtipularis Poir. 14. C. foliis oblongo-lanceolatis acuminatis ſerrulatis ſubtus tomentoſis, ſtipulis lanceolatis elongatis, pedunculis axillaribus multifloris. *Portorico.* (Samyda Vent.)

grewiaefolia Poir. 15. C. foliis cordato-oblongis ſerrulatis ſubtus tomentoſis, pedunculis axillaribus 1floris. *Java.* (Samyda Vent.)

** *Floribus octandris.*

multiflora * 16. C. foliis ovato-lanceolatis acutis integerrimis glabris, ramis ſpinceſcentibus, paniculis axillaribus divaricatis. *Ind. or.*

coriacea Poir. 17. C. foliis obovatis integerrimis coriaceis glabris, pedunculis axillaribus aggregatis 1floris. *Java.* (Samyda Vent.)

ſpinoſa W. 18. C. foliis ovatis ſerratis glabris, ramis ſpinoſis, pedunculis axillaribus 1floris. *Hiſpaniola.* (C. aculeata Jacq. Samyda ſpinoſa L.)

nitida Jacq. 19. C. foliis ovatis crenatis glabris, cymis pedunculatis axillaribus. *Amer. auſtr.*

ramiflora Vahl. 20. C. foliis ellipticis oblongis crenato-ſerratis ſubtus pubeſcentibus, pedunculis axillaribus e tuberculis ramorum. *Ind. occ. Amer. auſtr.* (Ironcana guianenſis Aubl. Athenaea Schreb.)

hirta Sw. 21. C. foliis oblongis utrinque attenuatis ſerratis ſubtus hirtis, pedunculis confertis 1floris. *Ins. occid.*

ovata W. 22. C. foliis ſubrotundo-ovatis acuminatis ſerratis glabris, pedunculis axillaribus multifloris. *Ins. orient.* (Anavinga ovata Lam.)

ilicifolia Poir. 23. C. foliis ovatis angulato-ſpinoſis coriaceis nitidis ſubtus tomentoſis, floribus faſciculatis 6andris. *Hiſpaniola.* (Samyda Vent.)

1668. AUGEA Thunb.

capenſis Thunb. *Afric. auſtr.* Herba ramoſa annua, foliis connatis teretibus obtuſis glabris, pedunculis axillaribus 1floris.

1669. AQUILARIA.

malaccenſis Lam. 1. A. foliis ovatis acuminatis glabris integerrimis venoſis, petiolis hirſutis, floribus axillaribus confertis. *Ind. or. transgang.* (A. ovata Cav.)

chinenſis * 2. A. foliis lanceolatis undulatis nitidis, floribus terminalibus ſolitariis. *China auſtr.* (Ophiſpermum ſinenſe Lour.)

1670. DAÏS.

cotinifolia 1. D. foliis obovato-oblongis, floribus 5fidis. *C. B. S.* (D. laurifolia Jacq.)

octandra 2. D. foliis ovato-lanceolatis venoſis acutis, floribus 4fidis. *Ind. orient.*

diſperma Forſt. 3. D. foliis ovato-lanceolatis eveniis, floribus 4-5fidis. *Inſ. Amicor.*

1671. RHYNCHOTHECA R. et P.

ſpinoſa R. et P. *Peru. Nov. Granat.* Frutex ramoſiſſimus, ramis ſpineſcentibus, foliis obovato-oblongis (interdum ſub-3fidis), floribus terminalibus faſciculatis nutantibus. (Rh. integrifolia et diverſifolia Kunth.)

1672. HETERODENDRON Desf.

oleaefolium Desf. *Nov. Holl.* Frutex foliis alternis oblongo-lanceolatis glaucis, floribus racemoſis axillaribus.

1673. STYLOBASIUM Desf.

spathulatum Desf. *Nov. Holl.?* Frutex foliis ſpathulatis, pedunculis axillaribus 1floris ſuperne racemoſis.

1674. CALPIDIA Thuar.

lanceolata Poir. *Madagascar.* Arbor trunco orgyali, diametri Spedalis, foliis oblongo-lanceolatis, floribus rubentibus paniculato-umbellatis.

1675. DARWINIA Rudg.

faſcicularis Rudg. *Nov. Holl.* Frutex ramoſiſſimus, foliis confertiſſimis lineari-ſubulatis glanduloſo-aſperis, floribus terminalibus ſubcapitatis ſeſſilibus.

1676. HARDWICKIA Roxb.

binata Roxb. *Coromandel.* Arbor foliis binatis medio mucronatis, floribus paniculatis axillaribus terminalibusque flavis.

1677. COPAIFERA.

Jacquini Desf. 1. C. foliis ſub-4jugis alternis ovatis inaequilateris apice obtuſe attenuatis lucidis. *Nov. Granat.* (Copaiva officinalis Jacq.)

guianenſis Desf. 2. C. foliis 4jugis oppoſitis ovato-oblongis aequilateris acuminatis glabris. *Guiana.*

Langsdorffii Desf. 3. C. foliis ſub-4jugis ellipticis utrinque nitidiusculis pellucido-punctatis ciliatis, petiolis pedunculisque pubeſcentibus. *Braſil.*

1678. CRUDIA Schreb.

ſpicata W. 1. Cr. foliis pinnatis, foliolis oblongo-lanceolatis acuminatis. *Guiana.* (Apalatoa ſpicata Aubl.)

aromatica W. 2. Cr. foliis ſimplicibus oblongis. *Guiana.* (Touchiroa aromatica Aubl.)

1679. DIPLOCHLAENA R. Br.

Dampierii Desf. 1. D. foliis ſpathulatis emarginatis ſubtus incanis. *Nov. Holl. occid.*

grandiflora Desf. 2. D. foliis oblongo-ellipticis emarginatis utrinque incanis. *Nov. Holl. occid.*

1680. ADENOSTEMON Perſ.

nitidus Perſ. *Chili.* Arbor procera, foliis oblongo-lanceolatis nitidis, floribus axillaribus albidis, fructibus flavis ſapidis. (Gomortega R. et P. Keulia chilenſis Molin.)

1681. QUERIA.

hiſpanica — *Hiſpania.* Herba annua ſubcaneſcens ramoſa, foliis oppoſitis filiformibus, floribus aggregatis terminalibus.

1682. TERMINALIA.

* *Foliis integerrimis.*

Vernix Lam. — 1. T. foliis lanceolatis acuminatis nitidis, racemis pendulis, fructibus depreſſis venoſo-reticulatis. *Inſ. Molucc.*

Benzoin L. ſuppl. — 2. T. foliis lineari-lanceolatis ſubrepandis ſubtus pubeſcentibus rubro-venoſis, racemis abbreviatis, fructibus hinc gibbis. *Ind. or.* (T. angustifolia Jacq. Croton Benzoë L.)

rhomboidea * — 3. T. foliis lanceolatis acutiusculis glaberrimis coriaceis, racemis axillaribus, fructibus rhomboideis. *Madagascar.* (Mirobolanus [Myrobalanus] Poir.)

procera Roxb. — 4. T. foliis ſpathulato-lanceolatis acutiusculis glabris ſubtus baſi glanduloſis, racemis axillaribus, fructibus oblongis 5gonis. *Inſ. Andaman.*

trifoliata * — 5. T. foliis ternatis lanceolatis obtuſiusculis glabris ſubtus discoloribus, racemis paniculatis laevibus. *Braſil.* Sello.

macroſtemon * — 6. T. foliis oblongo-lanceolatis acuminatis coriaceis utrinque glaberrimis venoſis, paniculae ramis verticillatis pubeſcentibus, ſtaminibus elongatis. *Braſil.* Sello.

lanceolata Mart. — 7. T. foliis faſciculatis ovato-lanceolatis acutiusculis mucronatis ſericeis. *Braſil.*

argentea Mart. — 8. T. foliis oppoſitis ovatis acuminatis ſupra pubeſcentibus ſubtus argenteo-ſericeis. *Braſil.*

fagifolia Mart. — 9. T. foliis faſciculatis ovatis acutiusculis mucronatis ſericeo-villoſis, floribus ſpicato-glomeratis. *Braſil.*

lucida Hofmannsegg. — 10. T. foliis oppoſitis ovato-oblongis acutis coriaceis utrinque glabris baſi eglanduloſis, ſpicis plurimis aggregatis pubeſcentibus. *Braſil.*

firma Mart. — 11. T. foliis faſciculatis obovatis mucronatis coriaceis margine revolutis utrinque glabris reticulatis, ſpicis terminalibus aggregatis villoſis. *Braſil.*

madagascarenſis * — 12. T. foliis ovalibus ſubemarginatis coriaceis, ſpicis laxis axillaribus, fructibus obſolete angulatis. *Madagascar.* (Mirobolanus Fatraea Poir.)

discolor * — 13. T. foliis obovato-oblongis glabris coriaceis ſubtus rufis, paniculae terminalis ramis angulato-compreſſis glabris, floribus 8andris. *Braſil.* Sello.

elliptica W. — 14. T. foliis oblongo-ellipticis ſubtus piloſiuſculis baſi 2glanduloſis, ſpicis terminalibus paniculatis. *Ind. or.*

Bellirica Roxb. — 15. T. foliis obovato-oblongis obtuſis utrinque glabris, petiolis ſupra 2glanduloſis, racemis axillaribus. *Ind. or.* (T. Chebula Retz.)

Chebula Roxb. 16. T. foliis elliptico-oblongis obtusis utrinque glabris margine petiolisque glandulosis, racemis terminalibus aggregatis. *Ind. or.*

intermedia Bert. 17. T. foliis amplis coriaceis obovato-oblongis basi cordatis 2glandulosis acutiusculis utrinque glaberrimis, racemis simplicibus. *Guadalupa.* Bertero.

moluccana Lam. 18. T. foliis membranaceis obovatis obtusis basi eglandulosis utrinque glabris, racemis simplicibus elongatis. *Inf. Molucc. et Societ.* (T. glabrata Forst.)

ciliata * 19. T. foliis obovato-oblongis obtusis basi attenuatis ciliatis utrinque glaberrimis basi eglandulosis, pedunculis racemosis elongatis basi 2glandulosis. *Ind. or.*

** *Foliis subserratis, dentatis.*

subcordata Humb. 20. T. foliis obovatis obtusis subrepandis basi cordatis eglandulosis utrinque glabris, petiolis pubescentibus. *Amer. austr.*

Catappa 21. T. foliis obovato-oblongis acutiusculis obsolete denticulatis basi rotundatis eglandulosis subtus villosiusculis, racemis axillaribus simplicibus. *Ind. or.*

latifolia Sw. 22. T. foliis obovato-oblongis acutis obsolete crenulatis basi attenuatis eglandulosis utrinque glabris, racemis dichotomis villosis. *Ind. occ. America austr.* (T. dichotoma Meyer.)

mauritiana Lam. 23. T. foliis verticillatis confertissimis oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis glabris subcrenatis, racemis axillaribus. *Inf. Mascaren. Guiana?* (Pamea guianensis Aubl.)

villosa * 24. T. foliis oblongis utrinque attenuatis denticulatis subtus villosis, paniculis axillaribus ferrugineo-villosis, floribus 8andris. *Brasil.* Sello.

brasiliensis * 25. T. foliis oblongis membranaceis crenato-glandulosis venosis glabriusculis, floribus fasciculato-racemosis. *Brasil.* Sello.

1683. BUCIDA.

Buceras 1. B. racemis spicatis elongatis, foliis spathulatis glabris. *Jamaica. Cuba.*

capitata Vahl. 2. B. racemis capitatis, foliis spathulatis retusis ciliatis. *Hispaniola. Portorico. Inf. Carib.*

1684. GIMBERNATIA R. et P.

obovata R. et P. 1. G. foliis obovatis acuminatis, racemis spicatis pendulis, fructibus 5alatis. *Peru. Guiana?* (Chuncoa Juss. Poir. Tanibouca guianensis Aubl.?)

oblonga R. et P. 2. G. foliis oblongis, racemis spicatis confertissimis, fructibus 2alatis. *Peru.*

1685. GETONIA Roxb.

floribunda Roxb. *Ind. or. Madagascar.* Arbuscula ſcandens, foliis oppoſitis ovatis acutis glabris, floribus paniculatis. (Calycopteris Lam.)

DIGYNIA.

1686. ROYENA.

lucida 1. R. foliis ovatis nitidis ciliatis venisque ſubtus villoſis. *C. B. S.*

glabra 2. R. foliis oblongo-lanceolatis glabris ciliatis, ramis hirſutis. *C. B. S.*

pallens Thunb. 3. R. foliis ovato-oblongis obtuſis margine revolutis ramisque tuberculatis glabris. *C. B. S.*

pubeſcens W. 4. R. foliis ſpathulato-lanceolatis mucronatis pubeſcentibus, floribus 1gynis, ſtigmatibus 5. *C. B. S.* (R. cuneata Poir., hirſuta Jacq.)

hirſuta 5. R. foliis lanceolatis utrinque attenuatis hirſutis ſubtus rugoſo-venoſis. *C. B. S.*

villoſa 6. R. foliis cordato-oblongis obtuſis ſubtus tomentoſis. *C. B. S.*

anguſtifolia W. 7. R. foliis lineari-lanceolatis ſubtus tomentoſis. *C. B. S.*

1687. TURARIA Molin.

chilenſis Molin. *Chili.* Frutex foliis alternis oblongis integerrimis, floribus terminalibus pedunculatis flavis.

1688. ADRASTEA Cand.

ſalicifolia Cand. *Nov. Holl.* Frutex foliis linearibus calloſo-denticulatis ſubtus ſericeis, floribus ſubſolitariis ſeſſilibus.

1689. RECCHIA Seſſ.

mexicana Seſſ. *Mexico.* Frutex ramoſus foliis oblongis alternis, floribus ſubracemoſis flavis.

1690. HYDRANGEA.

arboreſcens 1. H. cymis nudis, foliis oblongo-ovatis acuminatis ſerratis glabris. *Virginia.* (H. vulgaris Pursh.

cordata Mx. 2. H. cymis ſubradiatis, foliis ſubcordato-ovatis acuminatis groſſe dentatis ſubtus glabris. *Carolina.*

hortenſis Sm. 3. H. cymis radiatis, foliis elliptico-oblongis utrinque attenuatis dentatis glabris. *China. Japon.* (Viburnum virens et ſerratum Thunb. Primula mutabilis Lour. Hortenſia opuloides Lam., ſpecioſa Perſ.)

nivea Mx. 4. H. cymis radiatis, foliis ovatis acuminatis mucronato-dentatis subtus niveo-tomentosis. *Carolina. Louisiana.* (H. radiata Walt., glauca Hortul.)

quercifolia Bartr. 5. H. cymis radiatis thyrsoideo-paniculatis, foliis oblongis sinuato-lobatis dentatis subtus tomentosis. *Georgia. Florida.* (H. radiata Sm.)

1691. CUNONIA.

capensis *C. B. S.* Arbor foliis pinnatis glabris, foliolis lanceolatis coriaceis glabris glanduloso-serratis, floribus fasciculato-racemosis albis.

1692. TIARELLA.

cordifolia 1. T. foliis cordatis acute lobatis mucronato-dentatis hirsutis, scapo racemoso pubescente. *Amer. bor.*

Menziesii Pursh. 2. T. foliis cordato-ovatis acutis sublobatis dentatis, caulinis alternis distantibus, racemo filiformi subspicato, calycibus tubulosis. *Ora Amer. ad Caurum.*

trifoliata 3. T. foliis ternatis, foliolis subrhomboideis serratis pilosis, racemis terminalibus, corymbulis alternis, calycibus campanulatis. *Asia ad Caeciam. Ora Amer. ad Caurum.*

biternata Vent. 4. T. foliis 2ternatis, foliolis cordato-ovatis obliquis inciso-lobatis dentatis, caule folioso, panicula terminali divaricata, floribus subsessilibus. *Carolina austr.*

1693. MITELLA.

diphylla 1. M. caule erecto superne diphyllo, foliis ovatis angulato-dentatis hirsutiusculis, racemo spicato. *Amer. bor.*

cordifolia Lam. 2. M. scapo setaceo nudo, foliis orbiculato-reniformibus subduplicato-crenatis lucidis. *Amer. bor.*

reniformis Lam. 3. M. foliis reniformibus repandis ciliatis, scapo nudo. *Amer. bor.* (M. nuda L.)

prostrata Mx. 4. M. radice repente, caule prostrato, foliis alternis cordato-subrotundis acutiusculis sublobatis. *Amer. bor.*

grandiflora Pursh. 5. M. hirsutissima, foliis cordato-subrotundis obtuse lobatis dentatis, scapo racemoso subfoliato, calycibus campanulatis. *Ora occid. Amer. bor.*

1694. SAXIFRAGA.

**Bergenia* Mönch. Cal. campanulato-lobatus. Capsl. basi coalita, styli subnulli.

crassifolia 1. S. foliis ovalibus basi attenuatis vel subcordatis subdenticulatis glaberrimis coriaceis, paniculae

coarctatae ramis nutantibus. *Sibir.* (Megaſea Haw. Geryonia Schrank. S. cordifolia Haw. var.)

ligulata Wall. 2. S. foliis obovato-ellipticis ſubretuſis ciliatis glabris, petiolis ligulatis, panicula cymoſa patula. *Nepal.* (Megaſea ciliata Haw.)

***Gymnopera* Don. Cal. reflexus. Stamina hypogyna. Styli divaricati, ſtigmatibus glabris.

Geum 3. S. foliis orbiculato-reniformibus dentato-crenatis utrinque piloſiusculis, petiolis elongatis ſcapoque paniculato hirſuto. *Hibernia. Helvetia. Sibir.* (Robertſonia polita, crenata et dentata Haw. var.)

hirſuta 4. S. foliis elliptico-ſubrotundis cartilagineo-crenatis utrinque piloſis, petiolis longiſſimis hirſutis, ſcapo paniculato viſcoſo-villoſo. *Hibernia. Pyren.* (Robertſonia ſphaeroidea Haw. S. hybrida Vill. Sternb. var.)

umbroſa 5. S. foliis obovatis cartilagineo-crenatis glabris in petiolum brevem dilatatum ciliatum decurrentibus, ſcapo paniculato ſuperne glanduloſo. *Hibernia. Luſitania? Pyren.* (S. ſpathularis Brot.?)

punctata 6. S. foliis obovato-oblongis argute profundeque cartilagineo-ſerratis glaberrimis in petiolum longum ciliatum decurrentibus, ſcapo paniculato hirſutiſſimo, ramis paniculae bracteatis. *Hibernia.* (S. ſerrata Ott.)

cuneifolia 7. S. foliis ſubrotundo-obovatis crenatis laevibus in petiolum glabrum attenuatis, caule baſi ſtolonifero, ſcapo paniculato. *Alp. Europ. med.*

ſpicata Don. 8. S. foliis cordato-orbiculatis argute ſerratis venoſis piloſis, petiolis baſi dilatatis, racemo elongato ſpicaeformi. *Ora occid. Amer. bor.* (S. Geum Pursh.)

Nelſoniana Don. 9. S. foliis cordato-orbiculatis ſubpeltatis inciſo-ſerratis, petiolis filiformibus longiſſimis, thyrſo ovato. *Ora occid. Amer. bor.* 60°.

arguta Don. 10. S. foliis ſubreniformibus inciſo-ſerratis glabris, petiolis filiformibus, ſcapo gracili racemoſo. *Ora occid. Amer. bor.*

ſtellaris 11. S. foliis oblongis apice dilatatis dentatis baſi integerrimis ſeſſilibus hirſutiusculis, ſcapo paniculato glanduloſo. *Alp. Europ.* et *Aſiae.* (S. Bellardi All. var. acaulis.)

leucanthemifolia Lapeyr. 12. S. foliis ſpathulatis inaequaliter dentatis hirſutiusculis in petiolum attenuatis, ſcapo dichotomo villoſo, ramis divaricatis 1floris, petalis inaequalibus. *Pyrenaei* et *montes Carolinae.* (S. Cluſii Gouan.)

ſarmentoſa 13. S. ſtolonibus reptantibus, foliis cordato-orbiculatis lobato-crenatis ſubtus rufis utrinque hirſutis, ſcapo paniculato ſubviſcido, petalis inaequalibus, exterioribus maximis. *China. Japon.* (S. chinenſis Lour., ſtoloniſera Jacqu., ligulata Murr. Diptera Borkh. Link.)

crosa Pursh. 14. S. foliis lanceolatis acutis erofo-denticulatis ciliatis glabris, fcapo ftricto villofo paniculato, pedicellis filiformibus. *Virginia. Carolina.*

*** *Leiogyne* Don. Cal. patulus. Stamina calyci inferta. Stigmata glabra.

† *Folia lobata.*

rotundifolia 15. S. foliis reniformi-cordatis lobato-crenatis longe petiolatis hirfutis, panicula foliata, petalis acutis. *Alp. Europ.* et *Afiae.* (S. repanda Sternb.)

granulata 16. S. foliis inferioribus reniformibus incifo-lobatis crenatis petiolatis hirfutis, caule paniculato, laciniis calycinis obtufis, petalis fpathulatis, radice granulata. *Europ.*

bulbifera 17. S. foliis radicalibus cordato-reniformibus crenatis, caulinis feffilibus ovatis dentatis cauleque multifloro hirfutis, axillis foliorum fubbulbiferis, laciniis calycinis acutis. *Italia. Hifpania.* (S. veronicaefolia Bertol. Rufli Presl.)

cernua 18. S. foliis radicalibus fuborbiculatis incifo-lobatis, caulinis incifis glabris, caule fimpliciffimo uni-paucifloro, laciniis calycinis obtufis, petalis obovatis unguiculatis. *Alpes Helvet. Arverniae. Pyren. Lappon. Scotia.* (S. vivipara Veft., penduliflora Bâtard. Cand.)

fibirica 19. S. foliis omnibus petiolatis cordato-reniformibus palmatis hirfutis, caule gracili ramofo, pedunculis capillaribus, petalis ovatis. *Afia.* (S. grandiflora Sternb.? granulata et Cymbalaria M. B.?)

nudicaulis Don. 20. S. foliis radicalibus petiolatis reniformibus palmatis glabris, fcapo paniculato fuperne glandulofo, laciniis calycinis acutis. *Ora occid. Amer. bor.*

bracteata Don. 21. S. foliis radicalibus caulinisque longe petiolatis reniformibus incifo-lobatis glabriusculis, petiolis villofis, floribus congefto-corymbofis bracteatis. *Sibir. orient.*

ricularis 22. S. caule debili fimpliciffimo bafi radicante, foliis reniformibus palmatis glabris, fummis fpathulatis indivifis, floribus fubternis bracteatis. *Alp. dinar. Scotia. Norvegia. Islandia. Sibiria. Amer. bor.*

nutans Don. 23. S. caule erecto pubefcente 1folio, foliis petiolatis reniformibus incifo-dentatis hirfutis, racemo nutante paucifloro, laciniis calycinis lanceolatis acutis. *Inf. Aleut.*

orientalis Jacqu. 24. S. caule erecto foliofo, foliis petiolatis cordato-fubrotundis 5lobis glabris reticulato-venofis, pedunculis 1floris, laciniis calycinis acutis. *Afia minor* et *media.* (S. reticulata Sternb.)

Cymbalaria 25. S. caule procumbente flaccido, foliis inferioribus longiffime petiolatis reniformibus obtufe 5lobis, fummis 3lobis integrisque, laciniis calycinis obtufis. *Graecia. Afia minor* et *media. Carinthia?* (S. hederacea M. B., paradoxa Sternb. var.?)

mollis Sm. 26. S. caule procumbente, foliis petiolatis reniformibus 5lobis carnosis glabris ciliatis, summis indivisis, pedunculis pubescentibus, petalis obovatis nervosis calycem superantibus. *Mons Atrata* Tournef. *Montes Siciliae.* (S. parviflora Bivon.)

arachnoidea Sternb. 27. S. caule debili prostrato ramosissimo, ramis petiolisque villosissimis, foliis cuneato-lobatis pilosis, pedunculis subdichotomis filiformibus, petalis calycem subaequantibus. *Alp. rhaetic.*

hederacea 28. S. caule filiformi flaccido, foliis subovatis 5lobis glaberrimis, summis ovatis acutis, pedunculis 1floris. *Creta. Cyprus.*

†† *Folia indivisa.*

Hirculus 29. S. foliis spathulato-linearibus glabris, ramis 1floris foliosis pubescentibus, petalis oblongis nervosis calycem multo superantibus. *Europ.* et *Asiae boreal. paludes.*

spinulosa Adam. 30. S. caule nudiusculo multifloro, foliis imbricatis erectis lineari-lanceolatis ciliatis spinulosis. *Asia ad lacum Baical.*

myosotifolia Pall. 31. S. caule erecto 3floro hispido, foliis confertis patentibus ovatis acutis hispidis, laciniis calycinis late ovatis. *Sibir.*

flagellaris Sternb. 32. S. caule foliato sub-1floro, farmentis capillaribus elongatis, foliis confertis spathulatis arillatis cartilagineo-ciliatis, petalis obovatis calycem longe superantibus. *Regio arctica Asiae* et *Americae Caucas.* (S. setigera Pursh. aspera M. B., prorepens Fisch. cuscutaeformis Loddig.)

aizoides 33. S. foliis lineari-lanceolatis acutis spinuloso-ciliatis glabris, floribus corymbosis, petalis oblongis calycem subsuperantibus. *Alp. Europ.* (S. autumnalis L., atrorubens Bertol.)

laevis M. B. 34. S. foliis oblongis acutiusculis glaucescentibus margine cartilagineis, capitulo paucifloro. *Caucas.*

bronchialis 35. S. caule rigido suffruticoso, foliis confertis triquetro-subulatis glabris spinuloso-ciliatis, floribus paniculatis parvis. *Regio arctica Asiae* et *Americae bor.*

tenella Wulff. 36. S. foliis lineari-subulatis pungentibus ciliatis, caule gracili oligophyllo paucifloro, laciniis calycinis lineari-lanceolatis cuspidatis. *Alp. carn. et jul.* (S. arenarioides Brignol. nitida et Vandelii Sternb.?)

brachypoda Wall. 37. S. foliis linearibus pungentibus 3nerviis margine spinulosis, flore terminali solitario. *Emodi montes.*

juniperina Adam. 38. S. caule suffruticoso caespitoso, foliis imbricatis lineari-subulatis rigidis margine scabris patentibus, floribus racemoso-congestis. *Caucas.*

aspera 39. S. caule basi procumbente, foliis alternis linearilanceolatis spinuloso-ciliatis pallidis, ramis subs3floris, petalis ramoso-nervosis. *Alp. rhaetic. noric. pennin. Pyren.*

hiſpidula Don. 40. S. caule filiformi hiſpido, foliis ovatis mucronatis ſtrigoſis utrinque 1dentatis, flore terminali ſolitario, calyce ſetoſo-ariſtato. *Emodi montes.*

bryoides 41. S. caulibus caeſpitoſis globoſis 1floris, foliis imbricatis erectis lineari-ſubulatis ciliatis glauceſcentibus, laciniis calycinis obtuſis. *Alp. noric. carn. dinar. pennin. Pyren.*

cherlerioides Don. 42. S. caulibus ſterilibus caeſpitoſis globoſis, caule florifero filiformi multifloro, foliis denſe imbricatis ſpathulatis mucronatis ciliatis, laciniis calycinis obtuſis. *Camtſchatca.*

**** *Micranthes* Don. Cal. patens. Petala parva ſeſſilia. Filamenta breviſſima. Stigmata glabra.

hieracifolia Kit. 43. S. foliis oblongis utrinque attenuatis ſubdenticulatis ciliatis glabris, petiolis dilatatis, ſcapo ſimpliciſſimo glanduloſo-piloſo, floribus racemoſo-ſpicatis bracteatis, petalis calyce brevioribus. *Carpathi montes. Alp. dinar.*

penſylvanica 44. S. foliis lanceolatis ſeſſilibus ſinuato-denticulatis utrinque piloſiſſimis, ſcapo elongato villoſo-viſcoſo, floribus corymboſis, petalis linearibus calyce longioribus. *Amer. bor.*

ſemipubeſcens Sweet. 45. S. foliis ſeſſilibus ovali-oblongis glabris denticulatis ſupra nitidis, ſcapo ramoſo glanduloſo-piloſo, floribus corymboſo-capitatis, petalis calycem aequantibus. *Amer. bor.* (S. marilandica Hortul., paluſtris Link.)

virginienſis Mx. 46. S. foliis ovatis acutiusculis dentatis petiolatis utrinque piloſis, ſcapo paniculato pubeſcente, petalis calyce longioribus. *Amer. bor.* (S. vernalis W., elongata Sternb.)

melaleuca Fiſch. 47. S. foliis ovato-ſubrotundis acutiusculis utrinque 2dentatis in petiolum longum attenuatis ſcapoque paucifloro glaberrimis, laciniis calycinis ovatis acutis, petalis unguiculatis. *Montes Sibir.*

nivalis 48. S. foliis obovatis crenatis ſubtus villoſis in petiolum attenuatis, ſcapo ſimpliciſſimo villoſo-viſcoſo, floribus congeſtis breviſſime pedicellatis, petalis minimis germine colorato brevioribus. *Sudet. Scotia. Lappon. Island. Spitzberg. Sibir.* (S. longiſcapa Don.)

dacurica W. 49. S. foliis rhombeis dentatis venoſis glabris in petiolum longum attenuatis, ſcapo ſubpaniculato glutinoſo, petalis acutis. *Alp. Dauuriae.* (S. punctata Pall.)

pyrolifolia Don. 50. S. foliis ovalibus crenatis utrinque glabris ſupra nitidis coriaceis, ſcapo glanduloſo, floribus ſubthyrſoideis, petalis linearibus. *Camtſchatca. Inſ. Aleut.*

***** *Saxifragae verae.* Stigmata barbata. Capſula cum calyce arcte connata.

† *Foliis indiviſis ſubſeſſibilibus.*

Cotyledon 51. S. foliis radicalibus roſaceo-congeſtis ſpathulatis cartilagineo-ſerrulatis, caule folioſo paniculato multifloro glanduloſo-piloſo, petalis amplis ſpathulatis. *Alp. helvet. pyren. Regio arctica Europ.* (S. pyramidalis Lapeyr. Sternb.

longifolia Lapeyr. 52. S. foliis radicalibus roſaceo-congeſtis linearilingulatis cartilagineo-ſerrulatis cruſtaceo-poroſis, caule folioſo paniculato glanduloſo, petalis ovalibus. *Alp. pyren. cott. pennin. nor. rhaet. dinar.* (S. lingulata Bellard., cruſtata Veſt.)

Aizoon 53. S. foliis radicalibus roſaceo-congeſtis ſpathulato-lingulatis cartilagineo-ſerrulatis, caule folioſo corymboſo, calycibus glaberrimis. *Alp. Europ. med.*

recta Lapeyr. 54. S. foliis radicalibus roſaceo-congeſtis lanceolato-lingulatis glaucis cartilagineo-ſerratis, caule foliato racemoſo glanduloſo, petalis haud maculatis. *Alp. rhaet. Pyren. Caucaſ.* (S. intacta et cartilaginea W.)

mutata 55. S. foliis omnibus ſpathulatis apice obtuſiſſimis cartilagineo-pellucidis integerrimis lateribus ciliato-villoſis, floribus pyramidato-racemoſis fuſco-glanduloſis, petalis linearibus acutis. *Alp. helvet. noric. dinar. pyren.*

marginata Sternb. 56. S. foliis obovato-lingulatis margine cartilagineo integerrimis glabris, floribus ſubcymoſis, petalis calyce duplo majoribus. *Calabria.*

Merkii Fiſch. 57. S. foliis radicalibus ovatis integerrimis ciliatis glabris, caule paucifloro, petalis unguiculatis calyce duplo longioribus. *Sibiria.*

media Gouan. 58. S. foliis radicalibus roſaceo-congeſtis lanceolatis glaucis rigidis integerrimis margine cartilagineis ſupra punctatis, caule ſubfoliato ferrugineo-villoſo, petalis obtuſis calyce brevioribus. *Pyren. Apennin. Aſia minor.* (S. calyciflora Lapeyr., caeſia L., porophylla Bertol., ambigua Cand.)

Lapeyrouſii Don. 59. S. foliis radicalibus roſaceo-congeſtis lanceolatis integerrimis ſupra punctatis, caule folioſo glanduloſo-piloſo, floribus racemoſis, petalis calycem excedentibus. *Pyren. Alp. dinar.* Baumgarten. (S. luteo-purpurea Lapeyr.)

aretioides Lapeyr. 60. S. caulibus caeſpitoſis globoſis, foliis imbricatis erectis linearibus mucronatis cartilagineo-marginatis glaucis, caule glutinoſo tomentoſo, petalis obovatis crenatis. *Pyren.*

Burſeriana 61. S. foliis triquetro-ſubulatis rigidis patulis laevibus glaucis, caule pubeſcente ſub-1floro oligophyllo, petalis nervoſis oblongis. *Alp. noric. lepont. dinar. Apennin. Pyren.*

retuſa Gouan. 62. S. caule repente caeſpitoſo, foliis imbricatis ovato-3gonis acutis apice recurvatis glaberrimis, pedunculis erectis bracteatis villoſis, petalis lan-

ceolatis, ſtylis elongatis. *Alp. cott. pennin. Pyren.* (S. purpurea All., oppoſitifolia γ. W.)

oppoſitifolia 63. S. caule repente caeſpitoſo, ramis erectis unifloris, foliis confertis ſubrotundis obtuſis ciliatis, petalis obovatis genitalia ſuperantibus. *Alp. omnes Europ.* et *Amer. bor.* (S. coerulea Perſ.)

biflora All. 64. S. caulibus erectiusculis ſub-3floris, foliis obovatis oppoſitis remotiusculis, ſtylis ſtamina ſuperantibus. *Alp. cott. pennin. Pyren.* (S. oppoſitifolia β. W.)

caeſia 65. S. caulibus caeſpitoſis, foliis aggregatis lineari-oblongis rigidis cretaceo-glaucis poroſis recurvis, floribus racemoſis pubeſcentibus. *Alp. carn. noric. dinar. Pyren.*

diapenſioides Bellard. 66. S. caulibus caeſpitoſis, foliis imbricatis linearibus ſtrictis carinatis cretaceo-glaucis, ramis erectis paucifloris glanduloſo-piloſis, petalis obovatis elongatis. *Alp. grai. pennin.* (S. valdenſis Cand.? S. muſcoides All. icon.)

compacta Sternb. 67. S. foliis radicalibus confertiſſimis lingulatis leproſis integerrimis, caulinis ſub-3dentatis, caule hirſuto paniculato. *Helvet.*

fimbriata Don. 68. S. caulibus caeſpitoſis globoſis, foliis obovatis 3nerviis pellucido-punctatis margine ſcarioſo fimbriatis, pedunculo ſolitario 1floro. *Ora occid. Amer. bor.* (S. Eſcholzii Sternb.)

ſerpyllifolia Purſh. 69. S. ſurculis repentibus, foliis confertis ovatis obtuſis petiolatis ſquarroſis integerrimis glabris, ramis erectis 1floris, petalis orbiculatis. *Ora occid. Amer. bor.*

parnaſſifolia Wall. 70. S. caule erecto folioſo 3floro, foliis cordatis obtuſis amplexicaulibus glanduloſo-ciliatis ſubtus nervoſis, petalis obovatis 5nerviis. *Emodi montes.*

amplexifolia Sternb. 71. S. foliis obovato-oblongis ſerratis glabris, radicalibus in petiolum latum decurrentibus, caulinis amplexicaulibus, floribus paniculatis minutis, petalis lanceolatis calycem excedentibus. *Inſ. Aleut.*

pauciflora Sternb. 72. S. foliis radicalibus ſubrotundis dentatis in petiolum decurrentibus glabris, ſcapo piloſo paucifloro. *Sibir. Camtſchatca.*

gracilis Steph. 73. S. foliis radicalibus cordato-orbiculatis profunde dentatis, ſcapo ſubnudo racemoſo, petalis ſublanceolatis, calycibus fructiferis reflexis. *Sibir.*

neglecta Sternb. 74. S. foliis radicalibus cuneatis longe petiolatis apice profunde dentatis glabris, ſcapo ramoſo multifloro, petalis calycem ſubaequantibus. *Sibir.*

androſacea 75. S. foliis ſpathulato-lanceolatis nervoſis piloſis ciliatis 3dentatis, caule oligophyllo ſub-2floro. laciniis calycinis obtuſis. *Alp. helvet. rhaet. nor. dinar.* (S. depreſſa Sternb.)

magellanica Commerſ. 76. S. foliis roſaceo-congeſtis obovatis viſcoſo-pubeſcentibus tridentatis, caule 1floro. *Magellan.* (Excl. ſyn. Poir.)

ſpathulata Desf. 77. S. foliis confertis ſpathulatis obtuſis ciliatis in petiolum decurrentibus, pedunculis 1floris, petalis obovatis. *Atlas.*

ſedoides 78. S. caulibus caeſpitoſis erectiusculis, foliis lineari-lanceolatis acutis patulis ciliatis, pedunculis 1floris elongatis, petalis linearibus calycem aequantibus. *Alp. Europ. med.* (S. Hohenwarthii et Seguierii Sternb., trichoides Scop.)

planifolia Lapeyr. 79. S. caulibus caeſpitoſis, foliis imbricatis obovato-oblongis obtuſis glanduloſo-piloſis, petalis obovatis calycem ſuperantibus. *Alp. cott. pennin. grai. Pyren.* (S. tenera Suter.?)

†† *Foliis 3partitis.*

aphylla Sternb. 80. S. foliis cuneatis 3fidis integrisque glabris in petiolum decurrentibus, pedunculis elongatis 1floris, petalis linearibus calycem aequantibus. *Alp. carn. noric.*

muſcoides Wulff. 81. S. foliis cuneatis 3fidis integrisque linearibus obtuſiusculis glabris, caule paucifloro, petalis linearibus calycem aequantibus. *Alp. Europ.* (S. pygmaea Haw. Don., moſchata Engl. bot. atropurpurea Sternb., caeſpitoſa Hudſ., pyrenaica Vill.)

tricuſpidata Rottb. 82. S. foliis cuneatis 3cuſpidatis ciliatis confertis erectis, caule aſcendente foliato racemoſo, petalis lanceolatis calycem multo ſuperantibus. *Groenlandia. Terra nova.*

Chamiſſoi Sternb. 83. S. foliis radicalibus cuneatis cuſpidato-3fidis ciliatis, caulinis confertis lineari-lanceolatis integerrimis, caule aſcendente paucifloro, floribus minutis. *Inſ. Aleut.*

Pavonii Don. 84. S. foliis 3partitis acutis nervoſis, petiolis dilatatis ſubtus coſtatis, caule oligophyllo ſub-3floro glanduloſo-pubeſcente, laciniis calycinis linear.-lanceolatis acutis, petalis obovatis. *Alp. Peruv.*

andicola Don. 85. S. villoſiſſima denſiſſime caeſpitoſa, foliis radicalibus 3fidis acutis ſubtus 3nerviis, petiolis dilatatis, foliis ſuperioribus integris lanceolatis, floribus corymboſis, laciniis calycinis acutis, petalis obovatis. *Alp. Peruv.*

obtuſiſida Don. 86. S. ſurculis lignoſis, foliis 3partitis linearibus obtuſiſſimis glabris rigidis petiolatis, caule ſub-5floro ſuperne pubeſcente, laciniis calycinis obtuſis, petalis obovatis. *Hiſpan.*

ciliaris Lapeyr. 87. S. caule caeſpitoſo, foliis ſparſis ciliatis, infimis ſpathulatis papilloſis, ſuperioribus cuneatis 3lobis, ſcapo ſubnudo, floribus capitatis, petalis obovatis calyce duplo longioribus. *Pyren.*

Schraderi Sternb. 88. S. caule folioſo paniculato piloſo, foliis longe petiolatis 3partitis, lobis lateralibus 2fidis linearibus, medio cuneato 3dentato, petalis calycem excedentibus. *Patria?*

ceratophylla Dryand. 89. S. ſurculis lignoſis rigidiſſimis glaberrimis, foliis ſub-3partitis carnoſis, laciniis anguſtiſſimis recurvo-mucronatis, caule glutinoſo paniculato, laciniis calycis viſcoſi recurvo-mucronatis, petalis oblongis obtuſis. *Hiſpania.* (S. 3furcata Schrad.)

moſchata Wulff. 90. S. pubeſcens caeſpitoſa, foliis confertis 3fidis baſi attenuatis, laciniis linearibus acutiuscul. cau-

caule erecto ſubcorymboſo, petalis lineari-oblongis calycem ſubſuperantibus. *Alp. carn. nor. rhaet. helvet. Pyren.* (S. caeſpitoſa Scop. exarata All., muſcoides et flaveſcens Sternb.)

tridactylites 91. S. radice annua, caule ramoſo glanduloſo-piloſo, foliis radicalibus ſpathulatis indiviſis, ſuperioribus 3fidis cuneatis, calycibus urceolatis petala ſubaequantibus. *Europ.*

††† *Foliis radicalibus 5fidis, ſuperioribus 3partitis.*

controverſa Sternb. 92. S. radice perenni, caule ſtricto ſubramoſo, foliis omnibus cuneiformibus ſeſſilibus glanduloſo-pubeſcentibus, infimis 5-ſuperioribus 3fidis, petalis nervoſis calycem longe ſuperantibus. *Alp. Europ.* (S. aſcendens L. petraea Gunn., hypnoides Scop.?)

laete-virens Don. 93. S. caeſpitoſa, foliis radicalibus 5-, reliquis omnibus 3partitis, laciniis linearibus acutis apice recurvis, ſummis indiviſis linearibus, caule glabro ſub-3floro, petalis ſpathulatis emarginatis. *Scotia. Hibernia.* (S. laevis Donn. affinis Don.)

leptophylla Perſ. 94. S. caeſpitoſa, ſurculis diffuſis procumbentibus, foliis radicalibus 5-reliquis 3partitis, laciniis lineari-lanceolatis cuſpidatis divaricatis, caule glabriusculo multifloro, petalis ſpathulatis. *Helvetia. Cambria. Scotia.* (S. denudata Don.)

elongella Sm. 95. S. caule aſcendente breviusculo, foliis radicalibus paucis 5fidis, plerisque 3partitis baſi attenuatis ciliatis, ſummis indiviſis confertis, laciniis ovatis mucronatis, pedunculis 1floris elongatis aphyllis rectis. *Scotia.*

hypnoides 96. S. caeſpitoſa procumbens gemmifera, foliis inferioribus 5-3partitis, ſuperioribus 3partitis vel indiviſis, laciniis linearibus cuſpidatis ciliatis, caule paucifloro ſuperne pubeſcente, laciniis calycinis cuſpidatis. *Europ. omnis.* (S. condenſata et ſponhemica C. C. Gmel. varr.)

globulifera Desf. 97. S. caeſpitoſa gemmifera, foliis inferioribus 5-3partitis, laciniis lanceolatis ariſtatis, petiolis ciliatis, floribus paniculatis, laciniis calycinis obtuſis. *Atlas.*

petraea 98. S. caule erecto ramoſo glanduloſo-piloſo, foliis omnibus nervoſis hirſutiusculis apice dilatatis, lobis late ovatis acutiusculis, radicalibus petiolatis 5lobo-palmatis, ſuperioribus 3fidis ſeu indiviſis, pedunculis 1floris viſcidis, laciniis calycinis linearibus acutis, petalis obovatis ſubemarginatis. *Alp. rhaet. lepont. carn.* (S. rupeſtris W., Ponae Sternb.)

exarata Vill. 99. S. caule erecto viſcoſo-pubeſcente, foliis inferioribus 5-ſuperioribus 3partitis, laciniis linearibus obtuſis ſupra ſulcatis, caule multifloro, laciniis calycinis obtuſis. *Pyrenaei. Delphinat. Alp. cott. grai. Caucaſ. Terra Nova.* (S. nervoſa, mixta, intricata et 5dactylis Lapeyr., hypnoides All., pubeſcens Poir., caeſpitoſa Vill., pulchella Don.?)

Bonplandii Don. 100. S. caule erecto ramoso folioso glanduloso-piloso, foliis 5fidis 3fidisque, laciniis linearibus obtusis, floribus subsessilibus aggregatis, laciniis calycinis lanceolatis. *Alp. peruv.* (S. peruviana Bonpl. in Sternb., andicola Kunth.)

stellata Don. 101. S. caule abbreviato caespitoso glanduloso-pubescente 2floro, foliis dense imbricatis appressis 5-3fidis, laciniis linearibus obtusis carnosis, laciniis calycinis ovatis acutis. *Alp. peruv.*

platypetala Sm. 102. S. caule ascendente villoso, foliis 5-3partitis, laciniis linearibus patentibus mucronatis, pedunculis elongatis subcorymbosis foliatis, petalis amplis suborbiculatis. *Cambria. Scotia.*

caespitosa 103. S. villosissima, foliis radicalibus aggregatis, superioribus sessilibus cuneatis 5-3fidis, laciniis foliorum calycisque oblongis obtusiusculis, caule paucifloro, petalis obovatis. *Europ.* (S. grönlandica L., decipiens Ehrh., petraea Roth., palmata Sm., hirta Donn. Sm., villosa W.)

latisida Don. 104. S. glaberrima, caule erecto multifloro, foliis omnibus late cuneatis 5-3fidis, laciniis ovato-lanceolatis acutis, pedunculis sub-2floris, calycibus glabris, petalis spathulatis. *Hispania.*

incurvifolia Don. 105. S. glabriuscula dein villosa, foliis radicalibus 5- superioribus 3fidis, laciniis lanceolatis obtusis incurvis, caule sub-3floro, calycibus glanduloso-pilosis acutis, petalis subrotundis emarginatis. *Hibernia. Norvegia?* (S. caespitosa fl. dan. 1388.?)

Sternbergii W. 106. S. glabra, foliis radicalibus palmatis 5-superioribus 3partitis, laciniis ovatis acutis, caule subcorymboso superne glanduloso-piloso, laciniis calycinis ovatis mucronatis, petalis obovatis. *Francomia.* (S. palmata Panz., 3dentata Don.)

†††† *Foliis omnibus 5fidis s. multifidis.*

exilis Steph. 107. S. foliis radicalibus palmato-5lobis, caulinis bracteiformibus integerrimis, caule filiformi paucifloro, petalis calyce triplo longioribus. *Sibir.*

cuneata W. 108. S. glabra, foliis inferioribus longe petiolatis subrotundo-cuneatis 5lobis, lobis ovatis acutiusculis, summis linearibus integerrimis, caule paniculato, petalis oblongo-linearibus. *Hispania.* (S. cuneifolia Cav.)

aizoides 109. S. villoso-viscosa, foliis omnibus longe petiolatis 5partitis, laciniis lanceolatis divaricatis recurvo-mucronatis ciliatis, caule ramoso, petalis obovatis. *Alp. Europ. austr.*

pedatifida Ehrh. 110. S. villoso-glutinosa, foliis radicalibus longe petiolatis 3fido-pedatis, laciniis linear-lanceolatis sub-3fidis, panicula fastigiata, laciniis calycinis mucronatis, petalis spathulato-linearibus. *Helvet. Pyren. Scotia. Hispania.* (S. ladanifera Sternb., dichotoma W. Sternb. varr.)

geranioides 111. S. piloso-glutinosa, foliis inferioribus longe petiolatis 3-5partito-pedatis, laciniis cuneatis in-

ciſis obtuſiusculis, floribus paniculatis, petalis oblongis calycem obtuſiusculum ſuperantibus. *Pyren.* (S. 5fida Lam.)

irrigua Fiſch. 112. S. piloſiſſima flaccida, foliis radicalibus longe petiolatis 3partitis cucullatis, laciniis bis 3partitis nervoſis lanceolatis obtuſis, caulinis palmatis ſeſſilibus, floribus paniculatis, petalis ſpathulato-linearibus calyces obtuſos longe ſuperantibus. *Tauria. Sibir.* (S. aquatica M. B. petraea Pall.)

aquatica Lapeyr. 113. S. glanduloſo-pubeſcens, foliis 3-5partitis in petiolum attenuatis, laciniis cuneatis acutiusculis multifido-inciſis, floribus paniculatis, petalis obovatis ſtriatis calycem ſubſuperantibus. *Pyren.* (S. petraea Gouan., aſcendens Vahl.)

pedemontana All. 114. S. glutinoſo-piloſa, foliis aggregatis cuneatis 5-3fidis, laciniis ſub-trifidis lanceolatis ſulcatis, floribus corymboſis, laciniis calycinis linearibus elongatis. *Alp. grai. carn. dinar.* (S. cymoſa Kit., heterophylla Sternb. Allionii Baumgart.)

maderenſis Don. 115. S. glanduloſo-piloſa ſuffruticoſa, foliis confertis longe petiolatis cuneiformibus palmatis inaequaliter inciſis, laciniis foliorum calycisqua ovatis acutis, caule paucifloro. *Madera.*

Stephaniana Sternb. 116. S. foliis petiolatis palmato-multilobis, caule folioſo piloſo, petalis calycem ſuperantibus. *Sibir.*

† *uniflora* Sternb. 117. S. foliis ſub-7fidis cuneatis, lobis obtuſis, caule folioſo unifloro, petalis calycem ſuperantibus. *Suecia.*

1695. GYPSOPHILA.

* *Floribus ſparſis.*

† *grandiflora* Poir. 1. G. caule tereti glabro, foliis lineari-ſubulatis ſubhirſutis, inferioribus faſciculatis, panicula pauciflora, petalis emarginatis. *Patria?*

Vaccaria Sm. 2. G. caule tereti glabro, foliis ovato-lanceolatis connatis, floribus corymboſis, calycibus pyramidatis laevibus, petalis emarginatis eroſis. *Europ. med. et auſtr. Ind. or.* (Saponaria L., S. perfoliata Roxb. W.)

elegans M. B. 3. G. caule paniculato, ramis dichotomis ſubdivaricatis foliisque lanceolatis ſubcarnoſis glabris, pedicellis filiformibus, petalis emarginatis calyce duplo longioribus, radice annua. *Caucaſ.*

viſcoſa Murr. 4. G. caule dichotomo, ramis medio viſcoſis, foliis cordato-lanceolatis amplexicaulibus laevibus, petalis retuſis calyce obtuſo longioribus, radice annua. *Aſia minor.*

dichotoma Beſſ. 5. G. caule dichotomo, ramis compreſſis paniculato-faſtigiatis, foliis linearibus carinatis connatis, petalis oblongis patentibus calyce obtuſiusculo duplo longioribus, ſtylis ſtamina aequantibus. *Galicia. Sibiria.* (G. dubia W. ſuppl.)

altiſſima 6. G. caule dichotomo, ramis patentibus diffuſis viſcoſis, foliis oblongo-lanceolatis nervoſis amplexicaulibus, petalis exiguis ſtamina aequantibus. *Sibir.*

ſabuloſa Stev. 7. G. caule dichotomo baſi pubeſcente, ramis paniculae viſcoſis. petalis oblongis calyces acutos multo ſuperantibus, foliis lanceolatis amplexicaulibus 3nerviis villoſiusculis. *Tauria. Caucaſ.* (G. perfoliata M. B.)

perfoliata 8. G. caule laevi paniculato, paniculae ramis umbellatis, foliis oblongo-lanceolatis nervoſis, petalis retuſis calyces ſuperantibus. *Aſia minor.*

acutifolia Fiſch. 9. G. caule paniculato, panicula trichotoma villoſo-viſcoſa, foliis lineari-lanceolatis acuminatis ſub-3nerviis, petalis emarginatis calycem ſtaminaque longe ſuperantibus. *Caucaſ.*

glauca Stev. 10. G. caule diffuſo paniculato, ramis divaricatis pubeſcentibus viſcoſis, foliis lineari-lanceolatis ſubcarnoſis obtuſis glaucis, petalis ſpathulatis integris. *Caucaſ. Armenia. Aſia minor.* (G. repens M. B., Stevenii Fiſch., armerioides Ser.)

repens 11. G. radice repente, caule erecto paniculato, pedunculis 2floris, petalis emarginatis ſtamina ſuperantibus, foliis lineari-lanceolatis glaucis ſecundis. *Europ. med. auſtr. Sibir.* (G. rigida L.)

paniculata 12. G. caule erecto ramoſo, ramis paniculae divaricatis filiformibus pubeſcentibus 1floris, floribus dioecis exiguis, calycibus obtuſiusculis, petalis revolutis, foliis linearibus margine villoſiusculis. *Sicil. Sibir.*

aſcendens Jacqu. 13. G. caule aſcendente paniculato, pedunculis filiformibus laevibus divaricatis, calycibus obtuſiusculis petala ſtaminaque aequantibus, foliis lanceolato-linearibus. *Patria?*

proſtrata 14. G. caulibus diffuſis, panicula trichotoma brachiata, ſtylis petala obtuſa longe excedentibus, foliis lanceolatis laevibus. *Aſia med.* (G. theſifolia Ser.)

Rokeika Delil. 15. G. caule dichotomo ramoſiſſimo, ramis divaricatis filiformibus glabris 1floris, petalis ſubtus colorato-ſtriatis genitalia aequantibus, foliis radicalibus ovatis ſuperioribus linearibus abbreviatis. *Aegypt.*

cretica Sm. 16. G. caule ramoſo dichotomo villoſiusculo, foliis lineari-ſubulatis glabris patentibus, pedunculis 1floris ſtrictis, petalis lanceolatis calycem excedentibus. *Creta.* (Saponaria L.)

illyrica Sm. 17. G. caule ſtricto ramoſo pubeſcente, foliis linearibus acutis erectis, calycibus viſcoſo-villoſiusculis, petalis ſpathulatis baſi punctatis. *Dalmatia. Sicilia. Inſ. maris aegei.* (Saponaria L.)

ochroleuca Sm. 18. G. caule dichotomo, ramis divaricatis, foliis lineari-ſubulatis flaccidis, petalis ſpathulatis baſi punctatis. *Attica.*

thymifolia Sm. 19. G. caule diffuſo ſubdichotomo, foliis ſpathulatis utrinque tomentoſis, petalis obovatis. *Parnaſſus.*

compreſſa Desf. 20. G. caule erecto, ramis compreſſis glabris, foliis lineari-lanceolatis rigidulis, calycibus viſcoſo-pubeſcentibus, petalis ſpathulatis. *Afric. bor.*

graminea Sm. 21. G. caule nudiusculo paniculato paucifloro, calycibus pubeſcentibus, petalis emarginatis, foliis radicalibus aggregatis linearibus margine ſpinuloſo-ſcabris. *Peloponneſ.*

tenuifolia M.B. 22. G. caule gracili paniculato, foliis radicalibus linearibus aggregatis, caulinis ſubulatis, petalis obovatis emarginatis genitalia calycemque duplo ſuperantibus. *Caucaſ.*

muralis 23. G. caule dichotomo paniculato, pedunculis 1floris capillaribus, petalis crenatis, foliis linearibus ſubulatis abbreviatis. *Europ.* (G. ſerotina Heyn.)

Saxifraga 24. G. caule ramoſiſſimo, ramis angulatis 1floris, calycibus baſi ſquamatis, foliis linearibus ſtrictis. *Europ. med.* et *auſtr.* (Dianthus ſaxifragus L. ſp. 1. filiformis Lam. G. multicaulis Poir.)

** *Floribus faſciculatis, capitatis.*

faſtigiata 25. G. caulibus caeſpitoſis ſtrictis, foliis linearibus obtuſis glabris ſubſecundis, pedunculis corymboſis viſcoſo-pubeſcentibus, floribus aggregatis, genitalibus exſertis. *Germania med. Boruſſ. Suecia. Hungar. Transſylvan. Sibir.* (G. arenaria Kit. var.)

collina Stev. 26. G. caule ramoſo, foliis linearibus acutis ſcabriusculis, pedunculis corymboſis laevibus, floribus aggregatis, calycibus obtuſiusculis, ſtaminibus exſertis. *Podolia. Beſſarabia.*

Struthium 27. G. caule baſi ſuffruticoſo ſimpliciusculo ſcabro, foliis linearibus acutis ſemiteretibus ſubfaſciculatis, floribus faſciculatis, ſtaminibus corolla brevioribus. *Hiſpania. Tauria.* (G. capitata M. B.?)

capitata Pall. 28. G. caule baſi ſuffruticoſo ramoſiſſimo, ramis dichotomis ſcabris compreſſo-angulatis, floribus capitatis involucratis, ſtaminibus exſertis, foliis lanceolatis glabris. *Aſia med.*

glomerata Pall. 29. G. caule herbaceo ſtricto ſimplici, foliis linearibus acutis carinatis ſcabris elongatis, floribus capitatis, bracteis ſcarioſis. *Tauria. Caucaſ.*

dianthoides Sm. 30. G. caule baſi ſuffruticoſo ſimplici ſtricto compreſſo, foliis linearibus anguſtiſſimis margine ſcabris flaccidis, floribus glomeratis, bracteis lineari-ſubulatis elongatis. *Creta.*

ocellata Sm. 31. G. caule diffuſo, foliis ſpathulatis utrinque tomentoſis, floribus capitatis, petalorum laminis ovatis zona notatis. *Euboea.*

*hirſuta** 32. G. caule aſcendente paucifloro, floribus ſubcapitatis ſeſſilibus, calycibus foliisque lanceolatis hirtis, petalis integerrimis. *Syria.* (Saponaria Labill.)

1696. SAPONARIA.

*Floribus aggregatis.

officinalis — 1. S. floribus fasciculato-corymbosis, calycibus glabris, petalis fauce coronatis, foliis oblongis nervosis laevibus. *Europ. omnis.*

glutinosa M. B. — 2. S. floribus fasciculato-corymbosis, calycibus glanduloso-hispidis viscosis striatis, petalis fauce coronatis apice 2dentatis, foliis ovatis nervosis. *Tauria.*

elegans Lapeyr. — 3. S. floribus corymbosis, calycibus villosis, petalis emarginatis fauce coronatis, caule nudiusculo, foliis linearibus glabris subintegerrimis. *Pyren.* (S. caespitosa Cand.)

depressa Bivon. — 4. S. floribus maximis subternis, calycibus cylindrico-subangulatis viscido-pubescentibus, petalis 2fidis fauce coronatis, foliis subspathulatis mucronatis glabris margine cartilagineo-ciliatis, radice lignosa. *Aetna* et *montes nebrod. Sicil.* (S. sicula Rafin.)

prostrata W. — 5. S. floribus confertissimis corymbosis, calycibus glanduloso-hirsutis, caule prostrato, ramis ascendentibus, foliis spathulatis ciliatis. *Asia minor.*

lutea — 6. S. floribus subcapitatis involucratis, calycibus lanatis, petalis obovatis integerrimis, caulibus caespitosis diphyllis, foliis radicalibus lineari-lanceolatis ciliatis. *Alp. cott. grai. pennin.*

bellidifolia Sm. — 7. S. floribus dense capitatis involucratis, calycibus hirtis, petalis linearibus emarginatis, caule erecto 2phyllo, foliis spathulatis mucronatis. *Calabriae montes.*

**Floribus solitariis.

ocimoides — 8. S. pedunculis axillaribus terminalibusque erectis, calycibus villosis, petalis spathulatis integerrimis, caule procumbente dichotomo, foliis subellipticis utrinque attenuatis basi ciliatis. *Europ. austr.*

orientalis — 9. S. pedunculis axillaribus erectis, calycibus glanduloso-hirsutis, petalis emarginatis fauce nudis, caule dichotomo glabriusculo, foliis oblongis utrinque attenuatis sub-3nerviis. *Carniolia. Asia minor.*

porrigens — 10. S. pedunculis axillaribus capillaribus fructiferis elongatis cernuis, calycibus viscido-hirsutis, petalis emarginatis fauce nudis, caule erecto ramoso villosissimo, foliis lanceolatis acuminatis nervosis. *Asia minor.*

caespitosa Sm. — 11. S. caule nudiusculo simplici 1floro, calycibus clavatis glabris, floribus radicalibus spathulatis aggregatis. *Euboea.*

1697. DIANTHUS.

*Floribus aggregatis.

† Suffruticosi.

arboreus
1. D. floribus fasciculatis, calycis squamis quaterna serie imbricatis appressis brevissimis acutiusculis, petalis dentatis subbarbatis longe unguiculatis, foliis linearibus carnosis obtusiusculis connatis. *Creta.*

fruticosus
2. D. floribus fasciculatis, calycis squamis quaterna serie imbricatis acutis, petalorum unguibus calyces aequantibus, foliis spathulatis obtusis. *Inf. maris aegei.*

rupicola Biv.
3. D. floribus subaggregatis bracteatis, calycis squamis triplici serie imbricatis cuspidatis ciliatis subappressis, petalis dentatis barbatis, foliis linearibus glaucis rigidis connatis. *Sicilia. Calabria.* (D. Bisignani Tenor.)

siculus Urvill.
4. D. floribus congesto-capitatis bracteatis, calycis squamis quaternis acutis tubo duplo brevioribus, petalis crenatis, foliis linearibus elongatis connato-vaginantibus. *Moesia infer.*

juniperinus Sm.
5. D. floribus subcorymboso-aggregatis, calycis squamis subquaternis obovatis aristatis tubo duplo brevioribus, petalis inciso-crenatis, foliis subulatis pungentibus. *Creta.* (D. aciphyllus Sieber.)

pinifolius Sm.
6. D. floribus capitatis bracteatis, bracteis obcordatis aristatis capitulum aequantibus, calycis squamis bracteiformibus tubo brevioribus, foliis subtriquetro-setaceis. *Thracia. Lemnos.*

suffruticosus W.
7. D. floribus subaggregatis, calycis squamis ovato-oblongis mucronatis tubo triplo brevioribus, petalis lentatis barbatis, foliis lineari-lanceolatis cauleque scabris. *Patria?*

spinosus Desf.
8. D. floribus capitatis sessilibus, calycis squamis obtusis tubum aequantibus, petalis linearibus, foliis subulatis spinescentibus. *Persia.*

†† Herbacei.

Libanotis Labill.
9. D. floribus aggregatis, calycis squamis senis acuminatis patentibus tubo brevioribus, petalis multifidis barbatis, foliis lanceolatis. *Libanus.*

collinus Kit.
10. D. floribus aggregatis, calycis squamis ovato-lanceolatis cuspidatis patulis tubo brevioribus, petalis dentatis barbatis subtus discoloribus, foliis lineari-lanceolatis 3nerviis cauleque scabris. *Europ. austr.* (D. scaber Schleich. asper W., umbellatus Cand., serratus Lapeyr., ruthenicus Röm. W., patens Horn., montanus M. B., discolor Sims. varr.)

Armeria
11. D. floribus fasciculatis, calycis squamis lanceolatis subulatis tubum aequantibus foliisque linearilanceolatis hirsutiusculis, petalis crenatis imberbibus. *Europ. Amer. bor.* (D. armerioides Rafin. carolinianus Walt.)

Pſeudarmeria M. B. 12. D. floribus aggregato-faſciculatis, calycis ſquamis ovato-ſubulatis tubum ſuperantibus foliisque lineari-lanceolatis aſperis, petalis crenatis barbatis. *Tauria.*

corymboſus Sm. 13. D. floribus aggregatis, calycis ſquamis lanceolatis villoſis tubo brevioribus, ramis divaricatis pubeſcentibus. *Aſia minor.*

barbatus 14. D. floribus aggregato-faſciculatis, calycis ſquamis lanceolatis ſubulatis calycem aequantibus, petalis dentatis barbatis, foliis lanceolatis nervoſis. *German. et Gallia auſtr.* (D. latifolius W., aggregatus Poir.)

chinenſis 15. D. floribus ſubaggregatis, calycis ſquamis lanceolatis cuſpidatis tubum aequantibus erecto-patulis, foliis lato-lanceolatis. *China.* (D. pulchellus Schrad. var.)

Fiſcheri * 16. D. floribus aggregato-corymboſis, calycis ſquamis ovatis cuſpidatis erectis calyce colorato brevioribus, petalis dentato-fimbriatis ſubimberbibus, foliis lanceolatis ſerrulatis. *Ruſſia auſtr.*

japonicus Thb. 17. D. floribus aggregatis, calycis ſquamis lanceolatis ariſtatis ciliatis tubo brevioribus, petalis crenatis, foliis ovatis glabris enerviis. *Japon.*

Carthuſianorum 18. D. floribus ſubcapitato-faſciculatis involucratis, calycis ſquamis ovatis ariſtatis tubo brevioribus, petalis crenatis rotundatis barbatis, foliis linearibus nervoſis. *Europ. Aſia minor.* (D. atrorubens All.)

ferrugineus 19. D. floribus faſciculatis involucratis, calycis ſquamis ariſtatis tubum aequantibus, petalis bifidis, laciniis 3dentatis, foliis linearibus ſubtus carinatis. *Calabria.*

atrorubens M. B. 20. D. floribus faſciculato-capitatis involucratis, involucro ovato ariſtato ſubſcarioſo capitulum aequante, calycis ſquamis ovatis ariſtatis tubo brevioribus, foliis linearibus glaucis. *Tauria. Caucaſ.* (D. capitatus Cand.)

polymorphus M. B. 21. D. floribus faſciculatis, calycis ſquamis ſcarioſis ovatis abbreviatis, petalis anguſtis dentatis villoſis, foliis linearibus acuminatis ſcabris. *Hungar. Transſylvan. Ruſſia auſtr.* (D. diutinus Kit.)

prolifer 22. D. floribus aggregato-capitatis, calycis ſquamis ovato-oblongis tubum ſuperantibus, petalis emarginatis, foliis linearibus ſerrulatis. *Europ. Aſia med.* (D. diminutus L.)

** *Floribus ſparſis.*

† *Petalis dentatis, crenatis.*

Caryophyllus 23. D. calycis ſquamis quaternis breviſſimis ovatis mucronatis, petalis imberbibus, foliis linearibus canaliculatis glaucis. *Gallia bor. Anglia. Italia.* (D. corſicus Link., clavatus *, longicaulis Tenor., grandiflorus Poir. Arroſti Presl. varr.)

crenatus Thb. 24. D. caule ramoſo, ramis ſub-1floris, calycis ſquamis ſubſenis lanceolatis acutis appreſſis tubo elongato brevioribus, petalis cuneatis inciſo-ſerratis imberbibus, foliis linearibus anguſtiſſimis patentiſſimis ſcabris. *C. B. S.*

pallidiflorus Ser. 25. D. caule ramoſiſſimo laevi, ramis elongatis 1floris, calycis ſquamis ovato-lanceolatis cuſpidatis tubo brevioribus, petalis crenatis barbatis, foliis ſubulatis rectis margine ſcabris. *Ad Volgam et Tanaim.* (D. pallens M. B. ramoſiſſimus Poir.)

diffuſus Sm. 26. D. caule diffuſo glabriusculo, floribus ſubcorymboſis, calycis ſquamis mucronatis tubo duplo brevioribus. *Cyprus.*

longiflorus Lam. 27. D. caule ſuffruticoſo, ramis multifloris, calycis ſquamis ſubquaternis lanceolatis cuſpidatis tubo triplo brevioribus, petalis longe unguiculatis ſerratis ſubbarbatis, foliis lineari-ſubulatis margine ſcabris. *Gallia auſtr. orient. Hiſpania. Luſitania.* (D. attenuatus Sm., inodorus Gärtn., luſitanicus Brot., hirtus Vill.)

pallens Sm. 28. D. caule paniculato multifloro, calycis ſquamis ovatis acuminatis abbreviatis, petalis inciſo-ſerratis, foliis laxis acutis. *Aſia minor. Macedonia.*

nazaraeus Clark. 29. D. caule ramoſo, ramis 1floris, calycis ſquamis ovatis acutis appreſſis tubo dimidio brevioribus, petalis dentatis, foliis elongatis lineari-ſubulatis 3nerviis margine ſcabris. *Palaeſtina.*

divaricatus Urv. 30. D. caule ramoſo divaricato, ramis ſtrictis 1floris, calycis ſquamis quaternis ſcarioſis ſubulatis patulis tubo apice attenuato ſubbrevioribus, petalis ſerratis punctatis, foliis lineari-ſubulatis flaccidis. *Inſ. Samos. Cyprus.* (D. tripunctatus Sm.)

pubeſcens Sm. 31. D. viſcido-pubeſcens, ramis ſub-1floris, calycis ſquamis ovato-ſubulatis tubo ſtriato villoſo dimidio brevioribus, foliis laxis ſtriatis. *Inſ. maris aegei.*

deltoides 32. D. caule decumbente ramoſo ſcabro ſubpubeſcente, calycis ſquamis ſubbinis ovato-lanceolatis acutis, foliis linearibus pubeſcentibus, inferioribus obtuſiusculis. *Europ. Japon.* (D. glaucus L. var.)

rigidus M. B. 33. D. caule ramoſiſſimo ſuffruticoſo, calycis ſquamis ovatis acutis breviſſimis appreſſis, petalis anguſtis dentatis, foliis lineari-ſubulatis patulis ſcabris. *Ad Volgam.*

campeſtris M. B. 34. D. caule paniculato pubeſcente, ramis erectis 1floris, calycis ſquamis lanceolatis acuminatis tubo brevioribus, petalis dentatis ſubtus discoloribus, foliis lineari-lanceolatis 3nerviis hirſutiusculis. *Podolia. Tauria.* (D. bicolor Adam.)

caucaſicus M. B. 35. D. caule ramoſo laevi, floribus ſubſeſſilibus, calycis ſquamis lanceolatis acuminatis erectis tubo duplo brevioribus, petalis dentatis ſubtus discoloribus, foliis linearibus ſubulatis margine ſca-

bris. *Caucaſ.* (D. ibericus W. Willdenowii Link.)

guttatus M. B. 36. D. caule paniculato laevi, calycis ſquamis lanceolatis cuſpidatis tubum aequantibus, petalis dentatis albo-maculatis, foliis linearibus ſubulatis nervoſis ſcabris. *Litus Ponti eux. inter Tyrae et Hypanis oſtia.*

pratenſis M. B. 37. D. caule ſuffruticoſo ramoſo glabro, calycis ſquamis exterioribus lanceolatis foliaceis tubum ſubaequantibus, interioribus ovatis brevibus, petalis dentatis ſubbarbatis, foliis lanceolatis inferioribus obtuſiusculis ſub-3nerviis. *Ad Volgam.* (D. verſicolor Fiſch.)

furcatus Balb. 38. D. caule flexuoſo ſubramoſo paucifloro glabro, pedunculis 2fidis, calycis ſquamis exterioribus lanceolatis interioribus ovatis mucronatis remotiusculis tubo brevioribus, petalis ſerratis, foliis linearibus elongatis laevibus. *Pedemont.* (D. geminiflorus Loiſ.?)

nitidus Kit. 39. D. caule paucifloro ſcabro, calycis ſquamis ovatis acutis erecto-appreſſis tubo brevioribus, petalis inciſo-ſerratis, foliis abbreviatis lineari-lanceolatis obtuſiusculis. *Carpathi. Alp. dinar.*

biflorus Sm. 40. D. caule ſtricto glabro paucifloro, floribus geminatis ſubpedunculatis, calycis ſquamis lanceolatis longe cuſpidatis patulis tubo brevioribus, petalis inciſo-ſerratis, foliis linearibus elongatis flaccidis margine ſcabris. *Hungar. Carniol. Italia ſuper. Euboea.* (D. furcatus Hornem. Hornemanni Ser., geminatus Kit. in lit.)

monadelphus Vent. 41. D. caule procumbente paucifloro, calycis ſquamis lanceolatis acuminatis patulis tubo brevioribus, petalis crenatis, foliis lanceolatis acuminatis glabris. *Syria.* (D. procumbens Perſ.)

incurvus Thb. 42. D. caule ramoſo, ramis incurvis, calycis ſquamis quaternis ovatis breviſſimis, petalis integris, foliis lineari-ſetaceis inferioribus elongatis ſuperioribus breviſſimis. *C. B. S.* (D. Burchellii Ser., albens Ait.)

pungens 43. D. caule paucifloro, floribus ſolitariis, calycis ſquamis breviſſimis mucronatis patentibus, tubo gibbo, petalis integris, foliis caeſpitoſis ſubulatis. *Hiſpan.* (D. hiſpanicus Aſſo.)

bicolor M. B. 44. D. caule paniculato, calycis ſquamis breviſſimis truncato-obtuſiſſimis mucronatis, petalis dilatatis crenatis ſubtus discoloribus, foliis linearibus ſubulatis nervoſis inferioribus tomentoſis. *Tauria. Thracia. Aſia minor. Peloponneſ.* (D. cinnamomeus Sm. emarginatus Ser.)

leptopetalus W. 45. D. caule paucifloro, calycis ſquamis breviſſimis ovatis acutis, petalis lineari-lanceolatis elongatis ſubintegerrimis, foliis ſubulatis. *Volgam et Hypanim.* (D. pomeridianus M. B., cretaceus Adam., bicolor Hornem.)

pomeridianus 46. D. caule paucifloro, calycis ſquamis ſubbinis ovatis acutis breviſſimis, petalis calycem ſubae-

quantibus obtusissimis subintegerrimis, foliis linearibus. *Palaestina.*

virgineus 47. D. caule paucifloro, calycis squamis obtusissimis brevissimis, petalis crenatis, foliis linearibus acuminatis. *Europ. austr.* (D. rupestris L.)

†† *Petalis multifido-laciniatis.*

superbus 48. D. caule herbaceo multifloro glabro, calycis squamis ovatis mucronatis subappressis tubo multo brevioribus, petalis multifido-laciniatis fimbriatis basi barbatis, foliis lanceolato-linearibus. *Europa a Transsylvania inde ad Lapponiam arcticam. Caucas.* (D. plumarius Gunn.)

prostratus Jacq. 49. D. caule fruticoso paniculato, calycis squamis lanceolatis tubo elongato triplo brevioribus, petalis fimbriatis imberbibus, foliis linearibus integerrimis. *C. B. S.*

fimbriatus M. B. 50. D. caule suffruticoso ramoso, ramis 1floris, calycis squamis senis lanceolatis calyce brevioribus, petalis oblongis dentato-fimbriatis imberbibus, foliis subulatis rigidis scabris. *Iberia. Sibiria.* (D. orientalis Sims. contortus Sm.)

monspessulanus 51. D. caule herbaceo paucifloro, calycis squamis ovato-lanceolatis cuspidatis tubo parum brevioribus erectis, petalis multifidis subimberbibus, foliis linearibus margine scabris. *Gallia austr. Italia super.* (D. monspeliacus Cand. et plumosus *.)

crinitus Sm. 52. D. caule herbaceo paucifloro, calycis squamis ovalibus mucronatis patulis tubo triplo brevioribus, petalis multifido-capillaribus imberbibus, foliis linearibus obtusiusculis laevibus. *Inf. maris aegei. Cyprus.* (D. elegans Urv.?)

suaveolens * 53. D. caule erecto glabro, floribus subcorymbosis, calycis squamis ovato-lanceolatis acutis erectis calyce brevioribus, petalis inciso-multifidis barbatis maculatis, foliis lineari-lanceolatis glaucis margine scabris. *Patria?*

punctatus * 54. D. caule erecto paucifloro, calycis squamis quaternis obtusis brevissimis, petalis imberbibus multifidis punctatis, foliis linearibus glaucis laxis. *Patria?*

plumarius 55. D. caule erecto paucifloro, calycis squamis ovatis mucronatis brevissimis appressis, petalis laciniato-multifidis barbatis, foliis linearibus glaucis margine scabris. *Helvet. Hungar. Transsylvan. Podolia.* (D. hortensis Schrad. moschatus Hortul. dubius Horn. varr.)

serrulatus Desf. 56. D. caule erecto paucifloro, pedunculis squamatis, calycis squamis imbricatis ovatis mucronatis appressis, petalis laciniato-multifidis imberbibus, foliis linear-lanceolatis serrulatis. *Afric. boreal.*

**** Caule unifloro.*

† Petalis dentatis.

ſylvaticus Hopp. 57. D. caule ſub-1floro, calycis ſquamis imbricatis ovatis acutis appreſſis, petalis dilatatis inaequaliter dentatis barbatis, foliis linearibus margine ſcabris. *German. med.*

ſylveſtris Wulff. 58. D. caule ſub-1floro, calycis ſquamis imbricatis ovatis acutis appreſſis, petalis dilatatis denticulatis imberbibus, foliis confertis ſubulatis rigidis. *Alp. noric. carn. dinar.*

repens W. 59. D. radice repente, caule ſimpliciſſimo 1floro, calycis ſquamis binis ovatis acuminatis patulis tubum ſubaequantibus, petalis longe unguiculatis dentatis imberbibus. *Sibir.*

caeſius Sm. 60. D. caule ſub-1floro, calycis ſquamis ovatis acutiusculis brevibus appreſſis, petalis duplicato-crenatis barbatis, foliis lineari-lanceolatis glaucis ſerrulatis obtuſiusculis. *Anglia. Germon. med.* (D. glaucus Hudſ. ſuavis W.)

caeſpitoſus Thunb. 61. D. caule 1floro glabro, calycis ſquamis quaternis lanceolatis acutis tubo duplo brevioribus, petalis ſubintegerrimis, foliis faſciculatis linearibus 3gonis ſcabris. *C. B. S.*

ſcaber Thunb. 62. D. caule 1floro ſcabro pubeſcente, calycis ſquamis quaternis ovato-lanceolatis tubo dimidio brevioribus, petalis abbreviatis crenatis, foliis lineari-ſubulatis villoſis ſubſerrulatis. *C. B. S.* (D. micropetalus Ser.)

bracteatus W. herb. 63. D. caule ſub-1floro glabro, calycis ſquamis ovato-acuminatis tubo ſubbrevioribus, petalis crenatis imberbibus, foliis ſubulatis ſtrictis margine ſcabris. *Armenia.* (D. petraeus M. B. Liboſchizianus Ser.)

ſerratifolius Sm. 64. D. radice lignoſa, caule 1floro, calycis ſquamis quaternis, petalis dentatis imberbibus, foliis ſerratis pungentibus. *Attica.*

ſtrictus Sm. 65. D. caule 1floro, calycis ſquamis quaternis, petalis crenatis imberbibus, foliis planis obtuſiusculis margine ſcabris. *Athos mons.*

gracilis Sm. 66. D. caule 1floro, calycis ſquamis ſubſenis mucronatis, petalis crenatis barbatis, foliis acuminatis margine ſcabris. *Athos mons.*

leucophaeus Sw. 67. D. caule 1floro, calycis ſquamis quaternis, petalis 3dentatis imberbibus, foliis ovato-lanceolatis baſi 5nerviis. *Olympus Aſiae minor.*

alpinus 68. D. caule 1floro abbreviato folioſo, calycis ſquamis exterioribus foliaceis tubum ſubaequantibus, petalis crenatis, foliis linearibus obtuſiusculis. *Alp. Europ. Sibir.* (D. glacialis Hänk. var. foliis acutiusculis.)

pumilus Vahl. 69. D. ſcapo breviſſimo 1floro, calycis ſquamis oblongis acuminatis exterioribus brevioribus, petalis dentatis, foliis radicalibus linearibus acutis glabris. *Arabia.* (D. 1florus Forsk.)

multipunctatus Ser. 70. D. caule ſtricto ſub-1floro elongato, calycis verrucoſi punctati ſquamis ovatis cuſpidatis tubum aequantibus, petalis 3-4dentatis barbatis maculatis, foliis linearibus acutis longiſſimis. *Inſ. Cos.* Urville.

†*purpureus* Lam. 71. D. caule ſub-1floro, calycis abbreviati ſquamis lanceolatis acutis tubo dimidio brevioribus, petalis integerrimis, foliis linearibus acutis glaucis ciliolatis. *Patria?*

†† *Petalis fimbriatis.*

alpeſtris Sternb. 72. D. caule 1floro, calycis ſquamis ovatis cuſpidatis tubo triplo brevioribus, petalis fimbriatis ſubbarbatis, foliis linearibus glabris. *Loca alpeſtr. German. auſtr. Sicilia?* (D. ſiculus Presl.)

petraeus Kit. 73. D. caule ſub-1floro, calycis elongati ſquamis ovatis cuſpidatis appreſſis tubo brevioribus, petalis multifidis imberbibus, foliis ſubulatis rigidis patentiſſimis glabris. *Hungar. Transſylvan. Arvernia?* (D. ſaxatilis Perſ.?)

fragrans M. B. 74. D. caule 1floro, calycis ſquamis ovatis mucronatis appreſſis tubo triplo brevioribus, petalis inciſo-ſerratis imberbibus, foliis lineari-ſubulatis rigidulis ſcabriusculis. *Caucaſ.*

ſquarroſus M. B. 75. D. caule 1floro, calycis ſquamis ovatis breviſſimis, petalis multifidis, foliis ſubulatis canaliculatis abbreviatis recurvis. *Ad Volgam.* (D. arenarius Pall. Muſſini Hornem.)

arenarius 76. D. caule 1floro, calycis ſquamis ovatis obtuſiusculis, petalis lacero-multifidis barbatis, foliis linearibus ſubciliatis. *Europ.* (D. praecox W., dubius Hornem., gallicus Cand.)

ſerotinus Kit. 77. D. caule ſub-1floro, calycis ſquamis ovatis acutiusculis appreſſis abbreviatis, petalis multifidis imberbibus, foliis linearibus abbreviatis glaucis. *Hungar. Transſylvan.*

1698. TRIANTHEMA.

* *Decandra.*

triquetrum W. 1. Tr. caule herbaceo dichotome ramoſo, ramis compreſſo-3quetris, foliis ſubſpathulatis petiolatis, floribus axillaribus ſeſſilibus. *Ora Coromandel.*

decandrum 2. Tr. caule herbaceo ramoſo, foliis oblongis petiolatis, floribus axillaribus pedunculatis aggregatis. *Ind. or.* (Zaleya Burm.)

humifuſum Thunb. 3. Tr. caule ſuffruticoſo proſtrato ramoſo, foliis lanceolatis acutis, floribus axillaribus breviter pedunculatis. *C. B. S.*

cuneifolium Thunb. 4. Tr. caule fruticoſo, ramis ancipitibus, foliis lanceolatis acuminatis, floribus axillaribus pedunculatis. *C. B. S.*

fruticosum Vahl. 5. Tr. caule fruticoso ramoso, ramis articulatis foliis sessilibus teretibus mucronatis, floribus terminalibus sessilibus semi-10andris. *Aegypt.* (Gymnocarpus Forsk. Delil.)

** *Pentandra.*

pentandrum 6. Tr. caule erecto herbaceo, foliis ellipticis integerrimis, floribus axillaribus subsessilibus congestis. *Arabia.* (Rocama Forsk.)

monogynum 7. Tr. caule prostrato herbaceo, foliis subrotundis obtusis petiolatis, altero minori, floribus axillaribus aggregatis pedunculatis 1gynis. *Aegypt. Ind. occid.*

crystallinum Vahl. 8. Tr. caule fruticoso procumbente, foliis ovatis petiolatis ramisque papulosis, floribus axillaribus 1gynis. *Arabia. Ind. orient.* (Papularia Forsk.)

1699. SCLERANTHUS.

perennis 1. Scl. calycibus fructiferis clausis obtusis marginatis, caule antherisque glabris, radice perenni. *Europ.*

hirsutus Presl. 2. Scl. calycibus fructiferis conniventibus obtusis, caule pubescente, antheris hirsutis, radice annua. *Aetna.*

annuus 3. Scl. calycibus fructiferis patulis acutis inermibus. *Europ. Amer. bor.* (Scl. polycarpos L.)

pungens R. Br. 4. Scl. calycibus fructiferis patentibus semi-10andris, foliis 3quetris subulatis pungentibus asperis. *Nov. Holl.*

diandrus R. Br. 5. Scl. calycibus fructiferis erectis diandris, foliis carinatis subulatis glabriusculis. *Terra Diemen.*

1700. CHRYSOSPLENIUM.

alternifolium 1. Chr. foliis alternis. *Europ. Japon.*

oppositifolium 2. Chr. foliis oppositis. *Europ.* (Chr. repens Link)

1701. PACHYNEMA R. Br.

complanatum R. Br. *Nov. Holl. bor.* Suffrutex ramosus, ramis dichotomis compressis aphyllis, floribus lateralibus solitariis pedicellatis, bractea squamaeformi sub pedicello.

TRIGYNIA.

1702. BEMBIX Lour.

tectoria Lour. *Cochinchina.* Frutex scandens ramosus, foliis oppositis obovatis petiolatis coriaceis amplis, floribus terminalibus racemosis pallidis.

1703. DEUTZIA Thunb.

Japan Thb. *Japon.* Arbor ramoſiſſima, foliis oppoſitis ovato-oblongis acuminatis ſtellato-hirſutiuſculis ſerrulatis, floribus terminalibus paniculatis albis.

1704. MALPIGHIA.

* *Foliis glabris.*

† *Pedunculis axillaribus uni-multiſloris.*

coccifera 1. M. foliis ſubovatis ſpinoſo-dentatis nitidis venoſis, pedunculis axillaribus ſolitariis medio bracteatis. *Ind. occ.*

punicifolia 2. M. foliis oblongis acutiuſculis integerrimis nitidis, pedunculis axillaribus aggregatis, ramis tuberculoſis. *Cayenn.*

biflora Poir. 3. M. foliis ovato-lanceolatis acutis integerrimis, pedunculis 2floris. *Amer. auſtr.* (M. punicifolia Cav.)

Balleriana * 4. M. foliis obovatis ſubemarginatis membranaceis opacis, pedunculis axillaribus aggregatis ſub-1floris. *Guadalupa.* Bertero.

glabra 5. M. foliis ovato-oblongis acutiuſculis integerrimis opacis, pedunculis axillaribus umbelliferis. *Amer. tropic.*

†*ſaginea* Sw. 6. M. foliis ovato-oblongis acuminatis ſubtus ſericeo-nitidis, pedunculis axillaribus 3partito-umbellatis. *Inſ. Carib.*

†† *Floribus racemoſis.*

ſpicata Cav. 7. M. foliis lanceolatis integerrimis ſupra nitidis ſubtus ferrugineis glabris, racemis terminalibus ſpicatis ferrugineo-ſubvilloſis. *Inſ. Carib.*

denſa Poir. 8. M. foliis ovato-lanceolatis coriaceis utrinque lucidis, racemis denſe ſpicatis, pedicellis piloſis. *Guiana.*

coriacea Sw. 9. M. foliis ovato-lanceolatis integerrimis ſupra lucidis ſubtus opacis concoloribus, racemis terminalibus ſpicatis ferrugineis. *Jamaica.*

brachyſtachya * 10. M. foliis oblongis utrinque attenuatis integerrimis glabris, racemo terminali ſpicato abbreviato rufo-velutino. *Braſil.* (Byrſonima Cand.)

Guadalupenſis * 11. M. foliis elliptico-oblongis integerrimis ſupra nitidis ſubtus ferrugineis glabris, racemis terminalibus laxe corymboſis. *Guadalupa.* Bertero.

reticulata Poir. 12. M. foliis oblongis utrinque ſubattenuatis reticulatis ſupra nitidiuſculis, racemis terminalibus paniculatis, pedicellis ſuperioribus reflexis, bracteis pedicellatis ovatis. *Cayenn. Cuba.* (Byrſonima ſpicata Pöppig.)

pallida Poir. 13. M. foliis ovatis coriaceis ſupra lucidis, racemis ſpicatis glabris. *Cayenn.*

† *volubilis* Sims. 14. M. foliis oblongis acuminatis glaberrimis, ramis volubilibus tuberculatis, racemis corymbosis terminalibus. *Ind. occ.*

mollis Poir. 15. M. foliis ovato-oblongis coriaceis laevibus, racemo paniculato abbreviato glabro. *Cayenn.*

elegans Meyer. 16. M. foliis oblongo-lanceolatis membranaceis glaberrimis, racemis elongatis nutantibus, pedicellis glandulosis. *Surinam.*

lucida Sw. 17. M. foliis obovatis evoniis nitidis, racemis terminalibus corymbosis. *Ind. occ.*

laevigata Poir. 18. M. foliis spathulatis supra opacis subtus ferrugineis glabris, racemis terminalibus simplicibus glabris. *Cayenna. Guadalupa.* Bertero.

coccolobaefolia * 19. M. foliis subcordato-rotundis obtusis sessilibus, racemis simplicibus glabris. *Caracas.* (Byrsonima Kunth.)

pruinosa * 20. M. foliis spathulatis retusis subtus pruinosis, racemis compositis terminalibus. *Ad Orinocum.* (Byrsonima angustifolia Kunth.)

** *Foliis appresso-setosis urentibus.*

fucata Ker. 21. M. foliis oblongis supra nitidis subtus appresso-setosis, pedunculis axillaribus umbellato-corymbosis. *Ind. occid.?*

urens 22. M. foliis oblongis utrinque attenuatis supra ramisque glabris subtus appresso-setosis, pedunculis axillaribus 1floris aggregatis. *Ind. occ.* (M. cubensis Kunth.?)

Cnide * 23. M. foliis ovato-oblongis acuminatis rigidis supra ramisque hispidis subtus appresso-setosis, gemmis floriferis villosissimis, pedunculis 1floris aggregatis. *Hispaniola.* Bertero.

setosa * 24. M. foliis elliptico-oblongis undulatis obtusis supra laevibus subtus appresso-setosis ciliatis, pedunculis sub-1floris axillaribus apice incrassatis. *Hispaniola.* Bertero.

angustifolia 25. M. foliis lineari-lanceolatis acuminatis integerrimis utrinque appresso-setosis, ramis glabris, pedunculis axillaribus umbelliferis. *Amer. trop.* (M. linearis Jacq.)

aquifolia 26. M. foliis lanceolatis spinoso-dentatis subtus appresso-setosis, pedunculis axillaribus aggregatis. *Amer. trop.*

*** *Foliis pubescentibus, tomentosis.*

montana * 27. M. foliis oblongis utrinque attenuatis supra glabris subtus pubescentibus, racemis compositis ferrugineo-tomentosis. *Cumana.* (Byrsonima Kunth.)

† *obovata* Kunth. 28. M. foliis cordato-obovatis acutis integerrimis coriaceis supra nitidis subtus pubescentibus, umbellis axillaribus geminis 4floris. *Ad fl. Magdalenae.*

verbaſcifolia 29. M. foliis obovato-oblongis integerrimis utrinque cinereo-tomentoſis, racemis terminalibus ſimplicibus, trunco craſſo nodoſo humili. *Guiana.*

phlomoides * 30. M. foliis obovato-ſubrotundis baſi 2glandulosis ſupra ſcabro-ſubtus cinereo-tomentoſis venoſis, racemis compoſitis axillaribus. *Braſil.* Sello.

rhopalaefolia * 31. M. foliis ellipticis complicatis glabris, junioribus ſubtus ramisque ferrugineo-tomentoſis, racemis ſimplicibus. *Cumana.* (Byrſonima Kunth.)

laurifolia * 32. M. foliis oblongis utrinque attenuatis ſubcomplicatis ſupra pubeſcentibus ſubtus incano-tomentoſis, racemis ſimplicibus. *Cumana. Braſil. Mexico?* (Bryſonima Kunth. B. ſericea Cand? M. pulcra Seſſ.?)

rufa Poir. 33. M. foliis elliptico-ſubrotundis coriaceis ſupra nitidis ſubtus rufo-tomentoſis, racemis ſpicatis ferrugineis. *Cayenna. Braſil.* (M. macrophylla Juſſ. Byrſonima eriopoda nervoſa Cand. B. nitidiſſima Kunth.)

altiſſima Aubl. 34. M. foliis elliptico-oblongis utrinque ſubattenuatis ſupra appreſſo-ſetoſis ſubtus rufo-tomentoſis, racemis ſimplicibus hirſutis. *Guiana.*

craſſifolia 35. M. foliis obovatis coriaceis ſupra glabriuſculis ſubtus rufo-villoſis, racemis elongatis hirſutis. *Amer. auſtr.* (M. Moureila Aubl. Byrſonima ferruginea Kunth.)

cotinifolia * 36. M. foliis obovatis membranaceis ſupra glabriuſculis ſubtus rufo-villoſis, racemo ſubſpicato piloſo, glandulis calycis continuis. *Mexico.* (Byrſonima Kunth.)

1705. GALPHIMIA Cav.

Cauca * 1. G. foliis orbiculatis ſubemarginatis glaberrimis, pedunculis corymboſis terminalibus. *Arabia.* (Caucanthus Fork.)

glauca Cav. 2. G. foliis ovatis obtuſis baſi utrinque 1dentatis ſubtus glaucis, racemis terminalibus ſimplicibus. *Mexico.*

glandulosa Cav. 3. G. foliis oblongis glabris, petiolis apice 2glandulosis, racemis terminalibus. *Mexico.*

longifolia Kunth. 4. G. foliis oblongo-lanceoſatis acutis baſi angulatis glabris, petiolis 1-2glandulosis, racemis compoſitis. *Nov. Granat.*

chryſophylla * 5. G. foliis oblongis utrinque attenuatis undulatis margine revolutis ſupra glabris ſubtus aureo-ſericeo-tomentoſis, racemis ſimplicibus. *Ad Orinoc.* (Byrſonima Kunth.)

mollis Kunth. 6. G. foliis oblongis utrinque attenuatis coriaceis ſupra nitidis ſubtus incano-pubeſcentibus, petiolis 2glandulosis, umbellis axillaribus pauciforis. *Mexico.*

hirſuta Cav. 7. G. foliis ovatis acutis utrinque hirſutis, racemis terminalibus. *Mexico.*

1706. BANISTERIA.

* *Foliis lobatis, angulatis.*

palmata Cav. 1. B. foliis 5fido-palmatis cordatis ſubtus albido-tomentoſis, laciniis lanceolatis acuminatis, petiolis apice 2glanduloſis. *Hiſpaniola.*

anguloſa 2. B. foliis cordatis ſinuato-angulatis obtuſis, ſummis ſubintegerrimis, petiolis apice 2glanduloſis, floribus umbellatis. *Ind. occ.*

varia * 3. B. foliis ſubcordato-3fidis integrisque ovatis acutis ſubtus albido-lanatis, umbellis proliferis bracteatis. *Ad fl. Magdalen.* (B. diverſifolia Bertero.)

ſagittata Cav. 4. B. foliis cordato-haſtatis acutis angulatis ſubtus tomentoſis, petiolis apice 2glanduloſis. *Hiſpaniola.*

** *Foliis cordatis integris.*

auriculata Cav. 5. B. foliis profunde cordatis acutiusculis glabris integerrimis, petiolis ſub apice 2glanduloſis, floribus umbellatis. *Braſil.*

ciliata Lam. 6. B. foliis cordato-ovatis acutis denticulato-ciliatis, petiolis apice 2glanduloſis, floribus umbellatis. *Braſil.*

ſplendens Cand. 7. B. foliis cordato-ſubrotundis obtuſis ſubtus ſericeo-tomentoſis, petiolis apice 2glanduloſis, racemis divaricatis, floribus umbellatis. *Ind. occid.* (B. fulgens Lam., heterophylla W.)

Humboldtiana Cand. 8. B. foliis cordato-ſubrotundis acuminatis membranaceis ſubtus villoſo-tomentoſis baſi 2glanduloſis, umbellis axillaribus ſeſſilibus. *Nov. Granat.* (B. tiliaefolia Kunth.)

dichotoma 9. B. foliis cordatis acuminatis utrinque glabris baſi 2glanduloſis, umbellis axillaribus pedunculatis proliferis. *Inſ. Carib. Molucc.* (B. convolvulifolia Cav., timorenſis Cand.)

emarginata Cav. 10. B. foliis ſubcordato-ellipticis apice retuſis ſubtus ſericeis, petiolis apice 2glanduloſis, racemis corymboſis terminalibus. *Guadalupa.*

*** *Foliis ovatis, oblongis.*

† *Petiolis foliisve glanduloſis.*

microphylla Jacq. 11. B. foliis ellipticis retuſis reticulatis ſupra nitidis ſubtus glabris, petiolis apice 2glanduloſis, racemis corymboſis. *Hiſpaniola. Carolina auſtr.?* (B. umbellulata Cand.)

purpurea 12. B. foliis ellipticis utrinque glabris opacis, petiolis medio 2glanduloſis, racemis corymboſis terminalibus. *Martinica.*

ſericea Cav. 13. B. foliis amplis ellipticis mucronatis ſubtus tomentoſis, petiolis medio 2glanduloſis, ramis compreſſis, racemis paniculatis terminalibus. *Braſil.*

tiliaefolia Vent. 14. B. foliis subrotundis acuminatis subtus tomentosis, petiolis elongatis apice 2glandulosis, umbellis axillaribus compositis, petalis subsessilibus. *Java.*

chrysophylla Lam. 15. B. foliis oblongis acutiusculis subtus aureo-tomentosis nitidis, petiolis basi 2glandulosis, floribus corymbosis terminalibus. *Brasilia. Nov. Granat.*

periplocaefolia Desf. 16. B. foliis ovato-oblongis mucronatis coriaceis utrinque glabris, petiolis apice 2glandulosis, corymbis terminalibus. *Portorico.* Bertero.

fulgens 17. B. foliis ovato-oblongis acutis subtus sericeis basi 2glandulosis, ramis dichotomis, floribus corymbosis umbellatis. *Guadalupa.* Bertero. *Peru.* Humb. (B. elliptica Kunth.)

picta Kunth. 18. B. foliis ovato-oblongis acuminatis supra glabris subtus sericeis, glandulis baseos binis patelliformibus, umbellis terminalibus. *Nov. Granat.*

salicifolia Cand. 19. B. foliis oblongis utrinque attenuatis subtus sericeo-tomentosis, petiolis apice 2glandulosis, racemis axillaribus compositis folia aequantibus. *Brasilia.*

diversifolia Kunth. 20. B. foliis ovato-oblongis lanceolatisve coriaceis supra glabris subtus pubescentibus basi 2glandulosis, pedunculis terminalibus geminis multifloris. *Cuba.*

pauciflora Kunth. 21. B. foliis ovato-oblongis cuspidatis utrinque pubescentibus basi subtus glandulis 2 stipitatis, umbellis terminalibus. *Cuba.*

ovata Cav. 22. B. foliis ovato-lanceolatis acuminatis subtus pubescentibus basi subtus 2glandulosis, pedunculis ternis. *Hispaniola.*

†† *Petiolis foliisque eglandulosis.*

brachiata 23. B. foliis elliptico-oblongis utrinque glabris coriaceis, ramis brachiatis, floribus paniculatis. *Ind. occid.* (Heteropteris platyptera Cand.)

coerulea Lam. 24. B. foliis ovato-oblongis glabris opacis, racemis terminalibus paniculatis. *Ind. occid.*

laurifolia 25. B. foliis ovato-oblongis acutis coriaceis, racemis terminalibus paniculatis ferrugineo-tomentosis. *Jamaica. Hispaniola.*

Quapara Aubl. 26. B. foliis elliptico-oblongis supra appresso-setosis subtus tomentosis, pedunculis axillaribus umbelliferis. *Amer. austr. Ind. occid.*

sinemariensis Aubl. 27. B. foliis ovatis acuminatis supra glabris subtus appresso-setosis, corymbis axillaribus pedunculatis compositis. *Amer. austr. Ind. occid.*

muricata Cav. 28. B. foliis ovato-oblongis acutiusculis subtus sericeo-tomentosis, cymis axillaribus terminalibusque, fructibus hinc aculeatis. *Peru. Brasilia.*

Leona Cav. 29. B. foliis oblongis acutis glaberrimis reticulatis, panicula terminali foliata. *Sierra Leone. America tropic.* (B. multiflora, bracteata et pubiflora Cand.)

ferruginea Cav. 30. B. foliis ovato-oblongis acuminatis supra nitidis subtus ferrugineis, racemis paniculatis foliatis. *Amer. austr.*

longifolia Sw. 31. B. foliis ovato-oblongis acuminatis supra nitidis, paniculae terminalis ramis patentissimis glabris. *Inf. Carib.*

ledifolia Kunth. 32. B. foliis lineari-oblongis utrinque rotundatis mucronatis coriaceis supra nitidis, pedunculis axillaribus terminalibusque multifloris. *Cuba.*

macradena Cav. 33. B. foliis ovalibus coriaceis utrinque glaberrimis opacis eveniis, racemis terminalibus compositis rufo-tomentosis, glandulis calycinis maximis. *Ind. occid.*

floribunda Cand. 34. B. foliis ovalibus subemarginatis coriaceis, racemis axillaribus corymbosis. *Portorico.* Bertero. (Heteropteris appendiculata Cand.)

parvifolia Vent. 35. B. foliis subrotundis rigidis pubescentibus, floribus terminalibus corymbosis. *Inf. Carib.*

argentea * 36. B. foliis oblongis utrinque attenuatis membranaceis supra pubescentibus subtus sericeis, paniculae ramis fasciculatis. *Nov. Granat.* (Heteropteris Kunth.)

nitida Lam. 37. B. foliis ovato-oblongis acuminatis supra nitidis subtus sericeis, panicula terminali foliosa. *Brasilia.*

cornifolia * 38. B. foliis elliptico-oblongis utrinque attenuatis subcoriaceis supra nitidis subtus sericeis glaucis, floribus axillaribus corymboso-paniculatis. *Nov. Granat.* (Heteropteris Kunth.)

1707. VARGASIA Bert.

glabra Bert. 1. V. foliis ternatis obovatis acutis serratis utrinque glaberrimis venosis, racemis spicatis aggregatis reflexis. *Hispaniola.*

tomentosa Bert. 2. V. foliis ternatis spathulato-oblongis serrulatis subtus albido-tomentosis, racemis aggregatis erectis. *Hispaniola.*

1708. TRIOPTERIS.

* *Fructibus Salatis.*

jamaicensis 1. Tr. foliis ovato-oblongis utrinque glaberrimis venoso-reticulatis, paniculis ramosissimis. *Jamaica. Hispaniola. Brasil.* (Tr. floribunda Bib. brasilienfis Poir.)

lucida Kunth. 2. Tr. foliis oblongis utrinque attenuatis coriaceis nitidis, paniculis axillaribus terminalibusque simplicibus. *Cuba.*

rigida Sw. 3. Tr. foliis ovatis acutis complicatis utrinque glaberrimis parallele venosissimis, racemis paniculatis filiformibus. *Hispaniola.*

ovata Cav. 4. Tr. foliis subcordato-ovatis obtusiusculis coriaceis utrinque glabris, petiolis apice 2glandulosis, paniculis terminalibus. *Hispaniola.*

** *Fructibus 4alatis.*

citrifolia Sw. 5. Tr. foliis oblongis venoſo-nervoſis utrinque glabris, paniculis axillaribus dichotomis. *Jamaica.* (Tetrapteris inaequalis Cav.)

acuminata W. 6. Tr. foliis oblongis utrinque attenuatis glabris, umbellis paniculatis terminalibus. *Cayenn.* (Tetrapteris mucronata Cav. Triopteris pauciflora Meyer.)

acutifolia W. 7. Tr. foliis ovato-lanceolatis acuminatis glabris, panicula terminali. *Cayenn.* (Tetrapteris acutifolia Cav.)

discolor Meyer. 8. Tr. foliis oblongis acuminatis utrinque glabris ſubtus discoloribus, umbellis paniculatis axillaribus terminalibusque. *Surinam.*

buxifolia W. 9. Tr. foliis elliptico-oblongis glabris, umbellis terminalibus pedunculatis. *Hiſpaniola. Cuba. Mexico.* (Tetrapteris Cav. Tetr. acapulcenſis Kunth.)

1709. HIRAEA Jacq.

* *Calycibus eglandulosis.*

reclinata Jacq. 1. H. foliis obovato-oblongis baſi ſubcordatis ſupra pubeſcentibus ſubtus glabris, ramis reclinatis, pedunculis congeſtis abbreviatis 4floris bracteatis. *Nov. Granat.*

glabra * 2. H. foliis ovato-oblongis utrinque glaberrimis nitidis, panicula terminali trichotoma appreſſo-piloſa. *Braſil.* Sello.

odorata W. 3. H. foliis ovatis acutis ſuperne glabris ſubtus flavido-tomentoſis, racemis paniculatis pubeſcentibus. *Guinea.*

hypericoides Burch. 4. H. foliis linearibus utrinque glabris. *Africa auſtr.*

indica Roxb. 5. H. foliis ſubcordato-ovatis acuminatis utrinque glabris ſupra nitidis, panicula terminali. *Ora Coromandel.* (Triopteris indica W.)

natans Roxb. 6. H. foliis ovatis acuminatis ſupra glabris ſubtus appreſſo-ſetoſis. *Ind. or.*

** *Calycibus glandulosis.*

oblongifolia Cand. 7. H. foliis ovato-oblongis acutis ſupra glabris ſubtus pubeſcentibus, floribus paniculatis. *Ad fl. Magdalen.* (Maſcagnia oblongifolia et americana Bertero.)

ovatifolia Kunth. 8. H. foliis ovatis acuminatis ſupra nitidis ſubtus glabris, paniculis axillaribus folia ſubaequantibus. *Cumana.*

divaricata Kunth. 9. H. foliis oblongis utrinque attenuatis glabris ſubquinquenerviis, petiolis glandulosis, racemis paniculatis axillaribus folia ſuperantibus. *Cumana.*

1710. ERYTHROXYLON.

* *Foliis subtus 3lineatis: venis nimirum binis nervo medio parallelis.*

areolatum 1. E. foliis obovato-oblongis membranaceis glabris mucronatis subtus glaucis, ramis divaricatis, pedunculis aggregatis 1floris. *Ind. occid.* (E. carthagenense Jacq.)

Coca Lam. 2. E. foliis oblongis obtusiusculis membranaceis, ramis verrucoso-squamosis, pedunculis sparsis abbreviatis. *Peru.*

lineolatum Cand. 3. E. foliis oblongis utrinque subattenuatis mucronatis membranaceis subtus glaucis, pedunculis subaggregatis. *Cayenn.*

rigidulum Cand. 4. E. foliis obovato-oblongis obtusis coriaceis opacis subtus pallidis glabris, ramis tuberculosis, pedunculis aggregatis abbreviatis. *Ad fl. Magdalen.* Bertero.

mexicanum Kunth. 5. E. foliis obovato-oblongis subretusis coriaceis glabris, stipulis petiolos stipantibus, pedunculis solitariis. *Mexico.*

** *Foliis venosis.*

† *Pedunculis lateralibus aggregatis.*

nitidum * 6. E. foliis obovatis obtusis integerrimis glaberrimis nitidis, pedunculis axillaribus aggregatis flores aequantibus. *Brasil.* Sello.

subcordatum Cand. 7. E. foliis subcordato-orbiculatis emarginatis rigidis reticulato-venosis glabris, ramis divaricatis. *Hispaniola.* Bertero.

rufum Cav. 8. E. foliis elliptico-oblongis obtusis coriaceis subtus rufis, ramulis squamosis, pedunculis flore longioribus. *Hispaniola. Guadalupa.*

squamatum Vahl. 9. E. foliis oblongis utrinque attenuatis obtusiusculis glaberrimis, stipulis distiche imbricatis, pedunculis flore longioribus. *Cayenn. Guiana.*

laurifolium Lam. 10. E. foliis oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis glaberrimis, stipulis sparsis, pedunculis terminalibus subumbellatis flore longioribus. *Inf. Mascaren.*

macrophyllum Cav. 11. E. foliis oblongo-lanceolatis elongatis glabris, stipulis lanceolatis confertis, pedunculis aggregatis flore longioribus. *Cayenn.*

popayanense Kunth. 12. E. foliis oblongis utrinque attenuatis submucronatis membranaceis glabris, stipulis 2fidis subulatis, pedunculis aggregatis petiolos aequantibus. *Nov. Granat.*

obtusum Cand. 13. E. foliis obovato-oblongis obtusis membranaceis glabris subtus glaucescentibus, stipulis petiolo brevioribus, pedunculis aggregatis subelongatis. *Cuba.* (E. havanense Kunth. Humb.)

†† *Pedunculis subgeminis.*

longifolium Lam. 14. E. foliis lanceolatis obtusiusculis rigidis nitidis, stipulis acutis deciduis, pedunculis subternis flore longioribus. *Madagascar. Mascaren.*

sideroxyloides Lam. 15. E. foliis oblongis basi attenuatis lucidis, stipulis acutis sparsis, ramulis compressis, pedunculis subgeminis flores aequantibus. *Inf. Mascaren.*

havanense Jacq. 16. E. foliis obovato-oblongis rigidiusculis glabris nitidis, stipulis ramorum subimbricatis, pedunculis geminis flores subaequantibus. *Ind. occid. Amer. austr.* (E. ovatum Cav., cumanense et orinocense Kunth., Steudelia brasilienfis N. E.)

hondense Kunth. 17. E. foliis obovato-ellipticis retusis membranaceis glabris subtus glaucis, stipulis petiolum aequantibus, pedunculis petiolos superantibus. *Nov. Granat.*

ligustrinum Cand. 18. E. foliis oblongis utrinque attenuatis, pedunculis flore duplo longioribus. *Cayenn.*

lucidum Kunth. 19. E. foliis oblongis utrinque attenuatis coriaceis lucidis, stipulis pedunculos petiolosque excedentibus. *Nov. Granat.*

††† *Pedunculis solitariis.*

monogynum Roxb. 20. E. foliis obovato-oblongis glabris, pedunculis petiolos superantibus. *Ora Coromandel.*

ferrugineum Cav. 21. E. foliis obovato-ellipticis supra lucidis subtus ferrugineis, stipulis confertis, pedunculis petiolos floresque superantibus. *Madagascar.*

buxifolium Lam. 22. E. foliis obovatis mucronatis subtus glaucis, stipulis deciduis, pedunculis flores aequantibus, fructu 1loculari. *Madagascar.*

brevipes Cand. 23. E. foliis obovatis mucronatis subtus pallidis, stipulis sparsis deciduis, ramis lineato-tuberculosis, pedunculis breviffimis. *Portorico. Hifpaniola.* Bertero.

hypericifolium Lam. 24. E. foliis obovatis emarginatis submembranaceis, stipulis sparsis deciduis, ramis scabris, pedunculis subsolitariis flore longioribus, fructu 3loculari. *Inf. Mascaren. Hifpaniola.* Bertero.

1711. SCHINUS.

Molle 1. Sch. foliis pinnatis, foliolis serratis, impari longissimo petiolato. *Brasil. Peru.*

Huigan Molin. 2. Sch. foliis pinnatis, foliolis subdentatis, impari breviffimo subsessili. *Chili.*

Arcira 3. Sch. foliis pinnatis, foliolis linearibus aequalibus integerrimis. *Peru.*

† *dentata* Andr. 4. Sch. foliis simplicibus lanceolatis serratis, racemis axillaribus folia superantibus. *Inf. Sandwich.*

1712. STELLARIA.

* *Petalis 2partitis.*

† *Foliis cordatis, ovatis, oblongis.*

nemorum 1. St. foliis ovato-oblongis acutis, inferioribus cordatis petiolatis, panicula terminali dichotoma pubescente. *Europ.*

cuspidata W. 2. St. foliis petiolatis subcordato-oblongis acuminatis cauleque laxo glabris, pedunculis axillaribus. *Quito.*

media Sm. 3. St. caule debili subdecumbente, linea laterali pilosa alterna, foliis ovatis, pedunculis fructiferis reflexis, floribus sub-5andris, petalis calyce brevioribus. *Europ. Amer. bor.* (Alsine media L. Varietas 10stemon Oed. et Hornem. est St. Cerastium et latifolia Pers. Cand.)

ciliata Pers. 4. St. caule ramosissimo laevi, foliis exiguis cordato-ovatis acuminatis ciliatis petiolatis, floribus axillaribus, petalis calycem glabrum subsuperantibus. *Peru.*

dichotoma 5. St. caule dichotomo foliisque sessilibus cordato-ovatis pubescentibus, pedunculis solitariis fructiferis reflexis, calyce acuto corollam superante. *Sibir.*

Pallasiana Ser. 6. St. caule dichotomo foliisque ovatis sessilibus pubescentibus, pedunculis fructiferis folio duplo longioribus reflexis. *Sibir.* (St. dichotoma Schlechtend.)

ruscifolia Pall. 7. St. caule stricto, foliis cordato-ovatis acutis amplexicaulibus glabris nervoso-marginatis, floribus axillaribus solitariis, terminalibus subaggregatis longe pedunculatis. *Sibir.*

cordata Schlechtend. 8. St. foliis cordato-subrotundis obtusis glaberrimis petiolatis, caule flaccido glabro, pedunculis axillaribus paucifloris elongatis reflexis. *Nov. Granat.* Humb.

villosa Poir. 9. St. caule pedunculisque hirsutis, foliis sessilibus ovato-lanceolatis acuminatis pubescentibus, floribus terminalibus subpaniculatis, corolla calycem excedente. *Inf. Mascaren.*

puber Mx. 10. St. pubescens, foliis sessilibus ovatis ciliatis, pedunculis erectis, corolla calycem excedente. *Amer. bor.*

serpyllifolia W. 11. St. caule ramoso repente, foliis ovatis mucronatis breviſſime petiolatis venosis ciliatis, pedunculis axillaribus folia superantibus. *Peru.*

domingensis * 12. St. caule erecto superne pubescente, foliis ovatis acuminatis glaberrimis sessilibus, pedunculis terminalibus corymbosis calycibusque pilosiusculis, petalis calyce minoribus. *Hispaniola.* Bertero.

ovata W. 13. St. caule diffuso pilosiusculo, foliis subrhombeo-ovatis mucronatis petiolatis ciliatis, pedunculis axillaribus 1floris, fructiferis reflexis, calycibus basi pilosiusculis. *Nov. Granat.*

elegans Ser. 14. St. caule aſcendente, foliis ellipticis glabris, pedunculis paniculatis pubeſcentibus, petalis calycem glabriusculum ſuperantibus. *Sibir.*

undulata Thb. 15. St. caule decumbente ramoſo glabro, foliis ſeſſilibus oblongis acutis undulatis, pedunculis 1floris axillaribus ſubgeminis folia ſuperantibus. *Japon.*

cerastoides 16. St. caule aſcendente paucifloro, foliis oblongis obtuſiusculis glabris, pedunculis geminatis pubeſcentibus divaricatis, petalis calycem ſuperantibus. *Alp. Europ. med. Anglia. Regio arctica Europ.* (St. multicaulis W. Ceraſtium 3gynum Vill. refractum All.)

** *Foliis lanceolatis, linearibus.*

uliginosa Sm. 17. St. caule decumbente ramoſo, foliis oblongo-lanceolatis acutis glabris, pedunculis axillaribus terminalibusque corymboſis, petalis calyce brevioribus. *Europ. paludes.* (St. Alſine Hofm. W., fontana Wulff., aquatica Poll., Dilleniania Leers., hypericifolia Wigg. All., graminea γ. L.)

holostea 18. St. caule erecto 4gono, foliis lanceolatis acuminatis ſerrulatis, pedunculis terminalibns aggregatis ſcabris, calycibus enerviis acutis corolla brevioribus. *Europ.*

† *lanceolata* Poir. 19. St. caule erecto ſimpliciusculo ſuperne pubeſcente, foliis lanceolatis acuminatis glaberrimis integerrimis, floribus paniculatis, corolla calycem pubeſcentem ſuperante. *Ad fretum Magellan.*

bulbosa Wulff. 20. St. radice repente bulbifera, caule ſimpliciusculo paucifloro, foliis oblongo-lanceolatis ſubtus eveniis, petalis calycem ſuperantibus. *Carinthia.*

crassifolia Ehrh. 21. St. caule aſcendente 4quetro, foliis lanceolatis craſſiusculis glaucis, pedunculis axillaribus ſolitariis 1floris folia ſuperantibus, petalis calycem excedentibus. *Europ. paludes.* (St. humifuſa Rottb. et Vahl. in fl. dan. Ceraſtium 4gonum Baumg.)

florida Fiſch. 22. St. foliis lanceolatis acutis firmis ciliatis, pedunculis axillaribus terminalibusque longiſſimis ſolitariis ſtrictis, petalis ſepala 3nervia ſuperantibus. *Camtſchatca.*

dacurica W. 23. St. caule pubeſcente, foliis lanceolatis acutis ſeſſilibus integerrimis, pedunculis axillaribus ſolitariis folia ſuperantibus. *Dauuria.*

recurvata W. 24. St. caule proſtrato, foliis lanceolatis acutis ciliatis recurvatis, pedunculis axillaribus 1floris. *Nov. Granat.*

elongata Nutt. 25. St. caule elongato diffuſe ramoſo pubeſcente, foliis lanceolatis glabris calloſo-mucronatis, pedunculis ſolitariis longiſſimis, floribus apetalis. *Carolina. Georgia.*

scapigera Ait. 26. St. caule abbreviato folioſo, foliis lineari-lanceolatis acutiusculis margine ſcabris, pedunculis

aggregatis elongatis ſtrictis, petalis ſepala nervoſa ſubaequantibus. *Scotia. Sibiria.?* (St. Fiſcheriana Ser.)

longipes Gold. 27. St. glaberrima, foliis lineari-lanceolatis, pedunculis terminalibus dichotome ramoſis bracteatis, pedicellis elongatis, petalis ſepala obtuſa trinervia ſubaequantibus. *Canada.*

graminea 28. St. caule diffuſo 4gono, foliis lineari-lanceolatis margine laevibus, floribus terminalibus paniculatis, petalis ſepala 3nervia ſubaequantibus. *Europ. Amer. bor.* (St. longifolia Mühl. Spergulaſtrum gramineum Mx.)

longifolia Fries. 29. St. caule debili 4quetro, foliis ſublinearibus elongatis margine carinaque ſcabris, pedunculis axillaribus ſolitariis, petalis ſepala enervia aequantibus. *Suecia. Ducat. Lauenburg.*

glauca Wither. 30. St. caule erecto 4gono, foliis lineari-lanceolatis margine laevibus glaucis, pedunculis axillaribus ſubſolitariis, petalis calycem ſuperantibus. *Europ. humida.* (St. paluſtris Retz. W.)

viſcida M. B. 31. St. caule dichotomo ramoſo villoſo-viſcido, foliis lineari-lanceolatis ciliatis, petalis calycem ſuperantibus, capſulis oblongo-cylindricis. *Hungar. Transſylvan. Andegavum et Nannetum in Gallia. Tauria. Perſia.* (St. dubia Cand. fabuloſa Fiſch. Ceraſtium anomalum Kit. arvenſe 3gynum Bâtard. var. glabreſcens.)

Laxmanni Fiſch. 32. St. caule erecto paucifloro, foliis linearibus acutis glabriusculis, pedunculis filiformibus elongatis, petalis calycem ſuperantibus. *Sibir. ar.*

falcata Ser. 33. St. caule ramoſo pubeſcente, foliis confertis linearibus falcatis rigidis, pedunculis corymboſis elongatis incraſſatis, petalis calycem ſuperantibus. *Sibir.*

diffuſa W. 34. St. caule repente ramoſo diffuſo, foliis linearibus acutiusculis glabris, panicula dichotoma axillari. *Sibir.*

ſubulata W. 35. St. caule caeſpitoſo, foliis linearibus obtuſiusculis, floribus corymboſis, ſepalis ſubulatis petala duplo ſuperantibus. *Sibir.*

† *moſcovienſis* M. B. 36. St. foliis faſciculatis lineari-ſubulatis abbreviatis, floribus paniculatis. *Moſcovia.*

** *Petalis bilobis.*

radicans Lapeyr. 37. St. caule proſtrato multifloro, foliis ovalibus nitidis ſubſecundis, pedunculis divaricatis, petalis ſepala obtuſa excedentibus, capſula pyriformi. *Pyren.*

velutina Ser. 38. St. villoſa, foliis oblongo-linearibus, pedunculis filiformibus elongatis, petalis ſepala oblonga ſuperantibus. *Sibiria?*

Saxifraga Bertol. 39. St. caule diffuſo pubeſcente, foliis ovatis acutis ſeſſilibus, panicula dichotoma, petalis ſepala lanceolata ſuperantibus. *Apennin.*

*** *Petalis 5partitis.*

radians 40. St. caule erecto pubescente, foliis sessilibus lanceolatis acuminatis, pedunculis axillaribus 1floris, petalis sepala acuta superantibus. *Sibir.*

1713. ARENARIA.

* *Foliis planis exstipulatis,*

† *latioribus, subrotundis, oblongis s. lanceolatis,*

α. *oppositis vel sparsis.*

1. *Pedunculis solitariis.*

trinervia 1. A. caule gracili subramoso, foliis ovato-oblongis acutis 3nerviis, pedunculis axillaribus elongatis, sepalis angustis acuminatis petala superantibus. *Europ. nemora.*

lateriflora 2. A. caule simpliciusculo erecto, foliis ellipticis ciliatis sub-3plinerviis, pedunculis axillaribus elongatis erectis 2floris, corolla calycem superante. *Sibir. or. Amer. bor.* (Americana subramosior magis pubescit.)

serpyllifolia Ram. 3. A. suffrutescens caespitosa ramosa, foliis ovato-oblongis 3nerviis hirsutis, pedunculis terminalibus 1floris glanduloso-pilosis, corolla calycem obtusum superante. *Pyren.* (A. Ramondi Poir.)

peploides 4. A. caule dichotomo ascendente, foliis ovatis acutis carnosis amplexicaulibus, pedunculis axillaribus brevissimis, corolla calycem subaequante, seminibus paucis grandibus. *Litora marium boreal.* (Holosteum succulentum L. Polycarpon 1florum Walt. Honkenia peploides Ehrh.)

tetragyna W. 5. A. caule ramosissimo repente, foliis confertis oblongo-lanceolatis subcarnosis, corolla calycem superante sub-4gyna, seminibus paucis tuberculatis. *Alp. peruv.* Humb.

biflora 6. A. caule procumbente, foliis elliptico-subrotundis glaberrimis, pedunculis lateralibus subbifloris, corolla calycem superante. *Alp. Europ. med.* (A. apetala Vill. var.)

balearica 7. A. caule repente, foliis petiolatis ovatis nitidis, pedunculis longissimis 1floris pilosiusculis, corolla calycem superante. *Inf. balear. Corsica.*

rotundifolia M. B. 8. A. caule procumbente, foliis orbiculatis glaberrimis, pedunculis subdichotomis paucifloris, sepalis subulatis petala aequantibus. *Caucas.*

calycantha Ledeb. 9. A. foliis oblongis acutis sessilibus basi ciliatis, floribus nutantibus apetalis, calycibus acutis. *Sibir. orient.*

humifusa Wahlenb. 10. A. caule prostrato ramosissimo, foliis oblongis subcarnosis, floralibus latioribus confertis, floribus terminalibus subsessilibus conniventibus. *Regio arctica Scandinaviae.* (A. norvegica Gunn. Hornem. Stellaria humifusa Sw.)

Raddiana Ser. 11. A. caule proſtrato 4angulari, foliis ovato-lanceolatis ciliatis, pedunculis axillaribus pauciflo-ris, floribus apetalis. *Madera.* (A. alſinoides Radd.)

ſerpens Kunth. 12. A. caule ramoſiſſimo repente, foliis ſpathulato-oblongis ſubcarnoſis baſi ciliatis, petalis calycem ſubaequantibus. *Alp. peruv.*

ciliata 13. A. caule aſcendente caeſpitoſo, foliis oblongis ſubnervoſis ciliatis, pedunculis terminalibus erectis ſubſolitariis, corolla calycem acutum nervoſum ſuperante. *Alp. Europ. med. Hiberna. Islandia.* (A. multicaulis Wulff. L.)

cretica * 14. A. caule caeſpitoſo, foliis confertis oblongis acutis rigidiusculis glabris, pedunculis terminalibus elongatis viſcoſo-pubeſcentibus ſub-1floris, ſepalis carinatis acutiusculis corolla brevioribus. *Montes ſphaciot. Cretae.* (A. hirta Sieb.)

pubeſcens Urv. 15. A. caule ramoſo elongato foliisque ovatis acutis utrinque pubeſcentibus, calycibus villoſis acutis corolla brevioribus. *Inſ. Cos.*

hiſpanica * 16. A. caule erecto viſcoſo, foliis ſpathulatis ſubconnatis ſuperioribus lanceolatis, pedunculis elongatis lanatis, petalis ſubemarginatis calycem multo ſuperantibus. *Hiſpania.* (Stellaria Arenaria L.)

ſerpyllifolia 17. A. caule ramoſiſſimo ſcabro ſubpubeſcente, foliis ovatis acutis ſeſſilibus ciliatis, ſepalis nervoſis acutis petala ſubaequantibus. *Europ. Amer. boreal.*

uralenſis * 18. A. caule ramoſiſſimo ſcabro, foliis ovatis acutis ſeſſilibus nervoſis calloſo-piloſiusculis, pedunculis aggregatis glanduloſo-piloſis, ſepalis acuminatis corollam ſuperantibus. *Ural.* Pall. in W. herb.

buxifolia Poir. 19. A. caule ramoſo repente foliisque oblongis obtuſis pubeſcentibus, pedunculis 2floris bracteatis, corolla calycem obtuſum ſubſuperante. *Canada.* (A. thymifolia Pursh.?)

Wallichiana Ser. 20. A. caule ramoſiſſimo foliisque ovato-lanceolatis glaberrimis, ſepalis lanceolatis acutis corollam excedentibus. *Nepal.*

repens Ser. 21. A. caule repente foliisque ovatis ſubſeſſilibus piloſis, pedunculis axillaribus folio brevioribus, ſepalis acutis corollam aequantibus. *Patria?*

modeſta Duf. 22. A. caule erecto ſubdichotomo viſcoſo-pubeſcente, foliis inferioribus ovalibus ſuperioribus oblongo-linearibus, pedunculis filiformibus ſubdivaricatis, ſepalis acutis petala aequantibus. *Hiſpan. auſtr.*

muſcorum Fiſch. 23. A. caule abbreviato 1floro pubeſcente, foliis oblongis obtuſis ſtriatis ciliatis, corolla calycem obtuſum ſuperante. *Camtſchatca.*

nemoroſa Kunth. 24. A. caule procumbente ramoſo foliisque oblongis mucronatis venoſis petiolatis pubeſcentibus, petalis calyce acuminato brevioribus, ſeminibus pancis nitidis. *Quito. Nov. Granat.* (A. alſinoides et Stellaria pubeſcens W. herb.)

2. *Pedunculis multifloris.*

thymifolia Sm. 25. A. foliis ſpathulato-linearibus, floribus paniculatis, petalis unguiculatis calyce 3nervi longioribus. *Creta.*

ſpathulata Desf. 26. A. foliis inferioribus ſpathulatis ſuperioribus lanceolatis cauleque ramoſo pubeſcentibus, floribus corymboſo-paniculatis, petalis obovatis calycem ovatum ſuperantibus. *Afric. bor.*

† *molluginifolia* Pourr. in W. herb. 27. A. foliis obovatis acutiusculis ſubcarnoſis glaberrimis, pedunculis corymboſis divaricatis, ſepalis ovatis acutiusculis corolla brevioribus, ſeminibus paucis maximis ſolidis. *Hiſpan.*

muralis Sieb. 28. A. foliis ſpathulatis acutiusculis ſubcarnoſis cauleque ramoſiſſimo glanduloſo-pubeſcentibus viſcoſis, floribus racemoſis, petalis emarginatis calycem acutum aequantibus. *Creta.*

oxypetala Sm. 29. A. foliis ovatis acutis petiolatis, calycibus hirſutis ſub-5nerviis, petalis acuminatis. *Peloponneſ.*

cinerea Cand. 30. A. foliis oblongis acutis hirſutis, floribus paniculatis, pedicellis 2fidis glabriusculis, petalis obtuſis ſepala carinata acuta ſuperantibus. *Gallia provinc. Sicilia.* (A. Bartolotti Tin.)

ruſcifolia Poir. 31. A. foliis ovatis mucronatis coriaceis marginatis glabris, floribus ſubpaniculatis, ſepalis ovatis acutis ſtriatis corolla brevioribus. *Patria?*

β. *Foliis imbricatis.*

tetraquetra 32. A. foliis ovatis carinatis recurvis 4fariam imbricatis, floribus capitatis, ſepalis carinatis acutis corollam aequantibus. *Gallia auſtr. Hiſpania.* (A. amabilis Bory. imbricata Lag. armerina Bory. Gypſophila aggregata L.)

brevicaulis Sternb. 33. A. foliis ſubimbricatis oblongo-lanceolatis 3nerviis ciliatis, pedunculis ſubſolitariis, ſepalis lanceolatis ſtriatis petala ſuperantibus, caule proſtrato. *Alp. rhaet.*

bryoides W. herb. 34. A. caule caeſpitoſo glabro, foliis ovatis obtuſis concavis craſſis ciliatis 4fariam imbricatis, flore terminali ſeſſili, petalis calyce brevioribus. *Mexico.*

nana W. herb. 35. A. caule repente glabro, foliis oblongis obtuſis laxe imbricatis carnoſis, calycibus obtuſis petala aequantibus. *Alp. peruv.* (A. muſcoides Kunth.)

dicranoides Kunth. 36. A. caule caeſpitoſo, foliis ovato-lanceolatis convolutis rigidis ciliatis imbricatis, flore ſeſſili terminali ſubdigyno. *Alp. peruv.* (Lobelia bryoides W. herb.)

†† *Foliis anguſtis.*

procumbens Vahl. 37. A. caule proſtrato diffuſe ramoſo pubeſcente, foliis lineari-lanceolatis, pedunculis ſubpaniculatis elongatis, calycibus glanduloſis corollam excedentibus. *Afric. bor. Aegypt. Hiſpan. auſtr.*

(A. geniculata Poir., herniariaefolia Desf., extenſa Dufour.)

ſcopulorum Kunth. 38. A. caule procumbente ramoſiſſimo, foliis lineari-lanceolatis acutis ciliatis, pedunculis pubeſcentibus, corolla digyna calycem ſuperante, capſula ſub-3ſperma. *Alp. peruv.* (A. digyna W. herb.)

ſcabra Poir. 39. A. caule ſimplici breviſſimo foliisque lanceolatis acutis complicatis hiſpidiusculis, pedunculis ſubdichotomis, corolla calycem ſtriatum ſuperante. *Alp. Europ.*

conimbricenſis Brot. 40. A. caule erecto dichotome ramoſo viſcoſo-piloſiusculo, foliis lineari-lanceolatis patulo-recurvis, pedunculis terminalibus 2fidis, corolla calycem obtuſiusculum ſuperante. *Luſitan.*

montana 41. A. pubeſcens, foliis lanceolatis, caule ſterili longiſſimo procumbente, pedunculis terminalibus 1floris elongatis, fructiferis nutantibus, petalis ſepala acuminata multo ſuperantibus. *Gall. occ. et Hiſpan.*

lanceolata All. 42. A. caule caeſpitoſo, foliis lanceolato-linearibus rigidiusculis nervoſis, pedunculis ſub-1floris terminalibus pubeſcentibus, petalis mucronatis ſepala acuminata aequantibus. *Alp. cott. carn.* (Stellaria rupeſtris Scop.)

denſa Kit. 43. A. caule erecto ſimpliciusculo glabro, foliis lanceolatis margine ſcabris, pedunculis terminalibus elongatis ſub-3floris, petalis calycem ſuperantibus. *Alp. Croat.*

purpuraſcens Ram. 44. A. caule ſuffruticoſo aſcendente, foliis lanceolatis acuminatis glabris, pedunculis terminalibus pubeſcentibus, petalis ſepala acuminata ſuperantibus. *Pyrenaei.* (A. ceraſtoides Perſ.)

violacea Ledeb. 45. A. foliis lanceolatis glabriusculis, pedunculis terminalibus corymboſis viſcoſo-piloſis, petalis obovatis ſepala obtuſa ſuperantibus. *Sibir. or.*

Gieſekii Hornem. 46. A. foliis lanceolato-linearibus 3nerviis glanduloſo-ciliatis, pedunculis longiſſimis 1floris, ſepalis acutis corollam ſuperantibus. *Grönland.*

laricifolia 47. A. caule erecto ſubramoſo, foliis lineari-ſubulatis margine ſcabris nervoſis, panicula dichotoma pubeſcente, calycibus acutiusculis 3ſtriatis corolla brevioribus. *Alp. Europ. med. Caucaſ.*

decuſſata W. herb. 48. A. caule ramoſiſſimo repente, foliis lineari-lanceolatis acutis margine incraſſatis rigidis ciliatis decuſſatis, floribus terminalibus ſolitariis, petalis calycem ſuperantibus. *Mexico.*

cherlerioides Vill. 49. A. caule repente ramoſiſſimo, ramis aſcendentibus 1floris, foliis lineari-lanceolatis acutis carinatis pubeſcentibus, infimis decuſſatis, pedunculis ſolitariis terminalibus breviſſimis, petalis unguiculatis. *Delphinat.*

dauurica * 50. A. caule caeſpitoſo breviſſimo, foliis ſubimbricatis linearibus, floribus ſubaggregatis, ſepalis obtuſis petala anguſta ſuperantibus. *Sibir. orient.* (A. Cherleriae Fiſch.)

lycopodioides W. herb. 51. A. caule denſe caeſpitoſo, foliis appreſſis lanceolato-ſubulatis convolutis baſi ciliato-denticulatis, petalis calyce brevioribus. *Mexico.*

arctica Stev. 52. A. caule caeſpitoſo abbreviato 1floro, foliis linearibus obtuſis, pedunculis piloſo-glanduloſis, corolla calycem obtuſiusculum ſuperante. *Sibir.* (A. ſajanenſis W. herb.)

villoſa Fiſch. 53. A. caule ramoſo villoſo, foliis linearibus 3neviis ciliatis, ſepalis acuminatis petala excedentibus. *Sibir.*

rubicunda * 54. A. caule erecto ramoſo foliisque lanceolato-linearibus pubeſcentibus, pedunculis ſolitariis 1floris elongatis, ſepalis acuminatis hirſutis corolla brevioribus. *Sibir.* (A. purpurea W. herb.)

polygonoides Wulff. 55. A. caule procumbente, foliis linearibus obtuſiusculis, pedunculis 2floris terminalibus erectis, ſepalis ſubviſcidis enerviis corolla brevioribus capſulam ſubgloboſam 6valvem aequantibus. *Alp. lepont. nor. carn.* (A. obtuſa All. Bellard.)

pendula Kit. 56. A. caule diffuſo radicante, ramis erectis ſub-1floris, foliis linearibus ſubfaſciculatis, ſepalis cuſpidatis corolla brevioribus. *Hungar.*

hiſpida 57. A. caule flaccido hirſuto, foliis linearibus acutis ſubrecurvis ſubtus calloſo-hiſpidis, pedunculis capillaribus, ſepalis acuminatis petala aequantibus. *Gallia narbon.*

uliginoſa Cand. 58. A. caule caeſpitoſo erecto, ramis floriferis ſuperne nudis, foliis linearibus obtuſiusculis, pedunculis geminis, petalis ſubemarginatis ſepala acutiuscula excedentibus, capſula 3valvi. *Juraſſus.* Chaillet.

hirta Wormsk. 59. A. caule ſub-2floro glanduloſo-piloſo, foliis lincaribus obtuſiusculis 3nerviis ſulcatis, petalis oblongis calyce brevioribus. *Regio arctica Scandinaviae. Grönland.* (Alſine rubella Wahlb. Arenaria ſulcata W. herb.)

glabra Mx. 60. A. caule glaberrimo filiformi, foliis lineari-ſubulatis patulis, pedunculis 1floris elongatis divaricatis, petalis ſepala obtuſa ſuperantibus. *Carolin. bor.* (Stellaria 1flora Walt.)

calycina Poir. 61. A. caule erecto paucifloro glabro, foliis linearibus acutis connatis, pedunculis longiſſimis ſetaceis 1floris, petalis lanceolatis hyalinis calyce acuto multo brevioribus. *Afric. bor. Dalmatia?* (A. clandeſtina Portenſch.)

macrocarpa Pursh. 62. A. caule caeſpitoſo, foliis linearibus ciliatis confertis, pedunculis terminalibus folioſis 1floris, petalis ovatis capſulisque oblongis calycem ſuperantibus. *Ora occid. Amer. bor.*

Helmii Fiſch. 63. A. glanduloſo-piloſa, foliis linearibus obtuſiusculis 3nerviis, pedunculis longiſſimis 1floris, petalis capſulisque calycem ſuperantibus. *Ural.*

grandiflora 64. A. foliis linearibus ſub-3nerviis ciliatis faſciculatis, caule paucifloro, pedunculis longiſſimis, ſepalis cuſpidatis corolla brevioribus capſulam aequantibus. *Helvet. Gall. Ital.* (A. 3flora L., juniperina Vill., mixta Lapeyr., abietina Presl., liniflora W. herb., elongata Balb.)

auſtriaca 65. A. caule caeſpitoſo, foliis linearibus cuſpidatis 3nerviis, pedunculis terminalibus geminis elongatis, petalis emarginatis calycem ſubſuperantibus. *Alp. Auſtriae et Italiae.* (A. 3flora Vill. ſtellarioides Perſ., elongata W. herb. Stellaria 2flora Wulff.)

globoſa Labill. 66. A. caule ramoſo glanduloſo-piloſo, foliis linearibus acutis nervoſis, floribus ſubracemoſis, ſepalis inaequalibus corollam excedentibus. *Syria.*

imbricata M. B. 67. A. caule repente hirſuto, foliis confertis linearibus ciliatis rigidis patentibus, pedunculis 1floris terminalibus, petalis capſulisque calycem obtuſiusculum pubeſcentem ſuperantibus. *Caucaſ.*

** *Foliis ſucculentis, ſ. filiformibus plerumque ſtipulatis floribus ſub-5andris: capſulis 3valvibus. Alſine L. Wahlenb. Spergularia Perſ. Lepigonum Fries.*

ſucculenta Ser. 68. A. caule proſtrato glabro dichotome ramoſo, foliis ſpathulatis, pedunculis ſubcorymboſis, ſepalis obtuſis corollam aequantibus. *Aegypt.* (Alſine ſucculenta Delil.)

molluginea Ser. 69. A. caule dichotome ramoſo glabro, foliis ſpathulato-linearibus ſucculentis glaucis, pedunculis axillaribus demum deflexis, ſepalis obtuſis corollam ſubaequantibus. *Nov. Hiſpan.* (Alſine molluginea Lag.)

proſtrata Ser. 70. A. caule dichotome ramoſiſſimo, foliis linearibus obtuſis ſubverticillatis, floribus paniculatis, ſepalis inaequalibus corollam aequantibus. *Aegypt.* (Alſine proſtrata Forsk. Delil.)

glutinoſa M. B. 71. A. caule erecto paucifloro villoſo-viſcoſo, foliis oblongis obtuſiusculis, petalis obovatis calycem excedentibus. *Ad Volgam.*

rubra 72. A. caule procumbente ramoſo, foliis filiformibus, ſtipulis ſcarioſis latis vaginantibus, pedunculis axillaribus demum deflexis calycibusque glanduloſo-piloſis, ſeminibus ſolidis rugulofis. *Europ. Afric. bor.*

marina Sm. 73. A. caule proſtrato inferne glabro, foliis ſemiteretibus obtuſis elongatis, ſtipulis ovatis abbreviatis, capſulis oblongis calycem glanduloſum ſuperantibus, ſeminibus pellucido-marginatis glabris. *Europ.* (A. media L., glanduloſa Jacqu., marginata Cand., Spergula Duf.)

radicans * 74. A. caule proſtrato radicante glabro, foliis ſemiteretibus obtuſis, ſtipulis ovatis ſcarioſis, floribus axillaribus, capſulis calycem aequantibus, ſeminibus compreſſis. *In arena vulcanica Aetnae.* (Spergularia Presl.)

canadenſis Perſ. 75. A. caule proſtrato glabriuſculo, foliis filiformibus elongatis, floribus 5andris, capſula globoſa, ſeminibus compreſſis. *Canada.* (A. rubra ? Mx.)

grandis Kunth. 76. A. caule erecto, ramis cylindricis glabris, foliis ſubulatis verticillatis, ſtipulis ſcarioſis, pedunculis paniculatis, ſeminibus alatis. *Monte Video.* (Spergula grandis Perſ.)

purpurea Perſ. 77. A. caule erecto hiſpido, ramis divaricatis, foliis ſetaceis abbreviatis, pedunculis demum deflexis, petalis obtuſiſſimis calyce brevioribus, ſeminibus ſolidis. *Hiſpania.*

ſegetalis Lam. 78. A. caule erecto ramoſiſſimo, foliis filiformi-ſetaceis, ſtipulis ſcarioſis laceris, floribus paniculatis, petalis calyce brevioribus. *Europ. med.* (Alſine ſegetalis L.)

*** *Foliis filiformi-ſubulatis*

† *elongatis; caule elato: Orientales.*

juniperina 79. A. foliis ſubtriquetro-ſubulatis rigidis, ramorum ſterilium faſciculatis patentiſſimis, floribus paniculatis, petalis obtuſis calycem ſtriatum acutum glabrum ſuperantibus. *Armenia.*

graminifolia W. Schrad. 80. A. foliis filiformi-ſubulatis complicatis ſerrulato-ſcabris, caule erecto ſimplici, panicula pubeſcente, petalis calyces obtuſiſſimos margine ſcarioſos ſuperantibus. *Sibir. Ucrania. Transſylv. Cauca.* (A. filifolia M. B.)

longifolia M. B. 81. A. foliis filiformi-ſubulatis ſerrulato-ſcabris, inferioribus longiſſimis, caule erecto ſimplici, panicula conferta glabra, petalis calyces obtuſos carinatos ſuperantibus. *Ad Volgam. Sibir.* (A. capillaris Poir.)

juncea M. B. 82. A. foliis filiformi-ſubulatis ſerrulato-ſcabris, caule erecto ſimplici, panicula pauciflora glutinoſo-villoſa, ſepalis linearibus nervoſis petala aequantibus. *Sibir.* (A. davurica Fiſch.)

cucubaloides Sm. 83. A. foliis filiformi-ſubulatis ſerrulato-ſcabris, caule erecto ſimplici, floribus corymboſis, calycibus viſcoſis acutis corolla brevioribus. *Armenia.*

elatoides Adam. 84. A. foliis filiformi-ſubulatis ſerrulato-ſcabris, caule erecto ſimplici, panicula congeſta, multiflora, floribus minimis, ſepalis lanceolatis petala aequantibus. *Sibir.*

holoſtea M. B. 85. A. foliis filiformi-ſubulatis elongatis margine ſcabris, caule erecto ſimplici, panicula pauciflora pubeſcente, calycibus acuminatis corolla brevioribus. *Cauca.*

rigida M. B. 86. A. foliis lineari-filiformibus margine ſerrulatis, caule ſimplici folioſo, floribus paniculato-faſtigiatis, bracteis ſepalisque ſcarioſis elongatis acuminatis, corolla calycem ſubaequante. *Podolia. Ucrania.*

Erſophiloides Schreb. 87. A. foliis radicalibus ſetaceis, caulinis linearibus, panicula dichotoma pubeſcente, petalis lanceolatis calycem mucronatum ſuperantibus. *Aſia minor.*

formoſa Fiſch. 88. A. foliis lineari-ſetaceis ciliato-ſcabris, caule erecto ſimplici pedunculisque piloſo-viſcidis, floribus paniculatis, calyce obtuſo incraſſato petalis amplis breviori. *Sibir. orient.*

lychnidea M. B. 89. A. foliis triquetro-ſubulatis laevibus flexuoſis, caule ſimpliciſſimo 3floro, calycibus acuminatis ſtriatis corolla brevioribus. *Caucaſ.*

Gmelini Fiſch. 90. A. caule geniculato flexuoſo, foliis linearibus obtuſis, floribus paniculatis, petalis obovatis calycem ſuperantibus. *Sibir.*

cephalotes M.B. 91. A. caule erecto firmo nodoſo, foliis lineari-filiformibus elongatis, floribus paniculato-congeſtis, calycibus acuminatis glabris corollam ſubaequantibus. *Tauria. Beſſarabia.*

dianthoides Sm. 92. A. caule erecto ſimplici, foliis filiformi-ſubulatis ſcabris, floribus ſubcapitatis, bracteis ſcarioſis acuminatis pedunculos ſuperantibus, calycibus obtuſis corolla triplo brevioribus. *Armenia.*

verticillata W. 93. A. caule ſuffruticoſo ramoſo, ramis nodoſis pubeſcentibus, foliis faſciculato-verticillatis ſubulatis rigidis, pedunculis ſubverticillatis axillaribus 4floris. *Armenia.*

pharnaceoides Ser. 94. A. caule ramoſo glanduloſo-piloſo, foliis faſciculatis filiformibus mucronulatis, floribus ſubumbellatis, calycibus obtuſis corolla brevioribus. *Aſia minor.*

picta Sm. 95. A. caule dichotomo aphyllo ſuperne piloſo, foliis ſubulatis faſciculatis, petalis emarginatis ſubtus venoſis. *Cyprus.*

filiformis Labill. 96. A. caule ſimplici filiformi ſuperne nudo, foliis ſetaceis, floribus paniculatis, calycibus glabris corolla brevioribus. *Cyprus.*

†† *Foliis filiformi-ſetaceis abbreviatis.*

*ſcandinavica** 97. A. caule aſcendente paucifloro, foliis linearibus ſubulatis baſi vaginantibus, pedunculis ſubunifloris, petalis capſulisque calycem obtuſum ſuperantibus. *Regio arctica Scandinav.* (Stellaria biflora L. Alſine Wahlenb.)

*lapponica** 98. A. caule caeſpitoſo, foliis ſemiteretibus obtuſis ſubſecundis, ſcapo unifloro glaberrimo, petalis capſulaque calycem laeviſſimum aequantibus. *Alſ. lappon.* (Spergula ſtricta Sw. Alſine Wahlenb.)

*grönlandica** 99. A. caule decumbente paucifloro, foliis linearifiliformibus ſubcarnoſis, petalis emarginatis calycem obtuſiſſimum ſuperantibus. *Grönland.* (Stellaria Retz. Vahl.)

bavarica 100. A. caule erectiusculo caeſpitoſo glabro, foliis filiformibus ſubcarnoſis obtuſiusculis, pedunculis terminalibus fructiferis curvatis, ſepalis lanceolatis acutis margine ſcarioſis corolla brevioribus. *Bavaria.* Jungermann (1590.) *Mons Baldus.* Pona. Seguier.

faſciculata Gouan. 101. A. caule erecto ſtricto, foliis ſubulatis erectis, floribus faſciculatis, ſepalis acuminatis margine

membranaceis corolla duplo longioribus, seminibus muricato-serrulatis. *Europ. med.* (A. fastigiata Sm., mucronata Cand. Alsine mucronata Lam.)

tenuifolia 102. A. caule ramosissimo, foliis lineari-subulatis, floribus paniculatis, sepalis acuminatis corollam superantibus capsula brevioribus. *Europ. Amer. bor.* (A. viscosa Pers., patula Mx., emarginata Brot. Alsine viscosa Schreb. Aren. hybrida Vill.) Stamina plura abortiunt.

setacea Thuill. 103. A. caule caespitoso ramosissimo inferne pubescente, foliis setaceis fasciculatis subsecundis basi ciliatis, floribus paniculato-fastigiatis, calycibus acutis margine membranaceis corollam aequantibus. *Gallia. Tauria.*

rupestris Labill. 104. A. caule ascendente superne hirsuto, foliis filiformibus obtusis confertis, floribus paniculatis, calycibus 3nerviis pubescentibus corolla brevioribus. *Libanus.*

filifolia Forsk. 105. A. caule suffruticoso elongato, foliis filiformi-setaceis confertis patulis, pedunculis 1floris elongatis, sepalis subulatis corollam aequantibus. *Arabia.*

recurva Wulff. 106. A. caule declinato paucifloro superne subpubescente, foliis lineari-subulatis sulcatis, inferioribus imbricatis recurvis, calycibus acutis nervosis corollam subaequantibus. *Alp. Europ. med. Caucas.*

hirsuta M. B. 107. A. caule declinato hirsuto, panicula multiflora, foliis lineari-subulatis, inferioribus imbricatis incurvis, calycibus acutis hirsutis corolla subbrevioribus. *Tauria. Caucas.*

verna 108. A. caule caespitoso erecto superne pubescente, foliis lineari-subulatis nervosis omnibus erectis, pedunculis sub-3fidis, calycibus acutis petala aequantibus. *Europ.* (A. caespitosa Ehrh.)

striata 109. A. caule erecto superne pubescente, foliis filiformibus subsubulatis patulis, pedunculis sub-2floris, sepalis oblongis obtusis striatis corolla capsulaque brevioribus. *Europ. med.* (A. liniflora Jacqu., saxatilis L., rostrata Kit., capillacea Allion.?)

liniflora 110. A. caule suffruticoso distorto, foliis filiformimibus erecto-appressis, pedunculis subgeminis terminalibus abbreviatis, sepalis lanceolatis striatis corolla brevioribus. *Austria. Hungar. Caucas.* (A. pinifolia M. B.)

condensata Presl. 111. A. caule suffruticoso caespitoso, foliis 4fariam imbricatis triquetro-subulatis glabris, pedunculis solitariis, sepalis 5nerviis acutis corolla brevioribus. *Sicilia. Lusitania.* (A. Juressi W. herb.)

squarrosa Mx. 112. A. caule suffruticoso erecto, foliis imbricatis subulatis patentibus glabris, ramis floriferis elongatis erectis pubescentibus subaphyllis, calycibus ovatis corolla capsulaque brevioribus. *Amer. bor.*

ſtricta Mx. 113. A. caule caeſpitoſo erecto glabro, foliis linearibus ſubulatis erectis, panicula pauciflora, ſepalis lanceolatis corolla brevioribus. *Canada.*

ramoſiſſima W. 114. A. caule ramoſiſſimo procumbente, foliis ſubulatis recurvis, pedunculis calycibusque hiſpidis, petalis ſepala acuminata aequantibus. *Hungar.*

† *glomerata* M. B. 115. A. caule baſi ramoſo incano-pubeſcente, foliis e latiore baſi ſubulatis ſtrictis ſubappreſſis, floribus capitato-glomeratis, calycibus acuminato-cuſpidatis ſcarioſis ſtriatis petala longe ſuperantibus. *Tauria.* (Minuartae dichotomae ſimillima.)

pungens Steph. 116. A. foliis radicalibus aggregatis filiformi-ſetaceis elongatis rigidis patulis, caule paucifloro ſtricto viſcoſo-pubeſcente, petalis calyces obtuſiusculos ſuperantibus. *Sibir.*

1714. CUCUBALUS.

bacciferus *Europa.* Herba brachialis et altior ramoſa pubeſcens, foliis ovato-oblongis ſubſeſſilibus, pedunculis axillaribus, floribus albis, baccis nigris.

1715. SILENE.

* *Caule unifloro.*

† *Calycibus clavatis.*

valleſia 1. S. caule procumbente, foliis tomentoſis, radicalibus ſpathulatis, ſuperioribus lanceolatis, calycibus amplis ſtriatis coloratis. *Alp. pennin. cott. lepontin.*

corſica Cand. 2. S. caule ſuffruticoſo erectiusculo ramoſo, foliis ſubfaſciculatis obovatis viſcoſo-tomentoſis, pedunculo terminali erecto calycibus breviori. *Corſica. Hiſpania?* (S. aſcendens Lag.?)

elegans Brot. 3. S. caule erectiusculo abbreviato, foliis linearilanceolatis acutis aggregatis, pedunculis elongatis capillaribus, calycibus glabris ſtriatis erectis. *Luſitania.*

depreſſa M. B. 4. S. caule ſimplici procumbente, foliis lanceolatis ciliatis ſcabris, floribus ſubſeſſilibus terminalibus, calyce viſcido, dentibus obtuſis. *Armenia. Caucaſ.*

noduloſa Viv. 5. S. caule erecto nodoſo, foliis hiſpidis, radicalibus ſpathulatis, ſupremis lanceolatis brevillimis, calycibus glabris. *Corſica.*

falcata Sm. 6. S. caule erectiusculo, foliis falcatis ſubulatis piloſis. *Olympus Aſiae minoris.*

Saxifraga 7. S. caule erecto foliisque linearibus acutis glabris, pedunculis elongatis, calycibus laevibus erectis. *Europ. med.*

petraea Kit. 8. S. caule erecto filiformi, foliis lineari-ſetaceis elongatis ſcabris, pedunculis elongatis, calycibus laevibus erectis. *Hungar.*

†† *Calycibus campanulatis.*

acaulis 9. S. caule abbreviato caeſpitoſo, foliis linearibus acutis, pedunculis erectis, calycibus glabris, petalis integris emarginatis. *Alp. Europ.* (S. exſcapa All.)

*dinarica** 10. S. caule caeſpitoſo, foliis linearibus elongatis glabris, pedunculis erectis pubeſcentibus, calycibus hirſutis nigreſcentibus, petalis 2fidis. *Alp. dinar.* (S. depreſſa Baumg.)

auriculata Sm. 11. S. caule erecto, foliis lanceolatis fimbriatis, calyce pubeſcente, petalis utrinque auriculatis. *Euboea.*

††† *Calycibus inflatis.*

Pumilio Wulff. 12. S. caule breviſſimo ſub-2phyllo, foliis linearilanceolatis laevibus, calyce maximo hirſuto, petalis repandis. *Alp. carn. nor. rhaet.* (Cucubalus L.)

** *Caule pauciflоro.*

† *Calycibus clavatis.*

Siegeri Baumg. 13. S. caule erecto ſimpliciſſimo foliisque oblongolanceolatis glabris ciliatis, floribus terminalibus ſubternis bracteatis, calycibus ſtriatis coloratis, petalis obcordatis crenulatis. *Alp. dinar.*

aegyptiaca 14. S. caule erecto tomentoſo, foliis obovatis acutiusculis, floribus pedunculatis terminalibus paucis, calycibus pubeſcentibus, petalis obcordatis utrinque appendiculatis. *Aegypt.*

ſpathulata M. B. 15. S. caule aſcendente ſubdichotomo, foliis villoſis, radicalibus ſpathulatis, caulinis obovatis ovatisque, floribus terminalibus pedunculatis paucis, calycibus hirtis. *Caucaſ.* (S. pygmaea Adam.)

penſylvanica Mx. 16. S. caule humili ramoſo lanato, foliis ſpathulatolanceolatis elongatis pubeſcentibus, pedunculis folia aequantibus paucifloris ſubcorymboſis, petalis emarginatis crenatis. *Amer. bor.*

repens Patrin. 17. S. radice repente, caule ſimpliciusculo, foliis linearibus acutis, floribus corymboſis, petalis bifidis, genitalibus exſertis. *Sibir.*

cretacea Fiſch. 18. S. caule ſuffruticoſo erecto ramoſo, foliis teretiusculis ſubulatis patentibus, pedunculis unifloris elongatis, calycibus glabris. *Sibir.*

caeſpitoſa Stev. 19. S. radice lignoſa, caule caeſpitoſo, foliis confertis linearibus acutis, floribus terminalibus ſubternis, petalis 2lobis. *Caucaſ.*

dianthoides Perſ. 20. S. radice lignoſa, caule erecto filiformi ſuperne viſcoſo, foliis linearibus integerrimis, floribus ſubpaniculatis ternis bracteatis, petalis emarginatis. *Armenia.* (Cucubalus ſaxifragus Schreb.)

linifolia W. 21. S. caule erecto debili, foliis linearibus, infimis ſpathulatis, calycibus ſubſecundis pubeſcentibus ſtriatis. *Hiſpania. Afric. bor.* (S. arenarioides Desf.?)

flaveſcens Kit. 22. S. caule ſimplici ſuperne ſubaphyllo foliisque ſpathulato-lanceolatis incano-villoſiusculis, calycibus ſubangulatis, petalis 2fidis. *Bannatus.*

†† *Calycibus cylindricis.*

cordifolia All. 23. S. caule ſuffruticoſo erecto ſimpliciusculo foliisque ſubcordato-ovatis acuminatis viſcido-pubeſcentibus, floribus terminalibus ſubſeſſilibus. *Alp. cott. pennin.*

foetida Link. 24. S. caule erecto ſimpliciusculo foliisque ovatis acutis villoſo-tomentoſis viſcoſis, floribus ſubternis terminalibus pedunculatis erectis. *Luſitan.*

halophila W. herb. 25. S. caule humili ſubramoſo, foliis ſpathulato-lanceolatis piloſo-glanduloſis, floribus pedunculatis axillaribus erectis. *Hiſpan. auſtr.* (S. proſtrata W. herb., hiſpanica Otth., parviflora Zea apud Poir.)

cryptantha Viv. 26. S. caule humili ramoſo, foliis obovatis acutiusculis connatis hirſutis, floribus axillaribus ſubſeſſilibus. *Ager tripolit.* Cella.

rotundifolia Nutt. 27. S. caule decumbente diffuſo, foliis oblongis utrinque attenuatis margine piloſis, pedunculis terminalibus 3fidis, calycibus hirſutis, petalis 4fidis. *Ad Ohio.*

††† *Calycibus inflatis.*

procumbens Murr. 28. S. caule procumbente, foliis lanceolatis acutis glabris, floribus pedunculatis axillaribus, petalis emarginatis. *Sibir.* (Cucubalus polyphyllus Fiſch.)

fabaria Sm. 29. S. caule humili, foliis ſubrotundo-obovatis glaberrimis carnoſis glaucis, pedunculis ſubumbellatis, petalis linearibus 4fidis. *Creta. Sicilia?* (Cucubalus fabarius L.)

*** *Floribus ſparſis ſubſolitariis.*

† *Calycibus clavatis.*

canopica Delil. 30. S. caule herbaceo erecto glanduloſo-piloſo viſcoſo, ramis angulatis, foliis inferioribus ſpathulatis ſuperioribus lanceolatis villoſis, pedunculis axillaribus remotis demum reflexis. *Aegypt. ſuper.*

anguſtifolia M. B. 31. S. caule ſimplici aſcendente, ramis alternis 1floris, foliis linearibus elongatis glabris, calycibus pubeſcentibus. *Caucaſ.*

xeranthema Viv. 32. S. caule aſcendente foliisque lanceolatis hirſutis, pedunculis axillaribus oppoſitis ſub-1floris, calycibus glanduloſo-hirſutis albicantibus, petalis elongatis. *Corſica.*

chloraefolia Sm. 33. S. caule erecto, foliis ovatis mucronatis glaucis glaberrimis, calycibus laeviſſimis. *Armenia. Caucaſ.*

Urvillii Schott. 34. S. caule ſuffruticoſo ramoſiſſimo, ramis ſuperne nudis ſub-1floris, foliis brevibus faſciculatis mucronatis, calycibus laevibus ſtriatis. *Inſ. Cos.*

†† *Calycibus campanulatis.*

quadridentata Cand. 35. S. caule gracili erecto ſubramoſo, ramis 1floris, foliis linearibus patentibus, calycibus glaberrimis, petalis 4dentatis. *Europ. med.* (Silene 4fida et Cucubalus 4fidus L. Lychnis 4dentata Murr. Silene puſilla Kit. var.)

rupeſtris 36. S. caule erecto ſubdichotomo foliisque ovato-oblongis acutis glaberrimis, pedunculis elongatis 1floris ſubcorymboſis, petalis emarginatis. *Alp. Europ. med. et bor.* (S. Kaulfuſsii *.)

caryophylloides Cand. 37. S. caule ſtricto nodoſo, foliis linearibus ſubulatis ſub-3nerviis pubeſcentibus, ramis 1floris, calycibus glabris, petalis 2lobis. *Aſia minor.* (Cucubalus Poir.)

ſedoides Jacqu. 38. S. caule erecto dichotomo glanduloſo-piloſo, ramis patentibus, foliis ſpathulato-oblongis villoſiusculis, pedunculis axillaribus demum reflexis, petalis obcordatis. *Gallia auſtr. Sicilia. Graecia.* (S. ramoſiſſima Sibth., divaricata Clem.)

††† *Calycibus cylindricis.*

noctiflora 39. S. caule erecto hirſuto ſuperne viſcoſo, foliis inferioribus ſpathulatis ſuperioribus lanceolatis, pedunculis axillaribus abbreviatis, calycis coſtati dentibus elongatis, petalis 2fidis crenulatis. *Europ. med.*

ornata Ait. 40. S. caule ramoſo viſcoſo pubeſcente, foliis oblongo-lanceolatis, pedunculis axillaribus, calycibus coſtatis, petalis 2lobis. *C. B. S.*

laciniata Cav. 41. S. caule herbaceo tereti pubeſcente, foliis lanceolatis ſubvilloſis, calycibus pedunculatis terminalibus coſtatis, petalis longe unguiculatis 4fidis. *Mexico.*

†††† *Calycibus conicis ventricoſis.*

conica 42. S. caule erecto ſuperne 2partito, foliis lineari-lanceolatis pubeſcentibus, calycibus 30ſtriatis, petalis ſubintegris emarginatis. *Europ. med.* (S. conoidea L.)

††††† *Calycibus inflatis.*

pendula 43. S. caule erecto ramoſo pubeſcente, foliis oblongis acutis, pedunculis axillaribus remotis demum reflexis, calycibus coſtatis. *Europ. auſtr.* (S. ſcabriflora Brot. var. capſulis erectis?)

**** *Floribus racemoſis ſecundis.*

† *Calycibus clavatis.*

ſericea All. 44. S. foliis ſpathulato-lanceolatis ſericeo-villoſis (villoſiſſimis et glabris), calycibus ſtriatis glabris, petalis longe unguiculatis. *Europ. auſtr.* (S. caneſcens Tenor., decumbens Bivon., pubeſcens Loiſ., litorea Brot., ciliata et geminiflora W.)

bellidifolia Jacqu. 45. S. erecta pubeſcens, foliis ſpathulato-lanceolatis acutis, racemis 2partitis, calycibus glabriusculis, petalis 2lobis. *Luſitania. Afric. bor. Ins maris aegei.* (S. veſpertina Retz., bipartita Desf., diſtachya Brot.)

Pourretii Poir. 46. S. erecta pubeſcens, foliis inferioribus lanceolatis acutis, ſuperioribus linearibus ciliatis, racemo ſpicato ſecundo ſimplici, calycibus glabris. *Hiſpan.* (S. ciliata Pour., arvatica et legionenſis Lag.)

nicaeenſis All. 47. S. caule erecto hirſuto ſuperne viſcoſo, foliis lanceolatis obtuſiusculis hirſutis, calycibus coloratis ſtriatis viſcoſis. *Liguria. Corſica. Hiſpan. Sicil. Afric. bor.* (S. viſcoſiſſima Tenor., arenaria Desf., Pſammitis Link.)

laxiflora Brot. 48. S. caule dichotome ramoſo hirſuto, foliis lanceolatis pubeſcentibus, calycibus remotis ſtriatis hirſutiſſimis breviter pedunculatis. *Luſitania. Hiſpania.* (S. ſabuletorum Link., eriophora W. herb.)

ſupina M. B. 49. S. caule ſuffruticoſo ramoſo aſcendente, foliis linearibus mucronatis incano-pubeſcentibus, calycibus breviter pedunculatis tomentoſis. *Tauria. Caucaſ.*

obtuſifolia W. 50. S. caule ramoſo villoſo ſublanato, foliis ſpathulatis obovatis obtuſis glabriusculis, calycibus ſubſeſſilibus hirſutis coſtatis. *Nepal.* (S. colorata Fiſch.)

hiſpida Desf. 51. S. caule ramoſo hiſpido, foliis lanceolatis ſubtus ſub-3nerviis ciliatis, calycibus erectis hirſutiſſimis confertis. *Ager romanus. Atlas.* (S. trinervia Sebaſt., diſticha W.)

imbricata Desf. 52. S. caule ramoſo hiſpido, foliis lanceolatis villoſis, racemis elongatis ſecundis, floribus confertis ſubſeſſilibus, calycibus glabris. *Afric. bor.*

craſſifolia 53. S. caule ramoſo hirſuto, foliis obovato-orbiculatis carnoſis utrinque piloſis, racemo terminali, calycibus hirſutis, petalis emarginatis. *C. B. S.*

cernua Thunb. 54. S. caule filiformi foliisque lineari-lanceolatis villoſis, calycibus hirſutiusculis ſubſeſſilibus. *C. B. S.* (S. Burchellii Otth.)

† *pernoctans* Link. 55. S. caule ſuperne nudo 2fido foliisque radicalibus ſpathulatis villoſiusculis, racemis virgatis, calycibus glabriusculis eſtriatis erectis pedunculatis. *Luſitania?*

†† *Calycibus cylindricis ſ. ovato-cylindricis ſtriatis.*

anglica 56. S. caule ramoſo piloſo ſubviſcido, racemo foliato laxo, foliis ſpathulato-lanceolatis, calycibus hirſutis alternis, petalis emarginatis. *Anglia.*

gallica 57. S. caule ramoſo hirſuto viſcoſo, foliis oblongo-lanceolatis, calycibus hirſutis, petalis integerrimis. *Gallia.*

luſitanica 58. S. caule ramoſo dupliciter glanduloſo-piloſo, foliis ſpathulatis lanceolatisque, calycibus hirſutiſſimis, petalis integris crenulatis. *Europ. auſtr.*

cerastoides 59. S. caule simpliciusculo, foliis inferioribus spathulatis superioribus lanceolatis villosiusculis, racemo spicato terminali nudo, calycibus subsessilibus confertis, petalis emarginatis. *Italia. Hispania.* (L. rigidula L., micropetala Lag., micrantha Link.)

quinquevulnera 60. S. caule ramoso piloso subviscido, foliis lanceolatis, racemo foliato laxo, calycibus hirsutis alternis, petalis integerrimis. *Anglia. Europ. med.* (S. ocimoides Desf. et pedicellata Poir.)

tridentata Desf. 61. S. caule ramoso hirsuto, foliis spathulato-lanceolatis, calycibus subsessilibus, dentibus elongatis, petalis 3dentatis. *Afric. bor.*

brachypetala Cand. 62. S. caule ramoso substrigoso, ramis divaricatis foliisque obovatis lanceolatisque incano-subtomentosis, floribus breviter pedicellatis, petalis bifidis calyce brevioribus. *Ad Massiliam.*

*chia** 63. S. caule erecto simplici piloso, foliis inferioribus spathulatis, superioribus lanceolatis acutis nitidis, calycibus subsessilibus, petalis obcordatis. *Inf. Chios.* (S. sciotica Otth.)

nocturna 64. S. caule elato hirsuto, foliis inferioribus spathulatis subdentatis superioribus lineari-lanceolatis, calycibus subsessilibus striatis, petalis 2fidis calycem superantibus. *Europ. austr. Amer. bor.* (S. setacea Otth.)

mutabilis 65. S. caule erecto hirsuto, foliis omnibus linearilanceolatis, calycibus pedunculatis 10sulcatis, petalis 2fidis calycem subsuperantibus. *Italia. Hispan.* (S. micropetala Cand., hirsuta Lag.)

clandestina Jacqu. 66. S. caule ramoso, foliis inferioribus ovato-oblongis cinereo-pubescentibus, calycibus subsessilibus, petalis 2fidis calycem subsuperantibus. *Afric. bor.* et *austr.* (S. cinerea Desf., nyctantha W.)

apetala W. 67. S. caule ramoso, calycibus foliisque lanceolatis pubescentibus, ramis patulis racemosis, floribus apetalis. *Patria?*

setacea Viv. 68. S. caule erecto subhirsuto, foliis lineari-lanceolatis, summis latioribus, racemo paucifloro, calycibus incanis, petalis lineari-setaceis 2partitis calycem longe superantibus. *Ad Syrtim magnam Afric. bor.*

articulata Viv. 69. S. caule erecto nodoso, foliis oblongis subhirsutis ciliatis, racemo paucifloro, calycibus striatis hispidis, petalis 2fidis calycem subsuperantibus. *Ad Syrtim magnam Afric. bor.*

ligulata Viv. 70. S. caule erecto hirsutiusculo, foliis linearibus ciliatis, racemo paucifloris, calycibus pedunculatis hispidis, petalis 2partitis obtusis, squamis coronae faucis spathulatis. *Ager Tripolit.*

† *discolor* Sm. 71. S. caule diffuso, foliis obovatis, calycibus villosis, squamis coronae faucis emarginatis. *Cyprus.*

† *thymifolia* Sm. 72. S. caule suffruticoso procumbente ramosissimo, foliis ovato-oblongis, calycibus hirtis glutinosis, squamis coronae faucis emarginatis. *Cyprus. Asia minor.*

iberica M. B. 73. S. caule ramoso, ramis divaricatis, foliis lanceolatis pubescentibus, racemis 2partitis, calycibus glabris. *Iberia. Asia minor.* (S. divaricata Sm.)

††† *Calycibus ovato-conicis subventricosis striatis.*

dichotoma Ehrh. 74. S. caule erecto pilosiusculo, foliis spathulatis oblongo-lanceolatis, racemo spicato 2partito, calycibus subsessilibus nutantibus 10costatis villoso-viscosis, petalis 2partitis. *Hungar. Macedonia. Moesia infer. Tauria. Asia minor.* (S. 3nervis Soland. apud Russel. sessiliflora Desf. apud Poir.)

†††† *Calycibus inflatis.*

jenisseensis W. 75. S. caule erecto foliisque lineari-lanceolatis laevibus, pedunculis geminis erectis racemosis secundis, calycibus 10angulatis apice bracteisque scariosis, squamis coronae faucis 4partitis. *Sibir.* (S. graminifolia Otth., altaica Pers. Cucubalus fruticulosus Pall. ab ipso auctore accept.)

***** *Floribus paniculatis,*

† *erectis.*

a. Calycibus clavatis.

Armeria 76. S. panicula corymbosa, bracteis obsoletis, caule erecto foliisque subcordato-ovatis glaberrimis, calycibus coloratis, petalis integris. *Europ.*

compacta Hornem. M.B. 77. S. panicula compacta, bracteis dilatatis pedicellos superantibus, caule elato foliisque ovato-oblongis glaberrimis, calycibus coloratis, petalis integris. *Caucas. Transsylvan.*

Atocion Jacqu. 78. S. panicula simplici corymbosa, petalis 2lobis utrinque subulato-dentatis, caule erecto pubescente superne viscoso, foliis spathulato-lanceolatis ciliatis. *Cyprus. Asia minor.* (S. orchidea L. suppl.)

Pseudatocion Desf. 79. S. panicula subfasciculata, calycibus pubescentibus, petalis integerrimis, caule erecto foliisque oblongis obtusiusculis pubescentibus. *Sicil. Africa.*

Lerchenfeldiana Baumg. 80. S. panicula simplici corymbosa pauciflora, calycibus glaberrimis, petalis emarginatis, caule filiformi foliisque oblongo-lanceolatis subcrenulatis glaberrimis. *Alp. dinar.*

caespitosa Stev. 81. S. panicula subcapitata, calycibus tomentosis, caule simpliciſſimo elongato foliisque subulatis carnosis glabriusculis. *Caucas.*

congesta Sm. 82. S. panicula congesta, bracteis ellipticis ciliatis, calycibus hirtis, fauce petalorum nuda, caule foliisque spathulatis pubescentibus. *Attica.*

†*staticifolia* Sm. 83. S. panicula simplici corymbosa, foliis spathulato-linearibus glaberrimis. *Peloponnes.*

velutina Pourr. 84. S. caule elato foliisque lanceolatis obtusis incano-tomentosis, panicula corymbosa terminali, calycibus villoso-tomentosis. *Corsica.*

canariensis W. herb. 85. S. caule simplici stricto angulato, foliis pubescentibus, radicalibus spathulatis, caulinis lanceolatis acutis, paniculae congestae terminalis ramis subsecundis. *Teneriffa.* Brousonet.

Gypsophila Desf. 86. S. caule ramoso incano-pubescente, foliis lineari-lanceolatis acuminatis, paniculae ramis verticillatis, calycibus angulatis hirsutiusculis. *Patria?*

sibirica Pers. 87. S. caule simpliciusculo foliisque oblongis utrinque attenuatis pubescentibus, paniculae ramis verticillatis subviscosis, petalis emarginatis. *Sibir.* (Cucubalus L.)

virginica 88. S. caule erecto sublanato superne viscoso, foliis oblongo-lanceolatis acutis ciliatis, panicula corymbosa, calycibus villoso-viscosis, petalis 2fidis utrinque 1dentatis. *Amer. bor.* (S. Catesbaei Walt. W., cheiranthoides Poir.)

regia Sims. 89. S. caule erecto, foliis oblongo-lanceolatis, panicula corymbosa, calycibus pubescentibus, petalis lanceolatis acutis indivisis. *Ad Missisippi.*

† *Baldwini* Nutt. 90. S. caule erecto foliisque lanceolatis pilosis, panicula trichotoma, petalis divaricato-laciniatis. *Florida.*

Bergeri Schott. 91. S. caule simplici basi foliisque lanceolatis pilosiusculis, panicula subcorymbosa pauciflora, calycibus hispidis, petalis obcordatis. *Italia.*

fruticosa 92. S. caule suffruticoso foliisque spathulato-lanceolatis acutis ciliatis glabris, panicula trichotoma, calycibus viscidis, petalis 2lobis. *Sicil.*

bupleuroides 93. S. caule herbaceo foliisque spathulatis acutis subcoriaceis glabris, paniculae simplicis bracteis pedicellos superantibus, calycibus villoso-viscidis, petalis 2lobis reticulatis. *Armenia. Persia.*

molliſſima Sm. 94. S. caule herbaceo foliisque subcarnosis sericeo-villosis, radicalibus ovato-spathulatis, panicula corymbosa subtrichotoma, petalis 2fidis fauce nudis. *Asia minor.* (Cucubalus L.)

*pilosa** 95. S. caule erecto superne viscoso, foliis incano-subvillosis, radicalibus spathulatis, caulinis lanceolatis, panicula trichotoma diffusa, petalis 2partitis fauce subcoronatis. *Italia. Hungar. Transsylvan.* (Cucubalus pilosus W., molliſſimus Kit., Viscago molliſſima Baumg.)

patula Desf. 96. S. caule simplici piloso superne viscoso, foliis radicalibus ovato-oblongis acutis petiolatis, caulinis lanceolatis, paniculae ramis oppositis, floribus congestis, calycibus glabriusculis, petalis 2partitis coronatis. *Germania. Hungar. Afric. bor.* (S. nemoralis Kit. Cucubalus floccosus Ficin.)

longiflora Ehrh. 97. S. caule elato colorato foliisque lineari-lanceolatis glaberrimis, panicula elongata simplici, calycibus coloratis laevibus, petalis 2fidis. *Hungar. Transsylvan.*

caesia Sm. 98. S. caule ramoso superne viscoso foliisque radicalibus obovatis acutis glauco-villosis, panicula corymbosa, petalis 2partitis linearibus. *Graec.*

laevigata Sm. 99. S. foliis ellipticis, panicula patula, calycibus laevissimis enerviis, petalis angustis fauce nudis. *Cyprus.*

juncea Sm. 100. S. foliis spathulatis scabris, panicula patula, petalis angustis, squamis coronae 3dentatis. *Asia minor.*

ramosissima Sm. 101. S. caule ramosissimo foliisque spathulatis recurvis hirsutis, panicula patula, calycibus 10gonis, squamis coronae faucis 4fidis. *Creta.*

leucophaea Sm. 102. S. foliis oblongo-linearibus recurvis glutinosis, calycibus 10gonis, petalis angustis 2partitis, squamis coronae 2fidis. *Cyprus.*

rigidula Sm. 103. S. caule ramoso, foliis lanceolatis glabris, petalis acutis 2partitis, squamis coronae 4dentatis. *Attica.*

spinescens Sm. 104. S. caule suffruticoso, ramis oppositis horizontalibus spinescentibus, foliis spathulatis pubescentibus, panicula patula. *Asia minor.*

paradoxa 105. S. caule herbaceo erecto superne viscoso, foliis glabris lanceolatis, paniculae ramis oppositis patentibus sub-3floris, floribus polygamis (♂ et ♀), squamis coronae serratis. *Italia.*

italica Cand. 106. S. caule herbaceo erecto pubescente, foliis spathulato-lanceolatis, paniculae ramis viscosis subi-floris, calycibus pubescentibus, petalis fauce nudis. *Italia. Gallia.* (Cucubalus italicus L., Silenoides Vill. Silene Salzmanni Otth.)

catholica Otth. 107. S. caule erecto ramosissimo superne viscoso, foliis infimis spathulatis superioribus lanceolatis glabris, paniculae ramis laxis diffusis, calycibus coloratis glabris, petalis angustis fauce nudis, gentalibus exsertis. *Sicilia.* (Cucubalus catholicus L., glutinosus Retz., Silene Mussini Horn.)

reticulata Desf. 108. S. caule erecto superne viscoso ramoso, ramis virgatis, foliis lineari-lanceolatis glabris, paniculae ramis laxis unifloris, calycibus coloratis glabris, petalis obcordatis venosis basi utrinque 1dentatis. *Afric. bor.* (S. picta Pers., anastomosans Lag., grata Henckel.)

portensis 109. S. caule ramosissimo glabriusculo, foliis linearibus, ramis paniculae 1floris elongatis patulis, calycibus striatis glabris, petalis 2fidis. *Gallia. Lusitania.* (S. bicolor Thor.)

polyphylla 110. S. caule ramoso erecto, foliis fasciculatis linearisetaceis glaucis, paniculae ramis 3floris, petalis bifidis calyces longe superantibus. *Transsylvan.*

stricta 111. S. caule stricto ramoso glabriusculo, foliis lanceolatis, paniculae simplicis ramis foliatis, pedunculis abbreviatis, petalis emarginatis calycem subexcedentibus. *Franconia. Gallia austr.* (S. linaccola Wibel.)

Muscipula 112. S. caule superne viscoso dichotomo, foliis lanceolatis subfasciculatis glabriusculis, panicula

ramis dichotomis, calycibus glabris mediis breviter pedicellatis, petalis 2fidis. *Hiſpania. Italia. Afric. bor.*

inaperta 113. S. caule ramoſo glabro, foliis lineari-lanceolatis, paniculae ramis laxis 1floris, floribus ſub-5andris, petalis breviſſimis emarginatis. *Europ. auſtr.*

β. Calycibus campanulatis.

alpeſtris Jacq. 114. S. caule laevi dichotomo, foliis lineari-lanceolatis, paniculae ſimplicis ramis erectis glutinoſis, calycibus laevibus, petalis 4fidis. *Alp. Auſtr. Hungar.* (Lychnis alpeſtris L.)

rubella 115. S. caule ſimpliciusculo glabriusculo, foliis obovato-oblongis ſerrulato-ciliatis, panicula ſimplici, calycibus glabris tenuibus ſtriatis, petalis emarginatis breviſſimis conniventibus, corona faucis coalita. *Aegypt. Luſitania.* (S. micropetala Cand.?)

ſuculenta Delil. 116. S. caule diffuſo ramoſo, foliis obovatis carnoſis ramisque ſubpaniculatis villoſo-viſcoſis, petalis 2fidis involutis longe unguiculatis, ovario apice 3corni. *Aegypt.*

Otites Perſ. 117. S. caule ſtricto pubeſcente ſuperne oligophyllo, foliis inferioribus ſpathulatis villoſiusculis, paniculae ramis verticillatis, floribus dioecis, petalis linearibus indiviſis fauce nudis. *Europ.* (Cucubalus Otites L.)

volgenſis * 118. S. caule elato glabriusculo folioſo, foliis lanceolatis ſcabris ciliatis, paniculae decompoſitae ramis verticillatis, calycibus ſtriatis glabris, floribus hermaphroditis, petalis linearibus genitalia aequantibus. *Ad Volgam.* (Cucubalus W.)

parviflora Perſ. 119. S. caule erecto pubeſcente folioſo, foliis lineari-lanceolatis acuminatis glabriusculis, paniculae decompoſitae ramis verticillatis, calycibus ſtriatis, genitalibus longe exſertis, petalis linearibus ciliatis fauce nudis. *Hungar. Transſylvan.* (Cucubalus parviflorus Kit., effuſus Fiſch., caeſpitoſus Poir.)

multiflora Perſ. 120. S. caule ſimpliciſſimo viſcoſo, foliis ſcabris, radicalibus ſpathulatis, caulinis linearibus, paniculae ramis verticillatis, calycibus ſtriatis coloratis, petalis 2fidis planis. *Hungar. Transſylvan.*

fuſcata Link. Brot. 121. S. caule ſimplici glanduloſo-pubeſcente, foliis lanceolatis, floribus paniculatis breviter pedicellatis, calycibus viſcidis ſtriatis ſubcoloratis, petalis ſubemarginatis. *Luſitan.*

γ. Calycibus ovatis.

antirrhina 122. S. caule ramoſo foliisque lanceolatis pubeſcentibus, paniculae ſimplicis corymboſae ramis 3fidis, petalis emarginatis. *Virginia.*

ovata Pursh. 123. S. caule simplici, foliis ovato-lanceolatis acuminatis glabriusculis, panicula simpliciuscula, genitalibus exsertis. *Georgia. Carolina.*

cretica 124. S. caule elato foliisque oblongo-lanceolatis scabriusculis, paniculae diffusae foliatae ramis viscidis, calycibus 10gonis glabris, petalis 2fidis. *Creta.*

indica Roxb. 125. S. caule altissimo ramoso pubescente, foliis late lanceolatis, calycibus striatis reticulatis, dentibus longis obtusiusculis, petalis 2fidis basi utrinque 1dentatis. *Nepal.*

δ. Calycibus inflatis.

spergulifolia M. B. 126. S. caule herbaceo foliisque fasciculatis linearibus incano-villosiusculis, ramis divaricatis subpaniculatis, pedunculis ternis, calycibus bracteatis 10angulis hirsutis, petalis 2fidis. *Caucas. Armenia.* (Silene polyphylla M. B. Cucubalus spergulifolius Desf. fruticulosus Pall. it. 2. app. T. *)

lanuginosa Bertol. 127. S. caule suffruticoso ramoso pubescente, foliis lanceolato-linearibus subcarnosis 3nerviis margine lanatis, panicula dichotoma, calycibus reticulato-venosis, petalis 4fidis. *Alp. apuan.*

†† *Floribus paniculatis nutantibus.*

α. Calycibus clavatis.

saxatilis M. B. 128. S. caule simpliciusculo oligophyllo foliisque lanceolato-linearibus glabris, paniculae ramis oppositis 3floris, calycibus striatis, petalis angustis 2fidis. *Caucas.*

macropetala * 129. S. caule glabro viscoso, foliis lanceolatis cartilagineo-ciliatis scabris, paniculae ramis dichotomis glutinosis, petalis 2fidis reflexis elongatis. *Syria.* (S. longipetala Vent.)

longicilia Otth. 130. S. caule pubescente superne viscoso, foliis lanceolatis cuspidatis pubescentibus margine lanato-ciliatis, calycibus glabriusculis striatis, petalis fauce 2callosis. *Lusitania.* (Cucubalus longicilius Brot.)

nutans 131. S. caule simplici ascendente villoso, foliis oblongis acutis pubescentibus, floribus pendulis, calycibus viscoso-villosiusculis, petalis 2partitis. *Europ. nemora.*

livida W. 132. S. caule hirsuto flexuoso infracto superne viscoso, foliis oblongo-lanceolatis pubescentibus, paniculae ramis secundis, calycibus viscidis, petalis 2partitis lividis. *Carniolia.*

infracta Kit. 133. S. caule infracto foliisque lanceolatis glaberrimis, paniculae ramis subsecundis, calycibus laevibus striatis, petalis 2partitis. *Hungar.*

amoena 134. S. caule ascendente, ramis divaricatis, foliis lanceolatis subtus pubescentibus, paniculae diffusae ramis subsecundis 3floris, calycibus villosis, squamis coronae subcoalitis. *Tataria.*

β. Calycibus cylindricis.

viridiflora 135. S. caule foliisque ovato-oblongis hirſutis, paniculae ramis brachiatis viſcoſis, calycibus villoſis, petalis 2fidis. *Luſitania. Tauria.*

chlorantha Ehrh. 136. S. caule foliisque oblongis acutis glabris, paniculae ramis ſecundis bracteatis, calycibus glabriusculis, petalis anguſtis 2fidis. *Marchia Brandeb. Sileſia.* (Cucubalus chloranthus W.)

gigantea 137. S. caule erecto villoſo ſuperne glutinoſo, foliis inferioribus obovatis concavis carnoſis pubeſcentibus, paniculae ramis ſubverticillatis abbreviatis, calycibus pubeſcentibus, corona faucis obſoleta. *Africa?*

viſcoſa Perſ. 138. S. caule ſimplici villoſiſſimo villoſo, foliis lanceolatis undulatis, panicula ſubſpicata ſtricta, pedicellis ſub-3floris, petalis fauce nudis. *Dania. Suecia. Lithuania. Caucaſ. Ad Volgam.* (Cucubalus viſcoſus L.)

tatarica Perſ. 139. S. caule ſimpliciſſimo folioſo glabro, foliis lanceolatis, panicula ſpicata ſtricta, pedunculis oppoſitis ſecundis decumbentibus, petalis fauce nudis. *Neomarchia. Lithuania. Ruſſia. Sibir.* (Cucubalus L.)

latifolia Horn. 140. S. caule ramoſo elato foliisque ovato-oblongis ſubtus hirſutis, paniculae diffuſae ramis viſcoſiſſimis, pedicellis calycibusque coloratis villoſiusculis, petalis longe unguiculatis 2partitis fauce coronatis. *Patria?*

γ. Calycibus inflatis.

inflata Sm. 141. S. caule ramoſo foliisque ovato-oblongis glabris ſ. pubeſcentibus, calycibus ovato-globoſis reticulatis laevibus, petalis fauce nudis 2fidis. *Europ.* (Cucubalus Behen L... S. maritima W. 1flora Roth. ſaponariae folia Schott. Cucubalus anguſtifolius Tenor. niveus Nutt. varr.)

Behen 142. S. foliis obovato-lanceolatis, panicula corymboſa, calycibus reticulatis, petalis obcordatis fauce coronatis. *Graecia. Aſia minor.*

ſtellata Ait. 143. S. caule erecto pubeſcente, foliis quaternis lanceolatis ſcabris ciliatis, panicula racemoſa, calycibus campanulatis glabris, petalis profunde crenato-fimbriatis fauce nudis. *Amer. bor.* (Cucubalus ſtellatus L.)

fimbriata Sims. 144. S. caule ramoſo foliis ovato-oblongis ſubtus pubeſcentibus, calycibus ampliſſimis pubeſcentibus, petalis fimbriatis fauce nudis. *Caucaſ.* (Cucubalus M. B.)

lacera Sims. 145. S. caule aſcendente foliisque ſpathulatis hirſutis, calycibus ampliſſimis campanulatis, petalis multifidis. *Caucaſ.* (Cucubalus Stev.)

colorata Schousb. 146. S. caule ramoſo declinato pubeſcente, foliis oblongis acutis 3nerviis, panicula trichotoma, calycibus venoſis, petalis 2partitis utrinque 1dentatis, ſquamis coronae denticulatis. *Mauritania.*

1716. CHERLERIA.

ſedoides 1. Ch. foliis 3gonis obtuſis ſub-3nerviis, floribus terminalibus pedunculatis 5partitis, pedunculis glabris. *Alp. Europ. med. et Scotiae.*

ſtellata Clark. 2. Ch. foliis 3gonis obtuſis apice ſtellato-patentibus, floribus terminalibus pedunculatis 5partitis, pedunculis hiſpidis. *Parnaſſus.*

octandra Sieb. 3. Ch. foliis planiusculis concavis ſubtus 3coſtatis, floribus ſeſſilibus 4partitis. *Alp. rhaet.*

1717. GARIDELIA.

Nigellaſtrum 1. G. floribus ſub-10andris, nectariis ſeſſilibus patentibus. *Gallia auſtr.*

unguicularis Lam. 2. G. floribus polyandris, nectariis longe unguiculatis cordatis erecto-conniventibus. *Syria.*

1718. DIAPHORA Lour.

cochinchinenſis Lour. *Cochinchina.* Gramen culmo 3quetro foliis ſubulatis, paniculis ſpicatis.

TETRAGYNIA.

1719. MICROPETALON Perſ.

lanceolatum Perſ. 1. M. caule foliisque lanceolatis glaberrimis, floribus paniculatis corollatis. *Amer. bor.* (Spergulaſtrum Mx.)

lanuginoſum Perſ. 2. M. caule foliisque lanceolatis ſublanatis, floribus ſubſolitariis longe pedunculatis apetalis. *Carolin. Louſiana.* (Spergulaſtrum Mx.)

PENTAGYNIA.

1720. CERASTIUM.

* *Fructibus ovato-globoſis.*

aquaticum 1. C. caule dichotomo piloſo ſuperne viſcoſo, foliis cordatis ſeſſilibus, pedunculis axillaribus foliis fructiferis reflexis, denticulis capſulae 5, oblongis rectis. *Europ. aquoſa.* (Stellaria aquatica Scop. Larbrea Hilar.)

maximum 2. C. caule diffuſo foliisque lanceolatis pubeſcentibus, floribus corymboſis, petalis 2lobis crenatis, capſula calycem aequante. *Sibir.*

rupeſtre Fiſch. 3. C. caule proſtrato ramoſo foliisque ovato-lanceolatis pubeſcentibus, pedunculis axillaribus ſolitariis, petalis 2lobis calycem obtuſum longe ſuperantibus, capſula calycem aequante. *Sibir.*

fontanum Baumg. 4. C. caule repente ſub-4gono hirſuto, foliis piloſis, radicalibus ſpathulatis caulinis ovatis, floribus

bus paniculatis, petalis 2fidis calyce brevioribus. *Transsylvan.*

manticum 5. C. caule erecto stricto foliisque lineari-lanceolatis glaberrimis, pedunculis elongatis rectis, sepalis oblongis margine membranaceis corolla brevioribus, capsula calycem subaequante. *Italia. Helvetia. Hungar.*

dioecum Ait. 6. C. caule erecto villoso-viscoso, foliis linearibus patentibus, floribus corymbosis, sepalis acutis corolla brevioribus. *Hispan.*

incanum Ledeb. 7. C. caule erecto foliisque oblongo-linearibus acutis incano-pubescentibus, pedunculis trichotomis, calycibus corolla breviorihus capsulam superantibus. *Sibir.*

heterophyllum Viv. 8. C. foliis glabriusculis, inferioribus ovatis superioribus lineari-lanceolatis, calycibus hirsutis corollam superantibus. *Corsica.*

elongatum Pursh. 9. C. hirsutum, foliis linearibus elongatis divaricatis, panicula terminali trichotoma longe pedunculata, calycibus acutis corolla brevioribus. *Ora occid. Amer. bor.*

ciliatum Kit. 10. C. caule stricto, foliis fasciculatis linearibus supra scabris subtus revolutis glabris, pedunculis terminalibus elongatis subcorymbosis, petalis 2fidis calyces obtusos multo superantibus. *Croatia.* (C. matrense Kit. *)

serpyllifolium M. B. 11. C. caule ascendente pubescente superne aphyllo, foliis oblongis obtusis glabriusculis, sepalis obtusis glandulosis corolla brevioribus. *Sibir.*

Searani Tenor. 12. C. caule diffuso lanato, foliis oblongo-lanceolatis acutis utrinque subtomentosis, pedunculis fructiferis horizontalibus, corolla calycem duplo excedente. *Neapol.*

fimbriatum Ledeb. 13. C. caule diffuso angulato piloso, foliis lanceolatis acuminatis glabris ciliatis, petalis multifidis. *Sibir.*

** *Fructibus oblongo-cylindricis.*

† *Corolla calycem superante.*

grandiflorum Kit. 14. C. caule repente foliisque linearibus margine revolutis incano-tomentosis, paniculae ramis patentibus, petalis sepala margine scariosa sub-3plo superantibus. *Hungar. Iberia.* (C. argenteum M. B.)

tomentosum 15. C. caule repente, foliis lineari-oblongis obtusiusculis lanato-tomentosis, panicula dichotoma, petalis obcordatis calyce duplo longioribus. *Europ. med. et austr. Tauria.* (C. repens M. B.)

arvense 16. C. caule declinato, foliis lineari-oblongis obtusiusculis pubescentibus, petalis calyce longioribus, capsulis apice obliquo inaequaliter dentatis. *Europ. Asia. Afric. Amer. bor.* (C. repens L. hirsutum Tenor.)

lanatum Lam. 17. C. caulibus caeſpitoſis, ſterilibus proſtratis fo-
riferis erectiusculis, foliis ovali-ſubrotundis
natis, pedunculis ſubbifloris, petalis emargi-
tis. *Pyren. et alp. Europ. auſtr.* (C. villoſum
Baumg.)

latifolium 18. C. caulibus caeſpitoſis aſcendentibus ſubbiflo-
ris, foliis ovalibus hirſutis, petalis obcordat
capſula apice 10dentata. *Alp. Europ. med.*

alpinum 19. C. caule erecto paucifloro, foliis ovatis acu-
tiusculis ſubhirſutis, petalis obcordatis, capſula
elongata. *Alp. Europ.* (C. glabratum Hartm.)

ovatum Hopp. 20. C. caule erecto, foliis ovatis acutis glabris
ſubciliatis, floribus terminalibus ſubcorymboſis.
Carinthia. (C. carinthiacum Veſt.)

glaciale Gaud. 21. C. caule caeſpitoſo villoſo-viſcoſo ſubbiflo
foliis ſpathulato-lanceolatis, pedunculis fruc
feris divaricatis, capſula cylindrica calycem dup
excedente. *Mons Gotthard.*

davuricum Fiſch. 22. C. caule erecto foliisque cordato-oblongis am-
plexicaulibus glaberrimis, pedunculis termina-
bus aggregatis divaricatis, petalis obcordatis
pala oblonga ſuperantibus. *Davuria.*

campanulatum Viv. 23. C. caule erecto ramoſo villoſo, foliis radica
bus ſpathulatis, caulinis oblongis, panicula di-
chotoma, petalis 2fidis calyce duplo longioribus.
Italia. Hungar. (C. praecox Tenor. ſylvaticum
Kit.)

frigidum M. B. 24. C. caule ramoſo aſcendente, foliis hirſutis, ra-
dicalibus ſpathulatis, caulinis lanceolatis acutis
ramis ſub-3floris, calycibus acutis coloratis co-
rolla brevioribus. *Caucaſus.* (C. purpuraſcens
Adam.)

ſtrictum 25. C. caule ſtricto baſi ſuffruticoſo, foliis linear-
lanceolatis glabriusculis, pedunculis terminali-
bus ſub-3floris. *Alp. Europ. med.* (C. ſuffru-
coſum L., molle et laricifolium Vill., lineare All.)

Colsmanni Lehm. 26. C. caule ſtricto, foliis verticillato-faſcicula
reflexis oblongo-linearibus glabriusculis, pedun-
culis terminalibus ſubcorymboſis, petalis integris
calyces obtuſiusculos 3plo ſuperantibus. *Ad fre-
tum Magellan.*

penſylvanicum Horn. 27. C. caule aſcendente pubeſcente ſuperne viſcido
foliis linearibus acutis elongatis, panicula termi-
nali dichotoma, calycibus acutis. *Penſylvania.*
(C. tenuifolium Purſh. glutinoſum Nutt. nu-
tans Rafin.)

piloſum Ledeb. 28. C. caule erecto piloſo, foliis oblongis obtuſis
ſubtus glaucis, floribus terminalibus ſubterna
demum nutantibus, capſulis calycem ſuperanti-
bus. *Sibir.*

rigidum Ledeb. 29. C. caule elato apice dichotomo foliisque oblon-
gis acutis hirſutis, pedunculis capſulisque elon-
gatis. *Sibir.*

molliſſimum Poir. 30. C. caule ſubſimplici foliisque lanceolatis acu-
minatis villoſiusculis, floribus corymboſis, co-
rolla calycem acutum ſubſuperante. *Peru.*

Willdenovii Kunth. 31. C. caule erecto apice dichotomo, foliis oblongo-lanceolatis acutis lanatis, capſulis calycem ſubaequantibus. *Quito.* (Stellaria mollis W. herb.)

glutinoſum Kunth. 32. C. caule aſcendente apice dichotomo foliisque lanceolatis acuminatis villoſo-viſcoſis, petalis 2lobis, capſulis calycem ſuperantibus. *Nov. Granat.*

lithoſpermifolium Fiſch. 33. C. caule ramoſo foliisque lanceolatis acutis pubeſcentibus, floribus ſolitariis, petalis emarginatis, ſepalis ellipticis. *Sibir.*

imbricatum Kunth. 34. C. caule ramoſiſſimo repente, foliis 4fariam imbricatis obovato-oblongis obtuſis villoſis, capſulis calycem piloſum ſuperantibus. *Alp. peruv.*

†† *Corolla calycem aequante vel minore.*

vulgatum 35. C. caule erecto hirſuto ſubviſcoſo, foliis ovatis acutis, floribus pedicellos ſuperantibus. *Europ. Aſia. Africa. Amer. bor.* (C. barbulatum Wahlenb., ovale Perſ.)

viſcoſum 36. C. caule procumbente hirſuto ſubviſcoſo, foliis oblongo-lanceolatis, pedicellis flores ſuperantibus. *Europ.* (C. vulgatum Hudſ. Curt.)

†*ſtrigoſum* Fries. 37. C. caule erecto foliisque oblongis obtuſis ſtrigoſis, floribus ſubcapitatis, ſepalis lanceolatis hiſpidis petala longe ſuperantibus. *Suecia auſtr. Inſ. Mön.*

holoſteoides Fries. 38. C. caule alternatim hinc piloſo, foliis radicalibus obovato-oblongis, caulinis lanceolatis glabris, pedunculis ſubumbelliferis, petalis calyce brevioribus. *Suecia. Dania.*

ſemidecandrum 39. C. caule erecto humili incano-pubeſcente viſcido, foliis ovato-oblongis, floribus ſubumbellatis 5andris, petalis emarginatis calyce brevioribus. *Europ. Amer. bor.* (C. pumilum Curt. alſinoides Perſ. gracile Duf.)

macilentum Aſpegren. 40. C. caule diffuſo glaberrimo, foliis ovato-lanceolatis acutis, panicula dichotoma congeſta, petalis 2partitis calyce brevioribus. *Blekinga, prov. Sueciae. Corſica?* (C. tenue Viv.?)

dianicatum Herbich. 41. C. caule dichotomo incano-villoſo, foliis oblongis, pedunculis elongatis erectis, petalis emarginatis calycem aequantibus. *Neapol.*

pentandrum 42. C. caule humillimo ſubviſcido, foliis ſubrotundis obtuſis, floribus paniculatis 5andris, petalis 2dentatis calyce brevioribus. *Hiſpan. Tauria.*

brachypetalum Perſ. 43. C. caule erecto tomentoſo dichotomo, foliis ovatis, floribus longe pedunculatis ſubpaniculatis, calycibus villoſis petala ſuperantibus capſulas aequantibus. *Gallia. Alſatia.* (C. murale Desport.)

tauricum * 44. C. caule erecto ramoſo villoſo-viſcoſo, foliis oblongis villoſiſſimis, racemis terminalibus flavido-hirſutis, pedicellis nutantibus elongatis, capſulis cylindricis calycem ſubſuperantibus, denticulis rectis. *Tauria.*

† *diffuſum* Perſ. 45. C. caule ramoſiſſimo villoſo, foliis ovato-lanceolatis hiſpidiusculis, floribus dichotomo-paniculatis pedicellos aequantibus, petalis emarginatis calyce brevioribus, capſula obovata calycem aequante. *Patria?*

ſpathulatum Perſ. 46. C. caule erecto foliisque ſpathulato-oblongis villoſiſſimis, floribus ſubglomeratis terminalibus. *Jamaica.*

ruderale M. B. 47. C. caule erecto dichotomo foliisque oblongis obtuſis hirſutis, petalis calycem aequantibus, capſulis pendulis incurvis elongatis. *Tauria.*

dichotomum 48. C. caule dichotome ramoſo foliisque lanceolatis piloſo-viſcoſis, floribus aggregatis breviter pedunculatis, ſepalis lanceolatis petala aequantibus, capſulis denticulisque erectis calycem ſuperantibus. *Hiſpan. Afric. bor.*

nemorale M. B. 49. C. caule erecto ſuperne dichotomo foliisque lanceolatis hirſutis, floribus longe pedunculatis, petalis calycem aequantibus, capſulae elongatae denticulis revolutis. *Caucaſ.*

caucaſicum Fiſch. 50. C. caule elato dichotomo, ramis elongatis, foliis lanceolatis glabris margine ſcabris, paniculae ramis patentiſſimis 2fariam piloſis, petalis calycem glaberrimum aequantibus, capſulae cylindricae denticulis revolutis. *Caucaſ.* (C. elongatum M. B.)

longifolium W. 51. C. caule erecto dichotomo piloſo-viſcoſo, foliis lineari-lanceolatis hirſutis, pedunculis fructiferis patentiſſimis, capſulis calycem aequantibus. *Armenia.*

Commerſonii Ser. 52. C. caule dichotomo angulato pubeſcente viſcido, foliis linearibus elongatis obtuſis amplexicaulibus glabriusculis, pedunculis umbellatis, petalis capſulisque calycem aequantibus. *Monte Video.* (C. longifolium Juſſ. apud Poir.)

perfoliatum 53. C. caule erecto foliisque lanceolatis connatis glaucis glaberrimis, pedunculis terminalibus aggregatis, capſulis calycem multo ſuperantibus. *Graecia. Sibir.*

1721. LYCHNIS.

* *Floribus ſolitariis.*

coronaria Desr. 1. L. tomentoſa, caule dichotomo, foliis oblongis calycibusque coſtatis coriaceis, petalis emarginatis ſerratis fauce coronatis. *Europ. med. Tauria.* (Agroſtemma L.)

Githago Scop. 2. L. hirſuta, foliis linearibus, calycibus elongatis ſubcoriaceis, petalis integerrimis fauce nudis. *Europ.* (Agroſtemma L.)

Coeli roſa Desr. 3. L. glabriuscula, foliis linearibus, calycibus ſubcoriaceis clavatis 10coſtatis, laciniis cuſpidatis, petalis bilobis fauce coronatis. *Europ. auſtr.* (Agroſtemma L.)

laeta Ait. 4. L. glabra, caule dichotomo, foliis lanceolatis ciliatis, calycibus 10angulatis breviter dentatis, petalis emarginatis fauce coronatis. *Luſitania. Hiſpania. Corſica.* (L. paluſtris Brot. corſica Loiſ. L. diclinis Lag. var. pubeſcens.)

nivalis Kit. in lit. 5. L. glabra, foliis radicalibus oblongis ciliatis in petiolos longos attenuatis, ſcapo 1floro bracteato, bracteis linearibus elongatis ciliatis, calyce campanulato aequali obtuſe dentato, petalis amplis lobatis fauce coronatis. *Alp. carpath. ad Caeciam.* (Maramaros.)

apetala 6. L. caule ſub-1floro pubeſcente, foliis linearilanceolatis glabris, calyce nutante inflato ſtriato petala ſuperante. *Scandinavia arctica.* (L. brachypetala Fiſch. pauciflora Ledeb. var.)

** *Floribus aggregatis; pedunculis multifloris.*

grandiflora Jacq. 7. L. caule ramoſo foliisque oblongis nervoſis glabris, floribus terminalibus ſubternis, calycibus clavato-coſtatis, petalis amplis laciniato-dentatis. *China. Japon.* (L. coronata Thb. Hedona ſinenſis Lour.)

variegata Desf. 8. L. caule ſimplici glabro, foliis ſubrotundis carnoſis glauco-pruinoſis, floribus terminalibus ſubternis, calycibus cylindricis coloratis, petalis emarginatis variegatis. *Creta.*

ſibirica 9. L. caule ſimplici foliisque linearibus villoſiusculis, pedunculis terminalibus erectis aggregatis, calycibus campanulatis ſtriatis, petalis bifidis. *Sibir.*

pyrenaica Berger. 10. L. caulibus caeſpitoſis flaccidis glabris, foliis glauceſcentibus, radicalibus ſpathulatis, caulinis cordatis ſeſſilibus, pedunculis terminalibus ſubcorymboſis, calycibus campanulatis glabris, petalis ſubemarginatis. *Pyren.* (L. nummularia Lapeyr.)

dioeca 11. L. caule erecto foliisque oblongis hirſutis, pedunculis aggregatis, floribus dioecis, calycibus inflatis coſtatis, petalis bifidis. *Europ.* (L. ſylveſtris et pratenſis Schk., diurna et veſpertina Sibth. varr. e ſolo. In Tauria et Graecia ſemper fl. albo.)

Flos Cuculi 12. L. caule ſuperne viſcido, foliis lanceolatis glabris, floribus paniculatis, calycibus campanulatis, petalis 4fidis. *Europ. prata.*

fulgens Fiſch. 13. L. caule erecto piloſiſſimo, foliis oblongis hirſutis, florum faſciculis terminalibus 3fidis, petalis 2fidis amplis baſi utrinque dente lineari elongato auctis. *Sibir.*

chalcedonica 14. L. caule erecto foliisque lanceolatis hirſutiusculis, floribus terminalibus denſe faſciculatis, petalis 2fidis baſi utrinque ſubdentatis calycem ſubſuperantibus. *Aſia minor.*

Flos Jovis Desr. 15. L. tomentoſa, foliis lanceolato-linearibus, floribus umbellato-capitatis, calycibus clavatis co-

ſtatis, petalis 2lobis. *Helvetia. German. occid. Italia ſuper.* (Agroſtemma L.)

alpina 16. L. glabra, caule ſtricto caeſpitoſo, foliis linearibus, floribus capitatis bracteatis, petalis bifidis. *Alp. Europ. med. Scandinav. arctica. Amer. bor.*

magellanica Desr. 17. L. ſubvilloſa, foliis linearibus acutis, floribus faſciculatis terminalibus, petalis emarginatis baſi utrinque dentatis calycem ſubaequantibus. *Ad fretum Magellan.*

Viſcaria 18. L. caule viſcoſo, foliis lineari-lanceolatis glabris, floribus faſciculatis, petalis ſubintegerrimis, capſula 5loculari. *Europ.*

1722. SPERGULA.

arvenſis 1. Sp. foliis verticillatis, floribus paniculatis 10andris, ſeminibus ſolidis hiſpidis. *Europ. Amer. bor. auſtr.* (Sp. geniculata et villoſa Perſ. maxima Weih. viſcoſa Lag.)

pentandra 2. Sp. foliis verticillatis, floribus paniculatis 5andris, ſeminibus margine alatis. *Europ.*

nodoſa 3. Sp. foliis ſubulatis, imis oppoſitis ſuperioribus faſciculatis, ramis ſub-1floris, corolla calycem ſuperante. *Europ.* (Sp. glanduloſa Beſſ.)

laricina 4. Sp. caule decumbente, foliis oppoſitis faſciculatis ſubulatis rigidis ciliatis, petalis calycem ſuperantibus. *Sibir.*

glabra W. 5. Sp. caule aſcendente ramoſo, foliis oppoſitis faſciculatis ſubulatis flaccidis, pedunculis terminalibus elongatis 1floris, corolla calycem ſuperante. *Alp. cott.* (Sp. ſaginoides All.)

pilifera Cand. 6. Sp. caule repente ramoſo, foliis oppoſitis faſciculatis linearibus rigidiusculis apice piliferis, pedunculis axillaribus 1floris, corolla calycem ſuperante. *Corſica. Auſtria.* (Sp. laricina Wulff.)

ſaginoides 7. Sp. caule aſcendente ramoſo, foliis oppoſitis linearibus, pedunculis terminalibus ſolitariis, corolla calycem aequante. *Sudetes. Anglia. Suecia. Helvetia. Sibiria. Carolina.*

ſubulata Sw. 8. Sp. caule aſcendente, foliis linearibus ciliatis apice ſetiferis, pedunculis ſolitariis elongatis, corolla calycem ſubaequante. *Europ.* (Sp. ſaginoides Retz. laricina Lightf.)

† *apetala* Labill. 9. Sp. caule humili ſubramoſo, foliis lineari-ſubulatis pedunculos 1floros axillares ſubaequantibus, floribus apetalis 5andris. *Terra Diemen.*

1723. BERGIA.

verticillata W. 1. B. foliis oblongo-lanceolatis apice ſerrulatis, floribus ſubſeſſilibus verticillatis confertiſſimis. *Ind. or. Aegypt.* (B. capenſis L. Elatine luxurians Delil.)

glomerata Thb. 2. B. foliis obovatis crenulatis, floribus ſubaggregatis quaternis ſeſſilibus. *Afric. auſtr.*

cotyledonoides Roth. 3. B. foliis oblongis argute ſerratis ſupra cauleque hiſpidis ſubtus tomentoſis, floribus axillaribus faſciculatis 5andris. *Ind. or.*

1724. OXALIS.

* *Foliis ſimplicibus.*

† *acaules.*

monophylla 1. O. foliis ellipticis obtuſis, ſcapo 1floro, filamentis glabris. *C. B. S.*

lepida Jacq. 2. O. foliis obovatis ſubretuſis, ſcapo 1floro, filamentis ſimplicibus glanduloſo-piloſis. *C. B. S.*

roſtrata Jacq. 3. O. foliis obovatis retuſis, ſcapo 1floro, filamentis interioribus apice roſtratis piloſo-glanduloſis, antheris lateralibus. *C. B. S.*

primulaefolia Radd. 4. O. foliis obovato-oblongis, ſcapo multifloro aſcendente. *Braſil.*

†† *cauleſcentes.*

aliena * 5. O. foliis cordato-ovatis acutis villoſis, pedunculis compreſſis alatis multifloris, ſtaminibus exterioribus ſtylos ſuperantibus. *Braſil.* (O. Mandioccana Radd.)

ciliata * 6. O. foliis cordato-orbiculatis obtuſis ciliatis, petiolis pedunculisque multifloris hirſutis, ſtylis ſtamina ſuperantibus. *Braſil.*

** *Foliis binatis: acaules: ſcapo unifloro.*

afinina Jacq. 7. O. foliis lanceolatis margine cartilagineo-denticulatis, petiolis alatis, ſcapo folia ſuperante. *C. B. S.*

lanceaefolia Jacq. 8. O. foliis lanceolatis margine cartilagineo-ſcabris, petiolis alatis, ſcapo folia aequante. *C. B. S.*

leporina Jacq. 9. O. foliis ellipticis emarginatis cartilagineo-denticulatis, petiolis alatis, ſcapo folia ſuperante. *C. B. S.*

criſpa Jacq. 10. O. foliis obovato-ſubrotundis emarginatis undulatis, petiolis ſubrotundo-alatis, ſcapo folia ſuperante. *C. B. S.*

*** *Foliis ternatis.*

α. *Acaules.*

† *Scapo unifloro folia ſuperante.*

faboefolia Jacq. 11. O. foliolis obovatis emarginatis mucronatis, petiolis alatis. *C. B. S.*

laburnifolia Jacq. 12. O. foliolis oblongis obtuſis, petiolis ſemiteretibus compreſſis, calycibus margine glanduloſo-piloſis, ſtylis ſtamina interiora ſuperantibus. *C. B. S.*

rubro-flava Jacq. 13. O. foliolis lanceolato-oblongis retuſis pubeſcentibus, intermedio cuneiformi, ſtaminibus exterioribus ſtylos ſuperantibus. *C. B. S.*

flaccida Jacq. 14. O. foliolis oblongis retuſis pubeſcentibus, intermedio cuneiformi, ſcapo nutante folia duplo ſuperante, ſtaminibus exterioribus ſtylos excedentibus. *C. B. S.*

exaltata Jacq. 15. O. foliolis ellipticis emarginatis ſubtus villoſis, intermedio cuneiformi, ſcapo ſtricto folia duplo ſuperante, ſtaminibus exterioribus ſtylos excedentibus. *C. B. S.*

tricolor Jacq. 16. O. foliolis oblongis obtuſis calycibusque piloſis, ſtaminibus interioribus ſtylos ſuperantibus. *C. B. S.*

variabilis Jacq. 17. O. foliolis ſubrotundis piloſis, intermedio cuneiformi, ſcapo flaccido, ſtaminibus exterioribus ſtylos ſuperantibus. *C. B. S.*

purpurea Jacq. 18. O. foliolis ſubrotundo-obovatis ciliatis, ſtaminibus interioribus ſtylos ſuperantibus. *C. B. S.* (O. humilis Thunb.)

Acetoſella 19. O. foliolis obcordatis ſcapoque piloſiuſculis, petalis ſtriatis, radice articulato-ſquamata. *Europ. nemora. Japon. Amer. bor.* (O. americana Bigel.)

obtuſa Jacq. 20. O. foliolis obcordatis denſe piloſis, calycibus obtuſiſſimis, ſtaminibus interioribus ſtylos ſuperantibus. *C. B. S.*

lanata 21. O. foliolis obcordatis villoſis ſubtus albo-lanatis, calycibus acutis, ſtaminibus exterioribus ſtylos ſuperantibus. *C. B. S.*

truncatula Jacq. 22. O. foliolis truncato-cuneatis margine villoſis ſubtus lividis, ſtylis ſtamina interiora ſuperantibus. *C. B. S.*

punctata 23. O. foliolis obcordatis utrinque punctatis, ſtaminibus exterioribus ſtylos ſuperantibus. *C. B. S.*

fallax Jacq. 24. O. foliolis obcordatis piloſiuſculis ciliatis, ſtaminibus interioribus ſtylos ſuperantibus. *C. B. S.*

tenella Jacq. 25. O. foliolis obcordatis glabris, ſtaminibus exterioribus ſtylos ſuperantibus. *C. B. S.*

tenera * 26. O. foliolis obcordatis glabris, ſcapo flaccido laevi ſubbifloro, ſtylis ſtamina omnia ſuperantibus. *Monte Video.* Sello.

minuta Jacq. 27. O. foliolis lineari-lanceolatis acutis, ſtylis ſtamina interiora ſuperantibus. *C. B. S.*

filifolia Jacq. 28. O. foliolis filiformi-linearibus, ſtylis ſtamina interiora ſuperantibus. *C. B. S.*

†† *Scapo unifloro folia aequante vel breviori.*

puſilla Jacq. 29. O. ſubcauleſcens, foliolis cuneiformi-linearibus emarginatis glaucis, ſtaminibus interioribus ſtylos ſuperantibus. *C. B. S.*

ſanguinea Jacq. 30. O. foliolis oblongis obtuſis pubeſcentibus, petiolo ſemitereti compreſſo, calycibus piloſis, staminibus interioribus ſtylos ſuperantibus. *C. B. S.*

ambigua Jacq. 31. O. foliolis oblongis obtusis pilosiusculis, sepalis aequalibus pilosis apice bimaculatis, stylis stamina superantibus. *C. B. S.*

undulata Jacq. 32. O. foliolis oblongis obtusis undulatis, sepalis inaequalibus pilosis punctatis, stylis stamina superantibus. *C. B. S.*

fuscata Jacq. 33. O. foliolis oblongis obtusis pilosis maculatis, sepalis aequalibus interrupte bistriatis, stylis stamina superantibus. *C. B. S.*

glandulosa Jacq. 34. O. foliolis oblongis obtusis, petiolis calycibusque glandulosis, staminibus interioribus stylos superantibus. *C. B. S.*

grandiflora Jacq. 35. O. foliolis subrotundis subcuneatis, petalis truncatis, staminibus exterioribus stylos superantibus. *C. B. S.*

sulfurea Jacq. 36. O. foliolis subrotundis subtus punctatis sanguineis, sepalis reflexis clavato-pilosis glandulosis, staminibus exterioribus stylos superantibus. *C. B. S.*

laevigata W. 37. O. foliolis subrotundis glaberrimis, staminibus stylos superantibus. *C. B. S.?*

brevicapa Jacq. 38. O. foliolis subrotundis subtus punctatis sanguineis, petiolis plano-compressis, staminibus interioribus stylos superantibus. *C. B. S.*

speciosa Jacq. 39. O. foliolis subrotundis ciliatis, stylis stamina interiora superantibus. *C. B. S.* (O. purpurea L. Thunb., fugillata et rigidula Jacq. varr.)

cruentata Jacq. 40. O. foliolis obovatis emarginatis hirsutis, staminibus interioribus stylos superantibus. *C. B. S.*

magellanica Forst. 41. O. foliolis obcordatis carnosis glabris, stylis stamina interiora aequantibus, radice fibrosa. *Chili. Ad fretum Magellan.* (O. carnosa Molin.)

ferruginata Jacq. 42. O. foliolis obcordatis punctato-maculatis villoso-ciliatis, staminibus interioribus stylos superantibus. *C. B. S.*

marginata Jacq. 43. O. foliolis obcordatis ciliatis subtus sanguineis, sepalis reflexis clavato-ciliatis, staminibus interioribus stylos superantibus. *C. B. S.*

pulchella Jacq. 44. O. foliolis obcordatis subtus sanguineis punctatis, scapo abbreviato, sepalis reflexis clavato-ciliatis, stylis stamina interiora superantibus. *C. B. S.*

pramosa Jacq. 45. O. foliolis obcordatis supra fusco-maculatis subtus sanguineis, stylis brevissimis sub apice tuberculatis. *C. B. S.*

luteola Jacq. 46. O. foliolis obcordatis pilosis, staminibus exterioribus stylos superantibus. *C. B. S.*

macrogonya Jacq. 47. O. foliolis obcordatis ciliatis, stylis stamina interiora superantibus. *C. B. S.*

††† *Scapo multifloro.*

virgosa Molin. 48. O. foliolis cuneiformibus emarginatis, scapo longissimo, floribus verticillatis. *Chili.*

megalorrhiza Jacq. 49. O. foliolis obovatis emarginatis, scapo foliis breviori umbellifero, radice crassissima ramosa. *Chili.*

articulata Savign. 50. O. foliolis obcordatis ſericeo-tomentoſis, ſcapo folia ſubaequante umbellifero, calycibus apice glanduloſis. *Monte Video.*

compreſſa 51. O. foliolis obcordatis ſubtus hirſutis, petiolis plano-compreſſis, ſcapo 2floro folia ſuperante, ſtylis ſtamina interiora excedentibus. *C. B. S.*

ſericea 52. O. foliolis obcordatis ſericeis, ſcapo umbellifero folia ſuperante, floribus nutantibus, ſtaminibus interioribus ſtylos ſuperantibus. *C. B. S.*

violacea 53. O. foliolis obcordatis glabris, ſcapo 2fido umbellifero folia ſuperante, ſtaminibus exterioribus ſtylos ſuperantibus. *Amer. bor.*

caprina 54. O. foliolis obcordato-2lobis glabris, ſcapo longiſſimo umbellifero paucifloro, floribus erectis, ſtaminibus exterioribus ſtylos ſuperantibus. *C. B. S.* (O. macrophylla Horn.)

cernua Thunb. 55. O. foliolis obcordato-2lobis glabris ciliatis, ſcapo umbellifero longiſſimo, floribus cernuis, ſtaminibus exterioribus ſtylos ſuperantibus. *C. B. S.*

libyca Viv. 56. O. foliolis obcordatis hirſutis, ſcapo umbellifero multifloro folia ſuperante. *Ager cyrenaic.*

dentata Jacq. 57. O. foliolis obcordatis, ſcapo paucifloro, floribus nutantibus, ſepalis apice 3dentatis, ſtylis ſtamina ſuperantibus. *C. B. S.*

livida Jacq. 58. O. foliolis obcordato-2partitis ſubtus violaceis, ſcapo ſubbifloro, ſtaminibus interioribus ſtylos ſuperantibus. *C. B. S.*

purpurata Jacq. 59. O. foliolis obcordatis ciliatis ſubtus ſanguineis, ſcapo umbellifero, ſtylis longiſſimis. *C. B. S.*

corymboſa Cand. 60. O. foliolis obcordatis latiſſimis utrinque rotundatis glabriusculis, ſcapo 2fido ramoſo corymboſo multifloro. *Inſ. Mascaren.*

macrophylla Kunth. 61. O. foliolis obcordatis pubeſcentibus, ſcapo multifloro, ſepalis obtuſis apice maculatis, ſtylis longiſſimis. *Nov. Granat.*

latifolia Kunth. 62. O. foliolis latiſſimis emarginato-2lobis ciliatis, ſcapo ſub-6floro, ſepalis obtuſis apice maculatis, ſtylis ſtamina interiora ſuperantibus. *Mexico.*

Schraderiana Kunth. 63. O. foliolis ſubrotundo-obovatis emarginatis glabris, ſcapo multifloro, ſepalis obtuſis apice maculatis, ſtylis ſtamina breviora ſubaequantibus. *Nov. Granat.*

Jacquiniana Kunth. 64. O. foliolis ſubrotundo-obovatis 2lobis petiolisque glabris, ſcapo paucifloro, ſepalis obtuſis apice bimaculatis, ſtylis longiſſimis. *Mexico.*

debilis Kunth. 65. O. foliolis obcordatis ſubtus pubeſcentibus, ſcapo 2fido 6floro, ſepalis obtuſiusculis apice maculatis, ſtylis longiſſimis. *Nov. Granat.*

elegans Kunth. 66. O. foliolis obovatis emarginatis ſubtus violaceis petiolisque glabris, ſcapis longiſſimis pauciforis, ſepalis acuminatis apice bimaculatis, ſtylis longiſſimis. *Peru.*

β. Caulescentes.

† *Pedunculis unifloris.*

αα. Caule inferne nudo.

ciliaris Jacq. 67. O. caule erecto, foliolis oblongis emarginatis ciliatis, pedunculo petiolos superante, stylis stamina interiora superantibus. *C. B. S.*

† *longiflora* 68. O. foliolis semi-2fidis, lobis lanceolatis, floribus elongatis. *C. B. S.*

natans 69. O. foliolis obcordatis laevibus, pedunculis folia aequantibus, staminibus exterioribus stylos superantibus. *Afric. austr. aquae.*

convexula Jacq. 70. O. foliolis subrotundis punctatis, stipulis dilatatis acuminatis, pedunculis folia excedentibus, staminibus interioribus stylos superantibus. *C. B. S.*

bifida Jacq. 71. O. foliolis cuneiformibus 2lobis glabris, pedunculis folia excedentibus, stylis stamina interiora superantibus. *C. B. S.*

filicaulis Jacq. 72. O. caule filiformi elato subramoso, foliis cuneiformibus 2lobis glabris, pedunculis elongatis, staminibus interioribus stylos superantibus. *C. B. S.*

cuneata Jacq. 73. O. caule decumbente, foliis cuneiformibus emarginatis pilosis, pedunculis petiolo brevioribus, stylis stamina interiora superantibus. *C. B. S.*

cuneifolia Jacq. 74. O. caule decumbente, foliis cuneiformi-linearibus emarginatis pilosis, pedunculis petiolo brevioribus, staminibus exterioribus stylos superantibus. *C. B. S.*

glabra Thunb. 75. O. caule brevissimo, foliolis cuneiformi-linearibus emarginatis ciliatis, pedunculis folia superantibus, stylis stamina interiora excedentibus. *C. B. S.*

crenata Jacq. 76. O. caule decumbente, foliolis cuneiformi-linearibus emarginatis ciliatis, pedunculis petiolos aequantibus, staminibus exterioribus stylos superantibus. *C. B. S.*

linearis Jacq. 77. O. caule decumbente, foliolis linearibus emarginatis ciliatis, pedunculis petiolo brevioribus, stylis stamina interiora superantibus. *C. B. S.*

versicolor 78. O. caule erecto, foliolis cuneiformi-linearibus apice 2punctatis glabris, pedunculis folia superantibus, stylis stamina superantibus. *C. B. S.* (O. gracilis Jacq.)

elongata Jacq. 79. O. caule erectiusculo, foliolis linearibus elongatis divaricatis emarginatis apice 2punctatis glabris, petiolis longissimis, staminibus exterioribus stylos superantibus. *C. B. S.* (O. miniata et amoena Jacq.)

reclinata Jacq. 80. O. caule reclinato, foliolis linearibus emarginatis apice 2punctatis, pedunculis folia excedentibus, staminibus interioribus stylos superantibus. *C. B. S.*

polyphylla Jacq. 81. O. caule erecto ſubramoſo, foliolis confertis linearibus emarginatis apice 2punctatis, pedunculis folia excedentibus, ſepalis apice reflexis, ſtaminibus interioribus ſtylos ſuperantibus. *C. B. S.*

ββ. Caule folioſo.

tenuifolia Jacq. 82. O. caule erecto ſimplici, foliolis linearibus emarginatis breviter petiolatis, pedunculis elongatis, ſtaminibus exterioribus ſtylos ſuperantibus. *C. B. S.*

macroſtylis Jacq. 83. O. caule erecto ramoſo villoſo, foliis ſeſſilibus, foliolis oblongo-linearibus emarginatis, pedunculis elongatis, corolla ſubhypocrateriformi, ſtylis ſtamina interiora ſuperantibus. *C. B. S.*

hirta 84. O. caule ramoſo pubeſcente, foliis ſubſeſſilibus, foliolis ſpathulato-linearibus retuſis, pedunculis elongatis, corolla campanulata, ſtylis ſtamina interiora ſuperantibus. *C. B. S.* (O. hirtella Jacq., ſeſſilifolia L., venoſa Savign.)

tubiflora Jacq. 85. O. caule ſubramoſo villoſo, foliis ſubſeſſilibus ſpathulatis, pedunculis folia multo ſuperantibus, corolla ſubhypocrateriformi, ſtaminibus exterioribus ſtylos ſuperantibus. *C. B. S.* (O. caneſcens Jacq.)

ſecunda Jacq. 86. O. caule declinato ramoſo, ramis ſecundis, foliis ſubſeſſilibus ſpathulatis, pedunculis folia aequantibus, corolla hypocrateriformi, ſtaminibus interioribus ſtylos ſuperantibus. *C. B. S.*

multiflora Jacq. 87. O. caule erecto ramoſo villoſo, foliis ſubſeſſilibus ſpathulato-oblongis, pedunculis folia multo ſuperantibus, corolla campanulata, ſtaminibus exterioribus ſtylos ſuperantibus. *C. B. S.*

rubella Jacq. 88. O. caule erecto, foliis ſubſeſſilibus ſpathulato-linearibus pubeſcentibus, pedunculis folia multo ſuperantibus, corolla campanulata, ſtaminibus interioribus ſtylos ſuperantibus. *C. B. S.*

roſacea Jacq. 89. O. caule decumbente ſimpliciusculo villoſo, foliis ſubſeſſilibus ſpathulato-oblongis, pedunculis elongatis, corolla campanulata, ſtaminibus interioribus ſtylos ſuperantibus. *C. B. S.*

repens Thunb. 90. O. caule decumbente radicante ramoſo, foliolis obcordatis hirſutis, pedunculis ſubbifloris petiolos aequantibus, ſtaminibus interioribus ſtylos ſuperantibus. *C. B. S. Madagascar. Ceylon.*

reptatrix Jacq. 91. O. caule ſimplici, foliis longe petiolatis, foliolis obovatis ciliatis, pedunculis folia ſuperantibus, ſtaminibus exterioribus ſtylos ſuperantibus. *C. B. S.*

diſticha Jacq. 92. O. caule aſcendente ramoſo, foliolis obcordatis glabris, ſtipulis amplis obtuſis, pedunculis folia aequantibus, ſtaminibus interioribus ſtylos ſuperantibus. *C. B. S.* (O. ebracteata Sav.)

conorrhiza Jacq. 93. O. caule erecto ramoſo pubeſcente, foliis obcordatis, pedunculis petiolo brevioribus, radice craſſa fuſiformi. *Ad fluv. Platae.*

incarnata 94. O. caule erecto ramoſo glabro, foliolis obcordatis ſubtus discoloribus, pedunculis petiolos aequantibus, ſtylis ſtamina interiora ſuperantibus. *C. B. S.*

virginea Jacq. 95. O. caule erecto, foliolis obovato-oblongis, pedunculis folio brevioribus, ſtaminibus exterioribus ſtylos ſuperantibus. *C. B. S.*

nematodes * 96. O. caule filiformi repente glabro, foliolis obovato-ſubrotundis emarginato-2lobis ſubtus pubeſcentibus, calyce ciliato, ſtylis ſtamina ſuperantibus. *Nov. Granat.* (O. filiformis Kunth.)

†† *Pedunculis multifloris.*

aa. Caule herbaceo.

ſtricta 97. O. caule erecto ramoſo, foliolis obcordatis, pedunculis paucifloris folio brevioribus, ſtylis ſtamina interiora aequantibus. *Europ. Amer. bor.* (O. corniculata Flor. dan. Roth.)

corniculata 98. O. caule decumbente radicante ramoſo pubeſcente, foliolis obcordatis, pedunculis umbelliferis petiolo brevioribus, ſtylis ſtamina interiora aequantibus. *Europ. Aſia. Amer. bor. et tropic.* (O. puſilla Salisb. villoſa M. B. piloſiuscula Kunth.)

Lyoni Pursh. 99. O. caule ramoſo decumbente foliisque obcordato-2lobis piloſis, pedunculis paucifloris petiolos ſuperantibus, fructibus tomentoſis. *Georgia. Nov. Granat.* (O. mollis Kunth.)

microphylla Poir. 100. O. caule decumbente glabriusculo, foliolis obcordato-2lobis, pedunculis paucifloris petiolos ſuperantibus, ſtylis ſtamina interiora aequantibus. *Nov. Holl.* (O. rubens Haw.)

crenata Jacq. 101. O. caule erecto, foliolis obcordatis, pedunculis umbelliferis folia ſuperantibus, petalis crenatis. *Chili.*

pedunculariſ Kunth. 102. O. caule erecto carnoſo, foliolis ſubrotundo-ellipticis, pedunculis longiſſimis apice 3fidis multifloris, ſtaminibus exterioribus ſtylos ſuperantibus. *Quito.*

pubeſcens Kunth. 103. O. caule erecto pubeſcente, foliolis obovatis emarginatis, pedunculis apice 2fidis multifloris, ſtylis ſtamina longiora aequantibus. *Peru.*

lotoides Kunth. 104. O. caule procumbente hirſuto, foliolis obovatis emarginatis margine villoſis, pedunculis paucifloris petiolos ſuperantibus, ſtaminibus exterioribus ſtylos ſuperantibus. *Nov. Granat.*

ſcandens Kunth. 105. O. caule ramoſo ſcandente glabro, foliolis obovatis emarginatis ſubtus hirſutis, pedunculis elongatis multifloris, calycibus glabris, ſtylis ſtamina ſuperantibus. *Nov. Granat.*

medicaginea Kunth. 106. O. caule ramoſo procumbente glabro, foliolis obovatis emarginatis ſubtus pubeſcentibus, pedunculis longiſſimis multifloris, calycibus glabris, ſtaminibus exterioribus ſtylos ſuperantibus. *Nov. Granat.*

lupulina Kunth. 107. O. caule filiformi procumbente ſubramoſo glabriusculo, foliolis obcordatis glabris, pedunculis 1-3floris, ſtylis ſtamina ſuperantibus. *Nov. Granat.*

albicans Kunth. 108. O. caule caeſpitoſo ramoſo repente, foliolis obcordato-2lobis violaceo-marginatis ſubtus ſericeo-pubeſcentibus, pedunculis 1-3floris, ſtylis ſtamina ſuperantibus. *Mexico. Quito.*

Barrelieri 109. O. caule erecto ramoſo, foliolis obovato-lanceolatis, pedunculis 2fidis racemoſis folia aequantibus, ſtylis longitudine ſtaminum interiorum. *Amer. auſtr.*

roſea Jacq. 110. O. caule erecto, foliolis obcordatis, pedunculis longiſſimis corymbiferis. *Chili.*

† *tuberoſa* Molin. 111. O. caule erecto, foliolis ovatis, pedunculis umbelliferis. *Chili.*

rhombifolia Jacq. 112. O. caule erecto ramoſo, foliolis rhombeo-ovatis pubeſcentibus, pedunculis umbelliferis paucifloris folia aequantibus, ſtylis ſtamina ſuperantibus. *Caracas. Braſil.* (O. hedyſarifolia Radd.)

pentantha Jacq. 113. O. caule erecto ramoſo, foliolis obovatis emarginatis piloſis, pedunculis umbelliferis pauciflo-ris folio brevioribus, ſtaminibus exterioribus ſty-los ſuperantibus. *Caracas. Mexico.* (O. Neaei Cand.)

Dillenii Jacq. 114. O. caule erecto debili foliolisque obcordatis piloſiusculis, pedunculis paucifloris folia ſuperantibus, petalis emarginatis. *Carolina. Inſ. Carib.*

lateriflora Jacq. 115. O. caule baſi nudo aſcendente ſubramoſo, foliolis obcordato-2lobis, pedunculis lateralibus longiſſimis umbelliferis, ſtaminibus exterioribus ſtylos ſuperantibus. *C. B. S.*

ββ. Caule fruticoſo.

Plumerii Jacq. 116. O. caule erecto, foliolis oblongis, pedunculis paucifloris folia aequantibus. *Ind. occid.* (O. fruteſcens L.)

pſoraleoides Kunth. 117. O. ramis foliolisque obovato-ellipticis tomentoſis, pedunculis apice 2fidis multifloris petiolos ſuperantibus, ſtaminibus exterioribus ſtylos excedentibus. *Nov. Granat.*

hedyſaroides Kunth. 118. O. ramis foliolisque ovato-oblongis emarginatis ſubtus glaucis glabris, pedunculis apice 2fidis multifloris. *Quito. Nov. Granat.*

fruticoſa Radd. 119. O. foliolis ſubrotundo-ovatis ciliatis, petiolis foliaceis lanceolatis, pedunculis axillaribus paucifloris. *Braſil.*

parvifolia Cand. 120. O. caule repente lignoſo, foliolis obcordatis piloſis, pedunculis paucifloris, ſtylis ſtamina ſuperantibus. *Quito.* (O. microphylla Kunth.)

anguſtifolia Kunth. 121. O. foliolis oblongo-linearibus glaucis glabris, pedunculis paucifloris. *Nov. Hiſpan.*

glauca Kunth. 122. O. foliolis ſubrotundo-ellipticis glabris glaucis ciliatis, pedunculis folia aequantibus apice

2fidis ſub-8floris, ſepalis apice maculatis. *Ad fl. Amazonum.*

berjenſis Kunth. 123. O. foliolis ſubrotundis glabris glaucis, pedunculis apice 2fidis multifloris folia aequantibus, ſepalis pubeſcentibus emaculatis. *Ad Orinocum.*

****** *Foliis quaternatis.***

tetraphylla Cav. 124. O. acaulis, foliolis obcordato-2lobis glabris ſubtus glaucis, ſcapo umbellifero petiolos ſubaequante, ſtylis ſtamina omnia ſuperantibus. *Mexico.*

******* *Foliis digitatis.***

quinata Sav. 125. O. caule aſcendente ſuperne folioſo, foliis quinatis piloſis, foliolis cuneiformibus ſubemarginatis, pedunculis 1floris petiolos ſuperantibus. *C. B. S.*

pentaphylla Sims. 126. O. caule erectiusculo inferne nudo, foliis quinatis glabris, foliolis linearibus apice glandulo-ſis, pedunculis folia ſuperantibus 1floris, ſtylis ſtamina interiora ſuperantibus. *C. B. S.*

mallobolba Cav. 127. O. acaulis, foliis quinatis, foliolis ſpathulatis ſeſſilibus, ſcapo 1floro folia ſuperante, ſtaminibus internis ſtylos ſuperantibus, bulbo lanato. *Buenos Ayres.*

Burmanni Jacq. 128. O. acaulis, foliis quinato-ſenatis oblongis carnoſis glabris, ſcapo umbellifero folia ſuperante. *Afric. auſtr.*

pectinata Jacq. 129. O. acaulis, foliis quinato-ſeptenatis linearilanceolatis obtuſis glabris, ſcapo 1floro petiolos aequante, ſepalis appreſſis aequalibus, ſtylis ſtamina ſuperantibus. *C. B. S.*

flabellifolia Jacq. 130. O. acaulis, foliis ſubſeptenatis linearibus emarginatis, ſcapo 1floro petiolos ſuperante, ſepalis apice reflexis inaequalibus, ſtaminibus interioribus ſtylos ſuperantibus. *C. B. S.*

lupinifolia Jacq. 131. O. ſubacaulis, foliis ſubſeptenatis lanceolatis acutiusculis, ſcapo unifloro petiolos aequante, ſtaminibus exterioribus ſtylos ſuperantibus. *C. B. S.*

Commerſonii Perſ. 132. O. caule breviſſimo piloſo, foliis ſenatis obovatis tomentoſis, ſcapo 1floro folia ſubſuperante, calycibus obtuſis. *Monte Video.* (O. ſexenata Sav.)

fusca 133. O. ſubacaulis, foliis 7-9atis ſpathulato-linearibus canaliculatis mucronatis, ſcapo 1floro foliis breviori, ſtylis breviſſimis. *C. B. S.*

cuneaphylla Cav. 134. O. ſubacaulis, foliis ſubnovenis villoſiusculis obcordatis, ſcapo 1floro folia ſubaequante, calycibus acutis, ſtylis longiſſimis. *Inſ. Falkland.*

laciniata Cav. 135. O. acaulis, radice ſquamoſa, foliis ſubduodenis linearibus acutis glaucis, ſcapo 1floro foliis breviori, ſtylis ſtamina ſuperantibus. *Patagonia.*

decaphylla Kunth. 136. O. acaulis, foliis ſubdenis cuneatis 2fidis ciliatis, ſcapo multifloro folia ſuperante, ſepalis obtuſis apice 2maculatis, ſtaminibus ſubaequalibus ſtylos duplo ſuperantibus. *Mexico.*

tomentoſa Thb. 137. O. acaulis, foliis ſubvicenatis ſpathulatis emarginatis tomentoſis, ſcapo 1floro folia aequante, ſtylis longiſſimis. *C. B. S.*

****** *Foliis pinnatis.*

dendroides Kunth. 138. O. caule herbaceo ſimplici apice folioſo, foliis abrupte pinnatis ſub-12jugis oblongis inaequilateris acutis ciliatis, ſummis majoribus, petiolo piloſo, pedunculis 1floris. *Nov. Granat.*

ſenſitiva 139. O. ſubacaulis, foliis abrupte pinnatis ſub-14jugis oblongis acutiusculis, ſcapo umbellifero folia aequante. *Ind. orient.* (Todda vaddi Zanon. t. 131.)

1725. LEDOCARPON Desf.

chilenſe Desf. *Chili.* Frutex ramoſus, foliis 3partitis ſubulatis ſericeis, floribus terminalibus ſolitariis. (Balbiſia verticillata Cav. anal. n. 19. p. 61.)

1726. LANCRETIA Delil.

ſuffruticoſa Delil. *Aegypt. ſuper. Nubia.* Frutex ramoſus, foliis parvis faſciculatis oblongis dentatis incano-hiſpidis, floribus terminalibus aggregatis albis.

1727. DROSOPHYLLUM Link.

luſitanicum Link. *Luſitan.* Herba ſuffruticoſa ſubſpithamea foliisque lineari-ſubulatis apice ſpiratim tortis glandulo-ſo-piloſis, floribus terminalibus corymboſis flavis. (Droſera luſitanica L. Spergula droſeroides Brot.)

1728. GRIELUM.

tenuifolium *C. B. S.* Herba decumbens, foliis 2pinnatifidis linearibus albido-tomentoſis, pedunculis axillaribus ſolitariis 1floris, floribus flavis. (Gr. humifuſum Thb. Geranium grandiflorum L. ſp. 1.)

1729. PENTHORUM.

ſedoides *Amer. bor.* Herba pedalis foliis oblongo-lanceolatis duplicato-ſerratis glabris, racemis paniculatis axillaribus terminalibus pubeſcentibus.

1730. SEDUM.

* *Planifolia.*

† *Foliis crenatis, dentatis, ſerratis.*

latifolium Bertol. 1. S. foliis oppoſitis cordato-ovatis obtuſiſſimis, corymbis longe pedunculatis, ſtaminibus corolla longioribus. *Helvetia. Italia.* (S. Telephium ε. maximum L. S. maximum Link. Anacampſeros maxima Haw.)

Telephium 2. S. foliis ovato-oblongis obtuſe ſerratis, corymbis compactis axillaribus, ſtaminibus corolla brevioribus. *Europ. Amer. bor.* (S. telephioides Mx. Anacampſeros vulgaris, albicans et Sphylla Haw.)

certicillatum 3. S. foliis quaternis lanceolatis ſerratis glabris, racemis axillaribus. *Sibir.*

oppoſitifolium Sims. 4. S. foliis oppoſitis ſpathulatis dentatis ciliatis, panicula terminali. *Caucaſ.*

populifolium 5. S. caule fruticoſo, foliis alternis cordatis dentatis petiolatis, floribus ſubcorymboſis. *Sibir.*

involucratum M. B. 6. S. foliis obovatis obtuſiſſimis crenatis pubeſcentibus ciliatis, corymbo conferto involucrato, petalis acuminatis. *Caucaſ.*

ſpurium M. B. 7. S. foliis obovatis antice crenatis pubeſcentibus ciliatis, radicalibus faſciculatis, corymbo compoſito, petalis lanceolatis. *Caucaſ.* (S. ibericum Stev. Anacampſeros ciliaris Haw.)

hybridum 8. S. caule baſi radicante, foliis confertis cuneiformibus concavis ſubdentatis, cyma terminali. *Sibir.*

Aizoon 9. S. foliis alternis lanceolatis ſerratis, cyma ſeſſili terminali. *Sibir. Creta.*

Rhodiola Cand. 10. S. foliis oblongo-cuneatis apice ſerratis, corymbo coarctato, floribus Sandris dioecis. *Alp. Europ. med.* (Rhodiola roſea L.)

lividum W. 11. S. foliis oblongis baſi attenuatis apice ſubcrenatis glabris, cyma terminali. *Patria?*

ſtellatum 12. S. foliis obovatis apice ſubdentatis, floribus axillaribus ſolitariis ſeſſilibus. *Helvet. Ital. Gallia.*

† *Notarjanni* Tenor. 13. S. caule aſcendente herbaceo, foliis alternis ovatis petiolatis ſinuatis obtuſe dentatis, floribus axillaribus ſparſis. *Neapol.*

† *deltoideum* Tenor. 14. S. caule erectiuſculo, foliis alternis deltoideo-cuneiformibus crenato-dentatis, cymis lateralibus. *Neapol.*

†† *Foliis integerrimis.*

altum Clark. 15. S. foliis lanceolatis acutis integerrimis, floribus corymboſis ſubſecundis 6petalis, petalis lanceolatis. *Palaeſtina.*

Cotyledon Jacq. 16. S. foliis oblongo-lanceolatis acutis, cyma 3fida folioſa. *Patria?*

divaricatum Ait. 17. S. foliis rhombeo-cuneiformibus emarginatis petiolatis, caule ramoſo, panicula terminali divaricata. *Madera.*

Cepaea 18. S. foliis ſpathulatis integerrimis ciliatis, infimis ſubternis quaternisve, ſuperioribus ſparſis, panículae folioſae ramis abbreviatis, petalis acuminatis. *Europ. med. et auſtr.* (S. galioides Pourr. All., ſpathulatum Kit., 4phyllum Sm.)

ternatum Mx. 19. S. foliis ternis margine ſcabris, inferioribus obovatis, ſummis lanceolatis, cyma 3partita, floribus ſubſeſſilibus ſecundis ſub-8andris, petalis acuminatis. *Amer. bor.* (S. portulacoides Mühlb. W.)

oxypetalum Kunth. 20. S. caule fruticoſo, foliis alternis obovatis ſubemarginatis, cymis dichotomis, floribus ſeſſilibus ſecundis, petalis acuminatis. *Mexico.*

bicolor Kunth. 21. S. caule herbaceo erectiusculo glabro, foliis ſpathulatis acutiusculis, racemis terminalibus, petalis acutis ſubtus discoloribus. *Nov. Granat.*

quitenſe Kunth. 22. S. caule herbaceo glabro, foliis alternis ſpathulatis acutiusculis ſubtus convexis, racemis elongatis, petalis acuminatis. *Quito.*

alſinifolium All. 23. S. caule herbaceo ramoſo, foliis ovato-oblongis glabris, floribus laxe paniculatis, ramis 1floris villoſis, petalis mucronatis. *Pedemont.*

magellenſe Tenor. 24. S. caule aſcendente, foliis obovato-oblongis ſeſſilibus, floribus racemoſis, petalis acutis. *Neapol.*

arenarium Brot. 25. S. caule erecto caeſpitoſo, foliis alternis ovatis obtuſiusculis ſubtus convexis ſeſſilibus, cyma 2fida recurva, petalis acutis. *Luſitan.*

pubeſcens Vahl. 26. S. caule ramoſiſſimo foliisque oblongis obtuſis ſubtus convexis glaucis pubeſcentibus, cyma 2fida, petalis lanceolatis. *Afric. bor.*

ſempervivum Ledeb. 27. S. caule ſimplici erecto ſubtomentoſo folioſo, foliis ſpathulato-ovatis acutis pubeſcentibus ciliatis, corymbo multifloro hemiſphaerico, petalis cuſpidatis. *Iberia.* (S. ſempervivoides Fiſch. M. B.)

roſeum Stev. 28. S. caule ramoſiſſimo repente glabro, foliis oppoſitis obovatis carnoſis glaberrimis, cyma pauciflora, petalis cuſpidatis. *Caucaſ.*

libanoticum 29. S. caule aſcendente ſimpliciſſimo ſuperne nudo, foliis radicalibus faſciculatis ſpathulato-lanceolatis, floribus racemoſis. *Palaeſtina. Inſ. Samos.* (Cotyledon ſamium Urv.)

piloſum M. B. 30. S. caule aſcendente folioſo, foliis confertis oblongis obtuſis hirſutis, panicula corymboſa, petalis lanceolatis. *Caucaſ.*

eriocarpum Sm. 31. S. foliis oblongis obtuſis calycibusque glabris, floribus cymoſis, germinibus hirtis. *Peloponneſ.*

****Teretifolia.**

†*Flores flavi.*

nudum Ait. 32. S. caule fruticoſo ramoſo, ramis tortuoſis, foliis ſparſis abbreviatis oblongo-cylindricis obtuſis, floribus ſubſolitariis terminalibus. *Madera.*

altiſſimum Poir. 33. S. caule ſuffruticoſo ſtricto, foliis glaucis cylindricis acutis ſuperioribus ſparſis planiusculis, floribus denſe corymboſis 6-8petalis. *Pedemont.*

Pyren. Graecia. (Sempervivum ſediforme Jacqu. Sedum ochroleucum Sm.)

fruticuloſum Brot. 34. S. caule ſuffruticoſo erecto, foliis 5fariam imbricatis tereti-planiusculis baſi ſolutis mucronatis glauceſcentibus, cyma ſub-3fida, corolla 6petala obtuſa. *Luſitan.*

rupeſtre 35. S. foliis tereti-ſubulatis baſi ſolutis, ramorum ſterilium arcte imbricatis ſubadpreſſis glauceſcentibus, floriferi erectis viridibus, cymae 5fidae ramis erectis. *Europ.*

collinum W. 36. S. foliis omnibus glaucis tereti-ſubulatis acutis, ramorum ſterilium patentibus, floriferi erecto-patulis, cymae ramis recurvis. *Europ.* (S. rupeſtre Cand., glaucum Sm.)

reflexum 37. S. foliis tereti-ſubulatis viridibus, ramorum ſterilium reflexis, floriferi patulis, ramis cymae recurvatis, calycibus acutis. *Europ.* (S. virens Ait.)

Forſterianum Sm. 38. S. foliis tereti-ſubulatis viridibus, ramorum ſterilium ſquarroſis, floriferi erectis, cymae ramis patentibus, calycibus obtuſis. *Anglia.* (S. craſſicaule Link., criſtatum Schrad.)

rufeſcens W. 39. S. foliis tereti-ſubulatis, ramorum ſterilium glauceſcentibus 7fariam patentibus, floriferi patulis compreſſis viridibus, cymae multifidae ramis confertis erectis, floribus vireſcentibus. *Sibir.*

compactum Cand. 40. S. foliis tereti depreſſis baſi ſolutis incurvis glaucis mucronatis, ramorum ſterilium 5fariam confertis, cyma 4fida, petalis erecto-patentibus, capſulis elongatis roſtratis. *Gallia. Italia.* (S. rupeſtre Vill., rufeſcens Tenor.)

triangulare 41. S. foliis 6fariam imbricatis teretibus obtuſis erectiusculis, cyma 3fida patente folioſa. *Europ.*

acre 42. S. foliis alternis ſubovatis gibbis adnato-ſeſſilibus, cyma 3fida folioſa. *Europ.* (S. glaciale Clarion.)

pentapetalum Pursh. 43. S. foliis confertis adnato-ſeſſilibus tereti-compreſſis ſubulatis, cymae trichotomae ramis recurvatis, floribus ſeſſilibus, petalis linearibus calyce multo longioribus. *Ora occid. Amer. bor.*

coloniense Loiſ. 44. S. foliis undique imbricatis cylindricis obtuſis baſi ſolutis, cymis paucifloris, petalis lanceolatis calycem duplo ſuperantibus. *Ager pariſienſis.*

amplexicaule Cand. 45. S. foliis tereti-ſubulatis baſi membranaceis amplexicaulibus, ramorum ſterilium imbricatis, floriferi ſparſis, cyma 2fida pauciflora, floribus remotis ſeſſilibus, capſulis roſtratis. *Hiſpan. Luſitan. Gallia. Italia.* (S. roſtratum Tenor., carinatum Link. Sempervivum anomalum Lag. hort. matr.)

hispidum Desf. 46 S. foliis ſparſis ſemiteretibus patentibus, ramis filiformibus villoſis, floribus paniculatis, petalis lanceolatis acutis. *Atlas.*

annuum 47. S. foliis ſparſis remotiusculis teretibus obtuſis baſi ſolutis, cyma folioſa patula, floribus pedunculatis diſtantibus. *Europa.* (S. rupeſtre Oed., Oederi

Retz., alpeſtre Vill., rubens Hänk., ſaxatile Wigg. Willd. Cand.)

repens Cand. 48. S. caule baſi radicante aſcendente, foliis ſparſis cylindricis, cyma ſimplici pauciflora, petalis ovalibus. *Alp. helvet. et gall.* (S. annuum All.)

quadrifidum Pall. 49. S. caule ſimplici, foliis ſparſis teretibus obtuſis, floribus umbellatis 4petalis. *Aſia bor. arctic.*

lineare Thunb. 50. S. caule ſimplici, foliis oppoſitis ſemiteretibus elongatis acutis, cyma compoſita 3fida. *Japon.*

†† *Flores albi, rubentes, coerulei.*

hiſpanicum 51. S. foliis ſparſis teretibus acutiusculis glaucis, floribus cymoſis 6petalis, radice perenni. *Europ. auſtr.*

glaucum Kit. 52. S. foliis ſparſis teretiusculis obtuſis glaucis, floribus cymoſis 6petalis, radice annua. *Hungar. Transſylvan. Caucaſ.* (S. 6fidum M. B.)

rubens 53. S. foliis alternis ſubſiformibus gibbis glabris, caule ramoſo villoſo, cyma 4fida foliola, floribus ſecundis 5petalis 10andris. *Europ. auſtr.* (Craſſula rubens All. Ait. W. S. pallidum M. B.)

atratum 54. S. foliis ſparſis teretibus, obtuſis baſi ſolutis, floribus corymboſis faſtigiatis, capſulis obtuſis atro-purpureis. *Alp. Europ. med.* (S. Guettardi Vill. var.)

anglicum Hudſ. 55. S. caule aſcendente humili, foliis confertis alternis abbreviatis ovatis gibbis baſi ſolutis, cyma ſeſſili pauciflora, capſulis glabris membranaceis. *Anglia. Scotia.*

moranenſe Kunth. 56. S. caule repente ramoſo, foliis ſparſis ovato-oblongis obtuſis, floribus racemoſis ſecundis ſubſeſſilibus, petalis obtuſiusculis. *Mexico.*

album 57. S. caule erecto, foliis ſparſis cylindricis obtuſis glaberrimis, panicula ramoſiſſima. *Europ.*

daſyphyllum 58. S. caule debili decumbente, foliis breviſſimis ovato-ſubgloboſis glaucis, ramorum ſterilium imbricatis, floriferi alternis, floribus paucis terminalibus, petalis obtuſiusculis. *Anglia. Europ. austr.*

turgidum Cand. 59. S. caule repente glaberrimo ſubramoſo, foliis remotis ſemicylindricis abbreviatis, floribus cymoſis, petalis acutis. *Gallia auſtr. Mons Athos. Urvill. Caucaſ.?* (S. tenellum M. B., micranthum Cand.)

villoſum 60. S. caule ſimplici erecto foliisque remotiuſculis ſemiteretibus erectis viſcido-piloſis, cyma terminali pauciflora. *Europ.*

hirſutum All. 61. S. caule erecto foliisque remotis oblongo-cylindricis obtuſis hirſutis, cyma pauciflora, petalis ſubulatis. *Alp. pennin. Arvern.*

cruciatum Desf. 62. S. caule ramoſo baſi glabro radicante, foliis verticillatis ſemicylindricis obtuſis laevibus, corymbi ramis viſcoſo-pubeſcentibus. *Alp. grai. pennin.* (S. monregalenſe Balb.)

breviſolium Cand. 63. S. caule ſuffruticoſo decumbente ramoſo, foliis ovatis gibbis depreſſiusculis glaucis, floribus corymboſis, petalis obtuſis. *Pyren. Corſica.* (S. ſphaericum Lapeyr.)

coeruleum Vahl. 64. S. foliis ſparſis oblongo-cylindricis obtuſis baſi ſolutis, racemis paniculatis terminalibus, petalis obtuſis. *Afric. bor. Sicil.* (S. azureum Desf.)

heptapetalum Poir. 65. S. foliis ſparſis ovato-oblongis depreſſo-gibbis, racemis paniculatis filiformibus ſubpubeſcentibus, petalis cuſpidatis. *Afric. bor. Corſica. Melita. Creta.* (S. Cotyledon Sieber.?)

bracteatum Viv. 66. S. caule humili hirſutiusculo, foliis lineari-teretibus obtuſis, floribus cymoſis bracteatis, petalis ellipticis glanduloſis. *Ad magnam Syrtim Afr. bor.*

1731. COTYLEDON.

*Fruteſcentes.

† *Foliis planis.*

orbiculata 1. C. foliis obovato-orbiculatis acutiusculis carnoſis, floribus paniculatis. *C. B. S.* (C. ovata, oblonga, ramoſa et ramoſiſſima Haw., paniculata L. ſuppl.)

faſcicularis Ait. 2. C. foliis terminalibus faſciculatis cuneiformibus, caudice incraſſato, ramis carnoſis ſubconicis, floribus paniculatis nudis pendulis. *C. B. S.* (C. paniculata Thunb., curviflora Sims.)

ſpuria 3. C. foliis radicalibus ſpathulatis acutiusculis, ſcapo paucifloro, floribus nudis pendulis. *C. B. S.*

linguaeformis R. Br. 4. C. foliis radicalibus linguaeformibus acutis, floribus paniculatis, bracteis ſagittatis ſemiamplexicaulibus. *Californ.*

hemiſphaerica 5. C. foliis ovatis acutiusculis ſubtus hemiſphaericis furfureo-punctatis, ſpica nuda terminali, floribus remotiusculis. *C. B. S.*

coccinea Cav. 6. C. foliis obovatis acutis carnoſis ramisque villoſiusculis, ſpica folioſa terminali. *Patria?*

tuberculoſa Lam. 7. C. caule craſſo tuberculoſo, foliis ſerotinis oblongo-lanceolatis acutis, racemis terminalibus nudis calycibusque pubeſcentibus. *C. B. S.*

mucronata Lam. 8. C. foliis radicalibus obovatis mucronatis ſinuato-crenatis, ſcapo corymboſo. *Africa auſtr.* (C. undulata Haw.)

†† *Foliis teretiusculis.*

linguiata Lam. 9. C. caule tuberculato, foliis oppoſitis ſemiteretibus canaliculatis apice colorato mucronatis erectis, floribus corymboſis nudis nutantibus. *C. B. S.* (C. canaliculata Haw.?)

teretifolia Thunb. 10. C. foliis oppoſitis teretibus mucronatis caulequ hirſutis, floribus paniculatis cernuis villoſis. *C. B. S.*

cymoides Thunb. 11. C. caule craſſo tuberculato, foliis ſerotinis teretibus acutis glabris patulis, floribus corymboſis, pedunculis ſquamoſis. *C. B. S.*

reticulata Thunb. 12. C. caule craſſo foveolato, foliis teretibus acutis glabris erectis, paniculae decompoſitae ramis reticulatis erectis. *C. B. S.*

****Herbaceae.**

†*Foliis planis.*

cuneata Thunb. 13. C. caule pubescente viscido, foliis obovatis carnosis hirsutis, floribus paniculatis villoso-glutinosis. *C. B. S.*

purpurea Thunb. 14. C. caule glabro, foliis oblongo-linearibus carnosis concavis laevibus, floribus paniculatis. *C. B. S.*

triflora Thunb. 15. C. caule erecto glabro, foliis obovatis obtusissimis laevibus subincurvis, floribus spicatis ternis bracteatis. *C. B. S.* (*C. elata* Haw.?)

Malacophyllum Pall. 16. C. foliis radicalibus oblongo-lanceolatis obtusiusculis glaberrimis, scapo stricto simplici undique floribus pedunculatis foliisque tecto. *Davuria.*

spinosa 17. C. caule simplicissimo stricto, foliis radicalibus obovatis longissime cuspidatis, caulinis lanceolatis, spica elongata. *Sibiria.* (Crassula L. mant. Sedum W. en.)

serrata 18. C caule simplici spicato, foliis radicalibus spathulatis crenatis ciliatis. *Creta.*

Umbilicus 19. C. caule simplici, foliis omnibus peltatis cucullatis repando-dentatis, panicula racemosa pyramidata, floribus cernuis. *Anglia. Europ. austr.*

lutea Hudf. 20. C. caule simplici, foliis inferioribus subpeltatis crenatis, superioribus bracteisque ovatis dentatis, spica elongata foliosa, floribus erectis. *Anglia. Europ. austr.*

parviflora Sm. 21. C. foliis orbiculatis crenato-repandis, floribus paniculatis. *Creta.*

††*Foliis teretiusculis.*

papillaris Thunb. 22. C. caule decumbente villosiusculo, foliis oppositis teretibus utrinque attenuatis, floribus paniculatis glabris. *C. B. S.*

mammillaris Thunb. 23. C. caule repente carnoso, foliis subverticillatis secundis tereti-ovatis obtusis glabris, floribus alternis pedunculatis. *Afric. austr.*

hispanica 24. C. caule subramoso, foliis alternis teretibus obtusis pilosiusculis, floribus terminalibus corymboso-fasciculatis. *Hispania. Lusitania.* (C. tenuifolia Poir.)

hispida Lam. 25. C. caule subramoso pubescente, foliis alternis teretibus obtusis, floribus sparsis subpaniculatis. *Hispania. Lusitania.* (C. viscosa Vahl. Mucronia Ort.)

1732. SURIANA.

maritima *Ind. occid.* Frutex foliis spathulatis, floribus corymbosis flavis.

1733. BIEBERSTEINIA Steph.

odora Steph. 1. B. foliis pinnatifidis, laciniis rotundatis inciso-dentatis, petalis integerrimis. *Sibir.*

multifida Cand. 2. B. foliis pinnatifidis, laciniis multifidis linearibus, petalis dentatis. *Perſia.*

1734. JONCQUETIA Schreb.

paniculata W. *Guiana.* Arbor excelſa, foliis impari-pinnatis oblongis integerrimis glabris, floribus paniculatis albis. (Tapirira guianenſis Aubl.)

1735. ROBERGIA Schreb.

fruteſcens W. *Guiana.* Frutex foliis impari-pinnatis oblongis integerrimis ſubtus tomentoſis, floribus paniculatis albis. (Rourea fruteſcens Aubl.)

1736. CNESTIS Juſſ.

trifolia Lam. 1. Cn. foliis ternatis, foliolis ovato-oblongis acutis ſubtus tomentoſis, ſtipulis ſetaceis, panicula terminali. *Afric. occ.*

obliqua P. B. 2. Cn. foliis ternatis, foliolis lanceolatis acutis inaequilateris ſubtus glabris, panicula terminali. *Guinea.*

pinnata P. B. 3. Cn. foliis pinnatis, foliolis cordato-oblongis integerrimis glabris, corymbis axillaribus abbreviatis, floribus 2bracteatis. *Guinea.*

glabra Lam. 4. Cn. foliis pinnatis, foliolis ovali-oblongis utrinque ſubattenuatis integerrimis glabris, racemis aggregatis lateralibus. *Inſ. Mascaren.*

polyphylla Lam. 5. Cn. foliis pinnatis, foliolis ovali-oblongis acutis ſubtus villoſiusculis, racemis terminalibus tomentoſis. *Madagascar.*

corniculata Lam. 6. Cn. foliis pinnatis, foliolis oblongis acuminatis nervo medio villoſis, racemis lateralibus paucifloris, fructibus corniculatis pruritivis. *Afr. occ.*

1737. SPONDIAS.

Monbin 1. Sp. foliis impari-pinnatis ſub-10jugis, foliolis oblongis ſubdentatis parallele venoſis, petiolo communi compreſſo, racemis terminalibus. *Ind. occid.* (Sp. Myrobalanus Jacq.)

Myrobalanus 2. Sp. foliis impari-pinnatis ſub-8jugis, foliolis oblongis integerrimis parallele venoſis, petiolo communi tereti, panicula terminali laxa. *Ind. occid. Amer. auſtr.* (Sp. Monbin Jacq.)

dulcis Forſt. 3. Sp. foliis impari-pinnatis ſub-6jugis, foliolis oblongis acuminatis remote ſerratis, petiolo communi tereti, racemis axillaribus paniculatis. *Inſ. Societ. Mascaren.* (Sp. cytherea Sonner.)

Amra Hamilt. 4. Sp. foliis impari-pinnatis ſub-4jugis, foliolis oblongis acuminatis integerrimis, petiolo communi angulato, panicula terminali. *Ind. orient.* (Mangifera pinnata L. Sp. Mangifera W. amara Lam.)

1738. AVERRHOA.

Bilimbi 1. A. foliolis ovato-lanceolatis, fructibus oblongis obtusangulis. *Ind. or. Cochinchina.*

Carambola 2. A. foliolis ovatis inaequalibus acuminatis, fructibus oblongis acutangulis. *Ind. or. Cochinchina.*

1739. KIGGELARIA.

africana *Afric. austr.* Arbuscula foliis oblongis subserratis glabris, floribus racemosis pendulis albido-virescentibus. (K. integrifolia Jacq. var.)

1740. SMEGMARIA W.

emarginata *Chili.* Arbor frondosa sempervirens, foliis ovato-oblongis denticulatis emarginatis, floribus axillaribus. (Cullay Molin. non Quillaja.)

1741. CORIARIA.

myrtifolia 1. C. erecta diffusa, foliis petiolatis ovato-lanceolatis 3plinerviis, racemis subterminalibus abbreviatis. *Europ. austr. Afric. bor.*

ruscifolia 2. C. erecta ramosa, foliis sessilibus cordato-ovatis multinerviis, racemis axillaribus abbreviatis. *Peru. Chili.*

sarmentosa Forst. 3. C. procumbens, foliis subpetiolatis cordato-ovatis acuminatis 5nerviis, racemis axillaribus elongatis nutantibus. *Nov. Zeeland.*

microphylla Poir. 4. C. ramis 4angulis, foliis minimis ovatis obtusis 5nerviis, floribus spicatis lateralibus. *Peru.* Jos. Jussieu.

phylicifolia Humb. 5. C. erectiuscula, foliis pinnatis multijugis, foliolis petiolatis subcordato-oblongis acutis 3nervus venosis, racemis axillaribus subelongatis, pedunculis hispidis. *Peru.*

† *thymifolia* Humb. 6. C. erectiuscula, foliis pinnatis multijugis, foliolis petiolatis oblongis acutis 3nerviis eveniis, petiolis pedunculisque hispidis. *Peru.*

DECAGYNIA.

1742. NEVRADA.

procumbens *Aegypt. Arabia.* Herba tota lanato-tomentosa, foliis ovato-oblongis sinuato-dentatis, floribus axillaribus solitariis pedunculatis.

1743. GASTONIA Commers.

cutispongia Commers. 1. G. foliis pinnatis, foliolis integerrimis. *Inf. Mascaren.*

Nalugu Lam. 2. G. foliis pinnatis, foliolis serratis. *Ind. or.*

1744. PHYTOLACCA.

decandra 1. Ph. floribus 10andris 10gynis. *Amer. bor.*

abyſſinica Hofm. 2. Ph. floribus 10andris 5gynis. *Abyſſinia.* (P. dodecandra Herit.)

bogotenſis Humb. 3. Ph. floribus 7-12andris 7-9gynis. *Nov. Granat.*

octandra 4. Ph. floribus 8andris 8gynis, racemis breviter pedunculatis. *Japon. Mexico?*

heptandra Retz. 5. Ph. floribus 7andris 6gynis, foliis lanceolatis. *Amer.?* (Ph. ſtricta Hofm.)

icosandra 6. Ph. floribus 20andris 10gynis. *Ind. or.*

dioeca 7. Ph. fruticoſa, floribus dioecis polyandris. *Amer. auſtr.*

CLASSIS XI.

DODECANDRIA.

MONOGYNIA.

I. *Flores perfecti.*

A. *Corolla monopetala.*

Fructus ſuperus.

1745. ***Hopea*** **Roxb.** Cal. 5ſepalus, ſepalis 2 demum in alas fructus excreſcentibus. Cor. contorta 5partita. Filamenta alterna 2fida. Stigma ſimplex. Capſ. 1ſperma. *Familia?*

1746. *Baſſia* Kön. Cal. 5partitus. Cor. campanulata limbo 8fido. Filamenta duplici ſerie. Antherae ſagittatae. Bacca 5pyrena. *Sapoteae.*

1747. *Baitaria* R. et P. Cal. 2ſepalus 2bracteatus. Cor. tubuloſa, limbo 5fido. Stamina incluſa. Stigma 3fidum. Capſ. 3locularis polyſperma. *Familia?*

B. *Corolla pleiopetala.*

a. *Fructus ſuperus.*

1748. *Crateva.* Cal. 4partitus aut 4ſepalus. Pet. 4 ſecunda. Stam. declinata ſtipiti ovarii inſerta. Bacca ſtipitata 1locularis polyſperma. *Capparideae.*

1749. *Garcinia.* Flores ſubdiclini. Cal. 4ſepalus. Pet. 4. Stam. baſi ſubconnata. Stigma lobatum. Bacca 4–8locularis. Semina arillata. *Guttiferae.*

1750. *Heliocarpus.* Cal. 4ſepalus coloratus. Pet. 4. Stylus 2fidus. Capſ. 2locularis 2ſperma, valvis fimbriatis, fimbriis radiato-plumoſis. *Tiliaceae.*

1751. *Crenea* Aubl. Cal. urceolatus 4fidus. Pet. 4. Capſ. 5locularis polyſperma. *Salicariae.*

1752. *Elaeocarpus.* Cal. 5ſepalus. Pet. 5 apice fimbriato-laciniata vel lobata. Nectaria glanduloſo-ſquamaeformia. Antherae apice ſetigerae. Drupa ſub-2locularis. *Elaeocarpeae* Juſſ.

1753. *Tricuſpis* Perſ. Cal. 5dentatus. Pet. 5 3cuſpidata. Annulus nectariferus 10gonus. Antherae apice dehiſcentes. Capſ. 3locularis 3valvis oligoſperma. *Elaeocarpeae* Juſſ.

1754. *Vatica.* Cal. 5partitus. Pet. 5. Antherae ſeſſiles 4loculares, ſpinula loculis exterioribus interiecta. Capſ. ſub-3locularis? *Tiliaceae?*

1755. *Eurya* Thunb. Flores polygami. Cal. 5ſepalus ebracteatus. Pet. 5 baſi ſubcoalita. Antherae 4gonae. Stylus 3fidus. Capſ. baccata 3locularis. *Ternſtrömieae* Cand.

1756. *Ariſtotelea* Herit. Cal. 5partitus. Pet. 5. Stylus 3fidus. Bacca 3locularis. *Tiliaceae?*

1757. *Grangeria* Commerſ. Cal. 5partitus, laciniis revolutis. Pet. 5 unguiculata. Stigma ſimplex. Drupa 1pyrena. *Roſaceis aff.*

1758. *Triumfetta.* Cal. 5partitus. Pet. 5 acuminata aut 0. Stigma 2ſidum. Glandulae nectariferae perigynae. Capſ. 4locularis echinata. *Tiliaceae.*

1759. *Nitraria.* Cal. 5fidus. Pet. 5. Stylus 3fidus. Drupa 1pyrena. *Familia?*

1760. *Peganum.* Cal. 5partitus perſiſtens. Pet. 5. Filamenta baſi dilatata. Stigma 3quetrum. Capſ. 3locularis polyſperma. *Rutaceae.*

1761. *Hudſonia.* Cal. tubuloſus 5partitus. Pet. 5. Capſ. 3valvis oligoſperma. *Ciſteae.*

1762. *Talinum* Adanſ. Cal. ſub-2phyllus deciduus. Pet. 5. Stylus 3fidus. Capſ. 1locularis 3valvis. *Portulaceae.*

1763. *Lythrum.* Cal. tubuloſus, limbo 12dentato. Pet. 6, limbo calycis inſerta. Stigma capitatum. Capſ. 2locularis polyſperma. *Salicariae.*

1764. *Melanium* P. Br. Cal. ſubcampanulatus, limbo 6-10-12dentato. Pet. 5, 6, limbo calycis inſerta. Capſ. 1locularis oligoſperma. *Salicariae.*

1765. *Neſaea* Commerſ. Cal. campanulatus, limbo 12dentato. Pet. 6, limbo calycis inſerta. Capſ. 4locularis polyſperma. *Salicariae.*

1766. *Cuphea* P. Brown. Cal. tubuloſus baſi gibbus, limbo ſub-6dentato, dente ſupremo maximo. Pet. 6 limbo calycis inſerta ſubinaequalia. Capſ. 1locularis cum calyce hinc dehiſcens. Sem. lenticularia columnae liberae affixa. *Salicariae.*

1767. *Ginoria* Jacq. Cal. campanulatus, limbo colorato 6fido. Pet. 6 unguiculata collo calycis inſerta. Capſ. 1locularis 4valvis apice dehiſcens polyſperma. *Salicariae.*

1768. *Blakea* P. Brown. Cal. campanulatus, limbo 6dentato ſquamis cinctus. Pet. 6 collo calycis inſerta. Antherae baſi appendiculatae ſubcoalitae. Stigma ſimplex. Capſ. baccata 6locularis, placentis craſſis axi centrali affixis polyſpermis. *Melaſtomeae.*

1769. *Axinaea* R. et P. Cal. urceolatus, limbo obſolete denticulato. Pet. 6 orbiculata calyci inſerta. Antherae declinatae baſi appendiculatae apice poro gemino dehiſcentes. Capſ. 6locularis, placentis craſſis axi centrali affixis polyſpermis. *Melaſtomeae.*

1770. *Befaria* Mut. Cal. 7fidus. Pet. 7. Antherae pendulae. Stigma capitatum. Capſ. 7locularis polyſperma. *Ericeae.*

1771. *Lewiſia* Purſh. Cal. 7-9ſepalus coloratus. Pet. 14-18. Stigm. 3 2fida. Capſ. 3locularis, loculis 2ſpermis. *Familia?*

b. *Fructus inferus.*

1772. *Portulaca.* Cal. 2partitus caducus. Pet. 4, 5 baſi calycis inſerta. Stylus 3-5partitus. Capſ. 1locularis circumſciſſa polyſperma: ſemina filis ſingulis ad placentas plures liberas fixa. *Portulaceae.*

1773. *Dodecas.* Cal. 5fidus. Pet. 5 calyci inſerta. Capſ. 1locularis 4valvis polyſperma. *Onagrae?*

1774. *Chamaemeles* Lindl. Cal. 5dentatus truncatus. Pet. abbreviata calyci inſerta. Stigma ſimplex. Fructus baccatus? 2permus. *Pomaceae.*

1775. *Corallia* Roxb. Cal. 6-7fidus. Pet. orbiculata calyci inſerta. Stigma 3lobum. Bacca 1ſperma. *Pomaceae.*

1776. *Agathophyllum* Juſſ. Cal. truncatus. Pet. 6. Stam. alterna calyci alterna baſi petalorum inſerta. Drupa 6locularis. *Familia?*

1777. *Decumaria.* Cal. 8-12fidus. Pet. 8-12. Capſ. 8locularis polyſperma. *Familia?*

II. *Flores imperfecti.*

a. *Fructus ſuperus.*

1778. *Bocconia.* Cal. 2ſepalus caducus. Cor. 0. Antherae lineares. Stylus 2fidus. Capſ. compreſſa ſtipitata 1locularis ſub-1ſperma. *Papavereae.*

1779. *Podoria* Perſ. Cal. 4ſepalus. Cal. 0. Bacca ſtipitata globoſa 1ſperma. *Cappariideae.*

† 1780. *Apactis* Thunb. Cal. 0. Cor. 4petala inaequalis. Stylus ſimplex. Fructus? *Familia?*

† 1781. *Toxicodendron* Thunb. Flores dioeci. Cal. 5-8ſepalus. Cor. 0. Stigmata 3. Capſ. 3locularis, loculis 2ſpermis. *Tricoccae?*

1782. *Mabea* Aubl. Flores monoeci. Cal. 5dentatus. Cor. 0. Stigmata 3 filiformia revoluta. Capſ. 3locularis, loculis 2valvibus elaſtice diſſilientibus. *Tricoccae?*

1783. *Pterotum* Lour. Cal. 5ſepalus. Cor. 0. Antherae 2loculares. Achenium ſemine 1 alato. *Familia?*

1784. *Stixis* Lour. Cal. corollinus 6ſepalus. Stigmata 3. Drupa 1ſperma. *Familia?*

b. *Fructus inferus.*

1785. *Aſarum.* Cal. corollinus 3partitus. Antherae laterales. Stigma 6lobum. Capſ. 6locularis. *Ariſtolochieae.*

c. *Flores nulli.*

1786. *Thoa* Aubl. Monoeca. Spica apice ♂, ſtamina e nodis, baſi ♀, ſtigmate 3fido. Caryopſis.

DIGYNIA.

1787. *Agrimonia.* Cal. 5fidus ſuperus uncinato-ſetoſus. Pet. 5 calyci inſerta. Sem. 2 calyce veſtita. *Roſaceae.*

1788. *Calliconna* R. Br. Flores aggregati. Rec. globoſum villoſum. Involucrum 4phyllum. Cal. 4ſepalus. Cor. 0. Styli divaricati. Germen ſuperum 4ſpermum. *Canonicae* R. Br.

1789. *Euclea.* Flores dioeci. Cal. 5dentatus. Pet. 5. Bacca ſupera 2locularis. *Rhamneae?*

1790. *Pleurandra* Labill. Cal. 5ſepalus. Pet. 5. Stam. 1lateralia. Styli filiformes. Achenia 2. *Dilleniceae.*

TRIGYNIA.

1791. *Reseda.* Cal. inferus 4-5-6partitus. Pet. laciniata basi incrassata nectarifera. Capsl. 1locularis apice hians, placentatio parietalis. *Resedeae.*

1792. *Ochradenus* Delil. Cal. rotatus 5dentatus, glandula annulari repletus. Bacca polysperma. *Resedeae.*

1793. *Gelonium* Roxb. Flores dioeci. Cal. 5sepalus. Cor. 0. Stigmata 3 lacera. Capsl. 3locularis 3sperma. *Tricoccae.*

TETRAGYNIA.

1794. *Visnea.* Cal. 5sepalus. Pet. 5. Antherae 4gonae. Styli breves. Nux 3locularis, loculis 2spermis. *Onagrae?*

1795. *Dicroa* Lour. Cal. tubulosus 4dentatus. Pet. 5 crassa. Stamina corolla breviora. Bacca 4locularis polysperma. *Familia?*

1796. *Quillaja* Molin. Flores monoeci. Cal. 4sepalus. Cor. 0. Capsl. 4locularis. *Familia?*

1797. *Bertolonia* *. Cal. 6-7sepalus corollinus. Nectaria 10-14. Antherae sessiles 2valves. Styli crassi stigmatibus fungosis. *Chenopodeae.*

1798. *Calligonum.* Cal. 5partitus. Cor. 0. Nux 4angularis 4alata. *Polygoneae.*

1799. *Aponogeton* Thunb. Flores spicati bracteis coloratis distincti. Capsl. 4 sub-3spermae. *Alismeae?*

PENTAGYNIA.

1800. *Blackwellia* Commers. Cal. semisuperus 5fidus. Pet. 5-10. Capsl. 1locularis polysperma. *Rosaceae.*

1801. *Vauquelinia* Bonpl. Cal. 5fidus. Pet. 5 fauci calycis inserta. Capsl. calyce cincta 5cocca, coccis 2spermis. *Rosaceae.*

1802. *Lindleya* Kunth. Cal. 5fidus. Pet. 5 fauci calycis inserta. Discus annularis staminifer. Antherae basi uncinato-reflexae. Capsl. 5locularis sub-5sperma: semina marginata. *Rosaceae.*

1803. *Kageneckia* R. et P. Flores dioeci. Cal. hemisphaericus 5partitus. Pet. 5 fauci calycis inserta. Capsl. 5 1loculares: semina sub 20 apice alata. *Rosaceae.*

1804. *Orygia* Forsk. Cal. 5sepalus. Pet. 20 lanceolata. Styli filiformes. Capsl. 5locularis 5valvis polysperma. *Portulaceae?*

1805. *Brunelia* R. et P. Cal. 5partitus. Cor. 0. Glandulae nectariferae 10-14. Capsl. 5 2spermae: semina arillata. *Terebinthaceae.*

1806. *Glinus.* Cal. 5sepalus subcorollinus. Stamina setis distincta. Capsl. 5locularis polysperma. *Aizoideae.*

HEXAGYNIA.

1807. *Stratiotes.* Flores dioeci. Cal. 3partitus. Cor. 3petala. Antherae acuminatae. Setae stamina stylosque stipantes. Bacca 6locularis polysperma. *Hydrocharides.*

1808. *Cephalotus* Labill. Cal. 6partitus coloratus. Cor. 0. Stam. alterna longiora. Antherae didymae glandula nexae. Fructus 1spermi. *Rosaceae.*

DODECAGYNIA.

1809. *Sempervivum.* Cal. 10-12partitus. Pet. 10-12. Capſ. 10-12.

POLYGYNIA.

1810. *Ceratocephalus* Mönch. Cal. 5ſepalus. Pet. 5 unguiculata. Caryopſes cornutae. *Ranunculeae.*

1811. *Iſopyrum.* Cal. corollinus 5ſepalus. Pet. 5 tubuloſa 2labiata. Folliculi plures pleioſpermi. *Ranunculeae.*

1812. *Laurelia* Juſſ. Flores monoeci. Cal. campanulatus multifidus, laciniis imbricatis. Squamae 3 nectariferae ad baſin ſtaminum. Caryopſes plures in calyce nidulantes. *Monimieae.*

CLASSIS XI.

DODECANDRIA.

MONOGYNIA.

1745. Hopea Roxb.

odorata Roxb. *Calcutta.* Arbor foliis alternis ovato-oblongis ſubtus reticulatis, axillis venarum glanduloſis, floribus ſpicato-paniculatis flavidis.

1746. Bassia Kön.

longifolia 1. B. foliis lanceolatis acutis venoſis, pedunculis congeſtis axillaribus longiſſimis horizontalibus. *Malabar.*

latifolia Roxb. 2. B foliis oblongis acutis, pedunculis congeſtis terminalibus nutantibus. *Ind. or. Nov. Hebrid.* (B. obovata Forſt.)

1747. Baitaria R. et P.

acaulis R. et P. *Peru.* Herba foliis radicalibus lineari-lanceolatis.

1748. Crateva.

* *Floribus corollatis.*

tynandra 1. Cr. foliis membranaceis oblongis acutis, ſtaminibus germinis ſtipiti inſertis petala ſpathulato-linearia longe ſuperantibus. *Jamaica. Ad fl. Magdalen.* Bertero. (Cr. tapioides Cand.)

Tapia 2. Cr. foliis ſubcoriaceis oblongis acutis, ſtaminibus receptaculo inſertis petala obovata longe ſuperantibus. *Ind. or. et occ.*

obovata Vahl. 3. Cr. foliis obovatis obtuſis, ſtaminibus receptaculo inſertis petala ſubrotunda longe ſuperantibus, germinibus cylindricis. *Madagascar.* (Othrys Thuar.)

fragrans Sims. 4. Cr. caule volubili, foliis ellipticis, ſtaminibus petala elongata undulata aequantibus. *Sierra Leone.* (Cr. capparoides Andr.)

religiosa Forst. 5. Cr. foliis membranaceis oblongo-lanceolatis, staminibus petala oblonga acuta subexcedentibus. *Malabar. Insul. Societ. Cochinchina.* (Capparis magna Lour.)

falcata Cand. 6. Cr. foliis ovato-lanceolatis falcatis, racemis laxis terminalibus, staminibus petala oblonga superantibus. *Cochinchina.* (Capparis falcata Lour.)

oblongifolia * 7. Cr. foliis oblongis obtusis mucronatis perennantibus, staminibus germinis stipite brevioribus petala abbreviata superantibus. *Arabia. Ind. or.* (Capparis oblongifolia Forsk. Niebuhria Cand.)

** *Floribus apetalis.*

apetala * 8. Cr. foliis linearibus recurvo-mucronatis coriaceis, floribus racemosis, germinibus globosis. *Ind. or.* (Capparis apetala Roth. Niebuhria linearis Cand.)

cafra Burch. 9. Cr. foliis oblongis, floribus racemosis. *Afric. austr.* (Niebuhria Cand.)

avicularis Burch. 10. Cr. foliis obovatis abbreviatis, floribus racemosis. *Afric. austr.* (Niebuhria Cand.)

1749. GARCINIA.

* *Staminibus basi discretis.*

Mangostana 1. G. foliis oblongis venosis coriaceis, floribus terminalibus solitariis pedunculatis erectis. *Java. Insul. Molucc.*

cornea 2. G. foliis oblongis obtusis subemarginatis coriaceis, floribus terminalibus solitariis pedunculatis cernuis. *Insul. Molucc.*

Cambogia Desr. 3. G. foliis oblongo-lanceolatis subvenosis coriaceis, floribus terminalibus congestis subsessilibus, fructibus costatis. *Ind. or.* (Cambogia Gutta L.)

** *Staminibus basi subcoalitis.*

amboinensis * 4. G. foliis ovali-oblongis eveniis coriaceis, floribus congestis axillaribus pedunculatis. *Amboina. Cochinchina.* (Oxycarpus cochinchinensis Lour.)

celebica 5. G. foliis oblongo-lanceolatis subvenosis coriaceis, floribus axillaribus subaggregatis cernuis. *Insul. Molucc.* (Brindonia Thuar.)

Cowa Roxb. 6. G. foliis ovatis acuminatis, floribus polygamis, ♂ congestis lateralibus, ☿ solitariis terminalibus. *Ind. orient.* (G. dioeca Sm. Brindonia indica Thuar.)

1750. HELIOCARPUS.

americanus 1. H. foliis cordatis 3lobis subtus ramisque cymae glabris. *Nov. Hispan.*

popayanensis Kunth. 2. H. foliis cordatis 3lobis subtus ramisque cymae tomentosis. *Nov. Granat.*

1751. CRENEA Aubl.

maritima Aubl. 1. Cr. caule erecto 4gono, foliis oppositis spathulato-oblongis, pedunculis axillaribus aggregatis subbifloris bracteatis. *Guianna.*

repens Meyer. 2. Cr. caule fruticoso repente, foliis oppositis spathulatis, pedunculis 1floris ebracteatis, capsula 1loculari. *Guiana.*

1752. ELAEOCARPUS.

* *Petala laciniato-fimbriata.*

serratus 1. E. foliis elliptico-oblongis crenatis, racemis axillaribus elongatis, floribus 8andris. *Ind. or.*

reticulatus Sm. 2. E. foliis oblongis utrinque attenuatis serratis subtus reticulatis, racemis axillaribus folio brevioribus, floribus secundis pendulis 15andris. *Nov. Holl.* (E. cyaneus Sims.)

sylvestris Poir. 3. E. foliis ovato-lanceolatis serratis, racemis spicatis subterminalibus. *Ind. orient. Cochinchina.* (Adenodus sylvestris Lour. E. nitidus et Perim-Kara Cand.)

† *tectorius* Poir. 4. E. foliis oblongis crenatis, racemis spicatis terminalibus. *Cochinchina.* (Craspedum tectorium Lour.)

monoceras Cav. 5. E. foliis lanceolatis apice subserratis, racemis axillaribus villosiusculis. *Amer. austr.*

integrifolius Lam. 6. E. foliis ovato-oblongis obtusis integerrimis, racemis axillaribus, floribus 4fidis. *Inf. Mascaren. Molucc.* (E. oblongus Sm.)

integerrimus Lour. 7. E. foliis lanceolatis integerrimis, floribus congestis axillaribus pedunculatis 5fidis. *Cochinchina.*

** *Petala triloba.*

pedunculatis Labill. 8. E. foliis oppositis lanceolatis serratis, pedunculis axillaribus 1floris elongatis nutantibus. *Nov. Holl.* (Friesia Cand.)

dentatus Vahl. 9. E. foliis alternis oblongis superne dentato-serratis, racemis axillaribus. *Nov. Zeeland.* (Dicera dentata Forst.)

Dicera Vahl. 10. E. foliis oppositis ovato-oblongis duplicato-serratis, paniculis axillaribus pubescentibus, floribus 4gynis. *Nov. Zeeland.* (Dicera serrata Forst.)

1753. TRICUSPIS Perf.

dependens Perf. *Chili.* Arbor foliis oppositis ovato-oblongis serratis, pedunculis axillaribus solitariis. (Tricuspidaria R. et P.)

1754. VATICA.

chinensis *China.* Frutex ramis angulatis, foliis alternis cordato-oblongis obtusis integerrimis, floribus paniculatis.

1755. EURYA Thunb.

japonica Thb. 1. E. foliis oblongo-lanceolatis ſerratis ramulisque glabris, pedunculis axillaribus aggregatis abbreviatis. *Japon.*

chinenſis R. Br. 2. E. foliis obovato-oblongis, ramulis pubeſcentibus, floribus axillaribus. *China.*

multiflora Cand. 3. E. foliis elliptico-oblongis, ramulis piloſiusculis, floribus faſciculatis lateralibus. *Nepal.*

acuminata Cand. 4. E. foliis elliptico-oblongis acuminatis, ramulis villoſis, floribus axillaribus paucis. *Nepal.*

1756. ARISTOTELEA Herit.

Macqui Herit. *Chili.* Arbuscula foliis oppoſitis oblongis ſerratis, floribus racemoſis albidis.

1757. GRANGERIA Commerſ.

borbonica Lam. *Inſ. Mascaren.* Arbor excelſa, ramulis punctato-verruculoſis, foliis ovato-ellipticis integerrimis ſupra reticulatis ſubtus nitidis, floribus racemoſis albis.

1758. TRIUMFETTA.

* *Floribus corollatis.*

† *Foliis angulato-lobatis.*

glabra Rottl. 1. Tr. foliis cordato-ſubrotundis acute 3lobis crenatis utrinque nudis, racemis terminalibus elongatis, calycibus incanis pubeſcentibus, fructibus hirtis. *Ind. or.*

angulata Lam. 2. Tr. foliis oblongis baſi rotundatis angulatis dentatis ſupra glabris ſubtus villoſiusculis, floribus glomeratis axillaribus ſubſeſſilibus. *Ind. or.* (Tr. Bartramia L. excl. Rumph. ſyn.)

molliſſima Kunth. 3. Tr. foliis baſi truncatis glanduloſo-crenatis ſubrotundis angulatis inaequaliter dentatis ſupra ſtellato-pubeſcentibus ſubtus villoſo-tomentoſis, paniculis racemoſis terminalibus, calycibus fructibusque hiſpidiusculis. *Ad fl. Magdalen. Nov. Granat.*

hirta Vahl. 4. Tr. foliis baſi ſubcordatis glanduloſo-dentatis 3lobis acuminatis inaequaliter ſerratis ſupra glabris ſubtus ſtellato-pubeſcentibus, paniculae terminalis ramis dichotomis hirtis. *Ad fl. Magdalen.*

velutina Vahl. 5. Tr. foliis baſi rotundatis glanduloſo-dentatis ovatis acuminatis ſubangulatis inaequaliter ſerratis ſubtus incano-tomentoſis, floribus axillaribus. *Inſ. Mascaren. Guinea.*

procumbens Forſt. 6. Tr. foliis ſubrotundo-cordatis ſub-3lobis utrinque tomentoſis, floribus axillaribus, caule procumbente. *Inſ. Societ.*

famitriloba 7. Tr. foliis basi rotundatis glanduloso-dentatis oblongis 3lobis subtus dense villosis, lobo medio producto, summis indivisis lanceolatis, floribus axillaribus glomeratis, fructibus incano-pilosis. *Ind. occ.* (Tr. havanensis Kunth.)

trilocularis Roxb. 8. Tr. foliis subrotundo-ovatis 3lobis serratis superioribus ovato-lanceolatis, capsulis 3locularibus. *Ind. or.*

†† *Foliis indivisis.*

rhomboidea Jacq. 9. Tr. foliis rhombeo-ovatis crenatis subtus incanis, pedunculis axillaribus aggregatis, fructibus hirsutis. *Ind. occ.*

annua 10. Tr. foliis ovatis acutis dentatis glabriusculis, pedunculis axillaribus 3floris. *Japa.* (Tr. indica Lam.)

rotundifolia Lam. 11. Tr. foliis subrotundis duplicato-dentatis basi glandulosis supra rugulosis subtus albido-tomentosis, racemis terminalibus, calycibus incanis. *Ind. or.* (Tr. suborbiculata Cand.)

glandulosa Forsk. 12. Tr. foliis late ovalibus inaequaliter dentatis basi glandulosis subtus villosiusculis, pedunculis axillaribus congestis. *Arabia. Inf. Mascaren. Ind. or.* (Tr. Vahlii Poir.)

althaeoides Lam. 13. Tr. foliis basi rotundatis glanduloso-dentatis ovatis acutis utrinque villoso-tomentosis, floribus axillaribus, setis fructuum hispidis. *Ind. occ.* (Tr. macrophylla Vahl.)

grandiflora Vahl. 14. Tr. foliis basi subtruncatis ovato-oblongis inaequaliter dentatis supra subtrigosis subtus glabris, ramis hirsutis, setis fructuum elongatis glabris. *Inf. Carib.*

† *acuminata* Kunth. 15. Tr. foliis subcordato-oblongis acuminatis duplicato-serratis supra pubescentibus subtus tomentosis. *Nov. Granat.*

bogotensis Cand. 16. Tr. foliis ovato-oblongis acuminatis argute duplicato-dentatis ramisque pilosis, pedunculis axillaribus 3floris. *Nov. Granat.* (Tr. pilosa Kunth.)

rubricaulis Kunth. 17. Tr. foliis oblongis acuminatis serratis basi glandulosis ramisque pubescentibus, pedunculis axillaribus 3floris, fructibus 6locularibus. *Caracas.*

trichoclada Cand. 18. Tr. foliis ovato-oblongis acuminatis aequaliter serratis basi integerrimis utrinque subtrigosis, ramis, petiolis pedunculisque axillaribus hinc hirsutis. *Nepal.* (Tr. triclada et oblongata Link.)

† *obliqua* Roth. 19. Tr. foliis oblique cordatis oblongis acuminatis inaequaliter serratis supra stellato-asperis subtus tomentosis. *Patria?*

** *Floribus apetalis.*

Lappula 20. Tr. foliis subcordato-subrotundis acutis angulatis inaequaliter dentatis subtus villosis, racemis paniculatis terminalibus, calycibus hirsutis. *Ind. occid.*

heterophylla Lam. 21. Tr. foliis inferioribus ſubrotundis 3lobis, ſuperioribus oblongis repandis, pedunculis axillaribus. *Hiſpaniola.*

piloſa Roth. 22. Tr. foliis ovato-oblongis acuminatis inaequaliter crenatis piloſis ſubtus ſericeo-tomentoſis, pedunculis axillaribus, calycibus incano-hiſpidiusculis. *Ind. or.*

1759. NITRARIA.

Schoberi Murr. 1. N. foliis ſpathulatis integerrimis. *Aſia med.*

tridentata Desf. 2. N. foliis cuneatis ſub-3dentatis. *Afric. bor.* (Peganum retuſum Forsk. ?)

1760. PEGANUM.

Harmala *Ad mare mediterraneum, pontum euxinum et mare caſpium.* Herba ſuffruticoſa foliis ſubbipinnatifidis linearibus glabris, floribus ſolitariis albis. (P. crithmifolium Retz.)

1761. HUDSONIA.

ericoides 1. H pubeſcens ſuberecta, foliis filiformibus ſubulatis ſubimbricatis, pedunculis ſolitariis, calycibus obtuſis. *Amer. bor.*

montana Nutt. 2. H. glabriuscula decumbens, foliis filiformibus ſubulatis elongatis, pedunculis terminalibus, calycibus acuminatis lanatis, capſulis 3ſpermis. *Carolin. bor.*

tomentoſa Nutt. 3. H. incano-tomentoſa, foliis exiguis ovatis imbricatis appreſſis, floribus ſubſeſſilibus aggregatis, calycibus obtuſis. *Amer. bor.*

auſtralis * 4. H. glabriuscula erecta, foliis lineari-lanceolatis ſubtus piloſis ſparſis patulis, floribus terminalibus ſolitariis pedunculatis, calycibus acuminatis hirſutiusculis. *Monte Video.* Sello.

1762. TALINUM Adanſ.

* *Fruticoſa.*

triangulare W. 1. T. foliis obovatis retuſis, pedunculo racemoſo terminali 3angulari. *Ind. occ.* (Portulaca racemoſa L., 3angularis Jacq., Rülingia Ehrb.)

craſſifolium W. 2. T. foliis obovatis mucronatis, pedunculo terminali corymboſo 3angulari. *Patria?* (Portulaca craſſifolia Jacq.)

cuneifolium W. 3. T. foliis obovatis ſeſſilibus, paniculae terminalis ramis 3floris. *Arabia.* (Orygia portulacaefolia Forsk. Portulaca cuneifolia Vahl.)

fruticoſum W. 4. T. foliis obovatis emarginatis, corymbo terminali, calycibus 5ſepalis. *Ind. occ.* (Portulaca fruticoſa ſyſt. veg. ed. 15. paniculata L.)

Anacampferos W. 5. T. foliis ovatis ſubtus gibbis, ſtipulis piliformibus folio brevioribus, racemo ſimplici. *Afric. auſtr.* (Portulaca Anacampferos L. Rülingia Ehrh. R. varians Haw.)

arachnoides R. Br. 6. T. foliis ellipticis ſubtus gibbis araneoſis, ſtipulis folio brevioribus, pedunculis ſub-3floris elongatis. *C. B. S.* (Portulaca Haw. Anacampferos Sims. Talinum retuſum W.)

filamentoſum R. Br. 7. T. foliis ovatis obtuſiusculis utrinque gibbis araneoſis, ſtipulis folio longioribus, pedunculis 3floris. *C. B. S.* (Portulaca Haw. Anacampferos Sims. Rülingia polyphylla Haw.)

lanceolatum Link. 8. T. foliis lanceolatis acutis utrinque convexis nitidis, ſtipulis filamentoſis folio brevioribus, caule abbreviato ſub-1floro. *C. B. B.* (Rülingia et Portulaca Haw.)

** *Herbacea.*

patens W. 9. T. foliis ovato-lanceolatis ſubpetiolatis, ramis 4gonis, paniculae terminalis ramis dichotomis. *Ind. occ.* (Talinum reflexum Cav.)

mucronatum Kunth. 10. T. foliis ſpathulato-lanceolatis, pedunculis terminalibus racemoſis, petalis mucronatis. *Nov. Granat.*

paniculatum R. et P. 11. T. foliis obovato-oblongis acuminatis, floribus paniculatis, petalis acutis. *Peru.*

revolutum Kunth. 12. T. foliis ſpathulatis margine revolutis, pedunculis terminalibus dichotome paniculatis, petalis mucronatis. *Amer. auſtr.* (T. lingulatum R. et P.)

cauleſcens * 13. T. foliis ſubſpathulato-lanceolatis acutis, pedunculis axillaribus 1floris, floribus oligandris. *Quito. Mexico.* (Coſmia Domb. Calandrinia Kunth. T. album et nitidum R. et P.)

crenatum R. et P. 14. T. foliis ſubrotundo-ovatis acutis, floribus racemoſis polyandris, petalis crenulatis. *Peru.*

polyandrum R. et P. 15. T. foliis ſubrotundo-obovatis acutis, floribus racemoſis polyandris, petalis obcordatis. *Peru.*

monandrum R. et P. 16. T. foliis ſpathulato-lanceolatis, floribus racemoſo-ſpicatis ſecundis 1andris. *Chili.*

ciliatum R. et P. 17. T. foliis oblongo-linearibus ciliatis, floribus axillaribus ſolitariis. *Peru.*

lineare Kunth. 18. T. foliis linearibus acutiusculis, pedunculis racemoſis fructiferis recurvatis. *Mexico.*

umbellatum R. et P. 19. T. foliis linearibus piloſis, ſcapis umbelliferis filiformibus. *Peru.*

teretifolium Pursh. 20. T. foliis teretibus carnoſis, pedunculis corymboſis terminalibus. *Amer. bor.*

acaule * 21. T. foliis linearibus obtuſis elongatis, ſcapo unifloro foliis breviori. *Quito.* (Calandrinia Kunth.)

1763. LYTHRUM.

Salicaria 1. L. foliis oppoſitis cordato-lanceolatis ſubhirſutis, floribus racemoſo-ſpicatis. *Europ. Amer. boreal.*

virgatum 2. L. foliis oppoſitis lanceolato-linearibus glabris, ramis virgatis teretiuſculis, pedunculis ſubternis. *Auſtria. Italia. Galicia. Podolia. Caucaſ.* (L. acuminatum W. Gräfferi Tenor. varr.)

alatum Pursh. 3. L. foliis ſeſſilibus ſubcordatis lanceolatis glabris, ramis virgatis 4gono-alatis, floribus geminis ſubſeſſilibus axillaribus 6andris. *Georgia.*

nummulariifolium Perſ. 4. L. foliis oppoſitis ſuperioribus alternis ſubrotundis obtuſiuſculis, floribus axillaribus ſolitariis 8andris. *Corſica.*

dipetalum Mutis. 5. L. foliis verticillatis oppoſitisque ovatis acutis aſperis ſupra nitidis, ramis viſcoſis, floribus axillaribus pedunculatis nutantibus 2petalis. *Nov. Granat.*

flavum * 6. L. foliis oppoſitis lineari-lanceolatis ramisque glaberrimis, floribus axillaribus ſubſeſſilibus ſolitariis 12andris. *Monte Video.* Sello.

maritimum Kunth. 7. L. foliis oppoſitis ſparſisque ovato-lanceolatis acutis ſubtus glauceſcentibus glabris, floribus axillaribus ſolitariis 6andris, caule ſuffruticoſo. *Peru.*

Kennedianum Kunth. 8. L. foliis oppoſitis ſuperioribus alternis ſubcordato-oblongis acutis ſubtus glaucoeſcentibus, floribus axillaribus ſolitariis 6andris. *Nov. Hiſpan.*

album Kunth. 9. L. foliis ſparſis linearibus acutis, floribus axillaribus ſolitariis 6andris, caule ſuffruticoſo. *Mexico.*

acutangulum Lag. 10. L. foliis ſubalternis lanceolatis, floribus ſolitariis breviter pedunculatis, calycibus acute angulatis. *Hiſpania.*

lineare 11. L. foliis oppoſitis linearibus acutis glabris, floribus axillaribus ſolitariis 2bracteatis 6andris, caule herbaceo ramoſo. *Virginia.*

apetalum * 12. L. foliis linearibus acutis alternis, floribus ſubverticillatis apetalis 6andris, caule fruticoſo. *Braſil.* Sello.

Hyſſopifolia 13. L. foliis alternis lineari-lanceolatis, floribus axillaribus ſolitariis 6andris, caule herbaceo ſtricto. *Europ. Afric. auſtr.* (L. tenellum Thb.)

Thymifolia 14. L. foliis alternis linearibus, floribus axillaribus ſolitariis 4petalis 2andris, caule herbaceo ramoſo. *Europ. Afric. auſtr.* (L. hyſſopifolium Thb.)

theſioides M. B. 15. L. foliis alternis lineari-lanceolatis, capſulis pedicellatis ſubgloboſis 4dentatis. *Caucaſ.*

1764. MELANIUM P. Br.

alliaceum * 1. M. caule proſtrato, foliis ovatis oppoſitis, floribus alternis ſub-10andris. *Jamaica.* (Lythrum Melanium L.)

hirtum * 2. M. caule erecto ramoſo hirto, foliis oppoſitis lanceolatis ſeſſilibus, floribus pedunculatis erectis

subsolitariis 6andris, calycibus 2bracteatis hirsutis. *Hispaniola. Portorico.*

scabrum * 3. M. caule erecto diffuse ramoso foliisque oppositis ovatis scaberrimis, floribus axillaribus solitariis subsessilibus 6andris. *Jamaica. Hispaniola.* (Lythrum Parsonsia L.)

fruticosum * 4. M. caule fruticoso erecto, foliis oppositis oblongis, floribus axillaribus pedunculatis solitariis 12andris. *Amboina. Inf. Societ.* (Pemphis acidula Forst. Lythrum Pemphis L. suppl.)

1765. NESAEA Commers.

salicifolia Kunth. 1. N. caule fruticoso, foliis inferioribus oppositis superioribus alternis, foliis lanceolatis subsessilibus, pedunculis axillaribus abbreviatis 1floris. *Mexico.* (Heimia Link.)

speciosa Kunth. 2. N. caule fruticoso, foliis cordato-ovatis acutis sessilibus, pedunculis unifloris abbreviatis. *Brasil.*

triflora Kunth. 3. N. caule herbaceo, foliis oppositis sessilibus lanceolatis glabris, pedunculis axillaribus elongatis 3floris. *Amer. austr.* (Lythrum 3florum L. suppl.)

verticillata Kunth. 4. N. caule herbaceo foliisque oppositis petiolatis lanceolatis pubescentibus, floribus axillaribus pedunculatis verticillato-corymbosis sub-10andris. *Virginia.* (Lythrum verticillatum L.)

1766. CUPHEA P. Brown.

* *Fruticosae.*

Swartziana * 1. C. caule decumbente, ramis hirsutis, foliis cordato-ovatis venosis scabris, floribus racemosis 10andris, petalis subaequalibus. *Hispaniola.* (Lythrum cordifolium Sw.)

racemosa * 2. C. foliis oppositis petiolatis obovatis obtusiusculis glabris, racemis terminalibus, calycibus piloso-viscidis. *Amer. austr. Jamaica.* (Lythrum racemosum Mut.)

decandra R. Br. 3. C. foliis oppositis oblongis utrinque attenuatis glabris ciliatis, racemis terminalibus elongatis, floribus 10andris. *Jamaica.* (Lythrum ciliatum Sw.)

nigrophylla Kunth. 4. C. foliis ovato-oblongis scabriusculis ramisque viscidis, floribus lateralibus alternis. *Peru.* (C. cordata R. et P.?)

serpyllifolia Kunth. 5. C. foliis ovato-oblongis acutis utrinque subtrigosis ramisque viscidulis, calycibus hispidulo-glutinosis. *Nov. Granat.*

antisyphilitica Kunth. 6. C. foliis ovato-oblongis acutis scabris, floribus alternis lateralibus axillaribusque, calycibus hispidulis. *Amer austr.* (C. strigulosa Kunth.)

scabrida Kunth. 7. C. foliis oblongis utrinque attenuatis rigidis supra strigilloso-scabris venosis subtus calycibus-

que glabris, ramis 2fariam pilosis, floribus alternis lateralibus. *Mexico. Brasil.*

† *micropetala* Kunth. 8. C. foliis oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis rigidis scabris, floribus alternis secundis, petalis minutissimis. *Mexico.*

† *xorullensis* Kunth. 9. C. foliis oblongo-lanceolatis acutis rigidis utrinque scabris, ramis viscido-pubescentibus, pedunculis terminalibus subracemosis, calyce viscido pubescente. *Mexico.*

† *verticillata* Kunth. 10. C. foliis verticillatis ovato-oblongis acutiusculis viscoso-strigillosis, floribus lateralibus subsolitariis. *Peru.*

hirtella Kunth. 11. C. foliis oblongis utrinque attenuatis ramulisque viscido-subhirsutis, floribus terminalibus racemosis. *Nov. Granat.*

denticulata Kunth. 12. C. foliis oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis glabris denticulato-ciliatis, ramulis viscoso-hirsutis, floribus racemosis, calycibus hispidulis. *Cumana.*

loxensis Kunth. 13. C. foliis ovato-oblongis acutis supra scabris subtus pilosiusculis, ramulis calycibusque glanduloso-hirsutis, floribus lateralibus alternis. *Nov. Granat.*

hyssopifolia Kunth. 14. C. foliis lanceolatis acutis supra glabris subtus ramisque substrigosis, floribus lateralibus alternis, calycibus glabris. *Mexico.*

gracilis Kunth. 15. C. foliis lanceolatis acutis glabris, ramis virgatis calycibusque piloso-glandulosis, floribus lateralibus alternis. *Ad Orinoc. Brasil.* (C. fruticosa *, N. E.)

flava * 16. C. foliis oppositis confertis cordato-lanceolatis margine revolutis glabriusculis, floribus terminalibus subracemosis, calycibus piloso-glandulosis. *Brasil.* Sello.

** *Herbaceae.*

viscosissima Jacq. 17. C. caule erecto ramoso viscoso-hirsutiusculo, foliis ovato-lanceolatis supra scabris, floribus axillaribus subsolitariis. *Virginia. Amer. tropic.* (Lythrum petiolatum L. L. Cuphea L. fil. Balsamona Pinto Vand.)

procumbens Cav. 18. C. caule ramoso hirto subviscido, foliis oblongo-lanceolatis pilosiusculis, floribus lateralibus alternis, calycibus pilosis, filamentis duobus longioribus apice barbatis. *Mexico.* (C. lanceolata R. Br. bracteata Lag.)

nitidula Kunth. 19. C. caule ramoso fusco-villoso, foliis ovato-oblongis subtus hispidulis supra viscido-nitidulis, floribus lateralibus subsessilibus, calycibus glanduloso-pilosis, petalis subaequalibus. *Mexico.* (C. aequipetala Cav.)

cordifolia Kunth. 20. C. caule ramoso viscido-pubescente, foliis cordato-oblongis acutis margine revolutis rigidis scabris, floribus lateralibus subracemosis, calyce hispidulo-viscoso. *Nov. Granat.*

virgata Cav. 21. C. ramis virgatis hiſpidis, foliis ovato-lanceolatis ſupra ſcabris ſubtus piloſis, floribus lateralibus ſolitariis ſubſeſſilibus. *Mexico.*

ſpicata Cav. 22. C. ramis hiſpidulis, foliis oblongis utrinque attenuatis glabris, racemis nudis axillaribus terminalibusque, calycibus hiſpidulis. *Peru. Braſil.* (C. circaeoides Ker.)

micrantha Kunth. 23. C. ramis foliisque ovato-oblongis acutis piloſiusculis, floribus terminalibus ſubracemoſis, calycibus hiſpidulis, petalis ſubaequalibus. *Ad Orinocum.*

1767. GINORIA Jacq.

americana Jacq. *Cuba.* Frutex cubitalis, ramis cinereis, foliis oppoſitis oblongis obtuſiusculis integerrimis glabris, floribus umbellato-corymboſis cyaneo-rubris.

1768. BLAKEA P. Brown.

* *Foliis 3-5plinerviis.*

trinervia L. ſuppl. 1. Bl. foliis ovali-oblongis utrinque nitidis parallele venoſiſſimis, ramis rufo-tomentoſis, pedunculis ſolitariis, ſquamis calycem excedentibus imbricatis. *Jamaica.*

laevigata Don. 2. Bl. foliis ovalibus integerrimis ramulisque glabris, pedunculis ſolitariis, ſquamis baſi connatis calyce brevioribus. *Mexico.*

latifolia Don. 3. Bl. foliis ovali-oblongis acutis 3plinerviis glabris, pedunculis ſolitariis, ſquamis calyce longioribus. *Peru.* (Valdeſia R. et P.)

ovalis Don. 4. Bl. foliis ovali-oblongis acuminatis utrinque nitidis, pedunculis geminis, ſquamis calyce longioribus, petalis obtuſis. *Peru.* (Valdeſia R. et P.)

roſea Don. 5. Bl. foliis ovali-lanceolatis acuminatis glabris, pedunculis geminis, ſquamis calyce longioribus, petalis mucronatis. *Peru.* (Valdeſia R. et P.)

repens Don. 6. Bl. foliis lanceolatis acuminatis ſubtus piloſis, pedunculis geminis, ſquamis calyce brevioribus, petalis mucronulatis. *Peru.* (Valdeſia R. et P.)

** *Foliis quinquenerviis.*

quinquenervia Aubl. 7. Bl. foliis oblongis acuminatis 5plinerviis utrinque nitidis, pedunculis geminis, ſquamis calyce longioribus. *Guiana.* (Bl. 3plinervia L. ſuppl. Vahl.)

parasitica Don. 8. Bl. caule ſcandente, foliis ſubcordato-ovatis acutis ſupra nitidis, pedunculis ſubternis abbreviatis, ſquamis calycem aequantibus. *Guiana.* (Topobea parasitica Aubl.)

macrophylla Don. 9. Bl. foliis amplis ovalibus utrinque glabris, pedunculis ſolitariis, ſquamis calyce longioribus. *Mexico.*

rotundifolia Don. 10. Bl. foliis amplis ſubrotundis ſubtus ramulisque denſe ferrugineo-tomentoſis, pedunculis ſolitariis, ſquamis calyce longioribus. *Peru.*

multiflora Don. 11. Bl. foliis ovali-oblongis acutis ſubtus piloſis, pedunculis ſubternis, ſquamis calyce 3plo brevioribus. *Peru.*

mexicana Don. 12. Bl. foliis ellipticis acutis denticulatis ſubtus piloſis, pedunculis ſubternis, ſquamis calyce longioribus. *Mexico.*

1769. AXINAEA R. et P.

purpurea R. et P. 1. A. foliis cordatis 7nerviis crenatis reticulato-venoſis ſupra rugoſis ſcabris ſubtus lacunoſis fuſco-tomentoſis, pedunculis 1floris aggregatis. *Peru.*

glanduloſa R. et P. 2. A. foliis ovatis 5nerviis denticulatis baſi 2glanduloſis ſupra glabris ſubtus flavido-tomentoſis, panicula terminali multiflora. *Peru.*

lanceolata R. et P. 3. A. foliis oblongo-lanceolatis acuminatis 5nerviis dentatis ſupra glabris ſubtus fuſco-tomentoſis, racemis paniculatis. *Peru.*

dependens R. et P. 4. A. foliis lanceolatis acuminatis 5nerviis dentato-ſerratis ſupra glabris, racemo terminali compoſito pendulo. *Peru.*

muricata Don. 5. A. foliis ſubcordato-oblongis acutis 3nerviis crenatis ſupra nudis ſubtus ramulisque denſe granuloſis, panicula terminali granuloſo-muricata. *Peru.*

1770. BEFARIA Mut.

racemoſa Vent. 1. B. foliis ovato-lanceolatis glabris, ramis laevibus hiſpidisve, floribus racemoſo-paniculatis terminalibus. *Georgia. Florida.* (B. paniculata Mx.)

aeſtuans Mut. 2. B. foliis oblongis ſupra glabris ſubtus glauco-pubeſcentibus, corymbis terminalibus glanduloſo-hirſutis viſcidis. *Nov. Granat.* (Acunna lanceolata R. et P. ?)

reſinoſa Mut. 3. B. foliis ovatis laevibus, pedunculis terminalibus corymboſis pubeſcentibus, corollis reſinoſis. *Nov. Granat.*

coarctata Humb. 4. B. foliis oblongis glabris ſubtus glaucis, pedunculis terminalibus corymboſis calycibusque ferrugineo-tomentoſis. *Peru.* (Acunna oblonga R. et P. ?)

caxamarcenſis Kunth. 5. B. foliis oblongis ſupra glabris ſubtus pubeſcentibus glaucis, pedunculis terminalibus corymboſis calycibusque ferrugineo-hirtis. *Peru.*

glauca Humb. 6. B. glabra, foliis oblongis obtuſis ſubtus glaucis, racemis axillaribus terminalibusque, pedicellis ſubfaſtigiatis. *Nov. Granat.*

grandiflora Humb. 7. B. foliis ovatis ſupra glabris ſubtus ferrugineo-tomentoſis, pedunculis terminalibus corymboſis calycibusque ferrugineis. *Quito.*

ledifolia Humb. 8. B. foliis oblongis ſubmucronatis margine revolutis ſubtus glaucis nervo medio glanduloſo-piloſis, pedunculis terminalibus racemoſis viſcoſo-hirſutis. *Nov. Granat.*

1771. LEWISIA Pursh.

rediviva Pursh. *Ad fl. Clarkii et montes ſcopuloſos* (rocky mountains) *Amer. ad Caurum.* Herba acaulis ſucculenta, foliis radicalibus linearibus obtuſis, ſcapo 1floro, floribus albis.

1772. PORTULACA.

oleracea 1. P. caule proſtrato, foliis ſpathulatis, floribus ſeſſilibus. *Europ.*

marginata Kunth. 2. P. caule erectiusculo diffuſo, foliis ſpathulatis marginatis, floribus congeſtis involucratis. *Nov. Granat.*

pusilla Kunth. 3. P. caule ramoſo, foliis ellipticis, floribus ſubſeſſilibus. *Ad Orinoc.*

halimoides 4. P. foliis oblongis, floribus terminalibus congeſtis. *Jamaica.*

meridiana 5. P. caule radicante, foliis oblongis, axillis piloſis, floribus terminalibus ſubbaggregatis. *Ind. orient.*

quadrifida 6. P. caule proſtrato, foliis ovato-lanceolatis, floribus ſeſſilibus bracteatis 4fidis. *Aegypt.*

umbricola Kunth. 7. P. caule ramoſo, foliis ſparſis lanceolatis acutis, floribus ſubſeſſilibus. *Nov. Granat.*

rubricaulis Kunth. 8. P. caule aſcendente ramoſo, foliis ſubverticillatis lanceolatis acutis, floribus congeſtis involucratis. *Amer. auſtr.*

† *caffra* Thunb. 9. P. caule ramoſo, foliis lineari-oblongis, floribus axillaribus pedunculatis. *Afric. auſtr.*

piloſa 10. P. caule procumbente, foliis lineari-teretibus ſubulatis, axillis piloſis, floribus terminalibus ſeſſilibus ſubcongeſtis. *Amer. auſtr.* (P. teretifolia Kunth.)

peruviana Lindl. 11. P. caule decumbente, ramis erectis ſub-3floris, foliis lineari-teretibus ſubulatis, axillis nudis, floribus axillaribus terminalibusque ſolitariis involucratis, calycibus piloſis, petalis retuſis. *Afric. occ.*

laxinoſa Kunth. 12. P. caule decumbente, foliis teretibus obtuſis, ſummis ſubverticillatis, axillis calycibusque piloſis, floribus terminalibus ſeſſilibus congeſtis. *Ad fl. Amazonum.*

1773. DODECAS.

ſurinamenſis L. ſuppl. *Surinam.* Frutex ramis 4gonis, foliis ſpathulatis, pedunculis axillaribus 1floris.

1774. CHAMAEMELES Lindl.

coriacea Lindl. *Madera.* Frutex foliis ſpathulatis ſuberenatis, racemis axillaribus paucifloris.

1775. CARALLIA Roxb.

lucida Roxb. *Ind. or.* Arbor foliis oppoſitis oblongis ſerrulatis nitidis, pedunculis axillaribus incraſſatis cymoſis paucifloris, floribus luteis.

1776. AGATHOPHYLLUM Juſſ.

aromaticum W. *Madagascar.* Arbor craſſa, foliis alternis obovatis coriaceis, corymbis terminalibus. (Ravenſara Sonner. Evodia Gärtn.)

1777. DECUMARIA.

barbara *Carolina.* Frutex ſcandens foliis ovato-oblongis ſubſerratis, floribus corymboſis albis. (D. ſarmentoſa Boſc. var.)

1778. BOCCONIA.

frutescens 1. B. caule fruticoſo, foliis oblongis pinnatifidis ſubtus tomentoſis, laciniis dentatis. *Cuba. Mexico. Peru.*

integrifolia Humb. 2. B. caule fruticoſo, foliis oblongis crenatis. *Peru. Nov. Hiſpan.*

cordata W. 3. B. caule herbaceo elato, foliis cordatis ſinuato-lobatis glabris. *China bor.*

1779. PODORIA Perſ.

ſenegalenſis Perſ. *Senegambia.* Frutex foliis oblongis mucronatis, floribus parvis corymboſis. (Boſcia Lam.)

†1780. APACTIS Thunb.

japonica Thb. *Japon.* Arbor foliis alternis ovatis ſerratis glabris, floribus racemoſis.

†1781. TOXICODENDRON Thunb.

capenſe Thb. *C. B. S.* Frutex foliis verticillatis oblongis coriaceis, pedunculis corymboſis axillaribus. (Hyacinthe globoſa Lamb.)

1782. MABEA Aubl.

Piriri Aubl. 1. M. foliis oblongis utrinque attenuatis. *Guiana.*

Taquari Aubl. 2. M. foliis ſubcordato-oblongis obtuſiusculis. *Guiana.*

1783. PTEROTUM Lour.

procumbens Lour. *Cochinchina.* Frutex foliis alternis ovato-lanceolatis integerrimis, racemis axillaribus.

1784. STIXIS Lour.

scandens Lour. *Cochinchina.* Frutex scandens foliis oblongis acuminatis integerrimis, floribus racemosis variegatis.

1785. ASARUM.

europaeum 1. A. foliis geminatis reniformibus obtusissimis pubescentibus, calycibus hirsutiusculis erectis. *Europ.*

canadense 2. A. foliis geminatis reniformibus submucronatis pubescentibus, calycibus lanatis reflexis. *Amer. boreal.* (A. carolinianum Walt., latifolium Salisb.)

virginianum 3. A. foliis solitariis cordatis coriaceis glabris, calycibus subcampanulatis. *Amer. boreal. China. Japon.*

arifolium Mx. 4. A. foliis solitariis subhastato-cordatis maculatis, calycibus tubulosis infra limbum contractis. *Carolina.* (A. virginicum Walt.)

1786. THOA Aubl.

urens Aubl. 1. Th. partibus ♀ solitariis. *Guiana.*

edulis W. 2. Th. partibus ♀ spicatis. *Ind. or.*

DIGYNIA.

1787. AGRIMONIA.

Eupatoria 1. A. foliis interrupte pinnatis hirsutis, impari petiolato, spicis pedunculatis elongatis. *Europ. Amer. bor.* (A. odorata Gamer. Ait.)

succoolens Pursh. 2. A. foliis interrupte pinnatis hirtis, impari sessili, racemis spicatis elongatis viscosis. *Virginia. Carolina.*

parviflora Ait. 3. A. foliis interrupte pinnatis lineari-lanceolatis hirsutis, impari sessili, spicis virgatis. *Amer. bor.* (A. striata Mx.?)

repens 4. A. foliis interrupte pinnatis hirsutis, impari sessili, racemis spicatis hirtis sessilibus, bracteis reflexis pedicellos superantibus.

1788. CALLICOMA R. Br.

serratifolia R. Br. *Nov. Holl.* Frutex foliis oppositis oblongis serratis supra nitidis subtus tomentosis, capitulis pedunculatis, floribus ochroleucis.

1789. EUCLEA.

lancea Thunb. 1. E. foliis lanceolatis acutiusculis, pedunculis axillaribus 3fidis. *Afric. auſtr.*

racemoſa 2. E. foliis obovato-oblongis obtuſis coriaceis, pedunculis racemoſis nutantibus. *Afric. auſtr.*

undulata Thb. 3. E. foliis obovato-oblongis undulatis, pedunculis racemoſis erectiusculis. *Afric. auſtr.*

1790. PLEURANDRA Labill.

* *Foliis glabris.*

bracteata R. Br. 1. Pl. foliis ſpathulatis mucronatis ſubtus discoloribus, floribus terminalibus ſolitariis ſeſſilibus, bracteis ſericeis. *Nov. Holl.*

nitida R. Br. 2. Pl. foliis ſpathulatis acutiusculis mucronatis laevibus glaucis, floribus terminalibus ſolitariis, bracteis glabris, germinibus tomentoſis. *Nov. Holl.*

Cneorum Cand. 3. Pl. foliis ſpathulatis obtuſis, bracteis germinibusque glabris, floribus terminalibus ſolitariis ſeſſilibus. *Nov. Holl.*

riparia R. Br. 4. Pl. foliis linearibus obtuſiusculis margine revolutis, floribus terminalibus ſolitariis ſeſſilibus, calycibus glabris, germinibus hirſutis. *Nov. Holl.*

pedunculata R. Br. 5. Pl. foliis linearibus obtuſis margine ſubrevolutis, floribus pedunculatis ſub-8andris, calycibus germinibusque glabris. *Nov. Holl.*

enervia Cand. 6. Pl. foliis linearibus acutiusculis enerviis, floribus ſeſſilibus, calycibus obtuſis mucronulatis germinibusque glabris. *Nov. Holl.*

acicularis Labill. 7. Pl. foliis linearibus cuſpidatis, pedunculis axillaribus elongatis 1floris, germinibus hirſutis. *Nov. Holl.*

aceroſa R. Br. 8. Pl. foliis lineari-ſubulatis margine revolutis ſupra ſcabris ſubtus laevibus, pedunculis terminalibus 1floris, germinibus villoſis. *Nov. Holl.*

** *Foliis pubeſcentibus.*

hypericoides Cand. 9. Pl. foliis linearibus obtuſis margine revolutis ſupra aſperis ſubtus incanis, floribus pedunculatis, calycibus germinibusque pubeſcentibus. *Nov. Holl.*

ericaefolia Cand. 10. Pl. foliis linearibus obtuſiusculis margine revolutis ſupra aſperis ſubtus pubeſcentibus, floribus ſeſſilibus, calycibus germinibusque hirſutiuſculis. *Nov. Holl.*

intermedia Cand. 11. Pl. foliis linearibus obtuſis margine revolutis ſuperne ſcabris nitidis ſubtus ſubpubeſcentibus, floribus pedunculatis, calycibus glabris, germinibus hirſutis, ſtaminibus ſubamphigynis. *Nov. Holl.*

empetrifolia Cand. 12. Pl. foliis linearibus obtusis margine revolutis supra nitidis subtus villosiusculis, floribus pedunculatis 5andris. *Nov. Holl.*

scabra R. Br. 13. Pl. foliis oblongis obtusis utrinque asperis subtus canescentibus, floribus pedunculatis, calycibus glabris, germinibus subtomentosis. *Nov. Holl.*

ovata Labill. 14. Pl. foliis ovato-oblongis utrinque attenuatis strigilloso-asperis, floribus pedunculatis, calycibus germinibusque pubescentibus. *Terra Diemen.*

parviflora Cand. 15. Pl. foliis obovatis utrinque stellato-pubescentibus subtus tomentosis, floribus pedunculatis, calycibus germinibusque pilosis. *Nov. Holl.*

furfuracea R. Br. 16. Pl. foliis spathulatis stellato-pubescentibus, floribus pedunculatis bracteatis, calycibus germinibusque hirsutiusculis. *Nov. Holl. versus Africum.*

cinerea R. Br. 17. Pl. foliis oblongis obtusis utrinque villosis subtus incanis, floribus pedunculatis, calycibus germinibusque hirsutis. *Nov. Holl. ad Africum.*

fericea R. Br. 18. Pl. foliis linearibus obtusiusculis margine revolutis calycibusque fericeo-villosis, floribus subsessilibus terminalibus. *Nov. Holl. ad Africum.*

TRIGYNIA.

1791. RESEDA.

* *Foliis indivisis.*

sesamoides 1. R. foliis linearibus obtusis crassiusculis glabris, capsulis sub-4dentatis, dentibus reflexis. *Gallia austr. Hispania. Lusitania.* (R. purpurascens L. stellata Lam. Clusii *.)

linifolia Horn. 2. R. foliis linearibus subulatis canaliculatis, capsulis 3-5dentatis. *Europ. austr. Aegypt.?* (R. subulata Delil.?)

glauca 3. R. foliis linearibus glaucis subdentatis, caule ramoso, capsulis 4dentatis. *Hispan. Aegypt.*

dipetala Ait. 4. R. foliis linearibus integerrimis acutis, floribus 4gynis 2petalis, petalis inaequaliter laciniatis. *Afric. austr.* (R. capensis Thunb.)

scoparia Brouss. W. 5. R. foliis linearibus integerrimis glabriusculis, caule fruticoso, ramis virgatis, capsulis clavatis 3dentatis. *Teneriffa.*

canescens 6. R. foliis lineari-lanceolatis undulatis pilosis, ramis hirtis, capsulis 6dentatis. *Aegypt.* (R. 6gyna Forsk.)

Luteola 7. R. foliis lanceolatis glabris basi utrinque 1dentatis, capsulis 4dentatis, radice perenni. *Europ.* (R. lanceolata Lag., crispata Link.)

virescens Horn. 8. R. foliis lineari-lanceolatis glabris basi edentulis, capsulis 4dentatis, radice annua. *Hispan.*

chinenſis Lour. 9. R. foliis lato-lanceolatis integerrimis glabris, calycibus 5partitis, capſulis 3dentatis. *China auſtr.*

cochinchinenſis Lour. 10. R. foliis lato-lanceolatis 5nerviis integerrimis, calycibus 5partitis, capſulis 3dentatis. *Cochinchina.*

** *Foliis ſubdiviſis.*

mediterranea 11. R. foliis lanceolatis acutis integris 3fidisque, calycibus 6partitis corolla brevioribus, capſulis 3dentatis. *Afric. bor.* (R. 4gyna Forsk.)

odorata 12. R. foliis lanceolatis obtuſiusculis integris 3fidisque, calycibus 6partitis corollam aequantibus, capſulis 3dentatis. *Afric. bor.*

Phyteuma 13. R. foliis inferioribus ſpathulatis indiviſis, ſuperioribus ſubdiviſis, calycibus 6partitis florem ſuperantibus, capſulis 3dentatis. *Auſtria. Helvetia. Europ. auſtr.* (R. media Lag.)

ramoſiſſima Pourr. 14. R. foliis linearibus indiviſis 3fidisque, caule ramoſiſſimo, calycibus 6partitis, capſulis obovatis 3dentatis. *Hiſpania.* (R. erecta Lag.)

ſaxatilis Pourr. 15. R. foliis omnibus 3fidis, ſuperiorum laciniis linearibus, inferiorum lanceolatis undulatis, caule ſimplici, fructibus clavato-elongatis. *Hiſpan.* (R. ſtricta Perſ.)

pruinoſa Delil. 16. R. foliis omnibus 3fidis cauleque pruinoſo-papuloſis, laciniis lineari-lanceolatis acutis, capſulis clavatis obtuſe 3dentatis. *Aegypt.*

*** *Foliis pinnatis pinnatifidisque.*

lutea 17. R. foliis infimis pinnatis, ſuperioribus pinnatifidis 3fidisque, laciniis lanceolatis ſubundulatis, calycibus 6partitis, capſulis 3dentatis. *Europ.*

undata 18. R. foliis omnibus pinnatifidis, laciniis lineari-lanceolatis mucronatis undulatis margine ſcabris, racemo denſe ſpicato, petalis 3fidis calycem 5partitum ſuperantibus, capſulis maximis 3dentatis. *Europ. auſtr.*

alba 19. R. foliis omnibus pinnatifidis, laciniis lanceolatis laevibus ſubundulatis, racemo laxo, petalis 3lobis calycem 6partitum ſuperantibus, capſulis 4dentatis. *Europ. auſtr.*

fruticuloſa 20. R. foliis interrupte pinnatis, pinnis lanceolatis recurvis margine ſcabris, caule baſi fruticoſo, calycibus 5partitis, capſulis 4dentatis, dentibus recurvis. *Hiſpan. Sicil.*

bipinnata W. 21. R. foliis 2pinnatifidis ſcaberrimis, caule ſuffruticoſo, floribus ſpicatis. *Hiſpan.*

1792. OCHRADENUS Delil.

baccatus Delil. *Aegypt. ſuper.* Fruticulus ramoſus, ramis virgatis ſtrictis glabris, foliis linearibus obtuſiusculis e tuberculo glanduloſo, floribus ſpicatis flavis, pedunculis demum ſpineſcentibus.

1793. GELONIUM Roxb.

bifarium Roxb. 1. G. foliis oblongis utrinque attenuatis. *Ind. or.*

lanceolatum W. 2. G. foliis ſpathulato-lanceolatis. *Ind. or.*

TETRAGYNIA.

1794. VISNEA.

Mocanera *Inſ. Canar.* Frutex foliis petiolatis oblongis coriaceis ſubſerratis, floribus axillaribus ſolitariis pedunculatis nutantibus albis.

1795. DICHROA Lour.

febrifuga Lour. *China. Cochinchina.* Arbor foliis lanceolatis ſerratis, floribus corymboſis extus albis intus coeruleis.

1796. QUILLAJA Molin.

Saponaria Molin. *Chili.* Arbor excelſa, foliis alternis oblongis denticulatis undulatis, floribus axillaribus pedunculatis virentibus.

1797. BERTOLONIA *.

paniculata * *Braſil.* Frutex foliis oppoſitis oblongis glabris, floribus paniculatis. (Leandra Radd.?)

1798. CALLIGONUM.

Pallaſia Ait. 1. C. fructibus alatis, alis membranaceis ſubdentatis undulatis. *Ad Volgam.* (Pallaſia caſpica L. ſuppl. Pterococcus aphyllus, Calligonum polygonoides et Pallaſia Pterococcus Pall.)

polygonoides 2. C. fructibus cancellatis, ſetis ramoſis rigidis. *Armenia. Aegypt. Afric. boreal.* (C. comoſum Herit.)

1799. APONOGETON Thunb.

monoſtachys L. ſuppl. 1. A. ſpica ſimplici, foliis cordato-ovalibus. *Ind. or. China. auſtr.* (Saururus natans L. Spathium chinenſe Lour... A. lineare Vahl. var.?)

criſpus Thb. 2. A. ſpica ſimplici, foliis enſiformibus acuminatis criſpis. *Ceylon.*

diſtachys Ait. 3. A. ſpica 2fida, foliis oblongis elongatis acutiusculis natantibus, bracteis indiviſis. *C. B. S.*

anguſtifolius Ait. 4. A. ſpica 2fida, foliis lineari-lanceolatis erectis, bracteis 2partitis, floribus 6andris. *C. B. S.*

PENTAGYNIA.

1800. BLACKWELLIA Commerſ.

axillaris Lam. 1. Bl. foliis ovatis ſubcrenatis utrinque glabris, ſpicis axillaribus elongatis nutantibus, floribus plumoſo-villoſis. *Madagascar.*

ſpiralis Wall. 2. Bl. foliis ovato-oblongis uncinato-dentatis ſubtus villoſiusculis, petiolo apice 2glanduloſo, racemis axillaribus elongatis villoſis, floribus faſciculatis apetalis. *Inſ. Mascaren.*

paniculata Lam. 3. Bl. foliis ovato-ſubrotundis dentatis, floribus paniculatis. *Inſ. Mascaren.*

integrifolia Lam. 4. Bl. foliis ovatis obtuſis ſubintegerrimis utrinque glabris, floribus paniculatis terminalibus. *Inſ. Mascaren.*

glauca Vent. 5. Bl. foliis ovato-oblongis obtuſis glaucis utrinque glabris ſubintegerrimis, racemis axillaribus paniculatis. *Inſ. Mascaren.*

cerafifolia Vent. 6. Bl. foliis oblongis acuminatis dentatis utrinque glabris, racemis axillaribus oppoſitis. *Madagascar.*

tomentoſa Vent. 7. Bl. foliis obovatis dentatis tomentoſis, ſpicis axillaribus elongatis. *Java.*

1801. VAUQUELINIA Bonpl.

corymboſa Bonpl. *Mexico.* Arbor foliis ſparſis lanceolatis dentatis, floribus corymboſis albis.

1802. LINDLEYA Kunth.

meſpiloides Kunth. *Mexico.* Arbor foliis ſparſis oblongis crenulatis, floribus axillaribus ſolitariis albis.

1803. KAGENECKIA R. et P.

glutinoſa Kunth. *Nov. Granat.* Arbor ramulis glutinoſis, foliis oblongo-lanceolatis crenato-ſerratis nitidis, floribus terminalibus ♂ corymboſis, ♀ ſolitariis. (Lydaea Lyday Molin.)

1804. ORYGIA Forsk.

decumbens Forsk. *Arabia.* Fruticulus decumbens, foliis obovatis mucronatis, floribus racemoſis axillaribus purpureis. (Portulaca Vahl. Talinum W.)

1805. BRUNELIA R. et P.

comocladifolia Humb.
1. Br. foliis impari-pinnatis multijugis, foliolis oblongis ſpinoſo-ſerratis ſubtus tomentoſis, paniculis axillaribus. *Peru.*

inermis R. et P.
2. Br. foliis impari-pinnatis ternatis ſimplicibusque, foliolis ſerratis, fructibus glabris. *Peru.*

aculeata R. et P.
3. Br. foliis abrupte pinnatis, foliolis integerrimis, fructibus aculeatis. *Peru.*

acutangula Humb.
4. Br. foliis ternis oblongo-lanceolatis ſerratis ſubtus pulverulento-pubeſcentibus, ramis 3quetris, fructibus pubeſcentibus. *Nov. Granat.*

ovalifolia Humb.
5. Br. foliis ternis ſubrotundo-ovalibus ſerratis ſubtus pubeſcentibus, capitulis axillaribus pedunculatis. *Peru.*

tomentoſa Humb.
6. Br. foliis ternis ovali-oblongis ſerratis ſubtus reticulatis tomentoſis, racemis axillaribus. *Peru.*

1806. GLINUS.

lotoides
1. Gl. albido-lanatus diffuſus herbaceus, foliis obovatis faſciculatis inaequalibus, pedunculis unifloris axillaribus. *Ad litora maris mediterr. et ind.*

trianthemoides Roth.
2. Gl. glaber herbaceus, foliis obovatis, floribus paniculatis. *Ind. or.*

victamnoides
3. Gl. tomentoſus fruticoſus, foliis orbiculatis, pedunculis aggregatis axillaribus 1floris. *Ind. orient.*

ſeſſiflorus Forsk.
4. Gl. villoſus fruticoſus, foliis orbiculatis, floribus capitatis. *Arabia.*

*mozambicenſis**
5. Gl. glaber fruticuloſus, foliis obovato-oblongis ſubſeſſilibus, floribus congeſtis pedunculatis lateralibus. *Inſ. Mozambica. Afric. orient.* **(Miltus africana Lour.)**

HEXAGYNIA.

1807. STRATIOTES.

aloides
1. Str. foliis lineari-lanceolatis carinatis aculeato-denticulatis, ſpatha bifida nuda. *Europ.*

acoroides
2. Str. foliis linearibus elongatis flaccidis apice ſubſerratis, ſpatha bifida apice barbata. *Inſ. Ind. orient.*

1808. CEPHALOTUS Labill.

follicularis Labill.
Nov. Holl. ad Africum. Planta acaulis mirabilis propter folliculos plicatos operculatos ore annulato, foliis radicalibus ſpathulatis acutis interjectos, ſcapo racemoſo-paniculato.

DODECAGYNIA.

1809. SEMPERVIVUM.

* *Fruticosa: foliis planis.*

arboreum 1. S. caule laevi ramoso, foliis spathulatis acutiusculis glabris ciliatis, ciliis patulis mollibus, panicula diffusa. *Graecia. Lusitania. C. B. S.* (S. africanum Mill.)

ciliatum Brouss. 2. S. caule glabro, foliis obovatis acutis glabris cartilagineo-ciliatis, cymis confertis. *Teneriffa.*

canariense 3. S. caule abbreviato foliisque spathulatis mucronatis villosis, paniculae ramis divaricatis. *Inf. Canar.*

tortuosum Ait. 4. S. ramis tortuosis pubescentibus, foliis obovatis subtus convexis villosis, floribus paniculatis. *Inf. Canar.*

glutinosum Ait. 5. S. foliis cuneiformibus viscidis ciliatis, ciliis cartilagineis appressis, paniculae amplissimae declinatae ramis divaricatis glutinosis. *Madera.*

glandulosum Ait. 6. S. foliis orbiculato-spathulatis margine glutinosis globoso-glandulosis. *Madera.*

Smithii Sims. 7. S. foliis obovatis acuminatis plano-convexis subtus maculatis cauleque hispidis, ramis floriferis apice revolutis, floribus confertis. *Teneriffa.*

barbatum C. Smith. 8. S. foliis ovato-spathulatis acutis cartilagineo-denticulatis, ramis tortuosis, floribus paniculatis. *Inf. Canar.* (S. lineolare Haw. spathulatum Horn.)

† *tabulaeforme* Haw. 9. S. foliis dense imbricatis spathulatis ciliatis glabris. *Madera.*

** *Herbacea.*

tectorum 10. S. propaginibus patulis, foliis lanceolatis ciliatis, caule folioso villoso, nectariis cuneiformibus subcarnosis. *Europ.*

globiferum 11. S. propaginibus globosis demum patulis, foliis lanceolatis ciliatis, caule folioso villoso, nectariis subnullis. *Europ.*

montanum 12. S. propaginibus patulis, foliis lanceolatis villosis, petalis lineari-lanceolatis acuminatis elongatis. *German. austr.*

hirtum 13. S. propaginibus globosis demum patulis, foliis ciliatis, petalis elongatis apice hirsutis. *Hungar. Bohemia. Helvetia.*

pumilum M. B. 14. S. propaginibus globosis, foliis lanceolatis pilosis, caule paucifloro, petalis hirsutis. *Caucasus.*

arachnoideum 15. S. propaginibus globosis, foliis 3gonis apice barbatis filo nexis. *Europ. austr.*

anomalum Lag. 16. S. glaberrimum, propaginibus cylindricis, foliis carnosis subulatis basi solutis. *Hispan. austr.*

caespitosum C. Smith. 17. S. propaginibus globosis, foliis lanceolato-linearibus longe ciliatis lineato-maculatis glabris, cymae 2fidae ramis divaricatis. *Inf. Canar.* (S. barbatum Horn., ciliatum Sims.)

†*soboliferum* Sims. 18. S. propaginibus globosis deciduis, foliis ovato-lanceolatis ciliatis, petalis fimbriatis erectis. *Patria?*

flagelliforme Fisch. 19. S. propaginibus patulis lateralibus, foliis ovatis mucronatis papillosis ciliatis, cymae ramis 2fidis. *Sibir.*

aureum C. Smith. 20. S. foliis obovato-spathulatis mucronatis margine cartilagineo-membranaceis integerrimis, floribus cymoso-umbellatis, nectariis 0. *Inf. Canar.*

villosum Ait. 21. S. foliis obovatis obtusis villosis, nectariis palmatis. *Madera.*

pruinatum * 22. S. foliis lanceolatis acutis subtus convexis cauleque erecto pruinosis, cyma 2fida pauciflora. *Lusitania.* (Sedum pruinatum Link.)

dodrantale W. 23. S. foliis oblongis obtusis integerrimis glabris in petiolum attenuatis, cymis divaricatis, pedunculis calycibusque hirtis. *Teneriffa.*

hispanicum W. 24. S. foliis imbricatis semiteretibus subulatis ciliatis, cyma 2fida. *Hispania.*

stellatum Sm. 25. S. caule pubescente, foliis spathulatis sparsis, floribus paniculatis. *Mons Baldus.*

monanthon Ait. 26. S. caule breviſſimo, foliis undique confertis clavatis glabris, pedunculis 1floris subaggregatis, nectariis obcordatis. *Inf. Canar.*

POLYGYNIA.

1810. CERATOCEPHALUS Mönch.

falcatus Pers. 1. C. fructuum cornubus falcatis subascendentibus. *Europ. austr.* (Ranunculus falcatus L.)

orthoceras Cand. 2. C. fructuum cornubus rectis. *Tauria. Sibir. austr.* (Ranunculus falcatus M. B.)

1811. ISOPYRUM.

fumarioides 1. I. radice annua, petiolis basi simplicibus, foliis decompositis, foliolis spathulato-linearibus, floribus acutis, fructibus pluribus. *Sibir.*

thalictroides 2. I. radice fasciculata, petiolis basi stipulatis, foliis 3ternatis, foliolis obtuse lobatis, floribus obtusis, fructibus subternis. *Europ. austr.* (I. aquilegioides L. Helleborus thalictroides Lam.)

adoxoides Cand. 3. I. radice tuberosa, petiolis basi simplicibus, foliis ternatis, foliolis 3fidis, laciniis obtusis 3dentatis, floribus obtusiusculis, capsulis subteres. *China med.* Jac. Cunningham. *Japon.* Fischer.

grandiflorum Fisch. Cand. 4. I. scapo unifloro, floribus maximis ovalibus. *Imaus.*

1812. LAURELIA Juss.

aromatica Juss. *Chili.* Arbor foliis oppositis lanceolatis integerrimis aromaticis, floribus axillaribus subcymosis. (Pavonia R. et P. Thiga chilensis Molin.)

CLASSIS XII.

ICOSANDRIA.

MONOGYNIA.

I. *Flores corollati.*

A. *Corolla 4-5petala.*

a. *Fructus ſuperus.*

1813. *Antherylium* Vahl. Cal. 4partitus. Pet. 4. Capſ. 1locularis 3valvis polyſperma. *Guttiferae.*

1814. *Kunzia* *. Cal. 5partitus. Pet. 5. Fructus 1ſpermus. *Familia?*

1815. *Amygdalus.* Cal. 5partitus. Pet. 5. Drupa 1ſperma tomentoſa, putamine lacunoſo. *Pomaceae.*

1816. *Prunus.* Cal. 5partitus. Pet. 5. Drupa 1ſperma glabra, putamine laevisculo. *Pomaceae.*

1817. *Chryſobalanus.* Cal. 5partitus campanulatus. Pet. 5. Stylus lateralis. Drupa 1ſperma, putamine 5valvi. *Pomaceae.*

1818. *Plinia.* Cal. 4-5partitus. Pet. 4, 5. Stylus elongatus. Drupa 1ſperma multiſulca. *Pomaceae.*

1819. *Banara* Aubl. Cal. 6partitus. Pet. 6. Bacca 1locularis polyſperma.

b. *Fructus inferus. Myrteae.*

1820. *Drupatris* Lour. Cal. 5fidus. Pet. 4. Filamenta craſſa, antheris 2lobis. Drupa exſucca nuce 3locularì.

1821. *Guapurium* Juſſ. Cal. 4fidus. Pet. 4. Bacca umbilicata 2-4-ſperma.

1822. *Myrtus.* Cal. 4-5partitus. Pet. 4-5. Bacca 1-3locularis, 1-5ſperma.

1823. *Nelitris* Gärtn. Cal. 4-5dentatus. Pet. 4-5. Bacca 1locularis ſub-10ſperma, ſeminibus inverſis.

1824. *Campomanesia* R. et P. Cal. 4-5partitus. Pet. 4, 5. Bacca 1locularis ſub-10ſperma, ſeminibus placentae centrali affixis.

1825. *Pſidium.* Cal. 3-5lobus. Pet. 4-5. Bacca 1-5locularis, loculis polyſpermis.

1826. *Glaphyria* Jack. Cal. 5fidus. Pet. 5. Bacca 5locularis polyſperma, ſemina duplici ordine placentae centrali affixa.

1827. *Robinſonia* Schreb. Cal. 5dentatus. Pet. 5. Bacca 7locularis 7ſperma.

1828. *Punica.* Cal. 5fidus. Pet. 5. Pomum 10loculare polyſpermum.
1829. *Calythrix* Labill. Cal. 5fidus, laciniis ariſtatis perſiſtentibus. Pet. 5 decidua. Achenium.
1830. *Angophora* Cav. Cal. 5fidus. Pet. 5. Stamina longiſſima. Capſ. 3locularis 3ſperma.
1831. *Metroſideros* Gärtn. Cal. 5fidus. Pet. 5. Stamina longiſſima. Capſ. 4-5locularis polyſperma.
1832. *Leptoſpermum* Forſt. Cal. 5fidus. Pet. 5 unguiculata. Stamina petalis breviora. Capſ. 4-5locularis polyſperma: ſemina linearia exigua.
1833. *Fabricia* Gärtn. Cal. 5fidus. Pet. 5 exunguiculata. Stamina petalis aequalia. Capſ. multilocularis: ſemina alata pauca.
1834. *Philadelphus.* Cal. 4-5fidus. Pet. 4-5. Capſ. 4locularis: placenta angularis: ſemina membrana obvoluta.

B. *Corolla 6-polypetala.*

1835. *Sonneratia* L. fil. Cal. 6fidus. Pet. 6. Pomum multiloculare: ſemina numeroſa nidulantia. *Aurantia.*
1836. *Calyplectus* R. et P. Cal. campanulatus apice 10-12dentatus baſi 2bracteatus. Pet. 10, 12 limbo calycis inſerta. Stylus longiſſimus. Bacca corticoſa polyſperma. Sem. alata. *Salicariae.*
1837. *Bartonia* Sims. Cal. 5fidus. Pet. 10. Capſ. 1locularis apice operculatim 3-5valvis polyſperma. *Loaſeae.*
1838. *Cactus.* Cal. 1phyllus imbricatis ſuperus. Petala plurima baſi ſubcohaerentia calyci innata. Stigma multifidum. Bacca 1locularis polyſperma. *Cereae.*

II. *Flores apetali.*

1. *Fructus ſuperus.*

† 1839. *Triphaca* Lour. Flores monoeci. Cal. 5fidus. Fructus 5 leguminiformes. *Familia?*
1840. *Phoberos* Lour. Cal. 10fidus. Bacca 1locularis ſub-4ſperma. *Familia?*
1841. *Lophira* Banks. Cal. 5ſepalus inaequalis. Stigma 2fidum. Nux coriacea 1ſperma. *Familia?*
1842. *Abatia* R. et P. Cal. 4partitus. Capſ. 1locularis 2valvis polyſperma. *Tiliaceae?*
1843. *Polylepis* R. et P. Cal. turbinatus ſuperne ſpinoſus, limbo 3-4partito. Stigma multifidum. Achenium calyce obtectum. *Roſaceae.*
1844. *Cercocarpus* Kunth. Cal. turbinatus coloratus, limbo 5lobo. Achenium calyce obtectum. *Roſaceae.*

2. *Fructus inferus.*

1845. *Calliſtemon* R. Br. Cal. 5fidus. Stam. elongata. Capſ. 3locularis polyſperma. *Myrteae.*
1846. *Calyptranthes* Sw. Cal. truncatus in aeſtivatione calyptra caduca tectus. Bacca 1locularis oligoſperma. *Myrteae.*
1847. *Eucalyptus* Heri. Cal. prioris. Capſ. 4locularis polyſperma. *Myrteae.*
1848. *Foetidia* Commerſ. Cal. 4fidus. Nux lignoſa 4angula 4locularis, loculis 2ſpermis. *Familia?*

DI - PENTAGYNIA.

1. *Fructus ſuperi.*

1849. *Waldſteinia* Kit. Cal. 10fidus, laciniis alternis minoribus Pet. 5. Styli 2. Caryopſes 2, 3 receptaculo exſucco inſertae. *Roſaceae.*

1850. *Spiraea.* Cal. 5fidus. Pet. 2. Styli 3-5. Folliculi 3-5 polyſpermi. *Roſaceae.*

1851. *Kerria* Cand. Cal. 5fidus. Pet. 5. Styli 5. Capſ. 5 globoſae. *Roſaceae.*

1852. *Seſuvium.* Cal. 5partitus intus corollinus. Cor. 0. Styli 3. Capſ. 3locularis circumſciſſa. *Aizoideae.*

1853. *Aizoon.* Cal. 5partitus. Cor. 0. Styli 5. Capſ. 5locularis. *Aizoideae.*

2. *Fructus inferi. Pomaceae.*

1854. *Meſpilus.* Cal. 5fidus. Pet. 5. Styli 2-5. Bacca calyce coronata 2-5pyrena, officulis 1locularibus 2ſpermis.

1855. *Raphiolepis* Lindl. Cal. infundibuliformis 2fidus. Pet. 5. Styli 2. Bacca calycina 2-4pyrena, putamine chartaceo. *Roſaceae.*

1856. *Photinia* Lindl. Cal. 5dentatus. Pet. 5. Styli 2. Pericarpium 2loculare 4ſpermum calyce carnoſo incluſum: teſta cartilaginea. *Roſaceae.*

1857. *Pyrus.* Cal. 5dentatus. Pet. 5. Pomum clauſum 5loculare, loculis 1-2ſpermis.

1858. *Mesembrianthemum.* Cal. 5fidus perſiſtens. Petala numeroſa et ſecum et cum ſtaminibus coalita. Capſ. carnoſa multilocularis. *Aizoideae.*

1859. *Tetragonia.* Cal. 4partitus perſiſtens intus corollinus. Styli 4. Drupa 4angula, nuce 4loculari. *Aizoideae.*

DECA - POLYGYNIA.

1. *Fructus ſuperi.*

* *Potentilleae.*

1860. *Dalibarda* Mx. Cal. 5fidus. Pet. 5. Caryopſes 5-10 in rec. ſicco, ſtylis caducis.

1861. *Dryas.* Cal. 8-9partitus. Pet. 8, 9. Caryopſes plurimae, ſtylis plumoſis coronatae.

1862. *Rubus.* Cal. 5fidus. Pet. 5. Bacca compoſita.

1863. *Fragaria.* Cal. 10fidus, laciniis alternis minoribus. Pet. 5. Caryopſes nudae plurimae in rec. ſucculento turgido.

1864. *Potentilla.* Cal. 10fidus, laciniis alternis minoribus. Pet. 5. Caryopſes nudae plurimae in rec. ſicco, ſaepe piloſo.

1865. *Geum.* Cal. 10fidus, laciniis alternis minoribus. Pet. 5. Caryopſes ſtylis geniculatis coronatae.

1866. *Sieverſia* W. Cal. 10fidus, laciniis alternis minoribus. Pet. 5. Caryopſes ſtylis rectis coronatae.

** *Urticeis affines.*

1867. *Calycanthus.* Perianthium multiplici ſerie imbricatum coloratum. Stamina 4plici ſerie, interna abortientia. Antherae

2loculares laterales. Caryopſes plurimae ſtylis coronatae calyce baccato cinctae.

1868. *Chimonanthus* Lindl. Perianthium imbricatum coloratum. Stamina duplici ſerie, externa perfecta baſi connata. Caryopſes paucae.

1869. *Atheroſperma* Labill. Flores monoeci. Cal. 8partitus. Stamina antheris lateralibus filamentis ſterilibus interſtincta. Styli plumoſi filamentis interſtincti. Achenia plurima.

1870. *Peumus* Perſ. Flores dioeci. Cal. 10partitus, laciniis internis corollinis. Stamina glanduloſa. Drupae plurimae 1ſpermae.

1871. *Citroſma* R. et P. Flores monoeci. Cal. campanulatus 4-5-dentatus. Filamenta laxa corollina. Styli ſubulati. Baccae plurimae 1ſpermae calyce carnoſo cinctae.

1872. *Hedycarya* Forſt. Flores dioeci. Cal. 8-10fidus. Antherae ſeſſiles apice barbatae. Nuces 1ſpermae.

*** *Anoneae.*

1873. *Eupomatia* R. Br. Cal. truncatus. Calyptra in aeſtivatione caduca. Stamina interiora petaloidea: antherae laterales. Bacca polyſperma.

**** *Roſaceae.*

1874. *Roſa.* Cal. 5fidus. Pet. 5. Bacca polyſperma calyce coronata.

1875. *Anthodiſcus* Meyer. Cal. planus ſubintegerrimus perſiſtens Pet. 5. Bacca globoſa umbilicata.

CLASSIS XII.

ICOSANDRIA.

MONOGYNIA.

1813. Anthervlium Vahl.

Roburii Vahl. 1. A. ramulis 4gonis glabris, ſtipulis ſpineſcentibus, foliis ovato-ellipticis glaberrimis eglanduloſis, pedunculis axillaribus aggregatis 1floris. *Inſ. Carib.*

floribundum* 2. A. ramulis 4gonis pubeſcentibus, foliis oblongo-lanceolatis acuminatis, pedunculis umbelliferis axillaribus floribusque glanduloſis. *Nov. Granat.* (Adenaria Kunth.)

purpuratum* 3. A. ramulis teretibus villoſiusculis, foliis oblongis acuminatis ſupra glabris coloratis ſubtus ad venas pubeſcentibus, umbellis ſubſeſſilibus glanduloſis. *Nov. Granat.* (Adenaria Kunth.)

ristcoides* 4. A. ramulis teretibus pubeſcentibus, foliis oblongis acuminatis glabris, umbellis breviſſime pedunculatis. *Ad fl. Magdalen.* (Adenaria Kunth.)

1814. Kunzia.*

tridentata* *Montes ſcopuloſi* (rocky mountains) *Amer. bor.* Frutex ramoſiſſimus, foliis obovatis 3dentatis villoſo-tomentoſis, floribus terminalibus ſolitariis luteis. (Tigarea Pursh. Purshia Cand.)

1815. Amygdalus.

Perſica 1. A. foliis lanceolatis argute ſerratis, floribus ſubſeſſilibus ſolitariis. *Perſia.*

communis 2. A. foliis lanceolatis baſi glanduloſo-ſerratis, floribus ſeſſilibus geminis. *Afric. bor. Palaeſtina. Graecia.* (A. fragilis W.)

nana 3. A. foliis lanceolatis duplicato-ſerratis, pedunculis ſubgeminis. *China. Africa?* (Prunus ſinenſis Perſ., japonica Ker.)

4. A. foliis oblongis baſi attenuatis ſimpliciter argute ſerratis, pedunculis ſubgeminis. *Tataria.* (A. georgica Desf.)

microphylla Humb. 5. A. foliis oblongis acutis crenato-ſerrulatis glabris, floribus ſubſeſſilibus. *Mexico.*

orientalis Ait. 6. A. foliis lanceolatis integerrimis perennantibus argenteo-ſericeis. *Aſia minor.* (A. argentea Lam.)

1816. PRUNUS,

* *Pedunculis ſolitarus.*

ſpinoſa 1. Pr. foliis oblongis crenulatis ſubtus pubeſcentibus, ramis ſpinoſis, fructibus ſubgloboſis. *Europ. omn.*

ceraſifera Ehrh. 2. Pr. foliis ellipticis ſerrulatis utrinque glabris, ramis ſubinermibus, fructibus globoſis acutiusculis. *Amer. bor.*

maritima W. 3. Pr. foliis ovato-oblongis acuminatis duplicato-ſerratis, fructibus ovatis acuminatis. *Amer. bor.* (Pr. acuminata Mx.)

aſpera Thunb. 4. Pr. foliis ovatis acuminatis ſerratis utrinque aſperis, fructibus ſubgloboſis ſtylo coronatis, nuce triquetra. *Japon.*

japonica Thunb. 5. Pr. foliis ovatis acuminatis duplicato-ſerratis utrinque glabris. *Japon.*

glanduloſa Thunb. 6. Pr. foliis oblongis glanduloſo-ſerratis ſubtus reticulatis. *Japon.*

inciſa Thunb. 7. Pr. foliis ovatis acutis inciſo-ſerratis villoſis. *Japon.*

tomentoſa Thunb. 8. Pr. foliis ovatis acutis ſerratis ſupra villoſis, ſubtus tomentoſis, fructibus globoſis. *Japon.*

** *Pedunculis geminis.*

domeſtica 9. Pr. foliis ovalibus crenatis ſubtus ſubpubeſcentibus, fructibus ellipticis. *Europ.* (Pr. pyramidalis Cand.)

inſiticia 10. Pr. foliis oblongis utrinque attenuatis ſerratis ſubtus villoſiusculis, ramis ſpineſcentibus, fructibus globoſis. *Europa.*

Chicaſa Mx. 11. Pr. foliis oblongis acuminatis ſerrulatis glabris, ramis ſpineſcentibus, fructibus ſubgloboſis. *Virginia. Carolina.* (Pr. inſiticia Walt.)

daſycarpa Ehrh. 12. Pr. foliis ovatis acuminatis duplicato-ſerratis glabris, petiolis glanduloſis, floribus ſubſeſſilibus, fructibus globoſis ſubvilloſis. *Patria?*

Armeniaca 13. Pr. foliis ſubcordato-oblongis acuminatis glanduloſo-ſerrulatis utrinque glabris, floribus ſubſeſſilibus, fructibus ſubgloboſis pubeſcentibus. *Perſia bor. Armenia.*

brigantiaca Vill. 14. Pr. foliis ovatis acuminatis duplicato-ſerrulatis utrinque glabris, petiolis ſubglanduloſis, fructibus ſubgloboſis glabris, nucibus compreſſis. *Gallia orient.*

ſibirica 15. Pr. foliis ovato-oblongis acuminatis inaequaliter dentatis utrinque glabris baſi ſubglanduloſis, floribus ſubſeſſilibus, fructibus coriaceis compreſſis. *Sibir.*

† *Cocomilia* Tenor. 16. Pr. foliis ovalibus glanduloſo-crenulatis, petiolis glanduloſis. *Calabria.*

prostrata Labill. 17. Pr. foliis oblongo-lanceolatis serratis subtus tomentosis, caule fruticoso depresso. *Syria. Armenia. Caucas. Creta. Atlas.* (Amygdalus incana Pall.)

*** *Pedunculis subumbellatis.*

avium 18. Pr. foliis ovato-oblongis serratis basi 2glandulosis subtus pubescentibus, ramulis bimis floriferis, fructibus globosis. *Europ.* (Pr. macrophylla Poir.)

Cerasus 19. Pr. foliis ovato-lanceolatis serratis utrinque glabris, ramulis annotinis floriferis, fructibus globosis. *Europ.*

pensylvanica Ait. 20. Pr. foliis oblongo-lanceolatis acuminatis aequaliter serratis basi 2glandulosis utrinque glabris, umbellis subcompositis, fructibus subglobosis exiguis. *Amer. bor.* (Pr. borealis Mx.)

nigra Ait. 21. Pr. foliis ovato-oblongis acuminatis inaequaliter serratis, petiolis 2glandulosis, umbellis paucifloris. *Amer. bor.* (Pr. perficifolia Desf.)

hyemalis Mx. 22. Pr. foliis obovato-oblongis acuminatis serratis, umbellis paucifloris, stipulis setaceo-compositis, fructibus subovatis. *Amer. bor.*

pubescens Pursh. 23. Pr. foliis ovato-oblongis serrulatis basi subglandulosis, caule fruticoso, umbellae pauciflorae pedunculis calycibusque pubescentibus. *Amer. bor.* (Pr. sphaerocarpa Mx., sphaerica W.)

pumila 24. Pr. foliis lanceolatis apice serratis subtus pallidis, caule fruticoso, ramis virgatis, umbellis paucifloris. *Amer. bor.*

depressa Pursh. 25. Pr. foliis subspathulato-lanceolatis subserratis subtus glaucis, caule fruticoso, ramis declinatis, fructibus ovatis. *Amer. bor.* (Pr. pumila Mx. Susquehannae W.)

pygmaea W. 26. Pr. foliis oblongis utrinque attenuatis argute serratis basi 2glandulosis, caule fruticoso, umbellis paucifloris. *Pensylvania. Virginia.* (Pr. candicans W.)

Chamaecerasus 27. Pr. foliis obovato-oblongis obtusiusculis glandulosо-serratis, caule fruticoso, fructibus globosis subexsuccis. *Europ. Asia media.* (Pr. fruticosa Pall.)

**** *Pedunculis racemosis.*

semperflorens Ehrh. 28. Pr. foliis ovato-oblongis acuminatis serratis basi glandulosis, floribus subracemosis pendulis foliatis, laciniis calycinis serratis. *Europ. Amer. bor.*

Mahaleb 29. Pr. foliis subcordato-ovatis serrulatis subtus subpubescentibus, floribus terminalibus racemoso-corymbosis. *Europ. med. et austr.*

paniculata Thunb. 30. Pr. foliis ovato-oblongis acute serratis ciliatis, racemis pilosiusculis subcompositis, laciniis calycinis petalisque dentatis. *Japon.*

Capuli Cav. 31. Pr. foliis lanceolatis argute serratis eglandulosis glabris. *Peru.*

ſalicifolia Kunth. 32. Pr. foliis oblongis longiſſime acuminatis ſerrulatis laevibus, petiolis glanduloſis, racemis pendulis (?), calycibus perſiſtentibus. *Nov. Gramat.*

occidentalis Sw. 33. Pr. foliis oblongis acuminatis integerrimis ſempervirentibus utrinque glabris, racemis lateralibus elongatis, trunco altiſſimo, fructibus ovalibus. *Ind. occid.*

ſphaerocarpa Sw. 34. Pr. foliis ovato-lanceolatis integerrimis nitidis ſempervirentibus, racemis axillaribus laxis folio brevioribus, fructibus ſubrotundis. *Ind. occid.*

luſitanica 35. Pr. foliis ovato-lanceolatis obtuſe ſerratis eglanduloſis nitidis ſempervirentibus, racemis erectis. *Luſitania.*

Lauroceraſus 36. Pr. foliis oblongis coriaceis ſerrulatis lucidis dorſo 2glanduloſis, racemis erectis. *Aſia minor. Caucaſ.*

Hixa Brouſſ. 37. Pr. foliis ovato-oblongis acuminatis ſerratis baſi ſubtus glanduloſis ſempervirentibus, racemis elongatis. *Teneriffa.*

elliptica Thunb. 38. Pr. foliis elliptico-oblongis ſerratis glabris, racemis paucifloris. *Japon.*

caroliniana Ait. 39. Pr. foliis oblongo-lanceolatis mucronatis ſerratis eglanduloſis laevibus ſempervirentibus, racemis erectis. *Amer. bor.*

ſerotina Ehrh. 40. Pr. foliis oblongis acutis ſerratis baſi glanduloſis nitidis annuis, nervo medio ſubtus 2fariam pubeſcente, racemis erectis. *Amer. bor.* (Pr. virginiana du Roi.)

virginiana 41. Pr. foliis ovato-oblongis duplicato-ſerratis nitidis annuis, petiolo glanduloſo, racemis laxis nutantibus. *Amer. bor.* (Pr. rubra W.)

Padus 42. Pr. foliis oblongis duplicato-ſerratis ſubrugoſis, petiolo glanduloſo, racemis pendulis. *Europ. Aſia. Amer. bor.*

1817. CHRYSOBALANUS.

Icaco 1. Chr. foliis obovatis ſubemarginatis glabris, ſtaminibus piloſis. *Ind. occid. Amer. auſtr.* (Chr. pellocarpus Meyer var.?)

oblongifolius Mx. 2. Chr. foliis obovato-oblongis ſubtus lanatis, floribus ſubdioecis, ſtaminibus glabris. *Georgia. Florida.*

1818. PLINIA.

crocea *Ind. occid. Braſil.* Arbor foliis abrupte pinnatis 6jugis ovato-lanceolatis, floribus ſparſis ſeſſilibus.

1819. BANARA Aubl.

guianenſis Aubl. 1. B. foliis ovato-oblongis ſerratis ſubtus ſubtomentoſis, racemis compoſitis axillaribus glabris. *Guiana.*

*Roxburghii** 2. B. foliis lanceolatis remote denticulatis basi attenuatis integerrimis subtus lanatis, panicula axillari villosissima. *Ind. or.*

1820. DRUPATRIS Lour.

cochinchinensis Lour. *Cochinchina.* Arbor foliis oblongis serratis glabris, floribus spicatis albis.

1821. GUAPURIUM Juss.

*fruticosum** 1. Gu. caule fruticoso, foliis simplicibus pinnatisque pellucido-punctatis. *Peru.*

*herbaceum** 2. Gu. caule herbaceo volubili, foliis simplicibus dentatis hispidis. *Nov. Granat.* (Klaprothia mentzelioides Kunth.)

1822. MYRTUS.

1. *Floribus axillaribus subsessilibus.*

*Commersonii** 1. M. foliis subrotundo-ovalibus obtusis coriaceis supra lucidis subtus pallidis, floribus 4fidis. *Insul. Mascaren.* (Eugenia lucida Lam.)

*sessiliflora** 2. M. foliis oblongis glaberrimis supra nitidis subtus fusco-punctatis, floribus lateralibus subsolitariis 4fidis. *Ind. occid.* (Eugenia sessiliflora Vahl., lateriflora W.)

lineata Sw. 3. M. foliis ovatis acuminatis rigidis parallele venosis subtus incanis, floribus subaggregatis 4fidis. *Hispaniola.*

cordata Sw. 4. M. foliis subsessilibus cordato-oblongis obtusis rigidis nitidis, floribus subaggregatis 4-5fidis. *Ind. occid.*

2. *Pedunculis unifloris subsolitariis.*

*angustifolia** 5. M. foliis linearibus acutis subsessilibus, pedunculis folio brevioribus. *Hispaniola.* (Eugenia angustifolia Lam.)

*rosmarinifolia** 6. M. foliis subsessilibus linearibus cuspidatis margine revolutis utrinque glaberrimis, pedunculis lateralibus folio brevioribus. *Hispaniola.* (Eugenia rosmarinifolia Poir.)

*linifolia**; 7. M. foliis petiolatis linearibus obtusis enerviis glabris subtus planis, pedunculis axillaribus folio brevioribus. *Ind. occid.*

tenuifolia Sm. 8. M. foliis linearibus mucronatis supra glabris subtus revolutis pubescentibus, pedunculis sericeis folio brevioribus. *Nov. Holl.*

communis 9. M. foliis ovato-lanceolatis acutis utrinque nitidis, pedunculis folio brevioribus, floribus 5fidis bracteatis. *Europ. austr.*

*ovalis** 10. M. foliis ovalibus venosis glabris, ramulis fusco-villosis, pedunculis folia excedentibus. *Brasil.* Sello.

*grammica** 11. M. foliis oblongis utrinque attenuatis obtusis parallele venosis ramulisque glabris, pedunculis capillaribus folio brevioribus. *Brasil.* Sello.

*lurida** 12. M. foliis sessilibus lanceolatis cuspidatis utrinque glaberrimis reticulato-venosis, pedunculis rigidis folio brevioribus basi stipulatis. *Monte Video.* Sello.

vaccinioides Kunth. 13. M. foliis ovatis acutis coriaceis nitidis eveniis, ramulis hirtis, floribus 4partitis. *Peru.*

nummularia Poir. 14. M. caule radicante fruticuloso, foliis subrotundis coriaceis glabris venosis, pedunculis rigidis folio brevioribus, floribus 4partitis. *Inf. Mascaren.*

*daphnoides** 15. M. foliis obovatis coriaceis glabris supra opacis subtus punctatis reticulatis, pedunculis capillaribus petiolos superantibus, floribus 4partitis. *Amer.?* (Eugenia ruscifolia Poir.)

myricoides Kunth. 16. M. foliis oblongis utrinque attenuatis coriaceis subeveniis supra glabris subtus pubescentibus, floribus 5partitis. *Peru.*

ligustrina Sw. 17. M. foliis lanceolatis obtusis convexis nitidis pellucido-punctatis, pedunculis folia aequantibus, floribus 4fidis. *Hispaniola.* (Eugenia W.)

punicifolia Kunth. 18. M. foliis obovato-oblongis subcoriaceis nitidis, pedunculis geminis folio brevioribus, floribus 4fidis. *Cumana.*

brasiliana 19. M. foliis subcordato-ovatis obtusiusculis utrinque glaberrimis, pedunculis folia subsuperantibus, floribus 4fidis. *Brasil.* (Eugenia 1flora et Plinia rubra L. E. Michelii Lam.)

bracteata W. 20. M. foliis ellipticis glabris punctatis, pedunculis villosis apice bracteatis folio brevioribus, floribus 4fidis. *Ind. or.*

*Patrisii** 21. M. foliis ovato-oblongis acuminatis glabris, pedunculis geminis capillaribus bracteatis, bracteis setaceis. *Amer. austr. Hispaniola.* (Eugenia Patrisii Vahl.)

*Willdenowii** 22. M. foliis oblongis utrinque attenuatis obtusiusculis coriaceis nitidis venosis, pedunculis filiformibus bracteatis, bracteis subulatis appressis. *Ceylon. Portorico.* (Eugenia zeylanica W.)

alpina Sw. 23. M. foliis ovato-oblongis eveniis rigidis utrinque nitidis, ramulis quaternis fastigiatis, pedunculis rigidis folio brevioribus, floribus 4fidis. *Jamaica.* (Eugenia W.)

tomentosa Ait. 24. M. foliis ovatis 3plinerviis subtus tomentosis, pedunculis villosis folio subbrevioribus, floribus 5fidis. *China. Cochinchina.* (M. canescens Lour.)

calophylla Kunth. 25. M. foliis elliptico-oblongis utrinque attenuatis coriaceis eveniis nitidis, floribus 5fidis. *Ad Orinocum.*

*orbiculata** 26. M. foliis suborbiculatis coriaceis subtus albidis, pedunculis folia subsuperantibus, floribus 4fidis. *Inf. Mascaren.* (Eugenia Lam.)

*borbonica** 27. M. foliis ovatis obtusis coriaceis subtus revolutis obscure lepidotis, pedunculis folio brevioribus, ca-

calycibus villosis 4fidis. *Inf. Mascaren.* (Eugenia buxifolia Lam.)

mespiloides * 28. M. foliis oblongis supra glabris subtus subpubescentibus, pedunculis brevissimis calycibusque villosis, floribus 4fidis. *Inf. Mascaren.* (Eugenia Lam.)

tinifolia * 29. M. foliis ovalibus supra lucidis subtus revolutis, pedunculis elongatis tomentosis apice bracteatis. *Inf. Mascaren.* (Eugenia Lam.)

†*Ugni* * 30. M. foliis subcordatis carnosis, pedunculis axillaribus terminalibusque. *Chili.* (Eugenia Molin.)

balsamica * 31. M. foliis ovatis acuminatis subundulatis supra nitidis subtus punctatis glaucis, pedunculis subvillosis. *Jamaica.* (Eugenia Jacqu.)

foetida * 32. M. foliis ovato-lanceolatis obtusiusculis utrinque glabris subtus pallidis, pedunculis abbreviatis. *Cayenn.* (Eugenia foetida et maleolens Pers.)

crassina Vahl. 33. M. foliis ovalibus coriaceis supra lucidis subtus revolutis punctatis, ramis divaricatis, pedunculis filiformibus folia superantibus. *Ind occid.*

microphylla Humb. 34. M. foliis ovato-oblongis acutiusculis coriaceis supra nitidis subtus revolutis sericeis. *Peru. Nov. Granat.*

salutaris Kunth. 35. M. foliis ovato-oblongis obtusis submembranaceis nitidis reticulatis, floribus 5fidis. *Ad Orinocum.*

Arayan Kunth. 36. M. foliis ovato-oblongis acutis membranaceis reticulatis nitidis, ramulis villosis, floribus 5fidis. *Peru.*

3. *Pedunculis unifloris aggregatis.*

erythrocarpa Kunth. 37. M. foliis oblongis obtusis coriaceis nitidis, pedunculis umbellatis. *Nov. Granat. Brasilia.* (Eugenia umbellata N. Entd.)

Pseudopsidium * 38. M. foliis ovato-lanceolatis apice falcato-acuminatis nitidis, pedunculis aggregatis. *Martinica. Guadalupa.* (Eugenia Jacqu.)

cotinifolia * 39. M. foliis subrotundo-obovatis coriaceis lucidis subtus subvenosis, pedunculis subaggregatis folio brevioribus. *Cayenn. Mascaren.* (Eugenia L.)

cassinoides * 40. M. foliis ovato-oblongis utrinque attenuatis coriaceis nitidis, pedunculis subaggregatis folio brevioribus. *Madagascar.* (Eugenia Lam.)

oleaefolia Kunth. 41. M. foliis oblongis obtusis basi attenuatis coriaceis nitidis, pedunculis quaternis. *Ad fl. Amazonum.*

erythroxyloides Kunth. 42. M. foliis ellipticis emarginatis coriaceis nitidis, pedunculis aggregatis. *Cumana.*

cayennensis * 43. M. foliis elliptico-oblongis acuminatis subtus venoso-reticulatis, pedunculis abbreviatis aggregatis bracteatis. *Cayenn.* (Eugenia citrifolia Poir.)

procera Sw. 44. M. foliis ovatis acuminatis glaberrimis subtus parallele venosis, pedunculis filiformibus folio brevioribus, floribus 4fidis, trunco procero. *Hispaniola. Nov. Hispan.* (Eugenia Poir.)

*Chryſophyllum** 45. M. foliis ovato-lanceolatis acuminatis coriaceis ſupra lucidis ſubtus aureo-ſericeis, pedunculis aggregatis abbreviatis. *Inſ. Maſcaren.* (Eugenia Poir.)

*undulata** 46. M. foliis oblongis acuminatis undulatis glabris pellucido-punctatis, pedunculis abbreviatis bracteatis, floribus 5fidis. *Guiana.* (Eugenia Aubl.)

*latifolia** 47. M. foliis amplis ovato-oblongis glabris, pedunculis abbreviatis bracteatis, floribus 4fidis. *Guiana.* (Eugenia Aubl.)

*Heynii** 48. M. foliis ellipticis obtuſis coriaceis glabris pellucido-punctatis, pedunculis ramulisque ferrugineo-tomentoſis, floribus 5fidis. *Ind. or.* (M. latifolia Roth.)

4. *Pedunculis paucifloris.*

biflora 48. M. foliis lanceolatis acutis utrinque glabris, pedunculis 2fidis 2floris, floribus 4fidis. *Jamaica.*

*triflora** 49. M. foliis ovato-lanceolatis acutis glabris ſupra nitidis ſubtus venoſo-reticulatis, pedunculis ſtrictis bracteatis 3floris folia aequantibus, floribus confertis 5fidis. *Monte Video.* Sello.

*Selloi** 50. M. foliis oblongis utrinque attenuatis obtuſiuſculis opacis ſubtus pallidis venoſis, pedunculis capillaribus 3floris folio brevioribus, floribus 5fidis. *Braſil.* Sello.

*auſtralis** 51. M. foliis oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis glabris obſcure venoſis, pedunculis axillaribus foliatis ſub-3floris coloratis. *Nov. Holl.* (Eugenia auſtralis Wendl., myrtifolia Ker.)

ruſcifolia W. 52. M. foliis ovali-ſubrotundis venoſis punctatis, pedunculis abbreviatis pubeſcentibus ſub-4floris. *Ind. or.*

lucida 53. M. foliis ſubſeſſilibus ovato-lanceolatis glaberrimis, pedunculis 3floris. *Surinam.*

*guianenſis** 54. M. foliis elliptico-oblongis utrinque attenuatis venoſo-reticulatis glabris, pedunculis baſi ſtipulatis trifloris folio brevioribus, floribus 5fidis. *Guiana.* (Eugenia Aubl.)

*lancea** 55. M. foliis lanceolatis acuminatis coriaceis nitidis, pedunculis pubeſcentibus folio brevioribus ſub-3floris, floribus 4fidis. *Inſ. Carib.* (Eugenia Poir.)

*punctata** 56. M. foliis oblongis obtuſis coriaceis glabris punctatis, pedunculis 3floris folia aequantibus, floribus 5fidis. *Inſ. Carib.* (Eugenia Vahl.)

crenulata Sw. 57. M. foliis ſubrotundis glabris crenulatis, pedunculis ſub-3floris folio brevioribus, floribus 4fidis. *Hiſpaniola.* (Eugenia Willd.)

trinervia Sm. 58. M. foliis ovatis acuminatis 3nerviis ſubtus tomentoſis, pedunculis 3floris piloſis, floribus 4fidis. *Nov. Holl.*

foliosa Kunth. 59. M. foliis confertis ſubrotundo-ellipticis coriaceis glabris nitidis, pedunculis 3floris folia ſubaequantibus, floribus 4fidis. *Amer. auſtr.*

discolor Kunth. 60. M. foliis ſubternis elliptico-oblongis utrinque attenuatis ſubcoriaceis reticulatis ſupra nitidis ſubtus discoloribus, pedunculis ſub-3floris folio brevioribus, floribus 4fidis. *Nov. Granat.*

compreſſa Kunth. 61. M. foliis obovato-oblongis ſubcoriaceis reticulatis glabris, ramulis compreſſis, pedunculis 3floris folio brevioribus, floribus 4fidis. *Peru.*

umbelluliſera Kunth. 62. M. foliis ellipticis ſubemarginatis coriaceis glabris ſubtus ſubargenteis, pedunculis umbelliferis paucifloris, floribus 5fidis. *Cumana.*

dumoſa Vahl. 63. M. foliis lanceolatis utrinque attenuatis ſubmembranaceis reticulatis glabris, pedunculis dichotomis paucifloris folio brevioribus, floribus 4fidis. *Nov. Granat.* (M. ſalicifolia Kunth.)

limbata Kunth. 64. M. foliis oblongis utrinque attenuatis coriaceis reticulatis glabris marginatis, ramulis pubeſcentibus, pedunculis 2fidis paucifloris folio brevioribus, floribus 4fidis. *Peru.*

fimbriata Kunth. 65. M. foliis ſubrotundo-ellipticis coriaceis utrinque pubeſcentibus, pedunculis dichotomis paucifloris folia ſuperantibus, floribus 4fidis, petalis villoſo-fimbriatis. *Peru.*

rhopaloides Kunth. 66. M. foliis obovatis coriaceis nitidis reticulatis, pedunculis dichotomis ſub-6floris folio brevioribus, floribus 4fidis. *Peru.*

xalapenſis Kunth. 67. M. foliis ovatis utrinque attenuatis membranaceis nitidis, pedunculis ſub-6floris. *Mexico.*

5. *Floribus faſciculato-glomeratis.*

macrophylla * 68. M. foliis ampliſſimis oblongis glabris, pedunculis lateralibus faſciculatis, floribus 4fidis. *Ind. or.* (Eugenia Lam.)

glomerata * 69. M. foliis ovalibus coriaceis glabris, panicula ſeſſili terminali glomerata abbreviata, floribus 4fidis. *Inſ. Mascaren.* (Eugenia Lam.)

ſinemarienſis * 70. M. foliis oblongis acuminatis glabris, floribus ſubſeſſilibus glomeratis axillaribus terminalibusque 4-5fidis. *Guiana.* (Eugenia Aubl.)

elliptica * 71. M. foliis ellipticis ſubtus venoſis glabris, pedunculis lateralibus faſciculatis abbreviatis. *Inſ. Mascaren.* (Eugenia Lam.)

axillaris Sw. 72. M. foliis oblongis acuminatis nitidis venoſis, pedunculis axillaribus faſciculatis abbreviatis. *Jamaica. Amer. auſtr.* (Eugenia W. M. malpighioides Kunth.)

† Poireti * 73. M. foliis obovato-oblongis nitidis 3nerviis glabris, pedunculis dichotomis faſciculatis, floribus 4fidis. *Hiſpaniola.* (M. axillaris Poir.)

glabrata Sw. 74. M. foliis ſubellipticis acutiuſculis convexis coriaceis glaberrimis, pedunculis axillaribus breviſſimis faſciculatis, floribus 4fidis. *Hiſpaniol.*

diſticha Sw. 75. M. foliis diſtichis deflexis ovato-lanceolatis obtuſiuſculis nitidis, ramis horizontalibus, pedunculis axillaribus faſciculatis, floribus 4fidis, fructibus 2-4ſpermis. *Jamaica.*

baruenſis * 76. M. foliis ovato-lanceolatis glabris eveniis opacis, pedunculis axillaribus faſciculatis ebracteatis. *Amer. auſtr. Guadalupa.* (Eugenia Jacq.)

caſearioides Kunth. 77. M. foliis oblongis utrinque attenuatis membranaceis ſubtus pubeſcentibus, floribus axillaribus verticillato-glomeratis 4fidis. *Cumana.*

guayaquilenſis Kunth. 78. M. foliis oblongis utrinque attenuatis ſubcoriaceis piloſiusculis, floribus axillaribus verticillato-glomeratis 4fidis. *Quito.*

tuberculata Kunth. 79. M. foliis elliptico-oblongis margine revolutis coriaceis glabris ſupra glanduloſo-tuberculatis ſubtus ſericeis, floribus axillaribus congeſtis 4fidis. *Cuba.*

6. *Racemis axillaribus.*

malaccenſis * 80. M. foliis breviter petiolatis ovato-oblongis acutis coriaceis glabris, racemis lateralibus abbreviatis corymboſis, fructibus maximis. *Ind. or.* (Eugenia L.)

javanica * 81. M. foliis ſeſſilibus ovato-oblongis opacis glabris, racemis axillaribus laxis folia ſuperantibus. *Java.* (Eugenia Lam.)

Stoupii * 82. M. foliis elliptico-oblongis acuminatis ſupra lucidis, pedunculis axillaribus ſubquaternis arcuatis villoſis racemoſo-faſciculatis, pedicellis bracteatis, floribus 5fidis. *Cayenn.* (M. bracteolaris Poir.)

Luma Molin. 83. M. foliis ſuborbiculatis, racemis axillaribus trichotomis, caule arboreo. *Chili.*

buxifolia Sw. 84. M. foliis obovato-oblongis coriaceis nitidis ſubtus punctatis, racemis breviſſimis axillaribus multifloris, floribus 4fidis. *Hiſpaniola. Mexico.* (Eugenia buxifolia W, myrtoides Poir. M. maritima Kunth.)

floribunda * 85. M. foliis oblongis utrinque attenuatis margine revolutis ſubtus punctatis, racemis bracteatis multifloris petiolos aequantibus. *Inſ. Carib.* (Eugenia Weſt. W.)

laurina Retz. 86. M. foliis alternis oblongis glaberrimis ſerratis, racemis ſubbifidis ſimplicibus folio brevioribus, floribus 5fidis. *Ceylon.* (Eugenia W.)

Vahlii * 87. M. foliis ovatis acutis 3nerviis glaberrimis, pedunculis geminatis racemoſis, floribus bracteatis 4fidis. *Cayenn.* (Eugenia 3nervia Vahl.)

monticola Sw. 88. M. foliis ovatis apice obtuſe attenuatis glaberrimis, racemis breviſſimis multifloris, floribus 4-5fidis. *Jamaica. Hiſpaniola.*

Pimenta 89. M. foliis alternis oblongis utrinque attenuatis coriaceis glaberrimis, racemis corymboſis axillaribus terminalibusque. *Ind. occid.* (M. citrifolia Poir. ?)

dichotoma Poir. 90. M. foliis obovato-lanceolatis coriaceis glabris ſupra nitidis, pedunculis dichotomis corymboſis folia ſuperantibus, floribus 5fidis. *Hiſpaniola.*

Lindleyana Kunth. 91. M. foliis ſubellipticis obtuſis baſi attenuatis coriaceis marginatis glabris, pedunculis dichoto-

mis corymbosis pubescentibus folio brevioribus, floribus 4fidis. *Nov. Granat.*

emarginata Kunth. 92. M. foliis obovato-oblongis emarginatis coriaceis nitidis subtus pubescentibus, racemis solitariis folia subaequantibus, floribus 4fidis. *Ad Orinocum.*

pubescens Kunth. 93. M. foliis ovato-oblongis obtusis supra nitidis subtus sericeis, racemis axillaribus geminis terminalibus subquaternis folia subaequantibus, floribus 4fidis. *Ad Orinocum.*

7. *Racemis terminalibus.*

Jambos Kunth. 94. M. foliis lanceolatis acuminatis elongatis lucidis, racemis laxis terminalibus. *Ind. or.* (Eugenia L.)

cenosa * 95. M. foliis ellipticis coriaceis opacis venoso-reticulatis, racemis simplicibus, floribus 4fidis. *Madagascar.* (Eugenia Lam.)

Sonneratii * 96. M. foliis subsessilibus lanceolatis pellucido-punctatis, racemis terminalibus. *Ind. or.* (Eugenia lanceolata Lam.)

Dombeyi * 97. M. foliis ovalibus coriaceis supra lucidis, gemmis squamoso-imbricatis terminalibus racemiferis, pedicellis bracteatis, floribus 4fidis. *Brasil.* (Eugenia brasilienſis Lam.)

Cheken Feuill. 98. M. foliis sessilibus ovatis acutis nitidis venosis, racemis bracteatis terminalibus, floribus 4fidis. *Chili.* (Eugenia Chequen Molin.)

laevis Thunb. 99. M. foliis ovatis acuminatis argute serratis venosis glaberrimis, floribus corymboso-umbellatis terminalibus. *Japon.*

chinensis Lour. 100. M. foliis subsessilibus ovato-lanceolatis argute serratis pilosis, floribus terminalibus subcorymbosis. *China austr.*

† *nitens* Poir. 101. M. foliis petiolatis oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis lucidis subtus pallidis, corymbis terminalibus divaricato-trichotomis. *Inſ. Mascaren.*

pallens Vahl. 102. M. foliis oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis obtusis glaberrimis lucidis subtus punctatis, racemis terminalibus pubescentibus, floribus 4fidis. *Ind. occ.* (Eugenia Poir.)

albida Humb. 103. M. foliis oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis supra nitidis subtus sericeis, ramis pubescentibus, racemis terminalibus ternis, floribus 4fidis. *Nov. Granat.*

† *micrantha* Kunth. 104. M. foliis ovato-oblongis utrinque attenuatis subcoriaceis glabris nitidiusculis, racemis terminalibus subternis, floribus minutis 4fidis. *Nov. Granat.*

8. *Paniculis lateralibus.*

Caryophyllus * 105. M. foliis oblongis utrinque attenuatis coriaceis opacis venosis, paniculis trichotomis, calycibus repandis, fructibus ellipticis. *Inſ. Moluc.* (Ca-

ryophyllus aromaticus L. Eugenia caryophyllata Thunb. W.)

aromatica Poir. 106. M. foliis obovatis coriaceis glaberrimis, paniculis axillaribus patulis, calycibus 5fidis. *Ind. orient.?*

cymosa * 107. M. foliis subsessilibus ovato-lanceolatis acutis venosis utrinque glaberrimis, pedunculis lateralibus coloratis cymoso-paniculatis, calycibus 4lobis. *Inf. Molucc.* (Eugenia Lam.)

paviflora * 108. M. foliis ovato-lanceolatis acuminatis subtus ramisque pubescentibus, paniculis incano-villosiusculis, floribus 4fidis. *Java.* (Eugenia Lam.)

Mini * 109. M. foliis oblongo-lanceolatis longe acuminatis venosissimis supra lucidis, paniculis laxis bracteatis axillaribus terminalibusque, floribus 4fidis. *Guiana. Brasil.* (Eugenia Mini Aubl., microcarpos Lam., patens Poir.)

virgultosa Sw. 110. M. foliis ovato-lanceolatis acuminatis venosis glabris, ramis virgatis, paniculae ramis decussatis, floribus 4fidis. *Ind. occid.* (Eugenia divaricata Lam., laxiflora Poir. M. Billardiana Kunth.)

Aubletii * 111. M. foliis subsessilibus ovato-ellipticis tomentosis, paniculis axillaribus folia superantibus villosis, floribus 5fidis. *Guiana.* (Eugenia tomentosa Aubl.)

multiflora * 112. M. foliis ovato-lanceolatis acuminatis nitidis venosis pellucido-punctatis, paniculis axillaribus patulis elongatis, floribus 4fidis. *Cayenn.* (Eugenia multiflora Lam.)

dioeca 113. M. foliis oblongo-lanceolatis coriaceis venosis glabris, paniculis axillaribus quaternis patulis elongatis trichotomis, pedicellis compressis, floribus dioecis. *Brasil.*

maxima Molin. 114. M. foliis oblongis acuminatis, paniculis multifloris, trunco procero. *Chili.*

deflexa Kunth. 115. M. foliis ovato-oblongis utrinque attenuatis coriaceis nitidis reticulatis subtus pubescentibus, paniculis divaricatis ferrugineo-tomentosis folio brevioribus, floribus 5fidis. *Ind. occid. Amer. austr.* (Eugenia deflexa Poir. M. complicata et mollis Kunth. var.)

obovata * 116. M. foliis obovatis coriaceis supra nitidis subtus venoso-reticulatis, paniculis lateralibus, calycibus repandis. *Inf. Mascaren.* (Eugenia Poir.)

coccolobaefolia Kunth. 117. M. foliis subrotundis coriaceis nitidis venoso-reticulatis, paniculis axillaribus folia aequantibus, floribus 4–5fidis. *Nov. Granat.*

clusiaefolia Kunth. 118. M. foliis obovato-ellipticis emarginatis coriaceis nitidis reticulatis, paniculis axillaribus folia aequantibus, floribus 5fidis. *Nov. Granat.*

Greggii Sw. 119. M. foliis subellipticis acutis supra glabris subtus incano-tomentosis, paniculis axillaribus patulis, floribus 4fidis. *Ind. occid.* (Greggia aromatica Gärtn.)

villoſa * 120. M. foliis amplis obovato-ſubrotundis obtuſis ſupra aſperis ſubtus tomentoſis, paniculae ramis patentibus dichotomis villoſis, floribus 5fidis. *Inſ. Mascaren.* (Eugenia Poir.)

Smithii * 121. M. foliis oblongis utrinque attenuatis, paniculis axillaribus, calycibus repandis. *Nov. Holl.* (Eugenia elliptica Sm.)

ſplendens Sw. 122. M. foliis ovato-oblongis obtuſiusculis nitidis reticulato-venoſis, ramis virgatis, paniculis axillaribus trichotomis, floribus 4-5fidis. *Hiſpaniola.* (Eugenia periplocifolia Jacq.)

fragrans Vahl. 123. M. foliis ovatis convexiusculis acutis eveniis ſupra nitidis ſubtus punctatis, paniculis axillaribus trichotomis elongatis, floribus 4fidis. *Jamaica. Amer. auſtr.* (Eugenia fragrans W., paniculata Jacq., montana Aubl.)

rufeſcens * 124. M. foliis oblongo-lanceolatis obtuſis baſi attenuatis glabris opacis venoſis ſubtus discoloribus, paniculis erectis elongatis, floribus 4fidis. *Braſil.* Sello.

firma * 125. M. foliis ovato-ellipticis coriaceis amplis rufeſcentibus glabris venoſis, paniculis oppoſitis axillaribus trichotomis tomentoſis folio ſubbrevioribus. *Braſil.* Sello.

anceps * 126. M. foliis lanceolatis ſubſeſſilibus coriaceis nitidis parallele venoſis ſubtus discoloribus, ramis ancipitibus glaberrimis, paniculis erectis folia aequantibus. *Braſil.* Sello.

polyantha Kunth. 127. M. foliis oblongis utrinque attenuatis ſupra nitidis ſubtus ramisque pubeſcentibus, paniculis ſubſimplicibus, floribus 5fidis. *Ad Orinocum.* (M. ſylvatica Meyer.)

9. *Panicula terminali.*

caryophyllata 128. M. foliis obovatis glabris, panicula terminali trichotoma, calycibus repandis. *Ceylon. Inſ. Mascaren.* (Eugenia contracta Poir.? corymboſa Lam.?)

acris Sw. 129. M. foliis ellipticis coriaceis convexis venoſis punctatis, panicula trichotoma elongata, calycibus 4-5dentatis. *Ind. occid.* (M. caryophyllata Jacq.)

coriacea Vahl. 130. M. foliis ſubrotundo-ellipticis utrinque nitidis coriaceis eveniis punctatis, panicula terminali trichotoma, floribus 4fidis. *Ind. occ.*

Berteriana * 131. M. foliis oblongo-lanceolatis acuminatis ſupra nitidis ſubtus glaberrimis, panicula terminali, floribus confertis 4fidis. *Ad fl. Magdalen.* Bertero.

ferruginea * 132. M. foliis ovato-oblongis acuminatis coriaceis ſupra nitidis ſubtus venoſis, junioribus ramulisque ferrugineo-ſubſericeis, panicula terminali cymoſa. *Nov. Granat. Afric. occ.* (M. acuminata Kunth. Eugenia owarienſis P. B.)

fulva * 133. M. foliis oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis coriaceis ſupra nitidis ſubtus venoſo-reti-

culatis paniculaeque ramis fulvo-villosiusculis, floribus congestis. *Brasil.* Sello.

Loureiri * 134. M. foliis lanceolatis glabris, paniculae ramis abbreviatis, floribus congestis, fructibus nervosis. *Cochinchina.* (Eugenia nervosa Lour.)

corticosa * 135. M. foliis ovatis acuminatis glabris, panicula corymbosa, fructibus minutis. *Cochinchina.* (Eugenia Lour.)

marginata * 136. M. foliis ovalibus obtusis coriaceis utrinque nitidis marginatis, paniculae laxae ramis umbellatis. *Hispaniola.* (Eugenia Juss. Pers.)

acetosans * 137. M. foliis obovatis obtusis coriaceis venosis punctatis, paniculae terminalis ramis elongatis cymosis, calycibus campanulatis 4fidis punctatis. *Guiana.* (Eugenia Rich. Poir.)

androsaemoides 138. M. foliis sessilibus amplis ovato-oblongis obtusis venosis, paniculae ramis 3fidis, calycibus 4dentatis. *Ceylon. Cochinchina.*

Comete * 139. M. foliis ovato-oblongis acutis glabris pellucido-punctatis, paniculae terminalis ramis 3floris, floribus 5fidis. *Guiana.* (Eugenia Aubl. M. carnea Meyer.)

ceylanica 140. M. foliis ovato-lanceolatis acuminatis lucidis, paniculae terminalis pedunculis 3floris. *Ceylon.* (Eugenia spicata Lam.? Opa odorata Lour.)

violacea * 141. M. foliis ellipticis coriaceis glabris, paniculae terminalis ramis abbreviatis, floribus congestis. *Inf. Mascaren.* (Eugenia violacea Lam.)

1823. NELITRIS Gärtn.

Jambosella Gärtn. 1. N. foliis oppositis ovatis pubescentibus, pedunculis solitariis axillaribus 1floris bracteatis. *Inf. Societ.* (Decaspermum fruticosum Forst. Psidium decaspermum L. suppl.)

polygama * 2. N. foliis oblongis acuminatis, floribus terminalibus paniculatis. *Inf. Molucc.* (Eugenia Roxb.)

trinervia * 3. N. foliis ovatis acuminatis 3nerviis glabris, floribus racemosis terminalibus. *Cochinchin.* (Myrtus 3nervia Lour., dumetorum Poir.)

1824. CAMPOMANESIA R. et P.

cornifolia Kunth. 1. C. foliis subellipticis acutis conduplicatis subtus pubescentibus, floribus axillaribus aggregatis. *Nov. Granat. Peru?* (C. lineatifolia R. et P.?)

† *tomentosa* Kunth. 2. C. foliis elliptico-oblongis acutiusculis coriaceis subtus fusco-tomentosis. *Nov. Granat.*

1825. PSIDIUM.

pyriferum 1. Ps. foliis oblongis coriaceis venosis subtus pubescentibus, pedunculis axillaribus 1floris abbreviatis, fructibus pyriformibus. *Ind. orient. et occid.*

aromaticum Aubl. 2. Pf. foliis oblongis utrinque attenuatis glabris, pedunculis oppositis 2bracteatis elongatis, fructibus globosis. *Guiana.* (Pf. grandiflorum Aubl. var.)

Cattleyanum Sabin. 3. Pf. foliis obovatis coriaceis glaberrimis ciliatis, pedunculis axillaribus solitariis abbreviatis, fructibus globosis. *China.*

guianense Rich. Perf. 4. Pf. foliis oblongis glabris obsolete crenatis, pedunculis oppositis solitariis. *Guiana.*

†*amplexicaule* Perf. 5. Pf. foliis ovalibus subamplexicaulibus coriaceis integerrimis. *Inf. Antill.*

lapidiſſimum Jacq. 6. Pf. foliis oblongis acutis subtus tomentosis, pedunculis oppositis 1floris, fructibus subrotundis. *Patria?*

cordatum Sims. 7. Pf. foliis sessilibus cordato-subrotundis utrinque glabris, pedunculis 1floris aggregatis. *Ind. occ.*

parvifolium Vahl. 8. Pf. foliis lanceolatis acutis subtus tomentosis, pedunculis solitariis 1floris, fructibus subglobosis. *Amboina. Guadalupa.* Bertero. (Pf. angustifolium Lam.)

pomiferum 9. Pf. foliis oblongis utrinque attenuatis subtus pubescentibus, pedunculis 3floris, fructibus subrotundis. *Ind. or. et occ.*

polycarpon Anderf. Lamb. 10. Pf. foliis oblongis acutis subcrenatis supra pubescentibus subtus rugosis scabris, pedunculis 3floris, fructibus subglobosis. *Inf. Trinitat.*

guineense Sw. 11. Pf. foliis oblongis subtus ferrugineo-tomentosis, pedunculis 3floris, fructibus parvis globosis. *Guinea.*

rubrum Lour. 12. Pf. foliis oblongis obtusis integerrimis glabris, floribus axillaribus congestis sessilibus. *Cochinchina.*

montanum Sw. 13. Pf. foliis oblongis acuminatis crenulatis nitidis, pedunculis axillaribus multifloris, fructibus parvis. *Jamaica.*

cuminum Lour. 14. Pf. foliis ovatis acutis subserratis utrinque tomentosis, pedunculis axillaribus multifloris. *China auſtr.*

dubium Kunth. 15. Pf. foliis ovato-lanceolatis acuminatis glabris, racemis axillaribus abbreviatis paucifloris. *Ad Orinocum.*

nigrum Lour. 16. Pf. foliis ovato-lanceolatis subserratis glabris nitidis, pedunculis terminalibus multifloris. *Cochinchina.*

1826. GLAPHYRIA Jack.

nitida Jack. 1. Gl. foliis obovatis obtusis. *Sumatra.*

sericea Jack. 2. Gl. foliis lanceolatis acuminatis. *Sumatra.*

1827. ROBINSONIA Schreb.

melianthifolia W. *Guiana.* Arbor magna foliis pinnatis argute serratis, floribus flavis paniculatis. (Touroulia guianenſis Aubl.)

1828. PUNICA.

Granatum 1. P. foliis lanceolatis, caule arboreo. *Europ. auſtr. Aſia med.*

nana 2. P. foliis linearibus, caule fruticoſo. *Inſ. Antill.*

1829. CALYTHRIX Labill.

tetragona Labill. 1. C. foliis filiformi-4gonis punctatis. *Nov. Holl. ad Africum.*

glabra R. Br. 2. C. foliis teretibus glabris. *Nov. Holl.*

1830. ANGOPHORA Cav.

lanceolata Cav. 1. A. foliis alternis petiolatis lanceolatis acuminatis, floribus umbellatis. *Nov. Holl.*

cordifolia Cav. 2. A. foliis alternis ſeſſilibus cordato-ovatis ſupra nitidis, ramis hiſpidis, floribus corymboſis. *Nov. Holl.* (Metroſideros cordifolia Perſ. hiſpida Sm. hirſuta Andr. anomala Vent.)

1831. METROSIDEROS Gärtn.

* *Foliis alternis.*

capitatus Sm. 1. M. foliis obovatis mucronulatis margine ſcabris, ramulis calycibusque hirſutis, capitulis terminalibus. *Nov. Holl.*

ciliatus Sm. 2. M. foliis elliptico-oblongis obtuſis coriaceis glabris eveniis, ramulis villoſis, corymbis terminalibus. *Nov. Caledon.* (Leptoſpermum et Melaleuca Forſt.)

coriaceus Labill. 3. M. foliis elliptico-oblongis acutinsculis coriaceis 5-7nerviis utrinque rugulosis, ramulis glabris, racemis ſubſpicatis. *Nov. Holl.*

macrophyllus Poir. 4. M. foliis ovato-lanceolatis coriaceis 3nerviis ſubtus lepidoto-pulverulentis, paniculae terminalis ramis divaricatis. *Madagascar.*

marginatus Cav. 5. M. foliis lanceolatis 3nerviis margine revolutis, floribus terminalibus glomeratis. *Nov. Holl.*

lanceolatus Sm. 6. M. foliis lanceolatis cuſpidatis enerviis marginatis ſublepidoto-punctatis, floribus lateralibus confertis ſeſſilibus. *Nov. Holl.*

lophanthus Vent. 7. M. foliis lanceolatis cuſpidatis 3nerviis punctatis, floribus terminalibus ſpicatis pubeſcentibus. *Nov. Holl.*

ſpecioſus Sims. 8. M. foliis lanceolatis ſubtus venoſis glanduloſo-mucronatis, floribus lateralibus confertis, capſulis apice tomentoſis. *Nov. Holl.*

viminalis Gärtn. 9. M. foliis lineari-lanceolatis cuſpidatis elongatis ſubfalcatis glaberrimis, floribus confertis lateralibus pubeſcentibus. *Nov. Holl.*

ſalignus Sm. 10. M. foliis ſublinearibus cuſpidatis abbreviatis glaberrimis, ramulis pubeſcentibus, floribus con-

fertis ſubverticillatis lateralibus glabris. *Nov. Holl.*

ericifolius Vent. 11. M. foliis ſubfaſciculatis abbreviatis linearibus ſubciliatis apice recurvo-mucronatis, ramulis hirſutis, floribus lateralibus ſubſeſſilibus. *Nov. Holl.* (Leptoſpermum ambiguum Sm.)

ericaefolius Sm. 12. M. foliis imbricatis linearibus obtuſiusculis mucronatis piloſis, floribus capitatis terminalibus, bracteis piloſis, calycibus glabris. *Nov. Holl. ad Africum.*

linearis Sm. 13. M. foliis linearibus canaliculatis acutis rigidis, floribus lateralibus confertis ſeſſilibus. *Nov. Holl.*

juniperifolius Wendl. 14. M. foliis lineari-filiformibus rigidis ſcabris, floribus lateralibus confertis viridibus. *Nov. Holl.*

** *Foliis oppoſitis.*

floribundus Sm. 15. M. foliis ovato-lanceolatis petiolatis, paniculae terminalis ramis decuſſatis umbellatis. *Nov. Holl.* (M. laurifolius Desf.)

floridus Sm. 16. M. foliis obovato-oblongis venoſis glabris, panicula terminali thyrſoidea, calycibus turbinatis ſericeis. *Nov. Zeeland.* (Melaleuca florida et Leptoſpermum ſcandens Forſt.)

glomulifer Sm. 17. M. foliis ovatis ſubundulatis reticulato-venoſis ſubtus pubeſcentibus, capitulis lateralibus pedunculatis bracteisque tomentoſis. *Nov. Holl.*

villoſus Sm. 18. M. foliis ovatis venoſis ſubtus pubeſcentibus, thyrſis axillaribus terminalibusque oppoſitis villoſis, floribus ſeſſilibus confertis. *Inſ. Societ.* (Leptoſpermum collinum et Melaleuca aeſtuoſa Forſt. Melaleuca villoſa L. ſuppl.)

diffuſus Sm. 19. M. foliis ovatis 3nerviis venoſis utrinque glabris, paniculis axillaribus terminalibusque pedicellis oppoſitis. *Nov. Zeeland.* (Melaleuca diffuſa Forſt. lucida L. ſuppl.)

coſtatus Gärtn. 20. M. foliis lineari-lanceolatis acuminatis obliquis, paniculae decompoſitae ramis umbellatis. *Nov. Holl.*

umbellatus Cav. 21. M. foliis lanceolatis margine revolutis 1nerviis glabris, pedunculis terminalibus umbellatis. *Nov. Holl.*

anguſtifolius Sm. 22. M. foliis lineari-lanceolatis glabris, pedunculis axillaribus umbellatis, bracteis lanceolatis glabris. *C. B. S.* (Myrtus anguſtifolia L.)

1832. LEPTOSPERMUM Forſt.

* *Foliis nervoſis.*

ſcandifolium Sm. 1. L. foliis lanceolatis apice dilatatis mucronatis 5nerviis ſupra nitidis ſubtus pubeſcentibus, floribus ſolitariis, dentibus calycis membranaceis coloratis. *Nov. Holl.*

emarginatum Wendl. 2. L. foliis ſpathulatis emarginatis obſcure 5nerviis, dentibus calycis membranaceis coloratis. *Nov. Holl.*

ſericeum Labill. 3. L. foliis obovatis acutis ſericeis 3-5nerviis, floribus ſolitariis, dentibus calycis rigidis perſiſtentibus. *Nov. Holl.*

marginatum Labill. 4. L. foliis obovato-oblongis ſub-3nerviis margine niveo-ſericeis ciliatis, floribus glomeratis ſeſſilibus 10andris. *Nov. Holl. ad Africum.*

pubeſcens Sm. 5. L. foliis obovato-lanceolatis 3nerviis, ramulis villoſis, calycibus ſericeis, dentibus viridibus. *Nov. Holl.* (L. lanigerum W. trinerve Sm.)

lanigerum Sm. 6. L. foliis obovatis 3nerviis piloſis, ramulis villoſis, calycibus villoſiſſimis. *Terra Diemen. Nov. Holl.*

ſcoparium Forſt. 7. L. foliis ovato-lanceolatis acutis 3nerviis, ramis virgatis pubeſcentibus, calycibus glabris, dentibus calycis coloratis. *Nov. Holl.* (L. ſtellatum Cav. Melaleuca ſcoparia Forſt. L. ſuppl. Philadelphus ſcoparius Ait.)

tuberculatum Poir. 8. L. foliis ovatis obtuſiusculis mucronatis 3nerviis ſubtus punctato-tuberculatis, calycis villoſi dentibus rigidis. *Nov. Holl.*

† *porophyllum* Cav. 9. L. foliis ſpathulatis glabris obſcure 3nerviis pellucido-punctatis, dentibus calycis deciduis. *Nov. Holl.*

attenuatum Sm. 10. L. foliis lanceolato-linearibus acutis 3nerviis, calycibus ſericeo-villoſis, dentibus coloratis. *Nov. Holl.*

** *Foliis enerviis.*

flexuoſum Link. 11. L. foliis ovato-lanceolatis acuminatis venoſis glabris, ramis flexuoſis compreſſis, floribus ſeſſilibus aggregatis, calycibus hirſutis. *Nov. Holl.* (Metroſideros W.)

flaveſcens Sm. 12. L. foliis lineari-lanceolatis obtuſis ſubmucronatis glabris, ramulis ſericeis, dentibus calycis coloratis. *Nov. Holl.* (Melaleuca Thea Wendl. Lept. Thea W. multiflorum Cav.)

triloculare Vent. 13. L. foliis lineari-lanceolatis mucronato-pungentibus ſubciliatis, calycibus villoſis, floribus 15andris, capſulis 3locularibus. *Nov. Holl.*

juniperinum Sm. 14. L. foliis lineari-lanceolatis pungentibus, ramulis ſericeis, calycibus glabris, dentibus coloratis. *Nov. Holl.*

baccatum Sm. 15. L. foliis lineari-lanceolatis pungentibus, ramulis hirtis, calycibus glabris, dentibus coloratis pubeſcentibus, capſula baccata. *Nov. Holl.*

dubium * 16. L. foliis linearibus anguſtiſſimis obtuſiusculis, dentibus calycis glabri viridibus. *Nov. Holl.*

arachnoideum Sm. 17. L. foliis ſubulatis pungentibus, ramulis hirtis, calycibus dentibusque villoſis. *Nov. Holl.*

parvifolium Sm. 18. L. foliis obovatis incanis, ramulis calycibusque piloſis, dentibus coloratis. *Nov. Holl.*

imbricatum Sm. 19. L. foliis obovatis imbricatis ramulisque glabris, dentibus calycis glabri coloratis carinatis. *Nov. Holl.*

1833. FABRICIA Gärtn.

myrtifolia Gärtn. 1. F. foliis oppoſitis obovato-lanceolatis, dentibus calycis orbiculatis. *Nov. Holl.*

laevigata Sm. 2. F. foliis alternis obovatis ſub-3nerviis glaucis, dentibus calycis 3angularibus. *Nov. Holl.*

1834. PHILADELPHUS.

coronarius 1. Ph. foliis ovato-oblongis acuminatis dentatis utrinque glabris. *Europ. auſtr.* (Ph. nanus Mill. var.)

grandiflorus W. 2. Ph. foliis ovatis acuminatis dentatis, axillis venarum ſubtus barbatis. *Carolin. Georgia.* (Ph. inodorus Hortul.)

hirſutus Nutt. 3. Ph. foliis ovato-oblongis acutis dentatis ſupra hirſutis ſubtus albido-villoſis, caule humili. *Louiſiana.*

Lewiſii Pursh. 4. Ph. foliis ovatis acutis ſubintegerrimis ciliatis, ſtylo 3fido. *Amer. bor. occid.*

inodorus Mill. 5. Ph. foliis ovatis acutis integerrimis, ſtylo indiviſo, ſtigmatibus 4. *Carolina.*

1835. SONNERATIA L. fil.

acida L. fil. 1. S floribus corollatis, ſtigmate ſubrotundo. *Inſ. Molucc.* (Rhizophora caſeolaris L. Aubletia Gärtn.)

†*apetala* Roth. 2. S. floribus apetalis, calycibus 4fidis, ſtigmate umbraculiformi. *Ind. or.*

1836. CALYPLECTUS R. et P.

ſpecioſus Kunth. *Nov. Granat. Peru.* Arbor excelſa, foliis oppoſitis oblongis integerrimis, floribus axillaribus ſolitariis longe pedunculatis albis ſpecioſis. (C. acuminatus R. et P. Lafoënſia Vand.)

1837. BARTONIA Sims.

ornata Pursh. 1. B. capſula baſi folioſa 5valvi, ſeminibus ſubemarginatis. *Ad fl. Miſſuri.* (B. 10petala Sims.)

nuda Pursh. 2. B. capſula baſi nuda 3valvi, ſeminibus marginatis. *Ad fl. Miſſuri.*

1838. CACTUS.

1. *Echinocacti: oblongi tuberculis compoſiti.*

mammillaris 1. C. ſimplex cylindrico-oblongus, tuberculis ovatis apice ſpinoſo-lanatis, ſpinis breviusculis rectis. *Amer. auſtr.* (Mammillaria ſimplex Haw.)

ſtellatus W. 2. C. ſimplex ovato-ſubgloboſus, tuberculis oblongis apice piloſo-ſpinoſis, pilis longitudine ſpinarum. *Amer. tropic.*

coronatus W. 3. C. ſimplex clavatus, tuberculis ovatis apice ſpinoſo-lanatis, lana ſpinis breviore, ſpina media apice uncinata. *Amer. tropic.*

glomeratus Lam. 4. C. caeſpitoſus, tuberculis ſubdiscretis clavatis glaucis tomentoſis apice ſtellato-ſpinuloſis. *Hiſpaniola.* (M. lanifera Haw.)

viviparus Fraſ. 5. C. caeſpitoſus, glomerulis ſubgloboſis, tuberculis ovato-cylindricis barbatis ſulcatis proliferis. *Louiſiana ſuper.* (Mammillaria prolifera Haw.)

flaveſcens Cand. 6. C. ovatus, tuberculis apice ſpinoſo-tomentoſis, ſpinis rigidis elongatis divergentibus inaequalibus. *Amer. tropic.*

depreſſus Cand. 7. C. globoſo-depreſſus, tuberculorum apice lanato dupliciter ſpinoſo, ſpinis exterioribus intricato-patentiſſimis, internis rectis discoloribus. *Amer. tropic.* (C. pſeudo-mammillaris Salm. Mammillaria discolor Haw.)

ſtramineus * 8. C. caeſpitoſus prolifer, tuberculis cylindricis apice longe lanatis, ſpinis ſtramineis. *Patria?* (Mammillaria ſtramineu Haw.)

† *Microthele* * 9. C. globoſus prolifer, tuberculis numeroſis obtuſiſſimis abbreviatis apice fuſco-ſpinoſis. *Patria?* (Mammillaria parvimamma Haw.)

abnormis W. 10. C. diſformis ſubdiviſus, tuberculis oblongis compreſſis inaequalibus, faſciculis ſpinarum aggregatis baſi lanatis. *Amer. tropic.* (C. monſtroſus Desf.)

gibboſus Haw. 11. C. turbinato-cylindricus multangulatus, faſciculis ſpinarum divaricatarum et tuberculis latis obtuſis apice nudis alternantibus. *Ind. occ.*

puſillus Cand. 12. C. globoſus minimus, ſpinis tuberculorum externis mollibus albis, internis rigidis pubeſcentibus flavicantibus. *Patria?*

2. *Melocacti: ſimplices angulati.*

Melocactus 13. C. hemiſphaericus 14angulatus, ſpinis rigidiſſimis patentibus, vertice florifero diſtincto cylindrico ſpinoſiſſimo. *Ind. occ.*

nobilis 14. C. ſubrotundus 15angulatus, ſpinis latis recurvis. *Mexico.* (C. recurvus Mill.)

intortus Mill. 15. C. oblongus multangulatus, angulis ſuperne in ſpiram tortis, ſpinis erecto-curvatis. *Inſ. Caſtrib.*

reductus Link. 16. C. oblongus multangulatus, angulis ſpinisque confertiſſimis rectis brevibus. *Mexico.* (C. nobilis Haw.)

Hyſtrix Haw. 17. C. oblongus multangulatus, faſciculis ſpinarum confertiſſimis elongatis rectis fulvis. *Ind. occid.* (C. Erinaceus Haw.?)

3. *Cerei: elongati continui.*

* *Erecti.*

Scopa * 18. C. ſuberectus ſubcylindricus glaber, ſpinis ſtellatis ſetaceis molliusculis niveis. *Patria?*

cylindricus Lam. 19. C. erectus teres leviſſime decuſſatim ſulcatus, ſpinis faſciculatis lanatis, pilis ſpinas divaricatas aequantibus. *Peru.*

ſerpentinus W. 20. C. erectus ſubſcandens, junior ſubangulatus, ſpinis ſetaceis elongatis confertis albidis. *Amer. auſtr.*

Pitajaya Jacq. 21. C. erectus ramoſus, ramis 3quetris, angulis repandis, faſciculis ſpinarum nigricantibus. *Amer. auſtr.*

tetragonus 22. C. erectus 4angularis, angulis compreſſis transverſim plicatis. *Amer. auſtr.* (C. grandis Haw.)

paniculatus Lam. 23. C. erectus ramoſiſſimus, ramis divaricatis 4angulis, angulis crenato-repandis, faſciculis ſpinarum abbreviatis. *Hiſpaniola.*

ſpecioſus W. 24. C. ſuberectus ramoſiſſimus, ramis divergentibus, angulis dentatis, ſpinis faſciculatis divergentibus. *Mexico.* (C. ſpecioſiſſimus Desf. bifrons Haw.)

pentagonus 25. C. erectus tenuis 5-6angulatus, faſciculis ſpinarum nudis. *Amer. tropic.*

Haworthii * 26. C. procerus ſub-5angulatus profunde ſulcatus, ſpinis numeroſis elongatis fulvis. *Ind. occ.* (Cereus nobilis Haw.)

priſmaticus W. 27. C. erectus obſolete 5gonus nitidus, ſpinis faſciculatis tenuibus brevibus fuſcis baſi nudis. *Amer. tropic.*

hexagonus 28. C. erectus 5-6angularis, angulis compreſſis, ſpinis ſubulatis fuſcis, lanugine breviſſima. *Amer. auſtr.*

†*heptagonus* 29. C. erectus oblongus 7angulatus. *Amer. trop.*

ſtrictus W. 30. C. erectus 7angulatus, angulis compreſſis repandis, ſpinis pallidis, lanugine breviſſima. *Amer. tropic.*

niger Salm. 31. C. erectus 7angulatus, ſpinis inaequalibus divaricatis albidis, tomento breviſſimo. *Amer. auſtr.*

†*laetus* Kunth. 32. C. erectus articulatus 7angulatus, angulis tuberculatis faſciculato-ſpinoſis. *Quito.* (C. Hyſtrix Salm.?)

eburneus Salm. 33. C. erectus glauceſcens 8angulatus, angulis obtuſis, ſpinis albicantibus elongatis. *Amer. auſtr.* (C. peruvianus W.)

peruvianus 34. C. erectus ramoſus ſub-8angulatus, angulis obtuſis, ſpinis fuſcis abbreviatis *Peru.*

repandus 35. C. erectus 8angulatus, angulis compreſſis repandis, ſpinis fuſcis. *Ind. occ.*

ſubrepandus Haw. 36. C. erectus 8angulatus, angulis obtuſis repandis, ſpinis validis pallidis, lana breviſſima. *Ind. occ.* (C. crenulatus Salm.?)

Royeni 37. C. erectus articulatus 8angulatus, angulis obtuſis, ſpinis albis elongatis lanam ſubaequantibus. *Amer. trop.*

fimbriatus Lam. 38. C. erectus continuus 8angulatus, angulis obtuſiſſimis, ſpinis albis elongatis, petalis fimbriatis. *Hiſpaniola.* (C. albiſpinus Salm.?)

†*fulviſpinoſus* Haw. 39. C. erectus ſub-9angulatus, lateribus planis, ſpinis validis fulvis elongatis. *Amer. trop.*

† *regalis* Haw. 40. C. erectus 9angulatus ſulcatus, ſpinis fulvis elongatis, junioribus lanam aequantibus. *Amer. tropic.*

lanuginoſus 41. C. erectus 10angulatus, angulis obſoletis, ſpinis flaveſcentibus elongatis lanam aequantibus. *Amer. tropic.*

chlorocarpus Kunth. 42. C. erectus ramoſus, ramis faſtigiatis 10-12angulatis, angulis tuberculatis ſtellato-ſpinosis. *Quito.*

† *euphorbioides* Haw. 43. C. erectus ſub-10angulatus, angulis validis, ſpinis inaequalibus baſi ſubnudis. *Amer. trop.*

coquimbanus Molin. 44. C. erectus 10angulatus, angulis obtuſis, ſpinis centralibus longiſſimis rectis. *Chili.*

polygonus Lam. 45. C. erectus ramoſus 11angulatus ſulcatus, angulis ſubundulatis, ſpinis gryſeis abbreviatis. *Hiſpaniola.* (C. gryſeus Haw.)

multangularis W. 46. C. erectus ſub-18-20angulatis, angulis approximatis obtuſis, ſpinis ſetaceis flaveſcentibus confertis. *Amer. trop.*

divaricatus Lam. 47. C. erectus ramoſus, ramis divaricatis multangulis, angulis obtuſis, ſpinis approximatis. *Hiſpaniola.*

*** Cerei repentes.*

paraſiticus 48. C. ramoſus, ramis compreſſis undulato-ſubarticulatis compreſſis ſtriatis. *Hiſpaniola.*

ſerpens Kunth. 49. C. ramoſus ſubangulatus areolatus, areolis 6angulatis apice ſpinoſis. *Quito.*

triangularis 50. C. diffuſus ſubarticulatus, articulis ovatis 3gonis dentatis, ſpinis ſetaceis paucis lanugine longioribus. *Ind. occ.*

triqueter W. 51. C. repens, articulis oblongis 3quetris repandis, ſpinis ſetaceis lanugine longioribus. *Amer. trop.* (C. 3gonus Haw.)

caripenſis Kunth. 52. C. repens diffuſus, ramis 4gonis, angulis tuberculoſis ſtellato-ſetoſis. *Nov. Granat.* (C. 4angularis Haw.)

grandiflorus 53. C. repens diffuſus 5-7angulatus, ſpinis longitudine pilorum. *Ind. occ.*

reptans W. 54. C. repens 5gonus, lateribus planis, ſpinis ſubulatis rufis lanuginem ſuperantibus. *Ind. occ.*

albiſetoſus Haw. 55. C. repens 5angulatus, ſpinis ſtellatis albis lanugine rufa brevioribus. *Ind. occ.*

flagelliformis 56. C. repens teretiusculis 10gonus, ſpinis ſetaceis lanugine longioribus. *Amer. tropic.* (C. Humboldtii, ſepium et icosagonus Kunth.)

4. *Rhipſalides: penduli ſ. erectiusculi teretes glabri.*

pendulus Sw. 57. C. pendulus, ramis verticillatis teretibus glabris obtuſis. *Jamaic. Hiſpaniol.* (Rhipſalis Caſſutha Gärtn.)

58.

fasciculatus W. 58. C. pendulus, ramis verticillatis teretibus glabris, pilis juniorum ſubfaſciculatis. *Ind. occid.* (C. paraſiticus Cand.)

funalis Salm. 59. C. erectiusculus, ramis longis teretibus obtuſis glabris ſparſe punctatis. *Ind. occid.* (Rhipſalis garndiflora Haw.)

† *micranthus* Kunth. 60. C. pendulus inermis, ramis compreſſo-ancipitibus 3-4angula, floribus minutis. *Quito.*

5. *Opuntiae: ramis articulatis compreſſis.*

ſalicornioides Haw. 61. C. ramoſiſſimus tener, ramis verticillatis, articulis lineari-angulatis, junioribus teretiusculis, ſpinis faſciculatis minutiſſimis. *Patria?*

nanus Kunth. 62. C. repens, articulis teretibus ſubcompreſſis areolatis ſpinoſis. *Quito.*

fragilis Nutt. 63. C. ramoſus, articulis teretiusculis confluentibus fragilibus, faſciculis ſpinarum confertis, ſpinis exterioribus molliusculis internis elongatis rigidis, utrisque albis. *Amer. boreal.* (C. puſillus Haw.)

humilis Lag. 64. C. depreſſus, ramis divaricatis, articulis lanceolatis tumidis, ſpinis ſubſolitariis abbreviatis. *Ind. occ.* (C. folioſus W.)

truncatus Link. 65. C. dichotome ramoſus, articulis compreſſo-foliaceis denticulatis apice truncato-barbatis glaberrimis. *Braſil.*

braſilienſis W. 66. C. caule tereti, ramis compreſſis ovatis planis, ſpinis ſubſolitariis validis. *Braſil.*

monacanthos W. 67. C. articulato-prolifer, articulis obovato-oblongis, ſpinis ſolitariis validis. *Amer. auſtr.*

Opuntia 68. C. articulato-prolifer, articulis ovatis, ſpinis ſetaceis lanuginem aequantibus. *Amer. boreal. Ind. occ.*

Tuna 69. C. articulato-prolifer, articulis ovato-oblongis, ſpinis numeroſis validis divergentibus flavis elongatis, ſpinulis baſilaribus circinatis. *Quito. Mexico.* (C. Bonplandii Kunth.)

Ficus indica 70. C. articulato-prolifer, articulis ellipticis, ſpinis ſetaceis lanuginem aequantibus. *Amer. trop.*

tuberculatus W. 71. C. articulato-prolifer, articulis ovato-oblongis utrinque attenuatis, tuberculis ſpinoſis, ſpinis ſetaceis lanuginem aequantibus. *Amer. trop.*

Dillenii Ker. 72. C. articulato-prolifer, articulis latis oblique obovatis turgidis, ſpinis inaequalibus validis divaricatis. *Amer. bor. et auſtr. Ad fl. Miſſuri.* (C. ferox Nutt. Opuntia polyacantha Haw.)

tomentoſus Link. 73. C. articulato-prolifer, articulis oblongo-lanceolatis villoſiusculis, ſpinis inaequalibus abbreviatis rectis. *Amer. tropic.*

coccinellifer 74. C. articulato-prolifer, articulis oblongis obtuſis, ſpinis lanuginem aequantibus deciduis. *Amer. trop.* (C. decumanus W., ſubinermis Link. Opuntia craſſa et ſtricta Haw.)

elongatus W. 75. C. articulis lanceolatis confluentibus turgidis, ſpina faſciculi inferiore elongata, reliquis ſubobſoletis. *Amer. trop.*

elatior W. 76. C. articulis oblongis, ſpinis fuſcis validis inaequalibus divergentibus, lanugine obſoleta. *Amer. trop.* (Opuntia maxima Haw.)

curaſſavicus 77. C. articulis obovato-oblongis tumidis, ſpinis ſubbinis elongatis patentibus albis, lanugine breviſſima. *Amer. auſtr.* (C. triacanthos W.)

lanceolatus Haw. 78. C. articulis lanceolatis elongatis, ſpinis aequalibus breviſſimis. *Amer. trop.*

polyanthes Cand. 79. C. articulis ovatis, ſpinis duplicibus, majoribus patulis, minoribus circinatis. *Amer. trop.*

nigricans Haw. 80. C articulis oblongis, ſpinis duplicibus nigricantibus, majoribus divaricatis, minoribus circinatis. *Amer. trop.*

moniliformis 81. C. articulis globoſis, ſpinis baſi nudis ſolitariis geminisque validis elongatis divaricatis. *Ind. occ.*

ferox W. 82. C. articulis oblongis elongatis, ſpinis duplicibus albidis validis et ſetaceis lanugine longioribus. *Amer. trop.*

ſpinoſiſſimus Lam. 83. C. articulis oblongis, ſpinis confertiſſimis flavidis ſetaceis ſubulatisque. *Ind. occ.*

6. *Phyllanthi.*

Phyllanthus 84. C. ramis foliaceis articulatis oblongis crenatis, lanugine breviſſima, pedunculis lateralibus elongatis. *Amer. auſtr.* (Flores albi.)

elegans Link. 85. C. ramis foliaceis oblongis crenato-dentatis, lanugine breviſſima, floribus ſolitariis ſubſeſſilibus roſeis. *Amer. auſtr.* (C. ſpecioſus Bonpl. Desf. phyllanthoides Cand.)

alatus Sw. 86. C. ramis foliaceis petiolatis enſiformibus crenatis, floribus ſeſſilibus parvis albidis. *Jamaic.*

7. *Peireſciae: foliis diſtinctis.*

Peireſcia 87. C. caule tereti, ſpinis faſciculatis, foliis ovato-oblongis acutis petiolatis. *Amer. trop.* (Pereskia aculeata et longiſpina Haw. C. Bleo Kunth.)

portulaciſolius 88. C. caule tereti arboreo, ſpinis trunci faſciculatis, foliis confertis obovatis emarginatis, ſpinis ſolitariis axillaribus elongatis. *Ind. occ.*

† *grandifolius* * 89. C. caule ſpinoſiſſimo, foliis oblongo-lanceolatis carnoſis ſupra laevibus ſubtus punctato-aſperis. *Braſil.* (Pereskia grandifolia Haw. C. horridus Kunth.)

1839. TRIPHACA Lour.

africana Lour. *Afric. or.* Arbor magna, foliis cordatis integerrimis, floribus cymoſis luteis.

1840. PHOBEROS Lour.

cochinchinenſis Lour. 1. Ph. caule toto aculeato, foliis ovatis ſubſerratis, pedunculis terminalibus. *Cochinchina.*

chinenſis Lour. 2. Ph. ramis inferioribus aculeatis ſuperioribus inermibus, foliis ovatis integerrimis, pedunculis lateralibus. *China auſtr.*

1841. LOPHIRA Banks.

alata Banks. *Afric. trop.* Arbor foliis alternis obcordatis rigidis, floribus racemoſis.

1842. ABATIA R. et P.

rugoſa R. et P. 1. A. foliis oblongo-lanceolatis rugoſis, racemis terminalibus. *Peru.*

parviflora R. et P. 2. A. foliis oblongo-lanceolatis acutis planis, racemis e dichotomia. *Peru. Nov. Granat.?* (A. verbaſcifolia Kunth.)

1843. POLYLEPIS R. et P.

racemoſa R. et P. 1. P. foliis pinnatis, foliolis obovato-oblongis emarginatis crenatis, floribus racemoſis. *Peru.*

lanuginoſa Kunth. 2. P. foliis pinnatis, foliolis ſubintegerrimis ſubtus ſericeo-lanatis, floribus racemoſis. *Peru.*

villoſa Kunth. 3. P. foliis ternatis, foliolis crenatis ſubtus villoſis, racemis multifloris. *Peru.*

incana Kunth. 4. P. foliis ternatis, foliolis crenatis ſubtus tomentoſis, floribus racemoſis 5andris. *Peru.*

1844. CERCOCARPUS Kunth.

folhergilloides Kunth. *Mexico.* Arbor foliis alternis oblongis ſerratis, floribus umbellato-faſciculatis.

1845. CALLISTEMON R. Br.

rigidus R. Br. *Nov. Holl.* Frutex foliis linearibus cuſpidatis, floribus confertis axillaribus, ſtaminibus rubris. (Metroſideros linearis W. enum.)

1846. CALYPTRANTHES Sw.

paniculata R. et P. 1. C. foliis oblongo-lanceolatis obtuſe acuminatis utrinque glabris, racemis paniculatis. *Peru.*

braſilienſis * 2. C. foliis oblongis utrinque attenuatis ſupra glabris ſubtus incano-pubeſcentibus aſperis, paniculis axillaribus elongatis patulis ferrugineo-tomentoſis, floribus glomeratis. *Braſil.* (C. paniculata N. E.)

Chytraculia Sw. 3. C. foliis ovato-lanceolatis utrinque glabris, paniculis axillaribus terminalibusque trichotomo-

diffuſis villoſo-lanatis, floribus glomeratis. *Jamaica.* (Myrtus L.)

caryophyllifolia W. 4. C. foliis ovato-ellipticis parallele venoſis utrinque glabris, paniculae lateralis ramis rigidis glabris divaricatis 3floris. *Ind. or.* (Eugenia Lam. Myrtus Cumini L.)

Jambolana W. 5. C. foliis obovatis emarginatis, panicula terminali corymboſa glabra. *Ind. orient.* (Eugenia Lam.)

Syzygium Sw. 6. C. foliis ovato-oblongis obtuſis parallele venoſis utrinque glabris, paniculis axillaribus trichotomis glabris. *Jamaica.* (Myrtus Zuzygium L.)

guineenſis W. 7. C. foliis oblongis utrinque attenuatis venoſo-reticulatis, pedunculis axillaribus terminalibusque corymboſis. *Guinea.*

rigida Sw. 8. C. foliis ovatis acutis eveniis rigidis, pedunculis axillaribus 3floris glabris. *Jamaica.*

latifolia Poir. 9. C. foliis ovali-ſubrotundis emarginatis coriaceis reticulatis, floribus lateralibus ſubſeſſilibus faſciculatis. *Inſ. Mascaren.*

1847. EUCALYPTUS Herit.

* *Operculo conico.*

robuſta Sm. 1. E. operculo medio conſtricto calycem ſuperante, umbellis lateralibus terminalibusque, foliis oblongis acuminatis ſubtus discoloribus. *Nov. Holl.*

pilularis Sm. 2. E. operculo medio conſtricto calycem aequante, floribus corymboſis, fructibus globoſis, foliis lineari-lanceolatis. *Nov. Holl.*

roſtrata Cav. 3. E. operculo roſtrato, floribus umbellatis, foliis ovato-lanceolatis nitidis. *Nov. Holl.*

cornuta Labill. 4. E. operculo longiſſime roſtrato, floribus capitatis, foliis lineari-lanceolatis. *Nov. Holl. et Africum.*

Globulus Labill. 5. E operculo conico medio conſtricto calycem 4gonum aequante, floribus ſubſolitariis, foliis lanceolato-linearibus elongatis ſubfalcatis craſſiſſimis ſubeveniis. *Nov. Holl.*

incraſſata Labill. 6. E. operculo conico calycem aequante, floribus ſubcapitatis pedunculatis, foliis lanceolatis craſſiusculis parallele venoſis, nervis marginalibus. *Nov. Holl.*

marginata Sm. 7. E. operculo conico calycem aequante, umbellis lateralibus, foliis ovatis margine incraſſatis. *Nov. Holl.*

tereticornis Sm. 8. E. operculo conico tereti membranaceo calycem latitudine et longitudine ſuperante, umbellis lateralibus, foliis lanceolatis. *Nov. Holl.*

reſinifera Sm. 9. E. operculo conico tereti coriaceo calycem latitudine aequante longitudine ſuperante, umbellis lateralibus, foliis oblongo-lanceolatis membranaceis venoſo-reticulatis, nervis marginalibus. *Nov. Holl.*

multiflora Poir. 10. E. operculo conico, pedunculis multifloris elongatis, foliis lanceolatis basi inaequalibus parallele venosis apice incurvo-acuminatis. *Nov. Holl.* (E. longifolia Link.)

capitellata Sm. 11. E. operculo conico obtusiusculo calyceque angulato subancipiti, pedunculis 3floris subcapitatis, fructu globoso, foliis ovato-lanceolatis obliquis. *Nov. Holl.* (E. triantha Link.)

saligna Sm. 12. E. operculo conico acuto calyceque angulosо subancipiti, capitulis lateralibus, fructu turbinato, foliis lineari-lanceolatis. *Nov. Holl.* (E. angustifolia Link.)

viminalis Labill. 13. E. operculo conico obtusiusculo, pedunculis 3floris axillaribus, foliis lineari-lanceolatis subfalcatis longissimis. *Nov. Holl.*

** *Operculo hemisphaerico.*

pulverulenta Ker. 14. E. operculo submutico, pedunculis 3floris, foliis oppositis cordato-orbiculatis subcucullatis pulverulentis. *Nov. Holl.*

hirsuta Link. 15. E. operculo submutico, pedunculis 3floris ramisque strigosis, foliis cordatis obtusis subtus pubescentibus. *Nov. Holl.*

botryoides Sm. 16. E. operculo mutico, capitulis pedunculatis, fructu turbinato, foliis lanceolatis. *Nov. Holl.*

amygdalina Labill. 17. E. operculo mutico, capitulis pedunculatis, foliis lineari-lanceolatis. *Nov. Holl.*

paniculata Sm. 18. E. operculo submutico, calyce angulato, umbellis terminalibus subpaniculatis. *Nov. Holl.*

haemastoma Sm. 19. E. operculo mucronulato, umbellis lateralibus terminalibusque, ramulis angulatis, foliis lanceolatis elongatis coriaceis. *Nov. Holl.*

piperita Sm. 20. E. operculo mucronulato, umbellis lateralibus compositis, ramulis angulatis, foliis ovatis obliquis. *Nov. Holl.*

obliqua Sm. 21. E. operculo mucronulato, umbellis lateralibus solitariis, ramulis teretibus, foliis oblongo-lanceolatis obliquis. *Nov. Holl.*

corymbosa Sm. 22. E. operculo mucronulato, calyce tereti, umbellis terminalibus corymboso-paniculatis, foliis lanceolatis. *Nov. Holl.*

ovata Labill. 23. E. operculo mucronulato, capitulis paucifloris pedunculatis, foliis ovatis subcrenulatis venosis. *Nov. Holl.*

cordata Labill. 24. E. operculo mucronulato, pedunculis sub-3floris congestis axillaribus, foliis oppositis sessilibus cordatis crenatis. *Nov. Holl.*

1848. Foetidia Commers.

mauritiana Lam. *Inf. Mascaren.* Arbor foliis ovalibus, floribus solitariis pedunculatis.

DI - PENTAGYNIA.

1849. Waldsteinia Kit.

geoides W. *Hungar. Transſylvan.* Herba ſubſpithamea, foliis 5lobis, pedunculis ſubbifloris, floribus flavis.

1850. Spiraea.

* *Fruteſcentes.*

alpina Pall. 1. Sp. foliis lineari-lanceolatis ſubdenticulatis ſupra glabris ſubtus ſubpubeſcentibus, corymbis lateralibus. *Sibir. or.*

acutifolia W. 2. Sp. foliis ſpathulatis acutis integerrimis 3plinerviis glabris, corymbis lateralibus ſeſſilibus. *Patria?*

hypericifolia 3. Sp. foliis obovatis obtuſis ſubintegerrimis 3plinerviis glabris, corymbis lateralibus ſeſſilibus. *Hungar. Transſylvan. Podolia. Tauria. Gallia med. Japon. Amer. bor.* (Sp. crenata L. obovata W. picovienſis et ſawranica Beſſ. folioſa Poir. varr.)

chamaedryfolia 4. Sp. foliis oblongis apice inciſo-dentatis baſi attenuatis ſubpubeſcentibus, corymbis pedunculatis. *Hungar. Transſylvan. Sibir. China.* (Sp. oblongifolia Kit. cantonienſis Lour.)

triloba 5. Sp. foliis ſubcordato-ſubrotundis obtuſe lobatis dentatis, umbellis pedunculatis. *Sibir.*

thalictroides 6. Sp. foliis obovatis obtuſis ſub-3lobis, umbellis ſeſſilibus. *Sibir.*

argentea Mut. 7. Sp. foliis obovato-oblongis apice ſerratis ſericeis flabellato-venoſis, racemis paniculatis. *Noo. Granat.*

ulmifolia Scop. 8. Sp. foliis ovato-oblongis ſubduplicato-ſerratis glabriusculis, corymbis pedunculatis terminalibus. *Carniolia.*

betulifolia Pall. 9. Sp. foliis late ovatis inciſo-ſerratis glabris, corymbis terminalibus compoſitis faſtigiatis folioſis. *Sibir. Virginia.* (Sp. corymboſa Rafin.)

capitata Pursh. 10. Sp. foliis ovatis ſublobatis duplicato-dentatis ſubtus reticulatis tomentoſis, corymbis terminalibus congeſtis ſubcapitatis longiſſime pedunculatis, calycibus tomentoſis. *Ora occ. Amer. bor.*

discolor Pursh. 11. Sp. foliis ovatis lobatis dentatis ſubplicatis ſubtus niveo-tomentoſis, paniculis terminalibus pedunculatis ramoſiſſimis. *Ad montes ſcopulioſos Amer. bor.*

crataegifolia Link. 12. Sp. foliis obovatis obtuſis duplicato-ſerratis glabris ſubtus reticulatis, corymbis terminalibus compoſitis, floribus ſubcapitatis. *Patria?*

opulifolia 13. Sp. foliis ovatis 3lobis ſerratis glabris, corymbis terminalibus. *Amer. bor.*

tomentoſa 14. Sp. foliis lanceolatis inaequaliter ſerratis ſubtus tomentoſis, racemis terminalibus compoſitis. *Amer. bor.*

callosa Thunb. 15. Sp. foliis lanceolatis acutis serratis subtus glaucis subvillosis, panicula ramosissima terminali. *Japon.* (Sp. japonica L. suppl.)

salicifolia 16. Sp. foliis oblongis serratis glabris subsessilibus, racemis compositis terminalibus. *Europ. med. austr. Sibir. Amer. bor.* (Sp. carpinifolia W. var. foliis latioribus, racemis paniculatis. Sp. alba Ehrh., paniculata Ait. similis var. foliis basi attenuatis.)

magellanica Poir. 17. Sp. foliis oblongo-lanceolatis basi attenuatis petiolatis inciso-serratis utrinque glabris subtus pallidis nervosis, racemis terminalibus simplicibus. *Ad fretum Magellan.*

lanceolata Poir. 18. Sp. foliis lanceolatis obtuse serratis glabris petiolatis rubro-venosis, umbellis terminalibus pedunculatis. *Inf. Mascaren.*

incisa Thunb. 19. Sp foliis ovatis acutis incisis sub-5fidis subtus villosis, umbellis terminalibus pedunculatis. *Japon.*

laevigata 20. Sp. foliis oblongis obtusis integerrimis glaucis, panicula terminali thyrsoidea. *Sibir.* (Sp. altaica Pall.)

coerulescens Poir. 21. Sp foliis subsessilibus lanceolatis utrinque attenuatis integerrimis subtus albidis, paniculis axillaribus cymosis. *Ind. or.*

sorbifolia 22. Sp. foliis pinnatis, foliolis lanceolatis duplicato-serrulatis venoso-lineatis glabris, floribus paniculatis. *Sibir. Camtschatca. Ora occ. Amer. bor.*

* *Herbaceae.*

Aruncus 23. Sp. foliis supradecompositis, foliolis ovato-oblongis duplicato-serratis acuminatis glabris, racemis spiciformibus paniculatis, floribus dioecis, petalis minimis. *Europ. med. Amer. bor. Japon.*

Filipendula 24. Sp. foliis interrupte pinnatis, foliolis lanceolatis inciso-serratis, floribus corymbosis. *Europ.* (Sp. pubescens Cand. var.)

Ulmaria 25. Sp. foliis pinnatis subtus subtomentosis, lateralibus indivisis, extremo majori 3lobo, corymbis proliferis. *Europ.* (Sp. denudata Presl.)

quinqueloba Baumg. 26. Sp. foliis interrupte pinnatis subtus hirsutiusculis, foliolis lateralibus 3-extimo 5fidis, floribus cymoso-corymbosis. *Transsylvan.*

digitata W. 27. Sp foliis pinnato-ternatis subtus albo-tomentosis, foliolis lateralibus 5-extimo 7fidis, laciniis acutis serratis, panicula corymbosa. *Sibir.* (Sp. palmata Pall.)

lobata Jacq. 28. Sp foliis pinnatis subtus glabris, lateralibus 3fidis extimo 7partito, laciniis acutis serratis, corymbis paniculatis proliferis. *Virginia. Carolina. Japon.* (Sp. palmata L. suppl Thunb.)

camtschatica Pall. 29. Sp. foliis palmato-5partitis, petiolis auriculatis, caule hirsuto, corymbis proliferis. *Camtschatca. Inf. Aleut.*

trifoliata 30. Sp. foliis ternatis oblongo-lanceolatis serratis, stipulis linearibus integerrimis, floribus corym-

bosis, calycibus campanulatis, petalis elongatis. *Amer. bor.* (Gillenia Mönch.)

stipulata Mühlb. W. 31. Sp. foliis ternatis lanceolatis elongatis serrulatis, stipulis foliaceis ovatis inciso-dentatis, floribus corymbosis, calycibus campanulatis, petalis elongatis. *Louisiana.* (Gillenia stipulacea Nutt.)

1851. KERIA Cand.

japonica Cand. *Japon.* Suffrutex foliis ovato-lanceolatis duplicato-serratis venoso-lineatis, floribus flavis plerumque plenis. (Rubus japonicus L. Corchorus Thunb.)

1852. SESUVIUM.

Portulacastrum 1. S. foliis spathulato-oblongis, articulis caulis tumidis, flore pedunculato. *Amer. trop.* (S. pedunculatum Pers.)

longifolium W. 2. S. foliis lineari-spathulatis, articulis caulis aequalibus, flore pedunculato. *Amer. austr.* (S. spathulatum Kunth.)

revolutifolium Vahl. 3. S. foliis lineari-lanceolatis margine revolutis, flore terminali sessili. *Amer. trop.* (S. sessile Pers. Portulacastrum Cand., revolutifolium Ort.)

repens W. 4. S. foliis lanceolato-spathulatis, caulis repentis articulis filiformibus, flore pedunculato. *Ind. orient.*

microphyllum Humb. 5. S. foliis subrotundis lanceolatisve, caulis humifusi articulis aequalibus, flore pedunculato. *Cuba.*

1853. AIZOON.

* *Fruticosa.*

fruticosum 1. A. caule erecto ramoso, ramis virgatis, foliis lanceolatis basi attenuatis, floribus sessilibus. *C. B. S.*

rigidum 2. A. caule decumbente, ramis diffusis, foliis obovatis acutiusculis glauco-tomentosis, floribus alternis secundis sessilibus. *C. B. S.* (A. tomentosum Lam.)

stellatum Lam. 3. A. caule diffuso, foliis spathulato-linearibus incano-villosis, floribus paniculatis stellato-patentibus. *C. B. S.*

perfoliatum 4. A. caule erecto ramoso tomentoso, foliis obovatis perfoliato-connatis papillosis, floribus axillaribus pedunculatis solitariis. *C. B. S.*

** *Herbacea.*

paniculatum 5. A. caule decumbente ramoso, foliis obovato-lanceolatis hirsutis, ramis floriferis trichoto-

mis, floribus ſeſſilibus. *C. B. S.* (A. lanceolatum Murr.)

hiſpanicum 6. A. caule diffuſo, foliis lanceolatis ſeſſilibus papilloſis, floribus axillaribus ſubpedunculatis ſolitariis. *Hiſpan.*

canarienſe 7. A. caule diffuſo, foliis obovatis papilloſis pubeſcentibus, floribus axillaribus ſeſſilibus. *Inſ. Canar. Afric. bor. Aegypt. Arab.*

glinoides 8. A. caule decumbente, foliis obovatis hirſutis, floribus ſeſſilibus ſparſis. *C. B. S.*

ſecundum 9. A. caule decumbente, foliis obovatis acutis villoſo-tomentoſis, floribus axillaribus ſeſſilibus ſecundis *C. B. S.*

ſarmentoſum 10. A. caule diffuſo ſarmentoſo, foliis lineari-ſemiteretibus glabris, floribus ſolitariis pedunculatis. *C. B. S.*

1854. MESPILUS.

* *Inermes, foliis indiviſis.*

germanica 1. M. foliis oblongis ſubdentatis ſubtus villoſo-tomentoſis, floribus terminalibus ſolitariis ſubſeſſilibus 5gynis. *Europ. Aſia med.*

grandiflora Sm. 2. M. foliis oblongis baſi attenuatis inaequaliter ſerratis ſubangulatis ſubtus villoſiusculis, floribus terminalibus ſubcorymboſis 3gynis. *Patria?* (M. lobata Poir.)

tomentoſa W. 3. M. foliis ellipticis obtuſis integerrimis ſubtus tomentoſis, floribus ſubcorymboſis parvis, calycibus germinibusque lanatis. *Gallia. Hungaria. Tranſylvan.* (M. eriocarpa Cand.)

Cotoneaſter 4. M. foliis ovatis acutis mucronatis integerrimis ſubtus tomentoſis, floribus ſubcorymboſis parvis, calycibus germinibusque glabris. *Europ. media. Tauria. Caucaſ. Sibir.*

acuminata Wall. 5. M. foliis ovato-lanceolatis integerrimis utrinque piloſiusculis, floribus geminis parvis, calycibus glabris. *Ind. or.*

† *affinis* * 6. M. foliis obovatis, calycibus pedunculisque lanatis. *Ind. or.* (Cotoneaſter Lindl.)

japonica Thb. 7. M. foliis oblongis utrinque attenuatis apice dentatis ſubtus tomentoſis coriaceis, floribus corymboſis. *Japon. China.* (Crataegus Bibas Lour. Eriobotrya Lindl.)

Cuila Buchan. 8. M. foliis ellipticis ſubdenticulatis. *Ind. orient.* (Eriobotrya elliptica Lindl.)

pubeſcens Kunth. 9. M. foliis oblongis utrinque attenuatis ſerratis ſubtus pubeſcentibus, corymbis paucifloris, calycibus villoſis. *Mexico.*

ſtipuloſa Kunth. 10. M. foliis oblongis mucronatis ſerratis baſi attenuatis utrinque pubeſcentibus, ſtipulis elongatis perſiſtentibus, corymbis paucifloris, calycibus tomentoſis. *Mexico.*

denticulata * 11. M. foliis obovato-ellipticis mucronatis apice denticulatis coriaceis ſubtus tomentoſis, floribus

corymboſis, calycibus lanatis. *Mexico.* (Cotoneaſter Kunth.)

ferruginea * 12. M. foliis ſubcordato-oblongis obtuſis crenatis ſubtus reticulatis calycibusque ferrugineo-tomentoſis, floribus ſubcorymboſis. *Quito.* (Crataegus Perſ. Oſteomeles Kunth.)

lanuginoſa R. et P. 13. M. foliis cordato-ovatis obtuſis ſerratis ſupra pubeſcentibus ſubtus calycibusque rufo-tomentoſis. *Peru.* (Eriobotrya cordata Lindl. Oſteomeles latifolia Kunth.)

glabrata * 14. M. foliis breviſſime petiolatis ſubrotundo-ovatis obtuſis coriaceis crenatis utrinque glabris, ramulis verrucoſis; calycibus pubeſcentibus. *Nov. Granat.* (Oſteomeles Kunth.)

Perſoonii * 15. M. foliis ovatis obtuſis ſerratis glabris ſubtus glaucis in petiolum longum decurrentibus, floribus corymboſis pubeſcentibus. *Peru.* (Crataegus obtuſifolia Perſ. Oſteomeles Kunth.)

turbinata * 16. M. foliis obovatis inciſis ſerratis glabris, corymbis paucifloris, pedicellis brevibus, fructibus turbinatis. *Amer. bor.* (Crataegus Pursh.)

laevis * 17. M. foliis ovatis acuminatis ſerrulatis laevibus, umbella ſimplici terminali. *Japon.* (Crataegus Thunb.)

villoſa * 18. M. foliis oblongis acuminatis ſerratis ſubtus fructibusque villoſis, umbella compoſita terminali. *Japon.* (Crataegus Thunb.)

** *Spinoſae, foliis indiviſis diviſisque.*

Pyracantha 19. M. foliis ſempervirentibus lanceolatis crenatis lucidis, corymbis pubeſcentibus, dentibus calycis obtuſis. *Europ. med. Caucaſ. Cochinchina.* (M. pauciflora Poir. var.)

pruniſolia Poir. 20. M. foliis ellipticis inaequaliter ſerratis glabris, pedunculis corymboſis calycibusque glanduloſis, dentibus calycis obtuſis. *Amer. bor.* (Crataegus elliptica Ait. M. prunellifolia Poir.)

lucida Ehrh. 21. M. foliis obovatis ſubſeſſilibus coriaceis lucidis apice ſerratis, corymbis compoſitis, dentibus calycis lanceolatis ſubdentatis. *Amer. bor.* (Crataegus Crus galli Ait., lucida Wangenh., hyemalis Walt.. Cr. linearis Perſ. M. linearis Poir. var.)

cuneifolia Ehrh. 22. M. foliis obovato-oblongis acutis in petiolum decurrentibus ſubangulatis ſerratis ſupra glabris opacis ſubtus venoſo-lineatis villoſiusculis, calycibus ſubvilloſis, dentibus ſubulatis integerrimis. *Amer. bor.* (Crataegus punctata Ait. Crus galli du Roi. M. cornifolia Poir.)

xanthocarpos Ehrh. 23. M. foliis obovatis inciſis ſerratis ſupra nitidis ſubtus villoſis, dentibus calycis lanceolatis inciſis, floribus 5gynis, fructibus turbinatis verrucoſis. *Amer. bor.* (Crataegus tomentoſa L., parvifolia Ait., uniflora du Roi. M. lutea Poir.)

ſpathulata * 24. M. foliis ſpathulatis 3fidis dentatis ſubfaſciculatis, ſpinis incurvis, corymbis paucifloris, calycibus tomentoſis. *Amer. bor.* (Crataegus Mx.)

triloba Poir. 25. M. foliis cuneatis 3lobis mucronatis villoſis, pedunculis corymboſis calycibusque tomentoſis. *Afric. bor. Neapol.* (Cr. maura L. ſuppl., maroccana Perſ. varr.)

caroliniana Poir. 26. M. foliis obovato-cuneiformibus ſublobatis crenato-ſerratis, ſtipulis cordatis calycibusque glanduloſis, floribus ſubſolitariis, fructibus turbinatis ſub-4ſpermis. *Carolina.* (Crataegus flava Ait., Michauxii Perſ., glanduloſa Mx, viridis Walt., Meſp flexiſpina Mönch.)

pyrifolia W. 27. M. foliis ovato-ellipticis baſi attenuatis inciſo-ſerratis ſubplicatis ſubtus villoſis, calycibus villoſiusculis, dentibus lineari-lanceolatis ſerratis, floribus 3gynis. *Amer. bor.* (Crataegus pyrifolia Ait., leucophleos Mönch., tomentoſa du Roi., Meſp. latifolia Poir., Calpodendron Ehrh., flexuoſa Poir.)

glanduloſa W. 28. M. foliis ovatis baſi cuneatis angulatis inciſo-ſerratis utrinque glabris ſupra nitidis, petiolis ſtipulis calycibusque glanduloſis piloſiusculis, fructibus 5ſpermis. *Sibir. Amer. bor.* (Crataegus glanduloſa Ait., ſanguinea Pall., Meſp. rotundifolia Ehrh.)

cordata Mill. W. 29. M. foliis cordato-ovatis angulato-inciſis utrinque glaberrimis, petiolis calycibusque eglanduloſis, fructibus 5ſpermis. *Amer. bor.* (Crataegus cordata Ait., populifolia Walt., Meſp. Phaenopyrum Ehrh., acerifolia et fiſſa Poir.)

coccinea Ehrh. 30. M. foliis cordato-ovatis angulato-inciſis glanduloſo-dentatis utrinque glabris, petiolis calycibusque glanduloſis, fructibus 5ſpermis. *Amer. bor.* (Crataegus coccinea L., Meſp. aeſtivalis Walt., purpurea Poir.)

Oxyacantha Gärtn. 31. M. foliis obovatis ſubrhombeis 3fidis obtuſis membranaceis utrinque concoloribus, floribus corymboſis 1-3gynis. *Europ.* (Crataegus L. M. oxyacanthoides Thuill., laevigata et intermedia Poir.)

monogyna Ehrh. 32. M. foliis obovatis 3fidis ſublaciniatis ſubcoriaceis nitidis ſubtus discoloribus, floribus corymboſis 1gynis, ſtigmate peltato. *Europ. Sibir.* (Crataegus 1gyna Jacq. Pall. M. elegans Poir., heterophylla Flügg. Crataegus laciniata Stev.)

melanocarpa * 33. M. foliis ſub-3fidis antice ſerratis baſi attenuatis, floribus ſub-5gynis, dentibus calycis acutis reflexis villoſis. *Tauria.* (Crataegus M. B.)

nigra W. 34. M. foliis ovato-oblongis utrinque attenuatis ſub-3fidis inciſo-ſerratis ſubtus villoſis, petiolis ramuliſque tomentoſis, floribus 5gynis, calycibus villoſis. *Hungar. Transſylvan.* (Crataegus Kit.)

pentagyna * 35. M. foliis ovatis 3fidis ſerratis ſubtus ramisque villoſis, dentibus calycis breviſſimis, floribus 5gynis. *Hungar.* (Crataegus W.)

Azarolus Poir. W. 36. M. foliis obtusis 3fidis subdentatis subtus villosis, dentibus calycis ovatis. *Europ. austr.* (Crataegus L. Pyrus Scop. Mesp. Oliveriana Bosc. var.)

apiifolia * 37. M. foliis deltoideis inciso-lobatis, lobis acutis inciso-dentatis, calycis tubo oblongo, dentibus subserratis. *Amer. bor.* (Crataegus apiifolia Mx. Oxyacantha Walt.)

orientalis Poir. 38. M. foliis sub-3fidis inciso-serratis hirsutis, floribus 5gynis, dentibus calycis acutis reflexis. *Tauria.* (Crataegus M. B. Mesp. odoratissima Andr.)

tanacetifolia Poir. Sm. 39. M. foliis pinnatifidis utrinque hirsutis, laciniis obtusis aequaliter serrulatis, dentibus calycis lanceolatis, floribus 5gynis. *Graecia. Asia minor.*

*** *Foliis pinnatis.*

anthyllidifolia * 40. M. foliis impari-pinnatis 10gynis, foliolis spathulatis pubescentibus, floribus corymbosis, officulis 1spermis. *Inf. Sandwich.* (Pyrus Sm. Osteomeles Lindl.)

1855. RAPHIOLEPIS Lindl.

indica Lindl. 1. R. foliis lanceolatis serratis glabris supra nitidis, floribus corymbosis, petalis lanceolatis calycem superantibus, staminibus exsertis. *Ind. or.* (Crataegus L.)

salicifolia Ker. 2. R. foliis lanceolatis elongatis serratis glabris, floribus paniculatis, petalis lanceolatis calycem aequantibus, staminibus abbreviatis. *China.*

Loureiri * 3. R. foliis lanceolatis inaequaliter serratis glabris, floribus corymbosis, petalis subrotundis. *Cochinchina.* (Crataegus indica Lour.)

rubra Lindl. 4. R. foliis obovatis crenatis glabris, racemis compositis terminalibus, petalis ovatis, staminibus abbreviatis. *China austr.* (Crataegus Lour.)

1856. PHOTINIA Lindl.

serrulata Lindl. 1. Ph. foliis oblongo-lanceolatis elongatis coriaceis serrulatis lucidis, floribus paniculatis, pedicellis calyce longioribus. *China. Japon.* (Crataegus glabra Thunb.)

arbutifolia Lindl. 2. Ph. foliis oblongo-lanceolatis mucronato-serrulatis, panicula thyrsoidea, pedicellis calyce brevioribus. *California.* (Crataegus arbutifolia Hort. kew. ed. 2.)

dubia Lindl. 3. Ph. foliis lanceolatis remote serratis, panicula villosa. *Nepal.*

integrifolia Lindl. 4. Ph. foliis ovalibus integerrimis glaberrimis, ramis pustulatis, panicula corymbosa glabra. *Nepal.*

1857. PYRUS.

* *Foliis ſimplicibus.*

† *utrinque glabris.*

communis 1. P. foliis ellipticis obtuſis ſerratis nitidis, floribus corymboſis, fructibus baſi productis. *Europ.*

Chamaemeſpilus Ehrh. 2. P. foliis ſubellipticis utrinque attenuatis duplicato-ſerrulatis, floribus corymboſo-faſciculatis, fructibus ovalibus. *Montes Europ. med.* (Meſpilus L.)

alnifolia Nutt. 3. P. foliis ſubrotundis retuſis apice denticulatis venoſis ſubtus glaucis, racemis ſimplicibus elongatis, fructibus ſubrotundis. *Montes ſcopuloſi Amer. boreal.*

melanocarpa W. 4. P. foliis obovato-oblongis acutis ſerrulatis, nervo medio ſupra glanduloſo, ſubtus discoloribus, floribus corymboſis, calycibus extus glabris intus villoſis, fructibus ſubgloboſis. *Amer. bor.*

Botryapium L. ſuppl. 5. P. foliis ovato-oblongis cuſpidatis ſerrulatis ſubtus discoloribus, racemis ſimplicibus elongatis pubeſcentibus, petalis ſpathulato-lanceolatis, fructibus globoſis. *Amer. bor.* (Meſpilus canadenſis L. Crataegus racemoſa Lam.)

ovalis W. 6. P. foliis ſubrotundo-ovalibus acutiuſculis ſerrulatis ſupra nitidis ſubtus pallidis, racemis erectis villoſis, bracteis pedicellos ſubſuperantibus, petalis obovatis, fructibus ſubrotundis. *Amer. bor.* (Meſpilus Amelanchier Walt. Crataegus ſpicata Lam.)

ſanguinea Pursh. 7. P. foliis ſubcordato-ovalibus obtuſis mucronatis tenuiſſime ſerrulatis, ramis ſanguineis, racemis paucifloris, calycibus glabris, petalis linearibus obtuſis. *Amer. bor.* (Meſpilus canadenſis γ. rotundifolia Mx.)

† *Michauxii* Boſc. 8. P. foliis ovali-oblongis obtuſiuſculis integerrimis ſupra lucidis ſubtus pallidis, pedunculis 1floris incraſſatis, fructibus globoſis. *Amer. bor.*

anguſtifolia Ait. 9. P. foliis oblongo-lanceolatis baſi attenuatis crenato-dentatis, pedunculis corymboſis. *Amer. boreal.*

japonica Thb. 10. P. foliis obovato-oblongis ſerratis coriaceis nitidis, floribus axillaribus ſubgeminis breviſſime pedunculatis, calycibus glabris obtuſis. *Japon.* (Chaenomeles Lindl.)

prunifolia W. 11. P. foliis ovato-oblongis acutis ſerrulatis, pedunculis umbellatis piloſis. *Sibir.*

ſpectabilis Ait. 12. P. foliis elliptico-oblongis utrinque ſubattenuatis ſerrulatis laevibus, pedunculis umbellatis pubeſcentibus, unguibus petalorum calyce longioribus, ſtylis baſi lanatis. *China.*

baccata 13. P. foliis ovato-oblongis acutis aequaliter ſerrulatis, pedunculis umbellatis, unguibus petalorum abbreviatis, fructibus baccatis, calyce deciduo. *Sibir. Japon.*

coronaria 14. P. foliis cordatis angulatis inciso-ferratis, pedunculis corymbosis, stylis glabris. *Virginia.*

torminalis Ehrh. 15. P. foliis cordato-ovatis laciniato-lobatis serratis, lobis infimis divaricatis, pedunculis corymbosis pubescentibus, fructibus ellipticis. *Germania.*

†† *Foliis subtus pubescentibus.*

Malus 16. P. foliis ovatis acutiusculis serratis subtus subtomentosis, pedunculis umbellatis, fructibus basi umbilicatis. *Europ. Asia med.*

dioeca W. 17. P. foliis oblongis acutis duplicato-serratis subtus subtomentosis, pedunculis subaggregatis pubescentibus, floribus dioecis, petalis linearibus calycem aequantibus. *Patria?*

Cydonia 18. P. foliis ovato-ellipticis acutiusculis integerrimis subtus subtomentosis, pedunculis solitariis, loculis fructus pleiospermis. *Transsylvan. Tauria. Graecia.* (Cydonia vulgaris Pers.)

chinensis Thouin. 19. P. foliis subellipticis acutis serrulatis subtus sericeis, floribus solitariis subsessilibus bracteatis, fructibus oblongis torulosis. *China.*

arbutifolia Ehrh. 20. P. foliis obovato-oblongis acutis crenato-dentatis subtus tomentosis, nervo medio supra glanduloso, floribus corymbosis, calycibus lanatis. *Amer. boreal.* (Mespilus arbutifolia L., pumila Schmidt. Crataegus pyrifolia Lam.)

Amelanchier du Roi. 21. P. foliis subrotundo-ellipticis acutis serrulatis subtus pubescentibus, pedunculis racemosis germinibusque pilosis, petalis lanceolatis obtusis. *Europ. med.* (Mespilus L.)

Pollveria 22. P. foliis ovato-oblongis acutis serratis subtus tomentosis, nervo medio supra glanduloso, pedunculis corymbosis lanatis. *Alsatia.* (P. irregularis du Roi.)

cretica W. 23. P. foliis ovatis venosis mucronato-dentatis subtus tomentosis, pedunculis corymbosis calycibusque lanato-tomentosis, petalis lanceolatis. *Creta.*

parviflora Desf. 24. P. foliis elliptico-oblongis integerrimis subtus incano-tomentosis, pedunculis corymbosis, fructibus globosis. *Creta.*

nivalis Jacq. 25. P. foliis ovalibus obtusis apice subserrulatis subtus sericeo-tomentosis, pedunculis corymbosis, fructibus globosis. *Austria.*

alpina W. 26. P. foliis elliptico-oblongis serrulatis basi attenuatis integerrimis subtus albido-tomentosis, pedunculis corymbosis lanatis. *Patria?*

edulis W. 27. P. foliis oblongis basi cuneatis inaequaliter duplicato-serratis subtus tomentosis, pedunculis corymbosis sublanatis. *Gallia?*

Aria Ehrh. 28. P. foliis subrotundo-ovatis inciso-dentatis subtus albido-tomentosis, floribus corymbosis. *Europa.* (Crataegus L., Sorbus Crantz. Pers., Mespilus Scop.)

intermedia Ehrh. 29. P. foliis ovato-lanceolatis *inciso-dentatis* subtus niveo-tomentosis, floribus corymbosis. *Scandinavia.*

sinaica Thouin. 30. P. foliis ovato-oblongis mucronatis subintegerrimis subtus lanatis, corymbis paucifloris. *Mons Sinai.*

elaeagnifolia Pall. 31. P. foliis ovato-lanceolatis integerrimis tomentoso-lanatis, floribus corymbosis, dentibus calycis acutis. *Gallia austr. Tauria. Caucas.* (P. persica Pers., amygdaliformis Vill., salicifolia Balb.)

salicifolia 32. P. foliis lineari-lanceolatis utrinque attenuatis subcrenulatis subtus lanatis, dentibus calycis oblongis obtusiusculis. *Caucas. Sibir.*

** *Foliis pinnatis.*

pinnatifida Ehrh. 33. P. foliis inferne pinnatis subtus tomentosis, foliolis inferioribus anguste oblongis antice serratis, extremo maximo rhombeo inciso-serrato, caule arboreo, corymbis compositis. *Scandinavia.* (Sorbus hybrida L.)

hybrida Mönch. 34. P. foliis pinnatis subtus tomentosis, foliolis elliptico-oblongis, lateralibus apice dentatis, extremo maximo serrato, nervo medio glanduloso, caule fruticoso, floribus corymbosis. *Patria?*

domestica Sm. 35. P. foliis pinnatis sub-8jugis subaequalibus subtus demum nudis, foliolis oblongis antice serratis, gemmis glabris acuminatis glutinosis, fructu pyriformi. *Europ. med.* (Sorbus L.)

aucuparia Sm. 36. P. foliis pinnatis sub-8jugis subaequalibus subtus demum nudis, foliolis oblongis duplicato-serratis, petiolo communi pubescente, gemmis subtomentosis obtusis, fructu globoso baccato. *Europ. Asia.* (Sorbus L.)

americana * 37. P. foliis pinnatis sub-8jugis subaequalibus petioloque communi glaberrimis, foliolis lanceolatis acuminato-cuspidatis aequaliter serrulatis, fructibus globosis baccatis. *Canada.* (Sorbus aucuparia *β.* Mx. S. americana W.)

microcarpa * 38. P. foliis pinnatis sub-6jugis subaequalibus petioloque communi glabris, foliolis lanceolatis acuminatis inaequaliter incisis mucronato-serrulatis, ramulis glutinosis, fructibus globosis exiguis. *Amer. bor.* (Sorbus aucuparia *α.* Mx., microcarpa Pursh.)

1858. Mesembrianthemum.

* *Herbacea, annua s. biennia.*

† *Foliis planis.*

α. Floribus albis.

linearе Thunb. 1. M. acaule, foliis linearibus glabris, scapo 1floro. *Afric. austr.*

crinifloruum Thunb. 2. M. ſubacaule, foliis obovatis papuloſis, ſcapo 1floro, petalis filiformibus 5. *Afric. auſtr.*

ſpathulatum W. 3. M. acaule, foliis ſpathulatis petiolatis papuloſis, ſcapo 1floro. *C. B. S.*

lanceum Thb. 4. M. caule erecto ſub-4gono, foliis oppoſitis connatis lanceolatis acutis papuloſis, floribus terminalibus. *Afric. auſtr.*

lanceolatum Haw. 5. M. caule proſtrato, foliis alternis lanceolatis obtuſiusculis papuloſis, floribus pedunculatis. *Afr. auſtr.*

filiforme Thb. 6. M. caule filiformi decumbente, foliis ſpathulatis obtuſis papuloſis, floribus axillaribus ſeſſilibus. *Afric. auſtr.*

ovatum Thb. 7. M. caule flexuoſo ſubangulato, foliis ovatis ſubpetiolatis glabris, floribus terminalibus. *Afric. auſtr.*

cryſtallinum 8. M. caule erectiusculo, foliis ampliſſimis ovato-oblongis undulatis decurrentibus ſubtus 3plinerviis pellucido-papuloſis, floribus axillaribus pedunculatis. *C. B. S.*

glaciale Haw. 9. M. caule proſtrato, foliis ovato-oblongis undulatis pellucido-papuloſis, floribus axillaribus ſeſſilibus. *Attica. Aegypt.* (M. cryſtallinum Sibth. W.)

Tripolium 10. M. caule abbreviato proſtrato, foliis oblongo-lanceolatis acutis amplexicaulibus laeviſſimis ſubcrenulatis, pedunculis rigidis, calycibus 5angularibus. *C. B. S.*

β. Floribus flavis.

pinnatifidum 11. M. caule depreſſo dichotomo, foliis oppoſitis lyratis papuloſis, floribus axillaribus pedunculatis. *C. B. S.*

ſabuloſum Thb. 12. M. ſubacaule, foliis oblongis acutis concavis papuloſis, ſcapo 1floro. *Afric. auſtr.*

angulatum Thb. 13. M. caule decumbente angulato, foliis obovatis obtuſis ſulcatis papuloſis. *Afric. auſtr.*

pomeridianum 14. M. caule erectiusculo dichotomo hirſuto, foliis lato-lanceolatis laevibus ſubciliatis, pedunculis elongatis calycibusque villoſis. *C. B. S.*

glabrum Ait. 15. M. caule depreſſo foliisque ſpathulato-oblongis ſubundulatis glaberrimis, calycibus hemiſphaericis. *C. B. S.*

helianthoides Ait. 16. M. caule erecto ramoſo ſuperne pubeſcente, foliis ſpathulato-lanceolatis acutiusculis glabris, pedunculis calycibusque elongatis. *C. B. S.*

ſeſſiliflorum Ait. 17. M. caule ramoſo, ramis divaricatis foliisque ſpathulatis papuloſis, floribus ſeſſilibus. *C. B. S.*

γ. Floribus rubris.

limpidum Ait. 18. M. caule decumbente ramoſiſſimo, foliis ſpathulatis pellucido-papuloſis, pedunculis elongatis, calycibus obtuſis. *C. B. S.* (M. cuneifolium Jacq. Cand., pyropeum Haw. var.)

19.

papulosum Ait. 19. M. caule dichotomo, foliis ovato-spathulatis papillosis, papillis globosis, ramis angulatis, pedunculis deflexis. *C. B. S.* (M. Aitoni Jacq.)

†† *Foliis teretiusculis.*

tricolor W. 20. M. subcaulescens, foliis lineari-spathulatis canaliculatis connatis. *C. B. S.*

copticum 21. M. foliis semiteretibus papulosis *distinctis*, floribus sessilibus axillaribus albis. *Aegypt.*

scabriflorum 22. M. caule diffuso, foliis alternis teretiusculis obtusis basi ciliatis papulosis, floribus axillaribus, petalis (albis) calyce brevioribus. *Italia. Aegypt.*

apetalum Ait. 23. M. foliis amplexicaulibus semiteretibus canaliculatis papulosis, floribus pedunculatis, petalis abortientibus setaceis. *C. B. S.* (M. copticum Jacq.)

caducum Ait. 24. M. foliis filiformibus semiteretibus distinctis papulosis, papulis ovatis, floribus sessilibus, terminalibus basi foliatis. *C. B. S.*

pilosum Haw. 25. M. foliis lineari-teretiusculis ciliatis, ramis calycibusque hirtis, floribus polygynis. *C. B. S.*

** *Perennia.*

† *Acaulia.*

α. *Sphaeroidea, foliis connatis obtusissimis in globum connatis: petalis basi in tubum coalitis.*

minutum Haw. 26. M. laeve glaucum subemaculatum, floribus rubris. *C. B. S.*

minimum Haw. 27. M. laeve glaucescens maculosum, floribus albidis, germine exserto. *C. B. S.*

obcordellum Haw. 28. M. glaucescens, maculis confluentibus ramosis, floribus albicantibus, germine incluso. *C. B. S.*

obconellum Haw. 29. M. virescens, maculis confluentibus subtuberculiformibus, floribus albis, germine incluso. *C. B. S.*

truncatellum Haw. 30. M. subglaucum depressum, maculis punctiformibus subdistinctis, floribus stramineis, germine exserto. *C. B. S.*

fibuliforme Haw. 31. M. subcanescens pubescens emaculatum depressum. *C. B. S.*

nuciforme Haw. 32. M. glaucum emaculatum, apicibus foliorum subdistinctis. *C. B. S.*

β. *Thelephora, foliis subclavatis subdistinctis.*

pisiforme Haw. 33. M. foliis primis connato-pisiformibus, sequentibus semiteretibus pellucido-papulosis, caulículo ramosissimo humillimo. *C. B. S.*

truncatum Thb. 34. M. foliis sphaerico-obconicis umbilicato-truncatis proliferis, pedunculo solitario 1floro. *C. B. S.*

subglobosum Haw. 35. M. foliis subconnatis subglobosis papulosis caespitosis, ramulis filiformibus, floribus pedunculatis. *C. B. S.* (M. capillare Thb.)

digitiforme Thunb. 36. M. foliis teretibus obtusis distinctis laevissimis, floribus sessilibus. *Afric. austr.* (M. digitatum Ait.)

γ. Stavrophora, foliis semiteretibus decussatis.

moniliforme Thunb. 37. M. foliis primis connato-sphaeroideis, sequentibus decussatis semiteretibus subulatis elongatis recurvatis, floribus pedunculatis. *Afric. austr.*

testiculare Ait. 38. M. foliis quaternis subovatis supra planis subtus convexis, floribus sessilibus. *Africa austr.*

fissum Haw. 39. M. foliis quaternis aequalibus semiteretibus obtusissimis glaucis. *Afric. austr.*

obtusum Haw. 40. M. foliis quaternis inaequalibus semitereti-acinaciformibus obtusis. *Afric. austr.*

compactum Ait. 41. M. foliis connatis punctatis semiteretibus, apice triquetro subreflexo acuto, floribus sessilibus, calyce subcylindrico 6fido. *C. B. S.*

δ. Gibboso-difformia, folio altero abbreviato.

gibbosum Haw. 42. M. foliis ovatis semicylindricis apice subcarinatis patentibus viridibus. *C. B. S.*

luteo-viride Haw. 43. M. foliis oblongis semicylindricis apice triquetris luteo-viridibus, calycibus 6fidis. *C. B. S.*

perviride Haw. 44. M. foliis subovatis crassis semicylindrico-triquetris viridissimis. *C. B. S.*

pubescens Haw. 45. M. foliis semicylindricis incano-pubescentibus apice obliquis. *C. B. S.*

ε. Glossoidea, foliis distichis complanatis apice oblique incrassatis.

linguaeforme 46. M. foliis linguaeformibus altero margine incrassatis, floribus sessilibus, calycibus laevibus, petalis emarginatis. *C. B. S.* (M. scalpratum Haw.)

fragrans Salm. 47. M. foliis linguaeformibus obliquis turgidis apice crasse uncinatis, floribus sessilibus. *C. B. S.*

cultratum Salm. 48. M. foliis linguae-ensiformibus lucidis apice oblique obtusis submucronatis. *C. B. S.* (M. lucidum Haw.)

obliquum W. 49. M. foliis linguaeformibus apice oblique acutis, floribus pedunculatis, calycis carina ciliata, petalis acutis. *C. B. S.*

longum Haw. 50. M. foliis linguaeformibus elongatis apice oblique acutis, pedunculis elongatis, calycis carina glabra, petalis acutis. *C. B. S.*

praepingue Haw. 51. M. foliis linguaeformibus, junioribus ciliato-pubescentibus, flore subsessili, carina calycis ciliata, petalis emarginatis. *C. B. S.*

depressum Haw. 52. M. foliis linguaeformibus obtusis humo arcte appressis glaucescentibus. *C. B. S.*

angustum Haw. 53. M. foliis lineari-linguaeformibus semicylindricis longissimis. *C. B. S.*

ascendens Haw. 54. M. foliis late linguaeformibus obtusissimis subtruncatis ascendentibus viridibus, floribus pedunculatis. *Afr. austr.*

rufescens Haw. 55. M. foliis linguaeformibus obtusis arctissime imbricatis reclinatis rufescentibus apice incurvis, floribus sessilibus, petalis latissimis. *Afr. austr.*

Salmii Haw. 56. M. foliis lineari-linguaeformibus semiteretibus altero apice crassioribus apice oblique dentatis. *C. B. S.*

medium Haw. 57. M. foliis latissimis linguaeformibus reclinatis, pedunculis elongatis. *Afric. austr.* Burchell.

latum Haw. 58. M. foliis late linguaeformibus obtusissimis, humo appressis viridissimis, floribus subsessilibus. *Afr. austr.*

pustulatum Haw. 59. M. foliis linguaeformibus ascendentibus basi pustulatis. *Afric. austr.* Burchell.

ζ. *Ringentia: foliis decussatis subtriquetris apice incrassatis margine dentatis, ciliatis.*

murinum Haw. 60. M. foliis basi semicylindricis attenuatis apice triquetris denticulatis asperis glaucis, floribus sessilibus. *Afric. austr.*

mustelinum Salm. 61. M. foliis patentissimis triquetris supra planis lucidis punctatis ciliato-dentatis apice incrassatis. *Afric. austr.* (M. magnipunctatum Haw.)

felinum Lam. 62. M. foliis oblongis subtus convexis punctatis glaucis apice integerrimis margine ciliato-spinulosis. *Afric. austr.*

tigrinum Haw. 63. M. foliis oblongis subtus convexis glaucescentibus maculatis margine longissime ciliatis. *Afric. austr.*

caninum Haw. 64. M. foliis oblongis apice dilatatis triquetris epunctatis, angulis binis obtuse dentatis, floribus longe pedunculatis. *Afric. austr.*

vulpinum Haw. 65. M. subcaulescens, foliis elongatis glaucescentibus triquetris, angulis obsolete denticulatis, floribus longe pedunculatis. *Afric. austr.*

η. *Rostrata, foliis semiteretibus s. subtriquetris, apice mucronatis vel rostratis.*

albidum 66. M. foliis triquetro-ensiformibus integerrimis albidis obtusis mucronatis, pedunculo diphyllo elongato. *Afric. austr.*

canum Haw. 67. M. foliis triquetris compressis canescentibus basi attenuatis apice gibboso-carinatis mucronatis. *Afric. austr.*

aloides Haw. 68. M. foliis patentissimis rigidis semiteretibus acutis apice triquetris calloso-punctatis. *Afr. austr.* Burchell.

denticulatum Haw. 69. M. foliis triquetris compressis glaucis apice dilatato-carinatis subdenticulatis rostratis. *C. B. S.*

bellidiflorum 70. M. foliis triquetris viridibus apice dilatatis trifariam denticulatis mucronatis. *C. B. S.*

subulatum Haw. 71. M. foliis triquetris subulatis dorso superne serratis, pedunculis elongatis. *C. B. S.* (M. bellidiflorum Cand.)

subrostratum W. 72. M. foliis semicylindricis connatis apice 3gonis acutiusculis interne tenuissime tuberculosis. *C. B. S.* (M. rostratoides et acutum Haw.)

roſtratum 73. M. foliis ſemicylindricis elongatis acutis glaucis apice 3gonis externe tuberculatis, bracteis pedunculum ſuperantibus. *C. B. S.*

bibracteatum Haw. 74. M. ſubacaule ramoſum, foliis ſemiteretibus elongatis ſubulatis punctatis glaucis, bracteis quaternis pedunculo brevioribus. *C. B. S.*

bifidum Haw. 75. M. ſubacaule, foliis tereti-ſubulatis glaucis punctatis, calyce 2-4fido. *C. B. S.*

quadrifidum Haw. 76. M. ſubacaule, foliis teretibus obtuſis glaucis obſolete punctatis, calyce 4fido. *C. B. S.*

robuſtum Haw. 77. M. ſubacaule, foliis teretibus obtuſis punctatis baſi interiore gibboſo-puſtulatis. *C. B. S.*

† *diminutum* Haw. 78. M. ſubacaule, foliis lineari-ſubtriquetris ſubulatis. *C. B. S.* (M. caulículatum Haw.)

3. Calamiformia: foliis teretibus.

calamiforme 79. M. foliis teretibus glaucis punctatis ſurſum curvatis apice mucronatis laeviſſimis baſi ſupra planis. *C. B. S.*

obſubulatum Haw. 80. M. foliis ſubclavatis teretibus obtuſis punctatis viridibus. *C. B. S.*

teretiusculum Haw. 81. M. foliis ſubtrigono-teretibus craſſis elongatis viridibus punctatis. *C. B. S.* (M. punctatum et teretifolium Haw.)

cylindricum Haw. 82. M. foliis trigono-teretibus elongatis glaucis punctatis, pedunculo terminali ſolitario. *C. B. S.*

†† *Cauleſcentia ſ. ſuffruticoſa.*

α. Difformia: forma foliorum definitu difficilis.

difforme 83. M. foliis ſubtriquetro-ſemiteretibus ſubdentatis punctatis, altero minori. *C. B. S.*

ſemicylindricum Haw. 84. M. foliis ſemiteretibus apice dilatatis medio utrinque 1dentatis, caule aſcendente ramoſo. *C. B. S.* (M. bidentatum Haw.)

heterophyllum Haw. 85. M. foliis viridibus epunctatis, inferioribus triquetris compreſſis apice gibboſis mucronatis, ſuperioribus ſemiteretibus ſubdentatis, altero minori. *C. B. S.*

taurinum Haw. 86. M. foliis 2fariis oblique cruciatis ſemiteretibus craſſis obtuſis incurvatis luteſcenti-viridibus, calyce 2fido ſcarioſo. *Afric. auſtr.*

cruciatum Haw. 87. M. foliis lineari-linguaeformibus ſemicylindricis molliſſimis cruciatis. *C. B. S.*

dolabriforme 88. M. foliis glauceſcentibus punctatis baſi teretiompreſſis apice dilatatis breviter acinaciformibus. *C. B. S.*

β. Planifolia.

cordifolium 89. M. foliis petiolatis cordato-ovatis papuloſo-punctatis, floribus axillaribus ſubſeſſilibus rubris. *Afr. auſtr.*

pallens Ait. 90. M. foliis faſciculatis amplexicaulibus oblongo-lanceolatis acutis carinatis papuloſis, floribus axil-

laribus pedunculatis albis. *C. B. S.* (M. expanſum Cand.)

relaxatum W. 91. M. foliis lineari-lanceolatis ſubconnatis, junioribus ſemiteretibus, laciniis calycis duabus latioribus, petalis rubris. *Afr. auſtr.*

tortuoſum 92. M. caule divaricato laxo procumbente, foliis confertis ovato-lanceolatis connatis ſubpapuloſis, floribus argenteis, calycibus 3ſepalis 2cornibus. *Afric. auſtr.*

varians Haw. 93. M. foliis lanceolatis acuminatis carinatis ſubtrigonis, pedunculis craſſiſſimis. *Afr. auſtr.*

anatomicum Haw. 94. M. foliis elliptico-lanceolatis pellucido-papuloſis, caule filiformi, petalis ſtaminibusque argenteis. *C. B. S.*

expanſum 95. M. caule divaricato laxo decumbente, foliis remotis ovato-lanceolatis diſtinctis, floribus flavis, calycibus inaequaliter 5partitis. *Afric. auſtr.* (M. tortuoſum Cand.)

protractum Link. 96. M. caule erectiusculo pedunculisque hirſutis, foliis lanceolatis acuminatis diſtinctis laevibus ciliatis, floribus flavis. *Afric. auſtr.*

humifuſum Ait. 97. M. caule proſtrato, foliis amplexicaulibus ſpathulatis carinatis, papulis conicis ſcabris, petalis minutiſſimis albis. *C. B. S.*

emarcidum Thunb. 98. M. caule erectiusculo glabro, foliis connatis ovatis acutis, floribus pedunculatis ſubternis albis. *Afric. auſtr.*

articulatum Thunb. 99. M. caule erecto ramoſiſſimo, ramis aſperis ſecundis, foliis connatis lineari-lanceolatis ſubtus convexis, floribus ſeſſilibus. *Afric. auſtr.*

micranthon Haw. 100. M. foliis lineari-lanceolatis diſtinctis carinatis epunctatis, floribus pedunculatis, laciniis calycis duabus longiſſimis. *Afr. auſtr.* (M. parviflorum Jacqu.)

γ. Hemiſtrongyla; *foliis ſemiteretibus.*

juncum Haw. 101. M. ramis virgatis ſubdichotomis, foliis remotis ſemiteretibus ſubulatis, calycibus inaequaliter 4fidis. *Afric. auſtr.*

canaliculatum Haw. 102. M. caule repente ſuffruticoſo, ramis laxis decumbentibus, foliis ſemiteretibus canaliculatis obtuſis patentibus elongatis papuloſis. *Afric. auſtr.* (M. repens Salm.)

faſtigiatum Haw. 103. M. foliis confertis ſemiteretibus ſubulatis flexuoſo-reflexis glaucis, caule gracili declinato, laciniis calycis aequalibus. *Afric. auſtr.*

Haworthii W. 104. M. foliis ſemiteretibus acutiusculis punctatis glauceſcentibus connatis, pedunculo incraſſato terminali, petalis emarginatis rubris. *Afr. auſtr.*

elegans Jacqu. 105. M. foliis confertis 3gono-ſemiteretibus obtuſis glaucis aſperis, floribus pedunculatis roſeis. *C. B. S.*

puniceum Jacqu. 106. M. foliis ſemiteretibus punctatis diſtinctis glabris internodio brevioribus, floribus longe pedunculatis. *C. B. S.*

tenuifolium 107. M. foliis semiteretibus subcompressis subulatis viridibus glabris internodio longioribus, caule procumbente, floribus longe pedunculatis coccineis. *Afric. austr.*

longistylum Cand. 108. M. foliis semiteretibus obtusiusculis patentibus glabris internodia aequantibus, caule erecto suffruticoso, floribus terminalibus albis, stylis elongatis. *Afric. austr.* (M. pallens Jacqu.)

filicaule Haw. 109. M. foliis confertissimis semiteretibus acuminatis, floribus rubellis, caule filiformi reptante. *Africa austr.*

curvifolium Haw 110. M. foliis semiteretibus compressis subulatis incurvo-recurvis, ramulis decumbentibus asperis angulato-compressis, floribus puniceis. *Afric. austr.* (M. ceratophyllum W.)

flexifolium Haw. 111. M. foliis semitereti-sub3gonis subulatis incurvo-recurvis flexuosis viridibus, ramis effusis filiformibus compressis. *Afric. austr.*

testaceum Haw. 112. M. foliis semiteretibus papuloso-micantibus, caule suffruticoso, floribus testaceis. *Afric. austr.* Burchell.

violaceum Cand. 113. M. foliis semiteretibus acutis subreflexis glaucis scabris, ramis deflexis, floribus terminalibus longe pedunculatis violaceis. *Afric. austr.* (M. deflexum Haw.)

inflexum Haw. 114. M. foliis semiteretibus sub-3gonis compressiusculis glaucescentibus laevibus falcato-inflexis confertis. *Afric. austr.*

flexuosum Haw. 115. M. foliis semiteretibus viridibus flexuoso-recurvis, ramis gracilibus lucidis, laciniis calycis digitiformibus. *C. B. S.*

splendens 116. M. foliis semiteretibus confertis flexuoso-recurvis, caule radicante, laciniis calycis digitiformibus. *C. B. S.*

reflexum Haw. 117. M. foliis semiteretibus obtusis glaucis flexuoso-reflexis, laciniis calycinis inaequalibus. *C. B. S.*

ciliatum Ait. 118. M. foliis semiteretibus connatis, stipulis membranaceis reflexis laceris ciliaceis. *C. B. S.*

noctiflorum 119. M. foliis semiteretibus glaucis epunctatis remotis obtusis, floribus terminalibus subternis, calycibus clavatis. *C. B. S.* (M. stramineum et horizontale Haw.)

geniculiflorum 120. M. foliis semiteretibus obtusis papulosis remotis, ramis divaricatis, floribus sessilibus axillaribus. *C. B. S.*

villosum 121. M. foliis semiteretibus canaliculatis pubescentibus, caule prostrato piloso. *Afric. austr.*

nitidum Haw. 122. M. foliis semiteretibus papulosis, ramis gracilibus diffusis, pedunculis dichotomis. *C. B. S.* (M. pruinosum Thunb.)

spinuliferum Haw. 123. M. foliis semiteretibus confertis canaliculatis, emarcidis spinescentibus, ramis erectis incrassatis. *C. B. S.* (M. sordidum Cand.)

anomalum W. 124. M. foliis semiteretibus connatis pellucido-punctatis submucronatis, floribus umbellatis apetalis, calycibus membranaceis. *C. B. S.*

δ. Macrophylla, foliis confertis elongatis, floribus subluteis.

loreum 125. M. foliis confertis 3gono-semiteretibus elongatis glaucis glaberrimis basi interiore gibbis connatis, caule pendulo. *C. B. S.*

corniculatum 126. M. foliis subconfertis 3gono-semiteretibus elongatis glaucis punctato-scabris linea elevata basilari connatis, caule angulato nodoso. *C. B. S.*

diversifolium Haw. 127. M. foliis confertis 3gono-semiteretibus longissimis subrecurvis viridibus, caule angulato robusto. *C. B. S.*

dubium Haw. 128. M. foliis subconfertis longiusculis 3gono-semiteretibus ascendentibus viridibus, caule teretiusculo. *C. B. S.*

elongatum Haw. 129. M. radice tuberosa, caule decumbente, foliis confertis 3gono-semiteretibus elongatis flexuosis glabris, floribus pedunculatis, petalis flavis elongatis acuminatis, stylis numerosis. *C. B. S.*

capitatum Haw. 130. M. foliis triquetris elongatis glaucis terminalibus confertis, ramis procumbentibus, laciniis calycis petala superantibus. *C. B. S.*

pugioniforme 131. M. foliis 3gonis elongatis glaucis alternis confertis, ramis procumbentibus, caule subbienni, laciniis calycis petala superantibus. *C. B. S.*

brevicaule Haw. 132. M. foliis triquetris strictis viridibus laevissimis patulis, caule humili. *Afric. austr.* Burchell.

ε. Strongylodea: erecta, foliis teretibus,

αα. foliis glabris.

patens W. 133. M. foliis teretiusculis acutis connatis punctatis, ramis patentibus, floribus solitariiis terminalibus albis. *C. B. S.*

foliosum Haw. 134. M. foliis confertis connatis teretiusculis obtusis recurvo-mucronulatis laevibus glaucescentibus, vaginis apice incrassatis, floribus axillaribus pedunculatis. *C. B. S.* (M. tumidulum Haw.)

tetragonum Thunb. 135. M. foliis teretibus connatis obtusissimis inflexis, caule 4gono, floribus terminalibus pedunculatis luteis. *Africa austr.*

decussatum Thunb. 136. M. foliis teretiusculis connatis obtusis, ramis fastigiatis trichotomis, floribus pedunculatis albis. *Afric. austr.*

maculatum Haw. 137. M. foliis teretiusculis compressis obtusis remotis, caule erecto maculato. *Afric. austr.*

spinosum 138. M. foliis teretiusculis distinctis punctatis, ramis 3acanthis, floribus rubris. *C. B. S.*

fasciculatum Thunb. 139. M. foliis teretiusculis connatis obtusis, caule articulato radicante, floribus terminalibus pedunculatis albis. *C. B. S.*

corallinum Thunb. 140. M. foliis teretibus distinctis obtusis incurvis, caule ramosissimo, floribus terminalibus sessilibus albis. *Afric. austr.*

cornutum Salm. 141. M. foliis teretibuus mucronatis connatis incurvis glaberrimis viridibus, ramis deflexis. *C. B. S.*

ſtramineum W. 142. M. foliis teretibus obtuſis elongatis punctatis viridibus, caule procumbente angulato, floribus tricoloribus polygynis. *Afric. auſtr.* (M. tricolor Haw.)

laeve Ait. 143. M. foliis confertis teretibus obtuſis arcuatis glaucis, laciniis calycis oblongis obtuſis. *C. B. S.*

purpureo-croceum Haw. 144. M. foliis confertis teretiusculis obtuſis glaucis, laciniis calycis inaequalibus. *C. B. S.*

verruculatum 145. M. foliis faſciculatis teretiusculis acutis glaucis incurvis, floribus corymboſis flavis. *C. B. S.*

clavatum Jacqu. 146. M. foliis teretiusculis diſtinctis, pedunculis terminalibus aggregatis clavatis, floribus albis. *C. B. S.*

ββ. Foliis ſcabris, papuloſis, hiſpidis.

umbellatum 147. M. foliis teretiusculis acutis glaucis, connatis ſcabro-punctatis recurvis, vaginis apice tumidis, floribus umbellatis albis. *C. B. S.*

umbelliflorum Jacqu. 148. M. foliis teretiusculis papuloſis diſtinctis, ramulis unifloris, floribus incarnatis. *C. B. S.*

pulverulentum Haw. 149. M. foliis teretiusculis obtuſis pulverulento-ſcabris, calyce 6fido, floribus rubris. *C. B. S.*

tenuiflorum Jacqu. 150. M. foliis teretiusculis obtuſis canaliculatis pellucido-papuloſis, ramis diffuſis flaccidis, floribus rubris. *C. B. S.*

viridiflorum Ait. 151. M. foliis teretiusculis papuloſo-piloſis, pedunculis lateralibus 1floris calycibusque hirſutis, floribus virentibus. *C. B. S.*

groſſum Ait. 152. M. foliis teretiusculis confertis papuloſis utrinque ſulcatis, ramis diffuſis, floribus luteis, caule baſi incraſſato. *C. B. S.*

incomtum Haw. 153. M. foliis teretiusculis confertiſſimis papuloſis viridibus, floribus terminalibus ſubumbellatis albis. *Afric. auſtr.* Burchell.

micans 154. M. foliis teretiusculis obtuſiusculis ſubrecurvis papuloſis, ramis aſperis, floribus croceis, filamentis nigris. *Afric. auſtr.*

ſpecioſum Haw. 155. M. foliis teretiusculis ſubulatis incurvis papuloſis, calycibus obtuſis, floribus ſaturrime coccineis. *C. B. S.*

breviſolium Ait. 156. M. foliis teretibus obtuſiſſimis papuloſis patentibus, ramis effuſis, ſtaminibus expanſis purpuraſcentibus. *C. B. S.*

ramuloſum 157. M. foliis teretibus obtuſis punctatis baſi interiore puſtulato-gibboſis, ſenioribus expanſis, caule proſtrato ramoſo. *C. B. S.*

hiſpidum 158. M. foliis teretibus obtuſis calycibusque glabris obconicis papuloſis, ſtaminibus piſtilla ſuperantibus, ramis hiſpidis. *C. B. S.*

floribundum Haw. 159. M. foliis teretibus obtuſis papuloſis, calycibus hemiſphaericis papuloſo-piloſis, piſtillis ſtamina ſuperantibus, ramis hiſpidis. *C. B. S. Inſ. Canar.* (M. hiſpidum *β.* W.)

hirtellum Haw. 160. M. foliis teretibus obtuſiſſimis papuloſo-echinatis, calycibus turbinatis papuloſo-hirſutis, ſta-

minibus ſtylos aequantibus. *C. B. S.* (M. pilifolium et hiſpifolium Haw., tuberculatum Cand.)

ſtriatum Haw. 161. M. foliis teretibus obtuſis papuloſis ſubincurvis faſciculatis, calycibus lanatis, ſtaminibus ſtylos aequantibus. *C. B. S.* (M. hiſpidum γ. L.)

brachiatum Haw. 162. M. foliis teretiusculis acutis erecto-patulis papuloſis, ramis ſtrictis trichotomis, laciniis calycis binis foliaceis elongatis, floribus luteis. *Afric. auſtr.*

echinatum 163. M. foliis teretiusculis oblongo-ovatis papuloſis echinatis, laciniis calycis inaequalibus foliaceis. *C. B. S.*

γγ. Foliis apice barbatis.

barbatum 164. M. procumbens, ramis gracilibus nudis, foliis ſemierectis oblongis remotis papuloſis, barba apicis 5radiata, laciniis calycis inaequalibus. *Afric. auſtr.*

ſtelligerum Haw. 165. M. erectiusculum, ramis gracilibus nudis, foliis ſubhorizontalibus oblongis remotiusculis papuloſis, barba apicis 6radiata, laciniis calycis aequalibus. *C. B. S.*

denſum Haw. 166. M. ſubacaule, foliis denſiſſime caeſpitoſis ſemiteretibus papuloſis baſi ſubciliatis, barba apicis multiradiata, pedunculis calycibusque 6fidis hirſutiſſimis. *C. B. S.* (M. barbatum γ. W.)

hirſutum Haw. 167. M. ſubacaule, foliis caeſpitoſis canis ſemiteretibus papuloſo-ſcabris, barba apicis multiradiata, ramulis craſſis, pedunculis calycibusque ſub-6fidis hirſutis. *C. B. S.* (M. barbatum β. W.)

ζ. *Trigonoidea: foliis ſubtrigonis.*

ſtipulaceum 168. M. foliis ſub-3gonis acutis laevibus glaucis pellucido-punctatis incurvis baſi marginatis, floribus terminalibus ſolitariis rubris. *C. B. S.*

variabile Haw. 169. M. foliis 3gonis compreſſis glaucis, caule decumbente, floribus verſicoloribus flavis demum rubris. *C. B. S.*

inaequale Haw. 170. M. foliis 3gonis viridibus, ramis decumbentibus, pedunculis fructiferis compreſſo-clavatis, laciniis calycis inaequalibus. *C. B. S.*

bicolor 171. M. foliis 3gonis acutis viridibus, ramis erectis, pedunculis calycibusque ſubaequalibus ſcabris, floribus intus luteis. *C. B. S.*

coccineum Haw. 172. M. foliis 3gonis obtuſis glauceſcentibus, pedunculis baſi laevibus, floribus coccineis. *C. B. S.*

aureum Ait. 173. M. foliis 3gonis mucronatis glaucis punctatis, floribus croceis, ſtylis atropurpureis. *C. B. S.*

aurantium Haw. 174. M. foliis 3gono-compreſſis glaucis, bracteis ſemiteretibus, laciniis calycis oblongo-ovatis, floribus aurantiacis. *C. B. S.* (M. croceum Jacqu.?)

tuberoſum 175. M. foliis 3gono-compreſſis ſubpapuloſis patentiſſimis apice recurvis, radice ampla tuberoſa, floribus terminalibus congeſtis puniceis. *C. B. S.*

clavellatum Haw. 176. M. foliis clavato-trigonis obtusissimis mucronulatis viridibus, ramis decumbentibus, floribus puniceis. *Nov. Holl.*

molle Ait. 177. M. foliis 3gonis turgidis obtusis canescentibus, marginibus lineato-punctatis, ramis ancipitibus decumbentibus. *C. B. S.*

trichotomum Thunb. 178 M. foliis connatis 3gonis obtusis laevibus, ramis trichotomis, floribus sessilibus. *C. B. S.*

sessile Thunb. 179. M. foliis 3gono-globosis gibbis connatis, floribus terminalibus sessilibus rubris. *C. B. S.*

η. Oxygonia: foliis triquetris.

glaucum 180. M. foliis triquetris acutis compressis glaucis aspero-punctatis, laciniis calycis cordato-ovatis, floribus sulfureis. *C. B. S.*

scabrum 181. M. foliis triquetris viridibus asperis, angulo inferiori muricato, laciniis calycis ovato-acuminatis, floribus lilacinis. *C. B. S.*

retroflexum Haw. 182. M. foliis triquetris glaucis scabris, calycibus retroflexis, floribus rubicundis. *C. B. S.*

versicolor Haw. 183. M. foliis triquetris glaucis verrucoso-asperis, laciniis calycis apice sub-2dentatis, floribus subversicoloribus rubris. *C. B. S.*

emarginatum 184. M. foliis triquetris glaucis scabris, calycibus dorso spinosis, petalis lilacinis denticulatis. *Afric. austr.* (M. roseum W.)

Milleri W. 185. M. foliis triquetris connatis acutis punctatis, pedunculis clavatis, floribus violaceis. *C. B. S.*

imbricans Haw. 186. M. foliis subtriquetris compressis albidis glabris, terminalibus imbricatis. *C. B. S.*

polyanthes Haw. 187. M. foliis abbreviatis subtriquetris mucronatis glaucis scabris, ramis rectis dumosis, floribus paniculatis confertissimis lilacinis. *C. B. S.*

glomeratum 188. M. foliis triquetris compressis glaucis incurvis punctatis, ramulis filiformibus pedunculisque compressis erectis. *Afric. austr.*

compressum Haw. 189. M. foliis triquetris glaucescentibus asperis, pedunculis compressis bracteatis, floribus puniceis. *C. B. S.*

insiticium W. 190. M. foliis triquetris obtusis connatis glaucis epunctatis, pedunculis compressis nudis, calycibus 2cornibus, floribus intus croceis. *C. B. S.*

pulchellum W. 191. M. foliis triquetris connatis pellucido-punctatis mucronatis, carina sub apice ciliata, caule ancipiti decumbente, floribus lilacinis. *C. B. S.*

microphyllum Haw. 192. M. foliis triquetris acuminato-cuspidatis punctatis viridibus basi intus pustulatis, ramulis confertissimis, floribus rubellis. *C. B. S.*

mucronatum Haw. 193. M. foliis triquetris mucronato-aristatis glaucescentibus, ramis confertis. *C. B. S.*

† *graniforme* Haw. 194. M. foliis subtriquetris ovatis graniformibus distinctis, floribus luteis. *C. B. S.* (Bradley succ. 2. t. 20.)

australe Ait. 195. M. foliis triquetris laevibus glaucis punctulatis, caule reptante semitereti, pedunculis ancipitibus,

floribus rubris. *Nov. Zeeland.* (M. demiſſum W. ſuppl.)

chinenſe Molin. 196. M. foliis triquetris ſemiamplexicaulibus, caule procumbente, floribus purpureis. *Chili.*

ſarmentoſum Haw. 197. M. ſarmentis radicantibus, foliis confertis triquetris punctatis glaberrimis, pedunculis ternatis 2bracteatis clavatis, floribus rubris. *Nov. Holl.*

recurvum Haw. 198. M. foliis triquetris recurvis glauceſcentibus punctatis, angulis ſerrulatis aſperis. *C. B. S.?*

laxum W. 199. M. foliis triquetris connatis tuberculato-punctatis margine carinaque tenuiſſime denticulatis, caule laxo diffuſo, ramis junioribus compreſſo-teretibus, adultioribus angulatis. *C. B. S.*

craſſifolium 200. M. foliis triquetris laevibus viridibus epunctatis baſi ſemiteretibus, floribus puniceis, caule humili reptante. *Afric. auſtr.*

reptans Ait. 201. M. foliis triquetris acutis glaucis pellucido-punctatis ſcabris, floribus rubris, caule filiformi reptante. *C. B. S.*

ſtrictum Haw. 202. M. foliis triquetris obtuſis expanſis glauceſcentibus groſſe punctatis, caule ſtricto lignoſo ramoſiſſimo. *C. B. S.*

blandum Haw. 203. M. foliis triquetris erectis glaucis apice fuſco-mucronatis, petalis carneis emarginatis. *Afric. auſtr.* Burchell.

cymbiforme Haw. 204. M. foliis triquetris cymbiformibus patentibus glaucis, ramis filiformibus erectis. *C. B. S.*

ſpectabile Haw. 205. M. foliis triquetris elongatis acutis glaucis laevibus, caule aſcendente, floribus coccineo-purpureis. *C. B. S.*

conſpicuum Haw. 206. M. foliis triquetris mucronatis glaberrimis viridibus, floribus paniculatis ruberrimis. *C. B. S.*

virgatum Haw. 207. M. foliis triquetro-compreſſis acutis glauceſcentibus remotis, ramis virgatis elongatis. *C. B. S.*

3. Oncinophylla: foliis ſubtriquetris apice aduncis.

bracteatum 208. M. foliis compreſſo-triquetris apice recurvo-aduncis viridibus aſperiusculis, bracteis quaternis carinatis calycem obvallantibus, ramis fuſcis ſcabris, floribus baſi albis. *C. B. S.*

radiatum Haw. 209. M. foliis compreſſo-triquetris apice recurvis glaucis aſperis, bracteis late ovatis pedunculos amplectentibus, ramis caneſcentibus, floribus rubris. *C. B. S.*

geminatum Haw. 210. M. foliis longe connatis triquetris glaucis laevibus margine cartilagineis apice aduncis, ramulis dichotomis. *Afric. auſtr.*

perfoliatum Haw. 211. M. foliis longe connatis triquetris glaucis cuſpidatis apice ſubtus 3acanthis, floribus purpureis. *C. B. S.* (M. uncinatum *β.* W.)

uncinatum Haw. 212. M. foliis longe connatis triquetris glaucis recurvo-mucronatis ſubtus ſubdiacanthis. *C. B. S.* (M. uncinatum *α.* W.)

viride Haw. 213. M. foliis longe connatis triquetris laevibus viridibus apice recurvo-uncinatis. *C. B. S.* (M. ſubaduncum Haw.)

ſemidentatum Salm. 214. M. foliis longe connatis triquetris glaucis punctatis, angulo inferiori recurvo-dentato. *C. B. S.*

multiflorum Haw. 215. M. foliis triquetris connatis glaucis laevibus punctatis remotis apice aduncis, calycibus cylindricis baſi attenuatis. *C. B. S.*

imbricatum Haw. 216. M. foliis triquetris connatis glaucis laevibus punctatis remotis apice aduncis, calycibus turbinatis. *C. B. S.*

vaginatum Haw. 217. M. foliis triquetris connatis viridibus glabris patentibus, angulis ſuperne aſperis, caule decumbente. *C. B. S.*

rigidum Haw. 218. M. foliis triquetris connatis glaucis horizontalibus glabris, angulis ſuperne ſcabris, ramis rigidiſſimis patentibus, floribus paniculatis. *C. B. S.*

parviflorum Haw. 219. M. foliis triquetris connatis glaucis glaberrimis erectis, ramis erectiusculis, floribus paniculatis. *C. B. S.*

tenellum Haw. 220. M. foliis triquetris tenuibus connatis glaucis ſcabris, ramis filiformibus, floribus paniculatis. *C. B. S.*

aduncum Haw. 221. M foliis ſemiteretibus acuminatis apice recurvis, ramulis erectis confertiſſimis. *C. B. S.*

ſpiniforme Haw. 222. M. ramulis foliisque teretibus ſubulatis ſpiniformibus erectis, apicibus recurvis, pedunculis carinisque bractearum ſcabriusculis. *C. B. S.*

t. Acinacophylla: foliis acinaciformibus.

anceps Haw. 223. M. foliis triquetro-acinaciformibus pellucido-punctatis, lateribus inferne ſubmembranaceis, ramis decumbentibus ancipitibus bruneo-caneſcentibus. *C. B. S.*

ſtellatum Haw. 224. M. foliis triquetro-acinaciformibus glauceſcentibus gracilibus ſcabriusculis, ramis ſtrictiſſimis, bracteis ovatis acutis calycem ſubamplectentibus, floribus rubris. *C. B. S.*

includens Haw. 225. M. foliis acinaciformibus triquetris, carina ſerrata, calycibus ſcabris punctatis. *C. B. S.*

acinaciforme 226. M. foliis acinaciformibus epunctatis connatis, marginibus ſubundulatis ſcabris, petalis linearilanceolatis. *C. B. S.* (M. ſubalatum et laevigatum Haw. varr.)

edule 227. M. foliis acinaciformibus ſubaequilateris epunctatis canaliculatis, carina ſerrulata, ramulis ancipitibus. *C. B. S.*

glauceſcens Haw. 228. M. foliis ſubacinaciformibus mucronatis connatis glaberrimis glauceſcentibus, floribus ſeſſilibus ſolitariis. *Afric. auſtr.*

vireſcens Haw. 229. M. foliis ſubacinaciformibus virentibus laevibus, caule proſtrato, pedunculis ſolitariis alatis. *C. B. S.* (M. laevigatum Haw.?)

aequilaterum Haw. 230. M. foliis ſubacinaciformibus laevibus, marginibus cartilagineis integerrimis, caule debili proſtrato, floribus rubris. *C. B. S.*

filamentoſum 231. M. foliis ſubacinaciformibus punctatis confertis margine cartilagineis ſerrulatis, caule proſtrato reptante angulato. *C. B. S.*

forficatum 232. M. foliis acinaciformibus apice ſpinuloſis epunctatis, caule ancipiti, floribus rubris. *C. B. S.*

ferratum 233. M. foliis ſubacinaciformibus erectis cuſpidatis punctatis, carina retrorſum ſerrata, pedunculis ſolitariis clavatis, laciniis calycis rigidis. *C. B. S.*

rubricaule Haw. 234. M. foliis ſubacinaciformibus marginibus ſerrulatis, ramis coloratis aſperis. *C. B. S.* (M. ſerrulatum et dimidiatum Haw.)

lacerum Haw. 235. M. foliis acinaciformibus connatis carina cartilagineo-dentatis, calycibus 5cornibus. *C. B. S.*

heteropetalon W. 236. M. foliis acinaciformibus ſubfalcatis glaucis confertis, angulis cartilagineis, carina lacera, petalis inaequalibus calyce magno brevioribus. *C. B. S.*

dilatatum Haw. 237. M. foliis acinaciformibus glaucis flexuoſo-recurvis, angulo carinali extra medium ſubdilatato. *C. B. S.* (M. marginatum Haw. ?)

mutabile Haw. 238. M. foliis acinaciformibus diſtinctis punctatis carina cartilagineis integerrimis, ramulis ancipitibus, petalis ſubulatis. *C. B. S.*

incurvum Haw. 239. M. foliis ſubacinaciformibus glaucis utrinque attenuatis, ramulis teretibus gracilibus effuſis. *Afric. auſtr.* (M. confertum Haw. ?)

κ. Drepanophylla: foliis falcatis.

falciforme Haw. 240. M. foliis acinaciformi-falcatis glaucis punctatis craſſis, floribus terminalibus pedunculatis faſtigiatis. *C. B. S.*

decumbens Haw. 241. M. foliis falcatis ſubacinaciformibus glaucis baſi attenuatis punctatis, ramis teretibus, floribus paniculatis. *Afric. auſtr.*

falcatum 242. M. foliis ſubfalcatis minutis glaucis faſciculatis, ramulis numeroſis filiformibus. *C. B. S.*

lunatum W. 243. M. foliis acinaciformi-ſemilunatis ſubconnatis epunctatis confertis ſubpapuloſis, floribus rubris. *C. B. S.*

maximum Haw. 244. M. foliis acinaciformibus ſemilunatis obtuſis ſubconnatis pellucido-punctatis, caule erecto, floribus rubris. *C. B. S.*

λ. Deltoidea: foliis deltoideis.

deltoides Haw. 245. M. foliis deltoideis confertis glaucis, lateribus carinaque dentatis, carina bractearum calycisque laciniis integerrimis. *C. B. S.* (M. deltoides β. W.)

muricatum Haw. 246. M. foliis deltoideis confertiſſimis, lateribus, carina foliorum calycibusque denticulatis. *C. B. S.* (M. deltoides α. W.)

cauleſcens Haw. 247. M. foliis deltoideis confertis glaucis, lateribus denticulatis, carina integerrima. *C. B. S.* (M. deltoides γ. W.)

1859. TETRAGONIA.

**Fruticosae.*

fruticosa 1. T. caule erecto, foliis lineari-lanceolatis integerrimis, floribus racemosis, fructibus obtuse angulatis. *C. B. S.*

Tetrapteris Haw. 2. T. caule procumbente, foliis lanceolatis subdecurrentibus, fructibus 4alatis. *C. B. S.*

decumbens Mill. 3. T. caule decumbente foliisque obovatis pruinosis, fructibus alatis. *C. B. S.*

***Herbaceae.*

hirsuta 4. T. caule procumbente foliisque ovato-oblongis carnosis subvillosis, floribus axillaribus ternis pedunculatis, fructibus angulato-alatis. *C. B. S.* (T. villosa Poir.)

herbacea 5. T. caule decumbente foliisque spathulato-oblongis glabris, pedunculis axillaribus ternis, radice tuberosa crassa. *C. B. S.*

spicata 6. T. caule erecto, foliis inferioribus ovatis superioribus lanceolatis glabris, racemo spicato terminali. *C. B. S.*

echinata Ait. 7. T. caule diffuso foliisque rhombeo-ovatis papulosis, pedunculis axillaribus solitariis, fructibus echinatis. *C. B. S.*

crystallina Herit. 8. T. caule diffuso foliisque ovatis sessilibus papulosis, fructibus axillaribus inermibus. *Peru.*

expansa Ait. 9. T. caule diffuso, foliis ovato-rhombeis papulosis, fructibus axillaribus subsessilibus 4cornibus. *Nov. Zeeland. Insul. Amicorum. Japonia.* (T. halimifolia Forst., japonica Thunb.)

DECA-POLYGYNIA.

1860. DALIBARDA L. Mx.

repens L. Poir. 1. D. stolonibus reptantibus foliisque simplicibus cordatis crenatis villosis, pedunculis unifloris. *Amer. bor.* (D. violaeoides Mx., Rubus Dalibardae L. W.)

geoides Pers. 2. D. foliis simplicibus ternatisque obtusis serratis glabris, impari maximo cordato, pedunculis solitariis abbreviatis. *Ad fretum Magellan.* (Rubus geoides Sm.)

fragarioides Mx. 3. D. foliis ternatis, foliolis cuneatis inciso-serratis ciliatis, pedunculis multifloris, calycis tubo obconico. *Amer. bor. Insul. Aleut.* (Dryas trifoliata Pall.)

pedata Steph. 4. D. foliis quinato-pedatis incisis, pedunculis filiformibus medio bracteatis, caule repente. *Ora occid. Amer. bor.* (Rubus pedatus Sm.)

1761. DRYAS.

octopetala 1. Dr. foliis cordato-oblongis inciso-crenatis rugosis subtus niveo-tomentosis, pedunculis unifloris. *Alp. Europ. med. Regio arctica Europ., Asiae et Amer.*

†*integrifolia* Horn. 2. Dr. foliis cordato-oblongis integerrimis subtus niveo-tomentosis, pedunculis 1floris. *Grönland. Island. Amer. bor.* (Dr. tenella Pursh.) Ex Inf. Aleutis collegit Chamisso Dryada intermediam utriusque speciei.

1862. RUBUS.

* *Fruticosi.*

† *Aculeati.*

a. Foliis pinnatis.

pinnatus W. 1. R. foliis pinnatis 2jugis rugoso-venosis duplicato-serratis utrinque glabris, nervo medio aculeato, ramis villosis, aculeis recurvis, pedunculis racemosis calycibusque villosis. *C. B. S. Inf. Helenae.*

rosaefolius Sm. 2. R. foliis pinnatis 3jugis subtus ramisque villosis, foliolis ovato-lanceolatis acutis duplicato-serratis, aculeis ramorum sparsis recurvis, pedunculis axillaribus solitariis. *Inf. Mascaren.*

apetalus Poir. 3. R. foliis pinnatis 3jugis subtus albido-tomentosis, foliolis ovato-oblongis argute serratis, ramis sarmentosis petiolisque aculeatis, racemis axillaribus pubescentibus, floribus apetalis. *Inf. Mascaren.* (R. tomentosus Bory. borbonicus Pers.)

Commersonii Poir. 4. R. foliis pinnatis 3jugis utrinque glabris, foliolis lanceolatis serratis, impari sub-3fido, aculeis ramorum rectis, pedunculis subsolitariis, calycibus acutis. *Java.*

lasiocarpus Sm. 5. R. foliis pinnatis 3jugis subtus niveo-tomentosis, foliolis ovatis acuminatis inciso-serratis, aculeis ramorum confertis recurvis, racemo paucifloro, fructibus dense lanatis. *Ind. or.* (R. mysorensis Roth.)

rigidus Sm. 6. R. foliis pinnatis supra glabris subtus villosis, paniculа terminali, ramis villosissimis aculeatis. *C. B. S.*

*bifloru*s Buchan. 7. R. foliis pinnatis sub-2jugis subtus niveo-tomentosis, foliolis laciniatis, impari maximo trilobo, aculeis ramorum sparsis rectis, pedunculis geminatis terminalibus 1floris. *Nepal.*

sanguinolentus Link. 8. R. foliis pinnatis bijugis glabris maculatis, foliolis lanceolatis acuminatis serrulatis, aculeis ramorum strigosorum confertis, pedunculis axillaribus paucifloris. *Inf. Mascaren.*

fraxinifolius Poir. 9. R. foliis pinnatis 3jugis utrinque laevibus, foliolis ovatis acuminatis inciso-serratis, ramis glabris teretibus, aculeis raris, paniculae ramis filiformibus. *Java.*

parvifolius 10. R. foliis inferioribus pinnatis ſuperioribus ternatis ſubtus tomentoſis, foliolis obovatis inciſo-lobatis, ramis teretibus pubeſcentibus, aculeis ſparſis recurvis, corymbo terminali, calyce patulo, petalis erectis ſpathulatis. *China. Japon.* (R. Sphyllus Thunb.)

idaeus 11. R. foliis inferioribus pinnatis ſuperioribus ternatis ſupra glabris ſubtus albido-tomentoſis, aculeis rectis, floribus racemoſis, calycibus reflexis. *Europ. Aſia et Amer. bor.*

β. Foliis quinato-ternatis.

fruticoſus 12. R. foliolis petiolatis ſupra glabris ſubtus tomentoſis, caule ſuffruticoſo erecto 5angulari, aculeis recurvis, calyce reflexo. *Europ., Afric. et Aſia bor.* (R. affinis Weih., paniculatus Schlechtend.)

floribundus Kunth. 13. R. foliolis longe petiolatis elliptico-oblongis argute ſerratis utrinque appreſſo-pubeſcentibus, ramulis villoſis nervisque foliorum ſubtus aculeatis, panicula terminali. *Quito.*

ſuberectus Anderſ. 14. R. foliis quinato-pedatis ſubcordato-ovatis duplicato-ſerratis ſubtus ſubpubeſcentibus, aculeis deflexis, ramis angulatis glabris, racemis lateralibus calycibusque inermibus piloſis. *Germania. Anglia. Scotia.* (R. neſſenſis Hall., nemoroſus Hayn., faſtigiatus Weih., ſulcatus Veſt.)

corylifolius Sm. 15. R. foliis quinatis ſubtus pubeſcentibus, lateralibus ſeſſilibus, aculeis confertis rectiusculis, caule teretiusculo fragili bienni, panicula glanduloſa, calycibus ſubreflexis. *Europ.* (R. bifrons et nutans Veſt., Aſchoffii Weih.)

nitidus Weih. 16. R. foliis quinato-ternatis ſupra nitidis ſubtus pubeſcentibus, aculeis recurvis caulis obtuſe angulati glabri, calycibus hiſpidulis ſubreflexis. *German. Anglia.*

leucoſtachys Sm. 17. R. foliis quinatis ovato-oblongis acuminatis laciniatis ſubtus hirſutiusculis, aculeis deflexis, ramis angulatis pubeſcentibus, calycibus glanduloſis reflexis. *German. Anglia.* (R. Wiegmanni Weih.)

rhamnifolius Weih. 18. R. foliis ſubpedatis cordato-orbiculatis acutiusculis ſubtus hirſutis, aculeis deflexis, ramis angulatis, calyce patente. *German. Anglia.* (R. cordifolius et rubricaulis Weih.)

plicatus Weih. 19. R. foliis quinatis petiolatis parallele venoſis ſubplicatis ſubtus hirſutis, aculeis recurvis, ramis angulatis, calyce reflexo ſubtomentoſo. *Germania. Anglia.*

Sprengelii Weih. 20. R. foliis quinato-ternatis ovato-oblongis acuminatis inaequaliter dentatis ſubtus piloſis, aculeis ſparſis tenuibus reflexis, caule proſtrato teretiusculo villoſo, panicula corymboſa, calyce patente inermi hirſuto. *Germania.*

Menkii Weih. 21. R. foliis quinato-ternatis ſubcordato-ovatis ſubtus calycibusque reflexis villoſiſſimis, aculeis deflexis, caule villoſo tereti. *Germania.* (R. velutinus Veſt.)

Schlechtendalii Weih. 22. R. foliis quinato-ternatis oblongis acuminatis angulatis ſerratis ſubtus pubeſcentibus, aculeis ramisque deflexis, caule teretiusculo villoſo, racemis axillaribus foliоſis, calyce inermi reflexo. *Germania.*

tiliaefolius Weih. 23. R. foliis quinato-pedatis ſubcordato-ovatis acutis ſerrulatis utrinque glabriusculis, aculeis rectiusculis, caule tereti glabro, calycibus tomentoſis patentibus. *Germania.*

Schleicheri Weih. 24. R. foliis quinatis oblongis acuminatis inaequaliter ſerratis ſubtus pubeſcentibus, caule angulato aculeatiſſimo ramisque villoſis, aculeis recurvis, paniculae decompoſitae ramis patentiſſimis confertiſſime aculeatis, calycibus aculeatis reflexis. *Germania.*

horridus Weih. 25. R. foliis quinatis ſubrotundis ſerratis rugoſis ſubtus villoſis, caule ramisque ſubangulatis aculeatiſſimis glanduloſis, racemis axillaribus, calycibus fructiferis appreſſis. *Germania.* (R. ferox Veſt.)

villoſus Ait. 26. R. foliis quinato-digitatis ovato-oblongis acuminatis ſerratis utrinque villoſis, petiolis aculeatis, aculeis reflexis, caule hiſpido, pedunculis racemoſis laxis. *Amer. bor.*

cuneifolius Pursh. 27. R. foliis quinato-digitatis obovatis apice inaequaliter dentatis plicatis baſi revolutis ſubtus tomentoſis, aculeis ſparſis recurvis, ramis petiolis pedunculisque villoſis, pedicellis paniculae divaricatis nudiusculis. *Amer. bor.* (R. parvifolius Walt.)

laciniatus W. 28. R. foliis quinato-digitatis ſubtus piloſis, foliolis pinnato-inciſis, aculeis caulis ſubangulati recurvis, calyce reflexo aculeolato, petalis 3lobis. *Patria?*

jamaicenſis 29. R. foliis quinato-ternatis inciſo-ſerratis ſubtus villoſo-tomentoſis, caule glabriusculo, aculeis recurvis, paniculis terminalibus diffuſis. *Ind. occ.*

γ. Foliis ternatis.

caeſius 30. R. foliis ternatis ſubpubeſcentibus, caule repente tereti caeſio-pruinoſo, aculeis ſubrecurvis, calyce erecto glanduloſo-pubeſcente, petalis obovatis emarginatis. *Europ. Japon.*

tomentoſus W. 31. R. foliis ternatis obovatis acutiusculis inaequaliter ſerratis ſupra piloſis ſubtus tomentoſis, lateralibus ſubinciſis, caule angulato, aculeis rectiusculis, calyce villoſo reflexo. *Europ. Aſia minor.* (R. ſanctus Schreb., obtuſifolius W., agreſtis Kit., caneſcens et collinus Cand., argenteus C. C. Gmel., Sphyllus Bellard., hypoleucus Veſt.)

glanduloſus Bellard. 32. R. foliis ſubrotundo-ovatis acuminatis mucronato-ſerratis glabris ciliatis, venis ſubtus pubeſcentibus, caule angulato petiolis pedunculisque glanduloſo-hiſpidis, aculeis rectiusculis. *Ger-*

mania. Italia ſuper. Anglia. Transſylvan. (R. hybridus Vill. Güntheri Weih.)

hirtus Kit. 33. R. foliis te. natis cordato-ovatis acutis inaequaliter ſerratis hirtis, nervo medio ſubtus aculeato, aculeis caulis angulati ſubrecurvis ſetisque confertis rubicundis, pedunculis inermibus calycibusque glanduloſo-piloſis. *Bannatus. Transſylvan.*

† *ulmifolius* Schott. 34. R. foliis ternatis ſubcordatis ovalibus duplicato-dentatis glabris ſubtus aculeatis, caule decumbente aculeatiſſimo. *Hiſpan.*

occidentalis 35. R. foliis ternatis ovatis acuminatis inciſis argute duplicato-ſerratis ſubtus tomentoſis, petiolis teretibus, caule tereti glabro pruinoſo, aculeis recurvis alternis.

hiſpidus 36. R. foliis ternatis cuneatis inciſis inaequaliter dentatis glabriusculis, caule ſarmentoſo tereti, aculeis recurvis ſetisque ſparſis, racemi pedicellis elongatis ſetoſis, petalis obovatis. *Amer. bor.* (R. trivialis Mx., flagellaris W.)

heterophyllus W. 37. R. foliis ternatis ovato-oblongis acuminatis profunde dentatis glabriusculis, caule procumbente ſubangulato glabro, aculeis raris recurvis, petiolis pedunculisque racemoſis inermibus villoſis, calyce tomentoſo reflexo, petalis ſpathulatis. *Nov. Eborac.* (R. villoſus Torr.)

bogotenſis Kunth. 38. R. foliis ternatis ſubcordato-ovatis acutis ſerratis ſupra pubeſcentibus ſubtus incano-hirtis, ramulis petiolisque piloſo-glanduloſis aculeatis, pedunculis axillaribus paucifloris. *Nov. Granat.*

nubigena Kunth. 39. R. foliis ternatis ovatis acutis utrinque pubeſcentibus, ramis petiolisque villoſis aculeatis, panicula terminali ſimplici, calycibus aculeatis, fructibus ſericeo-piloſis. *Quito.*

glabratus Kunth. 40. R. foliis ternatis oblongis acutis crenato-ſerratis utrinque glabris, ramulis petiolisque aculeatis, floribus ſolitariis, calycibus aculeato-pubeſcentibus. *Amer. auſtr.*

ellipticus Sm. 41. R. foliis ternatis ellipticis ſerrulatis ſubtus pubeſcentibus, ſummis ſimplicibus ſub-3lobis, caule erecto flexuoſo hiſpido, aculeis ſparſis recurvis, panicula denſa terminali. *Nepal.*

auſtralis Forſt. 42. R. foliis ternatis ovalibus ſubcoriaceis argute dentatis utrinque glabris, caule glabro teretiusculo, aculeis ramorum ſecundis recurvis, floribus racemoſis dioecis, calyce obtuſo patente. *Nov. Zeeland.*

roſeus Poir. 43. R. foliis ternatis ovato-lanceolatis crenulatis utrinque glabris, nervo medio aculeato, ſtipulis ovalibus, ramis flexuoſis glabris, pedunculis ſolitariis, petalis calyce glabro minoribus. *Peru.*

urticaefolius Poir. 44. R. foliis ternatis ſimplicibusque ſubcordato-oblongis dentatis utrinque ſericeo-tomentoſis, ramis angulatis ſetoſis, aculeis raris rectiusculis, paniculae ramis hirſutiſſimis, calyce albido. *Peru.*

δ. Foliis ſimplicibus.

moluccanus 45. R. foliis cordato-lobatis acuminatis crenatis ſubtus tomentoſis, paniculis aggregatis axillaribus, bracteis palmatis calycibusque ſericeis. *Inſ. Molucc. Japon.?*

alceaefolius Poir. 46. R. foliis palmato-lobatis argute dentatis ſupra rugoſis ſubtus tomentoſis, ramis angulatis villoſis aculeatis, pedunculis axillaribus aculeatis, bracteis capillari-pinnatifidis, calycibus inflato-globoſis. *Java.*

reflexus Ker. 47. R. foliis cordatis ſub-5lobis crenulatis rugoſis utrinque hiſpidis medio maculatis, lobo medio elongato, ramis teretibus aculeatis hiſpidis, pedunculis axillaribus reflexis paucifloris, bracteis pectinatis. *China auſtr.*

rugoſus Sm. 48. R. foliis cordatis ſub-5lobis crenatis ſupra rugoſis ſubtus reticulatis piloſis, caule ſcandente, ramis teretibus villoſis, aculeis incurvis, racemis axillaribus compactis, bracteis ovatis inciſis, calycibus ſericeis. *Nepal.*

tiliaceus Sm. 49. R. foliis cordato-ſubrotundis obſolete angulatis ſubtus albo-tomentoſis, racemis axillaribus laxis, bracteis laciniatis. *Nepal.*

paniculatus Sm. 50. R. foliis cordatis acutis ſublobatis crenatis ſubtus tomentoſis, pedunculis aculeatis, panicula terminali diffuſa, calycibus acutis. *Nepal.*

microphyllus L. ſuppl. 51. R. foliis cordatis 3fidis inaequaliter dentatis glabris, venis ſubtus pubeſcentibus, ramis teretibus flexuoſis glabris, aculeis ſparſis recurvis, pedunculis ſolitariis, calyce villoſo. *Japon.* (R. palmatus Thb.)

inciſus Thb. 52. R. foliis cordato-ſubrotundis inciſo-ſerratis utrinque glabris, aculeis ſparſis ſubrecurvis, pedunculis ſolitariis glabris. *Japon.*

corchorifolius L. ſuppl. 53. R. foliis cordato-ovatis acutis ſublobatis ſerratis villoſis, nervo medio ſupra aculeato, ramis tomentoſis, aculeis recurvis, pedunculis axillaribus ſolitariis tomentoſis. *Japon.* (R. villoſus Thb.)

elongatus Sm. 54. R. foliis cordatis acuminatis duplicato-crenatis ſubtus tomentoſis, ramis viſcoſo-pubeſcentibus, aculeis ſparſis, paniculae ramis glomeratis, calyce obtuſo. *Java.*

acuminatus Sm. 55. R. foliis ovatis coriaceis nitidis glabris ſerratis, ramis aculeatis glabris, caule ſcandente inermi, panicula racemoſa, petalis calycem verrucoſum aequantibus. *Nepal.*

pyrifolius Sm. 56. R. foliis oblongis acuminatis ſerratis utrinque glabris, ramis flexuoſis, aculeis ſparſis, paniculae ramis corymboſis, bracteis inciſis, petalis calyce minoribus. *Java.*

†† *Inermes.*

ſtrigoſus Mx. 57. R. foliis quinato-ternatis ovatis acuminatis inaequaliter ſerratis ſubtus lineatis candido-to-

mentoſis, pedunculis ſub-3floris calycibusque hiſpidis. *Amer. bor.* (R. penſylvanicus Poir.)

canadenſis 58. R. foliis digitatis denis quinis ternatisque, foliolis lanceolatis argute ſerratis utrinque nudis, ſtipulis linearibus ſubaculeatis, caule purpureo glabriusculo. *Amer. bor.*

inermis W. 59. R. foliis ternatis ſubtus albido-tomentoſis, foliolis ovatis ſubinciſis inaequaliter ſerratis, ſtipulis ſubulatis, caule procumbente glauco-tomentoſo. *Penſylvan.*

obovalis W. 60. R. foliis ternatis obovato-ſubrotundis ſerratis nudis, ſtipulis ſetaceis, caule hiſpido, racemis ſubcorymboſis paucifloris, bracteis ovatis. *Amer. boreal.*

ſpectabilis Pursh. 61. R. foliis ternatis ovatis acutis angulatis inaequaliter duplicato-ſerratis ſubtus pubeſcentibus, petiolis ſubaculeatis, ramis flexuoſis glaberrimis, pedunculis terminalibus ſolitariis 1floris, petalis ovatis calyce longioribus. *Ora occid. Amer. bor. Inſ. Aleut.* (R. ſtenopetalus Choris.)

odoratus 62. R. foliis ſimplicibus 5lobis inaequaliter dentatis, venis ſubtus pubeſcentibus, caule erecto, petiolis pedunculisque glanduloſo-piloſis, calycibus appendiculatis. *Amer. bor.*

parviflorus Nutt. 63. R. foliis palmato-lobatis, pedunculis ſub-3floris, petalis ovato-oblongis calyce villoſo acuminato brevioribus. *Ad lacum Huronum.*

** *Herbacei.*

ſaxatilis 64. R. flagellis reptantibus, caule obtusangulo, foliis ternatis rhombeis acutis inciſo-dentatis nudis, pedunculis ſubternis elongatis, petalis linearibus. *Europ. Aſia. Amer. bor.*

coriaceus Poir. 65. R. caule erecto ſubaculeato, foliis ovato-oblongis ſerratis glabris, pedunculis axillaribus aculeatis, petalis crenatis calyce lanceolato brevioribus. *Peru.*

arcticus 66. R. caule ſimplici, foliisque ternatis ovatis obtuſe dentatis glabris, pedunculis ſolitariis, petalis obovatis emarginatis. *Europ. bor. Sibir. Amer. bor.*

piſtillatus Sm. 67. R. caule 1floro, foliis ternatis argute ſerratis glabris, petalis oblongis integris, ſtylis approximatis. *Amer. bor.* (R. acaulis Mx.)

radicans Cav. 68. R. caule proſtrato ſarmentoſo aculeato, foliis longe petiolatis ternatis orbiculatis ſublobatis crenatis utrinque villoſis, pedunculis ſolitariis elongatis, laciniis calycis denticulatis, petalis ovalibus. *Chili.*

Chamaemorus 69. R. caule ſimplici 1floro, foliis ſimplicibus ſubreniformibus rotundo-lobatis plicatis, laciniis calycis oblongis inciſis, floribus dioecis. *Europ. bor. Sibir. Amer. bor.*

ſtellatus Sm. 70. R. caule erecto 1floro, foliis ſimplicibus cordatis 3lobis rugoſo-venoſis, petalis lanceolatis. *Ora oct. Amer. bor.*

trifidus Thb. 71. R. caule glabro ſimplici, foliis ſimplicibus cordatis 3fidis ſerratis utrinque glabris, pedunculis ſolitariis. *Japon.*

1863. FRAGARIA.

collina Ehrh. 1. Fr. calyce fructifero erecto connivente, pube foliorum erecta petiolorum patentiſſima, foliis utrinque pubeſcentibus apice conniventi-ſerratis, fructibus duriusculis. *Europ.*

indica Andr. 2. Fr. laciniis calycis alternis obovatis 3dentatis, pube petiolorum pedunculorumque erecto-patula, foliis dentato-ſerratis. *Nepal.* (Duchesnea fragiformis Sm.)

veſca 3. Fr. calyce fructifero reflexo, pube petiolorum patentiſſima, petiolorum appreſſa. *Europ. Amer. bor. et auſtr.* (Fr. ſemperflorens Hayn.)

elatior Ehrh. 4. Fr. calyce fructifero reflexo, pube pedunculorum petiolorumque patentiſſima. *Patria?*

virginiana Ehrh. 5. Fr. calyce fructifero patente, pube petiolorum erecta, pedunculorum appreſſa, foliis ſupra glabriusculis. *Amer. bor.*

grandiflora Ehrh. 6. Fr. calyce fructifero erecto, pube petiolorum pedunculorumque erecta, foliis ſupra glabriusculis. *Surinam.*

chilenſis Molin. 7. Fr. calyce fructifero erecto, pube petiolorum pedunculorumque patentiſſima, foliis ſubcarnoſis utrinque villoſis. *Chili:* (non inſ. Chiloe: Molin. ed. 2. p. 114.)

canadenſis Mx. 8. Fr. calyce fructifero patente, pube petiolorum pedunculorumque patentiſſima, foliis utrinque receptaculisque ſeminum villoſis. *Canada.*

† *monophylla* Duchesn. 9. Fr. calyce fructifero patente dentato, pube petiolorum pedunculorumque erecta, foliis ſimplicibus cordatis. *Patria?*

1864. POTENTILLA.

* *Foliis pinnatis.*

† *Floribus flavis, luteis.*

α. *Caule erecto, ſuberecto.*

fruticoſa 1. P. caule fruticoſo, foliis ſub-2jugis oblongo-lanceolatis integerrimis villoſis, ſtipulis ſcarioſis, petalis obovatis calycem ſuperantibus. *Europ. Aſia. Amer. bor.* (P. floribunda Pursh., davurica Neſtl., proſtrata Lapeyr.)

penſylvanica 2. P. caule erecto ſtricto, foliis interrupte pinnatis villoſiusculis ſubtus ſublanatis, foliolis majoribus oblongis truncatis inciſo-ſerratis, minoribus ſubintegerrimis, ſtipulis indiviſis, petalis calycem ſubaequantibus. *Amer. bor. Sibir.* (P. hiſpida Poir.)

viſcoſa Donn. 3. P. caule erecto ſtricto foliisque pinnatis viſcido-pubeſcentibus, foliolis lanceolatis inciſo-ſerratis ſummis confluentibus, ſtipulis inciſis, petalis calycem aequantibus. *Sibiria. Arabia.* (P. hiſpida Neſtl., penſylvanica Horn., dentata Forsk.)

lineata Trevir. 4. P. caule erecto villoſo, foliis interrupte pinnatis parallele venoſis ſericeo-argenteis, foliolis ſubellipticis ſerratis, ſtipulis dentatis, petalis calycem ſubaequantibus. *Nepal.*

arguta Pursh. 5. P. caule erecto ſtricto, foliis pinnatis ſub-3jugis ſupra incano-ſericeis ſubtus niveo-lanatis, foliolis oblongis pinnatifidis, laciniis lanceolato-linearibus acutis, ſtipulis inciſis, floribus corymboſis congeſtis, petalis calyce longioribus. *Louiſiana.* (P. miſſurica Horn. candicans Fiſch.)

pimpinelloides 6. P. caule erecto ſimplici, foliis pinnatis ſub-9jugis piloſis, foliolis aequalibus ſubrotundis obtuſis crenatis, ſtipulis inciſis, petalis calycem ſuperantibus. *Armenia.*

cicutarifolia W. 7. P. caule erecto foliisque pinnatis ſub-5jugis piloſiusculis, foliolis oblongo-cuneatis profunde dentatis, ſtipulis ovatis integris, floribus corymboſis. *Aſia minor.*

Filipendula W. herb. 8. P. caule erecto villoſo, foliis interrupte pinnatis ſub-12jugis villoſis, foliolis majoribus lanceolatis pinnatifido-ſerratis, minoribus integerrimis, ſtipulis inciſis, petalis calycem ſuperantibus. *Dauuria.*

Sanguiſorba W. herb. 9. P. caule erecto foliisque pinnatis ſub-4jugis glabris, foliolis obovatis obtuſe profundeque ſerratis, ſtipulis inciſis, petalis calyce ſubbrevioribus. *Sibiria.*

Sprengeliana Lehm. 10. P. caule ſimplici erecto paucifloro, foliis pinnatis 3jugis piloſiusculis, foliolis obovatis ſerratis, extimis majoribus ſubrotundis, ſtipulis integerrimis. *Sibir.*

geoides M. B. 11. P. caule erecto, foliis pinnatis ſub-3jugis hirſutis, foliolis ſubrotundis ſublobatis inciſo-ſerratis, extimis majoribus, ſtipulis inciſis, calycibus obtuſis corollam ſubaequantibus. *Tauria.*

Heynii Roth. 12. P. caule erecto, foliis pinnatis ſub-2jugis ſericeo-piloſis, foliolis obovatis inciſo-dentatis, extimis minoribus, ſtipulis lanceolatis integerrimis, petalis calyce acuto duplo brevioribus. *Ind. orient.*

tanacetifolia W. herb. 13. P. caule aſcendente foliisque pinnatis ſub-5jugis hirſutiſſimis, foliolis lanceolatis pinnatifido-ſerratis, ſtipulis laciniatis, petalis obcordatis calyce duplo longioribus. *Sibir.*

ſericea 14. P. caule aſcendente paucifloro villoſo, foliis pinnatis multijugis utrinque tomentoſis, foliolis ovatis pinnatifidis, ſtipulis lanceolatis integerrimis, petalis obcordatis. *Sibir.*

agrimonioides M. B. 15. P. caule aſcendente foliisque pinnatis villoſis, foliolis ovato-oblongis obtuſis pinnatifidis ſub-

tus ſericeo-tomentoſis, extimis majoribus, ſtipulis ſubbipartitis, petalis aureis calycem ſubexcedentibus. *Armen. Caucaſ.*

candicans Humb. 16. P. caule aſcendente paucifloro foliisque pinnatis multijugis ſericeis, foliolis inaequalibus profunde pinnatifidis, ſtipulis ſubinciſis, petalis calycem ſuperantibus. *Mexico.*

verticillaris W. 17. P. caule aſcendente villoſo, foliis pinnatis ſubtus niveo-tomentoſis, foliolis linearibus margine revolutis, lateralibus geminatis ſubverticillatis, terminali 3fido, ſtipulis inciſis. *Sibir.* (P. multifida Pall.)

Egedii Wormsk. 18. P. caule humili glaberrimo, foliis pinnatis 5jugis glabris, foliolis ovato-oblongis acute pinnatifidis, petalis aureis calycem denſe piloſum ſuperantibus. *Grönland.*

bifurca 19. P. caule aſcendente, foliis pinnatis ſub-8jugis ſericeis, foliolis oblongis integerrimis 2fidisque extimis confluentibus, ſtipulis ſubinciſis, petalis calycem ſuperantibus. *Sileſia. Caucaſ. Sibir.*

β. Caule decumbente.

ſupina 20. P. caule decumbente dichotomo pubeſcente, foliis pinnatis 3jugis glabriusculis, foliolis oblongis obtuſis inciſo-dentatis, ſtipulis ovatis integerrimis, pedunculis axillaribus 1floris, fructiferis reflexis. *Europ. Aſia. Amer. bor.*

Pombeyi Neſtl. 21. P. caule decumbente piloſo, foliis pinnatis 2jugis ternatisque piloſis, foliolis obovatis dentatis utrinque piloſiusculis, ſtipulis oblongis integerrimis, petalis calycem aequantibus. *Chili.*

multifida 22. P. caule decumbente, foliis pinnatis ſub-3jugis, foliolis oblongis pinnatifidis ſubtus lanato-tomentoſis, ſtipulis ovatis ſubintegris, petalis calycem ſubaequantibus. *Helvetia. Suecia. Italia ſuper. Tauria. Sibir.*

fragarioides 23. P. flagellis reptantibus, foliis radicalibus pinnatis ſub-3jugis villoſis, caulinis ternatis ſericeis, foliolis ovatis argute ſerratis, extimis majoribus confluentibus, ſtipulis ſerratis. *Sibir.*

Anſerina 24. P. caule repente, foliis interrupte pinnatis multijugis ſubtus ſericeis, foliolis oblongis argute ſerratis, ſtipulis multifidis, pedunculis axillaribus 1floris elongatis. *Europ. Aſia. Amer. boreal.*

†† *Floribus albis.*

rupeſtris 25. P. caule erecto dichotomo, foliis radicalibus pinnatis, caulinis ternatis pubeſcentibus, foliolis ſubrotundis dentatis, ſtipulis indiviſis. *Europ. Sibir.*

Saleſovii W. 26. P. caule ſuffruticoſo erecto, foliis pinnatis ſub-3jugis ſubtus niveo-tomentoſis, foliolis oblongis argute ſerratis, ſtipulis ſubſcarioſis, petalis calyce brevioribus. *Sibir.*

††† *Floribus rubris.*

paluſtris Scop. 27. P. caule aſcendente, foliis pinnatis ſub-2jugis glabris ſubtus glaucis, foliolis lanceolatis argute ſerratis, petalis lanceolatis acutis calyce brevioribus. *Europ. Aſia. Amer. bor.* (Comarum paluſtre L.)

** *Foliis digitatis.*

† *Floribus flavis, luteis.*

a. Caule erecto.

recta 28. P. foliis 7-5natis, foliolis oblongis inciſo-ſerratis patenti-piloſis, petalis pallidis calycem ſuperantibus. *Europ. Caucaſ.* (P. piloſa W., pallens Mönch., ſulfurea Lam.)

obſcura W. 29. P. foliis 7-5natis, foliolis lanceolatis acutis inciſo-ſerratis hirſutis, petalis obcordatis aureis calycem aequantibus. *Italia ſuper. Gallia. Tauria. Sibir.* (P. recta Vill.)

hirta 30. P. foliis 7-5natis cauleque paucifloro hirtis, foliolis ſpathulato-linearibus 3dentatis, petalis aureis obcordatis calycem ſuperantibus. *Europ. med. et auſtr. Sibir.* (P. piloſa Vill., anguſtifolia Cand.)

taurica W. herb. 31. P. foliis 5natis ſericeis, foliolis obovato-oblongis apice ſerratis, caule multifloro villoſo, petalis pallidis calyce longioribus. *Tauria. Ad Volgam.* (P. hirta M. B., rupeſtris Falk.)

intermedia 32. P. foliis 7-5-3natis piloſiusculis, foliolis obovato-oblongis profunde ſerratis, ſtipulis integerrimis, caule erecto diffuſe ramoſo, petalis aureis calycem ſubaequantibus. *Thuringia. Gallia. Scotia. Tauria.* (P. opaca Sm., chrysantha Trev., thuringiaca Bernh., umbroſa Stev.)

pedata W. 33. P. foliis 7-5natis pedatis cauleque ramoſo hirſutis, foliolis lineari-lanceolatis aequaliter ſerrato-ſubpinnatifidis, petalis aureis calycem duplo ſuperantibus. *Italia.* (P. rubens All. piloſa Cand.)

laciniosa Kit. Neſtl. 34. P. foliis 7-5natis cauleque ſtricto hirtis, foliolis lineari-lanceolatis inaequaliter lacıniatis pinnatifidis, petalis luteis calycem duplo ſuperantibus. *Hungar.*

† *diſſecta* Pursh. 35. P. foliis 5natis cauleque erecto ramoſo glabriusculis, foliolis pinnatifidis, floribus ſubcorymboſis. *Ad ſinum Hudſonis.*

† *virgata* Lehm. 36. P. foliis 9-7-5-3natis ſubtus niveo-tomentoſis, foliolis lanceolatis pinnatifidis, floribus paniculatis, petalis pallidis calyce longioribus. *Patria?*

† *divaricata* Cand. 37. P. foliis 7-5natis ſubpiloſis, foliolis ſpathulato-oblongis profunde ſerratis, corymbi ramis divaricatis, petalis obcordatis calycem aequantibus. *Corſica.*

ranunculoides Humb. 38. P. foliis 7-5-3natis supra glabris subtus pubescentibus, foliolis obovatis crenato-dentatis, petalis obcordatis calycem superantibus.

stipularis 39. P. foliis 7-5-3natis cauleque simplici debili glaberrimis, foliolis oblongo-linearibus apice 3dentatis, stipulis dilatatis acuminatis, pedunculis subcorymbosis filiformibus, petalis obovatis calycem superantibus. *Sibir.*

pumila Poir. 40. P. foliis 5natis subtus lanatis, foliolis obovato-oblongis incisis, caule humili erecto pubescente, pedunculis 1floris abbreviatis, petalis calycem aequantibus. *Amer. bor.*

β. Caule ascendente.

astracanica Jacq. 41. P. foliis radicalibus 5natis, superioribus 3partitis pilosis, caule dichotomo villoso, stipulis foliaceis amplis incisis, petalis calycem subaequantibus. *Caucas. Ad Volgam.*

canescens Bess. 42. P. foliis quinatis subtus incano-lanatis, foliolis spathulato-lanceolatis profunde serratis, floribus paniculatis, petalis emarginatis calycem subaequantibus. *Europ. med. Caucas. Amer. bor.* (P. ascendens Kit. W., inclinata Vill., intermedia Wahlenb., recta Jacq. Lam., humifusa Nuttall.)

argentea 43. P. foliis quinatis margine revolutis subtus candide tomentosis, foliolis lanceolatis basi attenuatis inciso-serratis, petalis retusis calycem superantibus. *Europ. Asia. Amer. bor.* (P. impolita Wahlenb., neglecta Baumg.)

calabra Tenor. 44. P. foliis quinatis supra incano-subtus revolutis candide tomentosis, foliolis multipartitis, laciniis linearibus, petalis obovatis integerrimis calycem subduplo superantibus. *Italia infer. Sicilia.*

Günthieri Pohl. 45. P. foliis inferioribus quinatis superioribus 3partitis, foliolis lanceolatis basi attenuatis margine planis acute serratis subtus canescentibus, caule diffuso, petalis emarginatis calycem superantibus. *Silesia. Bohemia. Suecia austr.* (P. sordida Fries., canescens Hartm.)

collina Wib. 46. P. foliis quinatis ternatisque subtus canescentibus, foliolis obovato-oblongis obtuse dentatis, petalis subretusis calyce longioribus. *Germania. Suecia austr. Italia.* (P. Thomasii Tenor.)

patula Kit. 47. P. foliis quinatis ternatisque utrinque glabriusculis ciliatis, foliolis cuneatis paucidentatis, caule dichotomo piloso, petalis retusis calycem longe superantibus. *Hungar. Transsylvan.*

crocea Lehm. 48. P. foliis quinatis utrinque cauleque hirsutiusculis, foliolis obovatis abbreviatis incisis obtuse dentatis, petalis retusis calyce duplo longioribus. *Europ. alpestria.* (P. aurea Sm., filiformis et rubens Vill., pyrenaica et sabauda Cand., ascendens et heterophylla Lapeyr., salisburgensis Jacq.)

aurea 49. P. foliis quinatis utrinque ſubtiliſſime margine denſe ſericeis, foliolis obovato-oblongis apice dentatis, petalis retuſis calyce duplo longioribus. *Europ. alpes.*

canadenſis 50. P. foliis quinatis ſupra obſcure ſubtus argenteo-ſericeis, foliolis obovato-oblongis acute ſerratis, caule aſcendente debili petiolisque molliſſime villoſis, petalis orbiculatis calycem aequantibus. *Amer. bor.*

petraea W. 51. P. foliis quinatis utrinque denſe niveo-ſericeo-tomentoſis, foliolis approximatis rhombeis profunde ſerratis inciſis, petiolis rigidis, petalis ſubrotundis calycem ſuperantibus. *Perſia bor.*

γ. Caule decumbente.

geranioides W. 52. P. foliis quinatis ſubtus albido-villoſis, foliolis cuneiformibus apice ſubpalmatis inciſis, laciniis linearibus obtuſis, petalis obcordatis calycem ſuperantibus. *Aſia minor. Armenia.*

Lindackeri Tauſch. 53. P. foliis quinatis ſubtus ſericeis, foliolis cuneiformibus inciſo-dentatis, dentibus oblongis rotundatis, caule filiformi procumbente, petalis calycem ſuperantibus. *Bohemia.*

inciſa Desf. 54. P. foliis quinato-ternatis rufo-piloſis, foliolis cuneato-lanceolatis apice inciſo-ſerratis diſtantibus, caule dichotomo decumbente, petalis cuneatis calycem ſuperantibus. *Patria?*

opaca 55. P. foliis 7-5natis utrinque petiolis pedunculisque hirtis, foliolis cuneato-lanceolatis profunde ſerratis, caule filiformi decumbente, petalis obcordatis calycem ſuperantibus. *Europ. Aſia et Amer. bor.*

verna 56. P. foliis radicalibus quinatis caulinis ternatis utrinque ſimpliciter piloſis, foliolis obovatis apice profunde ſerratis, caule declinato, petalis obcordatis calycem ſuperantibus. *Europ. Amer. bor.* (P. ſerotina Vill., ſubacaulis Lapeyr.)

ſubacaulis 57. P. foliis radicalibus quinatis caulinis ternatis utrinque pube ſtellata incano-tomentoſis, foliolis obovatis obtuſis crenatis, caule decumbente, petalis obcordatis calycem ſubduplo ſuperantibus. *Europ. Aſia bor. et med.* (P. cinerea Chaix. Vill., opaca Vill. Pollich., ovata Poir., verna var. δ. W.)

flagellaris W. herb. 58. P. foliis omnibus quinatis utrinque glabris, foliolis lanceolatis acutis argute ſerratis, ſarmentis filiformibus pubeſcentibus, pedunculis axillaribus 1floris, petalis obovatis integerrimis calycem ſubaequantibus. *Sibir. or.*

ſimplex Mx. 59. P. foliis quinatis ſubtus hirſutiusculis, foliolis oblongis obtuſiusculis acute ſerratis, caule procumbente ſarmentoſo hirſuto, petalis rotundatis calycem ſubaequantibus. *Amer. bor.* (P. ſarmentoſa W., caroliniana Poir.)

reptans 60. P. foliis quinatis utrinque piloſiusculis, foliolis obovatis argute ſerratis, caule ſarmentoſo pro-

ſtrato, pedunculis axillaribus 1floris, petalis obcordatis calycem ſuperantibus. *Europ. Aſia bor.*

nemoralis Neſtl. 61. P. foliis quinatis ternatisque ſubpedatis ſubtus appreſſe piloſis, foliolis cuneatis acute ſerratis, caule proſtrato filiformi, pedunculis axillaribus 1floris elongatis, floribus ſub-4petalis. *Europ.* (Tormentilla reptans L.)

†† *Floribus albis.*

alba 62. P. foliis quinatis ternatisque ſubtus argenteo-ſericeis, foliolis oblongis apice conniventi-ſerratis, caule aſcendente paucifloro, petalis obcordatis calycem ſuperantibus. *Europ. Caucaſ.*

valderia All. 63. P. foliis 7-5natis rigidiusculis ſubtus incano-tomentoſis, foliolis obovato-oblongis ſerratis, caule erecto, floribus corymboſis congeſtis, petalis calyce lanato brevioribus. *Alp. grai.* (P. lanata Lam.)

lupinoides W. 64. P. foliis 7-5natis utrinque ſericeo-villoſis, foliolis obovato-oblongis apice conniventi-ſerratis, caule erectiusculo, ſtipulis oblongo-lanceolatis maximis, floribus congeſtis bracteatis, petalis calyce brevioribus. *Delphinat. Pyren.* (P. valderia Vill., nivalis Lapeyr. . P. integrifolia Lapeyr. var.)

Cluſiana Jacq. 65. P. foliis radicalibus quinatis, caulinis ternatis utrinque pubeſcentibus, foliolis ovali-cuneiformibus apice conniventi-3dentatis, caule aſcendente paucifloro, petalis amplis calycem ſuperantibus. *Alp. rhaet. noric. carn. Apennin.?* (P. caulescens Scop. Bocconi Neſtl.?)

caulescens 66. P. foliis radicalibus quinatis, caulinis ternatis utrinque nudis margine piloſis, foliolis oblongis apice conniventi-ſerratis, caule erecto multifloro, ſtipulis lanceolatis ſuperne latioribus, petalis cuneatis calycem ſubaequantibus. *Alp. Europ. auſtr.*

alchemilloides Lapeyr. 67. P. foliis 7-5natis ſubtus argenteo-ſericeis, foliolis ſubſpathulatis apice conniventi-3dentatis ſubſerratis, caule erecto corymboſo, petalis emarginatis calycem excedentibus. *Pyren.*

††† *Floribus rubris.*

comaroides Humb. 68. P. foliis radicalibus quinatis caulinis ternatis ſubtus incano-ſericeis, foliolis oblongis apice ſub-5dentatis, caule erecto corymboſo, petalis obcordatis calycem ſuperantibus. *Nov. Hiſpan.* (P. rubra W. herb.)

*** *Foliis ternatis.*

† *Floribus luteis ſ. flavis.*

a. *Caule erecto ſ. aſcendente.*

Tormentilla Schrank. 69. P. foliis ternatis nitidis glabriusculis, caulinis ſeſſilibus, foliolis lanceolatis inciſo-ſerratis, ſti-

pulis folio proximis inciſis, pedunculis axillaribus 1floris, floribus 4petalis. *Europ. Aſia bor.* (Tormentilla erecta L., officinalis Sm.)

norvegica 70. P. foliis ternatis (ſ. ſubquinatis) petiolatis utrinque piloſis, foliolis oblongis acute ſerratis, caule erecto dichotome ramoſo, pedunculis axillaribus, petalis calyce brevioribus. *Marchia. Luſatia. Scandinavia. Europ. or. Aſia med.* (P. dichotoma Mönch., geminiflora Schrank., ruthenica et diffuſa W. varr.)

hirſuta Mx. 71. P. foliis ternatis petiolatis hirſutis, foliolis ſubrotundis inaequaliter obtuſe ſerratis, caule erecto ſimpli corymboſo, petalis calyce brevioribus. *Amer. bor.* (P. monspelienſis L.)

elatior Schlechtend. 72. P. foliis ternatis petiolatis utrinque glabriusculis, foliolis ovalibus acute ſerratis venoſis, petalis obovatis calycem ſubſuperantibus. *Sibir.?*

grandiflora 73. P. foliis ternatis pubeſcentibus, foliolis ſubrotundo-ovalibus acute dentatis, caule aſcendente paucifloro, petalis obcordatis calyce duplo longioribus. *Alp. Europ. med. Caucaſ. Sibir.*

fragiformis W. herb. 74. P. foliis ternatis utrinque flavo-villoſis, foliolis obovatis obtuſe dentatis, caule erecto paucifloro hirſuto, petalis obcordatis calycem excedentibus. *Inſ. Aleut.*

villoſa Pall. 75. P. foliis ternatis ſupra ſericeis ſubtus villoſiſſimo-lanatis, foliolis obovatis crenato-ſerratis, ſtipulis late lanceolatis, caule aſcendente paucifloro, petalis obcordatis calycem duplo excedentibus. *Inſ. Aleut. et ora occ. Amer. bor.* (P. lucida Schlechtend.)

velutina Lehm. 76. P. foliis ternatis utrinque incano-villoſis ſubtus reticulatis, foliolis obovatis crenatis, caule aſcendente paucifloro, petalis ſubrotundis calycem ſubexcedentibus. *Gallia provinc.* (P. ſubacaulis Cand.)

emarginata Pursh. 77. P. foliis ternatis utrinque hirſutis, foliolis inciſo-dentatis, caule aſcendente paucifloro, pedunculis elongatis, petalis cuncato-oblongis emarginatis calyce duplo longioribus. *Terra Labrador.*

macrantha Ledeb. 78. P. foliis ternatis ſubtus albido-villoſis, foliolis ovatis apice inciſis, caule erecto paucifloro, petalis obcordatis calycem duplo ſuperantibus. *Sibir. orient.*

nivea 79. P. foliis ternatis ſupra hirſutiusculis ſubtus niveo-tomentoſis, foliolis obovatis margine planis inciſo-ſerratis, caule aſcendente paucifloro, petalis obcordatis calycem acutum villoſum ſuperantibus. *Alp. Europ. med. et bor.*

leucophylla Pall. 80. P. foliis ternatis ſupra glabriusculis ſubtus calycibusque obtuſiusculis niveo-tomentoſis, foliolis lanceolatis inciſo-ſerratis margine ſubrevolutis, caule aſcendente multifloro, petalis calycem ſubaequantibus. *Sibir. or.* (P. betonicaefolia Poir. anguſtifolia W. herb. Lehm.)

uniflora Ledeb. 81. P. foliis ternatis supra subvillosis subtus niveo-tomentosis, foliolis obovato-oblongis inciso-serratis, caule 1floro, petalis obcordatis calyce duplo longioribus. *Sibir.*

biflora W. herb. 82. P. foliis ternatis pubescentibus, foliolis linearibus lateralibus 2- terminali 3partitis ciliatis, caule erecto 2floro. *Sibir. or.*

nana W. herb. 83. P. foliis ternatis utrinque pilosis subtus canescentibus, foliolis obovato-subrotundis obtuse dentatis, caule humili 1floro, petalis obcordatis calyce triplo longioribus. *Inf. Aleut.*

Vahliana Lehm. 84. P. foliis ternatis cauleque 1floro hirsutissimis subtus albo-lanatis, foliolis lateralibus cuneiformibus 3fidis, medio rhombeo, petalis obcordatis calyce duplo longioribus. *Grönland.* (P. hirsuta Vahl. Hornem.)

β. Caule decumbente.

micrantha Ram. 85. P. foliis ternatis sericeis, foliolis obovatis serratis, caule prostrato hirsuto 1floro, petalis calyce brevioribus. *Pyren. Calabria. Styria.*

frigida Vill. 86. P. foliis ternatis hirsutis, foliolis obovatis crenatis, caule decumbente humili paucifloro, petalis calyce brevioribus. *Alpes summae Europ. med.* (P. norvegica All., glacialis Hall. fil.)

Brauneana Hopp. 87. P. foliis ternatis subtus pubescentibus ciliatis, foliolis obovatis acute dentatis, caule procumbente sub-1floro, petalis obcordatis calycem superantibus. *Alp. noric. rhaet. lepont.* (P. minima Hall. fil., frigida var. *β.* Pers. Cand.)

†† *Floribus albis aut rubentibus.*

speciosa W. 88. P. foliis ternatis supra sericeis subtus niveo-lanatis, foliolis ellipticis serratis, caule ascendente corymboso, floribus bracteatis, petalis albis spathulatis calycem subaequantibus. *Creta. Parnassus.*

tridentata Soland. 89. P. foliis ternatis coriaceis supra glabris subtus pilosiusculis glaucescentibus, foliolis oblongis basi attenuatis apice 3dentatis, caule ascendente corymboso, petalis albis spathulatis calycem superantibus. *Scotia. Grönland. Canada.* (P. retusa Retz.)

Fragaria Poir. 90. P. foliis ternatis subsericeis, foliolis ovalibus acute serratis retusis, caule decumbente 2floro, petalis albis obcordatis calycem aequantibus. *Europ. Caucas. Japon.* (Fragaria sterilis L., Comarum fragarioides W. P. Fragariastrum Ehrh., prostrata Mönch., fragarioides Vill.)

splendens Ram. 91. P. foliis ternatis supra appresse pilosis subtus subglauco-sericeis, foliolis ovali-oblongis apice conniventi-serratis, caule decumbente radicante paucifloro, petalis calycem superantibus. *Gallia. Pyren.* (P. Vaillantii Nestl., montana Schrad.)

breviſcapa Veſt. 92. P. foliis ternatis ſubſericeis, foliolis ovalibus ſerratis, ſcapo ſub-1floro petiolis breviori, petalis albis obcordatis calycem aequantibus. *Syria.*

Gunneri Hartm. 93. P. foliis ternatis ſubtus albido-tomentoſis, foliolis obovato-ſubrotundis acute ſerratis, ſcapo ſub-1floro folia ſuperante, petalis albis integerrimis calycem ſubaequantibus. *Norvegia.* (P. nivea Gunner.)

nitida 94. P. foliis ternatis utrinque argenteo-ſericeis, foliolis obovatis apice 3dentatis, caule aſcendente ſub-1floro, petalis roſeis obovatis calycem ſuperantibus. *Alp. Europ. med.* (P. apennina Tenor.)

† *Jameſoniana* Grev. 95. P. foliis ternatis utrinque ſericeis, foliolis apice inciſis, lateralibus 3-medio 5fido, caule ſimplici ſub-2floro. *Inſ. Waigats maris Baffini.* (70° l. bor.)

1865. Geum.

* *Foliis radicalibus lyrato-pinnatis.*

urbanum 1. G. foliis caulinis ternatis, ſtipulis inciſis, floribus erectis, fructibus hirſutis, ariſtis nudiuſculis. *Europ. Aſia.* (G. intermedium Ehrh. et W., hederaefolium C. C. Gmel., hirtum Wahlb. fl. gothob. varr.)

album Gmel. 2. G. foliis caulinis ternatis, ſummis ſimplicibus ſub-3fidis, floribus erectis, petalis calycem aequantibus, ariſtis nudis apice piloſis. *Amer. bor.* (G. canadenſe Jacq.)

virginianum 3. G. foliis caulinis ternatis 3fidisque, floribus erectis, petalis calyce brevioribus, ariſtis tortis piloſis. *Amer. bor.* (G. geniculatum Mx.)

atlanticum Desf. 4. G. foliis caulinis laciniatis cauleque ſub-1floro villoſis, flore ſuberecto, fructibus hirſutis, ariſtis contortis. *Afric. bor. Gallia auſtr.* (G. ſylvaticum Pourr. Cand.)

† *coccineum* Sm. 5. G. foliis caulinis 3lobis, radicalium pinna extrema maxima reniformi-cordata, floribus erectis. *Olymp. Aſiae minoris.*

macrophyllum W. 6. G. hirtum, foliis caulinis pinnatis 3lobisque, radicalium pinna extrema maxima reniformi-cordata, floribus erectis, ariſtis apice piloſis. *Camtſchatca. Amer. bor.* (G. radiatum Mx.)

pyrenaicum W. 7. G. villoſum, foliis caulinis ſub-3fidis, floribus nutantibus, petalis calycem ſuperantibus, ariſtis piloſis baſi tortis. *Pyren.*

rivale W. 8. G. foliis caulinis ternato-3fidis, floribus nutantibus, petalis calycem aequantibus, ariſtis plumoſis medio tortis. *Europ. Aſia. Amer. bor.*

ſtrictum Ait. 9. G. foliis caulinis interrupte pinnatis, foliolis ovatis dentatis, ſtipulis inciſis, floribus erectis, petalis calycem ſuperantibus, ariſtis nudis. *Amer. bor.* (G. canadenſe Murr., aleppicum Jacq., intermedium Fiſch.)

hispidum Fries. 10. G. foliis radicalibus subaequaliter pinnatis caulinis pinnatifidis cauleque hirsutis, floribus erectis, petalis calycem superantibus, aristis superne hispidis. *Suecia austr.*

agrimonoides Pursh. 11. G. foliis caulinis aequaliter pinnatis, foliolis incisis, stipulis subintegris, floribus erectis, petalis calycem aequantibus. *Amer. bor.*

ciliatum Pursh. 12. G. foliis caulinis pinnatifidis palmatisque glabriusculis ciliatis, laciniis linearibus incisis, floribus corymbosis. *Montes scopulosi Amer. bor.*

†*involucratum* Pers. 13. G. scapo elongato, floribus subcapitatis involucratis, petalis calyce minoribus. *Ad fretum Magellan.*

magellanicum Pers. 14. G. foliis lyrato interrupte pinnatis, scapo elongato. *Ad fretum Magellan.*

** *Foliis radicalibus subsimplicibus.*

japonicum Thb. 15. G. foliis subrotundis 3-5lobis villosis, floribus erectis, fructibus hirsutis, aristis glabris. *Japon.*

†*Peckii* Pursh. 16. G. foliis radicalibus reniformibus inciso-dentatis glabriusculis, petiolis longissimis subauriculatis, caule 1floro, petalis calycem aequantibus. *Nov. Hantonia Amer. bor.*

1866. SIEVERSIA W.

montana * 1. S. foliis lyrato-pinnatis pilosis, caule erecto 1floro, aristis villosis. *Alp. Europ. med.* (Geum montanum L.)

reptans * 2. S. foliis pinnatis villosis, foliolis ovatis sub-3fido-incisis, flagellis reptantibus, caule 1floro, aristis villosis. *Helvetia et Europ. austr.* (Geum reptans L.)

anemonoides W. 3. S. foliis pinnatis glabris, foliolis cuneiformibus apice dentatis, caule 1floro, aristis villosis. *Camtschatca.* (Dryas pentapetala L., anemonoides Pall. Caryophyllata camtschatica Lam.)

geoides * 4. S. foliis lyrato interrupte pinnatis hirsutis, foliolis 3dentatis, caule 2floro, aristis nudis. *Sibir.* (Dryas geoides Pall. Geum potentilloides Ait. Caryophyllata potentilloides Lam.)

glacialis * 5. S. foliis pinnatifidis villoso-lanatis, laciniis ovato-oblongis, mediis majoribus sub-1dentatis, caule 1floro. *Ora Sibir. arctica.* (Geum glaciale Adam.)

triflora * 6. S. foliis radicalibus interrupte pinnatis pilosis, foliolis cuneatis inciso-dentatis, caule simplici sub-3floro, petalis calycem aequantibus, aristis longissimis villosis. *Louisiana.* (Geum 3florum Pursh.)

1867. CALYCANTHUS.

floridus 1. C. ramis patentibus, foliis ellipticis subtus villosis. *Carolina.* (C. sterilis Walt.)

glaucus W. 2. C. ramis patentibus, foliis oblongis acutis ſubtus glabris glauceſcentibus. *Carolina.* (C. fertilis Walt.)

laevigatus W. 3. C. ramis ſtrictiſſimis, foliis oblongis acuminatis utrinque viridibus glabris. *Amer. bor.* (C. fertilis Andr., ferax Mx.)

1868. CHIMONANTHUS Lindl.

fragrans Lindl. *Japon.* Frutex ramoſus, foliis oppoſitis oblongis acuminatis glabris, floribus lateralibus ſparſis ſeſſilibus ſulfureis intus rubris. (Calycanthus praecox L.)

1869. ATHEROSPERMA Labill.

moſchatum Labill. *Nov. Holl.* Arbor foliis oblongo-lanceolatis ſubſerratis pellucido-punctatis ſubtus piloſis, pedunculis axillaribus geminis 1floris reflexis. Plantae partes omnes nucem moſchatam redolent.

1870. PEUMUS Perſ.

fragrans Perſ. *Chili.* Arbor ſempervirens aromatica, foliis oblongis pellucido-punctatis, floribus racemoſis. (Ruizia fragrans R. et P. excl. ſyn. Feuill. et Molin.)

1871. CITROSMA R. et P.

* *Foliis ſubtus pubeſcentibus.*

triflora * 1. C. foliis oppoſitis oblongo-lanceolatis utrinque acuminatis ſubintegerrimis ſubtus ramisque teretibus hiſpidulis, pedunculis 3floris axillaribus divaricatis abbreviatis. *Braſil.* Sello.

grandiflora Kunth. 2. C. foliis oppoſitis ovato-oblongis acuminatis baſi auriculatis dentatis utrinque ramisque teretibus pube ſtellata hiſpidis, pedunculis axillaribus 1floris. *Nov. Granat.*

macrophylla Bonpl. 3. C. foliis oppoſitis ovato-oblongis acutis inaequaliter dentatis ſubtus ramisque 4gonis villoſo-hirſutis, pedunculis axillaribus paucifloris. *Nov. Granat.*

geſnerioides Kunth. 4. C. foliis ovato-ellipticis acutis dentatis utrinque ſtellato-pubeſcentibus, pedunculis axillaribus paucifloris. *Nov. Granat.*

echinata Kunth. 5. C. foliis oppoſitis oblongis utrinque attenuatis duplicato-dentatis ſupra piloſis ſubtus ramisque teretibus ſericeo-tomentoſis, pedunculis pauciſloris, calycibus echinatis. *Nov. Granat.* (C. muricata R. et P.?)

mollis Kunth. 6. C. foliis oppoſitis ovato-oblongis acutis obſolete dentatis ſupra ſtellato-pubeſcentibus ſubtus ramisque ſub-4gonis incano-tomentoſis, pedunculis

lis paucifloris. *Nov. Granat.* (C. tomentoſa R. et P.?)

dubia Kunth. 7. C. foliis oppoſitis ovato-oblongis acutis ſinuato-denticulatis utrinque pube ſtellata tomentoſis, caule volubili, pedunculis dichotomis, floribus ☿ 4andris 1gynis. *Nov. Granat. Peru.?* (C. dentata R. et P.?)

ſeſſiliflora Kunth. 8. C. foliis oppoſitis elliptico-oblongis acutis denticulatis ſupra hiſpidulis ſubtus ramisque tomentoſis, caule volubili, floribus ſubſeſſilibus glomeratis polygynis. *Nov. Granat.*

braſilienſis * 9. C. foliis oppoſitis oblongis utrinque attenuatis denticulatis ſubtus ſtellato-pubeſcentibus, ramis teretibus, calycibus aggregatis tetracarpis. *Braſil.* Sello.

alternifolia * 10. C. foliis alternis oblongis obtuſis integerrimis ſubtus villoſis, calycibus ſubſeſſilibus aggregatis tetracarpis. *Braſil.* Sello.

Selloi * 11. C. foliis alternis oblongo-ellipticis acuminatis denticulatis, venis ſubtus appreſſo-piloſis, pedunculis aggregatis 3floris, calycibus villoſis. *Braſil.* Sello. (C. ovalis R. et P.?)

Mutiſii Bonpl. 12. C. foliis ſubquaternis ſubcordato-oblongis acuminatis obſolete denticulatis, junioribus, venis adultiorum ſubtus et ramis ſparſim ſtellulato-pubeſcentibus, pedunculis paucifloris. *Nov. Granat. Martinica.*

lepidota Kunth. 13. C. foliis oppoſitis ovato-oblongis acutis remote denticulatis ramisque denſiſſime argenteo-lepidotis, pedunculis axillaribus paucifloris. *Nov. Granat.*

** *Foliis ſubtus glabris.*

laurifolia Kunth. 14. C. foliis ovato-oblongis acutis ſubcoriaceis ſupra nitidis integerrimis, pedunculis paucifloris calycibusque glabris. *Nov. Granat. Peru?* (C. oblongifolia R. et P.?)

petiolaris Kunth. 15. C. foliis quaternis longe petiolatis oblongis utrinque attenuatis dentatis, ramis 4gonis, pedunculis ternis multifloris. *Nov. Granat.*

glabra * 16. C. foliis oppoſitis breviter petiolatis oblongis utrinque attenuatis opacis glaberrimis ſubtus discoloribus parallele venoſis rare dentatis, pedunculis ternis 3floris abbreviatis. *Braſil.* Sello.

umbellata * 17. C. foliis oppoſitis lanceolatis utrinque attenuatis argute remote ſerratis utrinque opacis, pedunculis elongatis tomentoſis corymboſo-umbellatis, calycibus polygynis. *Braſil.* Sello.

† *paniculata* * 18. C. foliis alternis oblongis opacis glabriuſculis acutis integerrimis, ramulis teretibus ferrugineo-tomentoſis, pedunculis paniculatis elongatis. *Braſil.* Sello.

1872. HEDYCARYA Forſt.

dentata Forſt. 1. H. foliis oblongis glabris baſi attenuatis mucronato-ſerratis. *Nov. Zeeland.*

† *hirſuta* * 2. H. foliis ovato-oblongis ſinuato-crenatis utrinque hirſutis baſi 2glandulosis. *Bengal.* Roxb.

1873. EUPOMATIA R. Br.

laurina R. Br. *Nov. Holl.* Frutex glaberrimus ſuborgyalis, foliis alternis oblongis coriaceis, pedunculis unifloris.

1874. ROSA.

1. *Simplicifolia.*

berberifolia Pall. 1. R. germinibus globoſis pedunculisque aculeatis, aculeis caulinis ſubgeminatis uncinatis, foliis ſimplicibus ovatis ſeſſilibus denticulatis glabris. *Perſia bor. Tataria.* (R. ſimplicifolia Salisb.)

2. *Feroces: ramis tomentoſis aculeatiſſimis, fructibus nudis.*

ferox Lawr. 2. R. germinibus ſubgloboſis pedunculis petiolisque hiſpidis, aculeis ramorum duplicibus confertiſſimis, foliolis ſubrotundo-ovatis glanduloſo-ſerrulatis ſubtus rubiginoſo-glanduloſis. *Tauria.* (R. provincialis M. B., camtſchatica Red.)

rugoſa Thunb. 3. R. germinibus ſubgloboſis glabris, aculeis ramorum confertiſſimis rectis, foliolis oblongis dentatis rugoſo-venoſis ſubtus villoſis. *Japon.*

camtſchatica Vent. 4. R. germinibus ſubgloboſis glabris pedunculis petiolisque ſubtomentoſis inermibus, aculeis ramorum difformibus, ſtipularibus validis, reliquis confertiſſimis ſetiformibus, foliolis oblongis opacis ſerrulatis ſubtus pubeſcentibus. *Camtſchatca.*

3. *Bracteatae: fructibus tomentoſis, aculeis germinis ſtipularibus, floribus bracteatis.*

involucrata Roxb. 5. R. germinibus globoſis inermibus, floribus ſubſeſſilibus ſubſolitariis, ſtipulis bracteisque pectinatis glanduloſo-ciliatis, petiolis aculeatis, foliolis lanceolatis ſerrulatis ſubtus pubeſcentibus. *Bengal. Nepal. China.* (R. clinophylla Thor. Red.)

† *microphylla* Roxb. 6. R. germinibus globoſis aculeatis, bracteis appreſſis pectinatis, foliolis obovatis obtuſis. *China.*

bracteata Roxb. 7. R. germinibus ſubgloboſis ſericeo-villoſis, bracteis ovatis fimbriatis, aculeis ramorum validis erectis, petiolis aculeatis, foliolis oblongis lucidis mucronato-ſerrulatis. *Ind. or. China.* (R. lucida Lawr.)

Lyellii Lindl. 8. R. germinibus globosis villosis, stipulis pinnatifidis, bracteis integerrimis distantibus, floribus corymbosis, foliolis oblongo-lanceolatis lucidis glabris. *Nepal.*

4. *Cinnamomeae*: *foliis sublanceolatis, floribus bracteatis.*

*Willdenowii** 9. R. germinibus ovatis pedunculisque solitariis abbreviatis glabris, bracteis appressis, aculeis ramorum suboppositis subrecurvis, petiolis villosiusculis inermibus, foliolis oblongis angustis aequaliter serrulatis subtus villosis resinoso-punctatis. *Ad mare caspium? Sibiria?* (R. microphylla W. herb., arenaria M. B. Stev. in W. herb.)

nitida W. 10. R. germinibus subglobosis pedunculisque glandulosо-hispidis, aculeis ramorum confertis setaceis rectis, petiolis inermibus, foliis lanceolatis serratis nitidis. *Terra nova.* (R. blanda Pursh. rubescens Red.)

Rapa Bosc. 11. R. germinibus hemisphaericis ore ampliato, pedunculis cymosis petiolisque aculeatis glandulosis, ramulis inermibus, foliolis oblongis undulatis lucidis coloratis. *Florida.* (R. turgida Pers.)

lucida Ehrh. 12. R. germinibus depresso-globosis hispidis, aculeis stipularibus subrecurvis, ramorum setaceis, petiolis aculeatis glabris, foliolis oblongis lucidis glaberrimis. *Amer. bor.*

*Lindleyi** 13. R. germinibus globosis hispidis, pedunculis geminis glandulosis, ramulis virgatis subinermibus, foliolis oblongis opacis glaucis. *Amer. bor.* (R. carolina ε. Ait., laxa Lindl.)

parviflora Ehrh. 14. R. germinibus depresso-globosis pedunculisque hispidis, calycibus viscosis, stipulis linearibus, aculeis rectis, petiolis aculeatis pubescentibus, foliolis lanceolatis subnitidis. *Amer. bor.* (R. caroliniana Mx., carolina du Roi., pensylvanica Wangenh., humilis Marsh.)

Woodsii Lindl. 15. R. germinibus ovatis pedunculisque glabris, petiolis aculeatis, ramulis subinermibus, stipulis laciniisque calycis conniventibus, foliolis oblongis obtusis glabris. *Ad fl. Missuri.*

gemella W. 16. R. germinibus depresso-globosis pedunculisque geminatis glabris, aculeis ramorum oppositis remotis rectiusculis, petiolis inermibus villosiusculis, foliolis oblongis acutis glabris supra opacis subtus pallidis. *Amer. bor.*

carolina 17. R. germinibus globosis pedunculisque corymbosis hispidis, aculeis stipularibus reflexis, stipulis convolutis, petiolis subinermibus pubescentibus, foliolis oblongo-lanceolatis opacis. *Amer. bor.* (R. virginiana du Roi, corymbosa Ehrh., palustris Marsh., pensylvanica Mx., Hudsoniana Red., evratina Bosc. Poir.)

Lyonii Pursh. 18. R. germinibus subglobosis glabriusculis, pedunculis subternis hispidis, aculeis sparsis rectis, pe-

tiolis aculeatis, foliolis ovato-oblongis subtus tomentosis. *Tennassee Amer. bor.*

blanda Ait. 19. R. germinibus subglobosis pedunculisque subsolitariis glabris, aculeis caulinis deciduis, stipulis bracteisque subcoloratis glanduloso-ciliatis, petiolis pubescentibus, foliis oblongis opacis subtus subpubescentibus. *Ad sinum Hudson. Ora occid. Amer. bor.* (R. fraxinea W.)

fraxinifolia Borkh. 20. R. germinibus subglobosis pedunculisque subcorymbosis glabris, ramis inermibus coloratis, stipulis serrulatis, petiolis glabris, foliolis oblongis subtus glaucis. *Terra nova.* (R. blanda Jacqu., virginiana Mill., alpina laevis Red.)

cinnamomea 21. R. germinibus globosis pedunculisque glabris, aculeis stipularibus geminis subrecurvis, petiolis inermibus villosis, foliolis lanceolatis basi attenuatis subtus glaucescentibus pilosiusculis. *Europa. Caucas. Sibir.* (R. foecundissima du Roi, majalis Wahlenb., fluvialis Retz., daurica Pall., mutica fl. dan., aristata Lapeyr.?)

laxa Retz. 22. R. germinibus oblongis pedunculisque corymbosis glaberrimis, aculeis caulinis recurvis, bracteis glanduloso-serratis, petiolis inermibus villosiusculis, foliolis oblongis aequaliter serratis subtus pubescentibus. *Sibir.*

Kosinsciana Bess. 23. R. germinibus oblongis glabris utrinque constrictis, pedunculis calycibusque hispidulis, aculeis substipularibus recurvis, foliolis cuspidato-serratis utrinque glabris subtus pallidis. *Ad fl. Tyram.*

frutetorum Bess. 24. R. germinibus subglobosis pedunculisque brevissimis glabris, aculeis substipularibus validis reflexis, petiolis inermibus foliolisque ellipticis subtus villosis. *Volhynia.*

ambigua Wair. 25. R. germinibus ovatis pedunculisque hispidis, aculeis stipularibus reflexis, ramorum juniorum duplicibus confertissimis, petiolis inermibus pilosiusculis, foliolis subtus glabris. *Patria?*

macrophylla Lindl. 26. R. germinibus oblongis pedunculisque hispidulis, ramulis petiolisque inermibus, foliolis lanceolatis subtus pubescentibus, bracteis subcoloratis, laciniis calycis longissimis. *Nepal.*

5. *Pimpinellifoliae: floribus ebracteatis, foliolis ovatis vel oblongis.*

alpina 27. R. germinibus elongatis glabris, pedunculis hispidis, caule ramisque inermibus, fructibus pendulis. *Europ. med.* (R. pendulina L., pyrenaica Gouan., lagenaria et hybrida Vill., inermis Mill.)

pygmaea M. B. 28. R. germinibus ovatis abbreviatis, pedunculis ramisque hispidis, caule subinermi, foliolis ovatis acutis glanduloso-2serratis subtus glaucis. *Tauria. Delphinatus.* (R. pimpinellifolia Vill.)

humilis Bess. 29. R. germinibus oblongis glabriusculis, pedunculis glanduloso-hispidis, aculeis caulinis confertis un-

cinatis, petiolis aculeatis foliolisque subtus pubescentibus. *Volhynia.* (R. Ratomsciana Bess.)

rubella Sm. 30. R. germinibus globosis pedunculisque solitariis glanduloso-hispidis, aculeis caulis humilis sparsis rectis setisque glanduliferis, foliolis subrotundis obtusis glanduloso-serratis. *Anglia.* (R. polyphylla W.)

livescens Bess. 31. R. germinibus oblongis utrinque attenuatis pedunculisque glanduloso-hispidis, caule pruinoso humili petiolisque remote aculeatis, aculeis rectiusculis, foliolis ellipticis acutis glabris 2serratis subtus glaucis. *Ad Tyram fl. . . Caucas.* (R. arguta Muss. Puschk. in W. herb.)

balsamica W. 32. R germinibus oblongis utrinque attenuatis hispidissimis, ramis inermibus, petiolis subaculeatis, foliolis duplicato-serratis subtus pubescentibus. *Patria?*

stricta Mühlb. Lindl. 33. R. germinibus oblongis glabris maculatis, fructibus pendulis, pedunculis ramisque inermibus setosis, petiolis aculeatis, foliolis glaucescentibus. *Amer. bor.*

suavis W. 34. R. germinibus oblongis glabris, pedunculis petiolisque hispidulis, foliolis subrotundis duplicato-serratis glabriusculis, aculeis ramorum confertissimis rectis, ramulorum duplicibus. *Patria?*

acicularis Lindl. 35. R. germinibus obovatis glabris, laciniis calycis conniventibus, pedunculis petiolisque pubescentibus, aculeis sparsis acicularibus rectis, foliolis glaucis rugosis. *Sibir.*

*horrida** 36. R germinibus subglobosis glabris, pedunculis hispidis, aculeis ramorum confertissimis duplicibus rectis, petiolis inermibus pubescentibus, foliolis oblongis simpliciter serratis utrinque glaberrimis. *Patria?* (R. viminea Lindl.)

sulfurea Ait. 37. R. germinibus hemisphaericis turgidis glabris, pedunculis petiolisque nudiusculis, aculeis ramorum duplicibus confertis, foliolis simpliciter dentatis subtus glaucis. *Asia med.?*

lutescens Pursh. 38. R. germinibus globosis pedunculisque glabris, aculeis ramorum confertissimis gracilibus setisque, petiolis inermibus, foliolis ovalibus simpliciter serratis glabris. *Sibir.*

spinosissima 39. R. germinibus globosis glabris pedunculisque glabriusculis, aculeis ramorum duplicibus confertis reflexis, majoribus falcatis basi latis, petiolis aculeatis, foliolis simpliciter serratis glabris. *Europ. Asia med.* (R. pimpinellifolia L., altaica W., ochroleuca Sw. varr.)

melanocarpa Link. 40. R. germinibus globosis pedunculisque hispidissimis, aculeis ramorum subaequalibus confertissimis reflexis, petiolis inermibus, foliolis simpliciter serratis glabris. *Podolia. Volhynia.* (R. microcarpa Bess.)

oxyacantha M. B. 41. R. germinibus globosis glabris, pedunculis villoso-glandulosis, fructiferis subreflexis, aculeis ramorum e lata basi setaceis contertis, petiolis

aculeatis, foliolis simpliciter serratis glabris. *Sibir.* (R. grandiflora Lindl.?)

flava Wikstr. 42. R. germinibus globosis pedunculisque hispidis, aculeis ramorum confertissimis subsetaceis, petiolis aculeatis, foliolis subtus pubescentibus. *Patria?*

myriacantha Cand. 43. R. germinibus globosis pedunculisque hispidis, aculeis ramorum confertissimis inaequalibus rectis, majoribus elongatis, petiolis subaculeatis, foliolis minutis orbiculatis. *Gallia. Tauria.*

nankinensis Lour. 44. R. germinibus ovatis glabris, pedunculis hispidis, aculeis ramorum confertis, foliolis oblongis acutis serrato-ciliatis. *China.*

involuta Sm. 45. R. germinibus globosis pedunculis petiolisque hispidissimis, aculeis ramorum confertis rectis setisque glanduliferis, foliolis ellipticis duplicato-serratis, venis subtus pubescentibus. *Scotia. Hebrides.*

reversa Kit. 46. R. germinibus ovatis pedunculisque hispidis, aculeis ramorum confertis setaceis reflexis, petiolis villosis subinermibus, foliolis subtus pubescentibus. *Hungar.*

Sabini Woods. 47. R. germinibus globosis pedunculisque hispidis, aculeis ramorum subconfertis rectiusculis, petiolis villosis hispidulis, foliolis glanduloso-serrulatis subtus pubescentibus. *Scotia.*

Doniana Woods. 48. R. germinibus globosis pedunculisque hispidis, aculeis ramorum confertis setaceis, petiolis aculeatis, foliolis duplicato-serratis utrinque villosis. *Scotia.* (R. Sabini β. Lindl.)

6. *Centifoliae: aculeis difformibus, floribus bracteatis, foliis rugosis.*

damascena 49. R. germinibus clavatis elongatis pedunculisque subcorymbosis glanduloso-hispidis, laciniis calycis reflexis, ramis viridibus, aculeis subconfertis validis inaequalibus, petiolis aculeatis, foliolis subtus pubescentibus. *Syria?* (R. bifera Poir., belgica Mill., calendarum Ser.)

centifolia 50. R. germinibus ovatis pedunculisque subgeminatis hispidis, aculeis ramorum sparsis, ramulis petiolisque inermibus, foliolis subtus pubescentibus. *Caucas. Macedonia.* (R. provincialis Ait. R. muscosa Ait., pomponia Cand., burgundiaca Pers., apiifolia W. varr.)

gallica 51. R. germinibus ovatis pedunculisque glanduloso-hispidulis, aculeis ramorum subdeciduis sparsis, petiolis aculeatis, foliolis subcoriaceis rugosis. *Europ. med. Caucas.* (R. pumila L. suppl. var. humilis, aculeis setaceis confertis, radice repente. R. Polliniana*.)

pulchella W. 52. R. germinibus obovatis pedunculisque glandulosis, caule humili, aculeis sparsis, petiolis inermibus villosis, foliolis ellipticis acutis glanduloso-serratis subtus pubescentibus. *Gallia.*

parcifolia Ehrh. 53. R. germinibus ovatis glabriusculis, pedunculis glandulosis, petiolis cauleque humili graciliter aculeatis, foliolis ovatis rugosis glanduloso-serratis. *Gallia orient.* (R. remensis Cand., burgundiaca C. C. Gmel.)

turbinata Ait. 54. R. germinibus campanulatis pedunculisque glanduloso-hispidis, aculeis ramorum sparsis recurvis, petiolis villosis inermibus, foliolis duplicato-serratis subtus pubescentibus. *Patria?* (R. campanulata Ehrh., francofurtana Borkh., inermis et Rosenbergiana Red.)

7. *Villosae; foliis pilosis, serraturis divergentibus, aculeis rectiusculis.*

villosa 55. R. germinibus depresso-globosis pedunculisque glanduloso-hispidis, laciniis calycis subdivisis, aculeis ramorum gracilibus rectiusculis sparsis, petiolis subaculeatis glanduloso-setosis, foliolis obtusiusculis utrinque villosis. *Europ. Asia med.* (R. mollis Sm., tomentosa β. Lindl., pulchella et heterophylla Woods.)

tomentosa Sm. 56. R. germinibus ellipticis pedunculisque glanduloso-hispidis, laciniis calycis alternatim pinnatis, aculeis gracilibus subrecurvis sparsis, petiolis subaculeatis glanduloso-pubescentibus, foliolis acutis utrinque villosis. *Europ.* (R. villosa Ehrh., molliffima Borkh., scabrinscula et subglobosa Sm., agrestis C. C. Gmel., foetida Bât. Cand. Red., dimorpha Beff. est var. aculeis ramorum deciduis.)

gracilis Woods. 57. R. germinibus globosis pedunculisque glanduloso-hispidis, laciniis calycis indivisis, aculeis ramorum subgeminis subrecurvis sparsisque setis glandulosis, petiolis pubescentibus subaculeatis, foliolis utrinque villosis. *Europ.* (R. villosa engl. bot., pomifera Borkh. Fries.)

*Ledebourii** 58. R. germinibus ovatis glaucis pedunculisque aculeolatis, ramis glabris petiolisque pubescentibus inermibus, foliolis obtusis duplicato-serratis utrinque villosis. *Caucas.* (R. mollis Ledeb.)

Andrzeiovii Stev. 59. R. germinibus globosis pedunculisque setoso-aculeatis, laciniis calycis pinnatifidis, aculeis ramorum confertis rectis, petiolis aculeatis, foliolis parvis duplicato-glanduloso-serratis utrinque villosis. *Volhynia.*

terebinthacea Beff. 60. R. germinibus oblongis utrinque attenuatis pedunculisque composito-corymbosis setoso-hispidis, laciniis calycis lanceolatis emarginatis, aculeis ramorum rectis compressis, petiolis pubescentibus, foliolis subtus tomentosis. *Ad fl. Tyram.*

farinosa Rau. 61. R. germinibus ovatis pedunculisque solitariis glaberrimis, aculeis caulinis sparsis rectis, petiolis inermibus, foliolis duplicato-serrulatis utrinque incano-tomentosis. *Franconia.*

alba 62. R. germinibus subovatis glabriusculis, pedunculis corymbosis elongatis hispidis, aculeis ramo-

rum sparsis recurvis, petiolis villosis aculeatis, foliolis late ovatis simpliciter serratis subtus villosis. *Europ. Caucas.* (R. leucantha M. B. Friedländeriana Bess. var.)

***montana* Stev.** 63. R. germinibus subovatis glabris, pedunculis hispidis bracteatis, petalis calyce minoribus, aculeis ramorum sparsis recurvis, petiolis villosis aculeatis, foliolis duplicato-serratis subtus pubescentibus. *Tauria. Podolia austr.*

***Boreykiana* Bess.** 64. R. germinibus ovatis glabris, pedunculis corymbosis glanduloso-hispidis, ramis subinermibus glabris, aculeis ramulorum raris recurvis, petiolis aculeatis, foliolis utrinque pubescentibus aequaliter serratis subtus glandulosis. *Podolia austr.*

***hibernica* Sm.** 65. R. germinibus globosis pedunculisque subgeminis glabris, laciniis calycis pinnatifidis, aculeis ramorum raris incurvis, petiolis pubescentibus, foliolis simpliciter serratis, venis subtus villosiusculis. *Hibernia.*

8. *Rubiginosae: foliis glandulosis, aculeis inaequalibus.*

***lutea* Dalech.** 66. R. germinibus globosis pedunculisque glabris, aculeis ramorum sparsis rectis, petiolis recurvo-aculeatis, foliolis acutis duplicato-serratis supra nitidis subtus glandulosis. *Europ.* (R. Eglanteria L., foetida All., chlorophylla Ehrh. punicea Mill. var. bicolor Jacqu.)

rubiginosa 67. R. germinibus ovatis hispidiusculis glabrisve, pedunculis hispidis, aculeis ramorum sparsis validis subrecurvis, petiolis aculeatis, foliolis ovatis duplicato-serratis subtus glanduloso-pilosis. *Europ. Asia med. Amer. bor.* (R. Eglanteria Mill., suavifolia Lightf., suaveolens Pursh., micrantha Sm., umbellata C. C. Gmel., grandiflora et marginata Wallr., glutinosa Schultz., Seraphini Viv., flexuosa et aciphylla Rau., myrtifolia Hall. fil., sepium Thuill., agrestis Sav.)

† *adenophylla* W. 68. R. germinibus ovatis pedunculisque hispidissimis, aculeis ramorum sparsis, petiolis inermibus subglandulosis, foliolis oblongo-lanceolatis utrinque glabris margine glandulosis duplicato-serrulatis. *Patria?*

***pulverulenta* M. B.** 69. R. germinibus ovatis pedunculisque hispidis, aculeis ramorum inaequalibus deciduis, aliis recurvis sparsis, aliis confertis setaceis, petiolis aculeatis villosis, foliolis duplicato-serratis utrinque glandulosis villosis. *Caucas.*

***uncinella* Bess.** 70. R. germinibus oblongis pedunculisque glabris, aculeis ramorum sparsis recurvis, petiolis subaculeatis, foliolis subtus pubescentibus duplicato-serratis utrinque confertim glandulosis. *Volhyn. Tauria.*

***caryophyllacea* Bess.** 71. R. germinibus oblongis pedunculisque glabris, aculeis ramorum aequalibus recurvis sparsis, pe-

tiolis subinermibus, foliolis duplicato-serratis utrinque glandulosis subtus incanis. *Volhynia. Podolia. Iberia.* (R. iberica Stev.)

Klukii Bess. 72 R. germinibus ovatis pedunculisque corymbosis glabris hispidisve, aculeis ramorum sparsis basi dilatatis recurvis, petiolis villosis aculeatis, foliolis 2serratis supra pubescentibus subtus glandulososcabris. *Volhynia. Tauria.* (R. balsamica Bess, et floribunda Stev.)

cuspidata M.B. 73. R. germinibus ovatis pedunculis corymbosis calycibusque hispidis, laciniis calycis pinnatifidis elongatis, aculeis ramorum sparsis validis recurvis, petiolis aculeatis, foliolis ovato-lanceolatis acutis utrinque villosis subtus glandulosis. *Caucas.*

agrestis Sw. 74. R. germinibus oblongis pedunculisque glaberrimis, laciniis calycis longissimis, aculeis ramorum sparsis recurvis, petiolis inermibus foliolisque aequaliter serratis subtus villosis glandulosisque. *Suecia.*

glutinosa Sm. 75. R. germinibus ovato-ellipticis turgidis hispidissimis, pedunculis solitariis abbreviatis, aculeis ramorum duplicibus, aliis validis recurvis, aliis setaceis, ramulis petiolisque glanduloso-tomentosis, foliolis subrotundis duplicato-serrulatis utrinque glanduloso-villosiusculis viscosis. *Creta. Sicilia.* (R. rubiginosa cretica. Red.)

trachyphylla Rau. 76. R. germinibus ovatis apice constrictis glabris, pedunculis aggregatis hispidis, aculeis ramorum raris inaequalibus recurvis, petiolis sparse glandulosis subaculeatis, foliolis duplicato-serratis utrinque glabris, venis subtus rare glandulosis. *Francoma.*

9. *Caninae: foliis eglandulosis conniventi-serratis, aculeis aequalibus aduncis, laciniis calycis deciduis.*

canina 77. R. germinibus ovatis pedunculisque aggregatis glabris, laciniis calycis pinnatifidis, aculeis ramorum sparsis validis recurvis, petiolis subaculeatis, foliolis simpliciter serratis utrinque glabris. *Europ. Asia.* (R. senticosa Achar. Swartziana et Afzeliana Fries, armata Stev., calycina M. B.)

collina Jacqu. 78. R. germinibus ovatis basi pedunculisque glanduloso-hispidis, aculeis ramorum sparsis recurvis, petiolis glandulosis subaculeatis, foliolis subsimpliciter serratis supra glaberrimis subtus villosis. *Europ.* (R. Forsteri Sm., bractescens Woods, taurica M. B., solstitialis Bess., campestris Sw., leucantha Lois.)

dumetorum Thuill. 79. R. germinibus ovatis pedunculisque glabris, aculeis ramorum sparsis recurvis, petiolis glandulosis subaculeatis, foliolis subduplicato-serratis utrinque villosis. *Europ.* (R. Borreri Woods, sepium et corymbifera Borkh. sepincola Sw.)

caeſia Sm. 80. R. germinibus ellipticis pedunculisque ſolitariis glabris, aculeis ramorum ſparſis recurvis, petiolis pubeſcentibus ſubinermibus, foliolis inaequaliter ſerratis ſubtus glaucis pubeſcentibus. *Anglia. Podolia. Suecia. Tauria.* (R. glauca Schott., glauceſcens Beſſ. var.? Et armis et pube magis carent.)

caucaſica M. B. 81. R. germinibus ovatis pedunculisque umbellatis glabris, aculeis ramorum ſparſis reflexis, petiolis aculeatis, foliolis duplicato-ſerratis utrinque pubeſcentibus. *Caucaſ.*

frondoſa Stev. 82. R. germinibus oblongis pedunculisque ſolitariis glaberrimis, laciniis calycis elongatis omnibus pinnatis, ramis inermibus laevibus, ſtipulis membranaceis, foliolis ovatis ſimpliciter ſerratis utrinque glaberrimis. *Podol. auſtr.*

turbinella Sw. 83. R. germinibus depreſſo-globoſis pedunculisque aggregatis glaberrimis, laciniis calycis integerrimis villoſis elongatis, aculeis ramorum raris ſubrecurvis, petiolis inermibus foliolisque aequaliter dentatis ſubtus incano-villoſis. *Suecia.*

venoſa Sw. 84. R. germinibus ovatis pedunculisque glabris, laciniis calycis elongatis ſubinciſis margine tomentoſis, aculeis ramorum ſparſis validis recurvis, petiolis inermibus foliolisque duplicato-ſerratis venoſis ſubtus glaberrimis glauceſcentibus. *Suecia.*

Jundzillii Beſſ. 85. R. germinibus ovatis baſi pedunculisque hiſpidis, aculeis ramorum raris recurvis, petiolis glanduloſo-villoſis aculeatis, foliolis glanduloſo-2ſerratis ſubtus glauceſcentibus villoſiusculis. *Volhynia. Tauria. Caucaſ.* (R glanduloſa et nitidula Beſſ.)

coriifolia Fries. 86. R. germinibus globoſis pedunculisque ſolitariis abbreviatis glabris, aculeis ramorum ſparſis recurvis, petiolis inermibus villoſis, foliolis coriaceis opacis inaequaliter ſerratis ſubtus villoſis. *Suecia. Dania.* (R. craſſifolia Liljebl., ſepium Sw.)

baltica Roth. 87. R. germinibus globoſis baſi pedunculisque glanduloſo-hiſpidis, bracteis coloratis, aculeis ramorum rectis, petiolis ſubinermibus piloſis, foliolis ſimpliciter ſerratis ſubtus pubeſcentibus. *Ad litus maris baltici circa Roſtochium.*

ſaxatilis Stev. 88. R. germinibus ovatis pedunculisque ſubcorymboſis hiſpidiſſimis, aculeis ramorum ſparſis recurvis, petiolis aculeatis glanduloſis, foliolis duplicato-ſerratis utrinque glabriusculis. *Podolia. Tauria.*

rubrifolia Vill. 89. R. germinibus ovatis pedunculisque corymboſis glabris, bracteis coloratis, aculeis ramorum ſparſis recurvis, petiolis aculeatis, foliolis ſimpliciter ſerratis utrinque glabris ſubtus ſubcoloratis. *Europ. med.*

microphylla Roxb. 90. R. germinibus ſubglobuloſis hiſpidiſſimis, aculeis ramorum raris, petiolis ſubaculeatis, foliolis minutis ovatis ſerrulatis nitidis glaberrimis. *China.*

ſericea Lindl. 91. R. germinibus ſubclavatis pedunculisque ſolitariis glabris, aculeis ramorum ſparſis ſubſtipulari-

bus validis suberectis, stipulis connatis patentibus integerrimis, petiolis aculeatis, foliolis exiguis oblongis apice dentatis subtus sericeis. *Nepal.*

indica 92. R. germinibus ovatis pedunculisque subcorymbosis glabris, aculeis ramorum raris recurvis, petiolis subaculeatis, foliolis coriaceis ovato-lanceolatis simpliciter serratis supra nitidis subtus glaucis. *China.* (R. longifolia W., sinica Sm.)

semperflorens Curt. 93. R. germinibus oblongis glabris, pedunculis solitariis glanduloſis, aculeis ramorum raris debilibus recurvis, petiolis subinermibus, foliolis membranaceis ovato-lanceolatis crenato-serratis subtus glaucis. *China.* (R. indica Red., chinensis Jacqu., diversifolia Vent., bengalensis Pers.)

Montezumae Humb. 94. R. germinibus ellipticis pedunculisque solitariis glabris, ramis inermibus, petiolis aculeatis, foliolis ovatis argute serratis glabris. *Mexico.* (R. mexicana W. herb.)

Lawrenceana Sweet. 95. R. germinibus oblongis pedunculisque glabris, fructibus oligospermis, petalis spathulatis acutiusculis, petiolis aculeatis, foliolis lanceolatis argutissime serrulatis. *China?*

10. *Systylae: stylis coalitis.*

systyla Woods. 96. R. germinibus oblongis glabris, pedunculis subternis hispidiusculis, aculeis ramorum sparsis validis recurvis, petiolis subaculeatis, foliolis ovato-lanceolatis subtus piloſiusculis. *Anglia. Gallia.* (R. collina Sm., stylosa, breviſtyla et 2bracteata Cand.)

arvensis 97. R. germinibus oblongis glabris, pedunculis subaggregatis glabriusculis, ramis proſtratis repentibus, aculeis sparsis subreflexis, petiolis subaculeatis, foliolis ovato-lanceolatis utrinque glabris opacis inaequaliter serratis. *Europ.* (R. tuguriorum W., repens C. C. Gmel., montana Vill., sarmentacea Woods., Herporrhodon et serpens Ehrh., sylvestris Poll., geminata Rau. R. Czackiana Bess.?)

abyssinica R. Br. 98. R. germinibus oblongis pedunculisque corymbosis tomentoſis, laciniis calycinis integerrimis, aculeis ramorum scandentium confertissimis validis subfalcatis, petiolis aculeatis, foliolis obovatis simpliciter serratis sempervirentibus. *Abyssinia.*

sempervirens 99. R. germinibus oblongis pedunculisque corymbosis glanduloſo-hispidulis, bracteis coloratis subintegerrimis, aculeis ramorum scandentium sparsis subreflexis, petiolis subinermibus, foliolis utrinque glabris sempervirentibus nitidis aequaliter serratis. *Europ. austr.* (R. balearica Pers., scandens Brot. atrovirens Viv., microphylla Desf., proſtrata Cand.)

multiflora Thunb. 100. R. germinibus ovatis pedunculisque corymbosis villoſissimis inermibus, ramis scandentibus flexuoſis, aculeis stipularibus subrecurvis, stipulis pintifidis, petiolis foliolisque subtus villoſis. *Japon. China.* (R. florida Poir.)

*Brownii** 101. R. germinibus oblongis pedunculisque corymbosis glanduloso-villosis, laciniis calycis stipulisque integerrimis, aculeis ramorum sparsis latissimis recurvis, petiolis subaculeatis, foliolis lanceolatis simpliciter serratis utrinque pubescentibus. *Nepal.* (R. Brunonii Lindl.)

moschata Mill. 102. R. germinibus ovatis pedunculisque paniculatis villoso-tomentosis, bracteis stipulisque integerrimis ciliatis, aculeis ramorum sparsis reflexis, petiolis villosis aculeatis, foliolis simpliciter serratis subtus glaucis subpubescentibus. *Afr. bor. Madera.* (R. Opsostemma Ehrh. Noisettiana Red.)

rubifolia R. Br. 103. R. germinibus globosis pedunculisque solitariis glabris, aculeis ramorum abbreviatis recurvis, foliolis simpliciter serratis utrinque glabris. *Amer. bor.*

11. *Banksiae: scandentes, foliis ternatis, stipulis liberis subdeciduis.*

laevigata Mx. 104. R. germinibus ovatis pedunculisque solitariis hispidissimis, aculeis ramorum subgeminatis falcatis, petiolis inermibus foliolisque coriaceis lucidis glaberrimis. *Georgia.*

sinica R. Br. 105. R. germinibus ovatis pedunculisque solitariis hispidis, aculeis ramorum sparsis recurvis, petiolis aculeatis, foliolis simpliciter serratis lucidis glaberrimis. *China.* (R. ternata Poir., nivea Caud. Red.)

setigera Mx. 106. R. germinibus globosis pedunculisque hispidis, laciniis calycis pennatim setigeris, aculeis stipularibus recurvis, petiolis aculeato-setosis, foliolis simpliciter serratis glabris. *Virginia. Carolina.*

Hystrix Lindl. 107. R. germinibus oblongis pedunculisque solitariis setosissimis, laciniis calycis rigidis erectis aculeatis, aculeis ramorum inaequalibus, majoribus recurvis, minoribus confertis setaceis, petiolis aculeatis, foliolis simpliciter serratis lucidis glabris. *China. Japon.*

microcarpa Lindl. 108. R. germinibus globosis pedunculisque corymbosis glabris, stipulis bracteisque subnullis, aculeis ramorum aequalibus recurvis, petiolis inermibus, foliolis lanceolatis simpliciter serratis lucidis. *China.*

Banksiae R. Br. 109. R. germinibus depresso-hemisphaericis pedunculisque laxis nutantibus corymbosis glabris, ramis flexuosis inermibus, foliolis simpliciter serratis glaberrimis. *China.*

1875. Anthodiscus Meyer.

trifoliatus Meyer. *Guiana.* Arbor elata foliis ternatis, floribus racemosis virescentibus.

CLASSIS XIII.

POLYANDRIA.

MONOGYNIA.

I. *Flores perfecti.*

1. *Monopetali.*

1876. *Antholoma* Labill. Cal. 4ſepalus. Cor. calyptraeformis crenata. Stigma ſimplex. Frutex 4locularis. *Marcgravieae.*

1877. *Marcgravia.* Cal. 6partitus imbricatus. Cor. calyptraeformis integra. Stamina membranulae perigynae inſerta. Stylus 0. Stigma craſſum. Capſ. baccata ſemimultilocularis. *Marcgravieae.*

1878. *Swartzia* W. Cal. 4ſepalus. Petalum 1 laterale. Legumen oligoſpermum. *Leguminoſae.*

1879. *Fouquiera* Kunth. Cal. 5ſepalus imbricatus. Cor. tubuloſa, limbo 5partito. Stylus apice 3fidus. Germen 1loculare. *Portulaceae?*

1880. *Omphalocarpus* P. B. Cal. imbricatus. Cor. limbo ſub-6fido, fauce ſquamata. Fructus ligneſcens multilocularis, loculis 1ſpermis. *Sapoteae.*

1881. *Dicalyx* Lour. Cal. duplex, ext. 3ſepalus, int. 5dentatus. Cor. 5partita. Stamina corollae inſerta. Drupa 1ſperma, cal. int. coronata.

1882. *Aſteranthus* Desf. Cal. urceolatus multidentatus. Cor. rotata multiloba ciliata. Stam. corollae inſerta. Stylus baſi 6radiatus. Stigmata 6. *Symploceae.*

2. *Tripetali.*

1883. *Doliocarpus* Roland. Cal. 5ſepalus. Filamenta apice dilatata, antherarum loculos discretos utrinque gerentia. Bacca 1locularis ſub-2ſperma. *Dilleniceae.*

1884. *Trilix.* Cal. 3ſepalus. Bacca 5locularis polyſperma. *Roſaceae?*

3. *Tetrapetali.*

1885. *Papaver.* Cal. 2ſepalus caducus. Stylus 0. Capſ. 1locularis apice ſub ſtigmate perſiſtente hians, placentis valvaribus. *Papavereae.*

1886. *Stylophorum* Nutt. Cal. 2ſepalus caducus. Stylus diſtinctus. Stigma capitatum 4lobum. Capſ. elliptica 1locularis 4valvis, valvis revolutis. *Papavereae.*

1887. *Chelidonium.* Cal. 2ſepalus. Stigma 2lobum. Siliqua 1locularis 2valvis, ſemina ſtrophiolata. *Papavereae.*

1888. *Glaucium* Tourn. Cal. 2ſepalus. Stigma 2lobum. Siliqua 2(3-4)locularis, ſepto fungoſo placentifero. *Papavereae.*

1889. *Actaea.* Cal. 4ſepalus caducus. Bacca polyſperma. *Ranunculeae.*

1890. *Grias.* Cal. 4fidus. Stigma urceolatum. Drupa nuce 8ſulca. *Guttiferae?*

1891. *Calophyllum.* Cal. coloratus ſub-4ſepalus. Stigma capitatum. Drupa globoſa. *Guttiferae.*

1892. *Mammea.* Cal. 2ſepalus. Petala coriacea. Stigma capitatum. Bacca 2-4ſperma. *Guttiferae.*

1893. *Sparrmannia* Thunb. Cal. 4ſepalus. Stamina plurima exteriora abortientia. Capſ. echinata 5locularis, loculis 2ſpermis. *Tiliaceae.*

1894. *Capparis.* Cal. 4partitus. Siliqua baccata ſtipitata. *Capparideae.*

4. *Pentapetali.*

a. *Fructibus ſuperis.*

1895. *Arſis* Lour. Cal. 5ſepalus coloratus deciduus. Antherae 4loculares. Bacca ſtipitata 1ſperma. *Capparideae.*

1896. *Shorea* Roxb. Cal. 5fidus. Antherae mucronatae. Capſ. 1ſperma ſtylo coronata, calyce alato veſtita. *Familia?*

1897. *Tilia.* Cal. 5partitus, pedicello bracteato. Petala ſubinde duplicata. Antherae didymae. Stigma 5fidum. Capſ. coriacea 5locularis 5ſperma non dehiſcens. *Tiliaceae.*

1898. *Brownlowia* Roxb. Cal. 5partitus. Nectaria 5 linearia perigyna. Capſ. 3 2valves 1ſpermae. *Tiliaceae.*

1899. *Dipterocarpus* Gärtn. Cal. 5dentatus, dentibus 2 elongatis. Antherae ſubulatae elongatae. Capſ. 1ſperma, calyce alato veſtita. *Tiliaceae.*

1900. *Diplophractum* Desf. Cal. 5ſepalus tomentoſus. Petala baſi ſquamata. Stigmata 5. Capſ. 5locularis 10locularis 10ſperma. *Tiliaceae.*

1901. *Grewia.* Cal. 5partitus coloratus. Petala baſi ſquamata ſ. glandulifera. Stigma lobatum. Drupa nucibus 4 2locularibus 2ſpermis. *Tiliaceae.*

1902. *Columbia* Perſ. Cal. 5ſepalus. Petala baſi ſquamata. Fructus 4alatus 4locularis, loculis 1-2ſpermis. *Tiliaceae.*

1903. *Muntingia.* Cal. 5partitus. Stylus ſulcatus. Bacca multilocularis polyſperma. *Tiliaceae.*

1904. *Aubletia* Schreb. Cal. 5partitus. Antherae apice foliaceae. Stigma infundibuliforme. Capſ. coriacea multilocularis, loculis polyſpermis. *Tiliaceae.*

1905. *Alegria* Seſſ. Involucrum 10-12phyllum. Cal. 5ſepalus. Stamina exteriora abortientia. Stigmata 5. Capſ. 5locularis 5valvis, valvis medio ſeptiferis. Semina alata. *Tiliaceae.*

1906. *Berria* Roxb. Cal. 5partitus irregularis. Stigma 3gono-capitatum. Capſ. 3locularis 3valvis, valvis ſingulis dorſo 2alatis medio ſeptiferis. *Tiliaceae.*

1907. *Corchorus.* Cal. 5ſepalus deciduus. Stigm. 1-3. Capſ. ſiliquaeformis 2-5locularis: ſemina angulata ſeptata. *Tiliaceae.*
1908. *Ciſtus.* Cal. 5partitus ſubaequalis. Stigma capitatum. Capſ. 5locularis, loculis oligoſpermis. *Ciſteae.*
1909. *Helia nthemum* Tourn. Cal. 5partitus inaequalis ſ. 3partitus, ſepalis exterioribus acceſſoriis anguſtioribus. Capſ. 1locularis 3valvis polyſperma. *Ciſteae.*
1910. *Bixa.* Cal. 5ſepalus. Capſ. ſetoſo-hiſpida 1locularis 2valvis, ſeminibus ſubdenis farina colorata involutis. *Bixeae* Kunth.
1911. *Weihea* *. Cal. 5partitus. Pet. fimbriata. Capſ. baccata 3locularis, loculis 2-3ſpermis. *Familia?*
1912. *Sarcochlaena* Thuar. Involucrum carnoſum urceolatum. Cal. 3ſepalus. Urceolus ſtamina cingens. Capſ. 3locularis 6ſperma involucro baccato cincta. *Chlaenaceae.*
1913. *Schizochlaena* Thuar. Involucrum membranaceum 2florum fimbriatum. Cal. 3ſepalus. Antherae adnatae. Capſ. 3locularis polyſperma, involucro ampliato incluſa. *Chlaenaceae.*
1914. *Rhodochlaena* Thuar. Bracteae 2 loco involucri. Cal. 3ſepalus carnoſus glutinoſus. Petala ſub-6na. Antherae 4angulae adnatae. Ovarium 3loculare polyſpermum. *Chlaenaceae.*
1915. *Ternſtrömia* L. ſuppl. Bracteae 2 loco involucri. Cal. 5ſepalus. Stam. duplici ſerie. Bacca 2locularis, loculis 3ſpermis. *Ternſtrömieae* Mirb.
1916. *Cleyera* Thunb. Bracteae 2 loco involucri. Cal. 5ſepalus. Antherae adnatae retrorſum hiſpidae. Stigm. 2, 3. Bacca 2-3-locularis. *Ternſtrömieae.*
1917. *Freziera* Sw. Bracteae 2 loco involucri. Cal. 5ſepalus. Antherae terminales glabrae ovatae. Stigma 3fidum. Bacca 3-5-locularis. *Ternſtrömieae.*
1918. *Cochloſpermum* Kunth. Cal. 5ſepalus inaequalis perſiſtens. Antherae acuminatae. Capſ. 5locularis polyſperma. Semina cochleata lanigera. *Ternſtrömieae?*
1919. *Ochna.* Cal. 5ſepalus. Antherae 2loculares. Drupae 5 1ſpermae gynobaſi inſertae. *Ochneae.*
1920. *Delima.* Cal. 5ſepalus. Capſ. membranacea 1locularis 2valvis: ſemina baccata. *Dillenieae.*
1921. *Taſmannia* R. Br. Flores dioeci. Cal. 2-3partitus. Fructus membranaceus 1locularis polyſpermus. *Magnolieae.*
1922. *Aegle* Corr. Cal. 5dentatus deciduus. Antherae lineares elongatae mucronatae. Fructus baccatus multilocularis, pulpa carnoſa demum excreſcente. *Aurantia.*
1923. *Bonnetia* Schreb. Cal. 5ſepalus imbricatus. Capſ. 3valvis polyſperma, valvis introflexis placentiferis. *Guttiferae.*
1924. *Cluſia.* Cal. imbricatus 4-5-8ſepalus. Pet. 4, 5, 6-8. Stigma radiato-peltatum. Capſ. coriacea 4-5-8valvis, valvis introflexis placentiferis. *Guttiferae.*
1925. *Sterbeckia* Schreb. Cal. 3-5partitus. Petala ſerrulata. Stigma capitatum. Capſ. cylindrica polyſperma. Sem. pulpa involuta. *Guttiferae.*
1926. *Vateria.* Cal. 5partitus. Antherae ſubulatae. Capſ. 3valvis 1ſperma. *Guttiferae?*
1927. *Aſcium* Schreb. Bractea cuculliformis pedicello adnata. Cal. coriaceus 5partitus. Bacca polyſperma. *Marcgravieae.*
1928. *Legnotis* Sw. Cal. 4-5partitus. Pet. inciſa fimbriata. Antherae oblongae. Capſ. 3locularis 3ſperma. *Elaeocarpeae.*

1929. *Vallea* Mut. Cal. 5partitus. Pet. 3loba. Antherae lineares basi affixae apice poro gemino dehiscentes. Stylus 3fidus. Capf. fublignosa muricata 5locularis, loculis 2spermis. *Elaeocarpeae.*

1930. *Myrodendron* Schreb. Cal. 5partitus. Antherae 2loculares. Stigma 5lobum. Ovarium 5loculare. *Familia?*

1931. *Lemniscia* Schreb. Cal. 5dentatus. Pet. linearia nectario cum staminibus adnata. Stigma obtusum. Ovarium 5loculare. *Familia?*

1932. *Sarracenia.* Cal. duplex deciduus, ext. 3- int. 5sepalus coloratus. Stigma latum peltatum. Capf. 5locularis polyfperma, placenta 5angularis centralis. *Familia?*

b. *Fructibus fubinferis.*

1933. *Loafa* Adanf. Cal. 5partitus. Pet. patentia, cum fquamis 2lobis alternantia. Stam. exteriora abortientia, interiora in phalanges dispofita. Antherae 2loculares. Stylus 3fidus. Capf. 1locularis apice 3valvis polyfperma. *Loafeae.*

1934. *Mentzelia.* Cal. 5partitus. Pet. limbo calycis inferta. Stamina exteriora longiora basi dilatata, interiora in phalanges dispofita. Antherae 2loculares. Stylus 3fidus. Capf. 1locularis apice 3valvis oligofperma. *Loafeae.*

5. *Flores* 6-10*petali.*

1935. *Mayna* Aubl. Flores dioeci. Cal. 3dentatus. Pet. 8. Antherae 4angulae. Bacca grandis polyfperma externe folioſa. *Familia?*

1936. *Heptaca* Lour. Flores polygami. Cal. 3fepalus. Pet. 10 fubrotata. Stigma 7partitum. Bacca 7locularis polyfperma. *Familia?*

1937. *Decadia* Lour. Cal. 3fepalus perfiftens. Pet. 10 fubferrata. Antherae 2lobae. Drupa nuce 3loculari. *Familia?*

1938. *Bruguiera* Lam. Cal. fuperus 10-12partitus. Pet. 10-12 conduplicata, fingula ftamina bina basi ferentia. Fructus 1fpermus angulatus, radicula longiffima germinante. *Rhizophoreae.*

1939. *Alangium* Juff. Cal. fuperus 6-10dentatus. Pet. 6. 10. Bacca corticofa 2-fperma. *Myrteae.*

1940. *Lecythis.* Cal. fuperus 6lobus. Pet. 6 calyci inferta. Difcus annularis intus ftaminibus obfitus, hinc dilatatus in ligulam membranaceam papillofo-lamellatam. Fructus lignofus operculatus fub-4locularis, loculis oligofpermis. *Myrteae.*

1941. *Lagerftrömia.* Cal. 6fidus campanulatus. Pet. 6 calyci inferta unguiculata. Stam. 6 exteriora crafſiora longiora. Capf. ſtylo coronata 6locularis. *Salicariae?*

1942. *Thea.* Cal. 5partitus obtufus inferus. Pet. 6. Antherae cordatae dorfo affixae. Stylus 3fidus. Capf. 3locularis 3fperma. *Camellieae* Cand.

1943. *Efpera* W. Cal. 5partitus. Pet. 6 perfiftentia. Capf. 4-6-alata 4-6locularis, loculis 1fpermis. *Tiliaceae.*

1944. *Sanguinaria.* Cal. 2fepalus deciduus. Pet. 8-12. Stigmata 2. Capf. 1locularis 2valvis. *Papavereae.*

1945. *Argemone.* Cal. 3fepalus deciduus. Pet. 6. Styl. 0. Stigma 5lobum. Capf. 1locularis femivalvata, apice placentis filiformibus fornicatis. *Papavereae.*

1946. *Podophyllum.* Cal. 3fepalus. Pet. 6-9. Bacca fubcarnoſa 1locularis. *Podophylleae* Cand.

1947.

1947. *Monodora* Dun. Cal. 3partitus. Pet. 6, interna craſſiora. Stigma ſeſſile. Bacca 1locularis polyſperma. *Anoneae.*

6. *Flores polypetali.*

1948. *Oncoba* Forsk. Cal. 4partitus. Pet. 12, ext. longiora. Bacca globoſa 6-12locularis polyſperma. *Familia?*

1949. *Ventenatia* P. B. Cal. 3ſepalus. Pet. 12 ſpathulata. Stigma ſub-5lobum. Bacca 5locularis polyſperma. *Familia?*

1950. *Nymphaea.* Cal. 4-5ſepalus. Stamina exteriora dilatata, omnia germini inſerta. Stigma ſtellato-radiatum medio glanduliferum. Bacca multilocularis. Semina membrana reticulata laxe obvoluta. *Nymphaeae.*

1951. *Euryale* Salisb. Cal. 4ſepalus. Petala cum ſtaminibus germini inſerta. Bacca multilocularis. *Nymphaeae.*

1952. *Nuphar* Sm. Cal. 5-6ſepalus. Stamina cum petalis receptaculo inſerta. Stigma ſtellatum. Bacca multilocularis. Semina nuda. *Nymphaeae.*

7. *Flores imperfecti.*

1953. *Thylacium* Lour. Calyptra conica ante antheſin clauſa, dein medio rupta, inferiore parte calycem ſiſtit. Cor. 0. Capſ. ſtipitata 6-10valvis: ſemina reniformia in pulpa nidulantia. *Capparideae.*

1954. *Maerua* Forsk. Cal. 4partitus fauce corona petaloidea. Cor. 0. Siliqua ſtipiti innata, cui et ſtamina inſerta. *Cappariderae.*

1955. *Ryania* Vahl. Cal. coloratus 5ſepalus perſiſtens. Cor. 0. Urceolus perigynus. Stigm. 4. Bacca polyſperma. *Flacourtieae* Rich.

1956. *Patriſia* Rich. Cal. coloratus 5ſepalus perſiſtens. Cor. 0. Urceolus 0. Fructus capſularis 3-5valvis. *Flacourtieae.*

1957. *Flacourtia* Commerſ. Flores dioeci. Cal. ſub-5partitus. Cor. 0. Stigma ſeſſile radiatum. Bacca multilocularis, loculis 2ſpermis, ſeminibus oſſeis. *Flacourtieae.*

1958. *Roydſia* Roxb. Cal. 6partitus. Cor. 0. Stam. columnulae inſerta. Germen pedicellatum. Drupa nuce 3valvi 1ſperma. *Familia?*

1959. *Seguiera.* Cal. 5ſepalus perſiſtens. Cor. 0. Capſ. 4alata 1ſperma. *Familia?*

1960. *Rheedia.* Cor. calycina 4petala. Stylus elongatus, ſtigmate infundibuliformi. Bacca 3ſperma. *Guttiferae.*

1961. *Chloromyron* Perſ. Cal. coloratus 6ſepalus. Cor. 0. Stigma ſeſſile 3lobum. Capſ. 3ſperma. *Guttiferae.*

1962. *Xyloſma* Forſt. Flores dioeci. Cal. 5partitus. Cor. 0. Urceolus crenulatus ſtamina cingens. Stigma ſubſeſſile 3lobum. Bacca ſub-2ſperma. *Guttiferae.*

1963. *Davilla* Vand. Cal. 5ſepalus inaequalis, ſepalis 2 interioribus corollinis maximis genitalia includentibus. Fructus 1ſpermis ſepalis tectus. *Dillenieae.*

1964. *Sloanea.* Cal. 4-7ſepalus. Antherae longiſſimae ſubſeſſiles. Stylus filiformis. Capſ. echinata 4-5locularis 4-5valvis, loculis ſub-3ſpermis, ſeminibus arillo carneo cinctis. *Tiliaceae.*

1965. *Azara* R. et P. Cal. 4-6partitus. Cor. 0. Stamina plurima abortientia. Antherae 2loculares. Bacca polyſperma. *Bixeae* Cand.

1966. *Ludia* Commerſ. Cal. ſub-5lobus. Cor. 0. Stigma 3fidum. Bacca globoſa ſtylo coronata 6-8ſperma. *Bixeae.*

1967. *Prockia* P. Brown. Cal. 3-5ſepalus perſiſtens. Stigma varium. Bacca ſicca oligo- ſ. polyſperma. *Bixeae.*

1968. *Laetia.* Cal. 5ſepalus. Capſ. carnoſa 3-5valvis ſtylo coronata polyſperma. Semina arillata. *Bixeae.*

1969. *Pariana* Aubl. Flores diclini. Cal. 2valvis. Cor. 2valvis. Stigm. 2. Semen triquetrum. *Gramineae.*

1970. *Evandra* R. Br. Spicula ſub-1flora, ſquamulis undique imbricatis, plerisque vacuis. Nux cylindrica cruſtacea. *Cyperaceae.*

1971. *Chryſithrix.* Flores diclini capitati laterales. Cal. 0, niſi ſquamae numeroſae paleaceae ſtamina interſtinguentes. Antherae ſubulatae. Stylus filiformis. *Aroideae — Cyperaceae.*

DIGYNIA.

1972. *Curatella.* Cal. 5ſepalus intus corollinus. Pet. 3 ſubcalycina. Styli filiformes. Capſ. 2locularis 2ſperma. *Dillenieae.*

1973. *Hemiſtemma* Juſſ. Cal. 5ſepalus. Cor. 5petala. Stamina 1lateralia, ext. abortientia. Capſ. 2 ſub-1ſpermae. *Dillenieae.*

1974. *Temus* Molin. Cal. 3fidus. Pet. 18 linearia longiſſima. Bacca 2ſperma. *Magnolieae?*

1975. *Bauera* Andr. Cal. 8partitus. Cor. 8petala. Annulus nectarifer perigynus ſtamina gerens. Capſ. 2locularis polyſperma. *Saxifrageae?*

1976. *Poterium.* Flores diclini. Cal. 2ſepalus inferus. Cor. rotata 4fida ſupera. Stigmata penicillata. Capſ. 2locularis 2ſperma. *Roſaceae.*

1977. *Cliffortia.* Flores diclini. Cal. 3fidus. Cor. 0. Antherae didymae. Semina duo calyce tecta. *Roſaceae.*

1978. *Ablania* Aubl. Cal. 4-5partitus perſiſtens. Cor. 0. Styli 2fidi. Capſ. 1locularis 4valvis, placenta centralis. *Guttiferae.*

1979. *Fothergilla.* Cal. integerrimus. Cor. 0. Filamenta clavata. Antherae 2loculares. Capſ. 2locularis 2ſperma, ſeminibus oſſeis. *Familia?*

1980. *Lacis* Schreb. Cal. 0. Cor. 0. Pedicelli baſi bracteati apice ſpinuloſi ſtaminiferi. Capſ. 1locularis 2valvis, placenta centrali. *Familia?*

TRIGYNIA.

1981. *Homalium* Jacq. Cal. ſub-6partitus. Cor. ſub-6petala. Stamina terna aggregata: glandulis nectariferis 6, 7 ad baſin petalorum. Capſ. 1locularis polyſperma. Placentatio valvaris. *Roſaceae?*

1982. *Sauravia* W. Cal. 5partitus. Cor. rotata 5partita vel ſub-5petala. Capſ. 5locularis polyſperma. *Ternſtrömieae.*

1983. *Hibbertia* Salisb. Cal. 5ſepalus, fructifer clauſus. Pet. 5. Capſ. congeſtae 1-2ſpermae. *Dillenieae.*

1984. *Paeonia.* Cal. 5ſepalus. Pet. 5. Ovaria 3-5 in folliculos pleioſpermos abeunt. *Ranunculeae.*

1985. *Delphinium.* Cal. corollinus 5ſepalus, ſepalo ſuper. calcarato. Petala ſub 4, ſuperiora poſtice cornuta. Ovaria 1-5 in folliculos pleioſpermos abeunt. *Ranunculeae.*

1986. *Aconitum.* Cal. corollinus 5ſepalus, ſepalo ſuper. fornicato (*galea*). Nectaria 2ſtipitata cucullata ſub galea, antice in labellum producta. Ovaria 3 in folliculos pleioſpermos abeunt. *Ranunculeae.*

Palmae.

1987. *Lodoicea* Commerſ. Flores dioeci ſpathacei. Cal. 3ſepalus. Cor. 3petala. Drupa 3ſperma. Putamen fibris involutum lobatum. Embryo ſubverticalis?

1988. *Latania* Commerſ. Flores dioeci ſpathacei. Cal. 3partitus. Cor. 3partita. Bacca 3pyrena. Embryo verticalis.

1989. *Ptychoſperma* Labill. Flores hermaphroditi. Cal. 3partitus. Cor. 3petala. Bacca 1ſperma. Embryo baſilaris.

1990. *Seaforthia* R. Br. Flores polygami. Cal. 3partitus. Cor. 3partita. Bacca 1ſperma. Embryo baſilaris.

1991. *Iriartea* R. et P. Flores androgyni ſeſſiles, ſpathis imbricatis. Cal. 3ſepalus. Cor. 3petala. Bacca 1ſperma. Embryo baſilaris.

1992. *Caryota.* Flores monoeci. Cal. 3ſepalus. Cor. 3petala. Bacca 2ſperma. Embryo dorſalis.

1993. *Jubaea* Humb. Flores hermaphroditi pedicellati. Cal. 3partitus. Cor. 3partita. Drupa nuce ſuperne 3forata. Albumen cavum.

1994. *Diplothemium* Mart. Flores androgyni, ſpathis duplicibus. Cal. 3ſepalus. Cor. 3petala. Drupa fibroſa, putamine poris tribus baſilaribus. Embryo intra porum in albumine aequabili.

1995. *Attalia* Humb. Flores androgyni ſeſſiles. Cal. 3partitus. Cor. 3petala. Drupa 3locularis 3ſperma. Putamen baſi 3foratum. Embryo baſilaris in albumine aequabili.

1996. *Gomutus* Rumph. Flores monoeci ſeſſiles. Cal. 3ſepalus. Cor. 3petala. Antherae mucronatae. Bacca 3ſperma. Embryo lateralis.

1997. *Manicaria* Gärtn. Flores androgyni. Spatha reticulato-fibroſa. Cal. 3ſepalus. Cor. 3petala. Drupa 3cocca, cortice ſuberoſo echinato, putamine cruſtaceo baſi 1poro. Embryo baſilaris in albumine cavo.

1998. *Begonia.* Flores monoeci. Cal. 0. Cor. 4petala, petalis oppoſitis majoribus: ♀ ſub-6petala. Styli 3-2fidi. Capſ. infera 3angularis alata 3locularis polyſperma. *Familia?*

1999. *Mallotus* Lour. Flores dioeci. Cal. 3ſepalus. Cor. 0. Antherae 2lobae. Stylus 0. Stigmata 3. Capſ. ſubrotunda 1ſperma 6valvis, valvis ſubſeptiferis, ſemine pedicellato. *Familia?*

TETRAGYNIA.

2000. *Caryocar.* Cal. 5lobus. Pet. 5. Stamina duplici ſerie, interiora baſi ſubcoalita abortientia. Drupa nucleis 1-4 reticulatis. *Rhizoboleae* Cand.

2001. *Pera* Mut. Flores dioeci. Cal. 2ſepalus. Pet. 1 concavum. Squamae nectariferae multifidae. Capſ. 3locularis 3ſperma. *Tricoccae?*

2002. *Marialvea* Vand. Cal. 2ſepalus. Pet. 4. Pomum 4ſpermum. *Guttiferae?*

2003. *Cimicifuga.* Cal. 4-5ſepalus. Pet. 4-5-6 cartilaginea. Capſ. 4, 5 folliculares. *Ranunculeae.*

2004. *Drimys* Forſt. Cal. 2-3partitus. Pet. 6-24. Filamenta breviſſima apice craſſiora. Antherae didymae. Bacçae 4-8 loculares polyſpermae. *Magnolieae.*

2005. *Tetracera.* Cal. 4-6ſepalus imbricatus. Cor. 4-5petala ſ. 0. Filamenta apice dilatata, utrinque antherarum loculos discretos gerentia. Styli ſimplices. Folliculi 2valves ſub-2ſpermi: ſemina arillata. *Dillenieae.*

2006. *Agdeſtis* Seſſ. Cal. 4ſepalus. Cor. 0. Filamenta filiformia: antherae 2fidae medio inſertae. Fructus 4 ſtigmatibus reflexis coronati coaliti. *Meniſpermeae* Cand.

PENTAGYNIA.

2007. *Aquilegia.* Cal. 5ſepalus coloratus. Pet. 5 apice hiantia baſi cornuta. Stam. interiora dilatata abortientia ſubperſiſtentia. Folliculi pleioſpermi. *Ranunculeae.*

2008. *Nigella.* Cal. 5ſepalus corollinus. Pet. 5 2labiata, ungue foveolato nectarifero. Folliculi roſtrati polyſpermi. *Ranunculeae.*

2009. *Laplacea* Kunth. Cal. 4ſepalus imbricatus. Pet. 9 aequalia. Stam. 3ſeriata. Capſ. 5locularis, loculis 3ſpermis: ſemina dorſo alata axi centrali affixa. *Ternſtrömieae.*

2010. *Wormia* Rottb. Cal. 5ſepalus obtuſiſſimus. Pet. 5. Antherae lineares elongatae. Folliculi pleioſpermi. *Dillenieae.*

2011. *Porcelia* R. et P. Cal. 3ſepalus. Pet. 6, interiora majora. Capſulae 3-6 cylindricae coriaceae polyſpermae. *Anoneae.*

2012. *Reaumuria.* Cal. 5partitus. Pet. 5 baſi ſquamis crenatis. Capſ. 5locularis: ſemina lanata. *Aizoideae.*

2013. *Gynocardia* Roxb. Flores dioeci. Cal. 5lobus. Pet. 5 baſi ſquamis nectariferis. Stigmata cordata. Bacca ſicca polyſperma. *Capparideae.*

2014. *Roumea* Poit. Flores dioeci. Cal. campanulatus 4-5partitus. Stamina baſi glandula crenata cincta. Stigmata umbilicata. Bacca ſtylis coronata oligoſperma. *Flacourtieae.*

POLYGYNIA.

1. *Flores perfecti.*

2015. *Sagittaria.* Cal. 3ſepalus. Cor. 3petala. Caryopſes plurimae exalbuminoſae. *Hydrocharideae.*

2016. *Braſenia* Schreb. Cal. 3ſepalus. Cor. 3petala. Capſulae plures 2ſpermae. Embryo operculatus. *Hydrocharideae.*

2017. *Limnocharis* Bonpl. Cal. 3ſepalus. Cor. 3petala. Filamenta ſterilia peripherica. Folliculi plures membranacei polyſpermi. *Hydrocharideae.*

2018. *Nelumbium* W. Cal. 4-5ſepalus. Antherae laterales. Receptaculum ſuberoſum nuculas plurimas in alveis fovet, embryone evoluto. *Nymphaeae.*

2019. *Eucryphia* Cav. Cal. 5ſepalus. Cor. 5petala, initio calyptra tecta. Capſulae plures cymbaeformes polyſpermae axi centrali affixae. *Familia?*

2020. *Carpodon* Labill. Cal. 4ſepalus. Cor. 4petala. Capſ. lignoſa multilocularis: ſeminibus alatis. *Familia?*

2021. *Guatteria* R. et P. Cal. 3partitus. Cor. 6petala. Antherae ſubſeſſiles. Baccae plurimae 1ſpermae. *Anoneae.*

2022. *Xylopia.* Cal. 3-5lobus. Cor. 6petala. Fructus 1-2ſpermi ſubſtipitati. *Anoneae.*

2023. *Artabotrys* R. Br. Cal. 3partitus. Cor. 6petala aequalis. Bacca 2ſperma, ſeminibus juxta ſe poſitis, pedunculo cirrhifero. *Anoneae.*

2024. *Unona.* Cal. 3lobus. Pet. 6, interiora minora. Fructus ſtipitati pleioſpermi. *Anoneae.*

2025. *Uvaria.* Cal. 3partitus. Pet. 6, exteriora minora. Baccae ſtipitatae multiloculares polyſpermae, ſeminibus 2ſeriatis. *Anoneae.*

2026. *Aſimina* Adanſ. Cal. 3partitus. Pet. 6, interiora minora. Antherae ſubſeſſiles. Baccae polyſpermae. *Anoneae.*

2027. *Anona.* Cal. 3partitus. Pet. 6. Antherae ſubſeſſiles. Fructus plures in baccam multilocularem cortice ſquamoſo muricato tectam connatae. *Anoneae.*

2028. *Cadſura* Juſſ. Cal. 3partitus. Pet. 6. Fructus plurimi glomerati 2ſpermi. *Familia?*

2029. *Liriodendron.* Cal. 3ſepalus bracteatus. Pet. 6. Samarae plures in conum aggregatae. *Magnolieae.*

2030. *Magnolia.* Cal. 3ſepalus. Pet. 9 et plura. Antherae laterales. Fructus 2valves 1ſpermi in conum aggregati: ſemina pendula funiculis umbilicalibus longiſſimis. *Magnolieae.*

2031. *Michelia.* Cal. 3ſepalus. Pet. 9 et plura. Antherae laterales. Capſ. baccatae 2valves pleioſpermae discretae. *Magnolieae.*

2032. *Illicium.* Cal. 3-6ſepalus. Pet. 9 et plura. Capſ. 2valves 1ſpermae ſtellatim diſpoſitae. *Magnolieae.*

2033. *Dillenia.* Cal. 5ſepalus. Pet. 5. Capſ. plures polyſpermae in fructum carnoſum coalitae. *Dillenieae.*

2034. *Atragene.* Cal. corollinus 4ſepalus. Pet. linearia. Caryopſes plurimae caudatae. *Ranunculeae.*

2035. *Knowltonia* Salisb. Cal. 5ſepalus. Pet. 5 et plura, unguibus nudis. Caryopſes baccatae. *Ranunculeae.*

2036. *Adonis.* Cal. 5ſepalus. Pet. 5 et plura, unguibus nudis. Caryopſes ſiccae acutae. *Ranunculeae.*

2037. *Ranunculus.* Cal. 5ſepalus. Pet. 5, baſi ſquama nectarifera. Caryopſes compreſſae mucronatae. *Ranunculeae.*

2038. *Hamadryas* Commerſ. Flores dioeci. Cal. 5-6ſepalus. Pet. 10, 12 linearia. Stigmata ſeſſilia. Caryopſes ovatae. *Ranunculeae.*

2. *Flores imperfecti.*

2039. *Trollius.* Cal. corollinus polyſepalus. Nectaria tubuloſa 1labiata. Folliculi plurimi pleioſpermi. *Ranunculeae.*

2040. *Helleborus.* Cal. ſubcorollinus 5ſepalus. Nectaria tubuloſa. Folliculi plures pleioſpermi. *Ranunculeae.*

2041. *Coptis* Salisb. Cal. corollinus 5-6ſepalus. Nectaria tubuloſa. Folliculi plures longe ſtipitati oligoſpermi ſtylo coronati. *Ranunculeae.*

2042. *Cathia.* Cal. corollinus 5ſepalus. Nectaria 0. Folliculi plures pleioſpermi. *Ranunculeae.*

2043. *Anemone.* Cal. corollinus pleioſepalus ſubinvolucratus. Nectaria 0. Caryopſes ecaudatae. *Ranunculeae.*

2044. *Pulſatilla* Tourn. Cal. corollinus 5-6ſepalus. Glandulae ſtipitatae nectariferae ad baſin ſepalorum. Caryopſes caudatae. *Ranunculeae.*

2045. *Clematis.* Cal. corollinus 4-5ſepalus. Nectaria 0. Caryopſes caudatae. *Ranunculeae.*

2046. *Thalictrum.* Cal. corollinus 4-5ſepalus. Nectaria 0. Filamenta elongata ſubdilatata. Caryopſes nudae. *Ranunculeae.*

2047. *Gyroſtemon* Desf. Flores dioeci. Cal. lobatus vel repandus. Cor. 0. Stamina in plures orbes concentricos diſpoſita. Capſ. plures 2valves 1ſpermae in orbem diſpoſitae. *Malvaceae.*

CLASSIS XIII.

POLYANDRIA.

MONOGYNIA.

1876. Antholoma Labill.

montanum Labill. — *Nov. Caledon.* Arbor foliis oblongis coriaceis, floribus corymbosis.

1877. Marcgravia.

umbellata — 1. M. foliis ramorum sterilium cordatis subsessilibus obtusiusculis, floridorum ovato-oblongis acuminatis venosis. *Amer. trop.*

coriacea Vahl. — 2. M. foliis ellipticis coriaceis eveniis. *Guiana.*

picta W. — 3. M. foliis ramorum sterilium cordatis obtusis supra albo-reticulatis. *Brasil.* Hofmannsegg.

spiciflora Rich. — 4. M. foliis obovato-oblongis obtusis acutisque, racemo terminali stricto multifloro, bracteis recurvis, stigmate 4lobo. *Guadalupa in monte igni-vomo.*

1878. Swartzia W.

simplex * — 1. Sw. foliis simplicibus oblongis, petiolis submarginatis, pedunculis racemosis, petalo subrotundo calycem superante. *Inf. Carib.* (Rittera Vahl. Sw., Swartzia simplicifolia W.)

† *grandiflora* W. — 2. Sw. foliis simplicibus oblongis acuminatis, petiolis teretibus, pedunculis 3floris, petalo reniformi maximo. *Inf. Trinit.* (Rittera Vahl.)

dodecandra W. — 3. Sw. foliis simplicibus subsessilibus ovato-oblongis emarginatis, pedunculis racemosis, petalo subspathulato calycem subaequante. *Amer. austr.*

triphylla W. — 4. Sw. foliis ternatis oblongis, medio maximo, petiolis marginatis apice 2dentatis, petalo subrotundo calycem superante. *Guiana. Brasil.* (Possira arborescens Aubl. Rittera Schreb.)

pinnata W. — 5. Sw. foliis pinnatis, petiolo communi tereti. *Inf. Trinit.* (Rittera Vahl.)

alata W. 6. Sw. foliis pinnatis, petiolo communi alato, floribus apetalis, legumine elliptico. *Guiana.* (Tounatea *guianenſis* Aubl.)

Langsdorffii Radd. 7. Sw. foliis pinnatis, petiolo communi alato, petalo ſubrotundo unguiculato. *Braſil.*

Flemingii Radd. 8. Sw. foliis pinnatis petioloque ſemitereti hirſutis, petalo calycem multo ſuperante. *Braſil.*

apetala Radd. 9. Sw. foliis pinnatis petioloque canaliculato laevibus, floribus apetalis. *Braſil.*

1879. FOUQUIERA Kunth.

formoſa Kunth. *Mexico.* Frutex ſpinoſus, foliis ſolitariis ſubcarnoſis, floribus terminalibus ſpicatis incarnatis.

1880. OMPHALOCARPUS P. B.

procerus P. B. *Guinea.* Arbor excelſa ramoſa, floribus trunco innaſcentibus ſeſſilibus, fructu umbilicato e corpusculis lignoſis irregularibus compoſito.

1881. DICALYX Lour.

cochinchinenſis Lour. *Cochinchina.* Arbor excelſa, foliis lanceolatis ſerratis, floribus racemoſis albis.

1882. ASTERANTHUS Desf.

braſilienſis Desf. *Braſil.* Frutex foliis alternis ovato-lanceolatis integerrimis, floribus axillaribus ſolitariis pedunculatis ſpecioſis.

1883. DOLIOCARPUS Roland.

Rolandri J. F. Gmel. 1. D. caule ſcandente, foliis oblongis acuminatis apice dentatis, pedunculis lateralibus ſtloris. *Surinam.* (Tetracera W.)

ſtrictus Poir. 2. D. caule ſtricto, foliis ovato-lanceolatis dentatis deflexis, floribus terminalibus. *Surinam.* (Tetracera W.)

Calinea J. F. Gmel. 3. D. caule ſcandente, foliis oblongis utrinque attenuatis, pedunculis multifloris lateralibus. *Guiana.* (Calinea ſcandens Aubl., Tetracera W.)

† *Soramia* Cand. 4. D. caule ſcandente, foliis obovatis integerrimis, pedunculis lateralibus ſubcorymboſis, floribus 5petalis. *Guiana.* (Soramia guianenſis Aubl. Tetracera obovata W. Mappia Schreb.)

1884. TRILIX.

lutea *Cuba.* Frutex foliis alternis ovato-oblongis ſerratis, floribus lateralibus racemoſis.

1885. PAPAVER.

* *Capſulis hiſpidis.*

hybridum 1. P. capſulis ſubgloboſis toroſis ſulcatis, caule folioſo, foliis pinnatifidis, laciniis linearibus. *Europ. arva fertilia.*

Argemone 2. P. capſula clavata, caule folioſo, foliis 2pinnatifidis lineari-lanceolatis. *Europ.*

nudicaule 3. P. capſula obovato-oblonga, ſcapo 1floro, foliis ſimplicibus pinnatifidis (hirſutis ſ. glabris). *Norvegia. Island. Inſ. Faeroer. Grönland. Labrador. Sibir. Camtſchatca.* (P. microcarpon Cand.)

alpinum 4. P. capſula obovato-oblonga, ſcapo 1floro, foliis 2pinnatifidis, laciniis linearibus ariſtatis. *Alp. Europ. med.*

pyrenaicum W. 5. P. capſula obovata, ſcapo 1floro, foliis pinnatis piloſis, pinnis inferioribus 3partitis. *Pyren. et Gallia auſtr.* (P. ſuaveolens Lapeyr. Argemone pyrenaica L.)

** *Capſulis glabris.*

† *Annua.*

Rhoeas 6. P. capſula obovata, ſetis caulinis patentibus foliis pinnatifidis inciſis. *Europ.*

dubium 7. P. capſula oblonga, ſetis caulinis appreſſis, foliis 2pinnatifidis. *Europ.*

obtuſifolium Desf. 8. P. capſula obovata depreſſa, ſetis caulinis abbreviatis patentibus, foliis 2pinnatifidis, laciniis ovatis obtuſiusculis. *Afric. bor.*

trilobum Wallr. 9. P. capſula ſubrotunda, caule folioſo foliisque 3lobis acutis baſi attenuatis glaberrimis. *In Thuringia rariſſimum.*

laevigatum MB. 10. P. capſula oblonga calyceque glabris, ſetis caulinis rariſſimis, foliis pinnatifidis inciſis hirſutiusculis. *Tauria. Caucaſ.*

arenarium MB. 11. P. capſula oblonga, calyce hiſpido, ſetis caulinis patulis raris, foliis 2pinnatifidis, laciniis linearibus. *Caucaſ.*

caucaſicum MB. 12. P. capſula oblonga, calyce hirto, ſetis caulinis rariſſimis caducis, foliis pinnatifidis glaucis glabris, laciniis inciſis obtuſis ariſtatis. *Caucaſ.*

fugax Poir. 13. P. capſula ovata calyceque glabris, ſetis caulinis rariſſimis, foliis pinnatifidis glaucis, laciniis lanceolatis integris ariſtatis. *Perſia.*

turbinatum Cand. 14. P. capſula turbinata calyceque glabris, ſetis caulinis raris, foliis pinnatifidis, laciniis ovatis integris muticis. *Ad Euphraten.*

armeniacum Lam. 15. P. capſula elliptico-oblonga calyceque glabris, ſetis caulinis raris, foliis pinnatifidis, laciniis linearibus ariſtatis. *Armenia.* (Argemone armeniaca L.)

† *Roubievi* Vign. 16. P. capſula oblonga, ſetis caulinis patulis, foliis 2pinnatifidis hirſutis, laciniis linearibus ariſtatis. *In agro Monspel. rariſſimum.*

floribundum Desf. 17. P. capſula oblonga, calyce hiſpido, ſetis caulinis patulis ſparſis, foliis inferioribus bi-ſuperioribus pinnatifidis glaucis piloſis, laciniis ovatis ariſtatis. *Armenia.* (P. virgatum Sm.)

horridum Cand. 18. P. capſula ſubelliptica, calyce hiſpido, ſetis caulinis confertis rigidis, foliis ſeſſilibus glaucis ſinuato-pinnatifidis, laciniis inciſo-dentatis ariſtatis. *Nov. Holl.*

gariepinum Burch. 19. P. capſula obovato-oblonga, calyce hiſpido, ſetis caulinis confertis inaequalibus rigidis, foliis ſeſſilibus ſinuato-pinnatifidis hiſpidis, laciniis ovatis remotis. *Afric. auſtr.*

ſetigerum Cand. 20. P. capſula obovata, calyce hiſpido, caule glabro paucifloro, foliis amplexicaulibus glaucis inciſo-repandis, dentibus ariſtatis. *Inſ. Stoechad.*

ſomniferum 21. P. capſula globoſa calyceque glabris, caule foliisque amplexicaulibus inciſo-repandis obtuſe dentatis glaucis glabris. *Graecia. Aſia minor. Aegypt.*

† *Perennia.*

orientale 22. P. capſula obovata, calyce hirſuto, caule ſtrigoſo, foliis decurſive pinnatis hirtis, laciniis oblongis ſerratis. *Aſia minor. Caucaſ.* (P. bracteatum Lindl.)

piloſum Sm. 23. P. capſula obovata, calyce piloſo, caule foliisque amplexicaulibus obtuſe lobatis hirtis. *Olympus Aſiae minor.*

1886. STYLOPHORUM Nutt.

cambricum * 1. St. capſulis oblongis coſtatis cauleque glabris, foliis ternatis petiolatis pinnatifidis obtuſe dentatis hirſutiusculis. *Cambria.* (Papaver cambricum L. Meconopſis Vign. Cand.)

ohienſe * 2. St. capſulis ellipticis turgidis denſe ſetoſis, caule ſub-4angulo ſuperne piloſo, pedunculis ſubcymoſis, foliis longe petiolatis pinnatifido-lobatis ſubtus glaucis glabriusculis. *Ad fl. Ohio.* (St. petiolatum Nutt. Meconopſis Cand.)

diphyllum Nutt. 3. St. capſulis —, foliis ſeſſilibus obtuſis lobatis undulatis glauceſcentibus, ſetis ſparſis. *Amer. bor.* (Chelidonium diphyllum Mx. Meconopſis Cand.)

1887. CHELIDONIUM.

majus 1. Ch. foliis compoſitis ſinuato-lobatis inciſo-dentatis, floribus ſubumbellatis. *Europ. Aſia.* (Ch. laciniatum Mill. et grandiflorum Cand. varr.)

japonicum Thb. 2. Ch. foliis impari-pinnatis 2jugis, foliolis ovato-oblongis inciſo-ſerratis ciliatis, pedunculis 1floris axillaribus. *Japon.*

1888. GLAUCIUM Tourn.

luteum Scop. Sm. 1. Gl. caule glabro, foliis inferioribus lyrato-pinnatifidis dentatis hiſpidiusculis, ſummis cordatis amplexicaulibus, ſiliquis aſperis. *Europ. med.* (Chelidonium Glaucium L. Gl. fulvum Sm. var.)

phoeniceum Sm. 2. Gl. foliis omnibus ſinuato-pinnatifidis dentatis cauleque piloſis, ſiliquis ſubſtrigoſis. *Ad lacum Mansfeldenſem. Gallia. Anglia. Italia.* (Chelidonium corniculatum L.)

rubrum Sm. 3. Gl. foliis caulinis pinnatifidis inciſis cauleque piloſis, ſiliquis villoſiusculis. *Graecia. Aſia minor.*

meſopotamicum * 4. Gl. caule hiſpido, foliis 2pinnatifidis, laciniis linearibus, ſiliquis ſetoſis ſubincurvis. *Meſopotamia.* (Römeria 2valvis Cand.)

refractum Stev. 5. Gl. foliis 2pinnatifidis, laciniis obtuſiusculis, pedunculis fructiferis recurvis, ſiliquis glabris ſub-4valvibus. *Perſia bor.*

violaceum Sm. 6. Gl. foliis 2pinnatifidis, laciniis linearibus, pedunculis rectis, ſiliquis ſub-3valvibus. *Anglia. Europ. auſtr.* (Chelidonium hybridum L. Römeria violacea Medic., hybrida Cand.)

1889. ACTAEA.

ſpicata 1. A. foliis 3ternatis, foliolis ovato-lanceolatis inciſo-ſerratis, racemo ovato, ſtaminibus petala aequantibus, baccis ſubgloboſis. *Europ. Caucaſ. Sibir.*

brachypetala Cand. 2. A. foliis 3ternatis, foliolis ovato-lanceolatis inciſo-ſerratis, racemo ovato, ſtaminibus petala ſuperantibus, baccis ovato-oblongis. *Amer. bor.* (A. ſpicata Mx., rubra W., americana Pursh., alba Mill.)

1890. GRIAS.

cauliflora *Jamaica.* Arbor excelſa, foliis obovatis 3pedalibus, floribus per caulem ramosque ſparſis albis.

1891. CALOPHYLLUM.

Inophyllum 1. C. foliis obovatis emarginatis, racemis axillaribus. *Ind. or. Inſ. oceani auſtr.*

Tacamahaca W. 2. C. foliis elliptico-oblongis acutiusculis, racemis axillaribus. *Inſ. Mascaren. Madagascar.*

Calaba 3. C. foliis ellipticis retuſis, pedunculis lateralibus paucifloris. *Jamaica. Hiſpaniola.*

apetalum W. 4. C. foliis ellipticis emarginatis, pedunculis axillaribus inferioribus 1floris aggregatis, ſuperioribus paucifloris, floribus apetalis. *Ceylon.* (C. Calaba L.)

ſpectabile W. 5. C. foliis oblongis utrinque attenuatis, racemis axillaribus multifloris, fructibus acutiusculis. *Inſ. Mascaren.* (C. acuminatum Lam.)

acuminatum W. 6. C. foliis oblongis acuminatis, pedunculis pauciforis. *Nov. Granat.* (C. Madruño Kunth.)

† *longifolium* W. 7. C. foliis lineari-oblongis elongatis. *Nov. Granat.*

1892. MAMMEA.

americana 1. M. foliis obovato-oblongis obtusis integerrimis coriaceis parallele venosis, fructibus 4spermis. *Ind. occid.*

emarginata Sess. 2. M. foliis obovatis obtusissimis emarginatis, fructibus 2spermis. *Mexico.*

1893. SPARRMANNIA Thunb.

africana Thb. *Afric. austr.* Frutex ramis hirsuto-villosis, foliis cordatis angulatis dentatis, floribus umbellatis albis.

1894. CAPPARIS.

I. *Fructibus oblongis s. brevioribus.*

* *Pedunculis subsolitariis.*

† *Inermes.*

mariana Jacq. 1. C. ramis superne farinosis, foliis cordato-ovatis obtusiusculis, pedunculis folia aequantibus. *Inf. Marianae s. Latronum.* (C. cordifolia Lam.)

Sandwichiana Cand. 2. C. foliis ellipticis glabriusculis, pedunculis folia aequantibus. *Inf. Sandwich.*

clutiaefolia Burch. 3. C. foliis obovato-oblongis mucronatis glabris, pedunculis folio brevioribus, floribus oligandris. *Afric. austr.*

lineata Pers. 4. C. ramis farinosis, foliis ovatis acuminatis subtus tomentosis venoso-lineatis. *Brasil.*

†† *Spinis stipularibus uncinatis s. reflexis.*

spinosa 5. C. foliis subrotundis retusis glabris, pedunculis folia subsuperantibus. *Europ. austr. Afric. bor.* (C. rupestris Sm. varietas inermis.)

Fontanesii Cand. 6. C. foliis cordato-ovatis acutiusculis. *Afric. bor.* (C. ovata Desf.)

aegyptia Lam. 7. C. ramis junioribus villoso-tomentosis, foliis subrotundis basi attenuatis mucronatis glabris, pedunculis folia superantibus. *Aegypt. Creta.*

nepalensis Cand. 8. C. foliis ovatis brevissime petiolatis ramisque canescentibus, pedunculis folia superantibus. *Nepal.*

leucophylla Cand. 9. C. foliis orbiculatis incano-villosis brevissime petiolatis, pedunculis folia superantibus. *Syria.*

tomentosa Lam. 10. C. foliis parvis oblongis retusis villoso-tomentosis breviter petiolatis, pedunculis brevissimis. *Senegambia.*

decalbata Cand. 11. C. foliis ovato-lanceolatis acuminatis ſupra glaberrimis ſubtus villoſis, pedunculis petiolos aequantibus. *Inſ. Timor.*

erythrocarpa Iſert. 12. C. foliis oblongis acuminatis mucronatis glabris ſubtus ſtellato-pubeſcentibus, pedunculis petiolos aequantibus. *Guinea.* (C. Afzelii Cand.?)

pyrifolia Lam. 13. C. foliis ovato-lanceolatis acuminatis demum glabris, pedunculis folio brevioribus. *Ind. or.*

††† *Spinis ſtipularibus rectis.*

herbacea W. 14. C. foliis ellipticis acutis glabris, junioribus pubeſcentibus, pedunculis folio longioribus, caule herbaceo. *Tauria. Caucaſ.* (C. ovata MB.)

rotundifolia Rottl. 15. C. foliis ſeſſilibus ſubcordato-ovatis glabris, fructibus globoſis. *Ind. or.*

canescens Banks. 16. C. foliis ovatis acutiusculis petiolum longe excedentibus villoſis, pedunculis folia aequantibus. *Nov. Holl.*

breviſpina Cand. 17. C. ſpinis abbreviatis, foliis ovato-lanceolatis mucronatis glabris, pedunculis petiolum 3plo ſuperantibus. *Ind. or.*

Rheedii Cand. 18. C. foliis ovali-oblongis mucronatis glabris ſubtus reticulatis breviſſime petiolatis, pedunculis folia aequantibus. *Malabar.* (Baducca Rheed.)

ſtyloſa Cand. 19. C. foliis oblongo-lanceolatis mucronatis glabris, pedunculis petiolos 3plo ſuperantibns, laciniis calycis acuminatis, germine in ſtylum craſſum producto. *Coromandel.*

** *Pedunculis aggregatis unifloris: ſpinoſae.*

aphylla Roth. 20. C. aphylla, caule flexuoſo dichotomo, ramis divaricatis glaberrimis, ſpinis ſubuncinatis, pedunculis umbellatis. *Ind. or.*

pubiflora Cand. 21. C. foliis ovali-oblongis acuminatis glabris, ſpinulis minimis rectis, pedunculis ſubaggregatis petiolos ſuperantibus. *Java.*

horrida 22. C. foliis ovatis acutis mucronatis, ramis flexuoſis, ſpinis patentibus, pedunculis ſubgeminatis. *Ceylon. Coromandel.*

acuminata W. 23. C. foliis ovatis acuminatis ſubtus ramulisque ferrugineo-tomentoſis, ſpinis rectis, pedunculis geminatis petiolos ſuperantibus *Ind. or.*

ceylanica 24. C. foliis oblongis utrinque attenuatis glabris, ſpinis rectis, pedunculis geminis petiolos ſuperantibus. *Ceylon. Cochinchina.*

Volkameria Cand. 25. C. foliis ovatis calloſo-mucronatis ſubtus rufo-velutinis, ſpinis uncinatis, pedunculis aggregatis, petalis ciliatis. *C. B. S.*

Billarderii Cand. 26. C. foliis ovali-oblongis venoſo-reticulatis ramulisque glabris, ſpinis rectis, pedunculis aggregatis, germine ſubſeſſili. *Inſ. Molucc.*

laſiantha R. Br. 27. C. foliis ovato-oblongis breviſſime petiolatis demum glabris, junioribus ramulis calycibusque villoſis, ſpinis rectiusculis, pedunculis aggregatis. *Nov. Holl.*

terniflora Cand. 28. C. foliis ovatis mucronatis demum glabris, junioribus calycibusque villoſis, ſpinis uncinatis, pedunculis aggregatis. *Coromandel.*

quadriflora Cand. 29. C. foliis ovatis acuminatis calloſo-mucronatis ſupra glabris ſubtus ramulis calycibusque villoſis, pedunculis aggregatis. *Ind. orient.* (C. pyrifolia β. Lam.)

micracantha Cand. 30. C. foliis ovalibus obtuſis calloſo-mucronatis, ſpinis parvis rectis, pedunculis aggregatis. *Java.*

**** Pedunculis racemoſis, corymboſis.*

† *Inermes.*

umbellata R. Br. 31. C. foliis ovalibus obtuſis ſubemarginatis glabris, ramulis petiolisque pubeſcentibus, pedunculis terminalibus umbellato-corymboſis. *Nov. Holl.*

obovata Hamilt. 32. C. foliis obovatis ſubtus ramulisque cinereo-villoſis, pedunculis corymboſis. *Ind. orient.* (C. maxima Roth.)

grandis 33. C. foliis ovatis acutis glabris, ramulis ſubvilloſis, pedunculis corymboſis, fructibus globoſis. *Ceylon.*

oleoides Burch. 34. C. foliis obovato-oblongis mucronatis glabris, racemis axillaribus folio ſubbrevioribus, floribus 8andris, fructibus globoſis. *Afric. auſtr.*

albitrunca Burch. 35. C. foliis obovato-oblongis obtuſiſſimis glabris, racemis axillaribus folio brevioribus, floribus 8andris. *Afric. auſtr.*

punctata Burch. 36. C. foliis oblongis baſi attenuatis ſubmucronatis glabris venoſo-reticulatis, racemis axillaribus abbreviatis. *Afric. auſtr.*

frondoſa Jacq. 37. C. foliis ſubcordato-oblongis utrinque attenuatis elongatis coriaceis glabris, pedunculis terminalibus ſtrictis corymbiferis, fructibus oblongis toruloſis. *Ind. occ. Amer. auſtr.* (C. braſiliana Cand.)

cuneata Cand. 38. C. foliis obovatis mucronatis coriaceis glabris petiolum 3plo excedentibus, floribus racemoſis. *Inſ. Carib.*

macrophylla Humb. 39. C. foliis longe petiolatis oblongis utrinque attenuatis ſubcoriaceis glabris, pedunculo terminali ſtricto racemoſo. *Ad fl. Magdalen.*

petiolaris Humb. 40. C. foliis longe petiolatis oblongis utrinque rotundatis membranaceis glabris, racemis terminalibus. *Quito.*

heterophylla R. et P. 41. C. foliis obovato-oblongis mucronatis emarginatisve glabris, axillis glanduliferis, racemis terminalibus corymboſis, fructu clavato. *Quito.*

macrocarpa R. et P. 42. C. foliis ovalibus mucronatis utrinque glabris, calycibus baſi glanduloſis, fructu ſubrotundo. *Quito.*

verrucoſa Lam. 43. C. foliis ovato-oblongis acutis ſubſeſſilibus coriaceis glabris, ramulis rugulоſis, racemis terminalibus paucifloris, fructibus oblongis verrucoſis. *Nov. Granat.*

amplissima Lam. 44. C. foliis ovalibus coriaceis nitidis, floribus axillaribus solitariis terminalibus racemosis, fructibus ellipticis pendulis. *Amer. austr.*

pulcherrima Jacq. 45. C. foliis ovato-oblongis obtusiusculis brevissime petiolatis glabris, racemo terminali stricto, calycibus reflexis, fructibus subrotundis. *Amer. austr.*

nemorosa Jacq. 46. C. foliis ovatis acuminatis supra glabris subtus villoso-tomentosis, glandula axillari obtusa, fructibus ovato-oblongis. *Amer. austr.* (C. *mollis* Kunth.)

incana Kunth. 47. C. foliis subpeltatis oblongis flavicantibus apice calloso-mucronatis supra aspero-punctatis subtus pube stellata tomentosis, racemis paucifloris, fructibus oblongis furfureo-floccosis. *Mexico. Hispaniola* Bertero.

odoratissima Jacq. 48. C. foliis ovato-oblongis acuminatis superne glabris subtus lepidoto-pilosis, racemis terminalibus longe pedunculatis, staminibus corollam subaequantibus. *Hispaniola. Amer. austr.*

Pachaca Humb. 49. C. foliis cordato-oblongis obtusis subemarginatis glabris coriaceis supra nitidis, floribus racemosis, fructibus globosis. *Cumana.*

avicennifolia Humb. 50. C. foliis ellipticis brevissime petiolatis subretusis coriaceis supra nitidis subtus incano-tomentosis, floribus racemosis, calycibus campanulatis obtusis, fructibus globosis. *Peru.*

scabrida Humb. 51. C. foliis longe petiolatis oblongis acutiusculis coriaceis subtus incano-tomentosis, racemis terminalibus, fructibus ovato-oblongis. *Amer. austr.*

crotonoides Humb. 52. C. foliis cordato-subrotundis obtusis membranaceis supra villosis subtus tomentosis, racemis terminalibus, floribus 8andris. *Peru.*

brevisiliqua Cand. 53. C. foliis ellipticis emarginatis glabris breviter petiolatis, pedunculis terminalibus umbellatis paucifloris. *Nov. Hispan.*

ferruginea 54. C. foliis oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis subtus lepidoto-pilosis, ramulis tomentosis, floribus corymbosis sub-8andris, fructibus obovatis. *Jamaica. Hispaniola.* (C. 8andra Jacq.)

cordata R. et P. 55. C. foliis cordato-subrotundis utrinque pube stellata tomentosis, pedunculis racemosis paucifloris, fructibus subglobosis. *Quito.*

laurina Humb. 56. C. foliis oblongis obtusis coriaceis glabris nitidis, racemis terminalibus, fructibus globosis. *Peru.*

†† *Spinosae.*

citrifolia Lam. 57. C. foliis oblongis mucronatis glabris, spinis uncinatis, pedunculis terminalibus umbellatis. *Afric. austr.* (C. capensis Thunb.)

sepiaria 58. C. foliis obovato-ellipticis submucronatis glabris, junioribus ramisque divaricatis canescentibus, spinis uncinatis, pedunculis terminalibus

umbellatis. *Ind. or.* (C. incanescens et Roxburghii Cand.)

corymbosa Lam. 59. C. foliis ovalibus subtus pubescentibus, spinis uncinatis, floribus corymbosis terminalibus. *Senegambia.* (C. puberula Cand.)

racemifera Cand. 60. C. foliis obovatis subtus ramulisque inermibus pubescentibus, stipulis ramorum subspinosis inaequalibus, racemis terminalibus. *Ind. or.*

Brassii Cand. 61. C. foliis ovato-lanceolatis glabris, ramulis petiolisque pubescentibus, spinis uncinatis, racemis corymbosis axillaribus. *Afric. occ.*

fasciculatis Cand. 62. C. foliis ellipticis demum glabris, spinis ramorum subuncinatis, ramulis inermibus, racemis fasciculato-corymbosis axillaribus. *Afric. occ.*

lanceolaris Cand. 63. C. foliis lanceolatis acutis, spinis uncinatis, racemis axillaribus subcorymbosis, pedicellis basi utrinque spinoso-stipulatis. *Java.*

II. *Fructibus elongatis subcylindricis.*

cynophallophora Mill. 64. C. foliis oblongis obtusis coriaceis glabris, axillis glanduliferis, pedunculis terminalibus paucifloris, fructu longissimo toruloso. *Ind. occ.* (C. flexuosa L.)

Eustachiana Jacq. 65. C. foliis ovatis acuminatis subcoriaceis glabris, axillis glanduliferis, pedunculis paucifloris foliis brevioribus. *Inf. Carib.* (C. brevis *.)

saligna Vahl. 66. C. foliis lineari-lanceolatis utrinque rotundatis venosis glabris, axillis glanduliferis, pedunculis terminalibus paucifloris, fructu tereti toruloso. *Inf. Carib.*

hastata Jacq. 67. C. foliis hastato-lanceolatis coriaceis, racemis terminalibus multifloris. *Amer. austr.*

linearis Jacq. 68. C. foliis linearibus coriaceis glabris, axillis glanduliferis, racemis panieulatis. *Amer. austr.*

lanceolata R. et P. 69. C. foliis lanceolatis mucronulatis glabris, pedunculis paniculatis, bracteis basi glanduliferis, fructibus longissimis. *Quito.*

guayaquilensis Humb. 70. C. foliis oblongis obtusis glabris submembranaceis supra nitidis, axillis glanduliferis, floribus racemosis, fructibus elongatis toulosis. *Quito.*

laeta Humb. 71. C. foliis oblongis utrinque rotundatis coriaceis eveniis glabris breviſſime petiolatis, axillis glanduliferis, racemis inferne ramosis. *Nov. Granat.*

subbiloba Humb. 72. C. foliis obcordatis coriaceis glabris, axillis glanduliferis, racemis paniculatis. *Nov. Granat.*

pauciflora Humb. 73. C. foliis ellipticis emarginatis coriaceis glabris, axillis glanduliferis, pedunculis 3floris. *Nov. Granat.*

amygdalina Lam. 74. C. foliis oblongis utrinque attenuatis callosomucronatis supra glabris subtus ramulisque lepidotis, pedunculis axillaribus corymbiferis. *Ind. occ.* (C. barcellonensis Kunth. var.)

comosa Jacq. 75. C. foliis lanceolatis petiolatis supra glabris subtus cinereo-tomentosis, pedunculis multifloris, staminibus corolla brevioribus. *Hispaniola.* 76.

tenuiſiliqua Jacq. 76. C. foliis ovato-lanceolatis acutis glabris, racemo terminali multifloro, fructibus elongatis. *Nov. Granat.*

commutata * 77. C. foliis oblongo-lanceolatis utrinque glabris, racemo terminali elongato, ſtaminibus corolla brevioribus. *Martinic.* Sieber.

obovatifolia Kunth. 78. C. foliis ſubcordato-obovato-ellipticis glabris ſupra nitidis, racemis axillaribus, fructibus elongatis torulofis. *Nov. Granat.*

Breynia 79. C. foliis oblongis coriaceis ſupra glabris ſubtus ramisque piloſo-lepidotis, pedunculis angulatis corymboſis, fructibus longiſſimis. *Ind. occ. Mexico.* (C. furfuracea R. et P.)

fidaefolia R. et P. 80. C. foliis cordato-ovatis ſupra glabris ſubtus ſtellato-pubeſcentibus, racemis terminalibus folio brevioribus ſubcorymboſis. *Peru.*

jamaicenſis Jacq. 81. C. foliis oblongis emarginatis coriaceis ſupra glabris ſubtus ramisque cinereo-tomentoſis, pedunculis paucifloris. *Jamaica.*

toruloſa Sw. 82. C. foliis oblongo-lanceolatis ſupra glabris ſubtus lepidoto-punctatis, pedunculis terminalibus ſubbifloris, fructibus elongatis torulofis. *Inſ. Antill.*

intermedia Kunth. 83. C. foliis oblongis acutis coriaceis ſupra glabris ſubtus denſiſſime lepidotis, paniculis terminalibus, floribus ſubumbellatis, fructibus lepidoto-tomentoſis. *Nov. Granat.*

anguſtifolia Kunth. 84. C. foliis linearibus utrinque rotundatis ſupra glabris ſubtus ramisque incano-tomentoſis, floribus corymboſis 8andris. *Mexico.*

longifolia Sw. 85. C. foliis lineari-lanceolatis ſubtus farinoſo-punctatis, fructibus torulofis. *Jamaica.*

1895. ARSIS Lour.

rugoſa Lour. *Cochinchina.* Arbuscula ramoſiſſima, foliis ovato-lanceolatis rugoſis integerrimis, floribus racemoſis albis.

1896. SHOREA Roxb.

robuſta Roxb. *Ind. or.* Arbor ingens, foliis alternis cordato-oblongis utrinque glabris, floribus paniculatis flavis.

1897. TILIA.

* *Petalis nudis.*

parvifolia Ehrh. 1. T. foliis cordato-ſubrotundis acutis utrinque glabris, axillis venarum ſubtus barbatis, fructibus ſubgloboſis. *Europ.* (T. intermedia Hayn., microphylla Vent., ulmifolia Scop., europaea γ. L.)

rubra Cand. 2. T. foliis cordatis baſi inaequalibus ſubtus petiolisque piloſiusculis, axillis venarum ſubtus bar-

batis, fructibus globoſis. *Tauria.* (T. triflora Horn.)

grandifolia Ehrh. 3. T. foliis cordato-ſubrotundis acutis ſubtus villoſiusculis, fructibus coſtatis. *Europ.* (T. platyphylla Vent., cordifolia Beſſ., europaea L.)

** *Petalis ſquama petaloidea auctis ſ. duplicatis.*

glabra Vent. 4. T. foliis profunde cordatis mucronato-ſerratis utrinque glabris, axillis venarum ſubtus barbatis, floribus corymboſis, ſtylo petala aequante, fructibus coſtatis. *Amer. bor.* (T. americana L., canadenſis Mx.)

laxiflora Mx. 5. T. foliis baſi obliquis ſubcordato-truncatis cuſpidato-ſerratis utrinque glabris, axillis venarum nudis, floribus paniculatis, ſtylo petala ſuperante, fructibus globoſis. *Amer. bor.*

pubeſcens Ait. 6. T. foliis baſi truncatis obſolete cordatis ſerratis ſubtus pubeſcentibus, axillis venarum ſubtus barbatis, corymbis paucifloris, ſtylo petala ſuperante, fructibus globoſis. *Amer. bor.* (T. caroliniana Mill., americana Walt.)

heterophylla Vent. 7. T. foliis baſi truncatis cordatisque mucronato-ſerratis ſubtus albido-tomentoſis, venis ferrugineis, ſtylis petala ſuperantibus, fructibus coſtatis. *Amer. boreal.* (T. alba Ait. W., americana du Roi.)

argentea Cand. 8. T. foliis inaequaliter cordatis mucronato-ſerratis ſubtus niveo-tomentoſis, venis concoloribus, ſtylis petala aequantibus, fructibus ovatis ecoſtatis. *Hungar. Graecia.* (T. alba Kit.)

1898. BROWNLOWIA Roxb.

elata Roxb. *Ind. or.* Arbor foliis cordatis 7nerviis, floribus paniculatis flavis.

1899. DIPTEROCARPUS Gärtn.

turbinatus Roxb. *Ind. or.* Arbor immenſa, foliis alternis ovato-oblongis glabris integerrimis, floribus racemoſis albis.

1900. DIPLOPHRACTUM Desf.

auriculatum Desf. *Java.* Arbor foliis oblongis apice dentatis baſi inaequaliter cordato-auriculatis, ſtipulis ſingularibus 2lobis indiviſisque medio ariſtatis, floribus pedunculatis terminalibus.

1901. GREWIA.

* *Foliis tri - triplinerviis,*

† *ſubtus glabris.*

multiflora Juſſ. 1. Gr. foliis ovato-lanceolatis acuminatis ſerratis, pedunculis ſubaggregatis 3floris, ſtaminibus abbreviatis. *Inſ. Philippin.*

diſperma Rottl. 2. Gr. foliis oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis ſerratis 3plinerviis, pedunculis ſolitariis 3floris, petalis breviſſimis. *Ind. or.*

apetala Juſſ. 3. Gr. foliis obovatis crenulatis ſcabris, pedunculis ſubſolitariis 3floris, floribus apetalis. *Java.*

oppoſitifolia Buchan. 4. Gr. foliis ovatis acuminatis dentatis, pedunculis oppoſitifoliis multifloris. *Nepal.*

umbellata Roxb. 5. Gr. foliis ellipticis ſubdenticulatis utrinque glaberrimis, pedunculis terminalibus 3floris. *Ind. orient.*

bicolor Juſſ. 6. Gr. foliis ovali-oblongis obtuſis argute ſerrulatis utrinque glabris ſubtus incanis, pedunculis geminatis 3floris, ſtaminibus petala aequantibus. *Senegambia.*

Rothii Cand. 7. Gr. foliis ovato-oblongis acuminatis argute ſerrulatis ſupra glabris ſubtus glabriuſculis incanis, pedunculis geminatis 3floris, ſtaminibus petala duplo ſuperantibus. *Ind. or.* (Gr. 2color Roth.)

cuneifolia Juſſ. 8. Gr. foliis obovatis ſubcoriaceis apice crenatis, pedunculis 2floris, ſtaminibus petala aequantibus. *Madagascar.*

nitida Juſſ. 9. Gr. foliis ovato-oblongis crenulatis ſupra nitidis, pedunculis ſolitariis abbreviatis ſubbifloris, ſtaminibus petala aequantibus. *China.*

Microcos 10. Gr. foliis oblongo-lanceolatis acuminatis elongatis ſubintegerrimis, junioribus ſubtus ſubfloccoſis, panicula terminali ramoſiſſima, pedunculis bracteatis, calycibus incano-tomentoſis. *Ind. or.* (Microcos paniculata L.)

glanduloſa Vahl. 11. Gr. foliis ovato-lanceolatis acuminatis utrinque laevibus crenulatis, crenis inferioribus glanduloſis, floribus axillaribus ſubſeſſilibus. *Inſ. Mascaren. Ind. or.*

laevigata Vahl. 12. Gr. foliis oblongo-lanceolatis acuminatis ſerrulatis utrinque glabris, pedunculis elongatis trifloris patentibus. *Ind. or.* (Gr. ſerrulata Cand., ovalifolia Juſſ. ?)

† *acuminata* Juſſ. 13. Gr. foliis ovato-oblongis abrupte acuminatis crenulatis, pedunculis ſubgeminatis 2floris petiolo longioribus. *Java.*

megalocarpa P. B. 14. Gr. foliis oblongis obtuſe acuminatis ſerratis laevibus, pedunculis 1-3floris, fructu glabro 4lobo. *Guinea.*

occidentalis 15. Gr. foliis ſubrotundo-ovatis obtuſe dentatis utrinque glabris, pedunculis ſolitariis 1floris. *Afric. auſtr.*

carpinifolia P. B. 16. Gr. foliis ſubcordato-ovatis acutis ſerratis ſubtus ſcabris, pedunculis brevibus ſub-3floris. *Guinea. Ind. or.* (Gr. rhamnifolia Roth.)

Mallococca 17. Gr. foliis ovato-lanceolatis acuminatis crenulatis utrinque glabris, pedunculis axillaribus ſub-3floris. *Inſ. Amicorum.* (Mallococca crenata Forſt.)

†† *Foliis ſubtus pubeſcentibus.*

guazumaefolia Juſſ. 18. Gr. foliis ovato-oblongis acutis ſubtus tomentoſis crenato-dentatis, dentibus inferioribus glanduloſis, pedunculis ſolitariis ſub-3floris. *Java.*

tomentoſa Juſſ. 19. Gr. foliis baſi obliquis ovato-lanceolatis utrinque tomentoſis inaequaliter dentatis, pedunculis abbreviatis ſub-4floris, petalis breviſſimis. *Java.* (Gr. hirſuta Sm.)

hirſuta Vahl. 20. Gr. foliis ovato-lanceolatis breviter petiolatis inaequaliter denticulatis transverſe venoſis utrinque villoſis, ramis villoſiſſimis, pedunculis ſub-3floris, fructu piloſo. *Ind. or.*

bracteata Roth. 21. Gr. foliis elliptico-lanceolatis obtuſe ſerratis utrinque faſciculato-piloſis ferrugineis, ramulis tomentoſis, pedunculis axillaribus 3floris, floribus involucratis. *Ind. or.*

excelſa Vahl. 22. Gr. foliis baſi obliquis oblongis obtuſe ſerratis ſupra glabris ſubtus incano-tomentoſis, ramulis glanduloſo-villoſis, pedunculis axillaribus ſub-2floris. *Arabia.* (Chadara arborea Forsk.)

ſalviſolia Roth. 23. Gr. foliis ovato-oblongis obtuſis crenulatis ſupra pubeſcentibus punctatis ſubtus niveo-tomentoſis, pedunculis axillaribus ſub-3floris bracteatis. *Ind. or.*

flava Cand. 24. Gr. foliis obovato-oblongis obtuſiſſimis crenulatis ſupra glabriusculis ſubtus incano-pubeſcentibus, pedunculis 1floris, petalis 2fidis calyce brevioribus. *Afric. auſtr.*

paniculata Roxb. 25. Gr. foliis elliptico-oblongis acutiusculis obtuſe ſerratis ſubtus villoſis, floribus paniculatis terminalibus, ſtipulis ſub-2fidis. *Ind. or.* (Microcos tomentoſa Sm.)

orientalis 26. Gr. foliis ovato-oblongis crenulatis utrinque aſperis, pedunculis axillaribus 3floris. *Ind. or.*

columnaris Sm. 27. Gr. foliis ovato-oblongis crenatis utrinque aſperis, pedunculis 3floris, genitalium ſtipite elongato villoſiſſimo. *Ind. or.*

piloſa Lam. 28. Gr. foliis ovato-oblongis acutiusculis denticulatis ſubtus faſciculato-piloſis, pedunculis ſub-corymboſis, fructibus piloſis. *Ind. orient.* (Gr. orientalis Vahl.)

flaveſcens Juſſ. 29. Gr. foliis ovato-oblongis acutis ſubangulatis inaequaliter ſerratis utrinque ſtellato-pubeſcentibus, pedunculis ſolitariis 3floris. *Ind. or.*

mollis Juſſ. 30. Gr. foliis ovato-lanceolatis denticulato-ſerratis ſupra glabris ſubtus tomentoſis, pedunculis ſubſolitariis 3floris. *Senegambia.*

aſpera Roxb. 31. Gr. foliis ſubrotundo-ovatis acuminatis ſub-3lobis inaequaliter ſerratis utrinque ſtellato-piloſis, pedunculis ſubternis 1floris petiolo brevioribus. *Ind. or.*

commutata Cand. 32. Gr. foliis cordato-oblongis acuminatis inaequaliter ſerratis ſupra ſubrugoſis ſtellato-pubeſcentibus ſubtus ſubferrugineo-tomentoſis, pedunculis axillaribus ſubcorymboſis. *Ind. or.* (Gr. carpinifolia Rottl. Roth.)

obliqua Juſſ. 33. Gr. foliis obliquis lanceolatis dentatis utrinque ſtellato-piloſis, pedunculis petiolum ſuperantibus 3floris. *Ind. or. Arabia.*

** *Foliis ſub-5nerviis.*

aſiatica 34. Gr. foliis cordato-ſubrotundis inaequaliter crenatis ſupra glabris ſubtus incanis, petiolis brevibus incraſſatis, ſtipulis ſubulatis, pedunculis ſubaggregatis 3floris petiolum 3plo ſuperantibus. *Inſ. Mascaren. Coromandel.*

tiliaefolia Vahl. 35. Gr. foliis oblique cordatis ſubrotundis obtuſe ſerratis utrinque glabris concoloribus, petiolis aequalibus, ſtipulis ſemicordatis, pedunculis petiolo brevioribus ſubaggregatis 3floris. *Ind. or.* (Gr. arborea Roxb. Microcos lateriflora L.)

abutilifolia Juſſ. 36. Gr. foliis late cordatis apice ſinuato-angulatis inaequaliter dentatis ſupra ſcabris ſubtus ſubtomentoſis, pedunculis ſubgeminatis 3floris petiolo duplo brevioribus. *Java.* (Gr. arbutifolia Poir. Perſ.)

populifolia Vahl. 37. Gr. foliis orbiculatis inaequaliter dentato-crenatis ſupra glabris ſubtus aſpero-punctatis, pedunculis ſolitariis 1floris folia ſubaequantibus. *Arabia.* (Chadara ſine nomine triviali Forsk.)

betulaefolia Juſſ. 38. Gr. foliis cordatis ſerratis ſubvilloſis, pedunculis ſolitariis elongatis 1floris. *Senegambia.*

rotundifolia Juſſ. 39. Gr. foliis ſubrotundo-ovalibus crenulatis ſupra incanis ſubtus albido-tomentoſis, pedunculis ſubgeminis folia ſuperantibus ſubcorymboſis. *Coromandel.* (Gr. orbiculata Rottl. Roth.)

arborea Roxb. 40. Gr. foliis ſubcordato-ovatis obtuſe ſerratis utrinque ſtellato-pubeſcentibus, pedunculis aggregatis elongatis umbellato-paniculatis. *Ind. orient.* (Gr. ſubinaequalis Cand.?)

villoſa Roxb. 41. Gr. foliis ſubcordato-ovatis angulatis duplicato-ſerratis utrinque ſtellato-pubeſcentibus ſubtus tomentoſis, pedunculis confertis 1floris petiolo brevioribus. *Ind. or.*

ſcabra Cand. 42. Gr. foliis ſubcordato-oblongis ſubtus ſcabris transverſe venoſis, panicula diffuſa, floribus involucratis. *Ind. or.* (Microcos Sm.)

ſapida Roxb. 43. Gr. foliis ovalibus groſſe dentatis glabriuſculis, pedunculis ternis 3floris petiolos longe ſuperantibus. *Ind. or.*

† *eriocarpa* Juſſ. 44. Gr. foliis ovalibus obtuſe ſerratis ſubtus tomentoſis, pedunculis axillaribus 3floris. *Java.*

† *velutina* Vahl. 45. Gr. foliis ſubobliquis ovalibus obtuſe ſerratis utrinque villoſis ſubtus incanis, pedunculis ſubternis abbreviatis 3floris. *Arabia.* (Chadara velutina Forsk.)

1902. COLUMBIA Perſ.

ſerratifolia Gaud. *Inſ. Philippin.* Arbor excelſa, ramulis hirſutis, foliis alternis baſi obliquis ovato-lanceolatis ſerratis ſubtus glaucis 3nerviis, floribus racemoſis terminalibus bracteatis rubris. (Colona Cav.)

1903. MUNTINGIA.

Calabura 1. M. foliis ſemicordato-lanceolatis ſerratis ſubtus ramisque denſe villoſis, pedunculis geminis axillaribus 1floris, calycibus acuminatis. *Hiſpaniola. Jamaica. Amer. auſtr.*

glabra * 2. M. foliis oblique ovato-oblongis utrinque ramisque compreſſis glabris, pedunculis geminis axillaribus 1floris, calycibus obtuſiſſimis. *Braſil.* Sello.

1904. AUBLETIA Schreb.

Tiburbu Sw. 1. A. foliis cordato-lanceolatis ſerrulatis hirſutis ſubtus fuſco-tomentoſis, fructibus denſe ſetoſis. *Ind. occ. Amer. auſtr.* (Apeiba Tibourbou Aubl., hirſuta Lam.)

Petumo W. 2. A. foliis ſubcordato-lanceolatis ſerrulatis ſupra glabris ſubtus incanis, venis rufo-hirſutiusculis, fructibus ſetoſis. *Guiana. Amer. auſtr.* (Apeiba Petoumo Aubl. A. ulmifolia Kunth.)

aſpera W. 3. A. foliis ſubcordato-oblongis integerrimis ſubtus pubeſcentibus, fructibus muricatis. *Guiana. Cayenn.* (Apeiba aſpera Aubl.)

laevis W. 4. A. foliis elliptico-oblongis acutis integerrimis glabris, petalis obtuſis, fructibus muricatis. *Guiana.* (Apeiba glabra Aubl.)

discolor * 5. A. foliis ovato-oblongis integerrimis ſubtus hirſutis caneſcentibus, pedunculis ſubternis axillaribus breviſſimis, fructibus ſetoſis. *Braſil.* Sello.

1905. ALEGRIA Seſſ.

candida Seſſ. *Mexico.* Arbor ſpecioſa, foliis ovatis ſerratis, floribus candidis roſaceis.

1906. BERRIA Roxb.

Amomilla Roxb. *Ceylon.* Arbor ramis glabris, foliis ovato-oblongis integerrimis glabris, floribus paniculatis.

1907. CORCHORUS.

* *Capsulis siliquaeformibus ecornibus.*

† *bivalvibus.*

siliquosus 1. C. foliis ovato-oblongis aequaliter obtuse serratis basi muticis glabris, pedunculis sub-2floris, floribus vernalibus 4fidis apetalis 4andris, autumnalibus 5petalis polyandris, capsulis linearibus laevibus, caule fruticoso. *Ind. occ.*

foliosus * 2. C. foliis minutis confertis ovato-oblongis crenulatis glabris basi muticis, pedunculis 1floris, capsulis teretibus asperis, caule fruticoso. *Cuba.* (C. siliquosus Pöppig.)

hirtus 3. C. foliis ovato-oblongis serratis basi muticis pilosis, ramis hirtis, capsulis solitariis obtusis brevissime pedunculatis hirsutis. *Ind. occ. Japon.*

lasiolobus * 4. C. foliis subcordato-ovatis mucronato-dentatis utrinque hirsutiusculis, ramis capsulisque solitariis subfalcatis acutis hirsutis. *Patria?* (C. pilolobus Link.)

mompoxensis Kunth. 5. C. foliis oblongo-lanceolatis acuminatis serratis glabriusculis, capsulis rectis ancipitibus pilosiusculis. *Ad fl. Magdalen.*

pilosus Kunth. 6. C. foliis lanceolatis acutis serratis utrinque villosis, capsulis pilosis. *Nov. Granat.*

argutus Kunth. 7. C. foliis lanceolatis acutis argute serratis glabris, capsulis compressis pubescentibus. *Nov. Granat.* (C. orinocensis Kunth.)

†† *tri- vel plurivalvibus.*

trilocularis 8. C. capsulis 3gonis 3valvibus scabris, foliis ovato-oblongis serratis, dentibus imis longe aristatis. *Arabia.* (C. aestuans Forsk.)

olitorius 9. C. capsulis oblongis subteretibus glabris 5locularibus, foliis ovato-oblongis serratis, dentibus imis longe aristatis. *Intra tropicos totius mundi.*

aestuans 10. C. capsulis oblongis 3valvibus 6sulcatis, foliis subcordatis ovato-acuminatis serratis, dentibus imis longe aristatis. *Amer. tropic.*

arenarius Kunth. 11. C. capsulis oblongis 3valvibus, foliis oblongis utrinque rotundatis undulato-crenatis complicatis coriaceis ramisque tomentosis. *Nov. Granat.*

serraefolius Burch. 12. C. capsulis lineari-teretibus scabris subtortuosis 6valvibus, foliis linearibus serratis. *Afric. austr.* (C. asplenifolius Burch. ?)

** *Capsulis siliquaeformibus apice cornutis.*

tridens 13. C. capsulis oppositifoliis subsessilibus sub-3valvibus apice 3cornibus, foliis lanceolato-linearibus serratis, dentibus imis subaristatis. *Ind. or.* (C. patens Lehm. 3locularis N. L. Burm.)

acutangulus Lam. 14. C. capsulis oblongis acutangulis apice 3-5cornibus, foliis ovatis serratis, dentibus imis subaristatis. *Ind. occid.*

*guadalupenſis** 15. C. capſulis lineari-teretibus elongatis obtusangulis 4valvibus apice 4cornibus, foliis ovatis ſerratis baſi muticis. *Guadalupa.* Bertero.

faſcicularis Lam. 16. C. capſulis ſeſſilibus aggregatis conoideis 3valvibus 6locularibus apice 3cornibus lanatis, foliis oblongis inaequaliter ſerratis baſi muticis. *Ind. orient.*

*** *Capſulis globoſis vel ovatis.*

capſularis 17. C. capſulis depreſſo-globoſis rugoſo-muricatis, foliis oblongis acuminatis ſerratis, dentibus imis ariſtatis. *Ind. or.*

hirſutus 18. C. capſulis ovatis ſubechinatis lanatis, pedunculis 3floris fructiferis deflexis, foliis ſubrotundo-oblongis repando-crenatis tomentoſis. *Ind. occ. Japon.* (C. tomentoſus Thunb.)

**** *Incertae ſedis.*

flexuoſus Thb. 19. C. foliis oblique cordatis ovatis cuſpidatis duplicato-ſerratis villoſis, caule flexuoſo, floribus terminalibus. *Japon.*

ſcandens Thb. 20. C. foliis ovatis acuminatis ſerratis, dentibus ariſtatis, caule ſcandente, floribus terminalibus ſolitariis. *Japon.*

ſerratus Thb. 21. C. foliis oblongis ſerratis cuſpidatis ſupra pubeſcentibus ſubtus glabris, dentibus ariſtatis, caule erecto. *Japon.*

1908. CISTUS.

* *Floribus rubris, ſtylo cylindrico.*

purpureus Lam. 1. C. foliis oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis amplexicaulibus ſubundulatis rugoſis, pedunculis ſubternis terminalibus abbreviatis, petalis baſi maculatis. *Aſia minor.*

heterophyllus Desf. 2. C. foliis oblongis lanceolatisque utrinque attenuatis margine revolutis ſubtus calycibusque villoſis, pedunculis hirſutis foliatis ſubternis. *Afr. boreal.*

parviflorus Lam. 3. C. foliis ovatis acutis ſubtomentoſis in petiolum attenuatis ſubtus rugoſo-venoſis, petiolis vaginantibus, pedunculis terminalibus ſubternis. *Creta.*

complicatus Lam. 4. C. foliis confertis ſubrotundo-ovatis obtuſiusculis tomentoſis ſubtus reticulatis ſubcomplicatis, petiolis vaginantibus, pedunculis 3floris. *Aſia minor. Hiſpania.*

villoſus Lam. 5. C. foliis ſubrotundo-ovatis rugoſis tomentoſo-hirſutis, petiolis vaginantibus, pedunculis ſubternis terminalibus. *Europ. auſtr. Afr. bor.* (C. piloſus L.)

creticus 6. C. foliis ſpathulato-oblongis undulatis tomentoſo-hirſutis in petiolum attenuatis, pedunculis

1floris. *Creta. Aſia minor. Tauria.* (C. tauricus Presl.)

incanus 7. C. foliis obovato-ſpathulatis ſub-3nervïis rugoſis tomentoſis ſeſſilibus ſubconnatis, pedunculis 1floris. *Europ. auſtr.*

criſpus 8. C. foliis lanceolatis utrinque attenuatis 3nerviis undulato-criſpis rugoſis pubeſcentibus ſubconnatis, pedunculis ſubternis abbreviatis, calycibus corollam ſubaequantibus. *Europ. auſtr.*

albidus 9. C. foliis ovali-oblongis ſeſſilibus incano-tomentoſis 3nerviis, pedunculis ſubternis, ſepalis exterioribus majoribus. *Hiſpan. Luſitan.*

candidiſſimus Dun. 10. C. foliis ovato-ellipticis acutis denſe tomentoſis 3nerviis, petiolis vaginantibus, pedunculis ſolitariis abbreviatis, ſepalis exterioribus brevioribus. *Inſ. Canar.*

vaginatus Ait. 11. C. foliis lanceolatis acutis 3nerviis hirſutis ſubtus reticulatis, petiolis vaginantibus, pedunculis axillaribus terminalibusque elongatis. *Teneriffa.* (C. ſymphytifolius Lam.)

ſericeus Vahl. 12. C. foliis ovatis obtuſis 3nerviis tomentoſis, inferioribus petiolatis, ſummis ſeſſilibus cordatis, pedunculis hirtis ſub-3floris, calycibus inaequalibus villoſo-ſericeis. *Hiſpania.*

hybridus Vahl. 13. C. foliis ovatis petiolatis incanis 3nerviis, ramis flavido-ſquamuloſis, pedunculis elongatis ſubracemoſis, ſepalis exter. caducis. *Hiſpania.* (C. cymoſus Dunal.?)

** *Floribus albidis.*

† *Stylo cylindrico.*

Cluſii Dun. 14. C. foliis linearibus margine revolutis ſub-3nerviis ſubtus caneſcentibus, floribus aggregatis breviter petiolatis, calycibus 3ſepalis. *Hiſpan. Afr. bor.* (C. Libanotis Desf. ſtenophyllus Link.)

†† *Stigmate ſeſſili.*

ladaniferus 15. C. foliis lineari-lanceolatis elongatis baſi connatis ſupra glabris ſubtus tomentoſis, floribus terminalibus ſolitariis, capſulis 10locularibus. *Hiſpan. Luſitan.*

monſpelienſis 16. C. foliis lineari-lanceolatis 3nerviis viſcoſis utrinque hirſutiusculis, racemis terminalibus ſubſecundis calycibusque villoſiſſimis. *Ad litora maris mediterran.*

florentinus Lam. 17. C. foliis lineari-lanceolatis enerviis ſubtus reticulato-rugoſis ſubtomentoſis, pedunculis ſub-3floris villoſis. *Italia?*

cyprius Lam. 18. C. foliis anguſte lanceolatis petiolatis ſupra glabris ſubtus incano-tomentoſis 3nerviis, pedunculis nudis ſub-3floris, floribus baſi maculatis. *Cyprus.*

laurifolius 19. C. foliis ovato-lanceolatis petiolatis 3nerviis ſupra glabris ſubtus tomentoſis, petiolis baſi con-

natis, pedunculis nudis multifloris. *Gallia auſtr. Hiſpan.*

longifolius Lam. 20. C. foliis oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis ſubtus viridibus venoſis margine villoſis, pedunculis axillaribus ſub-5floris calycibusque hirſutiusculis. *Hiſpan. Gallia narbon.* (C. nigricans Pourr.)

laxus Ait. 21. C. foliis ovato-lanceolatis acuminatis undulatis ſubdenticulatis glabriusculis, pedunculis cymoſis calycibusque hirſutis. *Hiſpania. Luſitania.* (C. capenſis L.?)

Ledon Lam. 22. C. foliis lanceolatis connatis nervoſis viſcoſis ſupra glabris ſubtus incano-ſericeis, pedunculis corymboſis calycibusque villoſis. *Gallia narbon.*

ſalvifolius 23. C. foliis ovato-oblongis obtuſis rugoſis utrinque hirſutis, pedunculis elongatis 1floris tomentoſis ſuperne articulatis. *Europ. auſtr.*

hirſutus Lam. 24. C. foliis oblongis obtuſis 3nerviis hirſutis, pedunculis ſubcymoſis, calycibus fructiferis maximis pyramidatis. *Armoracia. Hiſpan.*

corbarienſis Pourr. 25. C. foliis ſubcordatis ovatis acuminatis margine fimbriatis utrinque rugoſis ſubglutinoſis, pedunculis elongatis 1-5floris. *Gallia auſtr. Hiſpan.* (C. hybridus Pourr., ſalvifolius β. Cand.)

populifolius 26. C. foliis cordatis acuminatis petiolatis laevibus, pedunculis cymoſis bracteatis hirſutiusculis. *Gallia auſtr. Hiſpan. Luſitan. Mauritan.*

1909. HELIANTHEMUM Tourn.

I. *Stylo recto abbreviato: floribus luteis.*

* *Exſtipulata, foliis trinerviis.*

† *Suffruticoſa.*

Libanotis W. 1. H. foliis linearibus revolutis nudiusculis, pedunculis ſubſolitariis 1floris, calycibus glabris. *Luſitan. Afric. bor.* (Ciſtus L.)

umbellatum Mill. 2. H. foliis lineari-oblongis revolutis viſcoſis ſubtus ramisque tomentoſis, pedunculis umbellatis, calycibus villoſiusculis. *Sicilia. Gallia auſtr. Hiſpan. Luſitan.* (Ciſtus umbellatus L., verticillatus Brot.)

ocimoides Perſ. 3. H. foliis exiguis ovatis carinatis ſubſeſſilibus canescentibus, pedunculis terminalibus elongatis ſubpaniculatis. *Hiſpan. Luſitan.* (Ciſtus ocimoides Lam., ſampſucifolius Cluſ. Cav.)

alyſſoides Vent. 4. H. foliis obovatis ſubhirſutis ſeſſilibus, pedunculis terminalibus paucifloris, calycibus hirſutis. *Gallia occ. Hiſpan.* (Ciſtus alyſſoides α. Lam.)

rugoſum Dun. 5. H. foliis obovatis ſubobliquis margine criſpis ſubdenticulatis utrinque rugoſo-tomentoſis ſubtus incanis, ramis leproſo-tomentoſis, pedunculis terminalibus folio brevioribus, calycibus hirſutis. *Gallia occid. Luſitan.* (Ciſtus alyſſoides β. Lam.)

scabrosum Pers. 6. H. foliis ovato-oblongis piloso-scabris subtus ramisque cinereo-tomentosis, pedunculis 1floris folio brevioribus, calycibus hirsutis. *Lusitania.* (Cistus scabrosus Ait.)

algarviense Dun. 7. H. foliis ovato-lanceolatis piloso-scabris subtus ramisque incanis, pedunculis subpaniculatis calycibusque villosis. *Lusitan.* (Cistus algarviensis Sims. elongatus Vahl.?)

formosum Dun. 8. H. foliis spathulatis subpetiolatis utrinque ramisque tomentoso-villosis, pedunculis calycibusque villosis. *Lusitan.* (Cistus formosus Curt.)

atriplicifolium W. 9. H. foliis ovatis obtusiusculis petiolatis basi undulatis utrinque ramisque lepidotis subargenteis, pedunculis racemosis calycibusque rufo-hirsutis. *Hispan.* (Cistus Lam.)

lasianthum Pers. 10. H. foliis ovato-oblongis obtusiusculis carinatis ramisque cinereo-tomentosis, pedunculis sub-1floris brevissimis calycibusque hirsutissimis. *Lusitan.* (Cistus Lam.)

involucratum Pers. 11. H. foliis oblongo-lanceolatis sessilibus scabris, inferioribus petiolatis ramisque cinereo-tomentosis, pedunculis brevissimis involucratis. *Hispan. Lusitan.* (Cistus Lam.)

cheiranthoides Pers. 12. H. foliis oblongo-lanceolatis in petiolum attenuatis ramisque incano-tomentosis, pedunculis brevibus subbifloris, calycibus villosis. *Lusitan.* (Cistus cheiranthoides Lam.)

halimifolium W. 13. H. foliis obovatis glabris utrinque incanis, pedunculis elongatis subpaniculatis calycibusque albido-leprosis. *Hispan. Lusitan.* (Cistus L.)

†† *Herbacea.*

globulariifolium Pers. 14. H. foliis hirsutis, radicalibus spathulatis longe petiolatis, caulinis sessilibus acutis, racemis terminalibus abbreviatis, calycibus glabris. *Lusitan.* (Cistus Lam.)

Tuberaria Mill. 15. H. foliis radicalibus ovato-oblongis incano-tomentosis, caulinis lanceolatis glabriusculis sessilibus, floribus subpaniculatis, calycibus glabris. *Europ. austr.* (Cistus L.)

bupleurifolium Dun. 16. H. foliis radicalibus oblongis pilosiusculis, caulinis lanceolatis acuminatis glabris nitidis, floribus subcorymbosis breviter petiolatis, calycibus pubescentibus. *Hispan.* (Cistus Lam.)

heterodoxon Dun. 17. H. foliis sessilibus oblongo-lanceolatis tomentoso-hirsutis, summis alternis stipulatis, ramis hirtis, floribus subimbricatis brevissime pedunculatis, sepalis externis hirsutis bracteaeformibus. *Afric. Hispan.*

plantagineum Pers. 18. H. foliis oblongo-lanceolatis hirsutiusculis, summis stipulatis, racemis brevibus ebracteatis, sepalis subaequalibus, petalis denticulatis. *Creta. Corsica. Hispan. Afric. bor.* (Cistus plantagineus W., serratus Desf.)

guttatum Mill. 19. H. foliis oblongo-linearibus hirsutis, summis substipulatis, caule stricto simplici, racemo laxo

ebracteato, sepalis inaequalibus. *Europ. med.* (Cistus guttatus L., serratus Cav. H. eriocaulon Dun. var.)

inconspicuum Pers. 20. H. foliis oblongo-linearibus hirsutis, summis stipulatis, caule ramoso diffuso, floribus racemosis secundis. *Hispan. Corsica.*

punctatum W. 21. H. foliis stellato-pubescentibus incanis, inferioribus obovatis superioribus oblongis, racemis paucifloris, petalis serrulatis. *Gallia occid.*

** *Exstipulata, foliis enerviis venosis.*

corymbosum Mx. 22. H. suffruticosum, foliis oblongo-lanceolatis obtusiusculis subrevolutis subtus incano-tomentosis, floribus corymbosis confertis, calycibus tomentosis. *Amer. bor.*

glomeratum Lag. 23. H. suffruticosum, foliis oblongo-lanceolatis basi attenuatis subtus incanis, racemis axillaribus multifloris folio brevioribus. *Nov. Hispan.*

ramuliflorum Mx. 24. H. caule herbaceo ramoso, ramulis virgatis floridis, foliis oblongo-lanceolatis subtus tomentosis, floribus pedunculatis solitariis. *Carolina.*

rosmarinifolium Pursh. 25. H. caule herbaceo simplici, foliis linearibus revolutis subtus tomentosis, racemulis axillaribus interrupte confertifloris. *Amer. bor.*

carolinianum Mx. 26. H. caule herbaceo erecto, foliis oblongis obtusis subdenticulatis tomentoso-hirsutis, pedunculis solitariis 1floris calycibusque villosis. *Carolina.* (Cistus Walt.)

canadense Mx. 27. H. caule herbaceo ascendente, foliis linearilanceolatis hirsutis subtus incanis, racemis terminalibus paucifloris. *Amer. bor.* (Cistus L.)

brasiliense Pers. 28. H. caule basi suffruticoso ramoso foliisque lanceolatis alternis villoso-hirtis, pedunculis laxe racemosis. *Monte Video.* (Cistus Lam.)

II. *Stylo recto stamina aequante: floribus luteis.*

* *Exstipulata.*

lunulatum Cand. 29. H. caule suffruticoso ramoso, foliis obovato-oblongis subtus incanis, floribus subracemosis, petalis basi lunula notatis. *Alp. grai.* (Cistus Allion.)

† *petiolatum* Pers. 30. H. caule herbaceo ramoso foliisque oblongo-linearibus utrinque leproso-tomentosis, racemis paucifloris pubescentibus. *Hispania.*

** *Stipulata.*

micranthum * 31. H. caule suffruticoso foliisque linearibus obtusis margine revolutis stellato-pubescentibus, floribus racemosis, sepalis nervosis petala superantibus. *Ad magnam Syrtim Afric. boreal.* (Cistus Viv.)

villosum Pers. 32. H. caule herbaceo foliisque oblongo-lanceolatis subdenticulatis villosis, racemis elongatis secundis bracteatis. *Hispan.*

niloticum Pers. 33. H. caule herbaceo foliisque oblongis villoso-tomentosis, pedunculis erectis calycibusque hirsutis. *Europ. austr. Aegypt.* (Cistus L.)

lediifolium W. 34. H. caule herbaceo foliisque oblongis subdenticulatis glabriusculis, pedunculis erectis calyce brevioribus pubescentibus. *Gallia austr. Lusitan.* (Cistus L.)

salicifolium Pers. 35. H. caule herbaceo foliisque oblongis denticulatis, pedunculis horizontalibus calyce longioribus. *Gallia austr. Ital. Hispan.* (H. intermedium et denticulatum Pers. varr.)

sanguineum Lag. 36. H. caule herbaceo ramoso viscido-pubescente sanguineo, foliis oblongis obtusis superioribus stipulatis, pedunculis axillaribus 1floris fructiferis reflexis. *Hispan. Creta.* (H. retrofractum Pers.)

aegyptiacum Mill. 37. H. caule herbaceo foliisque lineari-oblongis margine revolutis subtus incanis pubescentibus, pedunculis filiformibus, calycibus inflatis petala includentibus. *Aegypt. Hispan.* (Cistus L.)

III. *Stylo basi inflexo.*

* *Floribus luteis.*

† *Capsula pilosa: foliis stipulatis, suffruticosa.*

Lippii Pers. 38. H. caule subdichotomo, foliis lineari-oblongis glaucescentibus subtus incanis, floribus sessilibus confertis, bracteis minutissimis. *Aegypt.* (Cistus L.)

sessiliflorum Pers. 39. H. caule ramosissimo, foliis linearibus cinereo-tomentosis margine revolutis, floribus spicatis secundis. *Afric. bor.* (Cistus Desf.)

ellipticum Pers. 40. H. caule ramoso, foliis ellipticis margine revolutis stellata pube albo-tomentosis, floribus spicatis remotiusculis. *Atlas.* (Cistus Desf.)

ruficomum * 41. H. caule ramoso foliisque ellipticis stellata pube canescentibus, floribus racemosis approximatis, calycibus hispidissimis rufescentibus. *Ad magnam Syrtim Afr. bor.* (Cistus Viv.)

lanuginosum * 42. H. caule ramoso foliisque ellipticis dense lanatis, floribus racemosis secundis, sepalis petala aequantibus. *Ad magnam Syrtim Afric. bor.* (Cistus Viv.)

cahiricum Delil. 43. H. caule ramosissimo, foliis obovatis margine revolutis incanis, floribus racemosis secundis, petalis apice cohaerentibus. *Aegypt.* (Cistus stipulatus β. Forsk.)

confertum Dun. 44. H. ramis foliisque oblongo-lanceolatis obtusis tomentosis subtus incanis, floribus racemosis secundis subsessilibus. *Teneriffa.*

canariense W. 45. H. caule procumbente ramoso, foliis ovali-oblongis glaucis subtus ramisque incano-tomen-

tosis, racemis elongatis secundis. *Insul. Canar.* (Cistus Jacq.)

mucronatum Dun. 46. H. caule erectiusculo, foliis ovato-ellipticis mucronatis supra stellato-pubescentibus subtus incano-tomentosis, floribus racemosis breviter pedicellatis. *Teneriffa.*

†† *Capsula glabriuscula meiosperma patula.*

α. Exstipulata suffruticosa.

ericoides Dun. 47. H. foliis alternis imbricatis semicylindricis abbreviatis glabriusculis, pedunculis terminalibus solitariis nutantibus. *Hispan. Neapol.* (Cistus Cav.)

Fumana Mill. 48. H. ramis procumbentibus, foliis linearibus involutis scabris, pedunculis terminalibus floris folia superantibus. *Europ.* (Cistus L.)

procumbens Dun. 49. H. ramis elongatis procumbentibus incanis, foliis alternis linearibus strigosis, pedunculis axillaribus folio brevioribus. *Europ. austr.*

molle Pers. 50. H. caule erecto, foliis subrotundo-ovatis petiolatis oppositis remotis villoso-tomentosis, racemis terminalibus paucifloris aequalibus. *Hispan.* (Cistus Cav.)

origanifolium Pers. 51. H. caule erecto dichotomo, foliis subrotundo-ovatis petiolatis oppositis utrinque pilosis, racemis secundis, petalis calycem aequantibus. *Hispan.* (Cistus Lam. Cav.)

cinereum Pers. 52. H. caule erecto, foliis ovatis acutis petiolatis dense tomentosis, racemis aggregatis, calycibus hispidis. *Hispan.* (Cistus Cav.)

dichotomum Dun. 53. H. caule erecto dichotomo, foliis minutis ovatis glabris petiolatis, racemis gracilibus paucifloris. *Hispan.* (Cistus Cav.)

oelandicum Cand. 54. H. foliis oblongo-lanceolatis obtusis glabris basi ciliatis, racemis paucifloris, petalis emarginatis calycem subaequantibus. *Insul. Oeland.* (Cistus L.)

alpestre Cand. 55. H. foliis oblongo-ellipticis obtusiusculis patenter pilosis supra viridibus subtus albidis, petalis integerrimis calycem duplo superantibus. *Alp. Europ. med.* (Cistus alpestris Crantz., oelandicus Jacq.)

penicillatum Dun. 56. H. foliis viridibus margine venisque hispidis, inferioribus ovatis petiolatis minoribus, superioribus subsessilibus lineari-oblongis, floribus minutis. *Gallia austr. Hispan.*

vineale Pers. 57. H. ramis ascendentibus rubellis nudiusculis, foliis ovato-oblongis lanceolatisque supra appresso-strigosis subtus albido tomentosis, petalis subintegerrimis calycem hirsutum superantibus. *Ager halensis.* (Cistus vinealis W., marifolius Wohlleb., oelandicus et serpyllifolius Roth.)

canum Dun. 58. H. ramis ascendentibus incano-tomentosis, foliis lanceolatis erectis supra cinereis strigosis subtus albido-tomentosis, floribus corymbosis, pe-

talis calycem hirſutum longe ſuperantibus. *Europ. med. et auſtr.* (Ciſtus L.)

italicum Perſ. 59. H. ramis aſcendentibus piloſo-tomentoſis, foliis ſupra cinereis ſubſtrigoſis ſubtus albido-tomentoſis, inferioribus confertis petiolatis ſubrotundo-ovatis ſuperioribus lanceolatis, petalis emarginatis pallidis calycem hirſutum longe ſuperantibus. *Ital. Hiſpan.* (Ciſtus L. H. obovatum Dun.)

marifolium Perſ. 60. H. ramis aſcendentibus virgatis, foliis omnibus ovatis ſ. ovato-oblongis acutis petiolatis remotiusculis ſupra cinereis nudiusculis ſubtus albo-tomentoſis, petalis aureis calycem hirſutum ſubſuperantibus. *Europ. auſtr. Tauria. Caucaſ.* (Ciſtus L. MB.)

β. Stipulata ſuffruticoſa.

arabicum Perſ. 61. H. ramis virgatis, foliis alternis ramulorum confertis lineari-lanceolatis pubeſcentibus, pedunculis ſubſolitariis terminalibus declinatis. *Arabia. Italia. Hiſpania.* (Ciſtus arabicus L., ferrugineus Lam. H. Savi Bertol.)

laevipes Perſ. 62. H. foliis faſciculatis filiformibus glabris, racemis ſecundis calycibusque piloſis, pedicellis laevibus. *Europ. auſtr.* (Ciſtus L.)

laeve Perſ. 63. H. foliis oppoſitis alternisque linearibus margine revolutis glabris, ſtipulis ſubulatis elongatis, pedunculis ſolitariis 1floris ſubterminalibus, calycibus laevibus. *Hiſpan.* (Ciſtus Cav.)

viride Tenor. 64. H. foliis faſciculatis linearibus nudiusculis, ſtipulis ſubulatis folio brevioribus, pedunculis racemoſis ſecundis calycibusque villoſo-glutinoſis. *Sicil.*

juniperinum Lag. 65. H. foliis lineari-ſubulatis ciliatis oppoſitis alternisque, ſtipulis ſubulatis, pedunculis racemoſis calycibusque villoſo-glutinoſis. *Hiſpan.*

Barrelieri Tenor. 66. H. foliis lineari-lanceolatis obtuſis baſi attenuatis ramisque villoſis, ſtipulis ſubulatis erectis, pedunculis paucifloris calycibusque piloſis. *Neapol. Sicil.*

thymifolium, Perſ. 67. H. foliis lineari-oblongis abbreviatis pubeſcentibus aſperiusculis, ſtipulis mucronatis erectis, pedunculis paucifloris villoſo-glutinoſis. *Hiſpan.* (Ciſtus L.)

glutinoſum Perſ. 68. H. foliis linearibus revolutis cinereis villoſo-glutinoſis, pedunculis racemoſis, calycibus viſcoſiſſimis. *Hiſpan.* (Ciſtus L.)

rubellum Preſl. 69. H. foliis ovato-ſubrotundis oblongisque acutis ſupra glaberrimis (rubicundis) ſubtus albo-tomentoſis, floribus racemoſis pendulis, calycibus piloſis. *Sicil.*

paniculatum Dun. 70. H. foliis ovato-ſubrotundis obtuſiusculis ſupra viridibus ſubtus incanis, racemis oppoſitis paniculatis. *Hiſpan. Sicil.*

crassifolium Perſ. 71. H. foliis ſubcarnoſis glabris breviter petiolatis, inferioribus ovatis acutis ſuperioribus oblongo-

linearibus, racemis brevibus ſubumbellatis, calycibus baſi piloſis. *Afric. bor. Hiſpan.* (Ciſtus glaucus Desf.)

polyanthon Perſ. 72. H. caule erecto, foliis ovato-lanceolatis ſtipulisque ſubſimilibus petiolatis hirſutiusculis, inferioribus ſubtus incanis, racemis ſtrictis paniculatis, calycibus hirſutis. *Afric. bor.* (Ciſtus polyanthos Desf.)

ſquamatum Perſ. 73. H. ramis erectis foliisque petiolatis lineari-oblongis utrinque argenteo-lepidotis, floribus racemoſis ſecundis. *Hiſpan. Afr. bor.* (Ciſtus L.)

lavandulaefolium Perſ. 74. H. foliis ſubfaſciculatis lineari-lanceolatis acutis margine revolutis ſupra cinereis ſtipulisque ſubſimilibus apice ariſtatis ſubtus ramisque albo-tomentoſis, racemis terminalibus ſubternis, floribus ſecundis. *Ad litora maris mediterr.* (Ciſtus lavandulaefolius Lam., ſyriacus et racemoſus Jacq. H. Thibaudi Perſ.)

Brouſſoneti Dun. 75. H. foliis breviter petiolatis oblongo-lanceolatis obtuſiusculis utrinque tomentoſis, ſtipulis linearibus ſubfalcatis, racemis abbreviatis ſecundis, ſepalis internis coloratis. *Teneriffa.*

ſtoechadifolium Perſ. 76. H. foliis oblongo-linearibus obtuſiusculis margine revolutis utrinque ſubtomentoſis, ſtipulis lineari-lanceolatis ſubvilloſis, racemis ante antheſin revolutis, calycibus villoſo-incanis. *Luſitan.* (Ciſtus Brot.)

croceum Perſ. 77. H. caule erecto, foliis elliptico-oblongis petiolatis ſtellato-villoſiusculis ſubtus ramisque incanis, ſtipulis lineari-ſubulatis, floribus racemoſo-confertis, calycibus coloratis. *Hiſpania. Afric. bor.* (Ciſtus Desf. H. nudicaule Dun. var.)

glaucum Perſ. 78. H. caule erecto, foliis ovato-lanceolatis glaucis utrinque tomentoſis, floribus racemoſis ſecundis, calycibus hirſutis. *Hiſpan. Ital.* (Ciſtus Cav.)

vulgare Gärtn. 79. H. ramis aſcendentibus, foliis oblongis margine ſubrevolutis ſupra piloſis ſubtus caneſcentibus, racemis laxis, pedicellis calycibusque piloſis. *Europ.* (Ciſtus Helianthemum L., grandiflorus Scop., hirſutus Thuill., barbatus Lam.)

tomentoſum Dun. 80. H. ramis aſcendentibus, foliis oblongis margine revolutis ſupra viridibus glabriuſculis ſubtus ſtellata pube incano-tomentoſis, racemis laxis, calycibus coloratis ſulcatis. *Anglia. Carniolia.* (Ciſtus Scop. Sm.)

ſurreianum Mill. 81. H. foliis oblongo-lanceolatis ſupra hirſutiuſculis ſubtus ramisque pube ſtellata ſparſa piloſiuſculis, petalis lanceolatis ſubdentatis calycem coloratum ſulcatum ſubaequantibus, ſtaminibus breviſſimis. *Anglia.* (Ciſtus L.)

leptophyllum Dun. 82. H. foliis oblongo-linearibus margine revolutis in petiolum brevem attenuatis ſupra glabriuſculis ſubtus cinereo-tomentoſis, ſtipulis ſubulatis, racemis laxis elongatis, calycibus piloſiuſculis. *Hiſpan.*

83.

acuminatum Perſ. 83. H. foliis longe petiolatis oblongis margine revolutis utrinque viridibus piloſis ſubtus ſubtomentoſis, racemis paucifloris, calycibus glabris. *Ager nicaeenſis.*

ſerpylliſolium Mill. 84. H. foliis oblongo-ellipticis ſubrevolutis ſupra nitidis ſubtus incano-tomentoſis, calycibus incanis. *Alp. Europ. med. et auſtr.* (Ciſtus L.?)

ovatum Dun. 85. H. foliis elliptico-lanceolatis obtuſiusculis in petiolum attenuatis utrinque ramisque ſericeo-villoſis, pedunculis paucifloris terminalibus, calycibus villoſiusculis. *Alp. maritim. Italiae.* (Ciſtus Viv.)

nummularium Mill. 86. H. ramis procumbentibus hirſutis, foliis inferioribus orbiculatis ſuperioribus oblongo-linearibus hirſutiusculis ſubtus cinereis, racemis calycibusque piloſis. *Gallia auſtr. Ital.* (Ciſtus L.)

anguſtiſolium Perſ. 87. H. ramis cinereo-tomentoſis, foliis breviter petiolatis lineari-oblongis margine revolutis ſupra hiſpidiusculis ſubtus tomentoſo-caneſcentibus, racemis laxis, calycibus pubeſcentibus. *Patria?* (Ciſtus Jacq.)

hirtum Perſ. 88. H. foliis ovato-oblongis margine revolutis utrinque ramisque hirto-tomentoſis ſubtus caneſcentibus, calycibus hirſutiſſimis albis. *Hiſpan. Gall. auſtr.* (Ciſtus L. H. aureum Perſ.)

Lagaſcae Dun. 89. H. foliis linearibus obtuſis revolutis hirſutis virentibus, ſtipulis planis, pedicellis hiſpidis, calycibus nitidis nervoſis ciliatis. *Hiſpania.*

ſulfureum W. 90. H. caule procumbente, foliis anguſte lanceolatis planis utrinque ſtellato-pubeſcentibus ſupra viridibus ſubtus pallidis, racemo paucifloro. *Hiſpan.*

** *Floribus albis rubriſve.*

violaceum Perſ. 91. H. foliis ſpathulato-linearibus margine revolutis utrinque ſubtomentoſis ſubtus caneſcentibus, racemis paucifloris, calycibus coloratis. *Hiſpan.*

racemoſum Perſ. 92. H. foliis linearibus margine revolutis ſubtus incanis, calycibus coloratis. *Hiſpan. Afric. bor. Teneriffa.* (Ciſtus L.)

ſtrictum Perſ. 93. H. ramis ſtrictis erectis, foliis anguſtiſſimis linearibus revolutis caneſcentibus, ſtipulis ſetaceis, calycibus nervoſis glabriusculis coloratis. *Hiſpan.* (Ciſtus Cav.)

piloſum Perſ. 94. H. foliis linearibus apice ariſtatis utrinque incanis margine revolutis, ſtipulis ſubulatis, calycibus nervoſis. *Hiſpan. Gallia auſtr.* (Ciſtus L. H. aſperum Lag. Dun.)

lineare Perſ. 95. H. foliis linearibus elongatis glabris margine revolutis caneſcentibus, ſtipulis ſubulatis, racemis laxis, calycibus coloratis glabriusculis. *Hiſpan. Gallia auſtr.* (Ciſtus Cav.)

ſrticum * 96. H. ramis divaricatis, foliis linearibus ſtipulisque ſubſimilibus hiſpidulis ſubtus caneſcentibus,

floribus racemoſis. *Ad magnam Syrtim Afr. bor.* (Ciſtus Viv.)

virgatum Perſ. 97. H. ramis virgatis incanis, foliis linearibus margine revolutis utrinque caneſcentibus, ſtipulis ſubulatis, calycibus pulverulento-pubeſcentibus. *Afric. bor.* (Ciſtus Desf.)

apenninum Perſ. 98. H. foliis oblongo-linearibus planis ſupra glauceſcentibus ſubtus tomentoſis, ſtipulis ſubulatis, calycibus villoſis ſtriatis obtuſiusculis. *Europ. med.* (Ciſtus apenninus L., roſeus All.)

hiſpidum Dun. 99. H. foliis oblongis obtuſiusculis ſubmucronatis margine revolutis ſupra calycibusque hiſpidis ſubtus incanis. *Luſitan.* (Ciſtus Lam. Brot.)

pulverulentum Cand. 100. H. foliis linearibus obtuſis margine revolutis albido-tomentoſis, ſtipulis linearibus, ſepalis ovatis obtuſis ſubfloccoſis. *Gallia.* (Ciſtus pulverulentus Pourr., polifolius Lam.)

polifolium Perſ. 101. H. foliis oblongo-linearibus petiolatis utrinque ſtellato-pubeſcentibus ſubtus incanis, ſtipulis ramentaceis obtuſis, calycibus glabriusculis. *Anglia. Gallia. Hiſpania.* (Ciſtus polifolius L., ſplendens Lam.)

mutabile Perſ. 102. H. foliis lanceolatis ſupra glabris ſubtus planis incanis, ſtipulis linearibus calycibusque piloſiusculis. *Hiſpan.* (Ciſtus Jacq.)

foetidum Perſ. 103. H. foliis oblongo-lanceolatis utrinque virentibus hirſutis, ſtipulis linearibus, calycibus piloſis. *Patria?* (Ciſtus Jacq.)

ciliatum Perſ. 104. H. foliis lineari-lanceolatis ſupra hirſutis ſubtus planis incano-ſubtomentoſis ciliatis, calycibus nervoſis glanduloſo-piloſis. *Afric. bor. Hiſpan. Ital.* (Ciſtus Desf.)

majoranaefolium Cand. 105. H. foliis ovato-oblongis acutiusculis margine revolutis ſupra virentibus hirſutis ſubtus incano-tomentoſis, calycibus hirſutiſſimis. *Gall. auſtr.*

1910. BIXA.

Orellana *Amer. tropic.* Arbor foliis cordato-oblongis nitidis utrinque glabris, floribus racemoſis carneis.

1911. WEIHEA *.

madagascarenſis * *Madagascar.* Frutex foliis oppoſitis ſubdentatis, pedunculis axillaribus 1floris e bractea urceolari. (Richaeia Thuar.)

1912. SARCOCHLAENA Thuar.

grandiflora Thuar. 1. S. foliis oblongis acutis ſubtus ferrugineo-tomentoſis, pedunculis paucifloris, involucris depreſſis ſcabris. *Madagascar.*

eriophora Thuar. 2. S. foliis oblongis obtuſis, pedunculis paucifloris, involucro rufo-lanato. *Madagascar.*

multiflora Thuar. 3. S. foliis oblongis acutis ſubtus glabris, floribus paniculatis, involucris 3lobis. *Madagaſcar.*

1913. SCHIZOCHLAENA Thuar.

cauliflora Thuar. 1. Sch. racemis e trunco ortis. *Madagaſcar.*

roſea Thuar. 2. Sch. paniculis terminalibus, involucro ampliſſimo irregulariter fiſſo. *Madagaſcar.*

elongata Thuar. 3. Sch. paniculis terminalibus, involucro 5lobo capſulam excedente. *Madagaſcar.*

1914. RHODOCHLAENA Thuar.

alticola Thuar. *Madagaſcar.* Frutex arbores altiſſime ſcandens, foliis alternis oblongis glabris integerrimis, floribus axillaribus pedunculatis ſplendide puniceis.

1915. TERNSTRÖMIA L. ſuppl.

* *Foliis integerrimis.*

brevipes Cand. 1. T. foliis obovatis ſubemarginatis, pedunculis axillaribus flores ſubaequantibus. *Amer auſtr.* (T. meridionalis Mut.?)

peduncularis Cand. 2. T. foliis obovato-oblongis ſubtus ſubſericeo-nitidis, pedunculis aggregatis flores ſuperantibus. *Inſ. Carib.*

elliptica Sw. 3. T. foliis oblongis acutiusculis, pedunculis cernuis flores ſubaequantibus. *Mexico. Inſ. Carib.* (T. lineata Cand.)

punctata Sw. 4. T. foliis oblongis ſubemarginatis margine punctato-aſperis, pedunculis ſolitariis 1floris elongatis. *Guiana.* (Taonabo Aubl.)

cluſiaefolia Humb. 5. T. foliis obovato-oblongis obtuſis nigro-punctatis, pedunculis elongatis. *Quito.*

† *corymboſa* Sm. 6. T. foliis oppoſitis oblongis acuminatis, paniculis terminalibus corymboſis, calycibus ebracteatis. *Guiana.*

** *Foliis dentatis, ſerratis.*

dentata Sw. 7. T. foliis oblongis utrinque attenuatis ſerratis venoſis, pedunculis lateralibus petiolo longioribus. *Guiana.* (Taonabo Aubl.)

*venoſa** 8. T. foliis elliptico-oblongis utrinque ſubattenuatis ſerrulatis venoſis, pedunculis axillaribus aggregatis breviſſimis. *Braſil.* Sello.

ſalicifolia Cand. 9. T. foliis lanceolatis elongatis acutis baſi obliquis crenulatis eveniis, pedunculis ſubgeminatis axillaribus petiolo brevioribus. *Guadalupa.* Bertero. *Martinica.* Sieber.

1916. CLEYERA Thunb.

japonica Thunb. 1. Cl. foliis ſpathulato-oblongis apice tenuiſſime ſerrulatis, pedunculis lateralibus alternis 1floris. *Japon.*

† *rubiginoſa** 2. Cl. foliis ovatis ſpinuloſo-ſerratis ſubtus incanis, pedunculis faſciculatis glanduloſo-piloſis. *Sumatra.* (Ternſtrömia Cand.)

† *pentapetala** 3. Cl. foliis ſpathulatis ſpinuloſo-denticulatis glabris, pedunculis faſciculatis glabris. *Inſ. orae Malac.* (Ternſtrömia Cand.)

ochnacea Cand. 4. Cl. foliis ovali-oblongis utrinque attenuatis venoſis integerrimis. *Japon. Nepal.*

1917. FREZIERA Sw.

theoides Sw. 1, Fr. foliis ovato-lanceolatis acuminatis obtuſe ſerratis utrinque glabris ſupra nitidis, pedunculis ſolitariis 1floris. *Jamaica.*

undulata Sw. 2. Fr. foliis elliptico-lanceolatis acuminatis undulato-ſerratis utrinque glabris, pedunculis axillaribus aggregatis. *Inſ. Carib.* (Eroteum undulatum Sw. Vahl.)

nervoſa Humb. 3. Fr. foliis oblongis acuminatis ſerrulatis parallele venoſis ſubtus pubeſcentibus, pedunculis faſciculatis abbreviatis. *Alp. peruv.*

ſericea Humb. 4. Fr. foliis ovato-oblongis acuminatis ſerrulatis ſubtus argenteo-ſericeis, floribus ſeſſilibus ſubternis. *Quito.*

chryſophylla Humb. 5. Fr. foliis lanceolatis integerrimis acuminatis in petiolum attenuatis ſubtus aureo-tomentoſo-ſericeis, pedunculis breviſſimis axillaribus calycibusque tomentoſis. *Quito. Peru.* (Lettſomia tomentoſa R. et P ?)

caneſcens Humb. 6. Fr. foliis oblongis utrinque attenuatis ſerrulatis ſubtus incano-lanato-tomentoſis, pedunculis ſubſolitariis, fructibus 3locularibus. *Peru.* (Lettſomia lanata R. et P.)

reticulata Humb. 7. Fr. foliis elliptico-oblongis petiolatis ſerratis ſubtus reticulatis tomentoſis, pedunculis aggregatis, fructibus 4locularibus. *Peru.*

1918. COCHLOSPERMUM Kunth.

Goſſypium Cand. 1. C. foliis 5lobis integerrimis ſubtus tomentoſis. *Coromandel.* (Bombax L.)

vitifolium W. 2. C. foliis 5fidis acuminatis ſerratis ſubtus pubeſcentibus. *Braſil. Mexico.* (C. hibiſcoides Kunth. ſerratifolium Cand.)

1919. OCHNA.

* *Stigmate capitato.*

obtuſata Cand. 1. O. foliis obovatis obtuſiſſimis ſerratis, floribus 8-10petalis. *Ind. or.* (O. ſquarroſa L. ?)

lucida Lam. 2. O. foliis obovato-oblongis acutis ſerratis, floribus 7-10petalis. *Ind. or.* (O. ſquarroſa Rottb.).

nitida Cand. 3. O. foliis oblongis utrinque attenuatis ſubſerratis, racemis confertis abbreviatis, floribus 5petalis. *Ind. or.*

multiflora Cand. 4. O. foliis ovali-oblongis acutis integerrimis, racemis compoſitis longe pedunculatis, floribus 5petalis. *Sierra Leone. Ind. or.* Rottler.

ciliata Lam. 5. O. foliis oblongis obtuſiuſculis ciliato-ſerratis, pedunculis paucifloris, floribus 5petalis. *Madagaſcar. C. B. S.?* (O. atropurpurea Cand.)

parvifolia Vahl. 6. O. foliis ovatis ſerrulatis, pedunculis 1floris folio longioribus. *Arabia.* (Evonymus inermis Forsk.)

*lanceolata** 7. O. foliis lanceolatis crenulatis, pedunculis ſubſolitariis folio brevioribus. *Malabar.* Rottler.

** *Stigmate multipartito.*

mauritiana Lam. 8. O. foliis oblongo-lanceolatis ſerrulatis, floribus corymboſis 5petalis, petalis calyce longioribus. *Inſ. Maſcaren.*

madagaſcarenſis Cand. 9. O. foliis oblongis utrinque attenuatis ſubſerratis, floribus corymboſis 5petalis, petalis calycem aequantibus. *Madagaſcar.*

†*arborea* Burch. 10. O. foliis ovali-oblongis ſubintegerrimis, floribus ſubracemoſis 5petalis, antheris linearibus apice 2poroſis. *Afric. auſtr.*

1920. DELIMA.

ſarmentoſa 1. D. foliis ellipticis ſcaberrimis rigidis ſerratis, floribus ☿ paniculatis apetalis, capſulis glabris. *Ceylon. Malabar.* (Tetracera Vahl.)

tripetala Blum. 2. D. foliis obovatis apice mucronato-dentatis ſcaberrimis, floribus ☿ paniculatis 3petalis, capſulis pubeſcentibus. *Java.*

hebecarpa Cand. 3. D. foliis obovatis ſubcrenulatis ſcabris, floribus ☿ paniculatis 5petalis, capſulis pubeſcentibus. *Java. Inſ. Philippin.*

mexicana Seſſ. 4. D. foliis ovalibus obtuſis ſerratis utrinque glabris, venis ſubtus rufo-villoſis, floribus dioecis paniculato-faſciculatis 5petalis. *Mexico.*

nitida Cand. 5. D. foliis oblongo-lanceolatis ſcabris ſubintegerrimis, floribus ☿ paniculatis 4petalis. *Inſ. Trinit.* (Tetracera Vahl.)

†*guianenſis* Rich. 6. D. foliis oblongis utrinque attenuatis ſubſerratis laevibus, floribus dioecis axillaribus breviter pedunculatis, fructibus globoſis pubeſcentibus. *Guiana.*

1921. TASMANNIA R. Br.

aromatica R. Br. 1. T. foliis lanceolatis baſi attenuatis, fructibus globoſis. *Nov. Holl.* (Winterana lanceolata Poir.)

inſipida R. Br. 2. T. foliis oblongis acuminatis baſi auriculatis, fructibus ovali-oblongis. *Nov. Holl.*

1922. AEGLE Corr.

Marmelos Corr. 1. Ae. foliis ternatis petiolatis ovato-oblongis venosis serratis, petiolis teretibus, ramis inermibus, floribus paniculatis, fructu 12loculari. *Ind. or.* (Crataeva L.)

sepiaria Cand. 2. Ae. foliis ternatis ovali-oblongis serratis sessilibus, petiolo communi alato, ramis spinosis, floribus solitariis, fructu 6-7loculari. *Japon.* (Citrus trifoliata L.)

1923. BONNETIA Schreb.

racemosa Sw. 1. B. foliis oppositis oblongo-lanceolatis subtilissime venosis, racemis axillaribus, capsulis 4valvibus. *Inf. Carib.* (Marila Sw. prodr. Mahurea speciosa Choisi. in Cand. prodr.)

meridionalis Sw. 2. B. foliis alternis oblongis coriaceis, racemo terminali, capsulis 3valvibus. *Guiana. Brasil.* Sello. (Mahurea palustris Aubl.)

1924. CLUSIA.

**Floribus polyandris.*

rosea 1. Cl. foliis obovatis obtusis emarginatis parallele venosis breviter petiolatis, floribus 6partitis, fructibus costatis. *Carolina. Hispaniola.*

retusa Poir. 2. Cl. foliis obovatis retusis parallele venosis breviter petiolatis, calycibus 8sepalis, corolla 6petala, fructibus globosis ecostatis. *Amer. tropic.*

alba 3. Cl. foliis obovatis obtusis parallele venosis, corolla sub-6petala, fructibus oblongis costatis. *Ind. occid.*

flava 4. Cl. foliis obovato-oblongis parallele venosis, pedunculis 3floris, calyce polysepalo, corolla 5petala. *Jamaica.*

venosa 5. Cl. foliis obovatis obtusis remote inflexo-venosis, pedunculis racemosis, floribus 4fidis. *Martinica.*

nemorosa Meyer. 6. Cl. foliis obovato-oblongis acutis parallele venosis, calycibus 6-8sepalis, corolla 4petala. *Surinam.*

parviflora Humb. 7. Cl. foliis obovatis obtusis parallele venosis, corollis 5petalis calycem subaequantibus. *Nov. Granat.*

elliptica Kunth. 8. Cl. foliis ellipticis utrinque rotundatis obsolete parallele venosis, floribus 4fidis. *Peru.*

multiflora Kunth. 9. Cl. foliis obovatis obtusis parallele venosis, pedunculis multifloris, corolla 5petala calycem 4sepalum superante. *Nov. Granat.*

pedicellata Forst. 10. Cl. foliis obovato-oblongis venosis, floribus cymosis 4fidis. *Nov. Caledon.*

sessilis Forst. 11. Cl. foliis obovato-ellipticis venosis, floribus subsessilibus solitariis 4fidis. *Inf. Amicorum.*

***Floribus oligandris.*

*microcarpa** 12. Cl. caule scandente, foliis obovatis acutis subtiliter parallele venosis, panicula terminali diffusa

trichotoma, floribus dioecis 5andris, fructibus globosis. *Guiana.* (Quapoya scandens Aubl. Xanthe Schreb. W.)

*macrocarpa** 13. Cl. caule scandente, foliis obovato-oblongis parallele venosis acutis, panicula terminali trichotoma, floribus dioecis, fructibus oblongis. *Guiana.* (Quapoya Pana-panapari Aubl. Xanthe parviflora W.)

*acuminata** 14. Cl. caule scandente, foliis subrotundis utrinque abrupte attenuatis mucronatis parallele venosis, floribus axillaribus breviſſime pedunculatis. *Portorico.* Bertero.

volubilis Kunth. 15. Cl. caule volubili, foliis ellipticis utrinque rotundatis parallele venosis. *Nov. Granat.*

tetrandra W. 16. Cl. arborea, foliis obovatis acutis parallele venosis, paniculis axillaribus, floribus 4fidis 4andris. *Quito.* (Havetia laurifolia Kunth.)

1925. STERBECKIA Schreb.

lateriflora W. *Guiana.* Frutex sarmentosus, foliis oppositis oblongis, floribus cymosis axillaribus albis. (Singana guianensis Aubl.)

1926. VATERIA.

indica *Ind. or.* Arbor excelsa, foliis sparsis oblongis coriaceis, floribus paniculatis albis. (Elaeocarpus copalliferus Retz. Vahl.)

1927. ASCIUM Schreb.

*Aubletii** 1. A. floribus subspicatis, cucullis clavatis elongatis longe pedicellatis, antheris minutis numerosissimis, foliis oblongis obtusis mucronatis. *Guiana.* (A. violaceum Vahl. Norantea guianensis Aubl.)

*Selloi** 2. A. floribus racemosis, cucullis subsessilibus in pedicello a flore remotis subrotundis, antheris sub-12 oblongis, foliis obovato-oblongis retusis. *Brasil.* Sello.

*Berterii** 3. A. floribus racemosis, cucullis sessilibus flori approximatis subtus mucronatis, foliis oblongis mucronatis subtus discoloribus. *Ind. occid.* Bertero.

1928. LEGNOTIS Sw.

Cassipurea Sw. 1. L. foliis ovatis acutis basi obliquis, floribus breviſſime pedunculatis. *Guiana. Guadalupa.* Bertero. (Cassipourea guianensis Aubl.)

elliptica Sw. 2. L. foliis oblongis acuminatis, floribus mediocriter pedunculatis. *Jamaica. Portorico.*

1929. VALLEA Mut.

stipularis Mut. 1. V. stipulis stipitatis, ramulis foliisque glabris, axillis venarum subtus barbatis. *Nov. Granat.*

cordifolia R. et P. 2. V. ſtipulis ſtipitatis, ramulis foliisque cordatis ſubtus hirſutis. *Peru.*

pubeſcens Kunth. 3. V. ſtipulis ſeſſilibus, ramulis foliisque ſubtus fuſco-tomentoſis. *Nov. Granat.*

1930. MYRODENDRON Schreb.

amplexicaule W. *Guiana.* Arbor procera, foliis alternis ſemiamplexicaulibus lanceolatis crenatis, floribus corymboſis albis. (Houmiri balſamifera Aubl.)

1931. LEMNISCIA Schreb.

floribunda W. *Guiana.* Arbor ramoſa, foliis oblongis acuminatis, floribus ſpecioſis paniculato-corymboſis coccineis. (Vantanea guianenſis Aubl.)

1932. SARRACENIA.

purpurea 1. S. foliis ventricoſis abbreviatis, appendice cordata erecta ſeſſili. *Amer. bor.*

rubra Walt. 2. S. foliis ventricoſis ſcapo brevioribus ſuperne reticulatis, appendice ovato-acuminata erecta. *Amer. bor.* (L. pſittacina Mx.?)

variolaris Mx. 3. S. foliis ventricoſis elongatis ſuperne dorſo maculatis, appendice brevi fornicata. *Carolina.* (S. adunca Sm. minor Walt.)

flava 4. S. foliis ſtrictis longiſſime infundibuliformibus, appendice erecta cordato-mucronata. *Amer. bor.*

leucophylla Raſin. 5. S. foliis tubuloſis ſtrictis elongatis albis rubro venoſis intus hirſutis, appendice fimbriata. *Louiſiana.*

1933. LOASA Adanſ.

(Folia omnium hirſuto-ſtrigoſa puritiva: pedunculi fere uniflori.)

* *Folia ſimplicia.*

† *cordata lobata.*

ranunculifolia Humb. 1. L. foliis radicalibus longe petiolatis ſinuato-lobatis dentatis ſupra tomentoſis ſubtus ſericeis, caule oligophyllo. *Peru.*

grandiflora Lam. 2. L. foliis cordatis 5lobis inciſo-dentatis duplicato-hirſutis, pedunculis axillaribus elongatis. *Peru.*

xanthiifolia Juſſ. 3. L. foliis cordato-ovatis angulato-dentatis, pedunculis lateralibus. *Peru.*

acerifolia Juſſ. 4. L. foliis cordatis lobatis dentatis, pedunculis axillaribus. *Peru.*

triloba Juſſ. 5. L. foliis cordatis 3lobis dentatis, pedunculis axillaribus. *Peru.*

nitida Lam. 6. L. foliis cordatis lobatis dentatis ſupra nitidis, pedunculis axillaribus. *Peru.*

†† *Folia oblonga incisa aut lobata.*

sclareaefolia Juff. 7. L. foliis oblongis acuminatis sinuato-dentatis, caule dichotomo, pedunculis axillaribus. *Peru. Chili.*

chenopodifolia Lam. 8. L. foliis ovalibus inciso-dentatis, pedunculis subracemosis. *Peru.*

loxensis Kunth. 9. L. foliis ovato-oblongis lobatis irregulariter dentatis subtus canescentibus, pedunculis subracemosis. *Peru.*

††† *Folia pinnatifida.*

argemonoides Juff. 10. L. foliis cordatis lobato-pinnatifidis tomentosis, pedunculis 3floris. *Nov. Granat.*

acanthifolia Juff. 11. L. foliis cordatis pinnatifidis dentatis, pedunculis axillaribus 1floris. *Chili.*

contorta Juff. 12. L. foliis subcordato-oblongis sinuato-pinnatifidis dentatis, pedunculis axillaribus elongatis, fructibus extus spiratim tortis calyce coronatis. *Peru.*

palmata * 13. L. foliis cordatis palmatis pinnatifidis asperis, pedunculis lateralibus, caule volubili. *Monte Video.* Sello.

†††† *Folia bipinnatifida.*

urens Jacq. 14. L. foliis oppositis 2pinnatifidis sinuatis, laciniis obtusiusculis, ramis maculatis, pedunculis axillaribus. *Peru.*

ambrosiaefolia Juff. 15. L. foliis alternis 2pinnatifidis, laciniis acutiusculis, pedunculis lateralibus. *Peru.* (L. hispida L.)

tricolor Ker. 16. L. foliis oppositis cordatis 2pinnatifidis inciso-dentatis, pedunculis axillaribus. *Chili.*

volubilis Juff. 17. L. foliis alternis 2pinnatifidis, laciniis lanceolatis obtusis ciliatis, caule volubili. *Chili.*

** *Folia ternata.*

triphylla Juff. 18. L. foliis ternatis lanceolatis serratis, medio elongato, pedunculis lateralibus. *Peru.*

papaverifolia Kunth. 19. L. foliis ternatis oblongis dentatis, medio maximo pinnatifido, pedunculis oppositifoliis subracemosis. *Nov. Granat.*

1934. MENTZELIA.

hispida W. 1. M. floribus pedunculatis solitariis, petalis integerrimis mucronatis. *Mexico.* (M. aspera Cav., strigosa Kunth.)

aspera 2. M. floribus subsessilibus solitariis, petalis crenatis obtusis. *Ind. occid.*

oligosperma Sims. 3. M. floribus pedunculatis axillaribus, petalis acuminatis, radice tuberosa. *Louisiana.*

1935. MAYNA.

odorata Aubl. 1. M. foliis oblongis integerrimis glabris. *Cayenn.*

*fericea** 2. M. foliis lanceolatis acuminatis integerrimis subtus fericeis. *Braſil.*

braſilienſis Radd. 3. M. foliis oblongis denticulatis ſubpubeſcentibus. *Braſil.*

1936. HEPTACA Lour.

africana *Ora Afric. orient.* Arbor parva, foliis alternis ovatis glabris integerrimis, pedunculis lateralibus multifloris, floribus albis.

1937. DECADIA Lour.

aluminoſa Lour. *Inſ. Molucc. orient. Cochinchina.* Arbor mediocris, foliis ovato-oblongis ſerratis laevibus, floribus racemoſis albis axillaribus et lateralibus.

1938. BRUGUIERA Lam.

gymnorrhiza Lam. 1. Br. radicibus epigaeis, foliis ovato-oblongis acutis nitidis, fructibus teretibus acutis. *Inſ. Molucc. Ind. or.* (Rhizophora L.)

*ſexangularis** 2. Br. foliis ovato-lanceolatis, fructibus ſexangularibus obtuſis. *Cochinchina.* (Rhizophora Lour.)

1939. ALANGIUM Juſſ.

decapetalum Lam. 1. A. ramis ſpineſcentibus, foliis oblongis glabriusculis, floribus 10petalis, fructibus glabris. *Ind. or.* (Grewia ſalvifolia L. ſuppl.)

hexapetalum Lam. 2. A. inerme, foliis ovato-lanceolatis glabris, floribus 6petalis, fructibus tomentoſis. *Ind. or.*

tomentoſum Lam. 3. A. ſubinerme, foliis oblongis obtuſis, ramulis calycibusque tomentoſis, fructibus pubeſcentibus *Ind. or.*

1940. LECYTHIS.

**Foliis integerrimis aut ſubintegerrimis.*

Ollaria 1. L. foliis ſeſſilibus cordato-ovatis ſubintegerrimis, racemis terminalibus faſciculatis. *Braſil.*

grandiflora Aubl. 2. L. foliis petiolatis oblongis acutis, racemis lateralibus flexuoſis, petalis obtuſis. *Guiana. Braſil.*

amara Aubl. 3. L. foliis petiolatis oblongis acuminatis, racemis axillaribus terminalibusque, petalis acutis. *Guiana.*

Zabucajo Aubl. 4. L. foliis petiolatis lanceolatis elongatis acutis, racemis terminalibus, petalis acutis. *Guiana.*

Idatimon Aubl. 5. L. foliis petiolatis oblongis, pedunculis racemoſis axillaribus glanduloſis, petalis obtuſis. *Guiana.*

parviflora Aubl. 6. L. foliis petiolatis oblongis acuminatis, racemis paniculatis terminalibus, petalis acutis. *Guiana.*

bracteata W. 7. L. foliis petiolatis obovato-oblongis, racemis lateralibus bracteatis, fructibus 6locularibus 2corticatis. *Cayenn.* (Couroupita guianenſis Aubl.)

***Foliis dentatis, ſerratis.*

minor Jacqu. 8. L. foliis petiolatis oblongo-lanceolatis elongatis ſerratis, racemis ſpicatis multifloris. *Amer. auſtr.*

longifolia Kunth. 9. L. foliis lanceolatis utrinque attenuatis remote dentatis conduplicatis. *Ad Orinocum.*

elliptica Kunth. 10. L. foliis ellipticis abrupte acutis dentato-crenatis, racemis ſtrictis. *Ad fl. Magdalenae.*

*braſilienſis** 11. L. foliis lanceolatis obtuſiusculis baſi attenuatis ſubtus pubeſcentibus antice crenulato-ſerrulatis, pedunculis breviſſimis 1floris, calycibus ſericeis. *Braſil.* Sello.

1941. LAGERSTRÖMIA.

indica 1. L. petalis criſpis, panicula terminali, foliis ſubrotundo-ovatis acutis glabris. *China. Cochinchina. Japon.*

Reginae Roxb. 2. L. petalis undulatis, panicula terminali, foliis amplis oblongis glabris. *Ind. or. Java.* (Adambea glabra Lam.)

hirſuta W. 3. L. petalis planis, panicula corymboſa terminali, foliis oblongis pubeſcentibus. *Malabar.* (Adambea hirſuta Lam.)

Münchhauſia W. 4. L. petalis planis, racemo ſubcompoſito terminali, foliis ovatis glabris. *China.* (Münchhauſia ſpecioſa L.)

parviflora Roxb. 5. L. petalis planis, pedunculis axillaribus 3floris, foliis oblongis obtuſis ſcabris ſubtus pallidis. *Ind. or.*

1942. THEA.

chinenſis Sims. 1. Th. pedunculis axillaribus terminalibusque ſolitariis 1floris, floribus 6-9petalis, fructibus dehiſcentibus. *China auſtr. et media. Japon.* (Th. cantonienſis Lour., viridis et Bohea L.)

cochinchinenſis Lour. 2. Th. pedunculis terminalibus ſolitariis, floribus 5petalis, fructibus dehiſcentibus. *Cochinchina.*

oleoſa Lour. 3. Th. pedunculis axillaribus 3floris, floribus 6petalis, fructibus clauſis. *China auſtr.*

1943. ESPERA W.

cordifolia W. *Jaffna in India orient.* Rottler. Frutex ſcandens, foliis cordatis integerrimis nitidis, floribus paniculatis.

1944. SANGUINARIA.

canadenſis — *Amer. bor.* Herba folio ſubreniformi ſinuato-lobato glauco, ſcapo 1floro, floribus albis.

1945. ARGEMONE.

mexicana — *Mexico. Carolina.* Herba annua foliis pinnatifidis inciſis ſpinoſis, floribus axillaribus flavis. (A. alba Rafin.)

1946. PODOPHYLLUM.

peltatum — 1. P. floribus ſub-20andris, fructibus virentibus ovatis. *Amer. bor.*

callicarpon Rafin. — 2. P. floribus ſub-10andris, fructibus carneis oblongis. *Louiſiana.*

1947. MONODORA Dun.

Myriſtica Dun. — *Jamaica.* Arbor foliis alternis oblongis coriaceis, pedunculis lateralibus unifloris. (Anona Myriſtica Gärtn.)

1948. ONCOBA Forsk.

ſpinoſa Perſ. — *Arabia.* Arbor grandis, ramis verrucoſis ſpinoſis, foliis alternis ovatis ſerratis, floribus albis.

1949. VENTENATIA P. B.

glauca P. B. — *Guinea.* Frutex foliis alternis ovali-oblongis ſupra glauco-glutinoſis, floribus ſolitariis terminalibus pedunculatis puniceis.

1950. NYMPHAEA.

* *Antherae laterales: flores coeruleſcentes.*

coerulea Sav. — 1. N. foliis peltatis repandis glabris, lobis baſeos acutis ſubparallelis, petalis lanceolatis. *Aegypt. infer.*

ſcutifolia Cand. — 2. N. foliis peltatis ſinuato-dentatis glabris, lobis baſeos acutis incumbentibus, petalis oblongis obtuſis. *C. B. S.* (N. coerulea Andr.)

ſtellata W. — 3. N. foliis peltatis integerrimis glabris, lobis baſeos divaricatis, petalis acutis calyce brevioribus. *Malabar. Madagaſcar.* (N. madagaſcarenſis Cand.)

pulchella Cand. — 4. N. foliis peltatis ſubrepandis glabris, lobis baſeos obtuſis divergentibus, petalis acuminatis calyce brevioribus. *Quito.* Ruiz et Pavon.

** *Antherae terminales: flores albi aut roſei.*

† *Folia peltata.*

Lotus 4. N. foliis orbiculatis argute ſerratis ſubtus pedunculisque pubeſcentibus, lobis baſeos acutis discretis. *Aegypt.*

thermalis Cand. 5. N. foliis orbiculatis argute denticulatis ſubtus pedunculisque glaberrimis, lobis baſeos acutis approximatis. *Hungar.* (N. Lotus Kit.)

pubeſcens W. 6. N. foliis ſubreniformibus argute dentatis ſubtus villoſis maculatis, lobis baſeos rotundatis. *Ind. or.* (N. Lotus, N. L. Burm. P. B.)

rubra Roxb. 7. N. foliis peltatis argute dentatis ſubtus pubeſcentibus emaculatis. *Ind. or.* (Caſtalia magnifica Salisb.)

ampla Cand. 8. N. foliis ſuborbiculatis dentatis ſubtus glabris reticulato-areolatis, lobis baſeos acutis patentibus. *Ind. occid. Aegypt.* (N. Lotus Sieber. ad Damiat. N. Rudgeana Meyer.)

verſicolor Roxb. 9. N. foliis peltatis margine intraque fiſſuram ſinuato-dentatis punctato-puſtulatis utrinque glabris. *Bengal.*

edulis Cand. 10. N. foliis peltatis ovalibus integerrimis ſubtus pubeſcentibus. *Bengal.* (Caſtalia Salisb.)

†† *Folia cordata ſubintegerrima.*

reniformis Walt. 11. N. foliis cordato-reniformibus glabris. *Carolin.* (Nelumbium W. Cyamus Pursh.)

alba 12. N. foliis cordatis integerrimis, radiis ſtigmatis aſcendentibus. *Europ.*

odorata Ait. 13. N. foliis cordato-ſagittatis integerrimis, lobis baſeos diſtantibus mucronatis, nervis venisque ſubtus prominulis, radiis ſtigmatis inflexis. *Amer. bor.* (N. alba Walt. Caſtalia pudica Salisb.)

minor Cand. 14. N. foliis cordato-ſubhaſtatis integerrimis, nervis venisque ſubtus prominulis, lobis baſeos divaricatis acuminatis, petiolis pedunculisque piloſiusculis. *Amer. bor.* (N. odorata β., minor Sims.)

nitida Sims. 15. N. foliis cordatis integerrimis, nervis lateralibus ſubtus aequatis, lobis baſeos rotundatis, petiolis laevibus, petalis obtuſis. *Sibir.* (N. odorata W.)

pygmaea Ait. 16. N. foliis cordato-ſagittatis integerrimis ſubtus coloratis, petalis acutis, ſtigmate pauciradiato. *China.* (Caſtalia Salisb.)

blanda Meyer. 17. N. foliis cordatis integerrimis ſupra ſubbullatis, venis ſubtus canaliculatis, petalis acuminatis. *Surinam.*

1951. EURYALE Salisb.

ferox Salisb. *China auſtr. Ind. or.* Herba aquatica tota aculeis horrida, foliis amplis peltatis orbiculatis, floribus violaceis. (Anneslea ſpinoſa Andr.)

1952. NUPHAR Sm.

**Calyx 5sepalus.*

luteum Sm. 1. N. ſtigmate integro umbilicato, foliis ovali-cordatis, lobis approximatis, petiolis acutangulis. *Europ. Aſia. Amer. bor.* (Nymphaea L.)

pumilum Cand. 2. N. ſtigmate lobato, foliis ovali-cordatis, lobis diſtantibus, petiolis obtusangulis. *Europ. bor.* (Nymphaea lutea *β.* minima W., N. pumila Hofm., Nuphar minima Sm.)

Kalmianum Ait. 3. N. ſtigmate inciſo, foliis cordato-ſubrotundis, lobis baſeos ſubapproximatis, petiolis teretibus. *Amer. bor.* (Nymphaea lutea *β.* Kalmiana Mx., microphylla Perſ., Kalmiana Sims.)

ſericeum Lang. 4. N. ſtigmate dentato, foliis cordato-oblongis, lobis baſeos diſtantibus, pedunculis petiolisque lepidoto-ſericeis. *Danub.*

japonicum Cand. 5. N. ſtigmate multiradiato, foliis cordato-ſagittatis, lobis baſeos ſubdiſtantibus acutis, petiolis teretiusculis. *Japon.* (Nymphaea lutea Thunb.)

***Calyx 6ſepalus.*

advena Ait. 6. N. ſtigmate multiradiato, foliis erectis cordatis ſubrepandis, lobis baſeos rotundatis diſtantibus, petiolis teretibus. *Amer. bor.* (Nymphaea advena Ait. ed. 1.)

ſagittaefolium Pursh. 7. N. floribus apetalis, antheris ſubſeſſilibus, foliis cordato-ſagittatis elongatis obtuſis. *Carolina. Georgia.* (N. longifolia Sm., Nymphaea ſagittaefolia W., longifolia Mx.)

1953. THYLACIUM Lour.

lucidum Cand. 1. Th. foliis ellipticis acutiusculis glabris, ramulis petiolisque velutinis, bacca ovato-globoſa. *Inſ. Booby inter Nov. Holl. et Nov. Guin.*

africanum Lour. 2. Th. foliis ovalibus mucronulatis ramulisque glabris, bacca oblonga. *Ora Afric. orient.* (Th. ovalifolium Juſſ.)

heterophyllum Juſſ. 3. Th. foliis ovali-lanceolatis ſimplicibus ternatisque. *Madagaſcar.* (Capparis panduriformis Thuar.)

panduriforme Juſſ. 4. Th. foliis panduriformibus obtuſis ſimplicibus ternatisque. *Inſ. Maſcaren.* (Capparis Lam.)

1954. MAERUA Forsk.

racemoſa Vahl. 1. M. floribus racemoſis, corona faucis integra, foliis retuſis. *Arabia.*

uniflora Vahl. 2. M. pedunculis 1floris, corona faucis multifido-laciniata, foliis oblongis coriaceis eveniis. *Arabia. Afric. occid.* (M. angolenſis Cand.?)

1955. RYANIA Vahl.

speciosa Vahl. *Inf. Trinit.* Arbor speciosa, foliis alternis oblongis acuminatis elongatis subtus venoso-reticulatis, floribus axillaribus subsolitariis pedunculatis. (Patrisia pyrifera Rich. Pers.)

1956. PATRISIA Rich.

dentata Kunth. 1. P. foliis ovato-oblongis acuminatis denticulatis, venis subtus pubescentibus, pedunculis unifloris. *Ad Orinocum. Cayenn.* (P. affinis Kunth., parviflora Cand.)

bicolor Cand. 2. P. foliis oblongis subtus albido-tomentosis, pedunculis multifloris. *Cayenn.*

1957. FLACOURTIA Commers.

Ramontchi Herit. 1. Fl. spinosa, foliis subrotundo-ovatis acutis crenatis, racemis paucifloris. *Madagascar.*

sapida Roxb. 2. Fl. spinosa, foliis ellipticis repando-serratis, pedunculis 3floris. *Ind. or.*

sepiaria Roxb. 3. Fl. spinosa, foliis obovato-oblongis repando-serratis, pedunculis 3floris. *Ind. or.*

flavescens W. 4. Fl. spinosa, foliis obovatis serratis, pedunculis 3floris. *Guinea.*

rhamnoides Burch. 5. Fl. spinosa, foliis ellipticis acutiusculis subserratis, pedunculis 1floris. *C. B. S.*

cataphracta Roxb. 6. Fl. inermis? foliis ovato-oblongis acuminatis serratis, pedunculis sub-6floris. *Ind. or.*

inermis Roxb. 7. Fl. inermis, foliis elliptico-oblongis crenatis nitidis, floribus racemosis ☿, stylo 5fido. *Inf. Molucc.*

1958. ROYDSIA Roxb.

suaveolens Roxb. *Silhet, prov. Ind. or.* Arbor foliis oblongo-lanceolatis alternis, racemis axillaribus.

1959. SEGUIERA.

americana 1. S. aculeata, aculeis recurvis, foliis ellipticis emarginatis nitidis integerrimis, floribus racemosis. *Amer. austr.*

asiatica Lour. 2. S. inermis scandens, foliis ovatis integerrimis asperis, floribus racemosis. *Cochinchina.*

1960. RHEEDIA.

lateriflora *Inf. Antill.* Arbor foliis amplis oblongis, pedunculis axillaribus subdivisis. (Mammea humilis Vahl.)

1961. CHLOROMYRON Pers.

verticillatum Pers. *Peru.* Arbor excelsa, ramis quaternis, foliis oblongis acuminatis integerrimis: e trunco ramisque

inciſis balſamum virens ſtillat. (Verticillaria acuminata R. et P.)

1962. XYLOSMA Forſt.

ſuaveolens Forſt. 1. X. foliis ovatis ſerratis. *Inſ. ſociet.* (Myroxylon ſuaveolens Forſt. char.)

orbiculatum Forſt. 2. X. foliis ſubrotundis integerrimis. *Inſ. Amicorum.* (Myroxylon Forſt. char.)

1963. DAVILLA Vand.

braſiliana Cand. *Braſil.* Frutex foliis oblongis obtuſis, floribus ſubpaniculatis fructus mentientibus ob ſepala interiora capſularum more genitalia foventia. (D. rugoſa Poir.)

1964. SLOANEA.

dentata 1. Sl. foliis cordato-ovatis denticulatis, ſtipulis ſerratis, calycibus 5-6-7fidis. *Inſ. Carib. Guiana.* (Sl. Plumerii Aubl., grandiflora Sm., Maſſoni Sw.)

ſinemarienſis Aubl. 2. Sl. foliis ſubrotundo-ovatis integerrimis, ſtipulis acuminatis, calycibus 5fidis. *Inſ. Carib. Guiana.* (Sl. Aubletii Sw.)

1965. AZARA R. et P.

integrifolia R. et P. 1. A. foliis geminis integerrimis, majori obovato, floribus ſubſpicatis pendulis. *Chili.*

dentata R. et P. 2. A. foliis geminis dentatis, majori elliptico, floribus umbellatis. *Chili.*

ſerrata R. et P. 3. A. foliis geminis ſerratis, majori lanceolato, floribus corymboſis. *Chili.*

1966. LUDIA Commerſ.

ſeſſiliflora Lam. 1. L. foliis ovato-oblongis acutiusculis venoſis, floribus axillaribus ſeſſilibus, ſtigmatibus ternis bifidis. *Inſ. Maſcaren.*

myrtifolia Lam. 2. L. foliis ovatis acutis integerrimis venoſis, floribus pedunculatis axillaribus ſolitariis, ſtigmate 3lobo. *Inſ. Maſcaren.*

heterophylla Lam. 3. L. foliis ramorum juniorum exiguis ovatis ſpinuloſo-dentatis, adultiorum obovatis nitidis integerrimis, floribus pedunculatis axillaribus ſolitariis. *Inſ. Maſcaren.*

1967. PROCKIA P. Brown.

* *Stylus filiformis, ſtigmate capitato vel acuticulo.*

Crucis 1. Pr. foliis ovatis acuminatis ſerrulatis glabriuſculis 3nerviis, ſtipulis falcatis, racemis paucifloris. *Inſ.*

Inf. Carib. Mexico. Braſil. (Tinea triplinervia N. E.)

*ſeptemnervia** 2. Pr. foliis cordato-oblongis acuminatis ſerratis ſubtus pubeſcentibus 7nerviis, ſtipulis ſemicordatis, racemis lateralibus ſub-8floris piloſis. *Braſil.* Sello.

deltoides Lam. 3. Pr. foliis deltoideo-ſubrotundis crenatis glabris, floribus ſolitariis 5partitis. *Inf. Maſcaren.*

** *Stigmate ſeſſili plano.*

theaeformis W. 4. Pr. foliis oblongis baſi attenuatis crenulatis utrinque glabris baſi ſubrevolutis, floribus ſolitariis. *Inf. Maſcaren.* (Lightfootia Vahl. Ludia heterophylla Bory. habet folia ramorum ſterilium pinnatifida.)

ſerrata W. 5. Pr. foliis ovato-oblongis acuminatis ſerratis, pedunculis lateralibus aggregatis 1floris. *Inf. Carib.* (Lightfootia Vahl. Sw.)

integrifolia W. 6. Pr. foliis obovatis oblongisque obtuſis ſubemarginatis ſubintegerrimis coriaceis, pedunculis ſubaggregatis 1floris. *Inf. Maſcaren.* (Lightfootia Vahl.)

1968. LAËTIA.

apetala 1. L. foliis oblongis obtuſis ſerrulatis nitidis, pedunculis ſub-3floris axillaribus. *Ind. occid.*

*ſcabra** 2. L. foliis ovalibus ſubdenticulatis opacis ſubtus ſcaberrimis triplinerviis, pedunculis axillaribus ternis, calycibus ſericeis. *Hiſpaniola.* Bertero.

Thamnia Sw. 3. L. foliis oblongis ſubintegerrimis nitidis, pedunculis axillaribus diviſis. *Jamaica.*

*paroiſlora** 4. L. foliis obovato-oblongis utrinque villoſiusculis, paniculis axillaribus tomentoſis, floribus glomeratis. *Braſil.* Sello.

hirtella Kunth. 5. L. foliis oblongis obtuſis argute denticulatis ſubtus pubeſcentibus, pedunculis 1floris. *Cumana.*

guazumaefolia Kunth. 6. L. foliis oblongis obtuſiusculis obſolete denticulatis ſubtus pubeſcentibus, pedunculis dichotomis multifloris, fructibus 6gonis. *Nov. Granat.*

completa 7. L. floribus corollatis, foliis ovatis obtuſis ſerratis rugoſis. *Amer. auſtr.*

1969. PARIANA Aubl.

campeſtris Aubl. 1. P. floribus androgynis verticillato-ſpicatis, ♀ centrali, ♂ quaternis ambeuntibus, foliis ovatis acuminatis ſtriatis, ora vaginarum longiſſime piloſa. *Cayenn.*

*anguſtifolia** 2. P. floribus dioecis elongato-ſpicatis, floſculis confertis, calycibus obtuſis, foliis linearibus glabris. *Ad Orinocum* Humb. (Panicum triticeum W. herb.)

1970. EVANDRA R. Br.

ariſtata R. Br. 1. E. culmo folioſo, ſpiculis paniculatis axillaribus terminalibusque, ſquamis ariſtatis. *Nov. Holl.*

pauciflora R. Br. 2. E. culmo nudo, ſpiculis lateralibus geminis ſolitariisve ſeſſilibus, ſquamis muticis. *Nov. Holl.*

1971. CHRYSITHRIX.

capenſis *C. B. S.* Planta magis Aroideis affinis quam Graminibus, ſcapo ancipiti, e cujus latere ſtamina innumera aurea antheris linearibus erumpunt.

DIGYNIA.

1972. CURATELLA.

americana. *Amer. auſtr.* Arbor mediocris, foliis oblongis ſupra ſcaberrimis ſubtus venoſis denticulato-aculeatis, paniculis confertis e ramo adultiori, floribus albis.

1973. HEMISTEMMA Juſſ.

Commerſonii Cand. 1. H. foliis oppoſitis ovali-oblongis mucronatis, pedunculis calycibusque tomentoſo-lanatis. *Madagascar.* (Helianthemum coriaceum *α.* Perſ.)

Aubertii Cand. 2. H. foliis ſpathulato-lanceolatis acutis ſubtus venoſis, pedunculis glabriusculis, calycibus ſericeis. *Madagascar.* (Helianthemum coriaceum *β.* Perſ.)

dealbatum R. Br. 3. H. foliis alternis ſpathulatis mucronatis ſubtus ſericeo-candicantibus, floribus ſpicatis ſecundis. *Ora bor. nov. Holl.*

Bankſii R. Br. 4. H. foliis obovato-oblongis obtuſis ſubtus denſe tomentoſis, floribus ſeſſilibus ſecundis. *Ora bor. nov. Holl.*

anguſtifolium R. Br. 5. H. foliis alternis linearibus anguſtiſſimis ſubtus candicantibus, floribus ſpicatis ſecundis ſericeis villoſis. *Ora bor. nov. Holl.*

† *Lechenaultii* Cand. 6. H. foliis ſpathulatis apice ſubemarginatis ſubtus albo-tomentoſis, floribus axillaribus ſolitariis breviſſime pedunculatis. *Nov. Holl. ora auſtr.*

1974. TEMUS Molin.

moſchata Molin. *Chili.* Arbor excelſa, foliis oblongis ſempervirentibus lucidis odorem nucis moſchatae ſpirantibus, floribus carneis.

1975. BAUERA Andr.

rubioides Andr. *Nov. Holl.* Arbuscula venuſta, foliis verticillatis lanceolatis glabris ſerrulatis, floribus pedunculatis axillaribus ſolitariis puniceis.

1976. POTERIUM.

spinosum 1. P. fruticosum, spinis ramosis divaricatis, foliolis minutis, spicis oblongis. *Sicilia. Creta. Syria.*

caudatum Ait. 2. P. frutescens inerme, ramis teretibus villosis, spicis elongatis laxis. *Inf. Canar.*

ancistroides Desf. 3. P. suffruticosum inerme, ramulis decumbentibus, foliolis subrotundis, spicis globosis. *Afr. bor.*

agrimonifolium Cav. 4. P. herbaceum hirsutum, foliolis lanceolatis, spicis oblongo-ovatis. *Hispan.*

hybridum 5. P. herbaceum glabrum, caule ramisque strictis teretibus. *Gallia austr.*

polygamum Kit. 6. P. herbaceum glabrum, caule ramisque diffusis angulatis, spicae oblongae floribus polygamis. *Hungar.*

Sanguisorba 7. P. herbaceum glabrum, caule ramisque strictis angulatis, spicae ovato-oblongae floribus androgynis. *Europ.*

1977. CLIFFORTIA.

* *Foliis alternis.*

strobilifera 1. Cl. foliis linearibus cuspidatis patentibus margine subserrulatis, stipulis membranaceis bidentatis. *C. B. S.*

graminea Thb. 2. Cl. foliis linearibus longissime cuspidatis strictis apice setaceo-serrulatis nervosis, vaginis latis planis apice bidentatis. *C. B. S.*

ruscifolia 3. Cl. foliis confertis lanceolatis cuspidato-pungentibus nervosis patulis, floralibus sub-3dentatis villosis. *C. B. S.*

tridentata W. 4. Cl. foliis cuneiformibus apice profunde 3dentatis ramisque pilosissimis. *C. B. S.* Hort. Kew.

cuneata Ait. 5. Cl. foliis cuneatis elongatis glabris glaucis apice acute dentatis. *C. B. S.*

ferruginea 6. Cl. foliis lanceolatis basi attenuatis setaceo-serratis striato-venosis utrinque glabris, stipulis ferrugineis membranaceo-setaceis elongatis bifidis. *C. B. S.* (Cl. serrata Thb., berberidifolia Lam.)

odorata Thb. 7. Cl. foliis ovatis obtusis aequaliter serratis subtus venosis ramisque albo-villosis. *Afric. austr.*

ilicifolia 8. Cl. foliis subrotundo-ovatis amplexicaulibus mucronato-dentatis venoso-striatis glaberrimis. *C. B. S.* (C. cordifolia Lam.)

** *Foliis oppositis.*

cinerea Thb. 9. Cl. foliis connatis ovatis obtusiusculis subtus cariuatis incano-tomentosis. *Afric. austr.*

pulchella 10. Cl. foliis orbiculatis integerrimis appressis striatis glaberrimis. *Afric. austr.*

crenata 11. Cl. foliis orbiculatis crenatis striato-nervosis glaucescentibus appressis. *C. B. S.*

**** Foliis fasciculatis.*

ericaefolia 12. Cl. foliis subternis teretibus sulcatis obtusis petiolatis. *C. B. S.*

teretifolia 13. Cl. foliis subquinis teretibus mucronatis subtus convexis glabris. *C. B. S.*

juniperina 14. Cl. foliis 7-9nis lineari-filiformibus subulatis scabris recurvis. *C. B. S.*

†*filifolia* 15. Cl. foliis subquinis semitereti-filiformibus glabris incurvis. *C. B. S.*

***** Foliis ternatis sessilibus.*

obcordata 16. Cl. foliis subrotundis obtusissimis integerrimis eveniis, medio minori obcordato. *Afric. austr.*

dentata W. 17. Cl. foliis obovatis venosis apice 3dentatis glabris, medio majori, ramulis pubescentibus. *Afr. austr.*

trifoliata 18. Cl. foliis confertis venosis pilosis, lateralibus lanceolatis integerrimis, medio obovato 3dentato. *Afric. austr.*

ternata 19. Cl. foliis lanceolatis acutis integerrimis pubescentibus. *C. B. S.*

falcata 20. Cl. foliis linearibus falcatis glabris. *C. B. S.*

sarmentosa 21. Cl. foliis linearibus angustissimis villosis, caule sarmentoso. *Afric. austr.*

1978. ABLANIA Aubl.

guianensis Aubl. *Guiana.* Arbor excelsa foliis oblongis undulatis, floribus corymbosis. (Trichocarpus laurifolia W.)

1979. FOTHERGILLA.

alnifolia *Carolina.* Frutex foliis oblongis obtusis vel acutiusculis apice subserratis subtus canescentibus, floribus spicatis (staminibus) albis. (F. Gardeni Jacq.)

1980. LACIS Schreb.

fluviatilis W. 1. L. foliis sessilibus sinuato-pinnatifidis crispis, floribus spicatis polyandris. *Guiana.*

fucoides Mart. 2. L. foliis multifido-laciniatis planis apice fimbriatis, floribus solitariis pedunculatis oliganthis. *Brasil.* [Marathrum Humb. p. 246 huc pertinere, sero vidi.]

TRIGYNIA.

1981. HOMALIUM Jacq.

racemosum Jacq. 1. H. foliis ovato-oblongis crenato-serratis, floribus paniculatis axillaribus. *Martinic. Guadalupe.*

Racoubea Sw. 2. H. foliis oblongis crenato-dentatis, floribus subspicatis axillaribus. *Guiana.* (Racoubea guianensis Aubl.)

1982. SAURAVIA W.

excelsa W. 1. S. foliis obovato-oblongis acutiusculis integerrimis supra scabris subtus ad venas hirsutis, panicula trichotoma elongata villosa. *Nov. Granat.*

villosa Cand. 2. S. foliis ellipticis utrinque attenuatis subserratis subtus pedunculisque villosis. *Mexico.*

† *cauliflora* Cand. 3. S. foliis oblongis acuminatis aristato-serratis supra glabris subtus ferrugineo-villosis, pedunculis 1floris in trunco aggregatis. *Java.*

crenulata Cand. 4. S. foliis obovatis acutiusculis crenulato-serratis, pedunculis 1floris ramorum veterum aggregatis. *Java.*

gigantea Cand. 5. S. foliis subcordato-oblongis acuminatis serratis subtus rufo-velutinis, pedunculis axillaribus trichotomis folio brevioribus subebracteatis. *Java.*

nepalensis Cand. 6. S. foliis oblongis utrinque attenuatis serratis supra glabris subtus ad nervos ramulisque strigosis, pedunculis racemosis. *Nepal.*

bracteosa Cand. 7. S. foliis subcordato-oblongis acuminatis subserratis, pedunculis axillaribus trichotomis, bracteis oblongis pedicellos aequantibus. *Java.*

bracteolata Cand. 8. S. foliis oblongis utrinque attenuatis subserratis glabris, pedunculis lateralibus subramosis, bracteolis minimis. *Java.*

tristyla Cand. 9 S. foliis ellipticis utrinque subattenuatis tenuissime serratis glabris, petiolis pedunculisque fasciculatis strigoso-squamulosis. *Inf. Molucc.*

serrata Cand. 10. S. foliis oblongis utrinque attenuatis serratis glabris, petiolis pedunculisque ferrugineo-tomentosis. *Mexico.*

lanceolata Cand. 11. S. foliis oblongo-lanceolatis acuminatis minutissime serrulatis, junioribus squamulas rufas ad nervos gerentibus, pedunculis axillaribus umbelliferis petiolum aequantibus. *Java.*

nudiflora Cand. 12. S. foliis obovatis acutiusculis subserratis, adultis utrinque glabris, pedunculis lateralibus 1floris solitariis. *Java.*

1983. HIBBERTIA Salisb.

* *Capsulis glabris: floribus 2-5gynis.*

volubilis Andr. 1. H. foliis obovato-lanceolatis mucronatis subintegerrimis subtus pubescentibus, floribus subsessilibus, caule subvolubili. *Nov. Holl.* (Dillenia scandens W., volubilis Vent., speciosa Curt.)

dentata R. Br. 2. H. foliis oblongis acutis mucronato-dentatis subtus scaberrimis, floribus pedunculatis, caule volubili. *Nov. Holl. Inf. Diemen.*

foliigna R. Br. 3. H. foliis oblongo-linearibus acuminatis callosomucronatis integerrimis subtus villosis, floribus sessilibus, caule erecto. *Nov. Holl.*

procumbens Cand. 4. H. foliis linearibus craſſiuſculis eveniis, caule procumbente, floribus terminalibus pedunculatis, ſeminibus pulpae immerſis. *Nov. Holl. bor.* (Dillenia procumbens Labill.)

virgata R. Br. 5. H. foliis linearibus obtuſiuſculis glabris, caule erecto gracili, floribus ſeſſilibus oligandris. *Nov. Holl.*

faſciculata R. Br. 6. H. foliis ſubfaſciculatis lineari-ſubulatis glabris, caule erecto, ramulis pubeſcentibus, floribus ſeſſilibus. *Nov. Holl.*

linearis R. Br. 7. H. foliis linearibus acutis integerrimis glabris, caule erecto, ramis gracilibus, floribus ſeſſilibus. *Nov. Holl.*

obtuſifolia Cand. 8. H. foliis linearibus obtuſis mucronulatis glabris, caule erecto, floribus ſeſſilibus. *Terra Diemen.*

diffuſa R. Br. 9. H. foliis obovatis apice dentatis glabris, caule humili diffuſo, floribus ſeſſilibus. *Nov. Holl.*

monogyna R. Br. 10. H. foliis ſpathulatis apice 2-3dentatis glabris, caule erecto, floribus ſeſſilibus 1gynis. *Nov. Holl.*

groſſulariifolia Salisb. 11. H. foliis ſuborbiculatis crenato-dentatis, floribus pedunculatis oppoſitifoliis ſub-10gynis, caule procumbente. *Nov. Holl. ad Afric.* (H. crenata Andr.)

** *Capſulis piloſis vel lepidotis: floribus* 2*gynis.*

pedunculata R. Br. 12. H. foliis linearibus obtuſiuſculis margine ſubrevolutis, germinibus incanis. *Nov. Holl.*

ſerpyllifolia R. Br. 18. H. foliis ellipticis coriaceis ſupra laevibus ſubtus pubeſcentibus, germinibus villoſis. *Nov. Holl.*

aſpera Cand. 14. H. foliis oblongis obtuſis margine ſubrevolutis ſupra ſcabriuſculis ſubtus villoſis, germinibus hirſutis. *Nov. Holl.*

hermanniaefolia Cand. 15. H. foliis obovatis ſupra villoſis ſubtus ſtellato-tomentoſis, germinibus tomentoſis. *Nov. Holl.*

oblongata R. Br. 16. H. foliis oblongis ſupra glabris ſubtus villoſis ſtellato-tomentoſis, germinibus lepidotis. *Nov. Holl. bor.*

ciſtifolia R. Br. 17. H. foliis oblongis ſupra ſtellato-pubeſcentibus ſubtus albido-villoſis, germinibus lepidotis. *Nov. Holl. bor.*

tomentoſa R. Br. 18. H. foliis oblongo-linearibus utrinque villoſo tomentoſis, germinibus lepidotis. *Nov. Holl. bor.*

lepidota R. Br. 19. H. foliis linearibus acuminatis utrinque germinibusque lepidotis, pedunculis terminalibus confertis. *Nov. Holl. bor.*

1984. PAEONIA.

* *Fruticoſa.*

Mutan Sm. 1. P. foliolis distinctis ſubtus glaucis, laciniis ovali-oblongis, germinibus tomentoſis urceolo membra-

naceo inclusis. *Tataria orient. China. Japon.* (P. officinalis Lour. Thunb., papaveracea et suffruticosa Andr.)

** *Herbaceae.*

† *Foliis subtus glabris.*

albiflora Pall. 2. P. caule sub-3floro, foliolis ovato-lanceolatis confluentibus subtus nitidis, fructibus glabris. *Tataria. China.*

anomala 3. P. caule 1floro, foliolis multipartitis, laciniis lanceolatis germinibusque glabris, flore nutante. *Sibir.* (P. laciniata Pall.)

tenuifolia 4. P. foliolis multipartitis glabris lineari-subulatis, pedunculis breviſſimis, germinibus tomentosis erectis. *Tauria.* (P. hybrida Pall.)

officinalis 5. P. foliolis inaequaliter laciniatis glabris, laciniis ovato-lanceolatis, germinibus rectiusculis tomentosis. *Europ. med.* (P. lobata Desf.)

corallina Retz. 6. P. foliolis distinctis ovato-oblongis planiusculis glabris, medio sublobato, germinibus recurvis tomentosis. *Anglia. German. austr. Inf. ion.*

dauŕica Andr. 7. P. foliolis distinctis subrotundis undulatis obliquis integriusculis glabris, germinibus patentibus tomentosis. *Sibir.* (P. 3ternata Pall.)

†† *Foliis subtus pubescentibus.*

Russi Bivon. 8. P. foliolis distinctis integris ellipticis subtus vix pubescentibus, fructibus recurvatis pilosis. *Sicil.*

humilis Retz. 9. P. foliolis 3partito-compositis lanceolatis acutis canaliculatis subtus subvillosis, germinibus rectis glabriusculis, stigmatibus erectis. *Hispan.*

decora Anderſ. 10. P. foliolis 3partito-laciniatis oblongis obtusis canaliculatis subtus pilosis, germinibus pubescentibus patentibus, stigmatibus recurvatis. *Thracia. Tauria.*

arietina Anderſ. 11. P. foliolis 3lobatis pinnatifidisque decurrentibus ovali-oblongis planiusculis subtus pilosis, fructibus tomentosis arcuato-patentibus. *Creta.* Clus.

peregrina Mill. 12. P. foliolis 3partito-laciniatis integrisque ovato-lanceolatis planiusculis subtus pilosis, germinibus tomentosis rectis. *Graecia.*

paradoxa Anderſ. 13. P. foliolis multipartitis obtusis undulatis subtus glaucis pilosis, germinibus appressis tomentosis. *Europ. austr.*

mollis Anderſ. 14. P. foliolis ovali-lanceolatis planis lobatis imbricatis subtus caesiis pilosis, lateralibus subsessilibus, germinibus tomentosis rectis. *Sibir.?*

1985. DELPHINIUM.

* *Annua.*

† *Monocarpa, petalis confluentibus: foliis plerumque multifidis, laciniis linearibus ſ. lineari-lanceolatis.*

axilliflorum Cand. 1. D. caule ſimplici glabriusculo, floribus axillaribus ſubſeſſilibus, bracteis foliaceis multifidis, germine villoſo. *Syria.* Labillard.

Oliverianum Cand. 2. D. caule glabro ramoſo, pedunculis axillaribus folia aequantibus, bracteis linearibus ſimpliciſſimis, fructibus glabris. *Perſia occid.*

Ajacis 3. D. caule glabro ſuperne ramoſo, floribus denſe racemoſis, pedicellis bracteas aequantibus, fructibus pubeſcentibus. *Europ. auſtr. Tauria.* (D. ambiguum Mill.)

Conſolida 4. D. caule glabro ramoſo, ramis divaricatis, floribus laxe racemoſis, pedicellis bracteas ſuperantibus, fructibus glabris. *Europ. Amer. bor.* (D. ſegetum Lam.)

pubeſcens Cand. 5. D. caule ſuperne ramoſo, foliis fructibusque villoſis, floribus laxe racemoſis, pedicellis bracteas ſuperantibus. *Gallia provinc.* (D. ambiguum Loiſ. Conſolida Gouan.)

rigidum Cand. 6. D. caule ramoſiſſimo, ramis patentibus rigidis paucifloris foliisque incano-villoſis, pedicellis bracteas ſuperantibus. *Syria.*

puſillum Labill. 7. D. caule erecto gracillimo paucifloro foliisque 5fido-pedatis villoſiusculis, pedicellis bracteas ſuperantibus. *Syria.* (D. pygmaeum Poir.)

tenuiſſimum Sm. 8. D. caule erecto gracili ſuperne ramoſo pubeſcente, pedicellis bracteas ſubulatas multo ſuperantibus, fructibus glabris. *Attica.*

Aconiti 9. D. caule erecto ramoſiſſimo, ramis divaricatis ſub-1floris foliisque abbreviatis pubeſcentibus, pedunculis elongatis, calcare erecto lituiformi. *Ad Helleſpontum. Syria.* (Aconitum 1gynum Forsk. D. incanum Clark. ?)

exſertum Cand. 10. D. caule erecto ramoſo glabro, foliis ternato-multifidis, calcare recto obtuſiusculo abbreviato, ſtaminibus exſertis. *Syria.*

flavum Cand. 11. D. caule erecto ramoſo ſuperne pubeſcente, floribus rare racemoſis flavis breviter pedicellatis, calcare recto patente, capſula pubeſcente. *Inſ. mar. aegei.*

†† *Tricarpa: petalis liberis: foliis plerumque ternato-multifidis linearibus.*

ambiguum 12. D. caule erecto villoſiusculo, racemis laxis, calcare recto abbreviato, germinibus villoſis. *Afric. bor.*

cardiopetalum Cand. 13. D. caule erecto ramoſo glabro, racemis confertis, petalis cordato-orbiculatis unguiculatis, calcare aſcendente germinibusque glabris. *Pyrenaei m.* (D. peregrinum Lam.)

junceum Cand. 14. D. caule erecto ramoſiſſimo glabro, racemis laxis, calcare recto acuto elongato, petalis ovatis unguiculatis. *Europ. auſtr. Afric. bor. Syria.* (D. peregrinum L., gracile Cand.)

nanum Cand. 15. D. caule pumilo incano-pubeſcente, foliis ſubcoriaceis 3-5lobis, ſuperioribus linearibus indiviſis, ramis pauciſloris, petalis ſubrotundis longe ſtipitatis. *Aegypt.* (D. peregrinum Delil.)

Forskolei Reichb. 16. D. caule ſuberecto pumilo, foliis appreſſis inferioribus 3dentatis ſuperioribus linearibus integerrimis, petalis inferioribus appendiculatis. *Ad Helleſpontum.*

† *halteratum* Sm. 17. D. caule erecto glabro, foliis floralibus 3fidis indiviſisque, racemis laxis, petalis inferioribus orbiculatis ſtipitatis. *Sicil.*

virgatum Poir. 18. D. caule ramoſo, foliis oblongis coriaceis inferioribus 3fidis, lobis 3dentatis, ſuperioribus integris, racemis virgatis, petalis inferioribus ovatis ſtipitatis. *Syria.* Labillard.

macropetalum Cand. 19. D. caule ramoſiſſimo, foliis inferioribus 3partito-3fidis ſummis integris lanceolatis, racemis laxis, petalis ſuperioribus 2lobis inferioribus ovatis ſtipitatis. *Afric. bor.* Brouſſonet.

† *obcordatum* Cand. 20. D. foliis caulinis 3partitis, floralibus linearibus acutis, racemo laxo, petalis inferioribus obcordatis ſtipitatis. *Afric. bor.*

† *tribracteolatum* Cand. 21. D. foliis inferioribus palmato-lobatis, racemo laxo, pedicellis 3bracteatis, petalis inferioribus cordato-orbiculatis ſtipitatis. *Afric. bor.*

** *Biennia, tricarpa, feminibus paucis grandibus.*

Requienii Cand. 22. D. caule ſimplici ſuperne calycibusque villoſis, foliis 5fidis, calcare calycem aequante. *Inſ. Stoechad.*

pictum W. 23. D. caule ſimpliciusculo ſuperne foliisque palmatis 7-5lobis pubeſcentibus, calcare calycem pedunculisque bracteas floresque ſubaequantibus. *Europ. auſtr.*

Staphis agria 24. D. caule petiolisque piloſis, foliis palmatis 7-5lobis, pedunculis bracteas floresque ſuperantibus, calcare breviſſimo. *Graecia.*

*** *Perennia: tricarpa: petalis liberis.*

† *Petalis inferioribus integris.*

grandiflorum 25. D. foliis palmatis multipartitis, laciniis linearibus diſtantibus, racemo laxo, pedicellis elongatis, petalis inferioribus ovatis convexis integerrimis. *Sibir.* (D. virgatum Jacq. fil. et chinenſe Fiſch. varr. foliis brevioribus, laciniis propioribus, petalis ſuperioribus obtuſis, calcare quaſi fiſſo.)

cheilanthum Fiſch. 26. D. foliis palmato-5partitis ſubtus incano-villoſiusculis, laciniis lanceolatis dentatis, petalis

inferioribus rotundis obtusissimis crenulatis, capsulis pubescentibus. *Sibir.*

virescens Nutt. 27. D. caule simplici pubescente, foliis 5-3partitis subpedatis, laciniis oblongis 3fidis, racemo paucifloro, calcare horizontali florem excedente, petalis inferioribus planis barbatis. *Ad fl. Missuri.*

†† *Petalis inferioribus bifidis barbatis.*

puniceum L. 28. D. caule flaccido flexuoso superne incano, foliis digitato-3partitis incisis, laciniis linearibus, racemo elongato, pedicellis abbreviatis, calcare resupinato. *Caucas. Ad Volgam. Sibir.* (D. triste Fisch.)

albiflorum Cand. 29. D. petiolis basi dilatato-vaginantibus, foliis multipartitis, laciniis linearibus, racemo elongato conferto, bracteis lato-lanceolatis pedicellos superantibus, calcare obtuso sepalis breviori. *Armenia.*

ochroleucum Stev. 30. D. petiolis basi dilatato-vaginantibus, foliis multipartitis, laciniis angustissimis subfiliformi-subulatis, racemo conferto subspicato, bracteis lineari-lanceolatis, calcare acuto calycem superante. *Iberia.* (D. puniceum var. MB.)

hybridum W. 31. D. petiolis basi dilatatis vaginantibus, foliis digitato-partitis incisis, racemis confertis fructibusque villosis, bracteis subulatis, calcare recto calycem superante. *Tauria. Caucas. Hungar.* (D. hirsutum Pers., fissum Kit.)

pentagynum Lam. 32. D. foliis multipartitis, laciniis linearibus, racemo pubescente, calcare acuto calycem aequante, fructibus villosis quinis. *Lusitan. Afr. bor.*

Menziesii Cand. 33. D. foliis 5partitis subvillosis, laciniis linearibus integris 3fidisque, racemo paucifloro, calcare recto, radice grumosa. *Caledonia occid. Amer. bor.*

† *elegans* Cand. 34. D. foliis 5partitis glabris, laciniis lineari-lanceolatis incisis, racemo paucifloro, calcare incurvo sepalis breviori. *Amer. bor.*

amoenum Stev. 35. D. foliis 5partitis subtus pubescentibus, laciniis lanceolatis pinnatifidis, racemo paniculato, calcare recto, germinibus glabris. *Sibir.*

tricorne Mx. 36. D. caule simplici, foliis paucis longe petiolatis 5partitis pubescentibus, laciniis linearibus obtusis incisis, racemo paucifloro, calcare ascendente recto, fructibus ternis recurvis hirsutis stylo coronatis, radice tuberosa. *Amer. bor.*

azureum Mx. 37. D. foliis 3partitis longe petiolatis glabriusculis, laciniis linearibus acutis, racemo elongato stricto, petalis omnibus barbatis, inferioribus villosissimis. *Amer. bor.*

exaltatum Ait. 38. D. foliis sub-3partitis, laciniis lanceolatis 3fidis acuminatis basi attenuatis, racemo stricto, calcare recto calycem aequante. *Amer. bor.* (D. tridactylum Mx.)

urceolatum Jacq. 39. D. foliis ſubpeltatis cucullatis ſubtus pubeſcentibus, inferioribus 5-ſuperioribus 3fidis, laciniis lanceolatis dentatis divaricatis, racemo ſtricto, calcare calycem ſuperante. *Amer. bor.?*

intermedium Ait. 40. D. foliis profunde cordatis 7-5-3fidis ſubtus pubeſcentibus, laciniis lanceolatis inciſo-ſerratis, racemis elongatis ſtrictis fructibusque glabris. *Europ. med.* (D. alpinum Kit., revolutum Desf., elatum L.)

palmatifidum Cand. 41. D. foliis baſi ſubtruncatis ciliatis ſubtus ad nervos piloſiusculis 5fidis, laciniis lanceolatis 3fidis integrisque, racemo ſubramoſo, fructibus glabris. *Sibir.*

cuneatum Stev. 42. D. foliis baſi cuneatis 5-7fidis, laciniis inciſis acutis, racemo laxo ramoſo glabro, calcare incurvo, fructibus pubeſcentibus. *Ad Volgam. Podol. auſtr.* (D. hybridum L. herb., villoſum Stev.)

dictyocarpon Cand. 43. D. foliis ſubcordatis 3-7fidis, laciniis oblongis acutis pinnatifido-inciſis, racemo ramoſo glabro, capſulis venoſo-reticulatis ciliatis. *Sibir.* (D. laxiflorum Cand.)

montanum Cand. 44. D. foliis ſubtruncatis 5fidis pubeſcentibus, laciniis baſi attenuatis 3fidis inciſis, racemo elongato capſulisque villoſis. *Alp. Europ. auſtr.* (D. elatum All., hirſutum Roth.)

ſpecioſum MB. 45. D. foliis peltatis 5lobis racemisque hirſutis, laciniis inciſo-ſerratis, bracteis lanceolatis villoſo-viſcoſis, capſulis reticulatis glabriusculis. *Caucaſ.*

daſycarpon Stev. 46. D. foliis 5partitis racemisque pubeſcentibus, laciniis lanceolatis inciſo-dentatis, calcare incurvo calycem ſubaequante, fructibus villoſiſſimis. *Caucaſ. Perſia bor.*

ciliatum Stev. 47. D. foliis 5partitis racemisque pubeſcentibus, laciniis lanceolatis inciſis, calcare incurvo calycem aequante, bracteis ſubulatis ſetoſo-ciliatis, fructibus glabris. *Caucaſ.* (D. flexuoſum MB.)

1986. Aconitum.

1. *Floribus perſiſtentibus flavidis.*

Anthora 1. A. calcare refracto, labello obcordato ſ. 2fido, galea fornicato-hemiſphaerica antice ſinuata roſtrata, foliorum laciniis anguſtis. *Europ. med. Sibir.* (A. nemoroſum MB., Candollei, Jacquini, eulophum, anthoroideum Reichenb.)

Pallaſii Reichenb. 2. A. calcare continuo, labello obcordato, galea hemiſphaerica clauſa roſtrata, caule paucifloro, foliorum laciniis anguſtiſſimis. *Caucaſ. Sibir.*

2. *Floribus deciduis ſubflavidis: galea ſubunguiculata, nectariis gracilibus.*

* *Foliis palmatis.*

Lycoctonum 3. A. calcare hamato, labello producto obtuſo, galeae fundo cylindrico, roſtro longe porrecto. *Norvegia. Lapponia. Ruſſia.* (A. ſeptentrionale Köll.)

Lamarckii Reichenb. 4. A. calcare hamato, galeae fundo elongato clavato. *Pyren. Alp. nor. et dinar.* (A. pyrenaicum Lam.)

Myoctonum Reichenb. 5. A. calcare hamato, galeae fundo cylindrico, roſtro abbreviato inflexo. *German. med. Italia.*

orientale Mill. 6. A. calcare arcuato gracili, labello integerrimo, galea cylindrica recta elongata, roſtro producto incumbente. *Perſia. Caucaſ.* (A. ochroleucum W.)

pallidum Reichenb. 7. A. calcare arcuato, galea conica elongata, ſepalis mediis imberbibus. *Ruſſia med. Bohemia.*

laſioſtomum Reichenb. 8. A. calcare arcuato, galea conica attenuata, ſepalis mediis denſe barbatis. *Ruſſia med. Podolia.*

Vulparia Reichenb. 9. A. calcare ſpirali, galeae fundo ampliato clavato, roſtro porrecto acuto, ſepalis infimis abbreviatis. *Europ. med. Sibir.* (A. Lycoctonum Jacq.: A ſeptentrionale Wahlenb. Beſſ. eſt var. fl. purpureis.)

Phthora Reichenb. 10. A. calcare ſpirali, galeae fundo ſubclavato, roſtro abbreviato tenui. *Hungar.*

Thelyphonum Reichenb. 11. A. calcare ſpirali, galeae fundo conico elongato. *Europ. med.* (A. altiſſimum Mill., galectonum et Luparia Reichenb. . . A. auſtrale Reichenb. var. fl. violaceis.)

** *Foliis pedatis.*

pyrenaicum 12. A. calcare arcuato, galeae fundo clavato ampliato. *Pyren. Sibir.* (A. ſquarroſum L.)

diſſectum Tauſch. 13. A. calcare arcuato, galeae fundo conico in apicem brevem declivi. *Sibir.*

barbatum Patr. 14. A. calcare recto obtuſo, galeae fundo conico oſtium ſubaequante, ſepalis mediis denſe barbatis, foliis opacis. *Sibir. or.*

Gmelini Reichenb. 15. A. calcare recto obtuſo, galeae fundo cylindrico rotundato, foliis nitidis ſquarroſis. *Sibir. or.* (A. Lycoctonum J. G. Gmel., nitidum Fiſch.)

leptanthum Reichenb. 16. A. calcare recto obtuſo, galeae fundo conico elongato attenuato, fructibus ventricoſis. *Dauria.*

3. *Floribus deciduis coeruleſcentibus.*

* *Nectariis inflatis, fructibus junioribus erectis.*

tortuoſum W. 17. A. calcare adunco, cucullo inflato gibboſo, labello obtuſo, galea hemiſphaerica ſubbiante, caule flexuoſo, foliorum laciniis divaricatis. *Sibir.*

volubile Pall. 18. A. calcare adunco, cucullo inflato, labello obcordato, galea hemiſphaerica, roſtro aſcendente, caule volubili. *Imaus.*

villoſum Reichenb. 19. A. calcare adunco, cucullo inflato, labello obcordato, galea conica incumbente ſubhiante, roſtro porrecto, floribus ſubpaniculatis foliisque villoſiusculis. *Sibir.* (A. ciliare Cand., flaccidum Reichenb.)

Lubarscii Reichenb. 20. A. cucullo gibberoſo abbreviato, labello orbiculari, galea hemiſphaerica clauſa, pedunculis patulis, foliorum laciniis latis. *Camtſchatca.*

maximum Pall. 21. A. cucullo apice gibberoſo, labello pendulo, galea hemiſphaerico-conica pubeſcente, racemo paucifloro, foliorum laciniis latis. *Camtſchatca.*

camtſchaticum Reichenb. 22. A. cucullo apice gibberoſo, labello revoluto, galea clauſa foliisque piloſiusculis. *Sibir. orient. Camtſchatca.* (A. ochotenſe Reichenb.)

** *Nectariis magnis elongatis.*

† *Fructibus junioribus erectis.*

Cammarum Jacq. 23. A. nectariis rectis, galea fornicato-conica recta, roſtro porrecto. *Europ. med. Sibir.* (A. macranthum et Kusnezovii Reichenb.)

naſutum Fiſch. 24. A. nectariis erectis, calcare arcuato, galea conica prona, roſtro demiſſo, racemis ſubpaniculatis, foliorum laciniis latiusculis. *Europ. med. Caucaſ. Sibir.* (A. Cammarum MB., Bernhardianum Wallr., Fiſcheri Reichenb.)

roſtratum Cand. 25. A. nectariis erectis, calcare depreſſo globoſo, labello elongato, galea hemiſphaerica antice infracta roſtrata hiante, foliorum laciniis anguſtis. *Helvetia. Sibir.* (A. album Ait. et rhynchanthum Reichenb. varr.)

variegatum 26. A. nectariis ſupinis, calcare arcuato, labello obcordato, galea fornicata prona hiante, roſtro revoluto, racemo compoſito glaberrimo. *Alp. Europ. med.* (A. glabrum Cand., bulbiferum et illinitum Reichenb.)

paniculatum Lam. 27. A. nectariis ſupinis, calcare capitato, labello obcordato, galea conica roſtrata antice ſinuata ſubincumbente, panicula ramoſiſſima. *Helvetia. Gallia prov.* (A. hebegynum Cand.)

productum Reichenb. 28. A. nectariis erectis, calcare capitato, galeae convexae roſtro producto, caule paucifloro. *Sibir. Camtſchatca.* (A. grandiflorum ſibiricum Cand.)

†*ferox* Wall. 29. A. calcare capitato, cucullo elongato, labello anguſtiſſimo divaricato, galea hemiſphaerica hiante, germinibus 5 villoſis, floribus laxe paniculatis. *Nepal.*

uncinatum 30. A. calcare ſupino capitato, labello obtuſo ſubemarginato, galea conica compreſſa, roſtro acuto recto, racemi ramis rigidis, foliis coriaceis 3lobis. *Amer. bor. Japon.* (A. japonicum Thunb.)

cernuum Wulff. 31. A. calcare capitato, labello emarginato revoluto, galea hemiſphaerica hiante, roſtro aſcendente, floribus laxe paniculatis. *Alp. Europ. med.* (A. Napellus Garid., flexicaule Hopp.)

Toxicum Reichenb. 32. A. nectariis ſupinis, calcare adunco, labello 2fido revoluto, galea ampliato-fornicata, roſtro obtuſo, racemis laxis. *Transſylvan.* (A. neomontanum Baumg.)

†† *Fructibus divergentibus.*

Napellus 33. A. nectariis ſigmoideis, calcare ſupino capitato, labello emarginato, galea hemiſphaerica clauſa vel hiante, racemo ſtricto, foliorum laciniis linearibus nitidis. *Europ. Sibir.* (Varietates numeroſae: tauricum et neomontanum Wulff., ſtrictum et anguſtifolium Bernh., acutum, ambiguum, amoenum, callibotryon, Cluſianum, commutatum, euſtachyon, formoſum, hians, Hoppeanum, laetum, laxum, patulum Reichenb, laxiflorum Schleich.)

††† *Fructibus conniventibus.*

Störkeanum Reichenb. 34. A. nectariis ſupinis, calcare capitato, labello revoluto, galea fornicata incumbente, roſtro acuto, floribus paniculatis. *German. auſtr.* (A. Napellus Störk. Sturm., neomontanum W., medium Schrad., intermedium Cand.)

decorum Reichenb. 35. A. nectariis ſupinis, calcare adunco, labello producto, galea conica, roſtro porrecto. *Pyren. Sudet.?* (A. hamatum Reichenb.)

*** *Nectariis gracilibus, labello ſubintegro.*

biflorum Fiſch. 36. A. calcare truncato, galea depreſſa, roſtro producto, floribus geminis oppoſitis ſeſſilibus, caule humili, foliorum laciniis linearibus. *Sibir.*

ſemigaleatum Pall. 37. A. calcare ſubadunco, galea convexa erecto-ſupina patula, caule erecto, pedunculis elongatis. *Camtſchatca. Ora Amer. bor. occ. ſub circ. arctico.*

delphinifolium Cand. 38. A. calcare adunco, galea hemiſphaerica horizontali ſubpatula, caule gracili paucifloro. *Orae Aſiae et Amer. bor. ſub circ. arctico.* (A. paradoxum Reichenb.)

Chamiſſoi Reichenb. 39. A. calcare ſubadunco, galea hemiſphaerica clauſa, floribus cauleque humili pubeſcentibus. *Inſ. Aleut.*

1987. LODOICEA Commerſ.

Sethellarum Labill. *Inſ. Sechell. S. Mahé.* Palma excelſa, foliis flabelliformibus, ſtipitibus inermibus, fructibus xx librarum. (Cocos maldivica J. F. Gmel. W.)

1988. LATANIA Commerſ.

rubra Jacq. 1. L. frondibus flabelliformibus, foliolis ſpinoſo-ſerrulatis, ſtipite inermi. *Inſ. Mascaren.*

borbonica Lam. 2. L. frondibus flabelliformibus medio elongatis, foliolis margine laevibus, ſtipite ſpinoſo. *Inſ. Maſcaren.* (L. chinenſis Jacq.)

1989. PTYCHOSPERMA Labill.

gracile Labill. *Nov. Hibern.* Caudex gracilis altiſſimus, ſtipitibus baſi dilatatis, frondibus alternatim pinnatis.

1990. SEAFORTHIA R. Br.

elegans R. Br. *Nov. Holl.* Caudex mediocris annulatus, frondibus conduplicatis apice eroſis.

1991. IRIARTEA R. et P.

deltoidea R. et P. 1. I. caudice ſubaequali, frondibus impari-pinnatis deltoideis eroſis, ſpathis ſubdenis deciduis, calycibus ♂ glabris, baccis ſubgloboſis. *Peru.*

ventricoſa Mart. 2. I. caudice medio ventricoſo, frondibus ſubplicatis antice repando-ſinuatis, ſpathis ſubdenis deciduis, calycibus ♂ villoſis, baccis ſubgloboſis. *Braſil.*

exorrhiza Mart. 3. I. caudice ſubaequali, frondibus ſubtrapezoideis antice ſinuato-dentatis, ſpathis ſubquinis deciduis, calycibus ♂ glabris, baccis ovato-ellipticis. *Braſil.*

ſetigera Mart. 4. I. caudice aequali, frondibus ſubrhombeis antice ſinuato-dentatis eroſis ſubtus pubeſcentibus, ſtipitibus ſetoſis, ſpathis ſubquinis perſiſtentibus, baccis ellipticis. *Braſil.*

andicola * 5. I. caudice aequali proceriſſimo, frondibus ſubtus argenteo-pubeſcentibus, fructibus globoſis. *Alp. Amer. auſtr.* (Ceroxylon Humb.)

1992. CARYOTA.

urens 1. C. caudice frondibusque inermibus. *Ind. orient. Inſ. Molucc.*

horrida Jacq. 2. C. caudice frondibusque ſpinoſis. *Amer. auſtr.*

1993. JUBAEA Humb.

ſpectabilis Humb. *Chili.* Caudex craſſiſſimus 6orgyalis, frondibus pinnatis linearibus, fructibus obovatis.

1994. DIPLOTHEMIUM Mart.

maritimum Mart. 1. D. acaule, frondibus laxis criſpis, pinnis linearibus ſubtus glaucis, drupis obovato-pentagonis. *Braſil.*

campeſtre Mart. 2. D. acaule, frondibus ſpiſſis rectiusculis, pinnis rigidis linearibus ſubtus glauceſcentibus, floribus ♂ 6andris, drupis ovato-globoſis. *Braſil.*

litorale Mart. 3. D. acaule, frondibus ſpiſſis rectiusculis, pinnis rigidis ſubtus glauceſcentibus, floribus ♂ ſub-10andris, fructibus obovatis ſubangulatis. *Braſil.* (Cocos arenarius B. A. Gomez.)

caudeſcens Mart. 4. D. caudice mediocri annulato, frondibus ſubcriſpis, pinnis linearibus longe acuminatis ſubtus argenteis, floribus polyandris, antheris ſubulatis. *Braſil.*

1995. ATTALIA Humb.

amygdalina Humb. 1. A. caudice humili, frondibus plicatis, fructibus ovatis. *Nov. Granat.*

humilis Mart. 2. A. caudice humili, frondibus erecto-patentibus, fructibus ellipticis umbonatis. *Braſil.*

compta Mart. 3. A. caudice mediocri craſſo ſuperne capitato, frondibus patentibus, petiolorum baſi craſſa ſubnuda, fructibus obovatis roſtratis. *Braſil.*

phalerata Mart. 4. A. caudice mediocri craſſo ſubcapitato, frondibus erecto-patentibus, fructibus oblongis roſtratis. *Braſil.*

funifera Mart. 5. A. caudice elato, frondibus phalerato-erectis, petiolorum baſibus fibroſo-fiſſis, fructibus ellipticis acutis. *Braſil.*

excelſa Mart. 6. A. caudice altiſſimo, frondibus patentibus, fructibus oblongo-ſub-5gonis acutis. *Braſil.*

ſpecioſa Mart. 7. A. caudice altiſſimo, frondibus patentibus, fructibus ovato-oblongis conico-roſtratis. *Braſil.*

1996. GOMUTUS Rumph.

ſaccharifer * *Inſ. Molucc. Cochinchina.* Caudex mediocris craſſus, frondibus pinnatis longiſſimis, ſtipitibus inermibus, ſpadicibus pendulis. (Areng ſaccharifera Labill.)

1997. MANICARIA Gärtn.

ſaccifera Gärtn. *Guiana.* Caudex craſſus, frondibus integris irregulariter findendis, ſpatha maxima fuſiformi mire dilatanda. (Pilophora Jacq.)

1998. BEGONIA.

* *Cauleſcentes.*

† *Foliis inaequaliter cordatis.*

arboreſcens Radd. 1. B. ramoſiſſima, foliis oblongis acuminatis dentato-ſerratis utrinque glaberrimis. *Braſil.*

nitida Ait. 2. B. fruticosa, foliis obsolete dentatis glaberrimis nitidis acutis, stipulis carinatis, capsulae ala maxima subrotunda. *Jamaica.* (B. obliqua Herit., minor Jacq.)

dichotoma Jacq. 3. B. fruticosa, foliis subreniformibus duplicato-denticulatis supra glabris subtus ad venas hirsutiusculis, paniculae dichotomae ramis divaricatis, capsulae alis acutis inaequalibus. *Amer. austr.*

reniformis Dryand. 4. B. suffruticosa, foliis subreniformibus angulatis crenato-dentatis, panicula dichotoma, capsulae alis acutis, duabus minutissimis. *Brasil.*

angularis Radd. 5. B. fruticosa, ramis angulatis, foliis subreniformibus crenulatis glabris subtus ad venas hirsutiusculis, stipulis ovatis integerrimis, capsulae alis undulatis, una maxima obtusangula. *Brasil.* (B. stipulacea W.)

spathulata W. 6. B. herbacea, foliis obtusis obsolete denticulatis glabriusculis, stipulis spathulatis inaequalibus ciliatis, capsulae alis obtusis. *Patria?*

† *cucullata* W. 7. B. foliis oblongis cucullatis denticulatis glabris, stipulis oblongis dentatis, capsulae ala maxima acutangula. *Brasil.*

odorata W. 8. B. herbacea, foliis acuminatis subangulatis inaequaliter obsolete denticulatis utrinque glabris, stipulis scariosis, panicula multiflora, capsula acute alata. *Patria?*

† *crenata* Dryand. 9. B. herbacea, foliis subrotundis obtusis crenato-dentatis. *Ind. or.*

tenuifolia Dryand. 10. B. foliis ovatis acutis angulatis obsolete dentatis. *Insul. principis prope Javam.*

sanguinea Radd. 11. B. foliis acuminatis integerrimis glabris subtus sanguineis, stipulis membranaceis, capsulae alis subaequalibus rotundatis. *Brasil.*

ferruginea 12. B. foliis oblongis subdentatis, capsulis apteris. *Nov. Granat.*

districha Link. 13. B. foliis acutis crenulatis glabris subtus strigoso-hirtis, cyma districha, capsulae ala maxima acuta, reliquis obtusis. *Patria?*

grandis Dryand. 14. B. foliis acutis duplicato-serratis asperis, floribus dioecis, capsulae alis subaequalibus. *Japon.* (B. obliqua Thunb.)

macrophylla Dryand. 15. B. foliis angulatis denticulatis, capsulae alis obtusangulis inaequalibus. *Jamaica.* (B. grandifolia Jacq.)

hirtella Link. 16. B. foliis angulatis inaequaliter serrulato-ciliatis subtus ad venas hirsutiusculis, stipulis scariosis lanceolatis fimbriatis, capsulae alis rectangulis inaequalibus. *Patria?*

discolor R. Br. 17. B. foliis angulatis serrulatis subtus sanguineis, caule nodoso, capsulae alis obtusangulis inaequalibus. *China, Martinica.* Sieber. (B. Evansiana Andr. Haw.)

pauciflora Lindl. 18. B. foliis subaequaliter cordatis obtusissimis crenatis pubescentibus, superioribus cucullatis, sti-

pulis lanceolatis ſcarioſis, capſulae alis obtusangulis inaequalibus. *Patria?* (B. patula Haw.?)

erminea Herit. 19. B. foliis ſubaequaliter cordatis acuminatis ſerratis ſupra papillis acuminatis raris, caule ſimplici, radice tuberoſa, capſulae ala maxima falcata, reliquis obliteratis. *Madagascar.*

tuberoſa Dryand. 20. B. repens, foliis inaequaliter cordatis angulatis dentatis, capſulae alis parallelis. *Inſ. Molucc.*

rotundifolia Dryand. 21. B. repens, foliis reniformi-ſubrotundis crenatis. *Ind. occ.*

†† *Foliis ſemicordatis.*

iſoptera Dryand. 22. B. fruticoſa, foliis obſolete dentatis glabris, capſulae alis ſubaequalibus parallelis. *Java.*

acutifolia Jacq. 23. B. foliis oblongis acuminatis angulatis ſerratis glabris, petiolis incraſſatis, capſulae ala maxima obtusangula, reliquis acutangulis. *Jamaica. Hispaniola.* (B. purpurea Sw.)

acuminata Dryand. 24. B. foliis acuminatis hiſpidis inaequaliter inciſo-dentatis, capſulae ala maxima obtusangula, reliquis acutangulis. *Jamaica.*

maculata Radd. 25. B. fruticoſa, foliis elongatis acuminatis repandis ſupra albo-maculatis ſubtus rubris, capſulae alis rotundatis ſubaequalibus. *Braſil.* (B. argyroſtigma Fiſch. Link.)

pulchella Radd. 26. B. ſubherbacea, foliis acuminatis inaequaliter dentato-ſerratis glabris, ſtipulis venoſo-reticulatis, capſulae alis rotundatis ſubaequalibus. *Braſil.*

humilis Dryand. 27. B. carnoſa ſubpellucida, foliis duplicato-ſerratis ſupra hiſpidis ſubtus ad venas ſtrigoſis, ſtipulis ciliatis, capſulae alis rotundatis. *Ind. occ.* (B. ſuaveolens Haw.)

hirſuta Aubl. 28. B. cauleſcens, foliis angulato-inciſis ſerrulatis hiſpidis, capſulae ala maxima obtusangula, reliquis parallelis *minimis*. *Guiana.* (B. humilis Bonpl.)

ulmifolia Humb. 29. B. ſuffruticoſa, foliis ſemicordatis oblongis aequaliter ſerratis rugoſis piloſis, ſtipulis lanceolatis acutis, capſulae ala maxima acutangula, reliquis obtusangulis. *Amer. auſtr.*

††† *Foliis ovatis vel oblongis.*

Urticae 30. B. radicans herbacea, foliis oblique ovatis duplicato-ſerratis utrinque hiſpidis, capſulis baſi 3cornibus. *Nov. Granat.?*

bidentata Radd. 31. B. cauleſcens erecta, foliis ſubobliquis oblongo-lanceolatis acuminatis denticulatis glabris, capſulae alis aequalibus, angulis bidentatis. *Braſil.*

digitata Radd. 32. B. foliis digitatis ſubundenis, foliolis lanceolatis inaequaliter ſerratis ſcabris, capſulae alis rotundatis aequalibus. *Braſil.*

ſcandens Sw. 33. B. radice tuberoſa, caule ſcandente radicante, foliis ſubrotundo-ovatis obſolete dentatis gla-

berrimis nitidis, capſulae ala maxima obtusangula, reliquis parallelis minimis. *Jamaica. Guiana.* (B. glabra Aubl.)

integerrima * 34. B. fruticoſa, foliis ovatis integerrimis glabris, capſulae ala maxima obtusangula, reliquis parallelis minimis. *Braſil.* Sello.

** *Acaules.*

octopetala Herit. 35. B. radice tuberoſa, foliis ſubaequaliter cordatis 5lobis inaequaliter dentatis glabris, pedunculis dichotomis, floribus ♂ 8petalis. *Peru.*

diptera Dryand. 36. B. foliis inaequaliter cordatis denticulatis, pedunculis dichotomis, capſulae alis duabus inaequalibus. *Braſil.* (B. obliqua L.)

tenera Dryand. 37. B. foliis inaequaliter cordatis, floribus umbellatis. *Ceylon.*

nana Herit. 38. B. foliis lanceolatis acuminatis ſerrulato-ciliatis, ſcapo ſub-2floro, capſula ſub-1alata. *Madagascar.*

1999. MALLOTUS Lour.

cochinchinenſis Lour. *China. Cochinchina.* Arbor foliis ſubrotundis 3fidis tomentoſis, racemis ſpicatis reflexis.

TETRAGYNIA.

2000. CARYOCAR.

* *Foliis ternatis.*

nuciferum 1. C. foliolis oblongis integerrimis glabris, fructibus maximis. *Guiana.*

glabrum Perſ. 2. C. foliolis oblongis denticulatis glabris, fructibus mediocribus. *Guiana.* (Saouari Aubl. Rhizobolus Corr.)

villoſum Perſ. 3. C. foliolis ſubrotundo-ellipticis ſubtus tomentoſis. *Guiana.* (Saouari Aubl.)

amygdaliferum Cav. 4. C. foliolis oblongis ſerratis, axillis venarum ſubtus barbatis, fructibus mediocribus. *Nov. Granat.*

** *Foliis quinatis.*

butyroſum W. 5. C. foliis glabris, fructu laevi. *Guiana.* (Pekea Aubl. Rhizobolus Schreb.)

tomentoſum W. 6. C. foliis ſubtus tomentoſis, fructu tuberculato. *Guiana.* (Pekea tuberculoſa Aubl.)

2001. PERA Mut.

arborea Mut. *Nov. Granat.* Arbor foliis alternis oblongis integerrimis, pedunculis 1floris axillaribus aggregatis. (Perula Schreb W.)

2002. MARIALVEA Vand.

guianenſis Choiſ. 1. M. foliis oblongis utrinque attenuatis glabris, pedunculis 3fidis, pedicellis 3floris. *Guiana.* (Tovomita Aubl.)

fructipendula Choiſ. 2. M. foliis lanceolatis obtuſiusculis, pedunculis elongatis 3floris. *Peru. Cayenn.* (Beauharnoiſia R. et P.)

uniflora Choiſ. 3. M. foliis lanceolatis obtuſiusculis, pedunculis axillaribus 1floris. *Guiana.*

2003. CIMICIFUGA.

palmata Mx. 1. C. foliis ſimplicibus palmato-multifidis, laciniis lanceolatis inciſo-ſerratis floribus ſubcorymboſis polygynis, capſulis breviſſimis ſubgloboſo-capitatis. *Virgin. Carolina.*

cordifolia Purſh. 2. C. foliis decompoſito-2ternatis, foliolis cordatis lobatis ſerrato-dentatis, racemis paniculatis virgatis, floribus 2–5gynis, fructibus ſeſſilibus. *Carolina.*

americana Mx. 3. C. foliis ternato-decompoſitis, foliolis ovatis ſub-3lobis dentatis, racemis elongatis ſtrictis, floribus 5gynis, fructibus ſtipitatis. *Carolina.* (Actaea podocarpa Cand.)

foetida 4. C. foliis decompoſitis, foliolis ovatis inciſis dentatis, racemis paniculatis nutantibus pubeſcentibus. *Hungar. Tranſſylvan. Galicia. Sibiria. Camtſchatca. Ora occid. Amer. bor.*

Serpentaria Purſh. 5. C. foliis decompoſitis, foliolis ovato-oblongis inciſis mucronato-dentatis, racemis paniculatis elongatis, floribus 1gynis. *Amer. bor.* (Actaea racemoſa L., 1gyna Walt.)

japonica * 6. C. foliis ternatis, foliolis cordatis palmatis inciſo-ſerratis, ſpicis longiſſimis. *Japon.* (Actaea Thunb.)

2004. DRIMYS Forſt.

Winteri Forſt. 1. Dr. foliis oblongis obtuſis ſubtus glauceſcentibus coriaceis, pedunculis ſimplicibus aggregatis, floribus 4gynis. *Ad fretum Magellan.* (Wintera aromatica Murr.)

mexicana Seſſ. 2. Dr. foliis oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis, pedunculis elongatis umbelliferis, floribus 4gynis. *Mexico.*

granatenſis 3. Dr. foliis oblongis utrinque attenuatis ſubtus glaucis, pedunculis elongatis 3floris, floribus 8gynis. *Nov. Granat. Braſil.* (Wintera granatenſis Murr.)

chilenſis Cand. 4. Dr. foliis oblongis baſi attenuatis ſubtus glaucis, pedunculis umbellatis, floribus ſub-6gynis. *Chili.*

axillaris Forſt. 5. Dr. foliis oblongis utrinque attenuatis, pedunculis aggregatis 1floris, calycibus integris, floribus 4gynis. *Nov. Zeeland.* (Wintera G. Forſt.)

2005. TETRACERA.

* *Genuinae: ſub-4gynae, floribus racemoſo-paniculatis.*

volubilis 1. T. foliis obovatis obtuſis ſubſerratis utrinque ſcaberrimis, floribus paniculatis, pedunculis villoſis. *Inſ. Antill. Amer. auſtr.*

erecta Seſſ. 2. T. foliis obovatis apice dentatis, panicula terminali multiflora. *Mexico.*

oblongata Cand. 3. T. foliis oblongis baſi attenuatis ſubſerratis utrinque ſcabris, floribus racemoſis, pedunculis glabris. *Braſil.*

Lima W. 4. T. foliis obovato-oblongis integerrimis utrinque aſperis, floribus paniculatis, pedunculis pubeſcentibus. *Braſil.*

acuminata Cand. 5. T. foliis oblongis acuminatis ſerrulatis utrinque ſcabris, pedunculis racemoſis pubeſcentibus. *Amer. auſtr.?*

hiſpida * 6. T. foliis lanceolatis utrinque attenuatis ſerrulatis ſupra glabris ſubtus discoloribus ad venas ſtrigoſis, pedunculis axillaribus racemoſis ramulisque hirſutis. *Braſil.* Sello.

jamaicenſis Cand. 7. T. foliis ovali-oblongis acutiusculis in petiolum longe attenuatis utrinque glabris ſubſerrulatis, pedunculis racemoſis glabris. *Jamaica.*

ovalifolia Cand. 8. T. foliis ovalibus obtuſis integerrimis coriaceis ſcabris, racemis lateralibus compoſitis, pedunculis calycibusque ſubvilloſis. *Cayenn.* (T. rotundifolia Sm.)

alnifolia W. 9. T. foliis ovali-oblongis obtuſis apice ſubdenticulatis ſubtus ſcabriusculis, panicula terminali, pedunculis ſubpubeſcentibus. *Guinea. Afric. occ.* (T. potatoria Afz.)

ſenegalenſis Cand. 10. T. foliis oblongis utrinque attenuatis integerrimis laevibus, panicula multiflora. *Senegambia.*

laevis Vahl. 11. T. foliis oblongis acuminatis ſubintegerrimis laevibus, pedunculis racemoſis terminalibus. *Ind. or.*

Euryandra Vahl. 12. T. foliis obovato-oblongis obtuſis integerrimis glabris, paniculae multiflorae ramis pubeſcentibus, floris 3gynis. *Nov. Caledon.* (Euryandra ſcandens Forſt.)

Rheedii Cand. 13. T. foliis oblongis utrinque attenuatis integerrimis laevibus, panicula ſubdichotoma. *Malabar.*

Aſſa Cand. 14. T. foliis ſubellipticis utrinque attenuatis ſubdenticulatis ſupra laevibus ſubtus pedunculisque pubeſcentibus, corymbo paucifloro terminali. *Ind. or. Java.* (T. malabarica Lam. Wahlbomia indica Thunb.)

** *Floribus monogynis.*

multiflora Cand. 15. T. foliis obovatis repando-dentatis laevibus, paniculis axillaribus terminalibusque. *Braſil.*

Tigarea Cand. 16. T. foliis ſubrotundis ſubrepandis ſcabris, paniculа ramoſa multiflora. *Guiana. Cayenn.* (Tigarea aſpera Aubl. Rhinium Schreb.)

lutea * 17. T. foliis elliptico-oblongis nitidis, integerrimis, pedunculis lateralibus racemoſis. *Braſil.* Sello.

Perriniana * 18. T. foliis ellipticis obſolete ſerrulatis utrinque nitidis, corymbis axillaribus. *Amer. auſtr.?* Perrin.

cuſpidata Meyer. 19. T. foliis ovali-oblongis cuſpidatis apice argute ſerratis ſubtus tomentoſis, pedunculis ſtoris axillaribus aggregatis. *Surinam.*

2006. AGDESTIS Seſſ.

clematidea Seſſ. *Nov. Hiſpan.* Frutex volubilis, foliis cordatis acuminatis, floribus paniculatis rubris.

PENTAGYNIA.

2007. AQUILEGIA.

vulgaris 1. A. calcaribus incurvis limbum petalorum ſubaequantibus, petiolis fructibusque villoſis, foliolis obtuſe lobatis crenatis. *Europ.* (A. viſcoſa Gouan. var.)

glanduloſa Fiſch. 2. A. calcaribus incurvis limbo petalorum duplo brevioribus, foliorum laciniis confertis anguſtis dentatis, caule ſuperne fructibusque glanduloſo-villoſis. *Alp. Sibir.*

ſibirica Lam. 3. A. calcaribus incurvis limbum petalorum obtuſiſſimum excedentibus, fructibus glaberrimis, caule ſub-1floro glabro. *Sibir.*

alpina * 4. A. calcaribus rectis apice ſubincurvis limbo petalorum dimidio brevioribus, fructibus pubeſcentibus, caule glabro, foliorum laciniis ſcrenatis anguſte oblongis. *Alp. Europ. med. et Sibir.* (A. grandiflora Pall.)

pyrenaica Cand. 5. A. calcaribus rectiſſimis gracilibus limbum ſubaequantibus, caule ſub-1floro 1phyllo, foliorum laciniis linearibus. *Pyren. et Apennin. montes.* (A. alpina Lam.)

canadenſis 6. A. calcaribus rectis limbum obtuſum ſuperantibus, genitalibus exſertis, ſepalis petala ſubſuperantibus, fructibus villoſis. *Amer. bor.*

formoſa Fiſch. 7. A. calcaribus rectis limbum breviſſimum ſtaminaque multo ſuperantibus, ſepalis lanceolatis ſtylos aequantibus petala multo excedentibus. *Camtſchatca.*

viridiflora Pall. 8. A. calcaribus rectis limbum truncatum ſuperantibus, ſtylis longe exſertis, ſepalis ovali-oblongis corolla brevioribus. *Sibir.* (A. flava Lam., atropurpurea W., davurica Patr., hybrida Sims. varr.)

parviflora Ledeb. 9. A. calcaribus rectis brevibus limbum obtusum aequantibus, sepalis acutis corolla longioribus, stylis staminibusque aequalibus arcuatim deflexis. *Sibir.*

anemonoides W. 10. A. calcaribus obtusissimis brevissimis, petalis 2lobis, sepalis ovatis corollam sub-5ies superantibus, pedunculis radicalibus 1floris, foliorum segmentibus linearibus. *Imaus mons.*

2008. NIGELLA.

* *Stamina multiplici serie dispositа: semina angulata.*

damascena 1. N. antheris muticis, involucro florum folioso. *Europ. austr.* (N. coerulea Lam., pygmaea Pers., coarctata Hortul. var.)

sativa 2. N. antheris muticis, floribus nudis, caule pilosiusculo, capsulis muricatis ad apicem usque nexis. *Europ. austr.*

segetalis MB. 3. N. antheris submuticis, caule glaberrimo angulato, capsulis laeviusculis ultra medium nexis. *Tauria.* (N. foeniculacea Cand.)

arvensis 4. N. antheris apiculatis, floribus nudis, caule glabro, capsulis laeviusculis ultra medium nexis. *Europ.* (N. divaricata Cand.)

aristata Sm. 5. N. antheris apiculatis, floribus involucratis, caule glabro. *Attica.*

hispanica 6. N. antheris subapiculatis, floribus nudis sub-10gynis, caule glabro. *Hispan. Afric. bor.*

** *Stamina simplici serie: semina plana.*

orientalis 7. N. stylis subdenis rectis corolla longioribus, capsulis glabris, seminibus margine membranaceis. *Syria. Caucas.*

cornicalata Cand. 8. N. stylis subquinis arcuatis exsertis, capsulis glabris. *Patria?*

ciliaris Cand. 9. N. stylis subdenis, capsulis hispidulis stellatim patentibus. *Syria.* Labillard.

2009. LAPLACEA Kunth.

speciosa *Peru.* Arbor foliis oblongis coriaceis integerrimis, floribus axillaribus pedunculatis solitariis albis.

2010. WORMIA Rottb.

madagascarensis Cand. 1. W. foliis subcordato-rotundis obtusis repando-sinuatis, petiolis subalatis, floribus corymbosis. *Madagascar.* (Lenidia Poir.)

coromandelina * 2. W. foliis oblongis utrinque attenuatis serratis, petiolis subalatis, pedunculis aggregatis 1floris lateralibus. *Coromandel.* (Dillenia pentagyna Roxb. Colbertia Salisb. Cand.)

triquetra Rottb. 3. W. foliis oblongis retusis apice dentatis, petiolis angulatis, pedunculis 3quetris subcorymbosis. *Ceylon.* (Dillenia dentata Thunb.)

alata R. Br. 4. W. foliis ovalibus integerrimis, petiolis alatis, pedunculis 3quetris subracemosis. *Nov. Holl.*

2011. PORCELIA R. et P.

nitidifolia R. et P. *Peru.* Arbor excelsa pulcherrima, foliis oblongis acuminatis nitidis, pedunculis pauciforis pendulis.

2012. REAUMURIA.

vermiculata 1. R. foliis semiteretibus obtusiusculis subfasciculatis. *Sicilia. Aegypt. Syria.*

hypericoides W. 2. R. foliis lanceolatis planis. *Syria.* (Hypericum alternifolium Lobill.)

2013. GYNOCARDIA Roxb.

odorata Roxb. *Silhet, prov. Ind. or.* Arbor foliis oblongo-lanceolatis alternis, pedunculis aggregatis.

2014. ROUMEA Poit.

coriacea Poit. 1. R. spinis trunci ramosis, foliis oblongis obtusiusculis serratis, pedunculis axillaribus aggregatis 1floris. *Hispaniola.*

Jangomas * 2. R. spinis trunci ♂ ramosis, foliis ovatis acuminatis serratis, pedunculis sparsis multifloris. *Cochinchina.* (Stigmarota Lour.)

POLYGYNIA.

2015. SAGITTARIA.

* *Foliis sagittatis aut hastatis.*

sagittifolia 1. S. foliis sagittato-lanceolatis acuminatis, laciniis baseos rectis acuminatis, scapo simplici. *Europ. Asiae et Amer. bor. aquae.* (S. latifolia W.)

pubescens Mühl. 2. S. foliis late ovatis sagittato-hastatis obtusiusculis multinerviis venosis scapoque simplici hirsutiusculis, laciniis baseos foliorum latis subdivaricatis acutis. *Amer. bor.*

obtusa W. 3. S. foliis late ovatis obtusis multinerviis glabris, laciniis baseos parallelis acuminatis, scapo simplici, floribus dioecis, bracteis ovatis acutis. *Amer. bor.*

obtusifolia 4. S. foliis ovato-subrotundis obtusis, laciniis baseos elongatis acuminatis patentibus, scapo paniculato divaricato. *Ind. or.*

guyannensis Humb. 5. S. foliis subrotundo-ovatis obtusis multinerviis, laciniis baseos acutis distantibus, scapo simplici, floribus monoecis, fructibus cartilagineo-denticulatis. *Nov. Granat.*

hastata Pursh. 6. S. foliis oblongo-lanceolatis acutis multinerviis, laciniis baseos longissime acuminatis divaricatis, scapo simplici, floribus dioecis, bracteis obtusis. *Pensylvan.* (S. gracilis Pursh.)

heterophylla Pursh. 7. S. foliis linearibus lanceolatisque utrinque acutis, s. oblongo-sagittatis, laciniis baseos linearibus divaricatis, scapo simplici paucifloro, floribus monoecis, ♀ subsessilibus, bracteis ovatis acuminatis. *Pensylvan.*

** *Foliis subcordatis, oblongis vel linearibus.*

natans Mx. 8. S. foliis infimis subcordatis, natantibus elliptico-lanceolatis basi attenuatis obtusis 3nerviis, scapo simplici paucifloro, pedunculis inferioribus elongatis. *Carolin. austr.*

lancifolia 9. S. foliis oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis nervoso-venosis, scapo paniculato, fructibus falcatis rostratis. *Ind. occ. Carolina.* (S. falcata Pursh.)

† *alpina* W. 10. S. foliis lanceolatis acuminatis basi subcordatis, scapo simplici. *Dauria.* (S. natans Pall.)

rigida Pursh. 11. S. foliis lanceolatis carinatis, petiolis 3quetris, scapis simplicibus, floribus ♀ sessilibus. *Amer. boreal.*

simplex Pursh. 12. S. foliis lineari-lanceolatis utrinque attenuatis, scapo simplici multifloro, floribus dioecis, bracteis obtusis. *Nov. Caesar.*

graminea Mx. 13. S. foliis linearibus longissimis 3nerviis, scapo simplici paucifloro, floribus monoecis, bracteis obtusis. *Amer. bor.*

pusilla Nutt. 14. S. foliis linearibus abbreviatis obtusis, scapo simplici paucifloro foliis breviori, floribus ♂ oligandris. *Pensylvan.* (Alisma subulata Pursh.)

acutifolia 15. S. foliis subulatis dorso convexis basi vaginantibus, scapo simplici paucifloro, floribus monoecis, bracteis acuminatis. *Surinam. Pensylvan.*

*** *Foliis divisis.*

chinensis Sims. 16. S. foliis 3fidis 3partitisque, lobis subaequalibus nervosis, scapo ramoso polygono, flore masculo solitario terminali. *China.* (S. sagittifolia Lour.? S. 3folia L. e Petiver.)

2016. BRASENIA Schreb.

peltata Pursh. *Amer. bor.* Planta aquatica Hydrocharidi l. Nymphaeis similis, foliis ovalibus centro peltatis, pedunculis floribusque purpureis diu erectis noctu submersis. (Hydropeltis purpurea Mx.)

2017. LIMNOCHARIS Bonpl.

Plumerii Rich. 1. L. foliis ovali-subrotundis subemarginatis, petiolis pedunculisque 3angularibus, floribus umbellatis, sepalis ovatis petala subaequantibus. *Ind. occ. Nov. Granat.* (Alisma flava L.)

Humboldtii Rich. 2. L. foliis cordato-ovalibus obtusis, petiolis pedunculisque subaggregatis 1floris teretibus subarticulatis, sepalis corolla angustioribus. *Amer. austr.* (Stratiotes nymphoides W.)

Commersonii * 3. L. foliis cordato-subrotundis obtusis, petiolis pedunculisque solitariis 1floris teretibus articulatis, sepalis corolla angustioribus, filamentis sterilibus nullis. *Brasil.* (Hydrocleis Rich.)

2018. NELUMBIUM W.

speciosum W. 1. N. floribus roseis, antheris apice clavato-appendiculatis. *Asia media et austr. Aegypt. Graecia* olim. Theophrast. Phylarch. apud Athen. (Nymphaea Nelumbo L. α. Cyamus Salisb.)

luteum W. 2. N. floribus luteis, antheris apice linearibus. *Amer. cor.* (N. codophyllum Rafin.)

2019. EUCRYPHIA Cav.

cordifolia Cav. *Chili.* Arbor procera pulcra, foliis cordato-oblongis crenatis tomentosis, floribus axillaribus pedunculatis albis. (Pellinia Molin.)

2020. CARPODON Labill.

lucidus Labill. *Nov. Holl. bor.* Arbor foliis oppositis, floribus axillaribus solitariis pedunculatis.

2021. GUATTERIA R. et P.

* *Foliis subtus glabris.*

brevipes Cand. 1. Gu. foliis oblongis acutis lucidis ramisque glabris, pedunculis axillaribus 1floris, fructibus breviter stipitatis. *Guiana.*

Ouregou Dun. 2. Gu. foliis oblongis acuminatis subtus glabris ferrugineis reticulatis, pedunculis axillaribus subaggregatis, fructibus longe stipitatis. *Guiana.* (Uvaria 1sperma Lam. W.)

podocarpa Cand. 3. Gu. foliis ovali-oblongis abrupte acuminatis ſubtus glabris concoloribus, pedunculis axillaribus ſolitariis, fructibus longe ſtipitatis. *Cayenn.*

ſuberoſa Dun. 4. Gu. foliis oblongis acutis glabris, pedunculis oppoſitifoliis 1floris, petalis exterioribus minoribus, fructibus globoſis longe ſtipitatis, cortice trunci ſuberoſo. *Coromandel.* (Uvaria Roxb.)

pendula R. et P. 5. Gu. foliis lanceolatis, pedunculis axillaribus longiſſimis pendulis, caule fruticoſo. *Peru.*

† *ovalis* R. et P. 6. Gu. foliis oblongis ovalibusque, pedunculis axillaribus. *Peru.*

† *glauca* R. et P. 7. Gu. foliis ovato-oblongis acuminatis (glaucis), pedunculis axillaribus. *Peru.*

virgata Dun. 8. Gu. foliis oblongo-lanceolatis obtuſiusculis utrinque opacis ſubſeſſilibus, ramis virgatis, fructibus parvis ovatis breviſſime ſtipitatis. *Jamaica. Cuba.* (Uvaria lanceolata et virgata Sw.)

laurifolia Dun. 4. Gu. foliis oblongis utrinque attenuatis ſupra nitidis, fructibus ellipticis mucronatis. *Jamaica. Hiſpaniola. Amer. auſtr.* (Uvaria Sw. Gu. maypurenſis Kunth.)

ſempervirens Dun. 10. Gu. foliis ovato-oblongis acuminatis glabris nitidis, pedunculis lanatis, petalis oblongis cuſpidatis, fructibus globoſis. *Malabar.*

Corinti Dun. 11. Gu. foliis ovato-oblongis glabris nitidis, petalis obtuſiusculis, fructibus globoſis. *Malabar.*

montana Cand. 12. Gu. foliis oblongo-lanceolatis acuminatis, pedunculis ſubgeminis ſubbifloris, petalis inflexis. *Malabar.* (Gu. malabarica Dun.)

acutifolia Dun. 13. Gu. foliis ovato-oblongis acutis craſſis nitidis, calycibus obtuſis, petalis acutiſſimis, fructibus globoſis. *Malabar.*

umbilicata Dun. 14. Gu. foliis ovato-oblongis acuminatis, pedunculis bracteolatis, fructibus globoſis depreſſo-umbilicatis ſtipitatis. *Amer. auſtr.?*

Berteriana * 15. Gu. foliis oblongis obtuſis utrinque glaberrimis ſerratis integerrimisque, fructibus numeroſis ſubtomentoſis obliquis mucronatis ſtipites aequantibus. *Portorico.* Bertero.

prinoides * 16. Gu. foliis oblongo-lanceolatis obliquis utrinque attenuatis obſolete ſerratis ſupra nitidis, ramis virgatis, fructibus obliquis mucronatis breviſſime ſtipitatis. *Hiſpaniola.* Bertero.

** *Foliis ſubtus pubeſcentibus.*

Aberemoa Dun. 17. Gu. foliis ovato-oblongis acutis utrinque tomentoſis, fructibus numeroſis oblongis utrinque attenuatis mucronatis ſubſeſſilibus. *Guiana.* (Aberemoa guianenſis Aubl.)

ceraſoides Dun. 18. Gu. foliis oblongo-lanceolatis acutis ſubtus villoſis, pedunculis axillaribus ſolitariis, petalis ſubaequalibus, fructibus globoſis. *Coromandel.* (Uvaria Roxb.)

ruſa Dun. 19. Gu. foliis ſubcordato-oblongis acutis ſubtus rufo-tomentoſis, pedunculis lateralibus breviſſimis paucifloris. *Ind. or. Inſ. Molucc.* (Gu. cordata Dun.)

eriopoda Cand. 20. Gu. foliis oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis ſubtus ramisque ferrugineo-villoſis, pedunculis 1floris floribusque piloſis. *Peru. Braſil. Guinea.* (Gu. hirſuta R. et P. Unona ovata Vahl. Cand.)

2022. XYLOPIA.

glabra 1. X. foliis oblongis utrinque attenuatis laevibus, pedunculis axillaribus breviſſimis ſub-1floris. *Jamaica.*

ligustrifolia Dun. 2. X. foliis lanceolatis obtuſiusculis glabris, ramis punctato-aſperis, pedunculis brevibus pauciſloris bracteolatis, petalis linearibus. *Quito.* Humb.

nitida Dun. 3. X. foliis oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis nitidis, floribus racemoſis, pedicellis bracteolatis. *Cayenn.*

martinicenſis * 4. X. foliis obovato-oblongis in petiolum attenuatis utrinque glabris ſubtus discoloribus, ramulis angulatis, pedunculis racemoſis. *Martinica.* Sieber.

acuminata Dun. 5. X. foliis oblongis baſi attenuatis abrupte longe acuminatis, ramis teretibus rugoſis, fructibus clavatis 2ſpermis. *Cayenn.*

primoides Dun. 6. X. foliis ovato-lanceolatis obtuſiuscule acuminatis nitidis, ramis virgatis, floribus ſolitariis, fructibus 2valvibus. *Cayenn.*

ſalicifolia Humb. 7. X. foliis ovato-lanceolatis anguſtis obtuſiusculis ſubtus ſericeis, fructibus 2ſpermis ruguloſis. *Ad fl. Magdalenae.*

fruteſcens Aubl. 8. X. foliis oblongo-lanceolatis acuminatis membranaceis ſubtus ſericeis, pedunculis piloſis breviſſimis, fructibus glabris. *Martinic. Guiana. Braſil.* (X. fetoſa Poir.)

braſilienſis * 9. X. foliis lanceolatis acuminatis coriaceis ſubtus piloſis, ramulis pedunculisque erectis elongatis 1floris hirſutis, petalis craſſiusculis velutinis. *Braſil.*

muricata 10. X. foliis lanceolatis acuminatis ſubtus ſtrigoſis apice barbatis, pedunculis multifloris, fructibus muricatis. *Jamaica.* (X. fruteſcens Gärtn.)

orientalis * 11. X. foliis ovato-oblongis ſubtus rugoſis, floribus praecocibus racemoſis abortientibus, ſeriboribus ſubternis. *Borneo. Celebes.* (Dammara ſelanica Rumph.)

2023. ARTABOTRYS R. Br.

odoratiſſimus R. Br. *China. Ind. or. Madagascar. Inſ. Mascaren.* Frutex foliis alternis oblongo-lanceolatis nitidis, pedunculis lateralibus uncino-cirrhiferis, floribus fructibusque pyriformibus flaveſcentibus. (Annona hexapetala L. ſuppl. Anona uncinata Lam. Uvaria uncata Lour., eſculenta Rottl., Unona eſculenta, hamata et uncinata Dun. Cand.)

2024. UNONA.

* *Floribus patentibus: fructibus oblongis.*

† *Petalis subaequalibus.*

Narum Dun. 1. U. caule sarmentoso, foliis lanceolatis acuminatis, pedunculis solitariis 1floris, petalis ovatis inflexis, fructibus laeviusculis longe stipitatis. *Malabar.* (Uvaria ceylanica Lam.)

Musaria Dun. 2. U. caule sarmentoso, foliis subcordato-lanceolatis acuminatis, pedunculis 1floris solitariis axillaribus, petalis ovatis reflexis, fructibus oblongo-teretibus subtorulosis stipitatis. *Inf. Moluc.*

penduliflora Sess. 3. U. caule arborescente, foliis subcordato-oblongis undulatis, pedunculis reflexis pendulis, petalis inflexis, fructibus leguminiformibus incurvis. *Mexico.*

Marenteria Cand. 4. U. ramulis scandentibus, foliis ovalibus obtusis glaberrimis, pedunculis erectis 1floris subterminalibus, fructibus ventricosis. *Madagascar.* (Marenteria Thuar.)

pachypetala * 5. U. foliis oblongis acuminatis, pedunculis solitariis 1floris, petalis coriaceis. *Cayenn. Brasil.* (U. crassipetala Dun.)

fuscata Cand. 6. U. foliis oblongis utrinque attenuatis, pedunculis axillaribus erectis 1floris, petalis oblongis acutiusculis. *Guiana.*

obtusiflora Cand. 7. U. foliis ovali-oblongis utrinque attenuatis, pedunculis axillaribus 1floris, petalis obovatis obtusissimis. *Guiana.*

acuminata Cand. 8. U. foliis oblongis utrinque attenuatis glabris, petalis oblongis acutis. *Guiana.*

macrocarpa Cand. 9. U. foliis ovalibus glaberrimis coriaceis, pedunculis paucifloris, petalis oblongis acutiusculis. *Guinea.*

grandiflora Lechen. 10. U. foliis cordato-oblongis subsessilibus supra laevibus subtus villosis, pedunculis oppositifoliis 1floris, petalis oblongis. *Ind. or.*

violacea Dun. 11. U. foliis ovato-ellipticis acutiusculis, pedunculis oppositifoliis 1floris cernuis, petalis oblongis. *Mexico.*

Lessertiana Dun. 12. U. foliis ovato-oblongis acutis supra laevibus nitidis subtus rufo-subfloccosis, pedunculis 1floris bracteatis, petalis oblongis subcrispis. *Patria?*

odorata Dun. 13. U. foliis oblongo-lanceolatis acutis, pedunculis axillaribus 1floris, petalis lineari-lanceolatis elongatis, fructibus teretibus apice umbilicatis stipitatis. *Inf. Moluc. China.* (Uvaria Lam. W.)

longifolia Dun. 14. U. foliis oblongo-linearibus undulatis acutis, floribus corymboso-umbellatis, petalis lineari-lanceolatis, fructibus ovatis stipitatis. *Ind. or. Java.* (Uvaria Lam. Vahl.)

nitidissima Dun. 15. U. foliis elliptico-oblongis utrinque attenuatis glaberrimis lucidis, pedunculis 1floris abbreviatis, petalis linearibus obtusis. *Nov. Caledon.*

ligularis Dun. 16. U. foliis ovato-lanceolatis acutis, pedunculis multifloris, petalis linearibus elongatis, fructibus ſubglobosis ſtipitatis. *Amboina.* (Uvaria Lam.)

†† *Petalis inaequalibus.*

tripetala Cand. 17. U. foliis lanceolatis ſupra rugosis ſubtus tomentosis, *fructibus* ſub-3quetris 3ſpermis granulatis. *Amboina.* (Uvaria Lam.)

** *Floribus conniventibus: fructibus ſubmoniliformibus.*

longiflora Roxb. 18. U. foliis oblongo-lanceolatis glabris, pedunculis axillaribus pendulis, petalis linearibus longiſſimis, fructibus moniliformibus. *Silhet, prov. Ind. or.*

discreta 19. U. foliis oblongo-lanceolatis anguſtis ſubtus ſericeis, fructibus *moniliformibus* longe ſtipitatis. *Surinam.* (Uvaria monilifera Gärtn.)

discolor Vahl. 20. U. foliis ovato-oblongis glabris ſubtus glaucis, pedunculis elongatis 1floris, fructibus moniliformibus breviter ſtipitatis. *China auſtr. Ind. or.* (Deſmos chinenſis Lour.?)

cochinchinenſis Cand. 21. U. foliis lanceolatis tomentosis, floribus ſolitariis longe pedunculatis, fructibus toruloſo-moniliformibus ſubſeſſilibus. *Cochinchina.* (Deſmos Lour.)

aromatica Dun. 22. U. foliis oblongis acuminatis glabris, floribus axillaribus ſolitariis, fructibus ſubſeſſilibus teretibus toruloſis. *Guiana.* (Uvaria aromatica Lam., ceylanica Aubl. Unona concolor W.)

aethiopica Dun. 23. U. foliis ovato-lanceolatis acutis ſubtus glaucis, fructibus teretibus toruloſis ſubſeſſilibus. *Afric. occ.* (Xylopia undulata P. B. Unona oxypetala Cand. et undulata Dun.)

ſeptopetala Cand. 24. U. foliis ovali-oblongis acuminatis ramisque glabris, pedunculis axillaribus ramoſis, petalis oblongo-linearibus elongatis acuminatis. *Timor.* Lechenault.

*** *Floribus conniventibus, baſi genitalia occulentibus: fructibus baccatis.*

latifolia Dun. 25. U. foliis oblongo-lanceolatis ſubtus lanatis, floribus racemoſis, baccis numeroſis 2-3ſpermis. *Inſ. Molucc.*

ſylvatica Dun. 26. U. foliis ovato-oblongis ſubtus tomentosis, floribus ſolitariis breviter pedicellatis carnoſis, baccis aſperis polyſpermis. *Cochinchina.* (Melodorum arboreum Lour.)

dumetorum Dun. 27. U. foliis lanceolatis glabris, floribus ſolitariis, baccis polyſpermis. *Cochinchina.* (Melodorum fruticoſum Lour.)

lucida Cand. 28. U. foliis oblongo-lanceolatis acuminatis glaberrimis ſupra nitidis, ramis aſpero-punctatis, baccis oblongis obtuſis ſubtoruloſis. *Peru.*

acutiflora Dun. 29. U. foliis oblongo-lanceolatis acutis rigidiusculis, pedunculis breviſſimis 1floris, baccis oblongis breviter ſtipitatis. *Patria?*

xylopioides Dun. 30. U. foliis oblongis acuminatis baſi revolutis ſupra nitidis ſubtus ſericeis, pedunculis ſubaggregatis abbreviatis, baccis oblongis numeroſis. *Ad Orinoc.* Humb.

2025. UVARIA.

ceylanica 1. U. caule fruticoſo ſarmentoſo, foliis ovato-lanceolatis acuminatis glabris, fructibus toruloſis breviſſime ſtipitatis. *Ceylon.*

lutea Roxb. 2. U. caule arboreo, foliis oblongis acuminatis nitidis, pedunculis ſolitariis ſub-4floris, fructibus oblongis 6ſpermis. *Coromandel.* (U. coriacea Vahl.)

Chamae P. B. 3. U. foliis ovatis acutis nitidis integerrimis, floribus racemoſis, petalis ligulatis. *Guinea.*

tomentoſa Roxb. 4. U. foliis oblongis acutis tomentoſis, pedunculis 1floris ſubſolitariis, petalis interioribus ovatis, fructibus 4ſpermis. *Coromandel.*

dulcis Dun. 5. U. foliis ſubcordato-oblongis obtuſiusculis ſubtus ramisque villoſis, pedunculis geminis bracteatis floribusque ſtellato-pubeſcentibus. *Java.* (U. javana Dun.)

velutina Cand. 6. U. foliis ſubſeſſilibus cordato-ovatis acuminatis villoſis, pedunculis lateralibus corymboſis, floribus piloſis. *Ind. or.*

†*ſpectabilis* Cand. 7. U. foliis oblongis acuminatis junioribus ramisque ferrugineo-villoſis, pedunculis 1floris lateralibus, petalis obovatis, interioribus apice 2fidis. *Guiana.*

2026. ASIMINA Adanſ.

parviflora Dun. 1. A. foliis obovato-oblongis ſupra glabris ſubtus ramulisque rufo-pubeſcentibus, pedunculis lateralibus breviſſimis, floribus tomentoſis exiguis. *Carolina. Georgia.* (Orchidocarpum Mx. Porcelia Perſ. Pursh.)

triloba Dun. 2. A. foliis obovato-oblongis abrupte acuminatis glabris, pedunculis abbreviatis floribusque denſe villoſis atro-rufis. *Virginia. Carolina.* (Annona L. Orchidocarpum Mx. Porcelia Perſ. Pursh.)

pygmaea Dun. 3. A. foliis ſpathulatis obtuſis glabris, pedunculis 1floris floribusque glabris. *Georgia. Florida.* (Annona Bartr. Orchidocarpum Mx. Porcelia Perſ.)

grandiflora Dun. 4. A. foliis oblongis obtuſis ſubtus rufo-pubeſcentibus, floribus ſubſeſſilibus, petalis exterioribus obovatis calycem longe ſuperantibus. *Georgia. Florida.* (Annona Bartr. Orchidocarpum Mx., Porcelia Perſ.)

campechiana Kunth. 5. A. foliis oblongis utrinque attenuatis ſubtus tomentoſis, pedunculis 1floris, petalis ſubaequalibus. *Nov. Hiſpan.*

2027. ANONA.

* *Foliis ſubtus glabris.*

muricata 1. A. foliis oblongo-lanceolatis utrinque glaberrimis nitidis, pedunculis ſolitariis 1floris, petalis exterioribus cordatis acuminatis, fructibus muricatis. *Ind. occid.*

reticulata 2. A. foliis oblongo-lanceolatis acutis glabris, pedunculis ſub-3floris, petalis exterioribus conniventibus, interioribus minutiſſimis, fructibus ſubgloboſis areolato-reticulatis. *Ind. occ.*

mucoſa Jacq. 3. A. foliis oblongo-lanceolatis glabris, petalis exterioribus apice patulis, fructibus gibboſo-areolatis. *Martinic.*

glabra 4. A. foliis ovato-lanceolatis glabris, pedunculis oppoſitifoliis 2floris, fructibus conoideis obtuſis laevibus. *Carolina. Nov. Hiſpan.* (A. excelſa Kunth.)

grandiflora Lam. 5. A. foliis ovato-lanceolatis glabris ſupra nitidis ſubtus glauceſcentibus, pedunculis ſolitariis breviſſimis, petalis oblongis ſubaequalibus, fructibus ovatis glabriuſculis. *Inſ. Mascaren. Madagascar.*

amplexicaulis Lam. 6. A. foliis cordato-oblongis acutis amplexicaulibus, pedunculis axillaribus ſolitariis 1floris, petalis ſubaequalibus. *Inſ. Mascaren. Madagascar.*

uniflora Dun. 7. A. foliis oblongis acutis duplicato-venoſis ſubtus glaucis, pedunculis 1floris tomentoſis, petalis exterioribus calycem aequantibus. *Braſil.*

paluſtris 8. A. foliis ovato-oblongis coriaceis glaberrimis, floribus ſolitariis pedunculatis, petalis omnibus acutis, fructibus ſubareolatis. *Jamaica. Amer. auſtr.* (A. atabapenſis Kunth.)

† *micrantha* Berter. 9. A. foliis oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis glaberrimis, ramulis punctatis, pedunculis lateralibus ſolitariis 1floris, calyce corollam multo ſuperante. *Hiſpaniola.*

ſquamoſa 10. A. foliis lanceolatis glabris pellucido-punctatis, petalis exterioribus ſubclauſis, fructibus ovatis ſquamoſis. *Ind. occ. et or.*

aſiatica 11. A. foliis lanceolatis glabris venoſo-lineatis nitidis, petalis exterioribus ſubclauſis, fructibus ſquamoſis. *Ceylon.*

longifolia Aubl. 12. A. foliis oblongis elongatis acutis venoſo-reticulatis, pedunculis elongatis, petalis omnibus acutis, fructibus punctatis reticulatis. *Guiana. Peru.* (A. riparia Kunth.)

punctata Aubl. 13. A. foliis oblongis utrinque attenuatis glabris, pedunculis abbreviatis, petalis omnibus acutis, fructibus globoſis punctatis. *Guiana. Nov. Granat.* (A. quinduenſis Kunth.)

obtuſiflora Tuſſ. 14. A. foliis oblongo-lanceolatis acuminatis undulatis venoſis, pedunculis 1floris nutantibus, petalis exterioribus obtuſis. *Hiſpaniola.*

laurifolia Dun. 15. A. foliis ovato-lanceolatis glabris, pedunculis ſolitariis 1floris pendulis, petalis exterioribus cordatis acutis, fructibus mammaeformibus laevibus. *Ind. occ. Georgia.* (A. glabra β. Lam.)

Humboldtii Dun. 16. A. foliis oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis membranaceis punctatis, pedunculis ſolitariis 1floris, petalis exterioribus ovatis. *Cumana. Quito.* (A. Bonplandiana Kunth.)

uliginoſa Kunth. 17. A. foliis oblongis utrinque attenuatis membranaceis punctatis, pedunculis ſolitariis 1floris, petalis ovatis acutis ſubaequalibus, fructibus globoſis reticulatis. *Quito.* (A. peruviana Dun.)

laevis Kunth. 18. A. foliis oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis membranaceis ſubtus punctatis, pedunculis 1floris aggregatis, petalis lanceolatis acutis, fructibus laevibus. *Amer. auſtr.*

† *exſucca* Cand. 19. A. foliis ovali-oblongis coriaceis glaberrimis ſupra lucidis, pedunculis ſuboppoſitifoliis, fructibus parvis exſuccis. *Guiana.*

** *Foliis ſubtus pubeſcentibus.*

paludoſa Aubl. 20. A. foliis oblongis acutis ſubtus rufeſcentibus ſericeo-tomentoſis venoſis, pedunculis 1floris, petalis ovatis acutis, fructibus tuberculato-muricatis. *Guiana.*

Ambotay Aubl. 21. A. foliis oblongis acutis ſubtus ferrugineo-tomentoſis, floribus breviſſime pedunculatis, petalis acutis. *Guiana. Hiſpaniola.* Bertero.

purpurea Seſſ. 22. A. foliis oblongo-lanceolatis ſubſeſſilibus venoſis ſubtus ferrugineo-piloſis, floribus axillaribus ſubſeſſilibus, petalis exterioribus cordatis interioribus ſubrotundis. *Mexico.*

xeſtropetala * 23. A. foliis oblongo-lanceolatis ſubtus petiolisque hirſutis, petalis 3 connatis, lateribus compreſſis dolabriformibus tomentoſis. *Braſil.* (A. dolabripetala Radd.)

Manirote Kunth. 24. A. foliis obovato-ellipticis acutiusculis membranaceis punctatis glabris, fructibus globoſis muricatis. *Guiana.*

cinerea Dun. 25. A. foliis oblongis obtuſis cinereis pellucido-punctatis ſubtus pubeſcentibus, petalis exterioribus conniventibus, fructibus ovato-globoſis ſquamoſis. *Inſ. Carib. Cumana.*

Cherimolia Lam. 26. A. foliis elliptico-oblongis acutis ſubtus tomentoſis, pedunculis 1floris, petalis exterioribus lanceolatis, fructibus ſubgloboſis ſubſquamoſis. *Nov. Granat. Quito. Peru. Chili.* (A. 3petala Ait.)

echinata Dun. 27. A. foliis ovato-oblongis acutiusculis ſupra glaberrimis ſubtus tomentoſis, ramis rugoſis, floribus 3petalis, fructibus ovatis echinatis. *Cayenna.*

fericea Dun. 28. A. foliis ovato-oblongis acuminatis ſupra glabris ſubtus ramulisque fericeo-tomentoſis ferrugineis, floribus 3petalis extus ferrugineis. *Cayenn.*

axilliflora Cand. 29. A foliis oblongis obtuſiusculis ſubtus ſubpubeſcentibus, pedunculis axillaribus 1floris petiolos ſuperantibus. *Hiſpaniola.* Bertero. *Guiana.*

†*africana* 30. A. foliis lanceolatis pubeſcentibus. *Amer.?*

2028. CADSURA Juſſ.

japonica Dun. *Japon.* Frutex humilis, cortice viſcoſo, foliis elliptico-oblongis rigidis ſerratis, pedunculis lateralibus 1floris, floribus albis. (Uvaria japonica L. Thunb.

2029. LIRIODENDRON.

Tulipifera 1. L. foliis deciduis 3lobis apice baſique truncatis. *Amer. bor.*

*indicum** 2. L. foliis oblongis baſi attenuatis coriaceis. *Silhet, prov. Ind. or.* (Magnolia pterocarpa Roxb.)

2030. MAGNOLIA.

**Americanae, antheris extus dehiſcentibus.*

grandiflora 1. M. foliis oblongis acutis coriaceis ſupra nitidis ſubtus ramulisque ferrugineis, petalis obovato-oblongis. *Amer. bor.*

† *mexicana* Cand. 2. M. foliis obovato-oblongis, petalis ovatis. *Mexico.*

glauca 3. M. foliis ellipticis obtuſis coriaceis ſubtus glaucis ſubpubeſcentibus, petalis oblongis concavis. *Amer. bor.*

Plumerii Sw. 4. M. foliis ovato-ſubrotundis utrinque glabris coriaceis, petalis ſpathulatis concavis. *Inſ. Carib.* (Talauma Juſſ.)

Umbrella Lam. 5. M. foliis lanceolatis patentiſſimis membranaceis, junioribus ſubtus pubeſcentibus, petalis exterioribus deflexis. *Amer. bor.* (M. 3petala L. frondoſa Salisb.)

acuminata 6. M. foliis oblongis acuminatis ſubtus pubeſcentibus, petalis obovato-oblongis. *Amer. bor.*

auriculata Lam. 7. M. foliis cordato-obovato-oblongis membranaceis ſubtus glauceſcentibus, petalis oblongis, extimis patentiſſimis. *Amer. bor.* (M. pyramidata Bartr.

macrophylla Mx. 8. M. foliis ampliſſimis cordato-obovato-oblongis membranaceis ſubtus albido-glaucis, petalis ovato-oblongis obtuſis. *Amer. bor.*

cordata Mx. 9. M. foliis elliptico-ovatis acutis ſubtus ſubtomentoſis, adultis cordatis, petalis oblongis planiusculis. *Carolina.*

****Asiaticae, antheris intus dehiscentibus.**

conspicua Salisb. 10. M. foliis obovatis abrupte acuminatis membranaceis subtus pubescentibus, petalis oblongis. *China.* (M. Yulau Desf.)

gracilis Salisb. 11. M. foliis obovatis utrinque attenuatis serotinis membranaceis, junioribus subtus pubescentibus, floribus erectis 6petalis, stylis reflexis. *Japon.* (Kobus Banks., M. tomentosa Thunb.)

obovata Thunb. 12. M. foliis obovatis acutis venoso-reticulatis glabriusculis, floribus erectis 6petalis, petalis obovato-oblongis. *Japon.* (M. denudata et liliiflora Lam., discolor Vent., purpurea Curt. varr.)

fuscata Andr. 13. M. foliis oblongis acutis coriaceis, junioribus ramulisque fusco-tomentosis, floribus erectis. *China.* (M. fasciata Vent., anonaefolia Salisb.)

pumila Andr. 14. M. foliis oblongis utrinque attenuatis coriaceis venoso-reticulatis glaucis, floribus cernuis, caule fruticoso. *Amboina.* (Liriodendron Liliifera L.)

† *inodora* Cand. 15. M. foliis oblongo-lanceolatis acuminatis glabris, pedunculis congestis terminalibus, petalis conniventibus. *China austr.* (Liriodendron Liliifera Lour.)

† *Coco* Cand. 16. M. foliis ovatis nitidis, floribus solitariis, petalis 6 conniventibus, germinibus octonis. *China austr. Cochinchina.* (Liriodendron Coco Lour.)

2031. MICHELIA.

Champaca 1. M. foliis oblongo-lanceolatis acuminatis basi attenuatis membranaceis glabris, pedunculis lateralibus crassis abbreviatis 1floris, petalis spathulatis acutiusculis *Ind. or. Inf. Mascaren.*

Kisopa Buchan. 2. M. foliis ovato-lanceolatis coriaceis, pedunculis lateralibus crassis abbreviatis, petalis lanceolatis acuminatis. *Nepal.*

Doltsopa Buchan. 3. M. foliis ovali-oblongis longissime acuminatis coriaceis subtus glaucis, pedunculis crassis tomentosis, petalis obovatis. *Nepal.*

*Figo** 4. M. foliis lanceolatis incurvo-reflexis nitidis, petalis ovato-oblongis. *China austr.* (Liriodendron Lour.)

parviflora Rumph. 5. M. foliis oblongis acutis glabris, ramulis tomentosis, petalis ovali-subrotundis. *Java.*

fericea Pers. 6. M. foliis ovato-lanceolatis acutis, junioribus subtus fericeo-lanatis, pedunculis erectis abbreviatis, petalis oblongis. *Amboina.* (M. Tsiampaca L.)

velutina Cand. 7. M. foliis elliptico-oblongis acutis subtus albido-villoso-tomentosis, floribus subsessilibus. *Nepal.*

2032. ILLICIUM.

floridanum 1. I. petalis interioribus lanceolatis. *Florida.*

anisatum 2. I. petalis interioribus lineari-subulatis. *Japon. China.*

parviflorum Mx. 3. I. petalis ovato-subrotundis concavis. *Florida.*

2033. DILLENIA.

speciosa Thunb. 1. D. foliis elliptico-oblongis mucronato-serratis venosis, pedunculis solitariis terminalibus, petalis obovatis. *Malabar. Java. Ceylon.* (D. indica L.)

aurea Sm. 2. D. foliis elliptico-oblongis serratis, pedunculis solitariis 1floris. *Ind. or.*

elliptica Thunb. 3. D. foliis elliptico-ovatis acutis serratis, pedunculis 1floris. *Inf. Celebes.*

serrata Thunb. 4. D. foliis elliptico-ovatis acutis mucronato-serratis, pedunculis 3floris. *Java. Celebes.*

retusa Thunb. 5. D. foliis obovatis apice truncatis remote dentatis, pedunculis 1floris. *Ceylon.*

† *integra* Thunb. 6. D. foliis obovato-oblongis obtusis subserratis coriaceis, pedunculis 1floris. *Ceylon.*

2034. ATRAGENE.

alpina 1. A. foliis 2ternatis serratis acuminatis, petalis spathulatis. *Alp. Europ. med.*

sibirica 2. A. foliis 2ternatis oblongo-lanceolatis acuminatis serratis, petalis emarginatis. *Sibir.*

ochotensis Pall. 3. A. foliis 2ternatis oblongo-lanceolatis serratis, petalis paucis linearibus. *Sibir. or.*

americana Sims. 4. A. foliis quaternis ternatis, foliolis cordatis subintegerrimis, petalis acutis. *Amer. bor.* (Clematis verticillaris Cand.)

occidentalis Horn. 5. A. foliis oppositis ternatis, foliolis subcordatis dentatis nitidis, intermedio 3partito, petalis spathulatis. *Patria?*

ceylanica L. 6. A. foliis oppositis ovatis 5-7nerviis subtus villoso-tomentosis, petalis linearibus. *Ceylon. Coromand.* (Clematis Poir. Naravelia Cand.)

2035. KNOWLTONIA Salisb.

rigida Salisb. 1. Kn. foliis 2ternatis coriaceis glabriusculis, foliolis subcordatis, lateralibus oblique truncatis, umbella supradecomposita patentissima. *C. B. S.* (Adonis capensis L., coriacea Poir., Anamenia coriacea Vent.)

vesicatoria Sims. 2. Kn. foliis 2ternatis coriaceis glabriusculis, foliolis subcordatis, lateralibus oblique truncatis, umbella simpliciuscula pauciflora. *C. B. S.* (Adonis vesicatoria L., laserpitiifolia Poir., capensis Lam. Anamenia laserpitiifolia Vent.)

gracilis Cand. 3. Kn. foliis 2ternatis subcoriaceis, foliolis ovatis profunde serratis pilosis, scapis apice ramosis, ramis erectis paucifloris. *C. B. S.* (Adonis capensis Thunb., gracilis Poir., Anamenia gracilis Vent.)

hirsuta Cand. 4. Kn. foliis 2ternatis, foliolis lanceolatis profunde serratis hirsutis, scapis basi ramosis, ramis decumbentibus pauciflоris. *C. B. S.* (Anamenia hirsuta Vent., Adonis Poir.)

daucifolia Cand. 5. Kn. foliis 3ternatis, foliolis inciso-pinnatifidis, laciniis dentatis divaricatis, scapo villoso corymbifero. *C. B. S.* (Adonis aethiopica Thunb., filia L. suppl., daucifolia Lam., Anamenia daucifolia Vent.)

2036. ADONIS.

* *Annuae.*

aestivalis 1. A. caule simpliciusculo, petalis suboctonis oblongis calycem glabriusculum duplo superantibus, fructibus elongato-spicatis. *Europ. med. Asiae et Afric. bor. segetes.* (A. miniata et flammea Jacq., citrina Hofm., maculata et anomala Wallr., flava Vill., microcarpa Cand., dentata Delil. varr.)

autumnalis 2. A. caule ramoso, petalis suboctonis obovatis obtusis calycem glabriusculum subsuperantibus, fructibus ovato-capitatis. *Europ. med. et Asia.* (A. aestivalis M. B., micrantha Cand., parviflora Fisch.)

** *Perennes.*

vernalis 3. A. petalis subduodenis oblongis apice eroso-denticulatis calycem pubescentem multo superantibus, fructibus villosis uncinato-mucronatis. *Europ. Sibir. Asia media.* (A. apennina L., volgensis Stev.)

pyrenaica Cand. 4. A. petalis subdenis spathulato-oblongis integerrimis calycem subpubescentem longe superantibus, fructibus glabris uncinatis. *Pyren. Hungar.?*

*** *Dubia.*

irkutiana Fisch. 5. A. petalis obovatis, calyce glaberrimo, foliis multifidis, laciniis dentatis. *Sibir. austr.*

2037. RANUNCULUS.

1. *Batrachia* Cand. *Fructus transverse rugoso-striati: flores albi.*

hederaceus 1. R. caule reptante radicante, foliis reniformibus obtuse sub-5lobis glabris, lobis integerrimis, petiolis basi stipulatis, pedunculis folio brevioribus, petalis calycem subsuperantibus. *Europ. Sibir. Inf. Aleut.*

saniculaefolius Viv. 2. R. caule natante radicante, foliis reniformibus obtuse 5lobis crenatis, petiolis basi nudis, pedunculis folia subaequantibus, petalis calycem triplo superantibus. *Afric. bor. ad magnam Syrtim.* Cella.

aquatilis 3. R. caule natante radicante, foliis emerſis 3partitis ſubdentati, ſubmerſis multifidis lineari-ſetaceis, petalis calycem ſuperantibus, fructibus ſubhiſpidis. *Europ. Aſia. Africa. Amer.* (R. tripartitus Cand., pantothrix Brot.)

peucedanifolius All. 4. R. caule natante, foliis omnibus ſubmerſis ditrichotome repetito diſſectis, laciniis longiſſimis linearibus parallelis, petalis calycem multo ſuperantibus. *Europ. Afric. Amer. bor.* (R. pantothrix *γ.* et aquatilis *γ.* Cand.)

2. *Ranunculaſtra* et *Thorae* Cand. *Fructus laeves compreſſi ſubgloboſi: radix grumoſa.*

* *Foliis inferioribus integris.*

bullatus 5. R. foliis omnibus radicalibus obovatis dentatis ſubſeſſilibus rugoſis, ſcapo 1floro piloſo. *Luſitania. Sicilia. Graecia. Afric. bor.*

Thora 6. R. foliis inferioribus reniformibus amplis crenatis ſubcoriaceis, caulino ſubſeſſili inciſo, floralibus paucis anguſtis, caule ſub-2floro. *Alp. Europ. med.* (R. ſcutatus Kit., hybridus Bir., brevifolius Tenor.)

Ficaria 7. R. foliis cordatis nitidis dentatis longe petiolatis, caule aſcendente, calyce ſub-3ſepalo. *Europ.* (Ficaria ranunculoides Mönch. Cand.)

macropetalus Cand. 8. R. foliis radicalibus orbiculatis crenatis, petiolis baſi membrana auctis, caulinis ovato-lanceolatis ſeſſilibus, caule glabro paucifloro, calyce appreſſo. *Peru.*

pedatus Kit. 9. R. foliis glabris, radicalibus 3partitis pedatis petiolatis, laciniis linearibus ſubintegris, caule pubeſcente ſtricto paucifloro oligophyllo, ſepalis appreſſis. *Hungar. Transſylvan.*

petroſelinus Bir. 10. R. foliis glabris ad baſin petioli villoſis bis 3partitis, laciniis linearibus inciſo-dentatis, caule multifloro, ſepalis acutis patentibus. *Inſ. Maſcaren.*

illyricus 11. R. foliis ſericeo-lanatis, primordialibus linearilanceolatis indiviſis reliquis 3partitis, laciniis linearibus ſubintegris, caule multifloro, ſepalis patentiſſimis. *Inſ. Oeland. Auſtria. Hungar. Tauria. Caucaſ.*

monspeliacus 12. R. foliis ſublanatis, radicalibus 3lobis, lobis cuneatis 3fido-dentatis, ſuperioribus 3partitis, laciniis linearibus, caule paucifloro, ſepalis reflexis. *Europ. auſtr.*

ſpicatus Desf. 13 R. foliis villoſis, radicalibus longe petiolatis cordato-orbiculatis lobatis, lobis cuneatis obtuſe dentatis, caulinis anguſtis ſeſſilibus, ſepalis reflexis, fructibus uncinatis ſpicatis. *Sicil. Luſitan. Afric. bor.*

creticus 14. R. foliis villoſo-hirſutis, radicalibus petiolatis cordato-orbiculatis inciſo-dentatis, caulinis ſeſſilibus 3partitis, lobis oblongis obtuſis apice ſub-

dentatis, caule multifloro, sepalis appressis. *Creta. Asr. bor.*

cortusaefolius W. 15. R. foliis pilosis, radicalibus petiolatis subcordato-reniformibus sublobatis inaequaliter dentatis, caulinis 5partitis, laciniis lanceolatis serrulatis, floralibus linearibus integerrimis, floribus corymbosis, sepalis patentibus. *Insul. Canar.*

Guzmanni Humb. 16. R. foliis supra villosis, radicalibus longe petiolatis subrotundis 3lobis dentatis, superioribus tripartitis sessilibus, caule piloso paucifloro, sepalis obtusis villosissimis petala subaequantibus. *Alp. Amer. austr.*

Krapfia Cand. 17. R. foliis radicalibus longissime petiolatis suborbiculatis 3fidis dentatis cauleque unifloro hirsutis, sepalis obtusis petala aequantibus, fructibus uncinatis. *Chili.*

japonicus Thunb. 18. R. foliis hirsutis, radicalibus rotundatis 3lobis, lobis incisis dentatis, supremis fissis, caule erecto ramoso. *Japon.* (R. asiaticus Thunb.)

asiaticus 19. R. foliis pubescentibus lanatisve, infimis simplicibus 3lobis inciso-dentatis, superioribus ternatis s. biternatis, calyce patente, corolla ampla. *Graecia. Asia minor. Afric. bor.*

***Foliis omnibus divisis.*

chaerophyllus 20. R. foliis sericeo-lanatis, radicalibus subintegris petiolatis ovatis serratis, reliquis 3partito-compositis, laciniis subdivaricatis oblongis, caule 1-2floro, sepalis lanceolatis acutis patulis. *Europ. austr. Afric. bor.* (R. flabellatus Desf., gregarius Brot., paludosus Poir., Thomasii Tenor.)

ascendens Brot. 21. R. foliis lanatis, radicalibus 3partito-ternatis petiolatis, laciniis cuneatis 3fidis dentatis, caulinis subsessilibus, caule ascendente dichotomo, pedunculis sulcatis, sepalis pilosis reflexis. *Lusitania.*

millefoliatus Vahl. 22. R. foliis omnibus decompositis multifidis glabris, laciniis abbreviatis incisis, petiolis cauleque unifloro appresse pilosis, sepalis oblongis patentibus, radicibus tuberosis. *Sicilia. Graecia. Afric. bor.* (R. Agerii Bertol.)

gracilis Cand. 23. R. foliis omnibus glaberrimis, radicalibus orbiculatis 3-5partitis, laciniis flabelliformibus sinuato-dentatis, caulinis multipartitis, laciniis sublinearibus, caule simplici gracili, sepalis reflexis. *Insul. Cos.* Clarke.

fumariaefolius Desf. 24 R. foliis radicalibus decompositis multipartitis, laciniis oblongis, scapis plurimis 1floris appresse villosis, calyce patente glabro. *Patria?*

myriophyllus Ruff. 25 R. foliis decompositis multifidis albido-villosis, laciniis lanceolato-linearibus, caule erecto ramoso hirsuto, sepalis lanceolatis patentibus. *Syria.*

orientalis 26. R. foliis decompositis multifidis pubescentibus, laciniis linearibus, petiolis alatis, caule ramoso villoso, sepalis obtusis reflexis, fructibus longe cornutis. *Asia minor. Insul. maris aegei.*

leptaleus Cand. 27. R. foliis ternato-compoſitis glabris, laciniis linearibus, caule patule piloſo, ſepalis acutis patulis, fructibus uncinato-mucronatis. *Cyprus.* Labillardière.

cicutarius Schlechtend. 28. R. foliis ternato-compoſitis glabris, laciniis oblongo-cuneatis inciſo-dentatis, caule ſtricto appreſſe piloſo, ſepalis patentibus pubeſcentibus. *Sibir. or.*

3. *Hecatoniae* Cand. *Radix fibroſa ſ. faſciculata: fructus laeves ſubrotundi.*

* *Foliis integris.*

† *Floribus albis.*

pyrenaeus 29. R. foliis radicalibus paucis lineari-lanceolatis integerrimis nervoſis baſi in petiolum attenuatis, ſcapo ſub-1floro apice piloſo. *Alp. Europ. med.* (R. bupleurifolius Lapeyr. R. plantagineus All. var. caule paucifloro.)

anguſtifolius Cand. 30. R. foliis radicalibus linearibus glauceſcentibus, caule oligophyllo paucifloro ſuperne glabro. *Pyren.*

amplexicaulis 31. R. foliis radicalibus oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis nervoſis, caulinis ovato-oblongis amplexicaulibus, caule ſuperne glabro paucifloro. *Alp. Europ. auſtr.*

parnaſſifolius 32. R. foliis radicalibus ſubcordato-ovatis nervoſis petiolatis cauleque paucifloro hirſutis, caulinis ſeſſilibus ovato-lanceolatis. *Alp. Europ. med.*

crenatus Kit. 33. R. foliis radicalibus cordato-ſubrotundis nervoſis crenato-dentatis, caule 1floro oligophyllo, petalis obtuſis crenulatis. *Montes carpathi orient.*

†† *Floribus flavis.*

gramineus 34. R. foliis lineari-lanceolatis ſubnervoſis cauleque paucifloro glaberrimis, ſquamis nectariferis tubuloſis. *Europ. auſtr.*

bupleuroides Brot. 35. R. foliis radicalibus petiolatis ovato-lanceolatis nervoſis glabris, caule lanato oligophyllo paucifloro, ſquamis nectariferis tubuloſis. *Luſitan.*

Lingua 36. R. foliis lanceolato-enſiformibus denticulatis ſeſſilibus glabriusculis, caule erecto ramoſo multifloro hirſutiusculo. *Europ. Sibir. Amer. bor.*

Flammula 37. R. foliis lanceolatis acutis ſubintegerrimis glabris, inferioribus petiolatis, caule baſi radicante aſcendente, pedunculis oppoſitifoliis. *Europ. Aſia. Afric. Amer.* (R. ovatus Perſ. var. foliis pleriſque ovatis petiolatis. R. reptans L. (filiformis Mx.) var. foliis linearibus.)

puſillus Poir. 38. R. foliis omnibus longe petiolatis, inferioribus ovatis ſubdentatis, ſuperioribus lineari-lanceolatis, caule ramoſo aſcendente piloſiusculo, pedunculis oppoſitifoliis, corolla calycem aequante. *Nov. Caeſar. Carolin.* (P. humilis Perſ. Flammula Walt.)

bonarienſis Poir. 39. R. foliis inferioribus petiolatis cordato-ovatis obtuſis crenatis, ſuperioribus ſubſeſſilibus oblongo-lanceolatis ſerratis, caule ramoſo, corolla calycem ſubaequante. *Buenos Ayres.* (R. heterophyllus Sm.)

polyphyllus W. Kit. 40. R. foliis infimis numeroſiſſimis verticillatis ovato-oblongis integerrimis erectis, caulinis longe petiolatis 3dentatis, radice fibrilloſa, caule ſtricto paucifloro. *Hungar. Ad Tanaim.*

flagelliformis Sm. 41. R. foliis petiolatis cordato-orbiculatis repandis, caule ramoſo radicante, pedunculis oppoſitifoliis. *Chili. Nov. Granat.*

ſalſuginoſus Pall. 42. R. foliis radicalibus petiolatis ſubcordato-ovatis apice profunde ſub-3dentatis, ſcapo ſubramoſo paucifloro, petalis calycem excedentibus, radice ſtolonifera. *Sibir.* (R. ruthenicus Jacqu.)

halophilus Schlechtend. 43. R. foliis radicalibus numeroſis longe petiolatis obovatis obtuſis 3dentatis carnoſis, flagellis e collo ortis, ſcapo 1floro, petalis obovatis reflexis calycem ſuperantibus. *Sibir.*

Cymbalaria Pursh. 44. R. foliis radicalibus petiolatis orbiculatis groſſe crenatis ſubcarnoſis, flagellis e collo ortis, ſcapo ſub-3floro, petalis linearibus calycem aequantibus. *Sibir. Amer. bor.*

tridentatus Humb. 45. R. foliis radicalibus petiolatis ovatis apice 3dentatis glabris ſubcarnoſis, ſcapo 1floro petiolos aequante bracteato, petalis linearibus calyce longioribus. *Mexico.*

nubigenus Humb. 46. R. minutus repens, foliis radicalibus ſuborbiculatis paucicrenatis petiolatis ſubcarnoſis, ſcapo 2floro apice pubeſcente, bracteis ſub-3dentatis, corolla 5petala. *Alp. peruv.*

** *Foliis diſſectis.*

† *Floribus albis.*

Pallaſii Schlechtend. 47. R. caule repente fiſtuloſo, foliis omnibus cuneatis tripartitis petiolatis, laciniis obtuſiusculis, calycibus 3ſepalis, corolla 8petala. *Ora occid. Amer. bor. ſub circ. arct.*

biternatus Sm. 48. R. caule repente, foliis 3partitis, laciniis 3fidis acutis, petalis obtuſis calycem aequantibus, fructibus uncinatis. *Ad fretum Magellan.*

rutaefolius 49. R. foliis bipinnatifidis, foliolis ſeſſilibus ovatis ſubpalmato-multifidis, caule ſimpliciusculo, corolla polypetala, petalis emarginatis, radice fuſiformi. *Alp. Europ. med.*

iſopyroides Cand. 50. R. folio radicali longe petiolato bipinnatifido, foliolis petiolatis oblongis 5fidis, laciniis 3fido-inciſis, foliis ſuperioribus 3partitis ſubſeſſilibus, corolla ſub-5petala calycem ſuperante. *Sibir.*

glacialis 51. R. foliis 3partito-ternatis craſſiusculis glabris, laciniis obtuſiusculis inciſis, caule ſub-1floro, calycibus obtuſis hirſutiſſimis, fructibus compreſſis marginatis. *Alp. jumm. Europ. Lappon.*

Chamissoi Schlechtend. 52. R. foliis 3partitis, radicalibus longe petiolatis glabris, laciniis 3-5fidis obtusiusculis, caule sub-1floro superne calycibusque hirsutis, fructibus utriculosis acuminatis. *Asia bor. extrema ad fretum Beringii.*

Seguierii Vill. 53. R. foliis ternato-3partitis, foliolis ovatis acutis 3fido-incisis, caule ramoso multifloro, calycibus glabris. *Alp. Delphinat. Pedemont. Austr.* (R. Columnae All.)

alpestris 54. R. foliis radicalibus subcordato-orbiculatis tripartitis, laciniis subtrifido-dentatis obtusiusculis, caulino lineari-lanceolato subindiviso, caule sub-1floro, petalis obcordatis, fructibus utriculosis mucronatis. *Alp. Europ. med.* (R. magellensis Tenor., Traunfellneri Hopp., crenatus Baumg.)

aconitifolius 55. R. foliis palmatis 5partitis, laciniis omnibus lanceolatis serratis, inferiorum obtusis, superiorum acutis, caule alato ramoso multifloro, calycibus appressis. *Alpestria Europ. med.* (R. platanifolius L., heterophyllus et dealbatus Lapeyr.)

ternatus Thunb. 56. R. foliis ternatis, foliolis cordatis 3lobis dentatis, caule pilosiusculo multifloro, pedunculis abbreviatis sparsis, calycibus reflexis. *Japon.*

apiifolius Pers. 57. R. foliis inferioribus longe petiolatis palmato-5fidis sinuatis, laciniis 3fido-dentatis, foliis caulinis 3partitis linearibus dentatis, caule ramoso multifloro, calycibus corollam aequantibus patentibus, fructibus muticis. *Buenos Ayres.*

lateri Bell. 58. R. foliis cuneiformibus apice irregulariter acute incisis, caule glabro ramoso paucifloro, calycibus appressis. *Alp. pennin.* (R. frigidus Schrank.?)

†† *Floribus flavis.*

a. Foliis glabris.

aa. Caule uni-paucifloro.

breviscapus Cand. 59. R. foliis radicalibus petiolatis orbiculato-cordatis 3-5fidis, flagellis e collo ortis, scapis 1floris petiolo brevioribus, calycibus glabris. *Peru.*

acaulis Banks. 60. R. foliis radicalibus longe petiolatis 3partitis, lobis ovalibus integerrimis, scapo 1floro petiolis brevioribus, calyce patente, petalis unguiculatis lanceolatis erectis. *Nov. Zeeland.*

lapponicus 61. R. foliis longe petiolatis 3partitis, lobis obovatis obtusissimis inciso-crenatis, caule 1floro, calyce 5sepalo piloso, fructibus uncinato-rostratis. *Lappon. Island.*

hyperboreus Rottb. 62. R. caule filiformi repente glaberrimo, petiolis basi alatis, stipulis binis reflexis, foliis basi truncatis 3fidis (sub-5fidis) obtusis, pedunculis oppositifoliis, calycibus reflexis, fructibus muticis. *Norvegiae arctic. Island. Grönland.*

Gmelini Cand. 63. R. caule filiformi repente, petiolis basi alatis, lobis basi truncatis 3-5fidis obtusis, pedunculis

oppositifoliis, calycibus reflexis, fructibus rostratis. *Sibir. orient.*

pygmaeus Wahlenb. 64. R. caule ascendente sub-1floro, foliis 5lobis obtusis, pedunculis superne pilosis, calyce patente corollam subexcedente, fructibus uncinatis. *Regio arctica Europ. et Amer.*

nivalis 65. R. caule erecto 1floro, foliis reniformibus 5lobis integerrimis, calyce hirsuto petalis striatis breviori, fructibus uncinato-rostratis. *Europ. arctic.*

frigidus W. 66. R. caule erecto 1floro, foliis radicalibus petiolatis obovatis apice 3-5dentatis, caulinis sessilibus palmatis, calyce hirsutissimo petalis emarginatis breviori. *Sibir.* (R. altaicus Laxm.)

Eschscholzii Schlecht. 67. R. caule erecto sub-2floro, foliis ciliatis, radicalibus petiolatis cordatis 3lobis, lobis late cuneatis 3dentatis, caulinis subsessilibus, calycibus sulvo-villosis corolla brevioribus. *Insul. Aleut.* Chamisso.

rivularis Banks. 68. R. caule reptante, foliis longe petiolatis 3partitis, laciniis obtusiusculis dentatis, pedunculis oppositifoliis, petalis lanceolatis, fructibus recte rostratis. *Nov. Zeeland.*

inundatus R. Br. 69. R. caule erecto subnudo 2-4floro, foliis radicalibus petiolatis 5partitis, laciniis 3fidis dentatis, calycibus obtusis corollam aequantibus. *Nov. Holl.*

demissus Cand. 70. R. scapo demisso sub-1floro, foliis radicalibus petiolatis 3-5partitis, lobis laciniatis, calyce patente pubescente. *Libanus.* Labillard.

polyrrhizos Steph. W. 71. R. caule erecto sub-3floro, foliis radicalibus longe petiolatis 3lobo-sinuatis, lobis divaricatis obtuse 3dentatis, caulinis sessilibus 3partitis acutis, calyce glabro patente, radice fasciculata. *Ad Volgam. Caucas. Sibir.*

montanus W. 72. R. caule 1floro, foliis radicalibus petiolatis cordato-orbiculatis palmato-5lobis, caulinis sessilibus sub-3partitis acutis, pedunculis sericeis, calycibus acutiusculis glabris. *Alp. Europ. med.*

ββ. Caule multifloro.

auricomus 73. R. foliis membranaceis nitidis, radicalibus petiolatis cordato-reniformibus crenatis 3lobisque, caulinis sessilibus in lacinias lineares subdentatas partitis, calyce appresso pubescente. *Europ. Amer. bor.*

cassubicus 74. R. foliis subcoriaceis, radicalibus reniformi-cordatis crenatis 3lobisque, caulinis digitatis sessilibus, foliolis rhombeo-lanceolatis serratis, calycibus fructibusque uncinato-mucronatis pubescentibus. *Pomerania. Boruss. Galicia.*

abortivus 75. R. foliis membranaceis, radicalibus petiolatis cordatis crenatis 3lobisque, caulinis sessilibus in lacinias lineares subintegerrimas divisis, corolla calycem glabrum subaequante, fructibus muticis. *Amer. bor.*

sceleratus 76. R. foliis inferioribus 3lobis, lobis 3fidis obtuse dentatis, caulinis 3partitis, laciniis sublinearibus integris, calycibus glabris, fructibus subspicatis. *Europ. Asia. Amer. bor.* (R. umbellatus Roxb., digitatus Gilib., Hecatonia paluſtris Lour.)

multifidus Pursh. 77. R. foliis 3partito-multifidis, laciniis linearibus acutis incisis, caule natante, pedunculis folia superantibus, calycibus glabris. *Louisiana.*

*Langsdorfii** 78. R. foliis 3partitis, lobis subrotundis obtuse inciso-dentatis, caule repente, calycibus reflexis, fructibus uncinatis. *Japon.* (R. japonicus Cand.)

dichotomus Seſſ. 79. R. foliis radicalibus longiſſime petiolatis bipinnatifidis, laciniis anguſtis incisis, caulinis ſeſſilibus pinnatifidis, caule dichotomo, pedunculis elongatis, calycibus reflexis, fructibus recte roſtratis. *Mexico.*

perſicus Cand. 80. R. foliis radicalibus petiolatis pinnatifidis, laciniis 3fidis dentatis, caulinis 3partitis, caule erecto dichotomo appreſſe pubeſcente, calyce patente villoſo. *Perſia.*

β. Foliis pubeſcentibus.

αα. Caule uni-pauciſloro.

ſibbaldioides Humb. 81. R. caule breviſſimo 1floro hirſuto, foliis pinnatis ſubtus piloſis, foliolis 3lobis inciſo-crenatis, calycibus patulis piloſis. *Alp. Quito.*

*ſibiricus** 82. R. foliis ſubpubeſcentibus palmato-multifidis, laciniis linearibus tenuiſſimis, caule 1floro, calycibus reflexis. *Sibir. orient.* (R. Langsdorfii Cand.)

collinus R. Br. 83. R. foliis radicalibus petiolatis 3partitis, laciniis ovalibus apice dentatis, ſcapo 1floro folia ſuperante, petalis unguiculatis oblongis. *Terra Diemen.*

peruvianus Perſ. 84. R. foliis radicalibus longe petiolatis ſemiorbiculatis crenatis, caulinis ſeſſilibus in lacinias lineares ſubintegerrimas partitis, calyce villoſo, petalis obtuſiſſimis. *Peru.*

pedunculatus Viv. 85. R. foliis radicalibus ſuborbiculatis crenato-dentatis, reliquis 3partitis, lobo medio petiolato 3fido inciſo, pedunculis radicalibus aphyllis, calyce patente. *Corſica.*

pedatifidus Sm. 86. R. foliis radicalibus longe petiolatis palmato-pedatis, laciniis ſubintegris, caulinis paucis ſeſſilibus, caule ſub-2floro ſuperne villoſo, calyce patente villoſiusculo. *Sibir. or.*

Villarſii Cand. 87. R. foliis radicalibus ſuborbiculatis 3partitis, laciniis 3fidis dentatis acutis, caulinis ſeſſilibus in lacinias lineares integras partitis, caule unifloro apice pubeſcente, calyce villoſo. *Alp. pennin. Delphinat. Tauria. Caucaſ. Sibir.* (R. lapponicus Vill., oreophilus M. B.)

anemonaefolius Cand. 88. R. foliis radicalibus 3partitis baſi cuneatis, laciniis inciſo-dentatis, caulino 3partito ſeſſili, laciniis linearibus integris, caule erecto 1-2floro ſuperne pubeſcente, calyce reflexo. *Aſia minor.*

napellifolius Cand. 89. R. foliis radicalibus ſuborbiculatis 5partitis, laciniis multifidis linearibus, floralibus 3partitis, laciniis linearibus integerrimis, caule nudiusculo 1-2floro, calyce appreſſo hirſuto. *Aſia minor.*

diſſectus M.B. 90. R. foliis radicalibus multipartitis, laciniis oblongis acutiusculis ſub-3fidis, caulinis digitatis linearibus, caule erecto ſub-2floro pubeſcente, calycibus hirſutis patentibus. *Caucaſ. Sibir.*

cappadocicus W. 91. R. foliis radicalibus cordatis 3lobis, lobis acuminatis dentatis, caulinis binis integris, caule erecto ſub-2floro, calycibus patulis. *Aſia minor.*

peduncularis Sm. 92. R. foliis radicalibus longe petiolatis 3partitis ſubcuneatis, laciniis 3fidis patentibus, caule nudiusculo ſub-1floro, calycibus demum reflexis, fructibus elongato-uncinatis. *Ad fretum Magellan.*

tomentoſus Poir. 93. R. caule villoſiſſimo ſub-1floro, foliis petiolatis tomentoſis 3partitis, lobis ovatis 3fidis dentatis, folio ſummo ſeſſili ovato integro, calycibus reflexis hirſutis. *Carolina.*

praemorſus Humb. 94. R. caule ſericeo-hirſuto ſub-1floro, foliis ternatis ſupra piloſis ſubtus ſericeis, foliolis ſub-3fidis crenato-ſerratis, calycibus reflexis piloſis, petalis denis emarginatis. *Alp. Quito.*

geoides Humb. 95. R. caule villoſo ſub-2floro, foliis 3partitis villoſo-ſericeis, laciniis inciſo-ſerratis, intermedia ſub-3loba, calycibus piloſis reflexis, petalis denis. *Mexico.*

Bonplandianus Humb. 96. R. caule piloſiusculo ſub-2floro, foliis ternato-3partitis ſupra glabris ſubtus piloſiusculis, foliolis ſub-3lobis crenato-ſerratis, calycibus reflexis piloſis, petalis ſubdnodenis. *Nov. Granat.*

delphinifolius Humb. 97. R. caule erecto paucifloro foliisque ternatis piloſis, foliolis 2-3partitis, laciniis 2-3fidis inciſo-ſerratis, calycibus piloſis reflexis, petalis 15. *Mexico.*

grandiflorus Humb. 98. R. caule erecto villoſo paucifloro, foliis radicalibus 3partitis, laciniis inaequaliter laciniatis, caulinis linearibus, calycibus reflexis, petalis obtuſiſſimis. *Aſia minor.*

geranioides Humb. 99. R. caule flagelliformi ſub-2floro foliisque ternatis ſericeo-piloſis, foliolis petiolatis 2-3fidis inciſo-ſerratis, pedunculis oppoſitifoliis, calycibus reflexis hirſutis, fructibus laevibus recte acuminatis. *Nov. Granat.*

piloſus Humb. 100. R. caule aſcendente dichotomo paucifloro, foliis ternatis appreſſe piloſis, foliolis ovato-rhomboideis 2-3fidis inciſo-ſerratis, calycibus reflexis, fructibus recte acuminatis. *Nov. Granat.*

† *cantonienſis* Cand. 101. R. caule erecto ramoſo piloſo paucifloro, foliis ternatis lanceolatis inciſo-ſerratis, pedunculis ſolitariis. *China auſtr.* (Hecatonia piloſa Lour.)

Pumilio R.Br. 102. R. caulibus caeſpitoſis erectiusculis villoſis, foliis longe petiolatis 3partitis, laciniis oblongis integris 3fidisque, pedunculis oppoſitifoliis, floribus minimis, fructibus villoſis. *Terra Diemen.*

ββ. Caule multifloro.

Breyniamus Crantz. 103. R. caule erecto multifloro foliisque villosis, radicalibus palmatis 3-5partitis, lobis obovato-oblongis dentatis, floralibus integerrimis, pedunculis sulcatis, calycibus patentibus, receptaculis pilosis, fructibus uncinatis. *Europ. med.* (R. nemorosus *β.* Cand.)

polyanthemos 104. R. caule erecto multifloro foliisque villosiusculis, radicalibus palmatis 3-5partitis, laciniis multifido-incisis angustis, floralibus integerrimis, pedunculis sulcatis, calycibus patulis, receptaculis glabris, fructibus submuticis. *Europ.* (R. nemorosus *α.* Cand.)

Gouani W. 105. R. caule erecto submultifloro foliisque hirsutis, radicalibus cordato-orbiculatis 5lobis, lobis inciso-dentatis, caulinis palmatis dentatis sessilibus, calycibus appressis villosis. *Pyrenaei montes.* (R. pyrenaeus Gouan. var. caule 1floro.)

acris 106. R. caule erecto multifloro foliisque pubescentibus, radicalibus palmato-5partitis, caulinis 3partitis, laciniis inciso-dentatis, floralibus linearibus integerrimis, pedunculis teretibus, calycibus patulis, petalis emarginatis, fructibus mucronatis. *Europ. Asia. Amer. bor.* (R. Stevenii Bess., rufulus Brot., sylvaticus Thuill.)

bruttius Tenor. 107. R. caule erecto foliisque villosis, radicalibus palmato-3-5partitis, laciniis profunde 3partitis incisis, summis linearibus integerrimis, pedunculis teretibus sericeis, calyce appresso. *Calabria.*

caucasicus M. B. 108. R. caule elato multifloro foliisque appresse pilosis, radicalibus amplis ternatis, foliolis cuneatis 3partitis, laciniis lanceolatis 3fidis, pedunculis teretibus, calycibus patulis, fructibus uncinatis. *Caucas.*

tuberosus Lapeyr. 109. R. caule subascendente foliisque appresse pubescentibus, radicalibus amplis 3partitis, laciniis distantibus incisis, lateralibus 2fidis, intermedia cuneiformi 3partita, pedunculis teretibus, calycibus appressis, fructibus longe uncinatis, radice tuberosa. *Pyren.*

lanuginosus 110. R. caule erecto multifloro petiolis calycibusque patentissime villosis, foliis holosericeis, radicalibus amplis 3partitis, laciniis obovatis 3fidis inciso-serratis, summis sensim minoribus, pedunculis teretibus, calyce patente, fructibus uncinato-muricatis. *Europ.* (R. constantinopolitanus Urv., tuberosus Sieb.)

villosus Cand. 111. R. caule erecto dichotomo deflexo-hirsuto, foliis villosis 3partitis, laciniis ovatis inciso-dentatis, summis indivisis, calycibus hispidis reflexis. *Persia.*

sericeus Poir. 112. R. caule erecto multifloro foliisque villoso-sericeis, radicalibus subternato-3partitis, lobis latis trifido-sinuatis incisis, caulinis palmato-

5partitis, laciniis anguſtioribus, ſummis 3partitis, calycibus patentibus, fructibus ſubmuticis. *Inſ. Mascaren.*

diffuſus Cand. 113. R. caule elongato diffuſo foliisque cordato-ſubrotundis dentatis villoſis, pedunculis oppoſitifoliis, calycibus appreſſis, fructibus recte mucronatis. *Nepal.*

nepalenſis Cand. 114. R. caule erecto dichotomo foliisque ternato-3partitis piloſis, laciniis oblongo-cuneatis dentatis, calycibus reflexis petala ſubſuperantibus, fructibus recte mucronatis. *Nepal.*

petiolaris Humb. 115. R. caule erecto dichotomo foliisque ſericeo-pubeſcentibus, radicalibus longiſſime petiolatis 3partitis, laciniis 3fidis inciſo-dentatis, ſummis linearibus, calycibus reflexis piloſis, fructibus recte mucronatis. *Mexico.*

plebejus R. Br. 116. R. caule erectiusculo dichotomo baſi petiolisque patenter piloſiſſimis, foliis ſubternatis villoſis, foliolis ovatis inciſo-dentatis, ſummis linearibus integris, calycibus ſubreflexis, fructibus ſubuncinatis. *Nov. Holl.*

hirtus Banks. 117. R. caule erecto dichotomo piloſiſſimo, foliis piloſis, inferioribus petiolatis ternatis, ſummis ſeſſilibus 3partitis, foliolis laciniisque ovatis groſſe dentatis, floribus minimis longe pedunculatis, calycibus reflexis, fructibus recte mucronatis. *Nov. Zeeland.*

hiſpidus Mx. 118. R. caule erecto ramoſo patenter piloſiſſimo, foliis ternato-3partitis, foliolis laciniisque ovalibus acutis inciſo-dentatis, pedunculis ſtrigilloſis, calycibus appreſſis. *Virginia. Carolina.*

recurvatus Poir. 119. R. caule erecto patenter piloſiſſimo, foliis villoſis omnibus cordatis 3lobis, lobis ovatis inciſis, calycibus reflexis petala minuta longe ſuperantibus. *Amer. bor.* (R. faniculaeformis Mühl.)

penſylvanicus 120. R. caule ramoſo petiolisque hirtis, foliis ternatis hirſutis, foliolis lato-lanceolatis 3fidis inciſis, calycibus reflexis petala aequantibus, fructibus recte mucronatis. *Amer. bor.* (R. canadenſis Jacq.)

faſcicularis Mühl. 121. R. caule gracili patenter villoſo, foliis ſericeo-pubeſcentibus ternato-3partitis, radicalibus longe petiolatis, laciniis ſub-3fidis inaequaliter dentatis baſi attenuatis, calycibus patentibus corolla brevioribus, fructibus uncinatis. *Amer. bor.*

Beloſii Cand. 122. R. caule erecto ramoſo hirſutiusculo, foliis radicalibus ternatis longe petiolatis glabris, foliolis 3fidis, laciniis acuminatis acute inciſis, calyce glabro patente petalis breviori. *Amer. bor.*

platyſpermus Fiſch. 123. R. caule erecto, foliis radicalibus multifidis, caulinis 3partitis, laciniis linearibus, fructibus orbiculatis membranaceo-compreſſis apice uncinatis. *Ditio Kirgiſorum Aſiae med.*

rhoeadifolius Cand. 124. R. caule erecto ramoſo piloſo, foliis omnibus petiolatis ternatis glabriusculis, foliolis oblongis

3fidis inciſo-dentatis, ſummis linearibus, calycibus patentibus corollam ſubaequantibus. *Inſ. Canar.* Brouſſonet.

repens 125. R. ſarmentis radicantibus, caule aſcendente foliisque ternatis glabriusculis vel hirſutis, foliolis 3fido-cuneatis inciſo-dentatis, pedunculis teretibus, calycibus appreſſis, fructibus recte mucronatis. *Europ. Aſia. Amer. bor.* (R. proſtratus et lucidus Poir.)

marginatus Urv. 126. R. radice fibroſa, caule baſi ramoſo patulo ſubhirſuto, foliis calloſo-marginatis, inferioribus petiolatis ternatis, foliolis obtuſis crenatis, caulinorum laciniis linearibus, calycibus reflexis corolla majoribus, fructibus uncinatis. *Aſia minor.*

chilenſis Cand. 127. R. caule decumbente radicante petiolisque hiſpidis, foliis cordato-orbiculatis 3-5fidis ſubtus hirſutis, petalis ſpathulatis calycem villoſum ſuperantibus. *Chili.*

lappaceus Sm. 128. R. caule erecto multifloro foliisque pinnatifidis hirſutis, laciniis ovatis 3fidis, calyce patente, fructibus uncinatis. *Nov. Holl.*

marilandicus Poir. 129. R. caule erecto hirſuto, foliis glabriusculis ternatis, foliolis 3fidis, laciniis oblongis acutis inciſo-dentatis, calyce glabro patentiſſimo petalis breviori. *Amer. bor.*

carolinianus Cand. 130. R. caule erecto ſubramoſo petiolisque appreſſe pubeſcentibus, foliis glabriusculis ternato-3fidis, laciniis ovatis obtuſis ſubinciſis, calyce reflexo glabrinsculo petalis breviori. *Carolina.* (R. ſeptentrionalis Poir.)

paluſtris L. Sm. 131. R. caule ramoſo nudiusculo, foliis petiolatis ſubhirſutis 3lobis ſinuatis, lobis ovatis obtuſis inciſo-dentatis, fructibus recte acuminatis, radice fibroſa. *Graecia. Corſica.* (R. corſicus Cand.)

bulboſus 132. R. caule baſi bulboſo multifloro foliisque ternato-3partitis villoſis, foliolis 3fidis inciſo-dentatis, pedunculis ſulcatis, calycibus reflexis. *Europ. Amer. bor.*

4. *Echinellae* Cand. *fructus muricati.*

* *Foliis indiviſis.*

ophioglosſifolius Vill. 133. R. caule fiſtuloſo glaberrimo, foliis omnibus petiolatis, inferioribus ſubcordatis ſuperioribus oblongis obtuſis nervoſis, petiolis late vaginantibus, pedunculis oppoſitifoliis, fructibus granulatis. *Europ. auſtr. Afric. bor.* (R. ophioglosſoides W., cordifolius Bat., fiſtuloſus Brignol.)

uliginoſus W. 134. R. caule ſimpliciusculo humili, foliis inferioribus ſubcordato-ovatis angulato-dentatis, ſuperioribus lanceolatis ſerratis, pedunculis oppoſitifoliis, fructibus granulatis. *Teneriffa.* (R. cochlearifolius Horn.)

nodiflorus 135. R. caule ramoſo foliisque oblongo-lanceolatis ſubdentatis glabris, floribus axillaribus ſeſ-

sessilibus, fructibus rostellatis. *Europ. austr.* (R. lateriflorus Cand.)

** *Foliis divisis.*

sessiliflorus R. Br. 136. R. caule procumbente, foliis subvillosis reniformibus 3partitis s. grosse dentatis, floribus sessilibus oppositifoliis, fructibus granulatis. *Nov. Holl.*

trilobus Desf. 137. R. caule erecto foliisque glabris, primordialibus subintegris, reliquis 3partitis pinnatifidisque, laciniis cuneatis obtuse dentatis, pedunculis oppositifoliis, fructibus granulatis. *Afric. bor. Sicilia. Graecia. Teneriffa.*

pauciflorus 138. R. caule foliisque villosis, radicalibus cordato-orbiculatis sublobatis crenatis, summis oblongis integerrimis, pedunculis oppositifoliis, calycibus reflexis petala aequantibus, fructibus granulatis. *Anglia. Europ. austr.*

cordigerus Viv. 139. R. foliis sericeis, radicalibus cordato-subrotundis sub-3lobis crenatis, caulinis incisis integrisque, caule sub-2floro, calycibus reflexis. *Corsica.*

pinnatus Poir. 140. R. caule foliisque pinnatis villosis, foliolis sub-3jugis inciso-lobatis, pedunculis oppositifoliis, calycibus patentibus, fructibus granulatis mucronatis. *Ind. or. C. B. S.*

cornutus Cand. 141. R. caule ramoso foliisque 2ternatis glabris, foliolis 3fidis, laciniis oblongo-linearibus acutis, pedunculis oppositifoliis, calycibus reflexis, fructibus granulatis cornutis. *Syria.* Labillard.

oxyspermus MB. 142. R. caule erecto villosissimo, foliis radicalibus subcordato-ovatis 3lobis sinuatis villosis, lobis inciso-dentatis, caulinis linearibus, calycibus subreflexis, fructibus muricato-aristatis, radice grumosa. *Tauria. Caucas. Syria.*

muricatus 143. R. caule foliisque subreniformibus basi truncatis 3lobis glabris, lobis sub-3dentatis, summis integerrimis, pedunculis oppositifoliis, calycibus patentibus, fructibus muricato-cornutis. *Europ. austr. Afric. bor. Amer. bor. et austr.* (R. echinatus et ventricosus Vent.)

chius Cand. 144. R. caule foliisque cordato-orbiculatis late dentatis villosis, pedunculis oppositifoliis, calycibus reflexis, fructibus muricatis uncinato-cornutis. *Ins. Chios.*

Philonotis Retz. 145. R. caule foliisque subternato-3partitis hirsutiusculis, lobis inferiorum obtusiusculis inciso-dentatis, superiorum integerrimis, pedunculis sulcatis, calycibus reflexis, fructibus muticis margine tuberculatis, radice fibrosa. *Europ.* (R. hirsutus Ait., fardous Crantz., agrarius All. . . . R. intermedius Poir., pumilus Thuill., parvulus L., parviflorus Gouan. varr.)

arvensis 146. R. caule erecto multifloro foliisque 3partito-multifidis glabris, laciniis linearı-lanceolatis

subintegerrimis, fructibus utrinque aculeatis. *Europ.* (R. echinatus Crantz.; tuberculatus Kit. Cand.)

laciniatus Baumg. 147. R. caule erecto foliisque ternato-3partitis fericeo-villosis, laciniis 3fidis linearibus dentatis, pedunculis elongatis filiformibus dense pilosis, calycibus patentibus, fructibus muricatis mucronatis. *Transsylvan.*

2038. HAMADRYAS Commerf.

magellanica Lam. 1. H. foliis supra glabris 5lobis incisо-dentatis, scapo folia superante hirsutiusculo, calycibus glabris. *Ad fretum Magellan.*

tomentosa Cand. 2. H. foliis supra arachnoideo-villosis 5-7fidis, lobis oblongis sub-3fidis, scapo petiolos superante calycibusque tomentosis. *Inf. statuum ad terram ignis.* Menzies.

2039. TROLLIUS.

europaeus 1. Tr. sepalis 15 conniventibus, nectariis stamina aequantibus. *Europ. prata.* (Tr. altissimus, medius et minimus Wender., napellifolius Köpert.)

asiaticus 2. Tr. sepalis 10 patentibus, nectariis stamina superantibus. *Sibir.*

patulus Salisb. 3. Tr. sepalis 5 patentibus, nectariis paucis stamina aequantibus. *Sibir. Asia minor.*

caucasicus Stev. 4. Tr. sepalis 10 patentibus, staminibus nectaria superantibus. *Caucas.*

americanus Mühlenb. 5. Tr. sepalis 5 abbreviatis patulis, staminibus nectaria superantibus. *Amer. bor.* (Tr. laxus Salisb. Pursh.)

2040. HELLEBORUS.

hyemalis 1. H. scapo 1floro, flore involucrato, foliis radicalibus peltatis multifidis, laciniis integerrimis. *Europ. austr.* (Eranthis Salisb. Köllea Bir. Robertia Merat.)

sibiricus * 2. H. scapo 1floro, flore involucrato, foliis radicalibus suborbiculatis 5partitis, laciniis cuneatis apice inciso-dentatis. *Sibir. orient.* (Eranthis Cand.)

niger 3. H. scapo sub-1floro, flore bracteato, foliis radicalibus pedatis coriaceis apice serratis. *Europ. med. et austr.*

orientalis Lam. 4. H. caule paucifloro, foliis radicalibus pedatis serratis subtus pubescentibus, floralibus subsessilibus palmatis, pedunculis sub-2fidis, (floribus purpurascentibus). *Graecia. Asia minor.* (H. officinalis Salisb.)

purpurascens Kit. 5. H. caule 2floro folioso, foliis caule altioribus digitatis argute serrulatis subtus subpubescentibus,

foliolis floralibusque 3fidis, (floribus livide purpuraſcentibus). *Hungar. auſtr. Transſylvan.*

odorus Kit. 6. H. caule ſub-2fido, ramis foliatis 2floris, foliis digitatis ſubtus pubeſcentibus, foliolis indiviſis baſi integerrimis, (floribus virentibus). *Hungar.*

viridis 7. H. caule 2fido, ramis foliatis 1floris, foliis digitato-pedatis ſerratis ſubtus glabris, (floribus virentibus). *Europ. med.* (H. dumetorum Kit. var. foliolis rigidiusculis mucronato-ſerratis.)

atrorubens Kit. 8. H. caule florifero praecoci 2fido, ramis angulatis foliatis paucifloris, foliis digitato-palmato-pedatis ſerratis utrinque glaberrimis, (ſubquaternis denis, flore livide rubente). *Croatia.*

foetidus 9. H. caule folioſo multifloro, foliis multipartito-pedatis ſerratis glabris, floribus (ſubvirentibus) 3gynis. *Europ. med.*

lividus Ait. 10. H. caule folioſo multifloro, foliis ternatis glaberrimis ſubtus glaucis ſerratis, (floribus livide rubentibus). *Corſica.* (H. 3phyllus Lam., argutifolius Viv.)

2041. COPTIS Salisb.

trifolia Salisb. 1. C. foliis ternatis glaberrimis, foliolis obovatis ſublobatis mucronato-dentatis, ſcapo 1floro. *Grönland. Amer. bor. Camtſchatca. Sibir. arctic.* (nusquam in Europa, nec in Norveg. nec in Island., teſtibus Gunnero, Oedero et Hornem.) (Helleborus 3folius L., 3lobus Lam., Anemone grönlandica Oed.)

aſplenifolia Salisb. 2. C. foliis 2ternatis, foliolis ſubpinnatifidis argute ſerratis, ſcapo 2fido 2floro. *Ora occ. Amer. bor.* Menzies.

2042. CALTHA.

* *Sepalis deciduis.*

paluſtris 1. C. caule erecto, foliis cordato-orbiculatis crenatis, ſepalis oblongis obtuſis. *Europ. Aſia et Amer. bor.*

radicans Furſt. Forſt. 2. C. caule repente aſcendente, foliis 3angulari-cordatis ſerrato-crenatis, ſepalis oblongis apice attenuatis. *Scotia.*

flabellifolia Pursh. 3. C. caule procumbente, foliis dilatato-reniformibus acute dentatis, ſepalis obovatis, capſulis adunco-roſtratis. *Penſylvan.*

natans Pall. 4. C. caule natante, foliis cordatis crenatis, lobis ſubparallelis, ſepalis ovalibus, capſulis recte roſtratis. *Sibir. or.*

integerrima Pursh. 5. C. caule erecto corymboſo, foliis cordato-orbiculatis integerrimis, ſinu baſeos clauſo, floralibus baſi obſolete crenatis, ſepalis obovatis. *Amer. bor.*

aſarifolia Cand. 6. C. caule ſuberecto 1floro, foliis cordato-reniformibus crenatis, ſepalis ovalibus. *Inſ. Aleut.*

parnaſſifolia Rafin. 7. C. caule 1floro 1folio, foliis radicalibus cordatis obtuſiſſimis paucidentatis multinerviis, ſepalis ellipticis. *Nov. Caeſar.* (C. ficarioides Purſh. Ranunculus Ficaria Walt.)

biflora Cand. 8. C. caule 2floro 1folio, foliis radicalibus reniformibus crenatis, ſinu baſeos latiſſimo, ſepalis oblongis. *Ora occ. Amer. bor.*

** *Sepalis perſiſtentibus*

† *quinis.*

appendiculata Perſ. 9. C. ſcapo 1floro breviſſimo, foliis cuneiformibus 3lobis, lobo medio obovato ſub-3fido, ſepalis oblongo-lanceolatis. *Ad fretum Magellan.* (C. paradoxa Furſt. Forſt.)

†† *pluribus.*

fagittata Cav. 10. C. ſcapo 1floro, foliis ſagittatis undulato-crenatis, auriculis ſurſum inflexis, ſtylis numeroſis. *Inſ. Falkland. Patagon.*

leptoſepala Cand. 11. C. caule 1-2floro 1folio, foliis radicalibus cordato-ovatis crenatis multinerviis, ſepalis 10 linearibus acutis. *Ora occid. Amer. bor.* 60° lat. bor.

† *glacialis* * 12. C. ſcapo 1floro, foliis ovatis obtuſis ſubcrenatis, ſepalis externis 5, internis ſub-12nis oblongo-linearibus petaloideis. *Davuria.* (Ficaria glacialis Fiſch. Cand.)

† *camtſchatica* * 13. C. ſcapo 1floro, foliis ovatis integerrimis ſub-3nerviis, ſepalis externis 5, internis deciduis, germinibus 1ſpermis. *Camtſchatca.* (Ranunculus camtſchaticus Cand.)

2043. ANEMONE.

1. *Hepaticae* Dill. Cand. *Involucrum 3phyllum flori proximum calycem mentiens. Herbae acaules.*

integrifolia Humb. 1. A. foliis ovatis integerrimis ſubtus lanatis, petiolis ſcapisque villoſiſſimis. *Mexico.*

Hepatica 2. A. foliis 3lobis, lobis ovatis obtuſiusculis, petiolis ſcapisque villoſis. *Europ. Amer. bor.* (Hepatica 3loba Cand. . H. americana Ker. et acutiloba Cand. varr.)

† *anguloſa* Lam. 3. A. foliis palmato-angulatis dentatis venoſis, petiolis ſcapisque villoſis. *Patria? Nov. Caeſar.?* (A. pedata Rafin.?)

2. *Stephanomata. Involucra remota foliacea multifida: pedunculi ſubſolitarii uniflori: Caryopſes lanatae, villoſae.*

* *Radice tuberoſa.*

palmata 4. A. foliis cordatis lobatis dentatis, involucro ſeſſili 3fido, ſepalis oblongis obtuſis. *Europ. auſtr. Afric. bor.*

stellata Lam. 5. A. foliis radicalibus cordato-orbiculatis 3-5partitis, laciniis cuneatis incisis mucronato-dentatis, involucro inciso, sepalis obtusiusculis. *Italia. Gallia. Asia minor.* (A. hortensis L.)

coronaria 6. A. foliis radicalibus ternato-decompositis, laciniis lanceolatis obtusiusculis incisis mucronato-dentatis, involucro multifido sessili vaginante. *Europ. austr. Asia minor.*

pusilla Cand. 7. A. foliis radicalibus ternato-decompositis, laciniis linearibus acutis, involucro sessili apice inciso. *Cyprus.* Labillard.

pavonina Lam. 8. A. foliis radicalibus ternato-3partitis, laciniis cuneatis 3fidis incisis, involucro sessili subintegro, sepalis lanceolatis acutis. *Aquitania. Gallo-provincia.*

decapetala 9. A. foliis radicalibus ternatis, foliolis ovatis obtusis 3lobis, involucro 3partito multifido, laciniis linearibus, sepalis oblongis obtusis. *Brasil. Peru. Chili.* (A. 3lobata Juss.)

parviflora Mx. 10. A. foliis radicalibus 3partitis, laciniis cuneatis apice truncato-crenatis, involucris similibus, sepalis lenis ovali-oblongis. *Amer. bor.* (A. cuneifolia Juss.)

caroliniana Walt. 11. A. foliis radicalibus ternatis, foliolis 3fidis acute dentatis, involucro 3partito, laciniis incisis, petalis 12-15 linearibus. *Carolina. Ad fl. Missuri.* (A. tenella Pursh.)

triternata Vahl. 12. A. foliis radicalibus 3ternatis, foliolis ovatis 3dentatis, involucro multifido, laciniis linearisetaceis, sepalis 10-12 oblongis obtusis. *Monte Video.* (A. fumariaefolia Juss.)

biflora Cand. 13. A. foliis radicalibus ternatis, laciniis linearibus obtusis incisis, involucro sessili multipartito, pedunculis geminis. *Persia?* Mx.

formosa Clark. 14. A. foliis radicalibus crassis 3partitis subrotundis flabelliformibus sub-3lobis acute dentatis, involucro 3partito, laciniis lanceolatis, sepalis late ovatis. *Asia minor.*

apennina 15. A. foliis sub-3ternatis hirsutiusculis, foliolis oblongis inciso-dentatis, involucri foliis ternis ternatis petiolatis. *Anglia. Italia. Graecia. Caucas.*

** *Radice sublignosa.*

coerulea Cand. 16. A. foliis involucri ternis palmato-5fidis, laciniis lineari-lanceolatis inciso-dentatis, sepalis 5 ovalibus. *Sibir.* (A. uralensis Fisch.)

baldensis 17. A. foliis 2ternatis, foliolis abbreviatis cuneatis 3-5fidis, involucri foliis ternis multifidis, petiolis late vaginantibus, caule lanato, sepalis 10 ovalibus. *Alp. Europ. med.* (A. alpina Scop., fragifera Jacq.)

nemorosa 18. A. foliis ternatis, foliolis 3fidis lanceolatis inciso-dentatis, involucri foliis ternis petiolatis similibus, sepalis 6 ellipticis, fructibus villosis.

Europ. Asia et Amer. bor. (A. 5folia L. var. americana. A. Fiſcheriana Cand. var. ſibirica.)

iſopyroides Juſſ. 19. A. foliis 2ternatis, foliolis cuneatis inciſo-3dentatis, involucri foliis petiolatis 3partitis, laciniis lateralibus 2fidis, media 3fida, ſepalis 5 oblongis. *Sibir.* Ex Imao (Altai) miſit Ledebour nomine A. reflexae.

trifolia 20. A. foliis omnibus petiolatis ternis ternatis, foliolis indiviſis ovato-lanceolatis acutis dentatis, ſepalis 5 ellipticis obtuſis. *Europ. med. Amer. bor.* (A. lancifolia Pursh.)

minima Cand. 21. A. foliis involucri petiolatis 3partitis, laciniis ovatis acuminatis extus et ad apicem ſerratis, ſepalis 5 oblongis obtuſis. *Virginia.*

reflexa Steph. W. 22. A foliis omnibus petiolatis ternis ternatis, foliolis indiviſis lanceolatis baſi cuneatis inciſo-ſerratis, ſepalis linearibus obtuſis reflexis. *Sibir.*

ranunculoides 23. A. caule ſubbifloro, foliis involucri ternis ſubpetiolatis 3partito-ternatis, foliolis lanceolatis inaequaliter ſerratis, ſepalis 5, fructibus glabris. *Europ. Sibir.*

Commerſoniana Rich. 24. A. foliis omnibus 3partitis, laciniis multifidis, involucri oppoſitis petiolatis cauleque villoſis, ſepalis 8. *Ad fret. Magell.* (A. multifida γ. Cand.)

*** *Radice fibroſo-faſciculata.*

ſylveſtris 25. A. foliis omnibus petiolatis ternatis ſub-5partitis ſubtus hirſutis, laciniis lanceolatis inciſo-ſerratis, ſepalis 6 ellipticis. *Europ. Aſia boreal.* (Al. alba Juſſ. ochotenſis Fiſch.)

ſibirica 26. A. foliis radicalibus ternatis, foliolis palmatis inciſis ciliatis, involucro 3partito, laciniis lanceolatis, ſepalis 6 ſubrotundis, germinibus glabris. *Sibir. or.*

§. *Diplocalymmata; involucrum univerſale triflorum, partialia 2 uniflora, pedunculus ergo medius nudus praecocius florens, laterales iterum involucrati; caryopſes lanatae vel glabrae.*

virginiana 27. A. foliis involucri univ. ternis ternatis petiolatis, foliolis late ovatis lateralibus 2partitis, medio 3fido, ſepalis 5 ellipticis, fructibus lanatis. *Amer. bor.*

penſylvanica 28. A. foliis involucri univ. ternis ſeſſilibus amplis cuneatis 3fidis, laciniis inciſo-ſerratis, ſepalis obovatis, fructibus villoſis. *Amer. bor. Sibir.* (A. irregularis Lam., aconitifolia Mx.)

dichotoma 29. A. caule ſuperne 2fido, foliis omnibus oppoſitis amplexicaulibus 3fidis inciſo-ſerratis, ſepalis 5 ellipticis, fructibus glabris. *Sibir. Canada.*

mexicana Humb. 30. A. foliis radicalibus ternatis, foliolis rhomboideo-ovatis 3fidis crenato-ſerratis, involucri oppoſitis ſeſſilibus inciſo-dentatis, ſepalis 5, germinibus pubeſcentibus. *Mexico.*

rivularis Buchan. 31. A. foliis omnibus 5partitis, laciniis radicalium ovatis inciso-dentatis, dentibus subaristatis, involucri foliis sessilibus, laciniis pinnatifidis. *Nepal.*

vitifolia Buchan. 32. A. foliis involucri petiolatis obtuse cordatis 5lobis subtus albo-tomentosis, involucris partialibus 3foliis 3floris, germinibus glabris. *Nepal.*

helleborifolia Cand. 33. A. foliis radicalibus digitato-pedatis subcoriaceis glabris, foliolis cuneatis 3fidis serratis, involucri utriusque foliis ternis 3fidis serratis, germinibus glabris. *Chili?* Dombey.

multifida Poir. 34. A. foliis radicalibus bis vel ter 3partitis, lacinulis 3fidis cuneatis, involucrorum foliis ternis breviter petiolatis multifidis, sepalis obtusis. *Ad fretum Magellan.*

4. *Petasodes: pedunculi umbellati uniflori: fructus glaberrimi.*

narcissiflora 35. A. foliis radicalibus palmato-digitatis subpedatis, laciniis sub-3fidis, involucri foliis sessilibus cuneatis 3-5fidis, pedunculis subnumerosis. *Alp. Europ. Sibir. et Amer. bor.*

umbellata 36. A. foliis radicalibus 3partitis, laciniis 3fidis integerrimis, involucri foliis 3partitis, pedunculis paucis. *Asia minor.* (A. fasciculata Vahl.)

2044. PULSATILLA Tourn.

(Involucrum uniflorum.)

alpina Arbr. 1. P. involucro 3phyllo foliisque ternatis supradecompositis villosis, laciniis pinnatifidis inciso-serratis, sepalis 6 patulis. *Alp. Europ. med.* (Anemone alpina et sulfurea L., apiifolia Scop. W., millefoliata Bertol.)

Nuttalliana * 2. P. involucro 3phyllo foliisque ternato-palmatis multifidis sericeo-villosis, laciniis linearibus elongatis, flore erecto, sepalis 6 erecto-conniventibus. *Louisiana. Ad fl. Columbiam orae occ. Amer. bor.* (Clematis hirsutissima Pursh. Anemone ludoviciana Nutt. Nuttalliana Cand.)

davurica * 3. P. foliis ternatis, foliolis ternis, lateralibus sessilibus inaequaliter 3fidis, terminali petiolato 3partito, laciniis linearibus acutis 2-3fidis, sepalis 6 erecto-conniventibus. *Davuria.* (Anemone Fisch. Cand.)

albana * 4. P. foliis 2pinnatifidis, foliolis multipartitis, laciniis oblongo-linearibus, pedunculo involucrum aequante, sepalis erectis apice subreflexis. *Caucas.* (Anemone Stev.)

pratensis Mill. W. 5. P. foliis 2pinnatis hirsutissimis, foliolis multipartitis, laciniis linearibus inciso-dentatis, flore pendulo, sepalis 6 apice reflexis. *Europ.* (Anemone pratensis L., sylvestris Vill.)

vulgaris Mill. W. 6. P. foliis 2pinnatis hirsutis, foliolis multipartitis, laciniis linearibus subintegerrimis, flore subnu-

tante, sepalis 6 erecto-patulis. *Europ. Sibir.* (Anemone Pulsatilla L., rubra Lam., intermedia Hopp. Schult.)

patens Mill. W. 7. P. foliis serotinis ternato-digitatis rigidiusculis, foliolis latiusculis 3fidis, flore erecto patente. *Europ. Sibir.* (Anemone L.)

Halleri W. 8. P. foliis pinnatis sericeo-villosissimis, foliolis 3partitis, laciniis lanceolato-linearibus acuminatis, flore erectiusculo. *Alp. Europ. austr.* (Anemone All. Vill.)

vernalis Mill. W. 9. P. involucro multifido villosissimo, laciniis linearibus integerrimis, foliis pinnatis subhirsutis, foliolis sessilibus ovato-oblongis obtuse dentatis, flore erecto patente. *Europ.* (Anemone vernalis L., sulfurea All.)

cernua * 10. P. involucro villoso, laciniis elongatis, foliis pinnatis subtomentosis, foliolis pinnatifidis, laciniis oblongis incisis, flore subcernuo. *Japon.* (Anemone Thunb.)

africana Herm. 11. P. involucro flori proximo, foliis ternatis rigidis glabris, foliolis ovato-acuminatis inciso-dentatis basi cuneatis, sepalis numerosis. *C. B. S.* (Atragene capensis L. Clematis Poir.)

tenuifolia * 12. P. involucro 3phyllo 2floro, foliolis oblongis incisis villosis, foliis radicalibus 3ternatis rigidis glabris, foliolis multipartitis, laciniis linearifiliformibus, sepalis 7-9 oblongis obtusis. *C. B. S.* (Atragene L. fil. Clematis Poir. Anemone Cand.)

2045. CLEMATIS.

* *Pedunculis unifloris,*

† *involucratis, involucro bifido.*

cirrhosa 1. Cl. scandens, foliis sempervirentibus simplicibus ternatisque ovato-oblongis obtusis crenatis, sepalis extus sericeo-villosis. *Hispan. Sicil. Graec. Asia minor. Afric. bor.* (Atragene cirrhosa et Cl. balearica Pers.)

semitriloba Lag. 2. Cl. scandens, foliis simplicibus cordatis subtrilobis profunde serratis, sepalis extus tomentosis. *Hispania. Corsica.* (Cl. polymorpha *a.* Viv.)

balearica Rich. 3. Cl. scandens, foliis sempervirentibus ternatis profunde incisis, medio 3partito, sepalis extus pubescentibus intus maculatis. *Minorca. Corsica.* (Cl. calycina Ait. Atragene Pers. Cl. polymorpha *γ.* Viv.)

nepalensis Cand. 4. Cl. scandens, foliis ternatis, foliolis oblongis acuminatis basi subdentatis, lateralibus subsessilibus, terminali basi 3nervio, sepalis extus villosis. *Emodi montes.*

†† *Pedunculis nudis.*

α. *Foliis simplicibus, caule herbaceo erecto.*

integrifolia 5. Cl. foliis ovato-oblongis acutiusculis nervosis ciliatis, floribus nutantibus coriaceis. *Europ. med. austr. Caucas. Sibir.*

odoroleuca Ait. 6. Cl. foliis ovatis obtusis, junioribus sericeis, floribus suberectis. *Amer. bor.* (Cl. sericea Mx.)

ovata Pursh. 7. Cl. foliis ovatis acutis glabris utrinque venoso-reticulatis, infimis subcordatis. *Carolina.*

gentianoides Cand. 8. Cl. foliis ovatis acutis coriaceis glabris basi 3nerviis apice subdentatis, floribus erectis dioecis, sepalis membranaceis. *Nov. Holl. Terra Diemen.*

β. *Foliis ternatis: scandentes.*

αα. *Fructibus caudatis plumosis.*

montana Buchan. 9. Cl. foliis fasciculatis, foliolis oblongis utrinque attenuatis serratis pubescentibus, sepalis obovatis. *Emodi montes.*

comosa Cand. 10. Cl. foliis villosis, foliolis oblongis acuminatis 3nerviis integerrimis, pedunculis axillaribus superne confertis. *Ind. or.*

japonica Thb. 11. Cl. foliis villosis oblongis acuminatis aequaliter serratis, sepalis conniventibus. *Japon.*

diversifolia Cand. 12. Cl. foliis glabris ternato-3partitis integrisque, foliolis lanceolatis acutis integerrimis, lateralibus confluentibus, medio petiolato, floribus erectis, sepalis oblongo-lanceolatis acuminatis. *Patria?*

Plukenetii Cand. 13. Cl. foliis glabris, foliolis obovatis obtusis mucronatis integerrimis, floribus erectis dioecis. *Florida?*

davurica Pers. 14. Cl. foliis glabris, foliolis ovatis basi obliquis mucronatis integerrimis, floribus nutantibus ♂. *Davuria.*

javana Cand. 15. Cl. pedunculis sub-1floris, foliis pubescentibus subbiternatis, foliolis subcordato-lanceolatis acuminatis subdentatis integris 3fidisve. *Java.*

bracanensis Humb. 16. Cl. pedunculis sub-1floris, foliis pubescentibus, foliolis ovato-oblongis acuminatis grosse serratis. *Cuba.*

Noronhiana Cand. 17. Cl. pedunculis sub-1floris, foliis pilosis, foliolis ovato-lanceolatis acuminatis serratis 3nerviis, sepalis villosis. *Java.*

ββ. *Cauda fructuum abbreviata nuda.*

Viticella 18. Cl. foliis integris ternatis 2ternatisque, foliolis ellipticis mucronatis integerrimis, pedunculis nutantibus, sepalis obovatis patentibus. *Europ. med. et austr. Asia minor.* (Cl. baccata Pers.)

crispa 19. Cl. foliis integris 3lobis ternatisque glabris ovali-lanceolatis acutissimis, sepalis undulato-crispis apice reflexis. *Amer. bor.*

florida Thb. 20. Cl. foliis ternato-decompositis, foliolis ovatis acutis integerrimis, sepalis oblongo-lanceolatis acuminatis. *Japon.*

campaniflora Brot. 21. Cl. foliis 2ternato-decompositis, foliolis integris 3lobisque ovato-lanceolatis, sepalis undulatis apice dilatatis. *Lusitan.*

pauciflora Cand. 22. Cl. foliis ternato-decompositis, foliolis integris 3partitisque ovatis mucronatis integerrimis, sepalis ellipticis apice subdilatatis. *Patria?*

γ. Foliis pinnatis aut decompositis; scandentes s. erectae.

linearifolia Cand. 23. Cl. foliis ternato-2pinnatis, foliolis linearibus elongatis acuminatis glabris, flore erecto, sepalis lanceolatis acutis margine lanatis. *Carolin. austr.*

angustifolia Jacq. 24. Cl. foliis pinnatis, foliolis lanceolatis acuminatis integris 3fidisque, sepalis obtusis margine lanatis. *Carniolia. Sibir.* (Cl. sibirica Lam., hexapetala Pall.)

Walteri Pursh. 25. Cl. foliis pinnatis, foliolis divaricatis linearilanceolatis acutis integerrimis subtus glaucis. *Carolina.*

clitorioides Cand. 26. Cl. foliis pinnato-ternatis glabris, foliolis oblongis acutis integerrimis, sepalis acutis glabris. *Nov. Holl.*

reticulata Walt. 27. Cl. foliis pinnatis coriaceis reticulato-venosis glabris, foliolis ovalibus obtusis integris 3lobisque, sepalis conniventibus. *Carolin.*

cylindrica Sims. 28. Cl. foliis pinnatis subbijugis glabris, foliolis ovato-oblongis acutis integerrimis, floribus cernuis, sepalis acuminatis apice reflexis. *Amer. bor.* (Cl. crispa Lam. Viorna Andr. divaricata Jacq.)

villosa Cand. 29. Cl. folii- pinnatis villosis, foliolis oblongis apice obtuse dentatis, medio 3fido, caule erecto villoso. *Ind. or.?*

scabiosaefolia Cand. 30. Cl. foliis pinnatis pubescentibus, foliolis 3partitis incisis, laciniis oblongis acutis basi attenuatis, caule erecto villosiusculo. *Ind. or.?*

Viorna 31. Cl. foliis 2pinnatis glabris, foliolis ternatis ovatis integris 2-3fidisque, floribus nutantibus conniventibus. *Virgin. Carolin.*

** *Pedunculis pauciforis.*

chinensis Retz. 32. Cl. foliis pinnatis 2jugis, foliolis ovato-lanceolatis glabris, pedunculis oppositis 3-5floris, floribus parvis, caule 4gono debili. *China.* Bladh.

terniflora Cand. 33. Cl. foliis pinnatis sub-3jugis, foliolis ovatis obtusis mucronatis integerrimis, pedunculis 3floris. *China.*

brevicaeflora Cand. 34. Cl. foliis pinnatis 2jugis utrinque villosis, foliolis cordatis acutis serratis reticulato-venosis, pedunculis oppositis folio brevioribus 3floris brac-

teatis, ſepalis oblongis erectis extus villoſis. *Nepal.*

peruviana Cand. 35. Cl. foliis 2pinnatis villoſis, foliolis cordato-ovatis ſub-3fido-inciſis, pedunculis folio longioribus paucifloris bracteoſis, floribus polygamis patentiſſimis. *Peru.*

montevidenſis * 36. Cl. foliis ternato-pinnatis glabris, foliolis divaricatis ovato-lanceolatis acuminatis 3fidis, pedunculis paucifloris patentiſſimis folia aequantibus, ſepalis patentibus lanceolatis villoſis. *Monte Video.* Sello.

dominica Lam. 37. Cl. foliis ternatis coriaceis ſubtus pubeſcentibus, foliolis ſubcordato-ovatis ſubintegerrimis, pedunculis 3floris folio longioribus, floribus parvis patentibus extus ferrugineis. *Hiſpaniola.* *Cuba.* (Atragene polygama Jacq.)

brachiata Ker. 38. Cl. foliis quinato-pinnatis ſupra nitidis, foliolis ovato-oblongis ſubdentatis, pedunculis paucifloris, floribus nutantibus patentiſſimis. *C. B. S.* Niven.

grandiflora Cand. 39. Cl. foliis pinnatis glabris ſubcoriaceis, foliolis ovato-lanceolatis acuminatis ſubtus venoſo-reticulatis nervoſis, pedunculis 3floris folio brevioribus, floribus maximis villoſis. *Sierra Leone.* Afzel.

Lechenaultiana Cand. 40. Cl. foliis ternatis ſericeis, foliolis ovato-lanceolatis ſerratis 5nerviis, pedunculis 3floris folio brevioribus. *Java.*

mauritiana Lam. 41. Cl. foliis ternatis glabris, foliolis cordato-ovatis acutis mucronato-ſerratis, pedunculis 3floris folia ſubaequantibus, ſepalis ellipticis mucronatis nervoſis. *Inſ. Mascaren. Madagascar.*

*** *Pedunculis multifloris corymboſo-paniculatis.*

† *Floribus hermaphroditis.*

erecta 42. Cl. foliis pinnatis glabris, foliolis ovato-lanceolatis integerrimis, caule erectiusculo, floribus umbellato-paniculatis. *Europ. med. Sibir.* (Cl. corymboſa Poir.)

Flammula 43. Cl. foliis pinnatis glabris, foliolis ovali-oblongis obtuſiusculis integris 3lobisque, caule ſcandente. *Europ. auſtr. Caucaſ. Afric. bor.* (Cl. maritima L.? Lam, fragrans Tenor., rubella Perſ.)

Maſſoniana Cand. 44. Cl. foliis pinnatis glabris, foliolis ovatis inciſo-dentatis ſublobatis glauceſcentibus, panicula trichotoma ampla. *Afric. auſtr.*

orientalis 45. Cl. foliis pinnatis glabris glaucis, foliolis lanceolatis acutis 3fido-dentatis baſi cuneatis, pedunculis bis 3fidis, ſepalis patulis intus villoſis. *Aſia minor. Caucaſ.*

glauca W. 46. Cl. foliis ternato-pinnatis glaucis, foliolis ovatis obtuſis mucronatis ſublobatis, pedunculis bis 3fidis, ſepalis intus glabris margine tomentoſis. *Sibir. auſtr.*

paniculata Thb. 47. Cl. foliis pinnatis glabris, foliolis ovatis acutiusculis integerrimis 3–5nerviis, floribus corymboso-paniculatis, sepalis lanceolatis obtusiusculis nervosis, germinibus villosissimis brevissime caudatis. *Japon.* (Ex horto kew. 1790.)

triloba Roth. 48. Cl. foliis ternatis pubescentibus, foliolis ovato-acuminatis integerrimis sub-3fidis, petiolis pedunculisque corymbosis tomentosis, floribus patentibus extus sericeis. *Ind. or.*

minor Lour. 49. Cl. foliis pinnatis glabris, foliolis ovatis obtusiusculis 3nerviis integerrimis, pedunculis axillaribus multifloris, floribus minimis 4gynis. *China austr.*

brevicaudata Cand. 50. Cl. foliis pinnatis glabris, foliolis ovato-lanceolatis acuminatis grosse serratis, pedunculis patentibus folio brevioribus conferte paniculatis. *China bor.*

heracleifolia Cand. 51. Cl. foliis pinnatis coriaceis glabris, foliolis ovato-lanceolatis incisis mucronato-dentatis, ultimis 3lobis, pedunculis erectis cinereo-villosis. *China bor.*

gouriana Roxb. 52. Cl. foliis pinnatis glabris, foliolis cordato-ovatis acuminatis subdentatis, pedunculis trichotomo-paniculatis pubescentibus folio sublongioribus. *Ind. or.*

Vitalba 53. Cl. foliis pinnatis glabris, foliolis subcordato-ovatis acuminatis inciso-dentatis, pedunculis multifloris folia aequantibus. *Europ. med. et austr. Asia minor.*

Buchanani Cand. 54. Cl. foliis pinnatis subtus villosis, foliolis subcordatis crenatis, pedunculis multifloris folia aequantibus. *Nepal.*

connata Cand. 55. Cl. foliis pinnatis glabris, foliolis ovato-lanceolatis acuminatis grosse serratis, petiolis basi dilatatis connatis. *Nepal.*

† *loasaefolia* Cand. 56. Cl. foliis utrinque villosissimis, inferioribus cordatis palmatis, superioribus ternatis, foliolis subcordatis 3fidis. *Nepal.*

† *indivisa* W. 57. Cl. foliis ternatis coriaceis glabris, foliolis ovatis mucronatis integerrimis, pedunculis axillaribus paniculatis. *Nov. Zeeland.* (Cl. integrifolia Forst.)

hedysarifolia Cand. 58. Cl. foliis ternatis coriaceis glabris, foliolis oblongo-lanceolatis acuminatis basi attenuatis 3nerviis, panicula elongata pendula trichotoma. *India transganget.*

acuminata Cand. 59. Cl. foliis ternatis glabris, foliolis ovato-lanceolatis longe acuminatis medio subserratis 3–5-nerviis glabris, pedunculis trichotomo-paniculatis. *Nepal.*

apiifolia Cand. 60. Cl. foliis ternatis glabris, foliolis ovatis acuminatis inciso-dentatis subtus nervosis, pedunculis paniculatis folia aequantibus, floribus 6gynis. *Japon.*

biternata Cand. 61. Cl. foliis 2ternatis glabris, foliolis subcordatis acutis, pedunculis 3fidis corymbosis folio brevio-

ribus, floribus 6gynis. *Japon. Cochinchina. Timor.* (Cl. virginica Thunb., virginiana Lour.)

†*trifoliata* Thb. 62. Cl. foliis ternato-decompositis glabris, foliolis ovatis obtusis repando-dentatis. *Japon.*

†† *Floribus dioecis.*

dioeca 63. Cl. foliis ternatis glabris, foliolis subcordato-ovatis acuminatis triplinerviis integerrimis. *Ind. occ.* (Cl. glabra Cand.)

brasiliana Cand. 64. Cl. foliis simplicibus ternatis pinnatisque pubescentibus, foliolis ovatis acutis 5nerviis subdentatis, caule tereti, staminibus sepala aequantibus. *Brasil.*

virginiana 65. Cl. foliis ternatis glabris, foliolis subcordato-ovatis inciso-dentatis lobatisque, corymbis dichotomis paucifloris, staminibus calyce brevioribus. *Amer. bor.*

Catesbiana Pursh. 66. Cl. foliis 2ternatis subtus pubescentibus, foliolis subcordatis 3lobis, paniculis divaricatis, staminibus calyce brevioribus. *Carolin. austr.*

americana Mill. 67. Cl. foliis ternato-pinnatis glabris, foliolis cordato-ovatis acuminatis subintegerrimis 5nerviis, paniculis amplis. *Amer. trop.* (Cl. Guadalupae Perf.)

Loureiri Cand. 68. Cl. foliis ternatis, foliolis ovatis acutis integerrimis 5nerviis, paniculis axillaribus, fructibus 3gonis. *Cochinchina.* (Cl. dioeca Lour.)

sericea Humb. 69. Cl. foliis ternato-pinnatis pubescentibus subtus sericeis, foliolis subovatis acuminatis grosse serratis subtus sericeo-villosis, floribus umbellato-racemosis. *Quito.*

holosericea Pursh. 70. Cl. foliis ternatis utrinque holosericeis, foliolis oblongo-lanceolatis integerrimis, corymbis dichotomis paucifloris, sepalis linearibus stamina superantibus. *Carolina.*

bonariensis Juss. Cand. 71. Cl. foliis ternatis glabriusculis, foliolis ovato-lanceolatis integerrimis, pedunculis paniculatis pubescentibus petiolo brevioribus, floribus polygamis. *Buenos Ayres.*

glycinoides Cand. 72. Cl. foliis ternatis glabris, foliolis ovato-lanceolatis acuminatis integerrimis basi 3nerviis, pedunculis folio brevioribus, staminibus calyce brevioribus. *Nov. Holl.*

hexasepala Cand. 73. Cl. foliis ternatis glabris coriaceis, foliolis cordato-ovatis crenatis venoso-reticulatis, pedunculis paniculatis folia superantibus, floribus 6sepalis. *Nov. Zeeland.* (Cl. hexapetala Forst.)

coriacea Cand. 74. Cl. foliis ternatis glabris coriaceis, foliolis cordato-ovatis inciso-crenatis, pedunculis corymboso-paniculatis folio brevioribus, floribus 4sepalis. *Nov. Holl.*

stenosepala R. Br. 75. Cl. foliis ternatis glabris coriaceis, foliolis cordatis acuminatis 3nerviis subdentatis, pedunculis trichotomis, sepalis linearibus obtusis, fructibus pubescentibus. *Nov. Holl.*

microphylla Cand. 76. Cl. foliis ternatis glabris coriaceis, foliolis obovato-oblongis integerrimis 1nerviis, fructibus glabris. *Inf. ad Nov. Holl.*

ariſtata R. Br. 77. Cl. foliis ternatis, foliolis ſubcordato-ovatis acutis groſſe dentatis 3nerviis, ſepalis oblongis, antheris apice ariſtatis. *Nov. Holl.*

cordata Pursh. 78. Cl. foliis pinnatis 2jugis, foliolis cordatis acuminatis lobatis inciſo-dentatis, dentibus mucronatis, racemis compoſitis elongatis multifloris, ſepalis ſtamina aequantibus. *Virginia.*

caripenſis Kunth. 79. Cl. foliis pinnatis 2jugis pubeſcentibus, foliolis ovatis acuminatis integerrimis, floribus paniculatis ſericeis. *Cumana.* (Cl. caracaſana Bonpl. Cand. ſyſt.)

2046. THALICTRUM.

1. *Genuina; foliis decompoſitis, radice fibroſa vel repente, ſepalis anguſtis deciduis.*

* *Fructibus triquetris ſtipitatis.*

aquilegifolium 1. Th. foliolis obtuſe lobatis glabris, petiolis baſi ſtipulatis, floribus corymboſo-paniculatis erectis, fructibus alatis pendulis. *Europ. Sibir.* (Th. atropurpureum Jacq. formoſum Sims.)

Chelidonii Cand. 2. Th. petiolis exſtipulatis, foliorum axillis gemmiferis, floribus laxe paniculatis, fructibus pendulis. *Nepal.*

contortum 3. Th. foliolis parvis ſubrotundis obtuſis 3lobis glaucis, petiolis exſtipulatis, caule ſubancipiti, floribus erectis, fructibus pendulis. *Sibir. or.*

** *Fructibus inflatis ſtipitatis, floribus polygamis.*

clavatum Cand. 4. Th. foliolis ſubcordato-ſubrotundis obtuſe lobatis ſubtus glaucis, petiolis exſtipulatis, ſepalis ſubrotundis ſtamina ſubſuperantibus, filamentis clavatis, fructibus compreſſis mucronatis. *Amer. bor.* Michaux.

podocarpon Humb. 5. Th. foliolis ſubcordato-ſubrotundis glabris ſubtus glaucis dentato-lobatis, petiolis exſtipulatis, paniculae ramis divaricatis, antheris elongatis apice ariſtatis, fructibus ſtriatis cuſpidatis. *Nov. Granat.*

longiſtylum Cand. 6. Th. foliolis cordatis integris dentatisque, venis ſubtus pubeſcentibus, petiolis baſi ſtipulatis, antheris apice ariſtatis ſepala ſuperantibus, ſtylis elongatis filiformibus. *Amer. auſtr.*

mexicanum Cand. 7. Th. foliolis cordato-ſubrotundis lobato-dentatis, antheris longe ariſtatis, ſtylis elongatis. *Mexico.* (Th. peltatum Cand. cordifolium W. herb.)

rytidocarpon Cand. 8. Th. foliolis ſubtus pubeſcentibus, petiolis exſtipulatis, fructibus rugoſis. *Amer. auſtr.*

**** Fructibus ſolidis oblongis utrinque attenuatis ſtriatis ſeſſilibus.*

† *Floribus dioecis ſ. polygamis.*

corynellum Cand. 9. Th. foliolis obtuſe 3lobis ſubtus glaucis venisque pubeſcentibus, panicula terminali, floribus dioecis, filamentis clavatis. *Amer. bor.* (Th. Cornuti L.?)

polygamum Mühlenb. 10. Th. foliolis obtuſe lobatis ſubtus glabris glaucis, pedunculis terminalibus corymboſis, floribus polygamis, filamentis filiformibus, ſtylis elongatis filiformibus. *Penſylvan.*

revolutum Cand. 11. Th. foliolis ovatis 3dentatis ſubtus revolutis pubeſcentibus, floribus dioecis, filamentis filiformibus. *Amer. bor.* (Th. pubeſcens Pursh.)

dioecum 12. Th. foliolis ſubreniformibus groſſe crenatis obtuſe lobatis glabris, ♀ ſubcordatis, ♂ baſi truncatis, pedunculis axillaribus folio brevioribus, floribus dioecis, filamentis filiformibus. *Amer. bor.* (Th. laevigatum Mx.)

carolinianum Boſc. Cand. 13. Th. foliolis ellipticis integris obtuſeque dentatis ſubtus glaucis glabriusculis, panicula terminali, floribus dioecis, filamentis filiformibus. *Amer. bor.* (Th. rugoſum Pursh.)

purpuraſcens 14. Th. foliolis orbiculatis groſſe dentatis glabris ſubtus glaucis, panicula contracta ſubaphylla, floribus monoecis dioecisque, filamentis filiformibus cauleque coloratis. *Amer. bor.*

†*ſolioloſum* Cand. 15. Th. foliolis orbiculatis obtuſe 3dentatis, panicula corymboſa, floribus erectis, filamentis filiformibus, caule tereti laevi. *Nepal.*

†† *Floribus hermaphroditis,*

α. erectis.

petaloideum 16. Th. foliolis obovatis glabris integris 3lobisque, caule ſimplici ſuperne nudo, floribus corymboſis, ſepalis rotundatis, filamentis ſubclavatis. *Sibir. auſtr. Mongolia.* (Th. ſtamineum L. ſuppl.)

†*ſaniculaeforme* Cand. 17. Th caule teretiusculo ramoſo, floribus paucis paniculatis, pedunculis rigidis divaricatis, ſepalis reflexis, fructibus ſtylo elongato acuminatis. *Nepal.*

acutilobum Cand. 18. Th. foliolis parvis ovatis 3–5dentatis acutiusculis viſcidulo-pubeſcentibus, antheris mucronatis. *Sibir.*

divergens Link. 19. Th. foliolis ovato-oblongis ſubtus pubeſcentibus obtuſe 3lobis, ramis petiolisque divaricatis, paniculae ramis patentiſſimis. *Sibir.* (Th. divaricatum pug. 1.)

Schweiggeri * 20. Th. foliolis ovatis ſubcuneatis multifidis acute dentatis, petiolis baſi ſtipulatis, caule ſtricto ſulcato, filamentis capillaribus elongatis, antheris mucronatis. *Patria?*

calabricum * 21. Th. foliolis ſubrotundis obtuſe lobatis ſubtus glauceſcentibus, panicula ſubracemoſa contracta

terminali, antheris elongatis, fructibus ſulcatis baſi attenuatis ſtylo coronatis. *Calabria. Sicil.*

elatum Jacq. 22. Th. foliolis ſubcordato-ovatis obtuſe dentatis utrinque glabris viridibus, panicula diffuſa, fructibus ovato-oblongis ſulcatis oblique roſtratis, caule elato. *Germania. Dania. Hungar.* (Th. majus Wallr.)

ambiguum Schleich. 23. Th. foliolis ſubcordatis acute lobatis dentatisque ſubtus glaucis venoſis, panicula ſtricta ramoſiſſima, fructibus ovato-oblongis ſulcatis oblique roſtratis, caule angulato elato. *Helvet.*

ſaxatile Cand. 24. Th. foliolis ſubovatis baſi cuneatis 3fidis acute dentatis ſubtus glaucis, fructibus utrinque attenuatis. *Ital. ſuper. Helvet.*

trigynum Fiſch. 25. Th. foliolis ovato-ſubrotundis acutiusculis integris 3dentatisque ſubtus venoſis, petiolis baſi ſtipulato-auriculatis, panicula ramoſiſſima, antheris apice uncinato-mucronatis, fructibus oblongis apice oblique roſtellatis. *Sibir.*

medium Jacq. 26. Th. foliolis oblongis baſi cuneatis acute 3fidis ſubtus glauceſcentibus, ſummis indiviſis lanceolatis, panicula ſubfolioſa, fructibus ovato-oblongis ſulcatis oblique roſtratis. *Europ. med. Tauria. Sibir.* (Th. diffuſum Schrad. concinnum W.)

flavum 27. Th. foliolis ovato-oblongis 3fidis acutis ſubtus glauceſcentibus, petiolis baſi vaginantibus, caule ſulcato, panicula corymboſa, fructibus ovato-ſubrotundis ſubmuticis. *Europ. Sibir.* (Th. vaginatum Desf., nigricans Jacq., rugoſum Poir.)

Bauhini Crantz. 28. Th. foliolis inferioribus lanceolato-linearibus, ſuperioribus linearibus anguſtiſſimis revolutis, ultimo ſeſſili, caule ſimpliciſſimo angulato, panicula congeſta, fructibus ovato-oblongis muticis. *Europ.* (Th. anguſtifolium fl. hal. et al.)

lucidum Jacq. 29. Th. foliolis lanceolatis vel linearibus ſubrevolutis nitidis, ultimo 3partito petiolato, caule ſimplici angulato, panicula patula, fructibus ovato-oblongis roſtratis. *Germania auſtr. Italia. Gallia. Hiſpania.* (Th. anguſtifolium Jacq., laſerpitiifolium W.)

galioides Neſtl. 30. Th. foliis ſubſimpliciter compoſitis, ſuperioribus faſciculatis, foliolis filiformibus, caule ſtricto teretiusculo, panicula ſtricta, fructibus lineari-oblongis muticis. *Alſatia.*

divaricatum W. 31. Th. foliis ſeſſilibus baſi vaginantibus, foliolis linearibus anguſtiſſimis, caule ſtriato ramoſo, ramis divaricatis, panicula diffuſa. *Patria?*

rosmarinifolium Nocett. 32. Th. foliis ſupradecompoſitis, foliolis lanceolatis acutis integerrimis ſupra opacis ſubtus glaucis, panicula diffuſa. *Italia?*

Thunbergii Cand. 33. Th. foliolis ſubcordato-ovatis 3-5fidis glauceſcentibus, caule tereti ramoſo, paniculis axillaribus, fructibus ſubrotundis ſubmuticis. *Japon.* (Th. flavum Thunb.)

simplex 34. Th. foliis ſubſimpliciter compoſitis, foliolis oblongo-linearibus obtuſiusculis 3fidis ſubtus glauceſcentibus, caule ſimplici ſubangulato, racemis axillaribus terminalibusque paucifloris, fructibus ovato-oblongis ſulcatis oblique mucronatis. *Scandinavia. Delphinatus. Helvetia. Ital. ſuper.* (Th. tenuifolium Sw.)

cinereum Desf. 35. Th. foliolis oblongis acute dentatis baſi attenuatis ſubtus venoſo-reticulatis, caule tereti, panicula ramoſiſſima, fructibus acuminatis. *Patria?*

rugoſum Ait. 36. Th. foliolis ſubcordato-oblongis apice ſub-3dentatis ſupra rugoſis nitidis ſubtus reticulatis glaucis, caule tereti, panicula ſtricta compoſita, fructibus ovato-oblongis ſulcatis mucronatis. *Amer. bor.* (Th. discolor W.)

glaucum Desf. 37. Th. foliolis ſubcordato-oblongis obtuſe 3dentatis utrinque glaucis, caule tereti glauco-pruinoſo, panicula ſtricta conferta. *Europ. auſtr.* (Th. ſpecioſum Poir.)

denſiflorum Humb. 38. Th. foliis pinnatis glabris, foliolis inferioribus ternatis, ſuperioribus ſimplicibus obovatis 3-5fidis ſubtus glauceſcentibus, floribus capitato-glomeratis. *Mexico.*

β. Floribus cernuis, nutantibus.

alpinum 39. Th. foliolis obovatis obtuſe 3lobis utrinque glaberrimis, caule ſimpliciſſimo humili paucifloro, antheris ariſtatis. *Alp. totius Europ. Sibir. Amer. boreal.*

foetidum 40. Th. foliolis ovatis ſub-3fidis irregulariter obtuſe dentatis cauleque ſimplici viſcido-pubeſcentibus, panicula patente, antheris elongatis cuſpidatis. *Alp. Europ. med. Sibir.* (Th. ſtyloideum L. ſuppl., ſaxatile Vill.)

pubeſcens Cand. 41. Th. foliolis ovatis ſub-3fidis acute dentatis viſcido-ſubpubeſcentibus, caule ſuperne glabro ramoſo, panicula diffuſa, antheris apiculatis. *Alp. grai. pennin. Gall. occ. auſtr.* (Th. Cornuti Poir.)

ſquarroſum Steph. W. 42. Th. foliolis ovatis 3fidis glabris, petiolis baſi dilatatis auriculatis, caule ramoſo, paniculae ramis patentibus, antheris apiculatis, fructibus oblongo-linearibus mucronatis. *Sibir.*

ſibiricum 43. Th. foliolis ſubimbricatis ovatis inciſo-dentatis glabris, radice repente, caule aſcendente, antheris elongatis apiculatis, fructibus ovatis mucronatis. *Sibir.*

minus 44. Th. foliolis ſubcordato-ſubrotundis 3fidis dentatis ſubtus glaucis, caule flexuoſo pruinoſo, paniculа diffuſa, fructibus oblongis utrinque contractis. *Europ. Sibir.*

majus Jacq. 45. Th. foliolis ſubcordato-late ovatis 3fidis ſubtus glaucis, caule glabro elato, panicula diffuſa folioſa, antheris cuſpidatis, fructibus ovato-oblongis oblique mucronatis. *German. med. et auſtr. Anglia. Gallia.*

nutans Desf. 46. Th. foliolis ſubcuneatis 3fidis ſubtus glaucis, dentibus acuminatis, foliolis ſummis cuſpidatis, panicula diffuſa, fructibus ovato-oblongis muticis. *Alp. pennin.* (Th. acuminatum pug. 2.)

glaucescens Cand. 47. Th. foliolis ovatis 3dentatis cauleque ſtricto glaucis, petiolis baſi ſtipulatis, panicula laxa elongata, fructibus ovatis mucronatis. *Ruſſia?*

2. *Deſciſcentia.*

* *Sepalis petaloideis ſtamina ſuperantibus, foliis compoſitis, radice tuberoſa.*

tuberoſum 48. Th. foliolis ſubrotundis obtuſis 3lobis glabris, petiolis baſi alatis, floribus corymboſo-umbellatis, ſepalis oblongis. *Hiſpania.*

anemonoides Mx. 49. Th. foliis radicalibus 2ternatis, foliolis ſubrotundis obtuſe 3dentatis, floralibus verticillatis petiolatis ſimplicibus majoribus ſubcordatis, caule ſimplici debili, floribus umbellatis, fructibus linearibus oblique mucronatis. *Amer. bor.* (Anemone thalictroides L.)

** *Foliis ſimplicibus.*

† *carolinianum* Walt. 50. Th. foliis radicalibus palmatis longe petiolatis, ſcapo 1floro, ſepalis 5, radice tuberoſa. *Carolina.* (Anemone Walteri Pursh.)

palmatum Walt. Mühlb. 51. Th. foliis 5lobis ſerratis, floribus corymboſis, filamentis clavatis. *Carolina.* (Th. ranunculinum W.)

rotundifolium Cand. 52. Th. foliis radicalibus petiolatis reniformi-orbiculatis ſinuato-crenatis multinerviis, ſcapo ſuperne ramoſo corymboſo, fructibus oblongis mucronatis. *Nepal.*

2047. GYROSTEMON Desf.

ramuloſus Desf. 1. G. foliis linearibus. *Nov. Holl. occ.*
oleifolius Desf. 2. G. foliis obovatis. *Nov. Holl. occ.*

CLASSIS XIV.

DIDYNAMIA.

GYMNOSPERMIA.

Labiatae: Cor. 2labiata, germina 4 gynobaſi inſerta ſtyli lateribus affixa. Caryopſes 2-4, vel nuculae.

1. *Calyx 2-labiatus.*

2048. *Lumnitzera* Jacq. Cal. $\frac{1}{4}$, lab. ſuper. ovato incumbente. Cor. $\frac{3,4}{1}$. Stam. declinata edentula.

2049. *Ocimum.* Cal. $\frac{1}{4}$, lab. ſuper. ſubrotundo incumbente. Cor. $\frac{4}{1}$, lab. infer. majore porrecto. Stam. declinata, interiora baſi proceſſu inſtructa.

2050. *Plectranthus* Herit. Cal. $\frac{1}{3,4}$, fructifer baſi gibbus. Cor. $\frac{3,4}{1}$, lab. infer. integro porrecto ſubconcavo. Stam. declinata edentula.

2051. *Prunella.* Cal. $\frac{3}{2}$, lab. ſuper. plano incumbente. Cor. $\frac{1}{3}$. Filamenta aſcendentia apice bidentata. Antherae didymae.

2052. *Meliſſa.* Cal. $\frac{3}{2}$, lab. ſuper. planiuſculo. Cor. $\frac{1}{3}$, lab. ſup. fornicato 2fido ſ. emarginato. Stam. aſcendentia.

2053. *Dracocephalum.* Cal. $\frac{3}{2}$ ſ. 5dentatus. Cor. faux inflata.

2054. *Praſium.* Cal. $\frac{3}{2}$. Cor. $\frac{1}{3}$, lab. ſuper. emarginato, inferioris lobo medio maximo. Caryopſes drupaceae.

2055. *Phryma.* Cal. $\frac{3}{2}$, fructifer reflexus, dentibus lab. ſup. elongatis ſetaceis. Cor. $\frac{1}{3}$, lab. ſuper. abbreviato, inf. porrecto. Caryopſis ſolitaria.

2056. *Cleonia.* Cal. $\frac{3}{2}$, lab. ſuper. planiuſculo. Cor. $\frac{2}{3}$, labii inferioris lobo medio emarginato. Filamenta apice bifurca. Stigma 4fidum. Caryopſes 4.

2057. *Trichoſtemma.* Cal. $\frac{3}{2}$, lab. infer. duplo majori. Cor. $\frac{3}{1}$, lab. infer. falcato. Filamenta longiſſima incurva.

2058. *Thymus.* Cal. $\frac{3}{2}$, fauce villis clauſa. Cor. $\frac{3}{1}$. Stam. aſcendentia.

2059. *Gardoquia* R. et P. Cal. $\frac{3}{2}$, fauce nuda. Cor. $\frac{3}{1}$. Stam. diſtantia.

2060. *Thymbra.* Cal. $\frac{3}{2}$. Cor. $\frac{3}{1}$, lobis ſubaequalibus. Stylus bifidus.

2061. *Lepechinia* W. Cal. $\frac{3}{2}$. Cor. $\frac{3}{1}$ calyci aequalis. Stam. diſtantia.

2062. *Clinopodium.* Cal. $\frac{3}{5}$, dentibus ariſtatis, involucris ſetaceis. Cor. $\frac{3}{5}$, lab. ſuper. obcordato.

2063. *Melittis.* Cal. $\frac{1}{2}$. Cor. $\frac{1}{2}$. Antherae 2loculares, loculis ſuperiorum ſuper, inferiorum juxta ſe poſitis.

2064. *Scutellaria.* Cal. labia indiviſa, fructiferi clauſa, ſuperius operculatum. Cor. ſubperſonata.

2065. *Chilodia* R. Br. Cal. 2bracteatus $\frac{1}{2}$. Cor. $\frac{1}{3}$, lobo medio labii inf. emarginato.

2066. *Proſtanthera* Labill. Cal. labia indiviſa, fructiferi clauſa. Cor. $\frac{3}{5}$, lab. inf. expanſo, lobo medio 2lobo. Stam. declinata. Antherae calcaratae.

2067. *Cryphia* R. Br. Cal. 2bracteatus, labiis indiviſis, fructifer clauſus. Cor. incluſa $\frac{1}{3}$, lab. ſup. breviſſimo. Antherae muticae.

2068. *Perilomia* Kunth. Cal labiis indiviſis, dorſo gibberoſo, fructifer clauſus. Cor. tubo arcuato, $\frac{3}{5}$. Antherae didymae. Caryopſes alatae.

2069. *Hemiandra* R. Br. Cal. $\frac{1}{2}$. Cor. $\frac{3}{5}$, labii inf. lobo medio bilobo. Stam. aſcendentia, antheris didymis, loculo altero caſſo.

2070. *Synandra* Nutt. Cal. $\frac{2}{3}$. Cor. $\frac{1}{3}$, fauce inflata. Filamenta tomentoſa, antherae ſuperiores loculis ſuperioribus caſſis cohaerentes.

2. *Calyx aequalis.*

2071. *Ajuga.* Cal. 5fidus. Cor. lab. ſup. minimum emarginatum. Stam. exſerta aſcendentia. Antherae 1loculares. Caryopſes reticulatae.

2072. *Aniſomeles* R. Br. Cal. 5fidus. Cor. $\frac{1}{2}$, lab. ſup. minori integro. Stam. exſerta aſcendentia. Antherae 2loculares. Caryopſes laeves.

2073. *Teucrium.* Cal. 5fidus. Cor. lab. ſup. fiſſum abbreviatum, laciniis lateralibus reflexis, lobo medio lab. inf. lato emarginato. Stam. in fiſſura lab. ſup. aſcendentia.

2074. *Weſtringia* Sm. Cal. 5fidus. Cor. $\frac{3}{5}$, lab. ſup. plano, lobis lab. inf. aequalibus. Stam. diſtantia, antherae inferiores abortientes.

2075. *Microcorys* R. Br. Cal. 5fidus. Cor. $\frac{1}{2}$, lab. ſup. abbreviato, lab. inf. lobo medio latiori. Stam. ſuperiora incluſa, antherarum lobo pollinifero glabro, abortiente barbato, inferiora antheris 2partitis caſſis.

2076. *Hemigenia* R. Br. Cal. 5fidus. Cor. $\frac{1}{2}$, lab. ſup. abbreviato, lab. inf. lobo medio 2fido. Stam. aſcendentia, antherarum lobo altero pollinifero, altero deſcendente caſſo, ſuperiorum barbato.

2077. *Colebrookia* Roxb. Flores aggregati. Involucrum imbricatum polyphyllum. Cal 5partitus, laciniis anguſtiſſimis plumoſis. Cor. lab. ſup. emarginatum. Stam. incluſa. Stylus bifidus exſertus.

2078. *Leucoſceptrum* Sm. Cal. tubuloſus 5dentatus. Cor. 5loba irregularis. Stam. exſerta inclinata. Stigma 2fidum.

2079. *Lavandula.* Cal. tubuloſus 5dentatus. Cor. $\frac{3}{5}$. Stam. incluſa.

2080. *Sideritis.* Cal. 5dentatus. Cor. $\frac{3}{5}$. Stam. incluſa. Antherae 2loculares. Stigma alterum vaginans alterum.

2081. *Phytoxys* Molin. Cal 5fidus. Cor. ringens, lab. ſup. abbreviato emarginato, inf. laciniis lateralibus pinnatifidis. Stam. intra tubum.

2082. *Origanum.* Flores ſpicati bracteati. Cal. 5dentatus, raro bilabiatus. Cor. $\frac{1}{2}$. Stamina incluſa.

2083. *Pycnanthemum* Mx. Flores verticillati bracteati. Cal. tubulosus 5fidus. Cor. $\frac{1}{2}$. Stam. subaequalia inclusa vel exserta.

2084. *Isanthus* Mx. Cal. campanulatus 5fidus. Cor. subregularis 5partita. Stam. subaequalia subexserta, antheris 2locularibus. Stigma 2fidum.

2085. *Satureia.* Cal. 5fidus. Cor. $\frac{1}{3}$, lobis subaequalibus, super. emarginato. Stamina distantia.

2086. *Bystropogon* Herit. Cal. dentibus 5 subulatis, intus villosis. Cor. $\frac{2}{3}$.

2087. *Pogostemon* Desf. Cal. tubulosus 5dentatus. Cor. $\frac{1}{2}$. Stam. exserta declinata transverse barbata. Stigma bifidum.

2088. *Hyssopus.* Cal. 5dentatus. Cor. $\frac{2}{3,4}$. Stam. distantia exserta recta, antherae 2loculares.

2089. *Elsholtzia* W. Cal. 5dentatus bracteatus, Cor. ciliata $\frac{4}{1}$. Stam. distantia.

2090. *Mentha.* Cal. 5dentatus. Cor. 4loba subregularis, lobo latiori emarginato. Stamina distantia recta.

2091. *Galeobdolon* Sm. Cal. 5fidus inaequalis aristatus. Cor. $\frac{2}{3}$, lab. sup. fornicato, laciniis lab. inf. acutis.

2092. *Galeopsis.* Cal. 5dentatus aristatus. Cor. $\frac{2}{3}$, lab. sup. fornicatum, inf. lobi laterales ad faucem tuberculati, medius crenatus. Antherarum valvae ciliatae.

2093. *Lamium.* Cal. 5dentatus. Cor. tubo inflato, lab. sup. fornicato, inf. laciniis lateralibus in dentes reflexos mutatis, lobo medio emarginato. Antherarum loculi barbati s. fimbriati.

2094. *Glechoma.* Cal. 5fidus. Cor. tubus elongatus, limbus $\frac{2}{3}$, lab. inf. lobo medio emarginato. Antherarum paria approximata cruciata.

2095. *Nepeta.* Cal. 5dentatus. Cor. $\frac{1}{3}$, lobo medio lab. inf. cucullato. Stam. approximata.

2096. *Hyptis* Jacqu. Cal. 5fidus. Cor. $\frac{2}{3}$, lobo medio lab. inf. cucullato. Stam. declinata.

2097. *Stachys.* Cal. 5fidus. Cor. $\frac{2}{3}$, lobis lab. inf. lateralibus reflexis. Stam. demum extrorsum versa.

2098. *Leonurus.* Cal. 5dentatus aristatus. Cor. $\frac{2}{3}$, lobis indivisis. Antherarum loculi paralleli.

2099. *Ballota.* Cal. pentagonus 5dentatus. Cor. $\frac{2}{3}$, lab. sup. recto, lobo medio lab. inf. emarginato.

2100. *Betonica.* Cal. 5dentatus. Cor. tubus elongatus cylindricus, lab. sup. verticale planiusculum, lobus medius lab. inf. crenatus.

2101. *Marrubium.* Cal. 10striatus 5-10dentatus. Cor. lab. sup. rectum lineare.

2102. *Phlomis.* Cal. 5gonus 5dentatus. Cor. lab. sup. fornicatum incumbens lab. inf. subaequali, lobo medio majore.

2103. *Leucas* R. Br. Cal. 10striatus sub-10dentatus. Cor. lab. sup. fornicatum inferiori elongato brevius. Anth. lobis divaricatis.

2104. *Leonotis* R. Br. Cal. 10striatus sub-10dentatus. Cor. lab. sup. fornicatum elongatum, inf. abbreviatum 3fidum. Antherae lobis divaricatis.

2105. *Moluccella.* Cal. campanulatus cor. amplior, dentibus spinosis. Cor. $\frac{1}{3}$.

2106. *Rizoa* Cav. Cal. tubulosus striatus 5dentatus. Cor. tubus elongatus, limbus $\frac{2}{4}$. Stam. subinclusa. Stigmata 2 distantia exserta.

2107. *Colquhounia* Wall. Cal. tubulosus 5dentatus. Cor. lab. sup. 2dentatum, inf. 3lobum, lobis lateralibus fauci ampliatae insertis, medio minori integro. Stam. ascendentia. Caryopses alatae.

2108. *Selago*. Cal. 4fidus, Cor. tubo gracili, limbo 5fido subaequali. Caryopses 2.

ANGIOSPERMIA.

1. *Verbeneae*.

2109. *Verbena*. Cal. 5fidus, dente unico subbreviori. Cor. limbus irregulariter 5lobus. Stam. inclusa. Utriculus 4spermus cito rumpens, ut maturi fructus caryopses siftant.

2110. *Aeollanthus* Mart. Cal. 2labiatus $\frac{1}{2}$, Cor. lab. sup. ascendens, inf. stamina declinata demum exserta condens. Utriculus circumscissus sub-2spermus.

2111. *Lippia*. Cal. 4-5dentatus demum 2valvis. Cor. limbus 2labiatus $\frac{2}{3}$. Stam. inclusa. Drupa exsucca calyce 2valvi tecta 2locularis 2sperma.

2112. *Priva* Adans. Cal. ventricosus 5dentatus. Cor. limbo 5fido. Drupa exsucca calyce inflato tecta 4locularis 4sperma.

2113. *Hebenstreitia*. Cal. tubulosus emarginatus ultra medium bifidus. Cor. 1labiata, tubo lateraliter dehiscente, limbo 4fido. Capsula membranacea 1locularis 2valvis 2sperma.

2114. *Tamonea* Aubl. Cal. 5aristatus. Cor. limbo $\frac{5}{5}$. Stam. inclusa, antheris 2 abortientibus. Stigma 4fidum. Drupa sicca, putamine 4loculari 4sperma.

2115. *Congea* Roxb. Involucrum 3phyllum sub-8florum. Cal. tubulosus 5dentatus. Cor. 2labiata, lab. sup. elongato 2fido. Stam. elongata stricta. Drupa baccata 1sperma.

2116. *Streptium* Roxb. Cal. 5dentatus. Cor. tubo torto, limbo 2labiato. Antherae 2lobae. Nuces 2 2loculares.

2117. *Holmskioldia* Retz. Cal. campanulatus coloratus ampliatus repandus. Cor. infundibuliformis, lab. sup. 2lobo, inf. 3fido, lacinia media producta. Bacca 4sperma.

2118. *Premna*. Cal. subcampanulatus 5dentatus. Cor. limbo $\frac{5}{5}$. Stam. exserta. Stigma 2fidum. Drupa putamine 4loculari, 4sperma, axi perforato.

2119. *Chloanthes* R. Br. Cal. campanulatus 5fidus aequalis. Cor. tubo ampliata, limbo $\frac{2}{3}$, lobo medio lab. inf. longiori. Stam. exserta. Drupa exsucca 2pyrena, pyrenis 3locularibus, loculis lateralibus 1spermis, intermedio aspermo farcto.

2120. *Vitex*. Cal. brevis 5dentatus. Cor. 2labiata $\frac{2}{3}$, lacinia media lab. inf. longiore. Stam. ascendentia. Drupa putamine 4loculari 4spermo.

2121. *Clerodendron*. Cal. 5fidus s. 5dentatus, fructifer subampliatus. Cor. tubo cylindrico, limbo 5partito subaequali. Stam. exserta. Bacca 4pyrena.

2122. *Wallrothia* Roth. Cal. campanulatus 5dentatus. Cor. ringens $\frac{2}{3}$, lobo medio lab. sup. cucullato. Stam. declinata. Antherae 2lobae. Bacca 1-4sperma.

2123. *Pyrostoma* Meyer. Cal. 5lobus. Cor. tubo subventricoso, limbo $\frac{1}{2}$. Stam. exserta. Stigma bifidum. Fructus?

2124. *Volkameria.* Cal. 5fidus. Cor. tubo cylindrico, limbo 5partito, laciniis aequalibus ſubſecundis. Stam. exſerta aſcendentia. Bacca 2pyrena, pyrenis 2locularibus.

2125. *Petrea.* Cal. campanulatus coloratus limbo duplici, ext. 5partito ſcarioſo elongato, int. 5dentato breviſſimo. Cor. calyce brevior, limbo 5fido aequali. Stam. incluſa. Stigma capitatum. Capſ. 2locularis 2ſperma.

2126. *Lantana.* Cal. breviſſimus obſolete dentatus. Cor. tubuloſa, limbo inaequaliter 4lobo. Stam. incluſa. Drupa baccata 1pyrena, pyrene 2loculari 2ſpermo, rima loculis interpoſita.

2127. *Spielmannia* Medic. Cal. 5fidus. Cor. 5loba, fauce barbata. Drupa nuce 2loculari 2ſperma.

2128. *Citharexylon.* Cal. campanulatus 5dentatus. Cor. infundibuliformis ſubrotata, lobis 5 ſubaequalibus. Bacca 2pyrena, pyrenis 2locularibus 2ſpermis.

2129. *Duranta.* Cal. tubuloſus 5dentatus. Cor. infundibuliformis, limbo inaequali. Stam. incluſa. Drupa 4pyrena, pyrenis 2locularibus 2ſpermis.

2130. *Amaſonia.* Cal. 5fidus. Cor. tubuloſa, limbo 5lobo ſubaequali. Stigma 2partitum. Drupa 2-4pyrena, pyrenis 1locularibus 1ſpermis.

2131. *Gmelina.* Cal. ſub-4dentatus. Cor. 4fida campanulata. Antherae 2 bipartitae, 2 ſimplices. Drupa nuce 2loculari.

2132. *Mendozia* R. et P. (Mendoncia Velloz. Vand.) Cal. 2ſepalus perſiſtens. Cor. baſi gibba, fauce conſtricta, limbo 5lobo reflexo. Antherae elongatae cuſpidatae. Drupa 1ſperma.

2133. *Myoporum* Banks. Cal. 5partitus. Cor. ſubhypocrateriformis, limbo 5lobo aequali. Stigma obtuſum. Drupa baccata 4locularis 4ſperma.

2134. *Pholidia* R. Br. Cal. 5fidus. Cor. infundibuliformis, fauce ampliata, limbo $\frac{3}{4}$. Antherae barbatae. Stigma capitatum. Drupa exſucca 4locularis 4ſperma.

2135. *Stenochilus* R. Br. Cal. 5partitus. Cor. ringens, lab. ſup. erecto ſemi-4fido, inf. indiviſo anguſto deflexo. Stam. exſerta. Stigma obtuſum. Drupa baccata 4locularis 4ſperma.

2136. *Bontia.* Cal. 5partitus. Cor. ringens, lab. ſup. emarginatum, inf. 3fidum longitudinaliter barbatum. Stigma 2lobum. Drupa putamine 2loculari, loculis 2partitis 4ſpermis.

†2137. *Eremophila.* R. Br. Cal. 5partitus, fructifer alienatus ſcarioſus. Cor.? Stigma indiviſum. Drupa exſucca 4locularis 4ſperma.

Deſciſcentes ſ. dubiae ſedis.

2138. *Xenopoma* W. Cal. duplex, ext. inf. tubuloſus 5dentatus, int. ſuperus 5partitus ciliatus. Cor. tubo cylindrico, fauce ampliata, limbo $\frac{2}{5}$. Stam. incluſa. Stigma 2fidum. Bacca?

2139. *Tozzia.* Cal. tubuloſus 4-5partitus. Cor. limbo ſub-2labiato, lobis 5 aequalibus. Antherae calcaratae. Nucula 2valvis 1ſperma. Semen ſtrophiolatum.

2140. *Hemiphragma.* Cal. 5partitus. Cor. infundibuliformis, limbo 5fido. Stam. ſubaequalia. Bacca exſucca ſemi-2locularis, diſſepimento ſuperne fiſſo.

2141. *Joſephinia* Vent. Cal. 5partitus. Cor. tubo brevi, fauce ampliata, limbo 5lobo, lacinia media lab. inf. elongata. Stigma 4fidum. Drupa echinata, 4-8locularis, loculis 1ſpermis.

2142. *Pedalium.* Cal. 5fidus. Cor. campanulata, limbo ſub-2labiato 5lobo. Filamenta piloſa, antheris per paria cruciatis; filam. 5 ſterile. Nux ſpinoſa 4gona 2locularis, ſeminibus arillatis.

2143. *Avicennia.* Cal. 5partitus. Cor. campanulata, limbo 4partito. Stam. ſubaequalia. Stigma 2fidum. Fructus 2valvis coriaceus 1ſpermus, ſemine germinante, embryone nudo.

2. *Primuleae:* placenta libera.

2144. *Limoſella.* Cal. 5partitus. Cor. 5loba. Capſ. polyſperma 2valvis, placenta libera centrali.

2145. *Erinus.* Cal. 5fidus. Cor. tubuloſa, limbo 5fido aequali, laciniis bifidis. Capſ. 2locularis, placenta libera centrali.

2146. *Lindernia.* Cal. 5partitus corolla longior. Cor. tubo ventricoſo, limbo 4lobo ſub-2labiato. Stam. incluſa. Capſ. 2valvis, placenta libera.

2147. *Manulea.* Cal. 5fidus. Cor. tubuloſa, limbo ſub $\frac{4}{1}$. Capſ. 2locularis, placenta libera centrali.

2148. *Hornemannia* W. Cal. 5fidus. Cor. perſonata $\frac{5}{2}$. Antherae 2loculares. Stigma 2lamellatum. Capſ. 2valvis, placenta libera ſubgloboſa.

2149. *Conobea* Aubl. Cal. tubuloſus 5dentatus baſi 3bracteatus. Cor. 2labiata, lab. ſup. emarginato, infer. 3lobo. Capſ. 4valvis. Placenta demum libera.

3. *Perſonatae.*

* *Rhinantheae:* diſſepimento aequali.

2150. *Rhinanthus* M. B. Cal. compreſſus 2labiatus. Cor. lab. ſup. tubuloſum apice appendiculatum. Capſ. 2locularis compreſſa.

2151. *Alectorolophus* M. B. Cal. ventricoſus 4dentatus. Cor. lab. ſup. compreſſum emarginatum. Antherae bipartitae. Capſ. compreſſa 2locularis, ſeminibus marginatis.

2152. *Gymnandra* Pall. Cal. longitudinaliter fiſſus 3dentatus. Cor. lab. ſup. indiviſum, inf. 2-3partitum. Stam. 2 abortientia margini faucis inſerta. Capſ. 2locularis 2ſperma.

2153. *Bartſia.* Cal. 4fidus 4partitus. Cor. tubuloſa, limbo $\frac{1}{3}$. Capſ. ovata compreſſa. Sem. angulata.

2154. *Lamourouxia* Kunth. Cal. 4fidus aequalis. Cor. fauce ventricoſa, lab. ſup. fornicato, inf. 3lobo. Antherae bifidae, lobis mucronatis. Capſ. compreſſa, ſeminibus membrana reticulata obvelatis.

2155. *Caſtilleia* Mut. Cal. tubuloſus compreſſus hinc fiſſus. Cor. tubuloſa compreſſa 2labiata, lab. ſup. lineari, inf. breviori dentato. Stigma capitatum. Capſ. 2locularis. Sem. membrana laxa veſtita.

2156. *Lafuentea* Lag. Cal. 5partitus. Cor. 2labiata $\frac{3}{2}$. Capſ. 2locularis polyſperma.

2157. *Euphraſia.* Cal. 4fidus. Cor. 2labiata, lab. ſup. emarginato ſ. denticulato. Antherae 2fidae mucronatae. Stigma capitatum. Semina ſtriata.

2158. *Pedicularis.* Cal. ventricoſus 5fidus. Cor. tubuloſa 2labiata, lab. ſup. galeato compreſſo, inf. 3lobo. Capſ. roſtrata 2locularis.

2159. *Melampyrum*. Cal. 2labiatus 4fidus. Cor. lab. sup. galeatum margine reflexo, inf. 3lobum. Antherae loculis acuminatis. Capſ. acuminata 2locularis, loculis oligoſpermis.

2160. *Orthocarpus* Nutt. Cal. tubuloſus ſemi-4fidus. Cor. lab. ſup. compreſſum margine inflexo, inf. concavum obſolete 3dentatum. Antherae loculis divaricatis. Capſ. ſtricta 2locularis, ſeminibus margine alatis.

2161. *Gomaria* R. et P. Cal. 5partitus. Cor. medio conſtricta, limbo 2labiato $\frac{4}{1}$, appendice urceolata. Stigma capitatum. Capſ. 2locularis, valvis 2fidis.

***Scrofularinae*: diſsepimento medio incraſſato placentifero.

2162. *Scrofularia*. Cal. 5fidus. Cor. ventricoſa, limbo contracto inaequaliter 5lobo. Stam. declinata. Capſ. acuminata, valvis introflexis diſsepimentum formantibus.

2163. *Digitalis*. Cal. 5partitus, laciniis ſubinaequalibus. Cor. campanulata, limbo 4fido. Stam. declinata. Antherae 2partitae. Capſ. acuminata, valvis introflexis diſsepimentum formantibus.

2164. *Linaria* Tourn. Cal. 5partitus. Cor. perſonata calcarata. Capſ. 2locularis apice dentibus dehiſcens. Semina ſubmarginata.

2165. *Nemeſia* Vent. Cal. 5partitus. Cor. perſonata calcarata. Capſ. 2locularis 2valvis, ſeminibus 4ſeriatis marginatis.

2166. *Antirrhinum*. Cal. 5partitus. Cor. perſonata baſi gibba. Capſ. 2locularis apice poris dehiſcens.

2167. *Anarrhinum* Desf. Cal. 5fidus. Cor. baſi gibba fauce aperta. Capſ. valvis 4 inaequalibus dehiſcens.

2168. *Mimulus*. Cal. prismaticus 5dentatus. Cor. ſubcampanulata, limbo $\frac{2}{3}$, lobis ſubaequalibus. Stigma 2lamellatum. Diſsepimenta lateribus placentifera.

2169. *Torenia*. Cal. 2labiatus. Cor. tubuloſa oblique fiſſa. Filamenta arcuata: antherae geminae unitae. Capſ. 2locularis.

2170. *Vandellia* P. Br. Cal. 4partitus. Cor. $\frac{2}{4}$. Capſ. diſsepimentum medio placentam fungoſam demum ſejunctam proferens.

2171. *Diaſcia* Link. Cal. 5partitus. Cor. 5loba, lobo infimo concavo, baſi utrinque ſinu ſaccato. Capſ. 2locularis 2valvis.

2172. *Tittmannia* Reichenb. Cal. 5partitus aequalis. Cor. perſonata, lab. inf. 3lobo porrecto. Filamenta arcuata, antherae ſuperiores cohaerentes. Capſ. 2locularis 2valvis, diſsepimento medio in placentam incraſſato.

2173. *Herpeſtes* Gärtn. Cal. 5partitus inaequalis, laciniis interioribus minoribus obtectis. Cor. tubuloſa 2labiata. Stam. incluſa. Capſ. 2locularis 2valvis, valvis 2partitis.

2174. *Limnophila* R. Br. Cal. tubuloſus 5fidus aequalis. Cor. infundibuliformis, limbo 5fido ſubaequali. Stam. incluſa. Antherae per paria cohaerentes. Stigma dilatatum. Capſ. 2locularis 2valvis.

2175. *Uvedalia* R. Br. Cal. prismaticus 5dentatus. Cor. ringens $\frac{2}{3}$, lacinia media lab. inf. baſi 2gibboſa. Antherarum lobi divaricati. Capſ. 2locularis 4valvis.

2176. *Morgania* R. Br. Cal. 5partitus aequalis. Cor. ringens $\frac{2}{3}$, lobis ſubaequalibus. Stam. incluſa. Stigma 2lamellatum. Capſ. 2locularis, valvis 2partitis, diſsepimento ex inflexis valvarum marginibus.

2177. *Mazus* Lour. Cal. campanulatus 5fidus aequalis. Cor. ringens $\frac{2}{3}$, baſi 2gibboſa. Stigma 2lamellatum. Capſ. 2locularis 2valvis, valvis integris medio ſeptiferis.

2178. *Ourisia* Commerſ. Cal. 5fidus ſubaequalis. Cor. infundibuliformis, limbo 5lobo ſubaequali. Capſ. 2locularis 2valvis. Semina membrana laxa obvoluta.

2179. *Dichroma* Cav. Cal. 5partitus. Cor. tubo elongato, limbo ⅔. Stigma ſimplex capitatum. Capſ. 2locularis, placentis diſſepimento adnatis.

2180. *Loxonia* Jack. Cal. 5partitus. Cor. infundibuliformis, limbo 2labiato. Stigma 2lobum. Capſ. calyce incluſa 2locularis.

2181. *Centranthera* R. Br. Cal. hinc fiſſus, laciniis 5 inde cohaerentibus. Cor. infundibuliformis, limbo inaequaliter 5lobo. Stamina incluſa. Antherae baſi calcaratae. Capſ. 2locularis 2valvis, diſſepimento contrario placentifero demum libero.

2182. *Büchnera*. Cal. tubuloſus 5dentatus 10ſtriatus. Cor. hypocrateriformis limbo 5partito, vel 2labiata. Stam. incluſa. Antherae lineares. Stigma ſubclavatum. Capſ. 2locularis 2valvis, valvis medio ſeptiferis.

2183. *Gerardia*. Cal. 5fidus aequalis. Cor. campanulato-infundibuliformis, limbo 2labiato 5lobo. Stam. incluſa. Antherae ſagittato-2lobae. Capſ. 2locularis 2valvis.

2184. *Schwalbea*. Cal. ventricoſus 4fidus, lacinia ſumma breviſſima, infima elongata. Cor. ringens ⅓. Capſ. 2locularis 2valvis, diſſepimento duplicato.

2185. *Escobedia* R. et P. Cal. pentagonus 5dentatus. Cor. tubus elongatus, limbus ⅔, lobis ſubaequalibus. Stam. incluſa. Antherae ſagittatae, lobis ariſtatis. Stigma ligulatum. Capſ. 2locularis 2valvis.

2186. *Browallia*. Cal. tubuloſus 5fidus. Cor. tubo apice ſubinflato, limbo hypocrateriformi, lobis ſubaequalibus. Stam. incluſa. Antherae inaequales. Capſ. 2locularis 2valvis.

2187. *Hemimeris*. Cal. 5partitus aequalis. Cor. rotata 2labiata ⅔. Stam. declinata glabra. Antherae didymae. Capſ. 2locularis, placenta ſeptis adnata.

2188. *Celſia*. Cal. 5partitus. Cor. rotata. Filamenta barbata. Capſ. 2locularis, diſſepimento placentifero.

2189. *Seymeria* Pursh. Cal. 5partitus. Cor. rotato-campanulata, aequaliter 5loba. Stam. breviſſima ſubaequalia prope faucem inſerta, quinto acceſſorio ſterili. Stylus declinatus. Capſ. ventricoſo-ovata 2locularis 2valvis.

2190. *Angelonia* Humb. Cal. 5partitus. Cor. irregularis patens, fauce fornicata, limbo ⅔, lobo medio labii inf. baſi ſaccato. Antherae loculis divergentibus. Capſ. 2locularis 2valvis, valvis 2fidis.

2191. *Stemodia*. Cal. 5partitus. Cor. 2labiata. Stamina 2fida, ſingula dianthera. Capſ. 2locularis, placenta demum libera.

2192. *Ruſſelia*. Cal. 5partitus. Cor. fauce ventricoſa barbata, limbo 2labiato, lab. ſup. emarginato, inf. 3lobo. Antherae loculis patulis. Capſ. roſtrata 2locularis, placenta demum libera.

2193. *Achimenes* Vahl. Cal. 5partitus. Cor. limbo ſubaequali plano 4fido. Antherae connexae. Capſ. 2locularis.

2194. *Razumovia* *. Cal. 4angularis ſub-2partitus. Cor. campanulata 5fida. Stamina hirſuta. Capſ. turgida 2locularis.

2195. *Trevirania* W. Cal. 5ſepalus. Cor. infundibuliformis, limbo 5lobo. Filamentum quintum ſterile. Capſ. ſemi-2locularis.

2196. *Chelone*. Cal. 5partitus bracteatus. Cor. ventricoſa 2labiata. Filamentum quintum ſterile. Capſ. 5locularis, diſſepimento lateribus placentifero.

2197. *Capraria.* Cal. 5partitus. Cor. campanulata, limbo 5fido aequali. Stam. incluſa. Stigma 2lobum. Capſ. 2locularis, valvis ſub-2fidis, placenta demum libera.

2198. *Leucophyllum* Humb. Cal. 5partitus. Cor. campanulata, limbo $\frac{2}{3}$, palato convexo. Stam. incluſa, antheris divaricatis. Capſ. 2locularis.

2199. *Maurandia* Jacq. Cal. 5partitus. Cor. perſonata, tubo ventricoſo, limbo $\frac{2}{3}$. Stam. incluſa, antheris divaricatis. Capſ. 2locularis, apice dentibus 10 dehiſcens.

Deſciſcentes.

2200. *Seſamum.* Cal. 5partitus. Cor. campanulata, limbo inaequali 5lobo. Filamentum 5 ſterile. Capſ. 4locularis, bivalvis, valvis inflexis loculos formantibus.

2201. *Dodartia.* Cal. 5dentatus. Cor. 5labiata, lab. inf. porrecto. Stigma 2fidum. Capſ. 2locularis, diſſepimento placentifero.

2202. *Cymbaria.* Cal. 10dentatus. Cor. 2labiata. Capſ. 2locularis, diſſepimento per proceſſus laterales in placentas abeunte.

2203. *Calytriplex* R. et P. Cal. triplex, intermedius 3partitus latior. Cor. irregularis, limbo 5fido, laciniis 2 ſuperioribus latioribus. Stigma capitatum. Capſ. 2locularis, 2valvis, valvis 2fidis.

2204. *Sibthorpia.* Cal. 5partitus. Cor. calycem aequans ſubregularis 5fida. Capſ. 2locularis obcordata 2valvis, diſſepimento valvis contrario.

*** *Orobancheae:* placentatio valvaris.

2205. *Orobanche.* Cal. 4-5fidus bracteatus. Cor. perſiſtens tubuloſa 2labiata, lab. ſup. fornicato emarginato, inf. 3fido reflexo. Capſ. 1locularis 2valvis, ſeminibus minutis ad inflexos valvarum margines inſertis.

2206. *Phelipaea* Tourn. Cal. 5fidus. Cor. 2labiata 5loba. Antherae barbatae. Capſ. prioris.

2207. *Hyobanche.* Cal. 5partitus bracteis binis ſuffultus. Cor. lab. ſup. fornicatum, inf. obſoletum. Capſ. prioris.

2208. *Lathraea.* Cal. 4partitus coloratus bracteatus. Cor. 2labiata, lab. ſup. integro, inf. 3dentato. Antherae ſagittatae piloſae. Capſ. 2valvis, valvis ſepti- et ſemiferis.

2209. *Epiphegus* Nutt. Cal. abbreviatus 5dentatus. Flores polygami. Cor. ♂ ringens compreſſa 4fida, lab. inf. plano. Cor. ☿ exigua ſubregularis 4fida citiſſime marcida et capſulam coronans. Capſ. obliqua 1locularis hinc hiaſcens.

2210. *Alectra* Thunb. Cal. 2labiatus $\frac{2}{3}$. Cor. tubuloſa, limbo 5partito. Filamenta barbata, antheris didymis. Capſ. 2valvis 2locularis.

2211. *Aeginetia* Roxb. Cal. 1phyllus ſpathaceus. Cor. campanulata, limbo 5lodo. Capſ. 2locularis.

4. *Acantheae:* capſula 2locularis, ſemina retinaculis ſubtenſa.

2212. *Acanthus.* Cal. 4fidus inaequalis, laciniis oppoſitis minoribus. Cor. 1labiata. Antherae 1loculares piloſae. Capſ. loculi 1ſpermi.

2213. *Blepharis* Juſſ. Cal. duplex uterque 4ſepalus, ext. ciliatus bracteatus. Cor. 1labiata 5loba.

2214. *Ruellia.* Cal. 5partitus aequalis. Cor. infundibuliformis, limbo 5fido ſubaequali patente. Antherae 2loculares. Capſ. polyſperma, diſſepimento adnato.

2215. *Bleehum* Juſſ. Cal. 5partitus. Cor. infundibuliformis, limbo 5fido. Antherae 2loculares. Capſ. 1locularis 2valvis, valvis infra fiſſis. Placentae liberae retinacula adhaerent.

2216. *Aphelandra* R. Br. Cal. 5partitus inaequalis. Cor. 2labiata. Antherae 1loculares. Capſ. 2locularis, diſſepimento contrario adnato.

2217. *Harrachia* Jacqu. Cal. 5partitus inaequalis. Cor. 1labiata lobata. Stam. incluſa, antheris 1locularibus. Capſ. 2locularis, diſſepimento contrario adnato.

2218. *Aetheilema* R. Br. Cal. 5partitus inaequalis, lacinia dorſali maxima. Cor. infundibuliformis, limbo 5fido. Capſ. 2-4ſperma, diſſepimenti ſegmentis 2partibilibus.

2219. *Lepidagathis* W. Cal. 4 ſepalus, ſepalis alternis majoribus ciliatis. Cor. 2labiata, lab. ſup. emarginato, inf. 3fido. Capſ. 4angula 2locularis 2ſperma.

2220. *Barleria.* Cal. 4partitus aequalis. Cor. 2labiata 5loba. Capſ. 4angula 2locularis 2ſperma.

2221. *Hygrophila* R. Br. Cal. ſemi-5fidus aequalis. Cor. ringens. Antherarum loculi paralleli. Diſſepimentum adnatum et valvis et retinaculis.

2222. *Thunbergia.* Cal. duplex, ext. 2ſepalus, int. 12fidus. Cor. campanulata, limbo 5lobo. Stigma 2lobum. Capſ. roſtrata 2locularis. Retinaculorum vices gerunt lobuli carnoſi.

2223. *Adenosma* R. Br. Cal. 5partitus, lacinia ſuprema majori. Cor. ringens ½. Antherae approximatae. Stigma dilatatum. Capſ. roſtrata 2partibilis: placentae ſuturis adnatae: retinacula 0.

5. *Bignonieae.*

2224. *Bignonia.* Cal. campanulatus integerrimus repandus vel ſubdentatus. Cor. campanulata, limbo 2labiato 5lobo. Filamentum 5 ſterile. Stigma bilamellatum. Capſ. ſiliquaeformis 2locularis, diſſepimento valvis parallelo. Sem. transverſa 2ſeriata membranaceo-alata.

2225. *Tecoma* Juſſ. Character Bignoniae, praeter diſſepimentum valvis contrarium.

2226. *Jacaranda* Juſſ. Cal., cor. et ſtam. Bignoniae. Capſ. ſuborbicularis lignea compreſſa 2locularis 2valvis, diſſepimento valvis contrario. Semina transverſa imbricata membranaceo-alata.

2227. *Spathodea* P. B. Cal. ſpathaceus hinc fiſſus. Cor. infundibuliformis, limbo 5fido inaequa . Filamentum quintum ſterile. Stigma bilamellatum. Capſ. ſiliquaeformis falcata ſub-4locularis, diſſepimento valvis contrario ſuberoſo.

2228. *Amphilophium* Kunth. Cal. campanulatus, limbo duplici, ext. patente undulato-criſpo, int. 2labiato. Cor. ſubcoriacea, fauce ventricoſa, limbo 2labiato, lab. ſup. galeato 2-inf. recto 3dentato. Filam. quintum ſterile. Capſ. ſublignea 2locularis.

2229. *Eccremocarpus* R. et P. Cal. magnus laxus 4-5fidus. Cor. tubuloſa, limbo reflexo 5fido. Filam. quintum ſterile. Capſ. ovata 1locularis, placentis valvaribus: ſem. imbricata membranaceo-alata.

2230. *Salpiglossis* R. et P. Cal. 5partitus ſubinaequalis. Cor. infundibuliformis, limbo 5lobo. Filam. quintum ſterile. Stylus apice linguaeformis, dentibus utrinque oppoſitis. Capſ. 2locularis, diſſepimento valvis parallelo.

2231. *Incarvillea* Juſſ. Cal. 5fidus 3bracteatus. Cor. tubuloſo-ventricoſa, limbo 5lobo. Filam. quintum ſterile 0? Capſ. ſiliquaeformis, diſſepimento valvis contrario: ſem. alata.

2232. *Gelſemium* Juſſ. Cal. 5dentatus. Cor. infundibuliformis, limbo 5lobo. Stam. quintum ſaepe perfectum. Capſ. ovata compreſſa, valvis inflexis diſſepimentum conſtituentibus. Sem. apice alato.

Deſciſcentes.

2233. *Tourrettia* Domb. Cal. 2labiatus, lab. ſup. acuminato, inf. latiori 4crenulato. Cor. tubuloſa 1labiata, lab. ſup. in cucullum producto. Antherae bilobae. Capſ. ſpinoſo-echinata ſublignea ſub-4locularis. Sem. marginata.

2234. *Martynia.* Cal. 5fidus inaequalis. Cor. ventricoſa, limbo 5lobo. Filam. quintum ſterile. Drupa acuta, nuce 4loculari, ſeminibus apteris.

2235. *Didymocarpus* Jack. Cal. 5fidus. Cor. infundibuliformis, limbo irregulari 5lobo. Capſ. ſiliquaeformis ſub-4locularis.

2236. *Aeſchynanthus* Jack. Cal. 5fidus ventricoſus. Cor. limbo ſubirregulari. Stam. exſerta: filam. quintum ſterile. Capſ. longiſſima ſiliquaeformis ſub-4locularis: ſem. ariſtata.

6. *Gesnereae* Rich.

2237. *Gesnera.* Cal. 5partitus. Cor. tubuloſo-campanulata, limbo $\frac{5}{5}$. Stigma 2lobum. Capſ. 1locularis 2valvis, placentis parietalibus bilamellatis.

2238. *Desleria.* Cal. 5partitus. Cor. tubuloſo-ventricoſa, limbo $\frac{5}{5}$. Stigma 2lobum. Bacca 1locularis, placentis parietalibus bilamellatis.

2239. *Parentucellia* Viv. Cal. ventricoſo-tubuloſus 5fidus. Cor. ringens, lab. ſup. fornicato, inf. 3fido bituberculato. Capſ. ſubbilocularis polyſperma, placentatio parietalis.

2240. *Anthocercis* Labill. Cal. 5fidus. Cor. campanulata, limbo 5partito aequali. Stam. incluſa, cum rudimento quinti. Capſ. 2locularis 2valvis, valvarum marginibus inflexis placentae parallelae infertis. Sem. reticulata.

7. *Baccatae.*

2241. *Brunfelſia.* Cal. campanulatus 5dentatus. Cor. infundibuliformis, tubo longiſſimo incurvo, limbo 5lobo. Capſ. globoſa baccata 2locularis: ſem. peripherica, placenta tamen centrali.

2242. *Creſcentia.* Cal. 2partitus aequalis. Cor. infundibuliformis, limbo 2labiato, lab. ſup. breviori crenato, inf. 3fido. Bacca corticata 1locularis, ſem. in pulpa nidulantia.

2243. *Tanaëcium* Sw. Cal. truncatus integerrimus. Cor. tubus longiſſimus, limbo 5lobo ſubregulari. Antherae horizontales, lobis divaricatis. Bacca 2locularis polyſperma.

2244. *Tripinnaria* Perſ. Cal. urceolatus 5crenatus. Cor. campanulata, limbo 5fido villoſo. Antherae bicornes incumbentes. Stigma acutum 2fidum. Bacca 1locularis polyſperma.

2245. *Columnea.* Cal. 5partitus. Cor. tubuloſa, limbo 2labiato, lab. ſup. fornicato, inf. 3fido, laciniis anguſtis divaricatis. Antherae per paria nexae. Bacca 2locularis polyſperma, diſſepimento placentifero.

2246. *Duboiſia* R. Br. Cal. 2labiatus brevis. Cor. ſubcampanulata, limbo 5partito ſubaequali. Stam. incluſa cum rudimento quinti. Bacca 2locularis polyſperma. Sem. reniformia.

2247. *Mitraria* Cav. Cal. duplex, ext. mitraeformis irregulariter fiſſus, int. 5partitus. Cor. tubuloſo-ventricoſa, limbo $\frac{2}{3}$. Stam. exſerta. Bacca 1locularis polyſperma.

2248. *Teedia* Rudolph. Cal. 5partitus. Cor. hypocrateriformis 5loba. Stylus perſiſtens. Bacca bilocularis, placenta utrinque incraſſata.

2249. *Halleria*. Cal. 3lobus perſiſtens. Cor. infundibuliformis, limbo 4fido, lacinia ſumma majore emarginata. Stylus perſiſtens. Bacca globoſa 1locularis polyſperma, funiculis ſeminum umbilicalibus centrum petentibus.

2250. *Diplanthera* R. Br. Cal. 3fidus, lacinia poſtica integra, lateralibus bifidis. Cor. 2labiata $\frac{2}{3}$. Stam. ſubaequalia, antherarum loculis divergentibus. Germen biloculare polyſpermum.

2251. *Linnaea*. Cal. duplex, ext. inferus 4fidus, int. ſuperus 5fidus. Cor. campanulata, limbo ſubaequaliter 5lobo. Bacca exſucca 3locularis, loculis 2 abortientibus.

8. *Fructus inferi.*

2252. *Picria* Lour. Cal. 4ſepalus deciduus, ſepalis 2 corolla longioribus. Cor. ringens, lab. ſup. ſpathulato, inf. trilobo. Filam. longiora ſeorſim vaginantia, antheris 1locularibus, breviorum 2locularibus connexis. Stigma 2fidum. Bacca 2locularis polyſperma.

2253. *Gloxinia* Herit. Cal. 5partitus. Cor. campanulata, limbo obliquo. Filam. quintum ſterile. Capſ. 2valvis.

9. *Pleiopetalae.*

2254. *Melianthus*. Cal. inaequaliter 5fidus perſiſtens coloratus baſi nectariferus. Pet. 5, quorum 4 nectario inſerta medio cohaerent. Capſ. 4 alatae 2ſpermae. *Familia?*

2255. *Krameria*. Cal. 4ſepalus. Pet. 4, 2 lateralia ſeſſilia, 2 unguiculata longiora. Stam. breviora baſi juncta. Antherae apice 2poroſae. Stigma indiviſum. Fructus ſubgloboſus muricatus 1ſpermus. *Polygaleae.*

CLASSIS XIV.

DIDYNAMIA.

GYMNOSPERMIA.

2048. Lumnitzera Jacq.

ocimoides Jacq. 1. L. ramis aſperiusculis, foliis ovatis crenatis glabris, verticillis ſpicatis nudis. *Patria?* (Ocimum polycladon Link.)

polyſtachya Jacq. 2. L. ramis glabris, foliis ovatis crenato-dentatis, verticillis ſpicatis nudis. *Ind. or.* (Ocimum polyſtachyon L.)

moſchata * 3. L. foliis rhombeo-lanceolatis crenatis pubeſcentibus, verticillis ſpicatis ſecundis. *Nov. Holl.* (Plectranthus moſchatus R. Br.)

proſtrata * 4. L. ramis divaricatis proſtratis piloſis, foliis ellipticis lineatis argute ſerratis hirſutiusculis, verticillis multifloris ſpicatis. *Ind. orient.* (Ocimum L.)

faſtigiata * 5. L. ramis brachiatis piloſo-viſcoſis, foliis oblongis obtuſis crenatis baſi attenuatis integerrimis, verticillis paniculatis terminalibus. *Ind. or.* (Ocimum Roth.)

tenuiflora * 6. L. foliis longe petiolatis oblongis ſerratis villoſiusculis, bracteis cordatis concavis, verticillis ſpicatis, ſpicis filiformibus. *Malabar. Ceylon.* (Ocimum L.)

denſiflora * 7. L. ramis tomentoſis, foliis ovatis obtuſe ſerratis breviter petiolatis ſubtus tomentoſis, paniculа terminali ramoſiſſima folioſa, calycibus ſubaequalibus. *Ind. or.* (Ocimum Roth.)

ſalvioides * 8. L. ramis piloſo-viſcoſis, foliis ovato-oblongis crenulatis utrinque piloſis, verticillis racemoſis bracteatis. *Ind. or.* (Ocimum Roth.)

† *capitata* * 9. L. foliis oblongis obtuſe ſerratis in petiolum decurrentibus pubeſcentibus, capitulis multifloris involucratis. *Ind. or. China.* (Ocimum capitatum Roth., capitellatum L.)

2049. OCIMUM.

* *Foliis ſerratis, dentatis, crenatis.*

thyrſiflorum 1. O. ramis piloſis, foliis oblongis utrinque attenuatis groſſe ſerratis, verticillis paniculatis bracteatis. *Ind. or. et occ.*

gratiſſimum 2. O. ramis teretibus piloſo-tomentoſis, foliis ovato-lanceolatis, verticillis ſpicatis. *Ind. or.*

Baſilicum 3. O. ramis ſubpubeſcentibus, foliis ovato-oblongis ſubſerratis, verticillis hirſutiusculis. *Ind. or. Perſia.* (O. piloſum et aſcendens W., racemoſum Thunb.)

micranthum W. 4. O. ramis glabris, foliis ovatis utrinque attenuatis ſerratis, verticillis glabriusculis, calycis labio ſuperiori latiſſimo. *Patria?*

viride W. 5. O. ramis piloſiusculis, foliis ovatis utrinque attenuatis ſerratis ſubtus ſcabris, racemis paniculatis. *Patria?* (O. viridiflorum Roth.)

ſuave W. 6. O. ramis pubeſcentibus, foliis ovato-oblongis utrinque attenuatis ſerratis utrinque villoſiusculis ſubtus incanis, verticillis paniculatis, corolla calycem ſubaequante. *Patria?* (O. urticaefolium Roth.)

ſanctum 7. O. ramis hirſutis, foliis ovato-oblongis obtuſis glabriusculis, racemis terminalibus hirſutis, bracteis cordatis. *Ind. or.*

febrifugum Ker. 8. O. ramis hirſutiusculis, foliis ovato-oblongis utrinque attenuatis crenatis glabriusculis, verticillis paucifloris, corolla calycem ſubaequante. *Sierra Leone. Guinea.* (O. heptodon P. B.?)

album 9. O. ramis glabris, foliis ovatis craſſiusculis obtuſe ſerratis, verticillis racemorum approximatis, ante antheſin ſpicam 4gonam formantibus, corollis magnis crenatis. *Ind. or. Java.*

americanum 10. O. ramis teretiusculis glabris, foliis oblongo-lanceolatis ſerrulatis utrinque nudis, verticillis remotis racemoſis, corolla calycem excedente. *Amer. trop.*

grandiflorum Herit. 11. O. foliis oblongis ſerratis ſcabris ſubviſcoſis, racemo terminali, filamentis longiſſimis. *Abyſſinia. Arabia.* (O. filamentoſum Forsk.)

tomentoſum Lam. 12. O. ramis villoſis, foliis ſubrotundis dentatis tomentoſis, verticillis remotiusculis hirſutis. *C. B. S.*

verticillatum 13. O. foliis ovatis obtuſis ſubſerratis laevibus, pedunculis quaternis verticillatis. *C. B. S.*

virgatum Thb. 14. O. foliis obovato-oblongis ſerratis ſubtomentoſis, verticillis racemoſis, racemis virgatis. *Japon.*

inflexum Thb. 15. O. foliis ovatis acutis ſerratis ſcabris, ramis tomentoſis flexuoſis, racemis paniculatis. *Japon.*

ſcabrum Thb. 16. O. foliis oblongis acutis ſerratis ſubtus punctatis, ramis piloſis, racemis ſimplicibus, floribus oppoſitis. *Japon.* (O. punctatum Thb. jap.)

17.

rugoſum Thb. 17. O. foliis ovatis acuminatis ſerratis ſubtus rugoſis, ramis tomentoſis, racemis terminalibus contractis. *Japon.*

criſpum Thb. 18. O. foliis ovatis ſerratis criſpis glabris, ramis villoſis, racemis terminalibus laxis, calycibus hiſpidis. *Japon.*

acutum Thb. 19. O. foliis ovatis acuminatis ſerratis glabris, racemis filiformibus, racemis hiſpidis. *Japon.*

madagascarenſe Perſ. 20. O. foliis cordato-ovatis crenatis ramisque pubeſcentibus, bracteis ſubrotundis ſubtus villoſis. *Madagascar.*

paniculatum Perſ. 21. O. foliis ovatis acuminatis crenatis ſubtus pubeſcentibus, floribus ſubpaniculatis, pedicellis ramoſis. *Madagascar.*

macroſtachyon Poir. 22. O. foliis ovato-oblongis obtuſis ſubdentatis glabriusculis, ſpica denſa terminali, calycibus hiſpidis. *Ind. or.*

† *menthoides* 23. O. foliis lineari-lanceolatis ſerratis, verticillis ſpicatis, ſtaminibus longe exſertis. *Ceylon.*

† *tereticaule* Poir. 24. O. foliis lineari-lanceolatis remote ſerratis, ramis teretibus ſtrictis pubeſcentibus, floribus oppoſitis axillaribus minimis. *Patria?*

** *Foliis integerrimis.*

integerrimum W. 25. O. foliis oblongo-lanceolatis acuminatis glabris, verticillis remotiusculis ſubpiloſis, bracteis corollisque calyces ſuperantibus. *Ind. or.*

minimum 26. O. foliis ovatis integerrimis, ramis confertis caeſpitoſis, verticillis raris. *Ceylon.*

ſerpyllifolium Forsk. 27. O. foliis lanceolatis incano-villoſis ſubfaſciculatis, verticillis racemoſis, ſtaminibus longiſſimis. *Arabia. Afric. or.* (O. africanum Lour.)

2050. PLECTRANTHUS Herit.

* *Floribus calcaratis.*

fruticoſus Herit. 1. Pl. caule fruticoſo, foliis ovatis inaequaliter dentatis, racemi pedicellis ſubternis villoſiusculis, calcare aſcendente. *C. B. S.* (Germanea urticaefolia Lam.)

** *Corollae labio inf. gibboſo concavo.*

ſcutellarioides R. Br. 2. Pl. foliis ovatis obtuſe ſerratis ſubtus rubentibus, racemi pedicellis geminis ramoſis, bracteis cordatis, labio corollae inf. falcato. *Nov. Holl. Nov. Hebrid. Inſ. Molucc.* (Ocimum L.)

galeatus Vahl. 3. Pl. foliis cordato-ovatis acuminatis ſerratis villoſiusculis, racemo terminali compoſito, bracteis nullis, labio corollae inf. falcato. *Java. Nepal.*

congeſtus R. Br. 4. Pl. foliis ovatis crenatis villoſis rugoſis, verticillis congeſtis multifloris, pedicellis calyce pubeſcente brevioribus. *Nov. Holl.*

graveolens R. Br. 5. Pl. foliis ovatis crenatis villoſis rugoſiſſimis, verticillis diſtinctis, pedicellis calyce longioribus. *Nov. Holl.*

auſtralis R. Br. 6. Pl. foliis ovatis inciſo-crenatis ſubrugoſis pubeſcentibus, verticillis diſtinctis, pedicellis calycem ſubaequantibus. *Nov. Holl.*

amboinenſis * 7. Pl. foliis ſubcordatis obtuſis crenatis carnoſis piloſis incanis, verticillis ſpicatis, filamentis baſi connatis ſtylum vaginantibus. *Inſ. Molucc. Cochinchina.* (Coleus amboinicus Lour.)

monadelphus Heyn. 8. Pl. foliis ovatis obtuſis groſſe ſerratis pubeſcentibus, verticillis racemoſis, filamentis baſi connatis. *Ind. or.* (Ocimum Roth.)

incanus Link. 9. Pl. foliis cordatis obtuſis crenatis hirtis, verticillis ſpicatis, bracteis hirſutis florem ſubaequantibus. *Patria?*

monachorum * 10. Pl. foliis ovatis obtuſiuſculis ſerratis glabris, verticillis racemoſis, ſtaminibus baſi villoſis. *Ind. or.* (Ocimum L.)

mollis * 11. Pl. foliis profunde cordatis ovatis acutis ſerratis rugoſis villoſiuſculis, lobis baſeos approximatis inflexis, verticillis remotis paucifloris, bracteis ſubrotundo-cuneiformibus. *Ind. or.* (Ocimum molle Ait.)

nudiflorus W. 12. Pl. foliis cordatis acuminatis groſſe dentatis rugoſis glabris, ſuperioribus amplexicaulibus, verticillis paniculatis, bracteis cordatis ſeſſilibus, corollae tubo refracto. *China?*

aſper * 13. Pl. foliis ovali-oblongis crenatis aſperis ſubtus cinereo-tomentoſis, verticillis ſimpliciter racemoſis, bracteis ovatis acuminatis reflexis, calycibus piloſiſſimis, tubo corollae refracto. *Ind. or.* (Ocimum aſperum Roth.)

Forskolei W. 14. Pl. foliis ovatis obtuſis crenatis utrinque villoſis, verticillis racemoſis ebracteatis, tubo corollae refracto. *Arabia.* (Ocimum hadienſe Forsk.)

craſſifolius Vahl. 15. Pl. foliis ovatis acutis crenatis carnoſis rigidis, verticillis remotiuſculis bracteatis. *Aegypt. Arabia.* (Ocimum Zatarhendi *α.* Forsk.)

punctatus Herit. 16. Pl. foliis ovatis acutis dentatis rugoſiſſimis villoſis, caule maculato-punctato, verticillis approximatis, calycibus glanduloſis, corolla villoſa. *Abyſſinia.* (Ocimum punctatum L. ſuppl.)

rotundifolius * 17. Pl. foliis caulequc glabris, inferioribus petiolatis rotundato-ovalibus crenatis, ſuperioribus ſeſſilibus cordatis, floribus racemoſis confertis ſubſeſſilibus. *Inſ. Mascaren.* (Germanea Poir.)

thymiflorus * 18. Pl. foliis ſubrotundo-ovatis mucronatis groſſe ſerratis glabris, venis ſubtus fuſco-pubeſcentibus, caule ſuperne calycibusque coloratis, racemis laxis filiformibus, bracteis ſubrotundo-ovatis. *Ind. or.* (Ocimum Roth.)

triſtis * 19. Pl. foliis ovatis obtuſis ſerratis ſupra ſtrigoſo-ſcabris ſubtus fuſco-tomentoſis, verticillis racemoſis bracteatis. *Ind. or.* (Ocimum Roth.)

maypurenſis * 20. Pl. foliis ovatis groſſe ſerratis, ſerraturis crenulatis, ſupra ſcabriuſculis ſubtus cinereo-tomentoſis, racemi compoſiti pedunculis oppoſitis ſub-3floris bracteatis. *Ind. orient.* (Ocimum Roth.)

indicus * 21. Pl. foliis obovatis remote ſerratis glabris ſubtus punctatis, racemo nudo ſimplici apice foliis linearibus undulatis comoſo, bracteis obtuſis ſeſſilibus. *Ind. or.* (Ocimum Roth.)

viſcoſus * 22. Pl. viſcoſo-piloſiſſimus, foliis obovato-ſubrotundis obtuſe ſerratis ſubtus reticulato-rugoſis, verticillis racemoſis bracteatis. *Ind. or.* (Ocimum Roth.)

caninus Roth. 23. Pl. foliis obovatis obtuſis carnoſis integerrimis ſubpubeſcentibus in petiolum attenuatis, faſciculis florum racemoſo-ſpicatis denſe congeſtis ebracteatis. *Ind. or.*

† *Barrelieri* * 24. Pl. foliis ovatis utrinque attenuatis medio groſſe ſerratis ſcabris ſubtus punctatis, verticillis bracteatis denſe ſpicatis. *Ind. or.* (Ocimum Roth.)

parviflorus W. 25. Pl. foliis ovatis dentatis pubeſcentibus, pedunculis verticillatis calycibusque glabris. *Amer. auſtr.*

micranthus * 26. Pl. foliis rhombeo-lanceolatis crenatis calycibusque glanduloſis glabris, ſpicis ſecundis. *Nov. Holl.* (Pl. parviflorus R. Br.)

nankinenſis * 27. Pl. foliis reniformibus concavis fimbriatis coloratis, ſpicis axillaribus 4gono-prismaticis. *China.* (Dentidia nankinenſis Lour.)

dubius * 28. Pl. foliis cordato-ovatis ſerratis carnoſis, verticillis ſpicatis, calycis labii inf. dentibus conniventibus. *Ind. or.* (Lavandula carnoſa L. fil.)

2051. PRUNELLA.

vulgaris 1. Pr. foliis ovato-oblongis ſubdentatis, labio calycis ſup. truncato ſubdentato, corolla calycem duplo ſuperante. *Europ. Aſia. Amer. bor. Nov. Holl.*

pennſylvanica W. 2. Pr. foliis ovato-lanceolatis baſi dentatis, labio calycis ſup. truncato 3ariſtatc labium inf. aequante, corolla calycem duplo ſuperante. *Amer. bor.* (Pr. laciniata Walt.)

grandiflora 3. Pr. foliis ovato-oblongis baſi dentatis, labio calycis ſup. 3fido, corolla calycem quadruplo ſuperante. *Europ. Caucaſ.*

alba Pall. 4. Pr. foliis lanceolatis baſi ſubpinnatifido-inciſis, caule hirſutiſſimo, labio calycis ſup. truncato 3mucronato, corolla calycem ſubduplo ſuperante. *Europ. med. auſtr. Caucaſ.* (Pr. laciniata Mill. Lam.)

intermedia Link. Brot. 5. Pr. foliis inferioribus lanceolatis ſinuato-pinnatifidis, ſuperioribus lanceolato-linearibus, labio calycis colorati ſup. truncato. *Ital. ſup. Luſitan.* (Pr. inciſa Link.)

haſtata Brot. 6. Pr. foliis ſubhaſtato-cordato-oblongis ſubdentatis, caule baſi repente, labio calycis ſup. 8fido. *Luſitan.*

hyſſopifolia 7. Pr. caule erecto ramoſo, foliis lanceolatis integerrimis, labio calycis ſup. 3mucronato. *Gallia auſtr.*

aequinoctialis Humb. 8. Pr. caule erecto ramoſo, foliis oblongis dentato-crenatis, labio calycis ſup. 3lobo, lobis mucronatis. *Nov. Granat.*

2052. MELISSA.

officinalis 1. M. foliis ovatis acutis ſerratis, verticillis dimidiatis. *Europ. auſtr.* (M. hirſuta Balb. Horn. cordifolia Perſ. var.)

grandiflora 2. M. foliis ovatis acutis ſerratis, pedunculis ſub-3floris axillaribus bracteatis, corollis infundibuliformibus elongatis. *Carniolia. Italia. Graecia. Aſia minor.* (Thymus Scop. W. Cand.)

altiſſima Sm. 3. M. foliis cordatis crenatis ſubtus lanatis, pedunculis paucifloris axillaribus abbreviatis, bracteis cuſpidatis pedunculatis. *Graecia.*

pyrenaica Jacq. 4. M. foliis oblongis obtuſe dentatis rugoſis, caule ſubaphyllo, floribus verticillatis. *Auſtria. Pyren.* Horminum L.)

† *rugoſa* Lour. 5. M. foliis ovatis acuminatis ſerratis rugoſiſſimis, racemis confertis axillaribus terminalibusque. *Cochinchina.*

2053. DRACOCEPHALUM.

* *Spicata ſ. ſubſpicata, (floribus capitatis vel verticillis approximatis).*

virginianum 1. Dr. floribus ſpicatis confertis, bracteis ſubulatis, foliis lineari-lanceolatis ſerratis. *Amer. boreal.*

denticulatum Ait. 2. Dr. floribus ſpicatis remotiuſculis, bracteis ſubulatis, foliis obovato-lanceolatis apice denticulatis. *Virginia. Carolina.*

variegatum Vent. 3. Dr. ſpicis brevibus 4gonis, bracteis ovatis acutis, foliis arcte ſeſſilibus ovali-oblongis apice denticulatis. *Carolina auſtr.*

cordatum Nutt. 4. Dr. floribus ſpicatis ſecundis, bracteis late ovatis, foliis cordatis crenatis, radice ſtolonifera. *Inſ. fl. Ohio.*

cochinchinenſe Lour. 5. Dr. floribus ſpicatis, bracteis ſubrotundis acutis, foliis ovato-lanceolatis integerrimis villoſis. *Cochinchina.*

fruticuloſum W. 6. Dr. floribus ſubſpicatis, bracteis ellipticis denticulato-mucronatis, calycis laciniis aequalibus, foliis ellipticis integerrimis mucronatis. *Sibir.*

lamiifolium Desf. 7. Dr. floribus ſpicato-capitatis, calycis laciniis ſubaequalibus, foliis ovatis obtuſis crenatis hirſutis. *Creta.*

Ruyſchiana 8. Dr. verticillis approximatis, foliis bracteisque lineari-lanceolatis integerrimis. *Europ.*

auſtriacum 9. Dr. verticillis approximatis, foliis linearibus mucronatis, caulinis bracteisque 3partitis. *Auſtria. Hungar. Transſylvan. Caucaſ.*

origanoides W. 10. Dr. floribus ſpicato-capitatis, bracteis ſpathulatis coloratis dentatis corollam ſubſuperantibus, foliis cordato-ſubrotundis ſinuato-dentatis ſubtus tomentoſis. *Sibir.*

botryoides Stev. 11. Dr. floribus ſpicatis, bracteis inferioribus oblongis 3dentatis mucronatis ſuperioribus lanceolatis corolla brevioribus, foliis ſubcordatis ſinuato-lobatis incano-tomentoſis. *Caucaſ.*

palmatum W. 12. Dr. floribus ſubſpicatis, calycis labio ſuperiori indiviſo mucronato, foliis ſubrotundo-oblongis baſi attenuatis ſinuato-dentatis pubeſcentibus. *Sibir.*

canarienſe 13. Dr. floribus ſpicatis, foliis ternatis lanceolatis ſerratis, lateralibus ſub-2lobis. *Inſ. Canar.*

pinnatum 14. Dr. floribus ſpicatis, bracteis lanceolatis coloratis ciliatis, calycibus corollae tubum ſuperantibus, foliis cordatis pinnatifido-ſinuatis. *Sibir.*

** *Verticillata.*

peregrinum 15. Dr. verticillis remotiusculis ſubſecundis, bracteis lineari-lanceolatis ſpinuloſo-ſubdenticulatis, foliis lanceolatis remote mucronato-dentatis. *Sibir.*

argunenſe Fiſch. 16. Dr. verticillis remotiusculis, foliis bracteisque lineari-lanceolatis acutis integerrimis, calycis laciniis aequalibus. *Sibir.*

grandiflorum 17. Dr. verticillis remotiusculis, bracteis lanceolatis integerrimis, calycis lab. ſup. elliptico obtuſo integerrimo, foliis oblongis obtuſis dentatis petiolatis. *Sibir.*

altaienſe Laxm. 18. Dr. verticillis remotiusculis, bracteis oblongis mucronato-dentatis, calycis laciniis aequalibus, foliis radicalibus cordato-oblongis obtuſis dentatis, caulinis amplexicaulibus ſubrotundis crenatis. *Imaus.*

Moldavica 19. Dr. verticillis remotiusculis, bracteis lanceolatis ſerratis, denticulis ciliato-ariſtatis, foliis oblongo-lanceolatis profunde crenatis ſubtus punctatis. *Podolia auſtr. Moldavia. Sibir.*

paroiflorum Nutt. 20. Dr. verticillis ſubcapitatis, bracteis ovatis mucronato-ſerratis, calycis corollam ſubaequantis labio ſup. ovato emarginato, foliis ovato-lanceolatis profunde ſerratis. *Ad fl. Miſſuri.*

caneſcens 21. Dr. verticillis remotiusculis, bracteis oblongis ciliato-ſpinuloſis, calycibus ſtriatis tubo corollae brevioribus foliisque oblongis obtuſis dentatis caneſcentibus. *Aſia minor.*

ibericum Stev. 22. Dr. verticillis remotiusculis, bracteis ſpathulatis elongato-ciliatis, calycibus ſtriatis tubum corollae ſubexcedentibus, foliis oblongis integerrimis. *Iberia. Tauria?* (Dr. odoratiſſimum Poir.)

peltatum 23. Dr. verticillis remotis, bracteis orbiculatis ciliatis, labio ſup. obtuſo calycis tubum corollae ſuperantis, foliis oblongis obtuſis ſerratis. *Aſia minor.*

thymiflorum 24. Dr. verticillis remotis, bracteis oblongis integerrimis, corollis vix calycem ſuperantibus, foliis oblongis dentatis. *Sibir.*

nutans 25. Dr. verticillis remotis, bracteis ovato-oblongis integerrimis, corollis calyce duplo longioribus nutantibus, foliis oblongis dentatis. *Imaus.*

**** Inflorescentia aliena.*

chamaedryoides Balb. 26. Dr. pedunculis axillaribus geminis, calycis dentibus ſuperioribus brevioribus, foliis lineari-lanceolatis crenatis rugoſis. *Patria?*

ſibiricum 27. Dr. pedunculis oppoſitis axillaribus cymoſis, bracteis ſubulatis, genitalibus incluſis, foliis cordato-lanceolatis acuminatis ſerratis. *Sibir.*

mexicanum Kunth. 28. Dr. pedunculis axillaribus cymoſis, bracteis ſubulatis, genitalibus exſertis, foliis ſubcordato-lanceolatis ſerratis. *Mexico.*

2054. PRASIUM.

majus 1. Pr. foliis cordato-ovatis acutis crenatis glabris, dentibus calycis ovatis acutis mucronatis. *Neapol. Sicil. Afric. bor. Peloponneſ. Aſia minor.*

minus 2. Pr. foliis ſubcordato-oblongis crenatis hirſutis, dentibus calycis obtuſis. *Corſica. Gallia auſtr. Creta.*

2055. PHRYMA.

leptoſtachya *Amer. bor.* Herba cubitalis, caule gracili pubeſcente, foliis ovato-oblongis acutis ſerratis, floribus oppoſitis racemoſo-ſpicatis purpuraſcentibus.

2056. CLEONIA.

luſitanica *Hiſpan. Luſitan. Afric. bor.* Herba hirta, foliis pinnatifidis, floribus ſpicato-capitatis violaceis, bracteis pectinato-ciliatis.

2057. TRICHOSTEMMA.

dichotomum 1. Tr. foliis oblongis integerrimis, racemis laxis pubeſcentibus. *Amer. bor.* (Tr. piloſum Roth.)

lineare Mühlb. 2. Tr. foliis linearibus craſſiusculis glabris, racemis laxis viſcido-pubeſcentibus. *Amer. boreal.* (Tr. dichotomum Roth.)

ſpirale Lour. 3. Tr. foliis ovatis acutis integerrimis tomentoſis, floribus ſpicatis, ſtaminibus ſpiratim convolutis. *Cochinchina.*

2058. THYMUS.

* *Floribus arcte capitatis.*

villosus 1. Th. bracteis imbricatis ovato-lanceolatis subdentatis, foliis setaceis fasciculatis pilosis, caule villoso. *Lusitan.*

capitellatus Link. 2. Th. capitulis subglobosis, bracteis ovatis obtusis subtus incanis, foliis linearibus abbreviatis margine revolutis glabriusculis. *Lusitan.*

cephalotus 3. Th. capitulis oblongis, bracteis ovato-oblongis integerrimis coloratis imbricatis, foliis linearibus fasciculatis, caule villoso. *Hispania. Lusitania.*

mumidicus Poir. 4. Th. capitulis oblongis, bracteis lanceolatis acutis ciliatis, calycibus villosis, foliis linearibus subtus nervosis punctatis. *Afric. bor. Hispania.* (Th. capitatus Lag. hispanicus Poir.)

laevigatus Vahl. 5. Th. capitulis subglobosis, bracteis lanceolatis obtusis, foliis spathulato-linearibus obtusis punctatis basi ciliatis, caule procumbente. *Arabia.* (Th. Serpyllum Forsk.)

striatus Vahl. 6. Th. capitulis ovatis, bracteis subovatis striatis, foliis linear-lanceolatis margine punctatis. *Neapol.* (Th. Marinosci Tenor.)

Richardi Pers. 7. Th. bracteis ovatis calycibusque rigidis, foliis late ovatis subtus nervosis. *Inf. balear.*

creticus Brot. 8. Th. bracteis oblongis ciliatis corolla brevioribus, staminibus exsertis, ramis tomentosis, foliis linear-lanceolatis fasciculatis glabris ciliatis. *Ad oras maris mediterranei omnes.* (Satureia capitata L. Th. capitatus Link.)

hirsutissimus Poir. 9. Th. capitulis ovatis villosissimis, bracteis lanceolatis ciliatis, foliis ovato-lanceolatis subsessilibus hirsutis, caule ramoso. *Asia minor.*

** *Floribus laxe capitatis aut verticillato-spicatis.*

odoratissimus MB. 10. Th. floribus laxiuscule capitatis, staminibus exsertis, ramis virgatis pubescentibus, foliis linear-setaceis ciliatis. *Podolia austr. Tauria. Ad Volgam.*

acicularis Kit. 11. Th. floribus laxiuscule capitatis, bracteis ovatis coloratis, ramis virgatis pubescentibus, foliis linearibus obtusis lineato-venosis punctatis ciliatis. *Croatia.*

hirsutus MB. 12. Th. floribus subcapitatis, dentibus calycis subulatis subaequalibus, foliis linearibus undique pilosissimis, caule repente. *Croatia. Hispania?* (Th. hirtus W.)

Zygis 13. Th. floribus verticillato-capitatis, ramis erectis calycibusque hirsutis, foliis linearibus obtusis basi attenuatis ciliatis subtus revolutis incanis. *Hispan. Lusitan.*

Marschallianus W. 14. Th. verticillis subracemosis, dentibus calycis subaequalibus subulatis hirsutis, ramis erectis villosis, foliis linear-oblongis obtusis subtus pla-

nis lineatis glabriusculis. *Europ. auſtr. Tauria.* (Th. glabratus Link.)

anguſtifolius Schreb. 15. Th. floribus glomerato-capitatis, dentibus calycis inaequalibus, inferioribus ſubulatis, ramis aſcendentibus hirſutis, foliis lineari-oblongis obtuſis ſubtus planis pallidis lineatis ciliatis. *Europ.*

Serpyllum 16. Th. floribus glomerato-capitatis verticillatisque, calycis hirſuti limbo discolore, ſtaminibus corollam ſubaequantibus, foliis ovalibus baſi ciliatis, caule decumbente, ramis aſcendentibus. *Europ. Aſia.* (Th. includens Ehrh.)

exſerens Ehrh. 17. Th. floribus glomerato-capitatis verticillatisque, calyce glabriusculo, ſtaminibus corollam excedentibus, ramis erectis, foliis ovali-oblongis baſi ſubciliatis. *Europ.*

collinus MB. 18. Th. floribus laxe verticillato-capitatis, calycis limbo concolore, ſtaminibus corollam ſubaequantibus, foliis ellipticis glabriusculis baſi ſubciliatis, caule undique hirto. *Podolia. Tauria. Caucaſ.* (Th. Serpyllum MB. tom. 2.)

montanus Kit. 19. Th. floribus verticillato-ſpicatis, calycibus nudiusculis, ſtaminibus corollam ſubexcedentibus, foliis ovato-ellipticis glabris, caule ramisque erectis pubeſcentibus. *Hungar. Transſylvan.* (Th. majoranaefolius Desf. Poir. nummularius MB.)

lanuginoſus Schk. 20. Th. floribus verticillato-racemoſis, ſtaminibus exſertis, foliis ſubrotundis ramisque undique hirtis. *Europ.* (Th. pannonicus Schult.)

lucidus Ehrh. 21. Th. floribus verticillato-racemoſis, ſtaminibus corolla brevioribus, foliis ovali-oblongis acutiusculis glaberrimis ſupra lucidis ſubtus lineatis, caule erecto ramoſo. *Patria?*

vulgaris 22. Th. floribus verticillato-racemoſis, ſtaminibus corollam aequantibus vel ſuperantibus, foliis ovatis glabris ſubtus revolutis, caule erecto. *Europ. auſtr. Sibir.*

Maſtichina 23. Th. floribus verticillato-capitatis, calycis lanati dentibus ſubulatis elongatis pectinato-ciliatis, foliis oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis glabris ſubintegerrimis. *Hiſpania.*

tomentoſus W. 24. Th. floribus verticillato-ſpicatis, calycis lanati dentibus ſetaceo-ciliatis, foliis ellipticis integerrimis utrinque tomentoſis. *Hiſpania.*

albicans Link. 25. Th. floribus verticillato-capitatis, dentibus calycis ſubulatis ſubaequalibus, foliis lanceolatis acutis ſubtus albidis, ramulis filiformibus. *Luſitania.*

lanceolatus Desf. 26. Th. floribus verticillato-ſpicatis, dentibus calycis linearibus ſubinaequalibus, ſtaminibus corolla longioribus, foliis oblongis pubeſcentibus, caule erecto. *Atlas. Graecia.*

caeſpiticius 27. Th. capitulis paucifloris, ſtaminibus corollam ſuperantibus, foliis lineari-lanceolatis revolutis glabriusculis, ramis diffuſis proſtratis radicantibus. *Luſitan.* (Th. repens Link.)

**** Floribus verticillatis, verticillis distinctis.*

Acinos 28. Th. verticillis 6floris, calycibus basi gibbosis hirsutis corolla dimidio brevioribus, foliis oblongis acutis subserratis, caule erecto ramoso villoso. *Europ. Asia med.*

graveolens MB. Sm. 29. Th. verticillis 6floris, calycibus basi gibbis hirsutissimis corollam subaequantibus, foliis ovatis acutis serratis. *Tauria. Caucas. Graecia.* (Th. canus Stev.)

acinoides Tenor. 30. Th. verticillis 6floris subapproximatis, calycibus subsessilibus basi gibbosis hirsutis corolla duplo brevioribus, foliis inferioribus ovatis obtusis superioribus lanceolatis acutis subintegerrimis, caule ascendente simpliusculo. *Neapol. Helvetia.* (Th. heterophyllus Poir.)

patavinus Ait. 31. Th. verticillis sub-6floris, calycibus pubescentibus basi gibbosis corolla fauce inflata subtriplo brevioribus, foliis subrotundo-ovatis acutis serratis subtus lineatis. *Europ. austr.* (Acynos rotundifolius Pers.)

alpinus 32. Th. verticillis paucifloris, calycibus hirsutis basi subgibbosis corolla fauce inflata subtriplo brevioribus, foliis subrotundis obtusiusculis concavis serratis. *Alp. Europ. med. et austr.* (Acynos purpurascens Pers.)

corsicus Pers. 33. Th. verticillis paucifloris, calycibus hirsutis basi subaequalibus corolla duplo brevioribus, foliis orbiculatis integerrimis margine subcartilagineis glabriusculis, ramis repentibus. *Corsica.*

Herba barona Loisl. 34. Th. verticillis sub-3floris, calycibus subcampanulatis glabriusculis basi aequalibus corolla dimidio brevioribus, foliis lanceolatis utrinque attenuatis glabris, ramis erectiusculis. *Corsica.*

Syrticus * 35. Th. verticillis sub-4floris, ramis floriferis subaphyllis, calycibus hispidissimis corolla minoribus, foliis linearibus margine revolutis undulatis hispidis, caule erecto ramoso. *Ad Syrtim magnam Afric. bor.* (Th. hirtus Viv.)

Tragoriganum 36. Th. verticillis sub-6floris bracteatis, calycibus cylindricis hispidis corolla subbrevioribus, foliis lineari-lanceolatis rigidis hirsutis. *Creta. Graecia. Cyprus.*

suaveolens Sm. 37. Th. verticillis paucifloris, foliis elliptico-lanceolatis mucronatis subserratis hirtis, caule suffruticoso. *Parnassus Graeciae.*

exiguus Sm. 38. Th. verticillis paucifloris, foliis oblique rhombeis mucronatis subintegerrimis, corolla filiformi. *Cyprus.*

***** Pedunculis subsolitariis unifloris.*

Brownei Sw. 39. Th. pedunculis oppositis capillaribus demum deflexis, calycibus cylindricis, dentibus aequalibus lanceolatis, caule ascendente gracili foliisque subrotundis crenatis glaberrimis. *Jamaica.*

filiformis Ait. 40. Th. caule filiformi decumbente, foliis cordatis acutis integerrimis. *Inf. balear.*

fruticulosus Bertol. 41. Th. caule suffruticoso ramosissimo ascendente, foliis lanceolatis nervosis margine revolutis hirsutiusculis, pedunculis solitariis 2bracteatis. *Sicilia.* (Satureia fasciculata Rafin.)

nubigenus Humb. 42. Th. caule suffruticoso prostrato, foliis subrhombeo-ovatis obtusis integerrimis, pedunculis abbreviatis, calycibus corolla superne ampliata duplo brevioribus. *Alp. Quito.*

xalapensis Humb. 43. Th. caule herbaceo procumbente filiformi, foliis subcordatis obtusis crenatis pilosiusculis, pedunculis elongatis, calycibus corolla brevioribus. *Mexico.*

*† *Pedunculis axillaribus 3-multifloris subcymosis.*

Teneriffae Perf. 44. Th. pedunculis folia aequantibus sub-3floris, calycibus hirsutiusculis, dentibus subaequalibus, foliis oblongo-lanceolatis glabris, ramis filiformibus decumbentibus. *Teneriffa. Sicil. austr.* Guss. (Th. terebinthaceus W.)

Barrelieri * 45. Th. pedunculis folia subaequantibus verticillatis bracteatis 2-3floris, dentibus calycis subulatis inaequalibus, foliis ovatis obtusiusculis subdentatis cauleque erecto albido-villosis. *Gallia austr. Sicil. Graecia.* (Melissa cretica L. Thymus creticus Cand.)

subnudus * 46. Th. pedunculis sub-3floris axillaribus folio brevioribus, caule erecto foliisque ovatis obtusis subdentatis glabriusculis. *Hungar.* (Melissa subnuda Kit.)

inodorus Desf. 47. Th. pedunculis 2-3floris confertis racemosis folio brevioribus, dentibus calycis subulatis inaequalibus staminibusque corolla brevioribus, foliis linearibus fasciculato-confertis pubescentibus, caule fruticoso erecto. *Afric. bor. Neapol. Hispan.* (Th. ericaefolius Roth. W.)

micranthus Brot. 48. Th. pedunculis verticillatis sub-3floris folio brevioribus, calycibus staminibusque corolla subbrevioribus, caule erecto stricto foliisque ovato-oblongis subtus venosis pubescentibus. *Lusitan. Neapol.* (Th. virgatus Tenor.)

microphyllus Urv. 49. Th. pedunculis sub-3floris folia superantibus, calycibus corolla duplo brevioribus, foliis minimis ovatis nervosis, caule prostrato, ramis filiformibus. *Inf. Melita.*

incanus Sm. 50. Th. pedunculis sub-6floris, calycibus corollam subaequantibus, foliis subrotundis integerrimis incano-tomentosis. *Attica. Inf. maris aegei.*

† *veronicaefolius* * 51. Th. pedunculis elongatis ramosis, calycibus glabris, foliis ovatis serratis, caule ramoso diffuso. *Inf. baham.*

Piperella 52. Th. pedunculis multifloris lateralibus secundis, calycibus coloratis, foliis subrotundis obtusis nervosis glabris, caule ascendente. *Hispania. Italia. Croatia.* (Th. croaticus Perf.)

Calamintha Scop. Sm. 53. Th. pedunculis cymoſis, inferioribus folio brevioribus, floribus glomeratis, foliis ovatis ſubſerratis cauleque erecto hirſutiusculis. *Anglia. Europ. auſtr.* (Meliſſa Calamintha L., umbroſa MB. Th. Moſcatella Pollin. varr.)

Nepeta Scop. Sm. 54. Th. pedunculis dichotomo-corymboſis folio longioribus, foliis ovatis ſerratis cauleque aſcendente hirſutis. *Anglia. Europ. auſtr.* (Meliſſa Nepeta L. Th. multiflorus Perſ.)

2059. GARDOQUIA R. et P.

* *Pedunculis ſolitariis unifloris.*

grandiflora Kunth. 1. G. foliis obovatis obtuſis ſubdentatis ſubtus incano-tomentoſis, pedunculis abbreviatis, corolla (flava) calycem 4plo ſuperante. *Quito.*

argentea Kunth. 2. G. foliis oblongo-lanceolatis obtuſis integerrimis margine revolutis utrinque argenteo-ſericeis, pedunculis abbreviatis, corolla (coccinea) calycem 3plo excedente. *Peru.*

glabrata Kunth. 3. G. foliis oblongo-lanceolatis ſubſerratis revolutis ſupra nitidis ſubtus glandulоſis, pedunculis abbreviatis, corolla calycem duplo excedente. *Quito.*

taxifolia Kunth. 4. G. foliis lineari-lanceolatis integerrimis glabris ſubtus punctatis, ramis villoſis, pedunculis abbreviatis. *Nov. Granat.*

discolor Kunth. 5. G. foliis oblongis utrinque attenuatis integerrimis venoſis ſubtus incano-ſericeis, pedunculis bracteatis. *Nov. Granat. Peru.* (G. ſtriata R. et P.?)

microphylla Kunth. 6. G. foliis cordato-ovatis obtuſis revolutis ciliatis, corolla (rubra) calycem multoties ſuperante. *Peru. Quito.* (G. revoluta R. et P.)

** *Pedunculis unifloris ſubverticillatis.*

obovata R. et P. 7. G. foliis obovato-ellipticis integerrimis utrinque ſtellato-pubeſcentibus, floribus ſubternis axillaribus breviſſime pedunculatis. *Peru. Monte Video.*

elliptica R. et P. 8. G. foliis ovato-ellipticis ſerratis, floribus ſubternis axillaribus. *Peru.*

thymoides Kunth. 9. G. foliis ſubcordato-ovatis acutis ſubſerratis margine revolutis ſubtus incano-pubeſcentibus, verticillis multifloris diſtantibus. *Quito.*

*** *Pedunculis triforis.*

tomentoſa Kunth. 10. G. foliis ſubrotundo-ovatis acutiusculis ſubſerratis ſubtus albido-tomentoſis, pedunculis axillaribus 3floris. *Quito.* (G. incana R. et P.)

elegans Kunth. 11. G. foliis ſubrotundo-ovatis obtuſis crenatis ſubtus albido-tomentoſis, pedunculis axillaribus 3floris. *Peru. Quito.* (G. pulchella Kunth.)

****** *Pedunculis multifloris.***

multiflora R. et P. — 12. G. foliis ovatis ferratis, pedunculis multifloris. *Chili.*

2060. THYMBRA.

spicata — 1. Th. ramis lignosis rigidis, foliis linearibus glabris acutis, junioribus fasciculatis obtusis ciliatis, floribus spicatis, bracteis lanceolatis albo-fimbriatis. *Graecia. Creta. Asia minor. Syria. Palaestina.*

† *ambigua* Clark. — 2. Th. floribus verticillato-spicatis, bracteis lanceolatis flores superantibus, foliis 4fariam imbricatis linearibus obtusissimis punctatis ciliatis. *Ad Thermopylas Graeciae.* (Th. verticillata L.)

ciliata Desf. — 3. Th. floribus capitatis, bracteis ovato-oblongis striatis, foliis linearibus ciliatis punctatis, ramis erectis lanatis. *Afric. bor.*

2061. LEPECHINIA W.

spicata W. — 1. L. spicis pedunculatis bracteatis, foliis ovato-oblongis basi truncatis crenatis. *Mexico.* (Horminum caulescens Orteg.)

clinopodifolia W. — 2. L. floribus verticillato-capitatis, foliis oblongis basi attenuatis remote serratis. *Sibir.* (Horminum Pers.)

2062. CLINOPODIUM.

vulgare — 1. Cl. capitulis verticillatis, bracteis setaceis hispidis, foliis supra pilosis remote dentatis. *Europ. Asia. Amer. bor.*

aegyptiacum Lam. — 2. Cl. capitulis terminalibus, bracteis setaceis hispidis, foliis supra glabris subintegerrimis. *Aegypt.*

origanifolium Labill. — 3. Cl. capitulis verticillatis, bracteis lineari-lanceolatis hispidis, foliis ovatis integerrimis hirsutis. *Libanus.*

asiaticum Lour. — 4. Cl. verticillis spicatis, bracteis hirsutis, foliis ovato-oblongis obtusis subserratis rugosis subtus tomentosis. *Cochinchina.*

2063. MELITTIS.

Melissophyllum — 1. M. foliis ovatis aequaliter serratis, calyce glabro 3fido, laciniis integerrimis. *Europ.*

grandiflora Sm. — 2. M. foliis ovatis aequaliter serratis, calyce glabro 4fido, labio corollae sup. emarginato. *Anglia.*

caroliniana * — 3. M. foliis rhombeo-ovalibus apice subdentatis glabriusculis, calyce villoso inaequaliter 3fido. *Georgia. Carolina.* (Thymbra caroliniana Walt. Thymus carolinianus Mx. Th. grandiflorus Sims. Calamintha grandiflora Pursh. Macbridea pulcra Ell. Nutt.)

†*japonica* Thb. 4. M. foliis alternis ovatis obtusis inaequaliter serratis villosis, pedunculis axillaribus solitariis, calycibus 5fidis hirsutis. *Japon.*

2064. SCUTELLARIA.

* *Floribus axillaribus solitariis.*

galericulata 1. Sc. caule deorsum pubescente, foliis cordato-lanceolatis crenato-serratis, floribus secundis. *Europ. Asia.*

hastifolia 2. Sc. caule sursum pubescente, foliis subhastatis subintegerrimis, floribus secundis. *Europ.*

minor 3. Sc. caule glabro gracili, foliis inferioribus cordato-ovatis suberenatis superioribus lanceolatis integerrimis, floribus secundis. *Europ.*

gracilis Nutt. 4. Sc. caule simpliciusculo, foliis late ovatis dentatis sessilibus, superioribus angustioribus, floribus exiguis. *Pensylvania.*

ambigua Nutt. 5. Sc. caule decumbente ramoso, foliis ovatis remote dentatis supra hirsutiusculis, floribus exiguis. *Ad fl. Ohio.*

havanensis Jacq. 6. Sc. caule procumbente tenello, foliis cordato-ovatis crenatis, corollae labio utroque trifido. *Cuba.*

parvula Mx. 7. Sc. caule humili foliisque omnibus ovatis integerrimis dense pubescentibus. *Amer. bor.*

humilis R. Br. 8. Sc. foliis cordato-ovatis grosse crenatis subtus punctatis pubescentibus. *Nov. Holland. Terra Diemen.*

mollis R. Br. 9. Sc. foliis cordato-oblongis inciso-crenatis glanduloso-pilosis, pedunculis petiolos aequantibus. *Nov. Holl.*

rumicifolia Kunth. 10. Sc. caule erecto ramoso glabro, foliis cordato-sagittatis integerrimis, superioribus lanceolatis. *Mexico.*

cumanensis Kunth. 11. Sc. caule fruticoso glabro, foliis subrotundis obtusis crenatis utrinque hirsutis subtus incanis. *Cumana.*

volubilis Kunth. 12. Sc. caule volubili, ramis 4angulis pilosis, foliis ovalibus crenatis utrinque villosis subtus incanis. *Nov. Granat.*

angustifolia Pursh. 13. Sc. caule simplici tenuissime pubescente, foliis linearibus, floribus oppositis axillaribus, genitalibus subexsertis. *Ad montes scopulosos Amer. boreal.*

†*Adamsii* * 14. Sc. foliis lineari-lanceolatis, infimis subserratis, corollis villosis. *Inter Casan. et Permiam.* (Sc. angustifolia Adam.)

** *Racemis spicatis axillaribus.*

malvaefolia Humb. 15. Sc. floribus axillaribus subspicatis, foliis subrotundo-ovatis obtuse grosse crenatis supra strigosis. *Nov. Granat.*

grandiflora Sims. 16. Sc. spicis brevissimis 4gonis, corollis hirsutis bracteas quater superantibus, foliis cordatis in-

ciſo-crenatis utrinque pubeſcentibus petiolo brevioribus. *Sibir.*

lateriflora 17. Sc. racemis laxis bracteatis axillaribus, bracteis pedicellos ſuperantibus, caule ramoſo foliisque ovato-oblongis acutis profunde ſerratis glaberrimis, radice repente. *Amer. bor.*

**** Racemis terminalibus*

† *ſimplicibus.*

orientalis 18. Sc. racemis laxiusculis folioſis ſubtetragonis, bracteis calyces ſuperantibus, foliis ſubcordato-ovato-oblongis inciſo-crenatis ſubpinnatifidis ſubtus albidis. *Aſia minor.*

hirta Sm. 19. Sc. racemis ſpicatis ſubſecundis, bracteis petiolatis flore duplo brevioribus, caule decumbente foliisque ſubcordato-ovatis crenatis villoſiſſimis. *Creta. Libanus.* (Sc. decumbens Sieber. utriculata Labill.)

alpina 20. Sc. racemis ſpicatis rotundato-4gonis, bracteis imbricatis ſeſſilibus flore duplo brevioribus, caule aſcendente villoſiusculo, foliis ſubcordato-ovatis crenatis. *Alp. Europ. med. Cochinchina.*

peregrina 21. Sc. racemis ſpicatis elongatis ſecundis, bracteis petiolatis ovatis calycem ſuperantibus, foliis cordatis ſerratis glabris. *Italia. Hungar. Sibir.*

altiſſima 22. Sc. racemis ſpicatis elongatis ſecundis pubeſcentibus, bracteis petiolatis ovatis calycem ſubaequantibus, foliis cordatis crenato-ſerratis acutis glabriusculis. *Tauria. Caucaſ. Sibir.*

pallida MB. 23. Sc. racemis ſpicatis elongatis ſecundis piloſo-hiſpidis, bracteis petiolatis ovatis calycem ſuperantibus, foliis cordatis obtuſiusculis crenato-ſerratis villoſis. *Tauria.*

Columnae All. 24. Sc. racemis ſpicatis elongatis ſecundis, bracteis petiolatis ovatis calyce brevioribus, foliis cordatis oblongis ſerratis pubeſcentibus. *Italia.*

rubicunda Hornem. 25. Sc. racemis ſpicatis elongatis ſecundis, bracteis petiolatis ovatis flores ſuperantibus, foliis ovatis groſſe ſerratis glabris. *Patria?*

nigreſcens * 26. Sc. racemis ſpicatis ſecundis, bracteis ſubſeſſilibus oblongis calyces villoſiſſimos ſuperantibus, foliis cordato-ovatis crenatis ſubtus ramisque caneſcentibus. *Creta.* (Sc. hirta Sieb.)

albida 27. Sc. racemis ſpicatis ſecundis elongatis, bracteis remotiusculis ovatis petiolatis calyces villoſiusculos ſuperantibus, foliis ovato-oblongis obtuſiusculis crenatis. *Graecia. Aſia minor. Cochinchina.*

lupulina 28. Sc. racemis laxis ſubſpicatis aequalibus, bracteis oblongis glabris coloratis calyces piloſiſſimos longe ſuperantibus deciduis, foliis ovato-oblongis obtuſis crenatis glaberrimis. *Sibir.*

integrifolia 29. Sc. racemis laxis aequalibus folioſis, calycibus glabris, foliis inferioribus oblongis obſolete ſer-

ratis, ſuperioribus lanceolatis integerrimis. *Amer. bor.* (Sc. hyſſopifolia L.)

purpuraſcens Sw. 30. Sc. racemis laxis, bracteis ſubrotundis minutis longe petiolatis, calycibus glabris, corollae labio utroque 3fido, foliis ovato-ſubrotundis repandis glaberrimis. *Ind. occ.*

coccinea Humb. 31. Sc. racemis laxis, bracteis lanceolatis obtuſis pedicellos aequantibus, foliis oblongis obtuſis integerrimis glabris ſubtus purpuraſcentibus. *Nov. Granat.*

incarnata Vent. 32. Sc. racemis ſpicatis ſubſecundis, bracteis lineari-lanceolatis pedicellos aequantibus, calycibus villoſis, foliis cordatis dentatis ſubtus tomentoſis. *Amer. auſtr.*

†*caroliniana* Lam. 33. Sc. racemis laxis folioſis, calycibus obtuſis, foliis lineari-lanceolatis acutis integerrimis caulequeque ramoſo glaberrimis. *Carolina.*

nervoſa Pursh. 34. Sc. racemo laxo folioſo, foliis ſeſſilibus ovatis dentatis nervoſis cauleque ſimplici glabris. *Virginia.*

†† *Racemo terminali compoſito.*

pilofa Mx. 35. Sc. bracteis ovatis petiolatis pedicellos ſuperantibus, foliis remotis oblongis obtuſis baſi attenuatis crenatis pubeſcentibus. *Amer. bor.* (Sc. elliptica Mühlenb., ovalifolia Perſ., caroliniana Walt.)

ſerrata Andr. 36. Sc. bracteis lanceolatis pedicello brevioribus, foliis ovatis acuminatis ſerratis pubeſcentibus ſubtus incanis. *Amer. bor.* (Sc. pubeſcens Mühlenb.)

canescens Nutt. 37. Sc. bracteis ovato-lanceolatis calyce longioribus, foliis ſubcordato-ovatis acutis ſerratis ſubtus racemisque incano-villoſis. *Ad fl. Ohio.*

verſicolor Nutt. 38. Sc. bracteis ovatis viſcido-pubeſcentibus, foliis late cordatis obtuſe dentatis glabriusculis. *Ad fl. Ohio.*

2065. CHILODIA R. Br.

ſcutellarioides R. Br. *Nov. Holl.* Frutículus foliis linearibus integerrimis, floribus axillaribus ſolitariis.

2066. PROSTANTHERA Labill.

* *Floribus axillaribus ſubſolitariis.*

denticulata R. Br. 1. Pr. foliis linearibus apice denticulatis ſubtus revolutis glanduloſis, calycibus piloſiusculis. *Nov. Holl.*

marifolia R. Br. 2. Pr. foliis oblongo-lanceolatis integerrimis piloſis, calycis hirſuti labio inf. retuſo, autherarum calcaribus elongatis. *Nov. Holl.*

rhombea R. Br. 3. Pr. foliis rhombeo-orbiculatis integerrimis ſubtus glanduloſis, calycibus pubeſcentibus, autherarum calcaribus abbreviatis. *Nov. Holl.*

retusa R. Br. 4. Pr. foliis orbiculatis crenatis utrinque glandulosis, calycis labio inf. retuso, antherarum calcaribus abbreviatis. *Terra Diemen.*

** *Racemis pauciflоris.*

coerulea R. Br. 5. Pr. foliis lanceolatis dentatis glabris. *Nov. Holl.*

rotundifolia R. Br. 6. Pr. foliis orbiculatis crassiusculis glabris subintegerrimis, ramulis tomentosis. *Terra Diemen.*

incisa R. Br. 7. Pr. foliis obovatis incisis utrinque glandulosis, calycis labio inf. angustiori duplo longiori. *Nov. Holl.*

saxicola R. Br. 8. Pr. foliis lineari-oblongis integerrimis pilosiusculis, racemo foliato, calycis hirsutiusculi labio utroque integerrimo subaequali, antherarum calcaribus elongatis. *Nov. Holl.*

violacea R. Br. 9. Pr. foliis subrotundis crenatis glandulosis pubescentibus, calycis labio inf. duplo longiori angustiori. *Nov. Holl.*

*** *Racemis subcompositis terminalibus.*

linearis R. Br. 10. Pr. foliis linearibus integerrimis subtus revolutis laevibus, calycibus glabris. *Nov. Holl.*

ovalifolia R. Br. 11. Pr. foliis ovalibus subintegerrimis glabris, ramulis corollisque extus pubescentibus. *Nov. Holl.*

prunelloides R. Br. 12. Pr. foliis ovatis acutis inciso-dentatis glabris, bracteis deciduis, corollis extus hirsutis, antherarum calcaribus elongatis. *Nov. Holl.*

lasiantha Labill. 13. Pr. foliis lanceolatis dentato-serratis glabris, racemis paniculatis, corollis hirsutis, antherarum calcaribus elongatis. *Nov. Holland. Terra Diemen.*

2067. CRYPHIA R. Br.

serpyllifolia R. Br. 1. Cr. foliis lineari-oblongis planiusculis calycibus ramulisque glabriusculis. *Nov. Holl. austr.*

microphylla R. Br. 2. Cr. foliis ovalibus convexis minutissimis fasciculatis calycibus ramulisque pilosiusculis. *Nov. Holl. austr.*

2068. PERILOMIA Kunth.

scutellarioides Kunth. 1. P. foliis ovatis acuminatis crenatis, calycibus glabriusculis, fructibus verruculoso-asperis. *Peru.*

ocimoides Kunth. 2. P. foliis subrotundo-ovatis acutis crenatis, calycibus pubescentibus, fructibus laevibus. *Quito.*

dubia * 3. P. foliis ovato-oblongis acutis serratis, calycibus fructibusque pubescentibus. *Brasil.* Sello.

2069. HEMIANDRA R. Br.

pungens R. Br. *Nov. Holl. auſtr.* Suffrutex humilis, foliis integerrimis calycisque labiis nervoſis mucronatis, floribus axillaribus ſolitariis albo-purpureis.

2070. SYNANDRA Nuttall.

grandiflora Nuttall. *Ad fl. Ohio.* Herba foliis cordato-ovatis amplexicaulibus dentatis, floribus axillaribus ſeſſilibus ochroleucis purpureo-ſtriatis.

2071. AJUGA.

* *Foliis indiviſis.*

oblongata MB. 1. A. foliis oblongis obtuſiuſculis integerrimis, calycibus oppoſitis ſubrotundo-ovatis corollae tubo triplo brevioribus, caule ramoſo aſcendente. *Caucaſ.* (A. ſalicifolia Stev.)

ſalicifolia Schreb. 2. A. foliis lanceolato-ellipticis obtuſiuſculis ſubintegerrimis, calycibus oppoſitis oblongis tubo corollae ſubduplo brevioribus, caule ſimplici diffuſo. *Aſia minor. Armenia. Caucaſ.* (Teucrium ſalicifolium L.)

Iva Schreb. 3. A foliis linearibus ſubdentatis integerrimisque albido-villoſis, floribus axillaribus ſeſſilibus ſolitariis. *Europ. auſtr. Afric. bor.* (A. moſchata Schreb. Pſeudo-iva Cand.)

reptans 4. A. foliis oblongis obtuſis baſi attenuatis ſubdentatis cauleque glabris, ſtolonibus reptantibus, floribus axillaribus ſeſſilibus, lobo medio labii inf. obcordato. *Europ. Cochinchina.*

alpina 5. A. foliis uniformibus glabriuſculis oblongis baſi attenuatis dentatis, verticillis multifloris remotis, lobo medio lab. inf. oblongo integerrimo. *Europ.*

genevenſis 6. A. foliis cauleque ſubvilloſis, caulinis radicalia ſubſuperantibus inciſo-dentatis, floribus verticillatis, lobo medio labii inf. abbreviato. *Europ.*

pyramidalis 7. A. verticillis multifloris pyramidato confertis, lobo medio labii inf. producto emarginato, foliis radicalibus maximis obovato-oblongis crenatis. *Europ.*

† *decumbens* Thb. 8. A. floribus verticillatis, foliis obovatis dentatis cauleque decumbente villoſis. *Japon.*

† *Tenorii* Presl. 9. A. floribus axillaribus congeſtis, foliis oblongis angulato-dentatis, floralibus majoribus, lobo medio labii inf. emarginato, caule humili villoſo. *Neapol. Sicil.*

auſtralis R. Br. 10. A. caule erectiuſculo ſimplici, foliis radicalibus oblongis repando-dentatis longe petiolatis, floralibus ſeſſilibus integerrimis. *Nov. Holl.*

sinuata R. Br. 11. A. caule decumbente hirsuto, foliis omnibus oblongis sinuatis basi attenuatis, calycibus hirsutissimis, corollis pilosiusculis. *Nov. Holl.*

orientalis 12. A. caule erecto villoso, foliis oblongis dentatis, corollis inversis. *Thracia. Asia minor.*

** *Foliis divisis.*

chia Schreb. 13. A. foliis 3fidis pilosis, floribus axillaribus folia superantibus, caule diffuso. *Inf. Chios. Asia minor.*

Chamaepitys Schreb. 14. A. foliis 3fidis pilosis, floribus axillaribus solitariis folio brevioribus, caule ramoso erecto. *Europ. med. austr. Asia minor. Afric. et Amer. bor.* (Teucrium L.)

2072. ANISOMELES R. Br.

ovata R. Br. 1. A. caule erecto, foliis ovatis acutis crenatis dense villosis, verticillis subcymosis multifloris, bracteis linearibus. *Ind. or. Inf. Moluce.* (Nepeta indica et amboinica L. Ballota disticha L. Ait.)

malabarica R. Br. 2. A. caule erecto foliisque ovato-lanceolatis serratis basi integerrimis lanato-tomentosis, verticillis subspicatis, bracteis filiformibus. *Ind. or.* (Nepeta malabarica L.)

*nepalensis** 3. A. foliis subcordato-ovatis dentatis hirsutis, cymis pedunculatis axillaribus. *Nepal.* (Ainga furcata Link. Craniotome versicolor Reichenb.)

salvifolia R. Br. 4. A. foliis lanceolatis supra laevibus subtus rugosis cauleque incano-tomentosis, verticillis multifloris. *Nov. Holl.*

moschata R. Br. 5. A. foliis ellipticis cauleque cinereo-pubescentibus, verticillis paucifloris, calycibus glandulosis. *Nov. Holl.*

inodora R. Br. 6. A. foliis ellipticis glabriusculis subtus punctatis, verticillis remotis, calycibus glandulosis. *Nov. Holl.*

2073. TEUCRIUM.

1. *Floribus axillaribus solitariis, geminis oppositis.*

fruticans 1. T. foliis oblongo-lanceolatis integerrimis subtus calycibusque albo-tomentosis, dentibus calycis lanceolatis, caule fruticoso. *Europ. austr. Afric. bor.* (T. latifolium L. var.)

heterophyllum Herit. 2. T. foliis ellipticis integerrimis crenatisque subtus albido-tomentosis, dentibus calycis abbreviatis, caule fruticoso. *Inf. Canar.* (T. canariense Lam.)

Laxmanni Murr. 3. T. foliis oblongis nervosis integerrimis subserratisque villosis, calycibus breviter pedunculatis villosissimis, dentibus obtusiusculis, caule herbaceo. *Hungar. Transylvan. Podol. Tauria. Caucas. Sibir.*

ſeſſilifolium Clark. 4. T. foliis ſeſſilibus obtuſis hirſutis, inferioribus lanceolatis integerrimis floralibus ſubellipticis crenatis, floribus ſubſeſſilibus. *Thracia.*

alpeſtre Sm. 5. T. foliis ſubrotundis baſi attenuatis inciſo-crenatis tomentoſis, caule fruticoſo ramoſiſſimo. *Creta.*

breviſolium Schreb. 6. T. foliis lanceolatis revolutis integerrimis obtuſis incanis, calycibus longe pedunculatis obtuſe dentatis, caule fruticoſo. *Creta.*

microphyllum Desf. 7. T. foliis ovatis crenulatis ſubtus revolutis incanis, dentibus calycis acutis, caule fruticoſo ramoſo. *Creta.*

aſiaticum 8. T. foliis lineari-lanceolatis patentiſſimis repando-ſerratis ſubtus tomentoſis, calycis lab. ſup. cordato. *Ind. or.?*

cubenſe 9. T. foliis oblongis baſi attenuatis ſubtrifido-inciſis glaberrimis, calycis dentibus lanceolatis cuſpidatis. *Cuba.*

africanum Thunb. 10. T. foliis 3fidis ſubtus albo-tomentoſis, laciniis linearibus obtuſis, pedunculis 1floris folio brevioribus *Afric. auſtr.*

Niſſolianum 11. T. foliis ſub-3fidis glabris, laciniis obtuſiuſculis, dentibus calycis longe ariſtatis, caule herbaceo decumbente. *Hiſpania.*

Pſeudo-Chamaepitys 12. T. foliis 3partitis hirſutis rigidiuſculis, laciniis linearibus acutis ſubtus revolutis, laciniis calycis elongatis pungentibus. *Hiſpan. Gallia auſtr. Sicil. Afric. bor.* (T. mauritanum Schreb. var.)

laevigatum Vahl. 13. T. foliis tri-multipartitis glabris, laciniis ſubdentatis ſubtus planis, laciniis calycis lanceolatis mucronatis, caule erecto herbaceo. *Ad fl. Plata.* Sello.

campanulatum 14. T. foliis multifidis glabris, laciniis linearibus inciſis, calycibus campanulatis piloſis, dentibus ſubariſtatis, caule herbaceo. *Italia. Graecia.*

2. *Floribus verticillatis, verticillis utplurimum dimidiatis.*

regium 15. T. foliis inferioribus petiolatis ovatis ſub-2dentatis, floralibus ſeſſilibus lanceolatis integerrimis, calycis piloſi dentibus cuſpidatis, caule fruticoſo. *Hiſpania.*

multiflorum 16. T. foliis inferioribus ovalibus apice dentatis, floralibus integerrimis petiolatis, verticillis approximatis multifloris, calycibus piloſis acutis, caule decumbente fruticoſo. *Hiſpania.*

lucidum 17. T. foliis omnibus ovatis baſi cuneatis inciſo-dentatis glaberrimis, calycis laevis dentibus acutis, caule ſuffruticoſo. *Italia. Graecia. Cyprus.*

Chamaedrys 18. T. foliis obovato-oblongis inciſo-crenatis piloſiuſculis, verticillis paucifloris, calycis campanulati dentibus acutis, caule procumbente. *Europ. Aſia med.*

Scordium 19. T. foliis oblongis ſeſſilibus baſi attenuatis groſſe ſerratis glabriuſculis, verticillis dimidiatis, caule

villoſo. *Europ. Aſia media.* (T. caucaſicum W. herb. var. verticillis multifloris.)

ſcordioides Schreb. 20. T. foliis cordato-oblongis ſemiamplexicaulibus crenatis rugoſis lanatis, verticillis dimidiatis. *Creta. Luſitania.* (T. Scordium Brot.)

lanuginoſum Link. 21. T. foliis lanceolatis acutiusculis ſeſſilibus crenatis ſubfaſciculatis villoſis, verticillis dimidiatis, dentibus calycis abbreviati ovatis, caule ramoſo. *Luſitania.*

bracteatum Desf. 22. T. foliis omnibus petiolatis ovatis cauleque erecto villoſis, inferioribus cordatis ſerratis, ſummis floralibus integerrimis, verticillis aequalibus ſuböfloris, dentibus calycis ovatis acutis. *Afr. bor.*

ſpinoſum 23. T. foliis oblongis pinnatifidis ſerratis integrisque ramisque divaricatis ſpinoſis lanatis, verticillis paucifloris, calycis lab. ſup. ovato, corollis inverſis. *Hiſpania. Luſitan. Aſia minor.*

Botrys 24. T. foliis multifidis glabriusculis, laciniis linearibus obtuſiusculis dentatis, verticillis dimidiatis, calycibus campanulatis piloſis. *Europ. Aſia med.*

3. *Pedunculis axillaribus triſloris.*

Thea Lour. 25. T. foliis ovato-oblongis acutis integerrimis glabris, caule fruticoſo procumbente. *Cochinchina.*

trifidum Retz. 26. T. foliis 3fidis hirſutiusculis, laciniis lanceolatis ſubtus ſubtomentoſis, pedunculis folia aequantibus. *C. B. S.* (T. capenſe Thunb.)

4. *Floribus capitatis.*

* *Foliis integerrimis.*

anguſtiſſimum Schreb. 27. T. foliis linearibus revolutis teretiusculis ſubglabris, capitulis piloſiusculis, calyce colorato campanulato, caule tereti incano. *Hiſpania. Luſitan.* (T. Chulilia Cav.)

coeleſte Schreb. 28. T. foliis linearibus revolutis calycibusque incano-tomentoſis. *Hiſpania.* (T. Maiorana Perſ.)

pumilum 29. T. foliis linearibus patentibus rigidiusculis ſubglabris, floribus capitato-verticillatis foliatis, caule humili tomentoſo. *Hiſpan.*

Libanitis Schreb. 30 T. foliis linearibus revolutis confertis cauleque tomentoſis, ſpicis capitatis foliatis. *Hiſpan.*

verticillatum Cav. 31. T. foliis verticillatis linearibus revolutis rigidis, caule fruticoſo ramisque denſe niveo-tomentoſis, calycibus obtuſis. *Hiſpan. auſtr.*

thymifolium Schreb. 32. T. foliis ovato-oblongis petiolatis ſubtus revolutis tomentoſis, calycibus campanulatis glabris mucronatis. *Hiſpan. auſtr.*

ſupinum 33. T. foliis linearibus ſubtus revolutis incanis, floribus faſciculato-capitatis, calycis dentibus elongatis cuſpidatis. *Auſtria. Transſylvan.*

montanum 34. T. foliis oblongo-lanceolatis ſubtus albido-tomentoſis, floribus faſciculato-capitatis, calycis campanulati incani dentibus mucronatis. *Europ. Aſiae minoris colles calcar.*

**** Foliis crenatis.**

Polium 35 T. foliis lineari-lanceolatis obtusis crenatis tomentosis, capitulis pedunculatis *dense lanatis*, caule decumbente. *Europ. med. Asia. Cochinchina.* (T. Teuthrion Schreb.)

Achaemenis Schreb. 36. T. foliis lanceolatis obtusis basi attenuatis apice crenatis planis, floralibus elongatis, capitulis dense lanatis. *Ager venetus.*

trifoliatum W. 37. T. foliis ternis oblongis obtusis grosse crenatis basi attenuatis integerrimis cauleque lanatis, capitulis albo-lanatis foliatis. *Hispan. Afric. bor.* (T. sub-Sphyllum Lag. var. capitulis spicatis oblongis.)

cuneifolium Sm. 38. T. foliis obovato-subrotundis crenatis dense tomentosis, caule fruticoso erecto, capitulis laxis, calycibus obtusis. *Creta.*

compactum Clem. 39. T. foliis obovatis inciso-crenatis villosissimis, floralibus lanceolatis petiolatis ciliatis calycem superantibus, capitulis spicatis, calycis inflati dentibus inaequalibus. *Granata Hispaniae austr.*

Pseudhyssopus Schreb. 40. T. foliis lineari-oblongis obtusis crenulatis, capitulis foliatis corymbosis dense lanato-tomentosis. *Italia. Hispania. Creta.* (T. lanigerum Lag., cymosum Pers.?)

capitatum 41. T. foliis lineari-lanceolatis revolutis crenatis tomentosis, capitulis pedunculatis aphyllis, calycibus obtusis dense lanatis. *Hispan. Gallia. Insion. Asia med. Aegypt.* (T. aegyptiacum Pers.)

lusitanicum Schreb. 42. T. foliis lineari-lanceolatis obtusis crenatis subtomentosis, caule corymbifero, capitulis pauciforis dense lanatis. *Lusitan.*

pycnophyllum Schreb. 43. T. foliis linearibus abbreviatis verticillato-confertis revolutis crenatis, capitulis pedunculatis dense tomentosis. *Hispania.*

valentinum Schreb. 44. T. foliis linearibus revolutis subcrenatis incanis remotiusculis, caule erecto fruticoso, capitulis corymbosis foliatis, calycibus incanis. *Hispan. austr. Ager tergest.?* W. herb.

gnaphalodes Herit. 45. T. foliis linearibus obtusissimis abbreviatis crassis revolutis subcrenatis tomentosis, capitulis pauciforis sessilibus ramisque dense niveo-lanatis. *Hispan.*

aureum Schreb. 46. T. foliis oblongis obtusis crenatis cauleque albido-tomentosis, summitatibus capitulisque dense lanatis aureis. *Hispan. Sicil. Gallia austr. Graecia.* (T. flavicans Lam. et flavescens Schreb. varr.)

buxifolium Schreb. 47. T. foliis ovalibus brevissimis apice crenatis villosis, ramis divaricatis rigidis tomentosis, capitulis foliatis paucifloris dense lanatis. *Hispan. austr. Creta.* (T. saxatile Cav.)

5. *Floribus spicatis.*

lamiifolium Urv. 48. T. foliis subcordatis obtusis crenatis petiolatis hirsutis, spica terminali densa, bracteis subu-

latis, calycis dente ſupremo latiusculo. *Moeſia infer.*

*Commerſonii** 49. T. foliis ſubrotundo-ovatis crenatis glabris longe petiolatis, ſpica terminali pauciflora longe pedunculata, caule ſimplici 4gono. *Ad fl. Plata.* (T. rotundifolium Poir.)

hyrcanicum 50. T. foliis cordato-oblongis crenatis ſubtus lanatis, ſpicis terminalibus cylindricis elongatis, floribus ſpiratim congeſtis, bracteis linearibus. *Perſia bor. Caucaſ.*

inflatum Sw. 51. T. foliis oblongis acuminatis inaequaliter groſſe ſerratis, ſpicis terminalibus ſubſecundis, calycibus inflatis. *Jamaica.*

faſciculatum Poir. 52. T. foliis faſciculatis ſeſſilibus linearibus glabris ſubtuberculato-dentatis, ſpica brevi terminali, bracteis oblongis mucronatis calycem ſuperantibus. *Patria?*

6. *Floribus racemoſis.*

villoſum Forſt. 53. T. foliis ovato-oblongis acuminatis ſerratis ramisque villoſis, racemo ſpicato terminali, bracteis lanceolatis calycem villoſiſſimum inflatum aequantibus. *Inſ. Amicorum.*

paluſtre Kunth. 54. T. foliis ovato-oblongis ſerratis pubeſcentibus, ramis glabriusculis, racemis ſpicatis verticillatis, bracteis linearibus calyce inflato hirſuto brevioribus. *Nov. Granat,* (T. hirtum W. herb.)

japonicum W. 55. T. foliis ovato-oblongis duplicato-ſerratis, racemo compoſito terminali, bracteis linearibus calycem aequantibus. *Japon.* (T. virginicum Thunb.)

virginicum 56. T. foliis ſubternis oblongis acuminatis baſi attenuatis ſimpliciter ſerratis, racemo ſimplici terminali, bracteis calyce campanulato brevioribus. *Amer. bor.*

canadenſe 57. T. foliis ovato-lanceolatis ſerratis ramisque incano-hirſutiſſimis, verticillis racemoſo-ſpicatis confertis, bracteis calycem duplo excedentibus. *Amer. bor.*

Arduini 58. T. foliis ovatis crenatis hirſutiusculis, racemo ſpicato tereti ſeſſili flavicante. *Olymp. Aſiae minoris.*

abutiloides Herit. 59. T. foliis amplis cordatis crenatis ramisque villoſis, racemis axillaribus laxiusculis aequalibus ebracteatis. *Madera.*

Scorodonia 60. T. foliis cordato-oblongis crenatis pubeſcentibus, racemis axillaribus ſecundis erectis laxiusculis, bracteis petiolatis abbreviatis, calycis lab. ſup. ovato, caule herbaceo. *Europ. med. et auſtr.*

Pſeudo-Scorodonia Desf. 61. T. foliis cordato-oblongis dentatis rugoſis ſubtus incanis, racemis axillaribus ſecundis, bracteis abbreviatis, calycis lab. ſup. ovato, caule fruticoſo. *Numidia.*

betonicum Herit. 62. T. foliis oblongis baſi cuneatis crenatis ſubtus calycibusque incanis, bracteis lanceolatis ſubre-

flexis pedicello brevioribus, calycis dente ſupremo erecto inaequali. *Madera.* (T. betonicaefolium Jacqu., caneſcens Forſt., maderenſe Lam.)

racemoſum R Br. 68. T. foliis oblongis repandis revolutis incano-tomentoſis, racemo terminali. *Nov. Holl.*

flavum 64. T. foliis ovatis crenatis opacis ramisque pubeſcentibus, floralibus integerrimis, verticillis racemoſis. *Europ. auſtr. Afric. bor.*

nitidum Schreb. 65. T. foliis ovatis crenatis *nitidis*, floralibus integerrimis piloſis, verticillis dimidiatis racemoſis, caule bifariam barbato. *Mauritania.*

Salviaſtrum Schreb. 66. T. foliis ovalibus rugoſis crenulatis ſubtus incanis, racemo laxo foliato, calycis labio ſup. ovato inaequali. *Luſitania.*

maſſiliense 67. T. foliis ovato-oblongis rugoſis eroſo-dentatis incanis, racemis ſtrictis ſubſecundis, dentibus calycis piloſi inaequalibus. *Gallia auſtr. Creta. Cochinchina.*

reſupinatum Desf. 68. T. foliis oblongis inciſo-ſerratis baſi cuneatis villoſis, racemis axillaribus confertis ſecundis foliatis, dentibus calycis ſubaequalibus, corolla inverſa. *Afric. bor.*

Murum 69. T. foliis ovatis integerrimis ſubtus incanis, racemis ſecundis laxis foliatis, calycibus hirſutis. *Hiſpania.*

ſubſpinoſum Pourr. 70. T. foliis lanceolatis integerrimis ſubtus revolutis incanis, ramis ſpineſcentibus, floribus racemoſis. *Inſ. baleur.*

quadratulum Schreb. 71. T. foliis ovato-rhombeis dentatis ſubtus revolutis incanis, ramulis filiformibus, racemis paucifloris. *Hiſpan. Afric. bor. Creta.* (T. ramoſiſſimum Desf., myrtifolium Poir.)

creticum 72. T. foliis linearibus obtuſis elongatis ſubtus revolutis albo-tomentoſis, racemis virgatis laxis, calycis dentibus aequalibus rigidis. *Creta. Aegypt. Cyprus.* (T. rosmarinifolium Lam., hyſſopifolium Schreb.)

7. Floribus corymboſis, paniculatis.

Pyrenaicum 73. T. foliis orbiculatis crenatis hirſutis, corymbo ſimplici terminali ſubſeſſili, calycis hiſpidi dentibus inaequalibus. *Pyrenaei m.*

rotundifolium Schreb. 74. T. foliis ſubreniformi-orbiculatis crenatis utrinque villoſis ſubtus incanis, corymbis termiualibus paucifloris, calycibus 10ſtriatis. *Hiſpan. auſtr.*

undulatum Lour. 75. T. foliis ovato-oblongis obtuſis undulatis ſubcrenatis glabris, corymbis terminalibus. *Cochinchina.*

argutum R. Br. 76. T. foliis triangularibus inciſo-ſerratis, corymbo terminali coarctato, bracteis lanceolatis acuminatis calycem glanduloſo-piloſum ſuperantibus, dentibus calycis inaequalibus. *Nov. Holl.*

corymboſum R. Br. 77. T. foliis ovato-lanceolatis inciſis pubeſcentibus, corymbis axillaribus, calycibus glanduloſis. *Nov. Holl.*

orientale 78. T. foliis multifidis glabris, laciniis linearibus, panicula diffusa trichotoma, calycibus patentibus corolla multo minoribus, dentibus lanceolatis. *Asia minor. Caucas.*

parviflorum Schreb. 79. T. foliis multifidis ramisque canescentibus, laciniis linearibus subtus revolutis, panicula diffusa trichotoma, calycibus corollam aequantibus, dentibus lineari-subulatis divergentibus. *Armenia.*

Teucrium filiforme Poir. (filifolium W. herb.) longe alienum, videtur esse altera species Campylanthi Roth. spec. nov. p. 89.

2074. WESTRINGIA Sm.

rosmariniformis Sm. 1. W. foliis quaternis lanceolatis supra glabriusculis subtus revolutis calycibusque argenteis, dentibus tubo dimidio brevioribus. *Nov. Holl.*

Dampieri R. Br. 2. W. foliis quaternis linearibus supra glabriusculis subtus revolutis calycibusque cinereis, dentibus tubo dimidio brevioribus. *Nov. Holl.*

rubiaefolia R. Br. 3. W. foliis quaternis elliptico-lanceolatis planiusculis nitidis calycibusque glabris. *Terra Diemen.*

glabra R. Br. 4. W. foliis ternis lineari-lanceolatis planis utrinque calycibusque glabris. *Nov. Holl.*

longifolia R. Br. 5. W. foliis ternis linearibus elongatis supra scabris subtus revolutis calycibusque pilosiusculis, dentibus tubum aequantibus. *Nov. Holl.*

angustifolia R. Br. 6. W. foliis ternis linearibus patentibus supra scabris subtus revolutis calycibusque cinereis, dentibus calycis tubo dimidio brevioribus. *Terra Diemen.*

cinerea R. Br. 7. W. foliis ternis linearibus mucronatis patentibus revolutis utrinque calycibusque cinereis, dentibus calycis brevissimis. *Nov. Holl. austr.*

rigida R. Br. 8. W. foliis ternis lineari-lanceolatis mucronato-pungentibus divaricatis supra glabriusculis subtus revolutis calycibusque cinereis, dentibus tubo dimidio brevioribus. *Nov. Holl. austr.*

2075. MICROCORYS R. Br.

purpurea R. Br. 1. M. foliis ternis ovali-oblongis pubescentibus subrevolutis subtus punctatis, ramulis sericeis, floribus axillaribus solitariis, bracteis setaceis persistentibus. *Nov. Holl. austr.*

barbata R. Br. 2. M. foliis ternis linearibus obtusis, caule diffuso, floribus axillaribus solitariis, bracteis caducis, calycibus corollisque hirsutis. *Nov. Holl. austr.*

virgata R. Br. 3. M. foliis ternis linearibus obtusis calycibusque glabris, bracteis caducis, caule erecto, ramis filiformibus. *Nov. Holl. austr.*

2076. HEMIGENIA R. Br.

purpurea. *Nov. Holl.* Fruticulus glaber, foliis ternis teretiusculis, floribus axillaribus solitariis bracteatis violaceis.

2077. COLEBROOKIA Roxb.

ternifolia Roxb. *Myſore, Ind. or.* Fruticulus, foliis ternis lanceolatis acutis villoſis obtuſe ſerratis, floribus ſpicato-paniculatis.

2078. LEUCOSCEPTRUM Sm.

canum Sm. *Nepal.* Herba foliis lanceolatis ſerratis glabris, floribus denſe ſpicatis bracteatis albis.

2079. LAVANDULA.

Spica W. 1. L. foliis linearibus ſubtus revolutis, verticillis ſpicatis inferne remotiusculis, bracteis ovatis acutis ſcarioſis. *Europ. auſtr.* (L. anguſtifolia Ehrh., Spica *α*. L., vera Cand., L. pyrenaica Cand. var.)

latifolia Ehrh. 2. L. foliis lineari-lanceolatis ſubtus planiusculis, verticillis ſpicatis approximatis, bracteis linearibus. *Europ. auſtr.* (L. Spica *β*. L. L. Spica Cand.)

Stoechas 3. L. foliis linearibus confertis margine revolutis albido-tomentoſis, ſpica imbricata oblonga comoſa, bracteis ſubreniformibus 3dentatis coloratis. *Europ. auſtr. Afric. bor.*

viridis Herit. 4. L. foliis linearibus margine revolutis rugoſis villoſis, ſpica comoſa, bracteis viridibus. *Madera.*

dentata 5. L. foliis linearibus revolutis crenato-pinnatifidis, ſpica imbricata comoſa, bracteis latis obtuſis ſtriatis calyces ſuperantibus. *Hiſpan. Afric. bor. Inſ. ion.*

ſtricta Delil. 6. L. foliis pinnatifidis ſcabris, laciniis linearibus integerrimis, ſpicis filiformibus elongatis interruptis, floribus oppoſitis, bracteis lanceolatis calyce brevioribus. *Aegypt.* (L. coronopifolia Poir.)

pinnata L. fil. 7. L. foliis pinnatifidis caneſcentibus, laciniis linearibus obtuſis, ſpica imbricata, bracteis lanceolatis calycem ſuperantibus. *Madera.*

heterophylla Viv. 8. L. foliis linearibus oblongisque pinnatifido-inciſis integris, ſpicis cylindricis. *Patria?*

multifida 9. L. foliis bipinnatifidis incanis, laciniis linearibus, ſpica ſimplici 4gona ſpirali, bracteis ovatis nervoſis villoſis. *Hiſpan. Afric. bor.*

abrotanoides Lam. 10. L. foliis bipinnatifidis glabriusculis, laciniis linearibus, ſpica ramoſa interrupta 4gona, bracteis ovatis nervoſis glabris. *Inſ. Canar.*

2080. SIDERITIS.

* *Ebracteatae.*

canarienſis 1. S. foliis ſubcordato-lanceolatis acutis crenatis rugoſis petiolatis ſubtus ramisque albo-tomentoſis, verticillis multifloris ſubſpicatis lanatis, caule fruticoſo. *Inſ. Canar.* (S. macroſtachya Poir.)

candicans Ait. 2. S. foliis subcordato-lanceolatis subcrenatis petiolatis, junioribus utrinque tomentosis, adultis glabriusculis, corollae lab. sup. retuso brevissimo, caule fruticoso. *Madera.*

cretica 3. S. foliis cordato-oblongis obtusiusculis crenatis petiolatis utrinque tomentosis, corollae lab. sup. ovato integerrimo, caule fruticoso. *Creta.*

montana 4. S. foliis oblongis sessilibus obtusis dentatis, verticillis remotis, calycibus spinulosis corolla majoribus, corollae lab. sup 3fido, caule erecto herbaceo hirsuto. *Europ. med. et austr.*

† *remota* Urv. 5. S. foliis oblongis, verticillis remotissimis, calycibus dense tomentosis spinosis corolla majoribus, ramis divaricatis rigidis. *Ins. Samos.*

elegans Murr. 6. S. foliis ovato-oblongis obtusis crenatis, verticillis remotis paucifloris, calycibus villosissimis inermibus corolla subbrevioribus, dentibus lanceolato-linearibus elongatis, caule herbaceo villoso. *Patria?* (S. nigricans Lam.)

romana 7. S. foliis obovato-oblongis dentatis in petiolum decurrentibus, verticillis paucifloris cauleque prostrato hirsutis, calycibus rigidis spinosis, dente supremo ovato. *Italia.*

decumbens Thunb. 8. S. foliis lanceolatis rugosis tomentosis, calycibus lanatis muticis, caule ascendente villoso. *Afric. austr.*

rugosa Thunb. 9. S. foliis lanceolatis sessilibus serrulatis rugosis tomentosis, calycibus spinulosis, caule erecto dense tomentoso. *Afric. austr.*

** *Bracteatae.*

† *Bracteis integerrimis.*

calycantha M. B. 10. S. foliis lanceolatis obtusis integerrimis lineatis sericeo-villosis, verticillis remotis, bracteis lanceolatis reflexis, calycis hirsutissimi dentibus subulatis patentissimis elongatis, caule erecto herbaceo. *Grusia russica.* (Stachys Vahl. Zietenia orientalis Gleditsch.)

lyriaca 11. S. foliis lanceolatis obtusis subcrenulatis caulique ascendente dense lanato-tomentosis, verticillis remotis, bracteis cordatis acutis venoso-reticulatis. *Italia. Graecia. Tauria.* (St. taurica et distans W., brutia Tenor.)

libanotica Labill. 12. S. foliis obovato-oblongis serratis tomentosis, ramis simplicissimis glabris, verticillis remotis, bracteis ovatis acuminatis nervoso-reticulatis piloso-ciliatis. *Libanus.*

mucronata Sieb. 13. S. foliis lanceolatis cuspidatis rigidis sessilibus rugosis incanis, bracteis cordatis rugosis spinosis, calycibus pungentibus, caule erecto lanato. *Palaestina.*

perfoliata 14. S. foliis cordato-lanceolatis cuspidatis amplexicaulibus denticulatis, bracteis cordatis cuspidatis membranaceis venoso-reticulatis ciliatis, verti-

cillis approximatis ſpicatis, dentibus calycis ſubulatis, caule erecto hirſuto. *Aſia minor.*

ciliata Thunb. 15. S. foliis petiolatis ovatis erectis ſerratis punctatis, verticillis ſpicatis, bracteis nervoſis ciliatis. *Japon.*

pullulans Vent. 16. S. foliis ovato-lanceolatis petiolatis incanis, ſummis ſeſſilibus, verticillis remotis, bracteis cordatis mucronatis, tubo corollae calycem ſuperante. *Aſia minor.*

rugoſa Poir. 17. S. foliis oblongis obtuſis obſolete dentatis ſubtomentoſis, verticillis diſtantibus, bracteis ovatis acuminatis, calycibus apice barbatis, caule fruticoſo glabro. *Syria.*

laſiantha Juſſ. 18. S. foliis ovato-oblongis acutis glabriusculis ſpinoſo-dentatis, verticillis ſpicatis villoſiſſimis, bracteis ovatis calycibusque ſpinoſis. *Aſia minor.*

leucantha Cav. 19. S. foliis lanceolatis abbreviatis apice ſpinoſis villoſis, verticillis ſpicatis, bracteis ſpinoſis, caule humili fruticoſo. *Hiſpan. auſtr.*

ſalviaefolia Kunth. 20. S. foliis oblongis obtuſiusculis crenatis ſupra rugoſis ſubtus pulverulento-incanis, verticillis ſpicatis, bracteis oblongis acutis, dentibus calycis lanceolatis acuminatis, caule fruticoſo. *Quito.*

paniculata Kunth. 21. S. foliis cordato-ſagittatis oblongis acutis crenato-dentatis ſupra rugoſis glabris ſubtus incano-pubeſcentibus, verticillis ſpicato-paniculatis, bracteis ovatis venoſo-reticulatis calycibusque acutis. *Quito.*

roſea Desf. 22. S. foliis ovato-oblongis obtuſis ſeſſilibus crenatis, floribus axillaribus geminis, bracteis lanceolatis, calycibus muticis. *Aegypt.* (S. aegyptiaca Perſ.)

†*parvifolia* Lam. 23. S. foliis ovato-lanceolatis acutis integerrimis, verticillis remotis, bracteis ſubulatis, caule hiſpido. *Patria?*

†† *Bracteis dentatis.*

incana 24. S. foliis ſpathulato-linearibus integerrimis albido-tomentoſis, verticillis remotis, bracteis latis dentatis, laciniis lab. inf. corollae abbreviatis acutis, caule fruticoſo. *Hiſpania.*

virgata Desf. 25. S. foliis linearibus integerrimis tomentoſis, ramis virgatis, verticillis remotis, bracteis dentatis, lobis lateralibus lab. inf. cor. obtuſis. *Afr. bor.*

foetens Clem. 26. S. foliis linearibus acutis glabris, ramis virgatis, verticillis denſe ſpicatis, bracteis calyce brevioribus dentatis ſubulato-ariſtatis. *Granata Hiſpan.*

glauca Cav. 27. S. foliis ſpathulato-linearibus glaucis ſubvilloſis, verticillis remotis, brateis dentatis, laciniis lab. inf. corollae acutis, caule herbaceo. *Hiſpan. auſtr.*

anguſtifolia Lag. 28. S. foliis linearibus acutiusculis confertis incanis, verticillis remotis, bracteis ſpinoſo-dentatis calyce brevioribus, caule fruticoſo. *Hiſpan. auſtr.*

Tragoriganum Lag. 29. S. foliis lineari-lanceolatis ſubſerratis obtuſiusculis mucronatis, verticillis ſpicatis, bracteis dentato-ariſtatis. *Hiſpan. auſtr.*

ſpinoſa 30. S. foliis lanceolatis acutis lanatis bracteisque cordatis ſpinoſo-2dentatis, verticillis approximatis bractea ſubbrevioribus. *Hiſpan. Afric. bor.* (S. ſubſpinoſa Cav.)

ilicifolia W. 31. S. foliis lanceolatis ſpinoſo-dentatis hirſutis, verticillis remotis, bracteis calyce brevioribus dentato-ſpinoſis. *Aſia minor.*

ſerrata Lag. 32. S. foliis anguſte lanceolatis hirſutis argute ſerrato-mucronatis 3nerviis, bracteis ſpinoſo-dentatis. *Murcia.*

hyſſopifolia 33. S. foliis lanceolatis glabris integerrimis, verticillis ſpicatis, bracteis ſpinoſo-dentatis, caule lanato. *Helvetia. Gallia. Italia.* (S. foetida Poir.)

pyrenaica 34. S. foliis obovato-oblongis apice dentatis hirſutiusculis, ſpica oblonga continua hirſuta, bracteis ſpinoſo-dentatis. *Alp. Europ. med.* (S. alpina Vill. var.)

chamaedryfolia Cav. 35. S. foliis obovatis inciſo-crenatis, verticillis remotis bracteas ſpinoſo-dentatas ſuperantibus, dentibus calycis mucronatis, caule villoſo. *Hiſpan. Luſitan.* (S. hirtula Brot.)

ſcordioides 36. S. foliis lanceolatis baſi attenuatis ſubdentatis vel integerrimis acutis vel obtuſis glabriusculis, verticillis approximatis, bracteis calycibusque longe ſpinuloſis, caule erecto hirſutiusculo. *Europ. auſtr.* (S. hirta Roth. var.)

hirſuta 37. S. foliis obovato-oblongis dentatis in petiolum attenuatis ramisque aſcendentibus hirſutis, verticillis remotis paucifloris lanatis, bracteis reflexis ſpinoſo-dentatis. *Europ. auſtr.*

criſpata W. 38. S. foliis obovato-oblongis dentatis undulatis ſubtus tomentoſis, verticillis diſtantibus, bracteis orbiculatis ſpinoſo-dentatis. *Hiſpan.* (S. Cavanilleſii Lag.)

bullata Kunth. 39. S. foliis cordato-oblongis obtuſis crenatis ſupra rugoſis ſubtus incano-tomentoſis, verticillis denſe congeſtis, bracteis ovatis apice 2dentatis venoſo-reticulatis calyces ariſtatos ſuperantibus. *Nov. Granat.*

ovata Cav. 40. S. foliis ellipticis crenatis petiolatis pubeſcentibus, ſpica 4gona, bracteis ovatis dentato-ſpinoſis. *Peru.*

lanata 41. S. foliis cordatis obtuſis obſolete crenatis villoſis, verticillis ſpicatis lanatis, bracteis obſolete ſerratis, calycibus muticis. *Aſia minor. Aegypt.*

2081. PHYTOXYS Molin.

acidiſſima Molin. *Chili.* Frutex ſuborgyalis, foliis ſubſeſſilibus lanceolatis denticulatis ſcabris, floribus axillaribus coeruleis. (Algue-laguen Feuill.)

2082. ORIGANUM.

vulgare 1. O. ſpicis aggregatis pedunculatis elongatis, bracteis glabris coloratis calyces aequantibus, foliis

ovato-oblongis integerrimis glabriusculis, caule erecto. *Europ. Asia med. Amer. bor.*

humile Poir. 2. O. spicis aggregatis subsessilibus oblongis, bracteis glabris apice coloratis calyces superantibus, foliis ovatis ciliatis, caule basi radicante divaricato hispido. *Patria?*

virens Link. 3. O. spicis axillaribus confertis abbreviatis, bracteis viridibus glabris calycem campanulatum superantibus, foliis ovato-oblongis remote serratis caulequè erecto pilosis. *Lusitan.*

heracleoticum 4. O. spicis digitatis laxe imbricatis elongatis pedunculatis, bracteis subcoloratis calycem aequantibus, caule erecto ramoso foliisque ovato-oblongis glabriusculis. *Europ. austr. Cochinchina?*

creticum 5. O. spicis fasciculatis subsessilibus prismaticis elongatis, bracteis membranaceis hispidiusculis acutis calyces superantibus, foliis ovatis asperis, caule erecto hispido. *Graecia. Creta. Cochinchina?* (O. megastachyon Link.)

macrostachyon Link. 6. O. spicis aggregatis axillaribus compressis longissimis, bracteis lanceolatis acutis glaberrimis calyce longioribus, foliis ovatis inciso-serratis cauleque erecto glabris. *Lusitania.*

punctatum Poir. 7. O. spicis globoso-capitatis subpedunculatis, bracteis lanceolatis pubescentibus calyces superantibus, foliis ovato-lanceolatis punctatis cauleque glabris. *Patria?*

smyrnaeum 8. O. spicis congestis umbellato-fastigiatis, bracteis incano-hirsutis arctissime imbricatis late ovatis calyces superantibus, foliis ovatis venosis breviter petiolatis, caule erecto villoso. *Graecia. Creta. Asia minor. Afric. bor.* (O. pallidum Pers., oblongatum et hirtum Link., glandulosum Desf.)

Onites 9. O. spicis oblongis aggregatis subsessilibus, bracteis arcte imbricatis late ovatis hirsutiusculis ciliatis, foliis ovato-oblongis subtomentosis subtus venoso-lineatis, caule ramosissimo hirto. *Sicil.*

Sriacum 10. O. spicis ternis quinisque oblongis sessilibus, bracteis arctissime imbricatis albo-villosissimis, foliis ovatis subtus tomentosis, caule erecto villoso. *Palaestina.*

Maru 11. O. spicis ternis subglobosis pedunculatis basi foliatis, bracteis arcte imbricatis obtusis, ramis filiformibus, foliis ovatis obtusis incano-tomentosis. *Creta. Palaestina.* (O. vestitum Clark. Majoranoides W. parviflorum Urv.)

Majorana 12. O. spicis ternis subrotundis pedunculatis, bracteis imbricatis pubescentibus, foliis petiolatis ellipticis glabriusculis, radice annua. *Ind. orient. Graecia.*

indicum Roth. 13. O. glomerulis interrupte spicatis pedunculatis basi foliatis, bracteis arcte imbricatis mucronatis incano-pubescentibus, foliis ovatis acuminatis duplicato-serratis subtus cinereo-tomentosis. *Ind. or.*

Tournefortii Ait. 14. O. ſpicis ſubternis oblongis 4gonis, bracteis maximis ſubrotundis nervoſis laevibus, foliis ſubſeſſilibus orbiculatis coriaceis punctatis glabris. *Inſ. maris aegei.*

ſipyleum 15. O. ſpicis ſolitariis ſubgloboſis terminalibus nutantibus, foliis ovatis glabris glaucis. *Aſia minor. Euboea.*

Dictamnus 16. O. ſpicis ſubſolitariis ſubrotundis nutantibus, bracteis maximis obtuſis coloratis laevibus laxiusculis, foliis orbiculatis utrinque albo-lanatis. *Creta. Cochinchina.*

† *ciliatum* W. 17. O. ſpicis ſolitariis axillaribus ſeſſilibus ovatis erectis, bracteis ſubrotundis ſetoſo-ciliatis, foliis ovatis obtuſis glabris. *Guinea.*

† *bengalenſe* Garcin. 18. O. ſpicis ſolitariis axillaribus pedunculatis baſi foliatis oblongis denſe imbricatis, bracteis ovatis lanatis, foliis ovatis utrinque attenuatis duplicato-dentatis glabris. *Bengal.*

aegyptiacum 19. O. floribus faſciculatis ebracteatis, foliis oblongis carnoſis tomentoſis. *Aegypt.*

2083. PYCNANTHEMUM Mx.

linifolium Pursh. 1. P. foliis linearibus acuminatis patentiſſimis nervoſis glabris, capitulis ſubgloboſis umbellato-corymboſis, bracteis cuſpidatis pubeſcentibus arcte imbricatis. *Amer. bor.* (Satureia virginiana L. Thymus virginicus Murr. Origanum flexuoſum Walt. Brachyſtemum virginicum Mx., linifolium W. en.)

lanceolatum Pursh. 2. P. foliis lineari-lanceolatis integerrimis ſubtus venoſis glabris, capitulis terminalibus faſciculato-corymboſis, bracteis arcte imbricatis acutis pubeſcentibus. *Amer. bor.* (Brachyſtemum lanceolatum W. en.)

muticum Perſ. 3. P. foliis ovato-lanceolatis ſubdentatis glabriusculis, capitulis terminalibus faſciculatis, bracteis arcte imbricatis acutis. *Carolina bor.* (Brachyſtemum Mx.)

nudum Nutt. 4. P. foliis ovato-oblongis integerrimis laevibus venoſis ſeſſilibus, capitulis aggregatis paucifloris, bracteis calycibusque reſinoſo-punctatis. *Carolina. Georgia.*

piloſum Nutt. 5. P. foliis lanceolatis ſubintegerrimis piloſis, capitulis terminalibus, bracteis lanceolatis calycibusque incano-villoſis. *Tenneſſee Amer. bor.*

montanum Mx. 6. P. foliis ovato-lanceolatis ſerratis, capitulo ſubſolitario ſeſſili prolifero, bracteis ciliatis, calycibus glabris. *Carolina.*

ariſtatum Mx. 7. P. foliis ovato-lanceolatis ſubſerratis caneſcentibus, capitulis ſolitariis ſubproliferis, bracteis laxiusculis calycibusque longe ariſtatis. *Amer. bor.* (Nepeta virginica L.)

verticillatum Perſ. 8. P. foliis ovato-lanceolatis integerrimis, verticillis paucis remotis baſi foliatis, bracteis acu-

minatis. *Penſylvan. Carolina.* (Brachyſtemum Mx. Origanum clinopodioides Walt.)

Monardella Mx. 9. P. foliis ovato-oblongis acuminatis ſerratis hirſutis, floralibus integerrimis coloratis, capitulo ſolitario laxiusculo baſi folioſo, bracteis ciliatis. *Virginia. Carolina.* (Origanum incanum Walt.)

incanum Mx. 10. P. foliis ovato-oblongis acutis ſubſerratis ſubtus floralibusque utrinque incano-tomentoſis, capitulis laxiusculis ſubaggregatis baſi folioſis, bracteis ſetaceis. *Amer. bor.* (Clinopodium incanum L.)

2084. ISANTHUS Mx.

coeruleus Mx. *Virginia. Carolina.* Herba annua ſubviſcido-pubeſcens, foliis lanceolatis integerrimis trinerviis, floribus ſubſolitariis axillaribus coeruleis. (Trichoſtemma brachiatum L., ſoli Dillenio notum, quod Nuttallius huc trahit, alienum eſt et valde dubium.)

2085. SATUREIA.

* *Floribus ſubſolitariis.*

approximata Bivon. 1. S. caule fruticoſo ramoſo, ramis ligneſcentibus, foliis faſciculatis abbreviatis lineari-lanceolatis piloſiusculis, pedunculis bracteatis folio brevioribus. *Sicil.* (S. faſciculata Rafin.)

ſpinoſa 2. S. caule fruticoſo, ramis ligneſcentibus ſpinoſis, foliis oblongo-lanceolatis mucronatis hiſpidiusculis, pedunculis bracteatis folio brevioribus. *Creta.*

incana * 3. S. caule fruticoſo, ramis vimineis, foliis elliptico-oblongis utrinque ſtellato-pubeſcentibus incanis ſubtus revolutis, pedunculis axillaribus breviſſimis. *Jamaica.* Bertero.

americana Poir. 4. S. caule fruticoſo, ramis hiſpido-aculeatis, foliis lineari-lanceolatis obtuſiusculis nervo medio aculeatis, floribus ſolitariis ſeſſilibus oppoſitis. *Hiſpaniola.* Desportes.

** *Pedunculis pauciſloris cymoſis.*

vimínea 5. S. caule fruticoſo, ramis vimineis, foliis oblongis integerrimis baſi attenuatis ſupra glabris ſubtus hiſpidis, pedunculis 3floris, bracteis linearibus. *Jamaica.*

filiformis Desf. 6. S. caule fruticuloſo, ramis filiformibus, foliis ovato-lanceolatis villoſis, pedunculis axillaribus breviſſimis ebracteatis 1-3floris. *Atlas.*

montana 7. S. caule fruticoſo, ramis ſcabris, foliis ſpathulato-lanceolatis mucronatis nitidis punctatis, pedunculis axillaribus ſubſecundis pauciſloris folia ſubaequantibus, bracteis calyces ſuperantibus. *Europ. auſtr.*

rupestris Wulff. 8. S. caule fruticoso, ramis glabriusculis, foliis obovato-subrotundis obtusis subdentatis glabris, pedunculis axillaribus cymosis ebracteatis folio brevioribus. *Carniolia.* (S. thymifolia Scop.)

obovata Lag. 9. S. caule fruticoso, foliis obovatis obtusis integerrimis carinatis, pedunculis axillaribus subcymosis secundis bracteatis. *Hispan. austr.*

tenuifolia Tenor. 10. S. caule suffruticoso, ramis filiformibus, foliis lanceolatis acuminatis revolutis hispidis, pedunculis paucifloris, bracteis calyce brevioribus. *Apulia.*

Juliana 11. S. caule fruticoso, foliis petiolatis ovato-lanceolatis scabris subtus revolutis venosis, pedunculis dense cymosis breviſſimis, calycibus hispidis. *Etruria. Graecia.* (Thymbra S. Juliani Lobel.)

graeca 12. S. caule herbaceo, foliis ovatis hispidis subtus venosis, pedunculis paucifloris oppositis, bracteis calyce brevioribus. *Ins. maris aegei.*

hirsuta Presl. 13. S. caule herbaceo simplici hirsuto, foliis ovato-lanceolatis hispidis, pedunculis breviſſimis paucifloris, bracteis calycem aequantibus. *Sicil.*

Teneriffae W. 14. S. caule herbaceo, foliis ovatis acutis pubescentibus subtus revolutis, pedunculis multifloris, bracteis calyce minoribus. *Teneriffa?*

hortensis 15. S. caule herbaceo erecto, ramis brachiatis, foliis lineari-lanceolatis patentissimis, pedunculis cymosis axillaribus paucifloris, bracteis calyces superantibus. *Tauria. Caucas.*

*** *Floribus verticillatis.*

nervosa W. 16. S. caule fruticoso erecto, ramis pubescentibus, foliis subsessilibus ovatis acutis glabris subtus venosis, pedunculis cymoso-verticillatis subebracteatis, calycibus villosissimis. *Atlas. Inf. ion. Sicil.* (S. capitata Desf.)

Thymbra 17. S. caule fruticoso, ramis lignescentibus, foliis spathulato-lanceolatis acutis hispidis punctatis eveniis, verticillis densis basi foliatis, calycibus cuspidatis hispidis. *Graecia. Asia minor. Afric. boreal.*

congesta Horn. 18. S. caule fruticoso, foliis ovatis obtusis glabris, floralibus reflexis, verticillis congestis, calycibus hispidis. *Patria?*

2086. BYSTROPOGON Herit.

origanifolius Herit. 1. B. foliis ovatis integerrimis subtus niveis, pedunculis dichotomis, calycibus plumosis. *Inf. Teneriffa. Nivaria Plinii.*

plumosus Herit. 2. B. foliis ovatis subserratis subtus villoso-lanatis, paniculorum axillarium ramis divaricatis, calycibus plumosis. *Inf. Canar.* (Mentha plumosa L. suppl.)

canarienſis Herit. 3. B. foliis ovato-oblongis crenatis ſubtus villoſiſſimis, paniculae dichotomae floribus congeſtis villoſis. *Inſ. Canar. Madera.* (Mentha canarienſis L.)

punctatus Herit. 4. B. foliis ovatis dentato-crenatis glabris punctatis, pedunculis dichotomis, floribus congeſto-capitatis, calycibus villoſis. *Madera.*

†*ſidaefolius* Herit. 5. B. foliis cordatis, pedunculis verticillato-paniculatis filiformibus. *Peru.*

mollis Kunth. 6. B. foliis ovatis ſubſerratis reticulato-venoſis ſubtus albido-tomentoſis, verticillis ſubgloboſis approximatis, caule volubili. *Quito.*

bipinnatus Roth. 7. B. foliis 2pinnatis linearibus ſtrigoſis ſubtus caneſcentibus, floribus ſpicatis, bracteis ariſtatis. *Ind. or.*

2087. POGOSTEMON Desf.

plectranthoides Desf. *Patria?* Fruticulus foliis oblongis ſubſerratis caneſcentibus, floribus ſpicatis ſecundis albis, bracteis integerrimis ovalibus imbricatis calyces ſuperantibus.

2088. HYSSOPUS.

officinalis 1. H. faſciculis axillaribus multifloris ſecundis, dentibus calycis erectis ſubaequalibus, lobo medio lab. inf. 2lobo integerrimo, foliis lanceolatis. *Europ. auſtr. Sibir.*

anguſtifolius MB. 2. H. faſciculis axillaribus paucifloris ſecundis, dentibus calycis patulis inaequalibus, lobo medio lab. inf. 2lobo integerrimo, foliis linearibus. *Tauria. Caucaſ.* (H. orientalis W.)

Lophanthus 3. H. pedunculis axillaribus cymoſis, corollae inverſae lobo maximo crenulato, foliis ſubcordato-oblongis obtuſis crenatis. *China bor.*

nepetoides 4. H. verticillis ſpicatis elongatis, lobo medio corollae crenulato, ſtylis corolla brevioribus, foliis ſubcordatis ovatis acuminatis acute dentatis. *Amer. bor.*

ſcrofulariſolius W. 5. H. verticillis ſpicatis elongatis, lobo corollae medio crenato, ſtylis corolla longioribus, foliis cordato-ovatis acuminatis obtuſe dentatis. *Amer. boreal.*

2089. ELSHOLTZIA W.

criſtata W. 1. E. ſpica ſubſolitaria unilaterali erecta. *Sibir.* (Hyſſopus ocimifolius Lam. Mentha Patrini Pall. ovata Cav.)

†*paniculata* W. 2. E. ſpicis unilateralibus reflexis paniculatis. *Ind. or.* (Hyſſopus criſtatus Lam.)

†*ocimoides* Perſ. 3. E. ſpicis aequalibus, bracteis reflexis. *Coromandel.* (Mentha ocimoides Lam.)

2090. MENTHA.

* *Verticillis ſpicatis.*

ſtellata Lour. 1. M. ſpicis cylindricis gracilibus, verticillis denſiſſime congeſtis, filamentis exſertis barbatis, foliis quaternis linearibus remote ſerratis glabris. *Cochinchina. Ind. or.* (M. quaternifolia Roth.)

myosuroides Roth. 2. M. ſpicis cylindricis gracilibus, verticillis denſiſſime congeſtis tomentoſis, filamentis exſertis barbatis, foliis oppoſitis petiolatis lineari-oblongis ſerrulatis ſericeo-tomentoſis. *Ind. or.*

quadrifolia Roxb. 3. M. ſpicis cylindricis longiſſimis, verticillis denſiſſime congeſtis hirſutis, filamentis exſertis nudis, foliis quaternis lanceolatis integerrimis lineatis utrinque ſericeo-lanatis. *Ind. or.*

viridis 4. M. ſpicis baſi interruptis, bracteis calycibusque piloſiusculis, pedicellis glaberrimis, ſtaminibus exſertis, foliis oblongo-lanceolatis acuminatis ſerratis cauleque laevibus. *Europ.* (M. laevigata W. en.)

tenuis Mx. 5. M. ſpicis gracilibus baſi interruptis, ſtaminibus incluſis, foliis ovato-lanceolatis ſubſeſſilibus glabriusculis. *Amer. bor.* (M. viridis Walt.)

criſpata Schrad. 6. M. verticillis ſpicatis diſtinctis, pedicellis calycibusque glabriusculis, ſtaminibus exſertis, foliis ſubſeſſilibus ovato-oblongis cuſpidato-ſerratis undulatis cauleque glabris. *Patria?*

nepetoides Lejeun. 7. M. verticillis ſubcymoſis denſe interrupte ſpicatis, calycibus ſubulatis pedicellisque hirſutis, ſtaminibus corollam aequantibus, foliis petiolatis ellipticis acutiusculis ſerratis ciliatis ſubtus ad venas hirſutis. *Ad fontem Spadanum in Belgio.*

piperita 8. M. verticillis diſtinctis obtuſe ſpicatis, pedicellis calycibusque apice piloſiusculis, ſtaminibus corolla brevioribus, foliis petiolatis oblongis acutis ſerratis ſupra glabris ſubtus pubeſcentibus. *Anglia.* (M. balſamea W.)

niliaca Jacq. 9. M. verticillis approximatis ſpicatis, pedicellis calycibusque hirſutiusculis, ſtaminibus exſertis, foliis ſeſſilibus ſubcordato-lanceolatis ſerratis glabris ſubtus cauleque caneſcentibus. *Aegypt.* Sieber.

ſylveſtris 10. M. verticillis ſpicatis baſi diſtinctis, pedicellis calycibusque hirſutis, ſtaminibus corolla brevioribus, foliis ſubcordato-oblongis ſubſeſſilibus ſerratis ſubtus ſubvilloſo-lanatis. *Europ.* (M. caneſcens Roth. nemoroſa, gratiſſima, hirta et pubeſcens W.)

Auricularia 11. M. verticillis continuo ſpicatis, pedicellis calycibusque hirſutiusculis, ſtaminibus exſertis, foliis cordato-oblongis acutis ſerratis utrinque piloſis. *Inſ. Moluc. Ind. or.*

divaricata Lag. 12. M. verticillis diſtinctis ſpicatis paucifloris, pedunculis calycibusque hirſutiusculis, ſtaminibus exſertis, foliis breviter petiolatis ovato-lanceo-

latis ſerratis utrinque incano-tomentoſis. *Hiſpania.*

criſpa 13. M. verticillis diſtinctis ſpicatis, pedicellis calycibusque baſi glabris, ſtaminibus corollam aequantibus, foliis ſubſeſſilibus cordato-ovatis cuſpidato-ſerratis undulatis glabriuſculis. *Helvetia. Germania.* (M. hercynica Röhling.)

tomentoſa Urv. 14. M. ſpicis numeroſiſſimis elongatis baſi interruptis, calycibus villoſis, ſtaminibus exſertis, foliis ſeſſilibus lanceolato-linearibus groſſe dentatis criſpis tomentoſis, caule ramoſiſſimo. *Inſ. maris aegei.* (M. incana et undulata W. en.)

rotundifolia 15. M. verticillis ſubdiſtinctis ſpicatis, pedicellis calycibusque hirſutiuſculis, ſtaminibus exſertis, foliis ſeſſilibus ovato-ſubrotundis rugoſis hirſutis dentatis. *Europ.* (M. macroſtachya Tenor., rugoſa Roth., fragrans Presl.)

lavandulacea W. 16. M. verticillis ſubdiſtinctis ſpicatis, pedicellis calycibusque villoſis, ſtaminibus exſertis, foliis ſeſſilibus lineari-lanceolatis ſubintegerrimis complicatis utrinque incano-tomentoſis. *Hiſpan. C. B. S.* (M. lavandulaefolia Perſ.? capenſis Thb.)

** *Verticillis capitatis.*

aquatica 17. M. verticillis capitatis, pedicellis calycibusque piloſis, ſtaminibus corollam aequantibus vel ſuperantibus, foliis ovatis ſerratis petiolatis utrinque cauleque villoſis. *Europ.* (M. hirſuta L., piloſa Wallr., pyramidalis Tenor., acutifolia Sm. varr.)

citrata Ehrh. 18. M. verticillis capitatis, pedicellis calycibusque glaberrimis, ſtaminibus incluſis, foliis ſubcordato-ovato-oblongis petiolatis ſerratis utrinque glabris. *Europ.* (M. odorata Sm., aſperſa Mönch.)

*** *Verticillis axillaribus remotis.*

arvenſis 19. M. pedicellis glabriuſculis, calycibus ſubcampanulatis hirſutis, dentibus abbreviatis, ſtaminibus corolla brevioribus, foliis petiolatis ovatis acutis ſerratis cauleque aſcendente ſubvilloſis. *Europ.* (M. agreſtis Sm., dentata Mönch.)

auſtriaca Jacq. 20. M. pedicellis pubeſcentibus, calycibus oblongis hirſutis, dentibus ſubulatis, ſtaminibus corolla brevioribus, foliis cordato-ovatis acutis ſerratis cauleque aſcendente hirtis. *Europ. Caucaſ.* (M. parviflora Schultz.)

gentilis 21. M. pedicellis glabris, calycibus glabriuſculis, ſtaminibus corollam ſubaequantibus, foliis ovato-oblongis ſerratis hirſutiuſculis. *Europ.* (M. rubra Sm.)

elegans Lejeun. 22. M. verticillis paucifloris remotis, pedicellis glabris, calycibus reſinoſo-punctatis ſuperne hirſutiuſculis, ſtaminibus incluſis, ſtylo longe exſerto, foliis ovato-oblongis utrinque attenua-

tis venosis argute serratis hirsutiusculis. *Ad fontem Spadanum in Belgio.*

badensis C. C. Gmel. 23. M. pedicellis glabris, calycibus hirsutiusculis, staminibus corolla duplo longioribus, foliis petiolatis rhombeo-lanceolatis utrinque attenuatis subdentatis glabris. *Palatinatus. Lapponia.* (M. lapponica Wahlenb.)

borealis Mx. 24. M. pedicellis calycibusque villosiusculis, staminibus longe exsertis, foliis oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis argute serratis ciliatis, caule retrorsum piloso. *Amer. bor.*

gibraltarica W. 25. M. pedicellis calycibusque villosis, foliis ovatis subintegerrimis petiolatis utrinque incano-pubescentibus, caule procumbente. *Ad Calpen Hispan. austr.*

canadensis 26. M. pedicellis calycibusque subpubescentibus, staminibus corollam aequantibus, foliis petiolatis lanceolatis profunde serratis piloslusculis. *Amer. bor.*

tomentella Link. 27. M. pedicellis calycibusque villosissimis, staminibus exsertis, foliis subrotundo-oblongis denticulatis petiolatis cauleque erecto dense villosis. *Lusitan. Calabria.*

Pulegium 28. M. pedicellis calycibusque hispidiusculis, staminibus exsertis, foliis subovalibus subdentatis obtusis in petiolum decurrentibus piloslusculis. *Europ.*

diemenica * 29. M. calycibus tomentoso-barbatis, staminibus inclusis, foliis ovato-lanceolatis subtus punctatis, caule erecto. *Terra Diemen.* (M. gracilis R. Br.)

australis R. Br. 30. M. calycibus tomentosis, staminibus exsertis, foliis lanceolatis, caule angulis marginatis scabro. *Nov. Holl. Terra Diemen.*

cervina 31. M. pedicellis calycibusque glabris, bracteis palmatis, foliis lanceolatis subintegerrimis laeviusculis. *Gallia austr.*

**** *Pedunculis cymosis vel corymbosis.*

sativa 32. M. pedunculis axillaribus cymoso-glomeriferis, pedicellis calycibusque hirsutiusculis, staminibus inclusis, foliis ovatis serratis pubescentibus petiolatis. *Europ.* (M. verticillata L., gentilis f. gracilis Engl. bot. 449.)

numidica Poir. 33. M. pedunculis axillaribus cymoso-glomeriferis, calycibus glabriusculis, staminibus exsertis, foliis lanceolatis subserratis glabris subtus punctatis. *Afric. bor.*

glabrata Vahl. 34. M. pedunculo subcorymboso-umbellifero, staminibus corolla brevioribus, foliis petiolatis ovato-lanceolatis serratis glabris. *Aegypt.* (M. kahirina Forsk.)

satureioides R. Br. 35. M. pedunculis axillaribus subcorymbosis paucifloris, calycibus glabriusculis, staminibus inclusis, foliis ellipticis repandis subnudis, caule angulis aspero. *Nov. Holl.*

2091. GALEOBDOLON Sm.

luteum Sm. *Europ. nemora.* Herba foliis ſubcordato-ovatis dentatis, floribus verticillatis luteis. (Galeopſis Galeobdolon L., Leonurus W. ſpec., Lamium Hofm., Pollichia Perſ. Schrank., Cardiaca Lam.)

2092. GALEOPSIS.

Ladanum 1. G. internodiis caulinis ſubaequalibus ſuperne ramisque glanduloſo-villoſis, calycibus pungentibus tubo corollae triplo brevioribus, bracteis ſubulatis ſubreflexis, foliis oblongis utrinque attenuatis remote ſerratis utrinque virentibus, floralibus lanceolatis ſerrulatis. *Europ. Aſia med.* (G. intermedia Vill. anguſtifolia Perſ. et parviflora Lam. var.)

taneſcens MB. 2. G. internodiis caulinis ſuperne incraſſatis, ramis foliisque lanceolatis utrinque attenuatis remote ſerratis integerrimisque, calycibus pungentibus incano-villoſis corolla triplo brevioribus, bracteis ſubulatis revolutis. *German. med.*

pubeſcens Beſſ. 3. G. internodiis caulinis ſubincraſſatis foliisque ovatis acuminatis ſerratis pubeſcentibus, bracteis ſubglanduloſis minutis, calycibus piloſis corolla triplo brevioribus. *German. Galicia.* (G. Walterina Schlechtend.)

ochroleuca Lam. 4. G. internodiis caulinis aequalibus foliisque oblongo-lanceolatis ſerratis appreſſe pubeſcentibus ſubtus ſubtomentoſis, calycibus villoſis pungentibus inaequalibus corolla quadruplo brevioribus, galea apice 2fida. *Europ.* (G. grandiflora Ehrh., villoſa Hudſ. Sm.)

Tetrahit 5. G. internodiis caulinis ſuperne incraſſatis, ramis ſubretrorſum hirtis, foliis ovato-oblongis dentatis hirſutis, verticillis ſummis ſubcontiguis, calycibus longiſſime ariſtatis tubum corollae aequantibus. *Europ. Amer. bor.*

verſicolor Curt. 6. G. internodiis caulinis ſuperne incraſſatis ramisque hirtis, foliis ovato-oblongis dentatis hirſutis, verticillis ſummis ſubcontiguis, corolla fauce inflata galea apice crenulata calycem pungentem multo ſuperante. *Europ.* (G. cannabina Roth. W.)

† *hiſpida* Thb. 7. G. internodiis caulinis ſubaequalibus ramisque retrorſum aculeato-hiſpidis, foliis cordato-oblongis obtuſiusculis crenatis aſperis, calycibus acutis tenuiſſime villoſis corolla triplo brevioribus. *Afric. auſtr.*

2093. LAMIUM.

Orvala 1. L. foliis cordatis acuminatis duplicato-dentatis utrinque cauleque glabris, calyce colorato, lab. corollae inf. utrinque 3dentato. *Ital. Hungar. Transſylvan.*

rugoſum Ait. 2. L. foliis cordatis acuminatis inaequaliter dentatis rugoſis cauleque piloſis, calycibus ariſtatis, lab. corollae inf. utrinque dente unico ſetaceo. *Italia. Sicilia.* (L. longiflorum Tenor.)

garganicum 3. L. foliis cordatis acutiuſculis inaequaliter crenatis cauleque incano pubeſcentibus, corollae tubo recto, dente utrinque gemino. *Ital. Peloponneſ. Creta. Aſia minor. Cochinchina.*

maculatum 4. L. foliis cordatis acuminatis inaequaliter dentatis cauleque glabriuſculis, verticillis 10floris, galea apice acute emarginata. *Europ. med. et auſtr.* (L. flexuoſum Tenor.)

album 5. L. foliis cordatis acuminatis dentato-ſerratis cauleque piloſiuſculis, verticillis 20floris, galea apice obtuſa integerrima. *Europ.*

ſtriatum Sm. 6. L. foliis cordatis obtuſiuſculis, galea corollae 2fida, laciniis divaricatis dentatis, fauce utrinque 2dentata. *Graecia.*

bifidum Cyr. 7. L. foliis cordatis acutis inciſo-crenatis, galea corollae 2fida, laciniis divaricatis integerrimis, fauce utrinque 1dentata. *Neapol.*

calycinum Urv. 8. L. foliis cordatis rugoſis lanatis, floralibus petiolatis, caule glaberrimo, calycibus reticulatis laevibus longiſſime ariſtatis corollam ſubaequantibus. *Inſ. Samos.*

moſchatum Mill. 9. L. foliis cordatis crenatis glabris, floralibus ſubſeſſilibus, calycis dentibus corollam ſubaequantibus. *Aſia minor.*

molle Ait. 10. L. foliis petiolatis ſubdentatis vel integerrimis ciliatis, inferioribus ſubcordatis ſuperioribus ovatis, verticillis paucifloris. *Patria?*

tomentoſum W. 11. L. foliis cordato-ſubrotundis obtuſe dentatis utrinque tomentoſis petiolatis, verticillis multifloris, calycibus denſe lanatis, fauce corollae utrinque dente unico ſetaceo. *Armenia. Caucaſ.*

hirtum Poir. 12. L. foliis cordato-ovatis crenatis hirſutis canescentibus, verticillis paucifloris, calycibus corollam ſubaequantibus cauleque hirſutiſſimis. *Patria?*

hirſutum Lam. 13. L. foliis cordatis acuminatis inaequaliter dentatis cauleque hirſutis, calycibus inaequalibus acuminatis corolla pubeſcente longe brevioribus. *Gallia.* (L. grandiflorum Pourr. — L. ſtoloniferum Lapeyr. var.?)

laevigatum 14. L. foliis cordatis rugoſis ſerratis glabriuſculis, verticillis paucifloris, calycibus tubum corollae aequantibus cauleque laevibus. *Ital. Sibir.*

purpureum 15. L. foliis cordatis petiolatis obtuſis inaequaliter obtuſe dentatis cauleque hirſutis, corollae tubo intus barbato. *Europ.*

inciſum W. 16. L. foliis cordatis petiolatis inaequaliter inciſis glabriuſculis, ſuperioribus confertis, corollae tubo intus imberbi, lobis lab. inf. lateralibus obtuſe dentatis. *Europ.* (L. purpureum β. Lam., diſſectum Wither., gueſtphalicum Weih.)

amplexicaule 17. L. foliis floralibus amplexicaulibus ſubrotundis crenato-inciſis, fauce corollae utrinque 2dentata. *Europ. Amer. bor.* (Pollichia Roth.)

hiſpidulum Mx. 18. L. foliis late cordatis longe petiolatis pubeſcentibus, caule hiſpido, axillis 1floris. *Tenneſſee Amer. bor.*

multifidum 19. L. foliis multipartitis glabriusculis, ſuperioribus amplexicaulibus, laciniis lanceolatis dentatis, galea corollae barbata, faucis dentibus porrectis. *Aſia minor et media.*

2094. GLECHOMA.

hederaceum 1. Gl. foliis reniformi-ſubrotundis crenatis cauleque glabriusculis, verticillis paucifloris, calycibus ſubulatis. *Europ. Amer. bor.* (Gl. hirſutum Kit., magnum Merat. var.)

indicum * 2. Gl. foliis cordato-ſubrotundis crenatis cauleque hirſutis, pedunculis corymboſis axillaribus, calycibus longe ariſtatis. *Ind. or.* (Gl. hindoſtana Roth.)

2095. NEPETA.

* *Floribus cymoſis axillaribus.*

marifolia Cav. 1. N. cymis laxiusculis erectis, calycis fauce villoſa, foliis ovato-oblongis ſubintegerrimis incanis ſubtus fuſco-punctatis, ramis virgatis, caule ſuffruticoſo. *Hiſpan. auſtr.* (Meliſſa fruticoſa L., cretica Lam., Thymus marifolius W. en.)

croatica * 2. N. cymis erectis paucifloris, calycis fauce nuda, foliis obovatis ſubdentatis utrinque glabris punctatis, caule herbaceo. *Croatia.* (Meliſſa alba Kit.)

ſerpyllifolia MB. 3. N. cymis laxis multifloris folia ſuperantibus, dentibus calycis abbreviatis obtuſis, foliis ſubrotundo-ovalibus integerrimis utrinque cauleque albido-ſubtomentoſis. *Tauria.*

acinifolia * 4. N. cymis congeſtis multifloris folia ſuperantibus, calycibus ſtriatis glabriusculis, foliis petiolatis ovatis dentatis ſubtus incanis, caule erecto villoſo. *Patria?*

parviflora MB. 5. N. cymis erectis paucifloris folia ſuperantibus, calycis hirſuti ſtriati dentibus bracteisque elongatis ſubulato-ariſtatis, foliis lanceolatis remote ſerratis ſubtus ramisque brachiatis hirſutis. *Podolia. Tauria. Caucaſ.*

fibirica MB. 6. N. cymis trichotomis ſubpaniculatis, calycis dentibus ſubulato-ariſtatis elongatis, foliis cordato-oblongis obtuſis dentatis cauleque glabriusculis. *Sibir.* (Teucrium ſibiricum L.)

grandiflora MB. 7. N. cymis racemoſis multifloris, calycibus cylindricis incurvis pubeſcentibus coloratis bracteas ſubulatas ſuperantibus, tubo corollae calycem multo ſuperante, foliis cordatis crenatis ſubtus

incanis rugoſo-nervoſis. *Caucaſ.* (Sub N. colorata W. plures ſpecies confuſae.)

meliſſaefolia Lam. 8. N. cymis ſubumbellatis trichotomis ſtrictis, pedunculis elongatis folia multo ſuperantibus, calycibus cylindricis pubeſcentibus, foliis cordato-ſubrotundis crenatis glabriusculis, ſummis ſeſſilibus, radicibus faſciculatis. *Creta.*

longiflora Vent. 9. N. cymis ſub-6floris, ſuperioribus racemoſis, calycibus cylindricis lanato-tomentoſis tubo corollae duplo brevioribus, foliis cordato-oblongis obtuſis crenatis incano-tomentoſis. *Armenia. Caucaſ. Perſia.* (N. ſalviaefolia Perſ. Muſſini Henck. MB.)

incana Ait. 10. N. cymis dichotomis multifloris, calycibus albo-tomentoſis incurvis tubum corollae ſuperantibus, foliis petiolatis ſubcordato-oblongis ſerratis pubeſcentibus, ſuperioribus baſi attenuatis, caule diffuſo. *Caucaſ.* (N. cyanea Stev.)

graveolens Vill. 11. N. cymis pedunculatis ſecundis ſub-6floris, calycibus ſubincurvis villoſis, foliis ſubcordato-oblongis obtuſis baſi attenuatis profunde ſerratis tomentoſis. *Gallia auſtr. Italia ſuper.* (N. Nepetella Allion.)

Nepetella 12. N. cymis pedunculatis racemoſis, calycibus nudis, foliis cordato-lanceolatis anguſtis acute ſinuato-dentatis tomentoſis. *Europ. auſtr.* (N. amethyſtina Poir.)

teucriifolia W. 13. N. cymis paucifloris racemoſis, foliis longiſſime petiolatis cordato-ovatis obtuſis utrinque paucidentatis glabris. *Armenia.*

lamiifolia W. 14. N. cymis paucifloris hirſutiſſimis, ſummis breviſſime pedunculatis ſubſpicatis corollae tubo filiformi longiſſimo curvato, foliis cordato-ovatis obtuſis ſerratis pubeſcentibus, radice lignoſa fuſiformi. *Armenia.*

anguſtifolia Vahl. 15. N. cymis pedunculatis ſuperne congeſtis ſubſpicatis, calycibus ſtriatis acutis, foliis lanceolatis obtuſis baſi attenuatis obtuſe ſerratis rugoſis. *Hiſpania.* (N. arragonenſis Lam.)

Cataria 16. N. cymis pedunculatis ſuperne congeſtis ſpicatis, calycibus incanis cuſpidatis, foliis cordato-ovatis ſerratis caneſcentibus. *Europ. Amer. bor.*

ucranica 17. N. cymis racemoſo-paniculatis multifloris, calycibus incano-piloſis tubum corollae ſubaequantibus, foliis cordato-lanceolatis ſerratis nudiusculis. *Podolia. Tauria. Caucaſ.*

nuda 18. N. cymis racemoſis multifloris, calycibus nudiusculis collo coarctatis tubum corollae ſubaequantibus, foliis ſeſſilibus cordato-oblongis ſerratis glabris. *Europ. med. et auſtr. Aſia med.* (N. pannonica Jacq., violacea Vill.)

pannonica 19. N. cymis multifloris, floribus congeſtis, calycibus nudiusculis patentibus tubo corollae brevioribus, foliis petiolatis cordato-oblongis obtuſis crenatis glabris. *Europ. med. Sibir.* (N. nuda Jacq., paniculata Crantz.)

violacea 20. N. cymis ſubcapitatis paniculatis, calycibus abbreviatis patentibus tubo corollae brevioribus, lobis corollae lateralibus patentibus, foliis cordato-oblongis breviſſime petiolatis dentatis glabriuſculis. *Europ. med. Sibir.*

coerulea Ait. 21. N. cymis breviſſime pedunculatis multifloris verticillato-ſpicatis hirſutis, lobis corollae lateralibus reflexis, foliis cordato-oblongis ſubſeſſilibus villoſis. *Patria?*

latifolia Cand. 22. N. cymis decompoſitis multifloris paniculato-congeſtis nudiuſculis, calycibus ciliatis profunde dentatis, foliis ſeſſilibus ovato-lanceolatis crenatis cauleque glabriuſculis. *Pyren. m.* (N. grandiflora Lapeyr.)

macrura Ledeb. 23. N. cymis multifloris patentibus paniculatis ſubaphyllis, calycibus incanis ſtriatis, foliis ſubcordato-triangularibus longe petiolatis ſerratis caneſcentibus, ſummis integerrimis. *Sibir.*

criſpa W. 24. N. cymis breviſſime pedunculatis paucifloris ſubverticillatis villoſis, foliis petiolatis cordatis crenatis rugoſis undulatis incanis. *Aſia minor?*

diffuſa Fiſch. 25. N. cymis breviſſime pedunculatis ſubverticillatis ebracteatis, calycibus villoſo-barbatis inaequaliter dentatis, foliis petiolatis ſubcordato-oblongis obtuſis crenulatis incanis. *Sibir. or.*

imbricata Lag. 26. N. cymis breviſſime pedunculatis compactis ſubverticillatis, bracteis patentibus rigidis lineari-ſubulatis calyces ſuperantibus, foliis petiolatis cordatis ſubdentatis villoſiuſculis apice ſummisque ſubintegerrimis. *Hiſpania.*

** *Floribus verticillatis.*

leucrioides Lam. 27. N. verticillis diſtinctis compactis, bracteis lanceolatis villoſis calyces aequantibus, foliis petiolatis cordatis crenatis tomentoſis internodio brevioribus. *Aſia minor.*

italica 28. N. verticillis remotis compactis, bracteis lanceolatis acuminatis margine ſcarioſis calycem aequantibus, foliis petiolatis cordatis obtuſis crenatis. *Italia.* (N. marrubioides W. var.)

multibracteata Desf. 29. N. verticillis approximatis, bracteis lanceolatis pubeſcentibus calycem excedentibus, foliis petiolatis cordatis acutis crenatis ſubtus villoſis. *Atlas.*

ſupina Stev. 30. N. verticillis approximatis capitato-aggregatis, bracteis ſubulatis calyces aequantibus, foliis ſubſeſſilibus ſubcordato-oblongis inaequaliter crenatis villoſis, caule decumbente. *Caucaſ.*

hirſuta 31. N. verticillis approximatis denſe ſpicatis, bracteis acuminatis calycibusque tomentoſis, foliis ſubſeſſilibus cordatis dentatis. *Sicil.* (N. Apuleii Ucr.)

lanata Jacq. 32. N. verticillis approximatis ſpicatis, bracteis ovatis nervoſo-rugoſis, corollae lobis lateralibus patentibus, foliis cordato-oblongis crenula-

tis rugosis utrinque incano-tomentoso-lanatis, radice tuberosa. *Hispan.*

tuberosa 33. N. verticillis distinctis, bracteis arcte imbricatis oblongis acutis coloratis venosis calyces subsuperantibus, corollae lobis lateralibus reflexis, foliis cordato-oblongis dentatis pubescentibus, radice tuberosa. *Hispan. Lusitan.*

reticulata Desf. 34. N. verticillis distinctis, bracteis patentibus oblongis reticulato-venosis subcoloratis, corollae lobis lateralibus reflexis, foliis cordatis lanceolatis elongatis dentatis pubescentibus. *Atlas.*

Scordotis 35. N. verticillis superne approximatis foliosis, bracteis ovatis acutis calycem superantibus, foliis cordato-ovatis crenatis incano-tomentosis. *Creta. Afric. bor.*

amboinica 36. N. verticillis spicatis, bracteis ovatis calyce brevioribus, foliis petiolatis cordatis obtusis crenatis tomentosis. *Amboina.*

madagascarensis Lam. 37. N. verticillis spicatis aphyllis, foliis petiolatis ovato-subrotundis crenatis villosis, radice tuberosa. *Madagascar. Ins. Muscaren. Ind. or.*

**** Floribus spicatis.*

lavandulacea L. suppl. 38. N. spica ovato-oblonga compacta, bracteis imbricatis ovatis calycem aequantibus, foliis oblongis superioribus incisо-serratis. *Sibir.* (N. multifida L.)

botryoides Ait. 39. N. spica elongata compacta, dentibus calycis subaristatis, foliis subbipinnatis glabris, radice annua. *Sibir.* (N. annua Pall., bipinnata Cav., multifida L. suppl.)

nepalensis * 40. N. spicis compositis subsecundis, calycibus incanis, foliis lanceolatis medio serratis petiolatis subreflexis utrinque attenuatis integerrimis. *Nepal.*

***** Corymbis terminalibus.*

heliotropifolia Lam. 41. N. corymbis pedunculatis paucifloris, foliis ovato-oblongis integerrimis canescentibus petiolatis, floralibus linearibus calycibusque subulatis. *Asia minor.*

japonica W. 42. N. corymbis 3fidis subsessilibus, foliis ovato-oblongis acutis serratis utrinque tomentosis subtus albidis. *Japon.* (N. incana Thb.)

racemosa Lam. 43. N. corymbis laxis subverticillatis paucifloris, foliis petiolatis cordatis subcrenatis incanis. *Asia minor.*

2096. HYPTIS Jacq.

** Capitulis pedunculatis axillaribus.*

ebracteata R. Br. 1. H. pedunculis paucifloris folio brevioribus, involucris nullis, calycibus hirsutis truncatis, dentibus aristatis, foliis cordatis duplicato-serratis,

ſummis ovatis. *Ind. occ.* (H. ſuaveolens Poit. Ballota ſuaveolens Jacq.)

lurida * 2. H. capitulis breviſſime pedunculatis, involucris abbreviatis, calycibus acuminatis foliisque ovatis ſerratis glandulosо-viſcoſis. *Braſil.* Sello.

Pſeudo-Chamaedrys Poit. 3. H. pedunculis abbreviatis, involucris linearibus calyces hirſutos aequantibus, foliis ovato-oblongis ſerratis ramisque hirſutis. *Ind. occ.*

Chamaedrys W. 4. H. pedunculis internodia aequantibus, capitulis multifloris compactis, involucris lanceolatis piloſis calyces aequantibus, foliis ovato-oblongis crenatis ramisque villoſis. *Cayenn. Guiana.* (Clinopodium Chamaedrys Vahl.)

radiata W. 5. H. pedunculis internodia aequantibus, involucris lanceolatis denticulatis calyces hiſpidos ſubulatos ſuperantibus, foliis oblongis baſi attenuatis integerrimis medio glabriusculis. *Carolin. Mexico. Inſ. Philippin.*

microcephala Berter. 6. H. pedunculis internodio brevioribus, capitulis globoſis, involucris ſetaceis hiſpidis radiantibus calyces multo ſuperantibus, foliis ovato-oblongis crenatis glabriusculis. *Ad fl. Magdalenae.*

capitata Jacq. 7. H. pedunculis internodio brevioribus, capitulis compactis, involucris lanceolatis acutis calyces aequantibus, foliis ovato-oblongis utrinque attenuatis medio ſerratis glabriusculis. *Ind. occ.* (Clinopodium capitatum Sw.)

lantanaefolia Poit. 8. H. pedunculis internodia ſubaequantibus, capitulis globoſis multifloris, involucris ovato-oblongis calyces ſubſcarioſos ariſtatos aequantibus, foliis oblongis ſerratis ſubtus venoſis tomentoſis. *Hiſpaniola. Portorico. Nov. Granat.* (H. meliſſoides Kunth.)

polyanthos Poit. 9. H. pedunculis crebris internodio brevioribus, capitulis laxiusculis, involucris ſetaceis calyce fructifero ampliato brevioribus, foliis ovalibus ſerratis ſubtus ſubtomentoſis. *Quito. Peru. Braſil.* (H. lamiifolia Weinm.)

inflata * 10. H. pedunculis alternis internodio brevioribus, capitulis ſubmultifloris laxiusculis, involucris lanceolatis calyces fructiferos inflatos membranaceos ſubſuperantibus, foliis ovato-oblongis dentatis utrinque ramisque piloſiusculis. *Braſil.* (Marſypianthus hyptoides Mart.)

brevipes Poit. 11. H. pedunculis oppoſitis abbreviatis, capitulis multifloris compactis, involucris lineari-lanceolatis calyces ſuperantibus, foliis rhomboideo-ovatis inaequaliter dentatis ramisque aſperis. *Amer. auſtr.* (H. globifera Meyer.)

atrorubens Poit. 12. H. pedunculis oppoſitis internodio brevioribus, capitulis globoſis multifloris compactis, involucris lanceolatis calyce ariſtato rigido multo brevioribus, foliis ovato-oblongis inaequaliter dentatis glabriusculis. *Cayenn.* Richard. *Portorico* Bertero. *Martinica* Sieber.

recurvata Poit. 13. H. pedunculis internodio brevioribus, capitulis compactis, involucris ſetaceis calyce fructifero elongato incurvo brevioribus, foliis cordato-ovatis inaequaliter ſerratis. *Cayenn.*

urticoides Kunth. 14. H. pedunculis crebris internodia ſubaequantibus, involucris ſetaceis calyce brevioribus, foliis oblongis acutis ſerratis ſupra ramisque hiſpidis. *Mexico.*

lanceolata Poir. 15. H. capitulis alternis ſeſſilibus globoſis, involucris lanceolatis calyces aequantibus, foliis lanceolatis ſubſerratis glabris. *Patria?*

** *Floribus cymoſis.*

polyſtachya Humb. 16. H. faſciculis racemoſo-ſpicatis, involucris lanceolatis calyce brevioribus, foliis ovatis duplicato-ſerratis ſubtus cano-tomentoſis. *Mexico. Martinica.*

caneſcens Humb. 17. H. cymis ſubcapitatis racemoſis, involucris lanceolatis calyces ſubaequantibus, foliis rhombeo-ovatis duplicato-ſerratis ſubtus incano-tomentoſis. *Caracas.* (Teucrium rhombifolium W. herb.)

tomentoſa Poit. 18. H. cymis umbellatis pedunculatis albo-tomentoſis, involucris ſubnullis, foliis ovato-oblongis acutis crenatis tomentoſo-incanis reticulato-venoſis. *Mexico.*

albida Kunth. 19. H. cymis umbellatis oppoſitis ſeſſilibus albo-lanatis, involucris nullis, foliis oblongo-lanceolatis acutis ſerratis utrinque albo-tomentoſis. *Mexico.*

nepetoides Fiſch. 20. H. cymis axillaribus oppoſitis breviter pedunculatis ſuperne paniculatis, involucris ſetaceis breviſſimis, calycibus ariſtatis, foliis ovato-oblongis inaequaliter dentatis pubeſcentibus. *Ind. occid.* (Brotera perſica *. Hyptis perſica W. Poit.)

ſpicata Poit. 21. H. cymis oppoſitis breviſſime pedunculatis racemoſo-ſpicatis, involucris abbreviatis, calycibus ariſtatis, foliis ovatis acuminatis inaequaliter dentatis utrinque glabris. *Hiſpaniola. Nov. Granat.*

*** *Floribus verticillatis.*

verticillata Jacq. 22. H. verticillis ſub-6floris, involucris nullis, foliis lanceolatis utrinque attenuatis inaequaliter dentatis glabriusculis. *Hiſpaniola.*

Plumerii Poit. 23. H. verticillis denſis foliatis, inferioribus diſtinctis ſuperioribus confluentibus, foliis inferioribus cordatis angulato-ſerratis ſubtus tomentoſis, floralibus ovatis. *Ind. occ.* (Ballota foliis cordatis Plum.)

hirſuta Kunth. 24. H. verticillis laxiusculis diſtinctis foliatis, involucris lanceolatis calyces ſubaequantibus, foliis ſeſſilibus oblongis utrinque attenuatis crenatis hirſutis. *Nov. Granat.*

Pohliana Jacq. 25. H. verticillis approximatis, involucris ſubulatis calyce brevioribus, foliis petiolatis ovato-oblongis ſerratis glabriuſculis. *Braſil.*

ſtachyoides Link. 26. H. verticillis diſtinctis aphyllis ſpicatis, involucris ſetaceis patulis calyces ſuperantibus, foliis rhombeo-ovatis ſerratis pubeſcentibus. *Braſil.*

**** *Floribus ſpicatis.*

ſpicigera Lam. 27. H. ſpicis axillaribus elongatis denſe floriferis longe pedunculatis, calycibus ariſtatis, foliis oblongis ſerratis, ramis ſubaculeato-aſperis. *Ind. occid.*

pectinata Poit. 28. H. ſpicis axillaribus ſecundis ſubpaniculatis, bracteis ſubulatis calyces ariſtatos aequantibus, foliis ſubcordato-oblongis inaequaliter ſerratis glabris. *Ind. occid.* (Nepeta L. Byſtropogon Herit.)

***** *Floribus axillaribus ſubſolitariis.*

ſcoparia Poit. 29. H. floribus axillaribus oppoſitis breviſſime pedunculatis ebracteatis, calycibus muticis, foliis linearibus obtuſis glabris. *Hiſpaniola.*

2097. STACHYS.

* *Floribus ſubſolitariis ſ. oppoſitis.*

ſpinoſa 1. St. fruticoſa ramoſa ſericeo-lanata, ramis trichotomis patentibus ſpina terminatis, foliis lanceolatis ſubintegerrimis, floribus oppoſitis axillaribus ſeſſilibus. *Creta.*

mucronata Sieb. 2. St. fruticoſa ramoſa lanata, ramis 3fidis inermibus, foliiis oblongis obtuſis crenulatis, floribus oppoſitis axillaribus ſeſſilibus, calycibus campanulatis ſpinoſis. *Creta.*

glutinoſa 3. St. fruticoſa ramoſiſſima glabra, ramis trichotomis ſubglutinoſis, foliis lineari-lanceolatis integerrimis, floribus ſubſolitariis breviſſime petiolatis 2bracteatis. *Creta. Corſica.*

fruticuloſa MB. 4. St. fruticoſa ramoſiſſima, ramis caneſcentibus, foliis lineari-lanceolatis apice dentatis, floribus oppoſitis dentatis, calycibus inermibus. *Caucaſ.*

aethiopica 5. St. herbacea tenera villoſa, foliis cordatis rugoſis crenatis, floribus oppoſitis ſubſpicatis, calycibus ariſtatis 5partitis. *Afric. auſtr.*

corſica Perſ. 6. St. herbacea aſcendens hirſuta, foliis ſubcordato-ovatis crenatis, floribus ſolitariis axillaribus, calycibus ſpinuloſis. *Corſica.* (Glechoma grandiflora Cand.)

anguſtifolia MB. 7. St. herbacea glabra, ramis virgatis diffuſis, foliis linearibus infimis pinnatifidis, floribus geminis pedunculatis remotis. *Tauria.* (St. tenuifolia Pall.)

** *Verticillis pauci-4floris.*

nivea Labill. 8. St. fruticosa densissime albo-tomentosa, foliis ovato-subrotundis obtusis integerrimis subtus nervosis, verticillis sub-4floris remotis, calycibus muticis. *Syria.*

rugosa Ait. 9. St. fruticosa tomentosa, foliis lineari-lanceolatis subserratis rugosis, summis integerrimis, floribus pedicellatis, calycibus muticis. *Afric. austr.*

betonicaefolia Desf. 10. St. herbacea villosa, foliis petiolatis cordato-oblongis rugosis crenatis, floribus subsessilibus, calycibus muticis, galea corollae dense lanata. *Creta.*

hyssopifolia Mx. 11. St. herbacea glabriuscula, foliis sessilibus lineari-lanceolatis subdentatis, verticillis sub-4floris. *Carolina.* (St. palustris Walt.)

*** *Verticillis 6floris*

† *distinctis.*

a. *Floribus albidis, ochroleucis, flavis.*

fienophylla * 12. St. suffruticosa hirsutiuscula, ramis virgatis, foliis linearibus trinerviis, infimis sublanceolatis utrinque 1dentatis, verticillis foliatis, calycibus pungentibus. *Hispan. austr.* (Sideritis linearifolia Lam.)

orientalis 13. St. suffruticosa albo-tomentosa, foliis oblongo-lanceolatis integerrimis venoso-rugosis, floralibus verticillos aequantibus, calycibus muticis. *Asia minor. Palaestina.*

scordioides Poir. 14. St. suffruticosa villosa, foliis lineari-lanceolatis subintegerrimis obtusis, floralibus inciso-laciniatis calycibusque spinulosis. *Afric. bor.?*

spinulosa Sm. 15. St. herbacea ramosa, angulis caulis ramorumque spinuloso-asperrimis, foliis cordatis crenatis pilosis, verticillis foliatis, calycibus campanulatis submuticis. *Creta.*

maritima 16. St. caule herbaceo erecto subsimplici villoso-lanato, foliis obovato-oblongis in petiolum attenuatis crenatis nudiusculis, floralibus lanceolatis integerrimis, calycibus villosis submuticis. *Ad litora maris mediterran.*

annua 17. St. caule herbaceo ramoso glabriusculo, foliis oblongo-lanceolatis acutiusculis trinerviis dentatis, summis integerrimis, calycibus villosis subpungentibus. *Europ.* (St. pubescens Tenor. et Balbisii Link. var.)

hirta 18. St. caule diffuso villoso, foliis inferioribus petiolatis cordato-oblongis obtusis crenatis rugosis hirsutis, floralibus abbreviatis sessilibus, calycibus subpungentibus, galea corollae 2fida, laciniis divaricatis, lab. inf. plano elongato, lobis lateralibus obsoletis. *Italia. Afric. bor. Hispan. Asia minor.* (St. inscripta Reichenb.)

β. Floribus rubentibus.

arvenſis 19. St. caule erecto hirſuto debili, foliis petiolatis cordatis obtuſis crenatis, tubo corollae calycem ſubmucronatum aequante. *Europ.* (St. purpurea Poir. var. italica et africana, corollis majoribus.)

arenaria Vahl. 20. St. caule aſcendente ſuperne villoſiſſimo, foliis lanceolatis ſeſſilibus obtuſis crenatis rugoſis baſi ſublanatis, calycibus villoſiſſimis pungentibus, galea corollae emarginata. *Calabria. Afric. bor. Aſia minor.*

iberica MB. 21. St. caule decumbente hirſuto, foliis oblongo-lanceolatis obtuſis ſubdentatis venoſis, calycibus villoſiusculis ſpinoſis. *Caucaſ.* (St. ſcordifolia W.)

aſpera Mx. 22. St. caule erecto ramisque ſubretrorſum hiſpidis, foliis ſubpetiolatis lanceolatis acuminatis ſerrulatis glabris, calycibus divaricato-ariſtatis. *Amer. bor.* (St. tenuifolia W. (var. caule glabro), arvenſis Walt.)

hiſpida Pursh. 23. St. caule erecto foliisque petiolatis ovato-oblongis obtuſe ſerratis ſtrigoſo-hiſpidulis, calycibus glabriusculis ſpinuloſis. *Amer. bor.*

nepetaefolia Desf. 24. St. caule erecto glabriusculo, foliis cordato-oblongis obtuſis crenulatis, calycibus ſubpungentibus. *Aſia minor.* (Nepeta circinata W. Cataria cappadocica humilior lamii folio. Tourn. in W. herb.)

arabica Hornem. 25. St. caule erecto ſuperne hirto inferne angulis muricato-aſperis, foliis ſubcordato-oblongis ſerratis rugoſis ſubtus nervoſis, ſummis ſeſſilibus acutis, calycibus amplis villoſis ſpinuloſis. *Arabia?*

ambigua Sm. 26. St. caule erecto villoſo fiſtuloſo, foliis ſubcordato-oblongis acute ſerratis villoſiusculis, calycibus acuminatis. *Scotia. Inſ. Orcades.*

ſylvatica 27. St. caule erecto villoſo-hirſuto ſolido, foliis cordato-ovatis dentato-crenatis villoſis, verticillis ſubaphyllis, calycibus acuminatis. *Europ.*

bogotenſis Humb. 28. St. caule erecto piloſo, foliis obſolete cordatis ſubrotundis obtuſis ſubtus caneſcentibus, calycibus mucronatis. *Nov. Granat.*

elliptica Kunth. 29. St. caule erecto hirſuto, foliis petiolatis ellipticis crenatis venoſo-reticulatis utrinque hirſutis, calycibus mucronatis. *Quito.*

hirſuta Kunth. 30. St. caule aſcendente hiſpido, foliis petiolatis cordato-oblongis acutis crenatis utrinque hirſutis, calycibus ſubpungentibus, galea emarginata. *Mexico.*

†† *Verticillis contiguis ſubſpicatis.*

Foeniculum Pursh. 31. St. caule erecto glaberrimo, foliis ſubcordato-oblongis acutis ſerratis ſubtus albicantibus, calycibus coloratis muticis. *Ad fl. Miſſuri.*

palaeſtina 32. St. caule erecto ſuffruticoſo tereti foliisque lanceolatis integerrimis rugoſis albido-tomentoſis, calycibus muticis ſub-10gonis. *Graecia. Syria.*

circinata Herit. 33. St. caule aſcendente piloſiſſimo, foliis petiolatis cordatis obtuſis crenatis utrinque villoſis, bracteis calycibusque ſpinuloſis. *Afric. bor. Hiſpan. Inſ. ion.* (St. canarienſis Jacq., velutina et molliſſima W., decumbens Desf.)

coccinea Jacq. 34. St. caule erecto, foliis cordato-lanceolatis acutis ſerratis rugoſis villoſis, ſuperioribus ſeſſilibus, verticillis ſubaphyllis, calycibus pungentibus. *Patria?*

olympica Poir. 35. St. caule baſi ſtolonifero lanato, foliis elliptico-oblongis obtuſis argute ſerratis ſubtus lanuginoſis, verticillis tomentoſis ſpicatis, calycibus ſpinoſis. *Olymp.*

congeſta Urv. 36. St. caule baſi ramoſo proſtrato tomentoſo, foliis ovato-oblongis crenulatis incanis, floribus denſe ſpicatis, calycibus denſiſſime lanatis, corolla extus piloſa. *Aſia minor. Palaeſtina.* (Marrubium undulatum Sieber.)

aegyptiaca Perſ. 37. St. *incana*, foliis ovatis rugoſis, bracteis late ovatis acuminatis, ſpica denſa, calycibus campanulatis laevibus. *Aegypt.*

† *betaefolia* Perſ. 38. St. foliis petiolatis cordatis inciſo-crenatis, ſpica compacta villoſa. *Patria?*

******** *Verticillis ſub-10floris.*

recta 39. St. caule aſcendente foliisque ſubſeſſilibus lanceolatis ſubdentatis hirſutis, calycibus pungentibus. *Europ.*

heraclea All. 40. St. caule aſcendente villoſiſſimo ſublanato, foliis petiolatis ſubcordato-oblongis crenato-ſerratis rugoſis utrinque villoſis, bracteis ſummis integerrimis, verticillis diſtinctis, calycibus villoſiſſimis pungentibus, galea corollae lanata. *Italia. Croatia. Gallia auſtr.* (St. obliqua Kit. phlomoides W.)

debilis Kunth. 41. St. caule debili laevi, foliis profunde cordatis obtuſis crenatis ſubtus pubeſcentibus, calycibus ſubpungentibus, galea corollae 2fida. *Quito.*

glauceſcens Muſſin. 42. St. caule erecto villoſo, foliis cordatis acuminatis ſerratis utrinque hirſutis, verticillis aphyllis ſpicatis, laciniis calycis divaricatis pungentibus. *Caucaſ.* W. herb.

paluſtris 43. St. caule erecto retrorſum hiſpido, foliis amplexicaulibus lanceolatis ſerratis pubeſcentibus, verticillis hirſutis, calycibus pungentibus. *Europ.*

********* *Verticillis multifloris.*

germanica 44. St. caule erecto lanato, foliis oblongis crenatis lanato-villoſis, bracteis lanceolatis integerrimis patulis, dentibus calycis ovatis, galea cor. rotundata, lobo med. lab. inf. emarginato. *Europ.*

intermedia Ait. 45. St. caule erecto ſublanato, foliis ſubcordato-oblongis crenatis villoſis, bracteis lanceolatis integerrimis, interioribus longioribus, calycibus pungentibus, galea ſubretuſa, lobo medio lab. inf. integerrimo. *Sibir.* (St. ſibirica Link.)

polyſtachya Tenor. 46. St. caule ramoſo ſublanato, foliis ſubcordato-oblongis inaequaliter crenatis rugoſis tomentoſis, bracteis ovato-oblongis abbreviatis ſerratis, calycibus ſpinoſis, galea cor. crenulata. *Neapol.*

ſalviaefolia Tenor. 47. St. caule ſimplici tomentoſo, foliis anguſte oblongis obtuſis crenatis incanis ſubtus lanatis, verticillis ſubſpicatis, calycibus longe ſpinoſis. *Calabria.*

cretica 48. St. caule erecto hirſuto, foliis ſubcordato-oblongis crenatis rugoſis pubeſcentibus, verticillis villoſo-lanatis, calycibus pungentibus, galea cor. demum reflexa. *Creta. Sicilia.* (St. daſyantha Rafin.)

alpina 49. St. caule erecto villoſo, foliis ſubcordato-oblongis cartilagineo-dentatis hirſutis, verticillis foliatis, calycibus coloratis ſubpungentibus, galea cor. horizontali. *Alp. Europ. med.*

lanata Jacq. 50. St. caule baſi procumbente radicante foliisque oblongis obſcure crenulatis denſiſſime lanatis, calycibus acutis denſa lana occultis. *Ad Volgam. Tauria. Graecia. Aſia minor.*

latifolia Ait. 51. St. foliis late cordatis rugoſis piloſis, verticillis ſubſpicatis, galea 2fida acuta. *Patria?*

† *Tournefortii* Poir. 52. St. caule erecto tomentoſo, foliis cordato-ovatis ſubcrenatis obtuſis rugoſis, petiolis dilatatis baſi connatis, calycibus ſpinoſis tubum corollae aequantibus. *Creta.*

Artemiſia Lour. 53. St. caule ſimplici albicante, foliis ſubtus tomentoſis, radicalibus ſubrotundis crenatis, caulinis pinnatifidis inciſis, calycibus pungentibus. *China. Cochinchina.*

2098. LEONURUS.

Cardiaca 1. L. foliis oblongis 3fidis baſi cuneatis glabriusculis, laciniis acutis, corolla calycem pungentem ſuperante, lobo med. lab. inf. oblongo. *Europ. Aſia minor. Amer. bor.*

villoſus Desf. 2. L. caule erecto villoſo, foliis oblongis 3fidis hirſutis, laciniis elongatis acutis dentato-laciniatis, tubo corollae villoſae calycem pungentem triplo ſuperante. *Tauria.* d'Urville.

Marrubiaſtrum 3. L. foliis oblongis groſſe dentatis utrinque attenuatis, calycibus longe ſpinoſis corollae tubum ſubſuperantibus, lobo medio lab. inf. ſubrotundo. *Europ. praeſertim orient.* (Chaiturus Ehrh.)

criſpus Murr. 4. L. caule erecto glabro, foliis ſubcordato-ovatis ſubtus incanis lobatis, lobis acutis inciſo-dentatis, corolla denſe lanata calycem glabrum ſpinuloſum multo ſuperante. *Sibir.*

ſupinus 5. L. caule aſcendente pubeſcente, foliis ſub-5lobis utrinque pubeſcentibus, lobis obtuſis apice dentatis, calycibus pubeſcentibus ſpinoſis tubum corollae ſubaequantibus. *Sibir.*

tataricus 6. L. foliis 3partitis, laciniis ſubinciſis, calycibus inermibus, galea corollae plana ſubreflexa. *Aſia media.*

ſibiricus 7. L. foliis 3partitis, laciniis ſubinciſis obtuſiusculis, calycibus inermibus, galea cor. fornicata erecta. *Sibiria. China.*

condenſatus Hornem. 8. L. foliis 3partitis, laciniis pinnatifidis dentatis lanceolatis acutiusculis, calycibus glabris ſpinoſis, galea cor. planiuscula recta pubeſcente. *Sibir.*

altaicus * 9. L. foliis palmato-pedatis glabris, laciniis linearibus pinnatifidis acuminatis, floralibus 3partitis hirſutis, verticillis denſe lanatis, calycibus ſpinoſis, galea cor. demum reflexa. *Imaus.*

lanatus Perſ. 10. L. caule erecto denſe lanato, foliis palmatis ſubtus albido-lanato-villoſis, calycibus ſpinoſis, galea cor. concava denſe villoſa. *Sibir. China.* (Ballota L. Panzera multifida Mönch.)

2099. BALLOTA.

nigra L. ſp. ed. 1. 1. B. foliis ovatis obtuſis crenatis baſi ſubattenuatis hirſutiusculis, cymis ſubverticillatis, dentibus calycis ovatis mucronatis patentibus tubum corollae ſubſuperantibus. *Europ.* (B. alba L. ſpec. ed. 2. fl. ſuec., foetida Lam. borealis Schweigg.)

vulgaris Link. 2. B. foliis ovatis acutis groſſe ſerratis baſi ſubattenuatis glabriusculis, cymis ſubverticillatis, dentibus calycis linearibus cuſpidatis rectis tubo corollae brevioribus. *Europ.* (B. nigra L. ſpec. ed. 2., ruderalis Sv. bot.)

2100. BETONICA.

officinalis 1. B. caulibus aſcendentibus laxis, foliis cordato-oblongis crenatis, ſpica interrupta abbreviata, calycibus ciliatis glabriusculis, lobo medio lab. inf. cor. ſubemarginato. *Anglia. Europ. auſtr.*

ſtricta Ait. 2. B. caule ſtricto ſimplici, foliis cordato-oblongis crenatis, ſpica oblonga baſi interrupta, calycibus hirſutis, lobo medio lab. inf. crenulato. *Europ.* (B. officinalis Crantz. Poll.)

incana Ait. 3. B. ſpica interrupta, tubo corollae incurvo tomentoſo, galea 2fida, lobo medio lab. inf. crenato, foliis cordato-oblongis groſſe crenatis canescentibus. *Italia. Ad Nanmetum Armoric.*

orientalis 4. B. ſpica continua elongata, lobo medio lab. inf. cor. integerrimo, foliis cordato-lanceolatis elongatis crenatis. *Aſia minor.*

Alopecuros 5. B. ſpica interrupta baſi foliata, calycibus pungentibus, galea cor. 2fida, foliis caulinis cordato-ovatis crenatis petiolatis. *German. med. et auſtr. Italia. Gallia.* (Flores ochroleuci.)

heraclea 6. B. ſpica ſubcontinua lanata, dentibus calycis filiformibus inermibus, foliis lanceolatis glabriusculis. *Aſia minor.* (Flores lutei.)

hirſuta 7. B. ſpica ſubcontinua oblonga folioſa, bracteis lanceolatis calyces cuſpidatos aequantibus, galea cor. integra, foliis cordato-oblongis crenatis cauleque hirſutiusculis. *Italia. Pyren. Caucaſ.* (B. Monnerii Gouan.)

grandiflora W. 8. B. ſpica interrupta foliata, bracteis ovatis cuſpidatis calycibusque ſpinoſis villoſis, corollae declinatae galea obcordata, foliis cordato-ovatis ſerratis cauleque villoſis. *Sibir. Caucaſ.*

nivea Stev. 9. B. ſpica interrupta foliata, bracteis lanceolatis calycibusque inermibus villoſis, corollae erectae galea rotundata, foliis lineari-oblongis groſſe ſerratis villoſis ſubtus niveo-tomentoſis. *Caucaſus.*

2101. MARRUBIUM.

* *Calycibus 5dentatis.*

Alyſſon 1. M. caule albo lanato, foliis cuneatis ſubpraemorſis dentatis lanatis, verticillis foliatis, calycis dentibus rigidis patentibus. *Hiſpan. Sicil.*

aſtracanicum Jacq. 2. M. caule lanato, foliis obovatis ſubrotundo-oblongis rugoſis crenatis utrinque tomentoſis, bracteis ſubulatis, calycis denſe lanati dentibus reflexo-uncinatis. *Ad Volgam. Aſia minor. Caucaſ.* (M. affine Horn.)

candidiſſimum 3. M. caule baſi ramoſo villoſo-lanato, foliis ovatis obtuſe dentatis rugoſis utrinque ſericeo-tomentoſis, bracteis dentibusque calycis ſubulatis patentibus. *Hiſpan. Graecia. Aſia minor.* (M. uncinatum Horn.)

peregrinum 4. M. caule ramoſiſſimo, ramis divaricatis, foliis oblongo-lanceolatis dentatis rugoſo-venoſis incano-tomentoſis, bracteis dentibusque calycis ſubulatis rectis. *Europ. med. et auſtr. Aſia minor.* (M. creticum Mill. Roth., paniculatum et incanum *Desrouſſ.*, remotum Kit.)

ſupinum 5. M. caule ramoſo lanato, foliis obovatis inaequaliter crenatis rugoſis lanato-villoſis, bracteis calycibusque ſpinoſis rectis villoſis. *Europ. auſtr.* (M. ſetaceum Desr.)

catariaefolium Desr. 6. M. caule ramoſo incano, foliis ovato-oblongis viridibus profunde crenatis, calycis villoſi dentibus bracteisque ſubulatis glabris patentibus. *Aſia minor. Caucaſ.* (M. leonuroides Desr.)

circinatum Desr. 7. M. caule tomentoſo, foliis orbiculatis crenatis rugoſiſſimis tomentoſis, bracteis dentibusque

calycis subulatis rectis villosis. *Graecia.* (M. velutinum Sm.)

** *Calycibus 10dentatis.*

vulgare 8. M. foliis subrotundo-ovatis dentatis venoso-rugosis incanis, bracteis dentibusque calycis setaceo-uncinatis. *Europ. Asia med. Amer. bor.* (M. apulum Tenor.)

hamatum Kunth. 9. M. foliis subrotundis crenatis rugosis subtus cauleque lanatis, bracteis setaceis, dentibus calycis subulatis hamatis. *Nov. Hispan.*

africanum 10. M. caule ramoso folioso villoso, foliis petiolatis cordato-subrotundis crenatis, verticillis pauciflоris, calycis dentibus lanceolatis mucronatis patentibus. *Afric. austr.* (M. microphyllum Desr.)

crispum 11. M. caule suffruticoso lanato, foliis superioribus amplexicaulibus cordato-subrotundis crenatis rugosissimis utrinque pilosis subtus discoloribus, verticillis foliatis, calycibus patentibus muticis, corollae glabrae galea integra. *Ital. Hispan.*

cinereum Desr. 12. M. caule lanato, foliis cordato-subrotundis crenatis rugosis supra pilosis subtus tomentosis, calycis dentibus ovatis mucronatis patentibus, corollae pilosae galea 2fida. *Hispan. Lusitan. Aegypt. Palaestina.* (Ballota saxatilis Sieber.)

hispanicum 13. M. caule erecto foliisque cordatis ovatis crenatis rugosis utrinque villosis, bracteis linearibus, dentibus calycis ovatis mucronatis, galea corollae barbata incisa. *Hispan. Ital. Sicil.* (M. hirsutum W., rupestre Bivon.)

orientale * 14. M. caule ramoso villoso, foliis cordato-subrotundis dentatis rugosis subtus incano-tomentosis, bracteis linearibus, calycis rigidi dentibus spinosis, galea corollae fornicata crenulata. *Asia minor.* (Ballota orientalis Presl.)

acetabulosum 15. M. caule stricto villoso-lanato folioso, foliis cordato-subrotundis crenatis rugosis, limbo calycis demum dilatato rotundato. *Creta. Ins. maris aegei. Palaestina.* (Stachys palaestina Sieber.)

Pseudo-Dictamnus 16. M. fruticosum densissime tomentosum, foliis cordato-subrotundis concavis petiolatis, calycis limbo plano villoso. *Creta. Graecia.*

2102. PHLOMIS.

* *Genuinae.*

† *Fruticosae.*

fruticosa 1. Phl. incano-tomentosa, foliis oblongis obtusis crenulatis rugosis, inferioribus subcordatis, bracteis lanceolatis acuminatis calycem aequantibus, dentibus calycis subulatis recurvis. *Europ. austr.*

ferruginea Tenor. 2. Phl. ferrugineo-tomentoso-floccosa, foliis subcordato-ovato-oblongis crenatis rugosis, brac-

teis linearibus subulatis calyce subbrevioribus, dentibus calycis subulatis recurvis. *Neapol.*

cretica Presl. 3. Phl. incano-tomentoso-hirsuta, foliis omnibus cordatis petiolatis crenatis rugosis, bracteis dentibusque calycis hirsutissimi subulatis, tubo corollae calycem subaequante, galea repanda. *Creta.* (Phl. fruticosa Sieber.)

scariosa Presl. 4. Phl. subtomentosa, foliis ovato-oblongis acutis crenatis rugosis supra viridibus, bracteis scariosis calyce brevioribus, galea corollae crenata. *Calabria.*

virens Cand. 5. Phl. hirsutiuscula, foliis ovato-lanceolatis, bracteis lineari-subulatis, dentibus calycis inaequalibus. *Asia minor?*

lanata W. 6. Phl. albido-lanata, foliis obovato-ellipticis obtusis rugoso-venosis, bracteis obovatis obtusis calyce breviſſime dentato brevioribus. *Calabria. Creta.* (Phl. microphylla Sieber., parvifolia Presl., angustifolia Cand.?)

purpurea Sm. 7. Phl. tomentoso-lanata, foliis subcordato-ovato-lanceolatis acutis rugosis subtus dense lanatis, bracteis lanceolatis pungentibus, calycibus acuminatis. *Hispania. Lusitania.*

italica Sm. 8. Phl. tomentosa, foliis cordatis oblongis utrinque lanatis, bracteis lanceolatis obtusis calyce obtusissimo inermi brevioribus. *Italia. Lusitan.* (Phl. purpurea L.)

Nissolii 9. Phl. tomentoso-villosa, foliis radicalibus cordato-sagittatis, caulinis oblongis, verticillis ebracteatis, dentibus calycis oblongis acutis. *Asia minor.*

armeniaca W. 10. Phl. tomentosa, foliis omnibus petiolatis lanceolatis obtusis rugosis subtus albo-tomentosis, bracteis breviſſimis subulatis reflexis, dentibus calycis lanceolato-subulatis. *Armenia.*

Lychnitis 11. Phl. tomentosa, foliis lanceolatis venoso-rugosis subtus albidis, floralibus ovatis involucrantibus, calycis villosissimi dentibus setaceis bracteas lineari-subulatas aequantibus. *Gallia austr. Hispania.*

†† *Herbaceae.*

orientalis Cand. 12. Phl. dense tomentosa, foliis omnibus petiolatis crenulatis, inferioribus subcordatis superioribus ovato-oblongis, verticillis laxis, bracteis subulatis calyce brevioribus. *Ad Smyrnam Asiae minor.*

samia 13. Phl. hirsuta, foliis cordatis crenatis supra viridibus subtus incano-tomentosis, bracteis 3partitis subulatis calycem 10 striatum mucronatum aequantibus. *Inf. Samos. Euboea. Afric. bor.*

lunarifolia Sm. 14. Phl. foliis cordatis crenatis subtus tomentosis, bracteis latis indiviſis fasciculato-ciliatis mucronatis, calycibus spinosis. *Graecia.*

crinita Cav. 15. Phl. candide tomentosa, foliis integerrimis, inferioribus petiolatis subcordatis, floralibus sessi-

libus oblongis, bracteis ſetaceis villoſis calycis dentes ſubulatos erectos ſubſuperantibus. *Hiſpan. auſtr.*

biloba Desf. 16. Phl. villoſo-lanata, foliis ovato-oblongis ſubintegerrimis, inferioribus petiolatis, floralibus ſeſſilibus verticillos paucifloros excedentibus, bracteis lineari-filiformibus hirſutis calycem aequantibus, galea cor. profunde 2partita. *Atlas.*

Herba venti 17. Phl. hirſuta, foliis venoſo-rugoſis ſerratis ſubtus hirſuto-tomentoſis, inferioribus cordato-oblongis petiolatis, floralibus ſubſeſſilibus lanceolatis, calycis dentibus patentibus bracteisque ſubulatis hirſutis. *Europ. auſtr.*

pungens W. 18. Phl. pubeſcens, foliis petiolatis ſupra ſcabris ſubtus tomentoſis, caulinis ovato-lanceolatis ſerratis, floralibus lineari-lanceolatis integerrimis, calycis dentibus patentibus bracteisque ſubulatis aſperis. *Armenia. Caucaſ. Perſia. Sibir.*

tuberoſa 19. Phl. radice tuberoſa, caule glabro, foliis cordato-oblongis ſerratis glabriusculis, calycis dentibus patentibus bracteisque ſubulatis hirſutis. *Tauria. Caucaſ. Sibir.*

alpina Pall. 20. Phl. pubeſcens, foliis radicalibus cordatis, floralibus lanceolatis elongatis, bracteis ſubulatis villoſis. *Imaus.*

laciniata 21. Phl. caule elato lanato, foliis alternatim pinnatis, foliolis pinnatifidis obtuſe dentatis, calycibus campanulatis denſe lanatis. *Armenia. Caucaſ.*

** *Deſciſcentes calyce.*

alba Forsk. 22. Phl. caule glabro, foliis ovatis obtuſis medio ſerratis piloſis, involucris 4fidis ſetaceis, calycibus obliquis, dentibus ſuperioribus majoribus. *Arabia.*

moluccoides Vahl. 23. Phl. arboreſcens, foliis omnibus petiolatis ovatis ſerratis, involucris multipartitis ſetaceis, calyce $\frac{1}{3}$, lobo medio lab. inf. rotundato membranaceo. *Arab.* (Clinopodium fruticoſum Forsk.)

2103. LEUCAS R. Br.

* *Fruticoſae.*

chinenſis R. Br. 1. L. ramis hiſpidis, foliis petiolatis ovatis ſerratis ſericeo-tomentoſis, calycibus infundibuliformibus, dentibus ariſtatis. *China.* (Phlomis Retz.)

montana * 2. L. ramis tomentoſis, foliis ſubcordato-ovatis groſſe dentatis ſubtus niveis, calycibus truncatis breviſſime dentatis bracteas lineares aequantibus. *Ind. or.* (Phlomis Roth.)

** *Herbaceae.*

ceylanica R. Br. 3. L. caule diffuſo piloſo, foliis lanceolatis obtuſis remote ſerratis, calycibus obovatis truncatis pi-

loſiſſimis breviſſime dentatis bracteas ſetaceas ciliatas ſuperantibus. *Ceylon. Ind. orient.* (Phlomis L.)

linifolia * 4. L. caule ramoſo pubeſcente, foliis lineari-lanceolatis obtuſis ſubſerratis glabriusculis, calycibus ovatis obliquis ſub-8dentatis glabris, dente ſupremo maximo. *Ind. or.* (Phlomis zeylanica Murr. linifolia Roth.)

Plukenetii * 5. L. caule ramoſo laevi, foliis lineari-lanceolatis groſſe ſerratis pubeſcentibus, calycibus obovato-oblongis obliquis 8dentatis apice piloſis, dentibus ſuperioribus majoribus. *Ind. or.* (Phlomis Roth.)

cephalotes * 6. L. caule ramoſo hirto, foliis oblongo-lanceolatis groſſe ſerratis pubeſcentibus, capitulis terminalibus multifloris, bracteis lanceolatis calyces oblongos piloſos dentibus 10 ſubulatis aequantibus. *Ind. or.* (Phlomis Roth.)

nutans * 7. L. caule pubeſcente, foliis ovato-lanceolatis obtuſis groſſe ſerratis piloſis, verticillis ſubcontiguis, bracteis ſetaceis calyce cylindrico obliquo 10dentato brevioribus. *Ind. or.* (Phlomis Roth.)

hirta * 8. L. caule foliisque lanceolatis obtuſis ſubſerratis rugoſis hirtis, verticillis faſtigiatis, calycis ovati truncati hirſuti dentibus 10 lanceolatis rigidis patulis. *Ind. or.* (Phlomis Roth.)

dimidiata * 9. L. caule hirto, foliis oblongo-lanceolatis ſubſerratis hirſutis, verticillis dimidiatis, calycis oblongi ſuperne piloſi dentibus 10 ſubulatis ſubpungentibus. *Ind. or.* (Phlomis Roth.)

aſpera * 10. L. ramis horizontalibus hirſutis, foliis lanceolatis baſi attenuatis medio ſerratis ſupra glabris ſubtus aſperis, bracteis lanceolatis, calycibus inaequaliter 10dentatis oblique truncatis. *Perſia auſtr.* (Phlomis W. en.)

indica R. Br. 11. L. caule tomentoſo, foliis ovatis ſerratis villoſis, bracteis linearibus villoſis, calycibus tubuloſis obliquis 8dentatis. *Ind. or.* (Phlomis L.)

urticaefolia R. Br. 12. L. foliis ovatis ſerratis cauleque caneſcentibus, bracteis ſubulatis, calycibus oblique truncatis membranaceis ſub-9dentatis. *Arabia. Ind. or.* (Phlomis Vahl.)

ſtachyoides * 13. L. caule aſcendente retrorſum piloſo, foliis ovato-oblongis acutis ſerratis pubeſcentibus, verticillis laxiusculis ebracteatis, calycibus campanulatis glabriusculis, dentibus 10 alternis minoribus. *Inſ. Societ. Cochinchina.* (Stachys decemdentata Forſt., Phlomis W., Ballota piloſa Lour.)

flaccida R. Br. 14. L. foliis ovatis membranaceis calycibusque glabriusculis, dentibus 10 aequalibus, verticillis multifloris. *Nov. Holl.*

glabrata R. Br. 15. L. ramis retrorſum piloſis, foliis ovatis ſerratis, bracteis abbreviatis 4partitis ſetaceis, calycibus obliquis $\frac{2}{3}$, labio inf. producto. *Arabia.* (Phlomis Vahl.)

martinicenſis R. Br. 16. L. ramis retrorſum piloſis, foliis oblongis utrinque attenuatis dentatis ſubtus pubeſcentibus, verticillis globoſis multifloris, calycibus incurvis oblique 8dentatis, dente ſupremo producto. *Martinica.* (Phlomis caribaea Jacq. martinicenſis Sw. W.)

biflora R. Br. 17. L. caule ſubramoſo ſcabro, foliis petiolatis ovatis crenato-ferratis glabris, calycibus oppoſitis pedunculatis axillaribus aequaliter 10dentatis. *Ceylon.* (Phlomis Vahl. W.)

2104. LEONOTIS R. Br.

Leonurus R. Br. 1. L. fruticoſa, foliis lanceolatis baſi attenuatis ferratis venoſis ſcabris, bracteis ſubulatis verticillo brevioribus, calycibus prismaticis glabriusculis, dentibus recurvatis mucronatis abbreviatis. *C. B. S.* (Phlomis L.)

ovata ✝ 2. L. fruticoſa, foliis petiolatis ovatis dentatis ſubtus incanis, verticillis capitatis, calycibus glabriusculis ore obliquo inaequaliter 7dentatis, dente ſupremo producto. *Afric. auſtr.* (Phlomis Leonotis Thunb. Leonitis L.)

intermedia Lindl. 3. L. caule ſuffruticoſo, foliis ſubcordato-ovatis acutis rugoſis ſerratis ſubtus tomentoſis, calycibus 10dentatis oblique truncatis muticis. *Afric. auſtr.*

nepetaefolia R. Br. 4. L. herbacea, foliis cordatis ſerratis ſubtomentoſis, verticillis globoſis, bracteis elongatis ſpinoſis reflexis, calycibus oblique 7dentatis ſpinuloſis, dente ſupremo producto rigido. *Ind. or. Afric. or.* (Phlomis L., Leonurus Marrubiaſtrum Lour.)

2105. MOLUCCELLA.

fruteſcens 1. M. caule fruticoſo ſubramoſo foliisque ovatis paucidentatis villoſiusculis, ſpinis axillaribus ternatis horizontalibus, calycibus ſubquaternis infundibuliformibus, ſpinis limbi 10, alternis brevioribus, galea cor. villoſiſſima. *Ital. Cyprus.*

perſica N. L. Burm. 2. M. caule fruticoſo glabro, foliis cuneiformibus dentato-ſpinuloſis tomentoſis, ſpinis axillaribus ſubpalmatis patentibus, calycibus verticillatis infundibuliformibus 5-mucronatis, galea cor. glabra. *Perſia.*

grandiflora Steph. 3. M. caule herbaceo glabro, foliis 3fidis cuneatis, laciniis inciſis apice ſpinuloſis, ſpinis axillaribus ſetaceis patentibus, calycibus ſubquaternis infundibuliformibus 5fidis, laciniis ſpina terminatis, galea cor. villoſa 2fida. *Imaus.*

tuberoſa Pall. 4. M. radice tuberoſa, caule herbaceo glabro, axillis petiolisque lanatis, foliis inferioribus oblongis inciſo-dentatis, ſuperioribus ſeſſilibus cuneiformibus ſerratis, calycibus infundibulifor-

mibus truncatis margine ſpinoſis, galea cor. piloſa. *Sibir. auſtr.*

Marrubiaſtrum Steph. 5. M. caule herbaceo humili lanato, foliis palmatis incano-villoſiusculis, laciniis obtuſe 3dentatis, verticillis foliosis, calycibus denſiſſime lanatis 5ariſtatis. *Sibir. auſtr.*

laevis 6. M. caule herbaceo glabro, ſpinis axillarum ſuperiorum palmatis, foliis ſubrotundo-ovatis groſſe dentatis, calycibus campanulatis ampliſſimis membranaceis margine 5-ſpinuloſis. *Aſia minor. Syria.*

ſpinoſa 7. M. caule herbaceo glabro, foliis petiolatis ſubcordatis inciſo-dentatis, bracteis calycibusque 2labiatis 7dentatis ſpinoſis, dente calycis ſupremo porrecto rigido. *Calabria. Graecia.*

2106. Rizoa Cav.

ovatifolia Cav. *Inſ. Chiloe prope Chili.* Herba glabra ramoſa, foliis ovatis ſerratis, floribus paniculatis roſeis.

2107. Colquhounia Wall.

coccinea Wall. *Nepal.* Frutex volubilis, foliis oblongis crenulatis, floribus ſubverticillatis coccineis.

2108. Selago.

* *Fruticoſae.*

† *Floribus capitatis.*

capitata 1. S. foliis linearibus carnoſis glabris obtuſis faſciculatis, ramis pubeſcentibus, capitulo terminali, bracteis ſcarioſis. *Afric. auſtr.*

fruticoſa 2. S. foliis linearibus ſparſis obtuſis integerrimis, capitulis ſubrotundis terminalibus ſeſſilibus. *Afr. auſtr.*

articulata Thb. 3. S. foliis linearibus abbreviatis ſubimbricatis obtuſis glabris, ramis divaricatis articulatis glabris, capitulis ovatis glabriusculis. *Afr. auſtr.*

ſtricta Berg. 4. S. foliis lineari-trigonis faſciculatis ſubtus ramisque hiſpidis, capitulis globoſis ſubtomentoſis. *C. B. S.*

glomerata Thb. 5. S. foliis lanceolatis glabris faſciculatis, ramis pubeſcentibus, capitulis terminalibus aggregatis, bracteis calycibusque ciliatis. *C. B. S.*

paniculata Thb. 6. S. foliis lanceolatis glabris margine revolutis, ramis patentiſſimis ſubpubeſcentibus, capitulis lateralibus ſubſpicatis. *C. B. S.*

cinerea Thb. 7. S. foliis lanceolatis glabris margine revolutis faſciculatis, ramis pubeſcentibus, capitulis terminalibus paniculatis. *C. B. S.*

decumbens Thb. 8. S. foliis obovatis ſerratis hirſutis, caule decumbente, capitulis terminalibus aphyllis hiſpidis. *C. B. S.*

†† *Floribus ſpicatis.*

α. *Spicis ſimplicibus.*

caneſcens Thb. 9. S. foliis filiformibus faſciculatis glabris, ramulis villoſis, ſpicis terminalibus oblongis pubeſcentibus. *Afric. auſtr.*

geniculata Thb. 10. S. foliis linearibus faſciculatis glabris, ramis geniculato-inflexis glabris, ſpicis cylindricis laxis, calycibus pubeſcentibus. *Afr. auſtr.*

diffuſa Thb. 11. S foliis linearibus glabris ſubreflexis, ramis diffuſis, ſpicis terminalibus oblongis, calycibus ciliatis. *Afr. auſtr.* (S. ſpinea Link.)

ovata Thb. 12. S. foliis linearibus acutis glabris faſciculatis, ramis pubeſcentibus virgatis, ſpicis ovato-oblongis, bracteis denticulatis glabris. *Afr. auſtr.*

hiſpida Thb. 13. S foliis linearibus reflexis hiſpidis, ſpicis oblongis terminalibus hirſutis *Afr. auſtr.*

triquetra Thb. 14. S. foliis lineari-trigonis obtuſis apice reflexis imbricatis, ſpicis terminalibus oblongis. *C. B. S.*

ſpicata Link. 15. S. foliis lineari-lanceolatis acutis integerrimis glabris, ſpicis terminalibus, bracteis ovatis acutis calycem aequantibus. *C. B. S.*

ſcabrida Thb. 16. S. foliis lanceolatis margine revolutis hiſpidiusculis ſparſis, ſpicis terminalibus ovatis, bracteis calycibusque ciliato-hiſpidis. *C. B. S.*

ramuloſa Link. 17. S. foliis lanceolatis obtuſis argute ſerratis glabris, ſpicis ovatis terminalibus, calycibus pubeſcentibus. *C. B. S.*

ciliata Thb. 18. S. foliis ovatis acutis ciliatis imbricatis, ramis hirſutis, ſpicis ovatis, bracteis ciliatis. *C. B. S.*

bracteata Thb. 19. S. foliis obovatis obtuſis decurrentibus imbricatis glabris, ſpicis oblongis, bracteis ovatis acutis imbricatis. *C. B. S.* (S. lucida Vent.)

β. *Spicis faſciculatis, corymboſis.*

polyſtachya 20. S. foliis filiformibus aggregatis, ſpicis corymboſis, calycibus hiſpidis. *Afr. auſtr.*

dentata Poir. 21. S. foliis teretibus acutis utrinque ſulcatis glaberrimis ſubdentatis, ſpicis terminalibus aggregatis. *C. B. S.* (S. teretifolia Link.)

polygaloides Thb. 22. S. foliis linearibus margine revolutis acutis imbricatis, ſpicis faſciculatis, bracteis carinatis. *C. B. S.*

coccinea 23. S. foliis inferioribus linearibus integerrimis, ſuperioribus lanceolato-ſubulatis ſubdentatis, ſpicis corymboſis. *C. B. S.*

rapunculoides 24. S. foliis linearibus dentatis glabris, ſpicis cylindricis faſciculatis faſtigiatis, bracteis glabris acuminatis. *Afric. auſtr.* (S. fulvo-maculata Link.)

faſciculata 25. S. foliis obovato-ſpathulatis argute dentatis ſeſſilibus glabris ſparſis, ſpicis corymboſis, bracteis glabris. *Afr. auſtr.* (S. ſerrata Berg. Poir.)

verbenacea Thb. 26. S. foliis oppoſitis oblongis ſerratis glabris decurrentibus, ſpicis faſciculatis, bracteis ſubulatis glabris. *Afr. auſtr.*

rotundifolia Thb. 27. S. foliis ſubrotundis integerrimis obtuſis glabris, ſpicis faſciculatis, bracteis ovatis acutis glabris. *Afr. auſtr.*

††† *Floribus paniculatis.*

corymboſa 28. S. foliis filiformibus glabris patentibus faſciculato-confertiſſimis, panicula ramoſa corymboſa. *Afr. auſtr.*

** *Herbaceae.*

puſilla Thb. 29. S. caule filiformi ſimplici erecto, foliis oppoſitis ovatis ſerratis piloſis, flore terminali ſubſolitario. *Afr. auſtr.*

divaricata Thb. 30. S. caule aſcendente ramoſo, ramis divaricatis pubeſcentibus, foliis lineari-filiformibus faſciculatis glabris, capitulis terminalibus. *C. B. S.*

†*anguſtifolia* Thb. 31. S. caule erecto ramoſo glabro, foliis linearibus ſubverticillatis, ſpicis terminalibus diſtichis, bracteis ovatis, floribus diandris. *C. B. S.* (Eranthemum anguſtifolium et Selago dubia L.)

ſpuria 32. S. caule erecto ſimplici, foliis linearibus acutis confertis ſubintegerrimis glabris, ſpicis gracilibus faſciculatis. *C. B. S.*

heterophylla Thb. 33. S. caule erecto ramoſo glabro, foliis radicalibus ovatis obtuſis ſerratis, caulinis lincaribus dentatis, capitulis terminalibus. *C. B. S.*

cephalophora Thb. 34. S. caule decumbente foliisque oblongis obtuſis dentatis villoſis, capitulis globoſis terminalibus. *C. B. S.*

cordata Thb. 35. S. caule erecto ſimplici foliisque petiolatis cordato-ovatis ſerratis hirtis, capitulo terminali. *C. B. S.*

ANGIOSPERMIA.

2109. VERBENA.

* *Foliis indiviſis.*

polycnemoides Lag. 1. V. ſuffruticoſa ramoſiſſima, foliis connatis ſubulatis ſubpungentibus, floribus axillaribus geminis ſeſſilibus. *Buenos Ayres.*

valerianoides Humb. 2. V. caule erecto ramoſo glabro, foliis linearibus margine revolutis integerrimis, ſpicis terminalibus ternis denſe imbricatis, bracteis ciliatis. *Nov. Granat.*

*montevidenſis** 3. V. caule erecto ramoſo glabro, foliis lanceolatis acutis ſubintegerrimis laevibus, ſpicis ſubternis terminalibus abbreviatis. *Monte Video.* Sello.

anguſtifolia Mx. 4. V. caule erecto glabro, foliis lineari-lanceolatis baſi attenuatis ſubſerratis venoſo-lineatis ſcabris, ſpicis axillaribus terminalibusque gracilibus elongatis. *Amer. bor.* (V. rugoſa Mühlb. W.)

paniculata Lam. 5. V. caule elato ſcabro, foliis petiolatis lanceolatis acutis groſſe ſerratis ſubtus venoſo-reticulatis, ſpicis filiformibus corymboſo-paniculatis. *Virgin. Carolin.*

bonarienſis 6. V. caule elato ramoſo hiſpidulo, foliis lanceolatis ſerratis amplexicaulibus venoſo-rugoſis ſcabris, ſpicis longe pedunculatis faſciculatis hirſutis, floribus imbricatis. *Ad fl. Plata.*

litoralis Humb. 7. V. caule elato ramoſo glabro, foliis lanceolatis petiolatis argute inciſo-ſerratis ſtrigoſis, ſpicis longe pedunculatis ternis, floribus diſtinctis hiſpidiusculis. *Peru.*

recta Humb. 8. V. caule erecto foliisque lanceolato-oblongis acutis crenato-ſerratis reticulato-venoſis hiſpidiusculis, ſpicis virgato-paniculatis. *Nov. Hiſpan.*

caroliniana 9. V. caule erecto hirſuto, foliis lanceolato-oblongis baſi attenuatis ſeſſilibus inaequaliter ſerratis ſubtus hirſutiusculis, ſpicis filiformibus corymboſis. *Carolina. Mexico.* (V. 2ſerrata Kunth.)

urticaefolia 10. V. caule erecto aſpero, foliis petiolatis ovato-oblongis ſerratis ſcabris, ſpicis filiformibus aggregatis, floribus diſtinctis. *Amer. bor. Mexico. Ind. occ.* (V. polyſtachya Kunth.)

diffuſa Desf. 11. V. caule ſuffruticoſo glabriusculo, foliis ovato-lanceolatis ſerratis pubeſcentibus, ſpicis longiſſimis paniculatis, floribus remotis. *Amer. bor.*

liguſtrina Lag. 12. V. caule fruticoſo, foliis ovato-oblongis ſcabris margine revolutis integerrimis, ſpicis cylyndricis terminalibus. *Paraguay.*

thymifolia Lag. 13. V. caule ſuffruticoſo, foliis ovatis ſcabris ciliatis margine revolutis, ſpicis capitatis terminalibus. *Paraguay.*

platenſis * 14. V. caule fruticoſo ramoſo, foliis oblongo-lanceolatis venoſo-lineatis inciſo-ſerratis utrinque hiſpidis, ſpica ſolitaria terminali laxa, bracteis calyce elongato brevioribus. *Ad fl. Plata.* Sello.

chamaedryfolia Juſſ. 15. V. caule aſcendente villoſo, foliis oblongis acutis ſubpetiolatis inciſo-ſerratis ſubtus piloſiusculis, ſpica ſubſolitaria faſtigiata. *Ad fl. Plata.* Feuillée. Sello. (Erinus peruvianus L.)

veronicaefolia Humb. 16. V. caule procumbente hiſpido, foliis oblongo-lanceolatis ſubſeſſilibus crenato-ſerratis ſtrigoſis, ſpicis filiformibus ſubternis. *Mexico.*

caracaſana Humb. 17. V. caule erecto ramoſo glabro, foliis oblongo-lanceolatis acutis triplinerviis ſerratis ſcabris, ſpicis filiformibus paniculatis. *Caracas.* (V. lanceolata W. herb.)

glabrata Humb. 18. V. caule procumbente ramoſo glabro, foliis oblongo-lanceolatis argute inciſo-ſerratis venoſo-reticulatis glabriusculis, ſpicis ternis terminalibus filiformibus. *Nov. Granat.*

corymboſa R. et P. 19. V. caule erecto herbaceo, foliis cordato-triangularibus rugoſis inciſo-ſerratis ſcabris, ſpicis corymboſis. *Chili.*

ſtricta Vent. 20. V. caule ſtricto hirſutiſſimo, foliis ſubſeſſilibus obovato-oblongis acutis duplicato-dentatis hirſutis, ſpicis faſciculatis elongatis ſtrictis. *Carolina.* (V. rigens Mx.)

laſioſtachys Link. 21. V. caule diffuſo hirto, foliis oblongis baſi attenuatis inaequaliter dentatis hirſutis, ſpica terminali denſa ſolitaria, bracteis hirtis. *California.*

** *Foliis trifidis.*

tridactylites Lag. 22. V. caule fruticuloſo, foliis minutis connatis 3fidis linearibus, ſpicis capitatis ſolitariis. *Inſ. Falkland.*

tridens Lag. 23. V. caule fruticuloſo, foliis 3fidis ſubulatis, ſpicis cylindricis, bracteis 3dentatis. *Paraguay.*

juniperina Lag. 24. V. caule ſuffruticoſo, foliis verticillatis 3partitis pungentibus, ſpicis capitatis, bracteis ſubindiviſis. *Chili.*

trifida Humb. 25. V. caule erecto foliisque 3fidis hiſpidis, laciniis lanceolatis acutis integerrimis, ſpicis glomerato-capitatis. *Mexico.*

clavata R. et P. 26. V. caule fruticoſo ramoſo villoſo, foliis ſubverticillatis linearibus margine revolutis integerrimis indiviſis 3fidisque, ſpicis umbellatis, antheris dorſo clavato-appendiculatis. *Peru.*

hiſpida R. et P. 27. V. caule herbaceo hiſpido, foliis oppoſitis ſubternis ſemiamplexicaulibus oblongis venoſis ſerratis aſperis indiviſis 3fidisque, ſpicis ſubternis cylindricis. *Peru.*

microphylla Humb. 28. V. caule ſuffruticoſo repente ramoſiſſimo hirſuto, foliis 3partitis obtuſis ſtrigoſis, laciniis ſubdentatis, faſciculis florum pedunculatis axillaribus. *Quito.*

inflata Kunth. 29. V. caule fruticoſo ramoſo, foliis ſeſſilibus 3partitis albido-tomentoſis, laciniis linearibus ſub-3fidis, ſpicis axillaribus folioſis. *Quito.* (V. heterophylla W. herb.)

hirta * 30. V. caule herbaceo erecto villoſo-lanato, foliis ſubſeſſilibus ovatis 3fido-dentatis utrinque piloſis, ſpicis aggregatis longe pedunculatis faſtigiatis proliferis. *Monte Video.* Sello.

bracteoſa Mx. 31. V. caule proſtrato ramoſo hirto, foliis ſub-3partitis hirſutis, laciniis cuneatis inciſo-dentatis, ſpicis ſolitariis elongatis, floribus diſtinctis, bracteis elongatis patenti-reflexis. *Amer. bor.* (Zapania Poir.)

Aubletia Jacq. 32. V. caule aſcendente ſcabro, foliis 3fidis ovatis inciſo-ſerratis glabriusculis, ſpicis ſolitariis laxis, bracteis calyces aequantibus patulis. *Carolina. Georgia.*

haſtata 33. V. caule erecto glabriusculo, foliis lanceolatis acuminatis inaequaliter argute ſerrulatis ſcabris, inferioribus ſubhaſtato-3fidis, ſpicis aggregatis filiformibus. *Amer. bor.*

**** Foliis laciniatis, multifidis.*

ſcabra Vahl. 34. V. caule erecto foliisque hiſpidis, inferioribus lanceolatis inciſo-ſerratis, ſuperioribus 3partito-pinnatifidis ſerratisque, laciniis acutis, ſpica terminali filiformi laxa, floribus remotis, bracteis linearibus elongatis. *Mexico.*

officinalis 35. V. caule erecto hiſpidiusculo, foliis 3fido-laciniatis dentatis ſcabris, ſpicis filiformibus ſubracemoſis, floribus remotiusculis. *In temperatis zonis orbis terrarum et in nov. Holl.*

ſpuria 36. V. caule aſcendente ramoſo glabro, foliis 3partito-laciniatis obtuſiusculis ſcabris, ſpicis ſolitariis filiformibus hiſpidiusculis, floribus remotis. *Amer. bor.*

erinoides W. 37. V. caule aſcendente ramoſo hirto, foliis 3partito-laciniatis hirſutis, laciniis lineari-lanceolatis ſubdentatis, ſpicis axillaribus ſolitariis laxis, bracteis calycem aequantibus patulis. *Peru.* (V. multifida R. et P. Erinus laciniatus L.)

cuneiformis R. et P. 38. V. caule erecto hiſpido, foliis cuneatis 3fido-laciniatis hirſutiusculis, laciniis lanceolatis ſerratis, ſpicis ternis terminalibus oblongis. *Peru.*

Lamberti Ker. 39. V. caule procumbente radicante hirſuto, foliis oblongis baſi laciniatis apice inciſo-ſerratis, ſpicis laxis ſolitariis, bracteis calyce brevioribus patentibus. *Carolina. Ora occ. Amer. bor.?* (V. proſtrata R. Br.)

caneſcens Humb. 40. V. caule procumbente diffuſo incano, foliis oblongo-lanceolatis inciſo-ſubpinnatifidis incano-hirſutis, ſpicis ſolitariis axillaribus terminalibusque, floribus diſtinctis. *Mexico.*

elegans Humb. 41. V. caule repente hiſpido, foliis laciniato-pinnatifidis, laciniis lineari-oblongis obtuſiusculis, ſpicis axillaribus ſolitariis laxis. *Mexico.* (V. moranenſis W. herb.)

tenera * 42. V. caule aſcendente ſuperne hirſutiusculo, foliis 3partito-laciniatis glabris, laciniis linearibus acutis integerrimis, ſpica laxa ſolitaria terminali. *Monte Video.* Sello.

Selloi * 43. V. caule repente radicante hiſpido, foliis 3partito-laciniatis ciliatis, laciniis linearibus, faſciculis florum pedunculatis hirſutis. *Monte Video.* Sello.

diſſecta W. herb. 44. V. caule erecto herbaceo foliisque 3partito-pinnatifidis hirſutis, laciniis lineari-lanceolatis obtuſiusculis, corymbo terminali coarctato ſubcapitato, calycibus elongatis. *Chili.* Née.

ſupina 45. V. caule erecto foliis 3partito-2pinnatifidis hirſutis, laciniis obtuſiusculis dentatis, ſpicis filiformibus ſolitariis, floribus remotis. *Europ. auſtr. Aſia minor. Aegypt.*

2110. AEOLLANTHUS Mart.

ſuaveolens Mart. *Braſil.* Herba annua glabra, foliis ſpathulatis integerrimis, floribus ſpicatis albis.

2111. LIPPIA.

* *Floribus capitatis.*

† *Capitulis pedunculatis axillaribus ſolitariis.*

α. *Fruticoſae.*

americana 1. L. capitulis 4gonis, bracteis reflexis, foliis petiolatis oblongis apice ſerratis ſcabris. *Nov. Hiſpan.*

hemiſphaerica 2. L. capitulis hemiſphaerico-conicis, foliis oblongis acuminatis integerrimis. *Amer. auſtr.*

purpurea Jacq. 3. L. capitulis hemiſphaericis longe pedunculatis ſubgeminis, foliis ovato-oblongis ſerratis hirſutiusculis. *Patria?*

capenſis * 4. L. capitulis oblongis breviter pedunculatis hirſutis, foliis petiolatis ovato-oblongis crenatis ſupra ſcabris ſubtus tomentoſis. *C. B. S.* (Verbena Thunb.)

ferruginea Humb. 5. L. capitulis paucifloris breviter pedunculatis, foliis ovato-oblongis crenatis ſupra ſcabris ſubtus ramisque ferrugineo-pulverulentis. *Peru.*

ſtoechadifolia Kunth. 6. L. capitulis oblongis multifloris longe pedunculatis, foliis lanceolatis ſerrulatis plicatis ſupra aſperis ſubtus ramisque ſtrigoſo-caneſcentibus. *Ind. occ.* (Verbena L. Zapania Juſſ. Perſ.)

montevidenſis * 7. L. capitulis ſubrotundis longe pedunculatis, bracteis oblongis patentibus, foliis ovatis crenulatis plicato-rugoſis utrinque aſpero-hiſpidiusculis. *Monte Video.* Sello.

linearis Humb. 8. L. capitulis ovatis folio brevioribus, foliis linearibus integerrimis glauceſcentibus appreſſo-ſtrigoſis. *Nov. Granat.*

caneſcens Humb. 9. L. capitulis oblongo-cylindricis folio longioribus, bracteis obovatis acutis, foliis obovatis apice argute ſerrulatis ſubeveniis utrinque ſericeo-ſtrigilloſis caneſcentibus, caule ſuffruticoſo proſtrato. *Peru.* (Verbena elliptica W. herb.)

reptans Humb. 10. L. capitulis oblongis folia ſuperantibus, foliis obovato-oblongis ſerrulatis venoſis utrinque ramisque caneſcentibus, caule ſuffruticoſo radicante. *Ind. occ.* (Zapania ſuberoſa *. Verbena globiflora Nocc.)

aſperifolia Rich. 11. L. capitulis oblongo-cylindricis, bracteis acutis, foliis ovato-lanceolatis crenatis ſupra ſcaberrimis ſubtus ſtrigilloſis, caule ſuffruticoſo. *Amer. auſtr.* (Verbena globulifera Herit. Zapania ſcaberrima et odorata Perſ., lantanoides Lam.)

β. *Herbaceae.*

nodiflora Rich. 12. L. capitulis ovato-conicis folio longioribus, bracteis acutis, foliis ſpathulatis apice dentatis utrinque ſcabris caneſcentibus, caule radicante. *Amer. bor. Ind. or. et occ. Inſ. maris pacifici et*

Nov. Holl. (Verbena L., Zapania Lam. Perf. R. Br., Verbena cuneata W. herb.)

repens * 13. L. capitulis ovato-conicis folio longioribus, bracteis obtusis, foliis obovato-oblongis apice argute dentatis utrinque ramisque glabris, caule radicante. *Italiae paludes maritimae.* (Verbena repens Sav. Tenor., V. nodiflora C. Bauh. Petagn., Zapania repens Bertolon.)

sarmentosa * 14. L. capitulis cylindricis elongatis breviſſime pedunculatis, foliis ſpathulatis obtuſis apice crenato-dentatis incanis, caule proſtrato radicante. *Ind. or.* (Verbena ſarmentoſa W. confuſa tamen cum nodiflora.)

lanceolata Rich. 15. L. capitulis conicis folio longioribus, foliis lineari-lanceolatis argute ſerratis. *Carolin. Georgia.* (Zapania Pursh.)

queretarensis Kunth. 16. L. capitulis oblongo-cylindricis folia excedentibus, bracteis acutis, foliis oblongis acutis ſerratis venoſis utrinque ſtrigilloſis, caule procumbente. *Nov. Hiſpan. Carolina?* (Verbena ſcabra Mühlenb. in W. herb.)

betulaefolia Kunth. 17. L. capitulis oblongo-cylindricis folio brevioribus, bracteis ſubulatis flores ſuperantibus, foliis ovato-deltoideis acutis argute ſerratis ſtrigoſis, caule baſi radicante. *Ad Orinocum.*

†† *Capitulis ſubverticillatis pedunculatis.*

javanica * 18. L. pedunculis inferioribus oppoſitis ſuperioribus verticillatis folia ſuperantibus, capitulis cylindricis, bracteis acutis, foliis oblongis ſubcrenulatis, caule erecto. *Java.* (Verbena N. L. Burm., Zapania Poir.)

origanoides Humb. 19. L. capitulis ſubverticillatis ovatis folio multo brevioribus, bracteis acutis, foliis petiolatis ovatis obtuſis crenulatis ſupra rugoſis aſperis ſubtus incano hirſutis, caule erecto fruticoſo. *Cumana. Braſil.*

graveolens Humb. 20. L. capitulis verticillatis ſubgloboſis folio brevioribus, bracteis acutis, foliis ovato-oblongis acutis reticulato-venoſis crenatis ſupra puheſcentibus ſubtus incano-villoſis, caule erecto fruticoſo. *Nov. Hiſpan. Ad ſl. Magdalen.* Bertero.

Berterii * 21. L. capitulis verticillatis numeroſis cylindricis folio brevioribus, bracteis incano-tomentoſis acutis patulis, foliis ovatis crenatis ſubtus villoſis, caule erecto fruticoſo. *Ad ſl. Magdalen.* Bertero.

††† *Capitulis paniculatis.*

hirſuta Mut. 22. L. capitulis hemiſphaericis, bracteis obtuſis, paniculis ſimplicibus folia ſubaequantibus, foliis oblongo-lanceolatis acuminatis crenatis ſupra rugoſis ſubtus incano-tomentoſis, caule fruticoſo. *Nov. Granat.*

23.

floribunda Kunth. 23. L. capitulis ſubgloboſis longe pedunculatis, bracteis acutis, paniculis axillaribus, foliis oblongo-lanceolatis acutis ſerratis ſupra glabris ſubtus piloſiusculis. *Nov. Granat.*

umbellata Cav. 24. L. capitulis ovatis, bracteis late ovatis acutis patulis, pedunculis terminalibus paniculato-umbellatis, foliis oblongis utrinque attenuatis ſerratis rugoſis ſubtus tomentoſis. *Mexico.* (L. callicarpaefolia Kunth.)

** *Floribus ſpicatis.*

ſcorodonioides Bonpl. 25. L. floribus ſubverticillato-ſpicatis, ſpicis axillaribus ſolitariis oppoſitis pedunculatis, bracteis linearibus, foliis obovatis obtuſis crenatis ſupra ſcabris ſubtus incano-tomentoſis, caule ſuffruticoſo. *Quito.*

citriodora Kunth. 26. L. floribus ſubternis remotis, ſpicis axillaribus terminalibusque ſubpaniculatis, bracteis abbreviatis, foliis ternis lanceolatis acutis integerrimis laevibus margine ſcabris. *Peru. Chili. Paraguay.* (Verbena Sphylla Herit. Aloyſia citriodora Orteg. Zapania Lam.)

*** *Floribus cymoſo-paniculatis.*

cymoſa Sw. 27. L. panicula terminali cymoſa, pedicellis 3partitis, foliis ovatis integerrimis glabriusculis, infimis ſubternis. *Jamaica.*

2112. PRIVA Adanſ.

lappulacea Perſ. 1. Pr. calycibus fructiferis uncinato-hiſpidis, foliis petiolatis ſubcordato-ovatis appreſſo-piloſiusculis. *Ind. occid. Amer. auſtr.* (Verbena L. Zapania Lam. Blairia Houſt. Priva echinata Juſſ.)

mexicana Perſ. 2. Pr. calycibus fructiferis didymo-globoſis denſiſſime echinato-hiſpidis, foliis breviter petiolatis ovato-oblongis hirſutis. *Mexico.* (Verbena L. Zapania Lam. Blairia Gärtn. Priva hiſpida Juſſ.)

aſpera Kunth. 3. Pr. calycibus globoſis hiſpidis, caule elato fruteſcente, foliis petiolatis ovatis acutis ſupra ſcaberrimis ſubtus hirtis. *Nov. Hiſpan.*

dentata Perſ. 4. Pr. calycibus villoſis, fructiferis roſtratis reflexis, caule herbaceo glabro, foliis petiolatis ovatis acutis obtuſe ſerratis ſubſtrigoſis. *Arabia.* (Phryma Forsk. Verbena Forskolei Vahl. Zapania arabica Poir.)

virgata * 5. Pr. calycibus villoſis roſtratis, floribus ſubverticillato-ſpicatis, ſpicis gracilibus ſubpaniculatis, caule fruticoſo elato, foliis petiolatis ovatis crenatis ſupra ſcabris ſubtus rugoſo-venoſis pubeſcentibus. *Peru.* (Verbena R. et P. Zapania Poir.)

laevis Juss. 6. Pr. calycibus ventricosis glabris, dentibus subulatis, floribus spicatis, caule herbaceo, foliis ovato-oblongis dentatis basi attenuatis glabris. *Chili. Buenos Ayres.* (Caltelia cuneato-ovata Cav.)

2113. HEBENSTREITIA.

scabra Thunb. 1. H. foliis linearibus obtusis integerrimis ciliatis, spicis terminalibus, bracteis ovatis acutis glabris integerrimis. *C. B. S.*

dentata 2. H. foliis linearibus integerrimis subdentatisque glabris, caule suffruticoso superne pubescente, spicis terminalibus laxis, bracteis integerrimis glabris. *C. B. S.* (H. integrifolia L. var.)

ciliata 3. H. foliis linearibus dentatis hirsutiusculis, caule suffruticoso hirsutiusculo, spicis terminalibus, bracteis lanceolatis ciliatis. *C. B. S.* (H. alba Jacq. albiflora Link.)

capitata Thb. 4. H foliis linearibus apice dentatis glabris, caule herbaceo pubescente, spicis ovatis, bracteis ciliatis squarrosis glabris. *C. B. S.*

fruticosa Thb. 5. H. foliis lanceolatis dentato-serratis glabriusculis, caule suffruticoso, spicis ovatis, bracteis imbricatis glabris. *C. B. S.*

erinoides Thb. 6. H foliis oblongo-lanceolatis serratis cauleque suffruticoso villosis, spicis terminalibus, bracteis ciliatis. *C. B. S.* (H. chamaedryfolia Link.)

cordata 7. H. foliis cordatis subcarnosis subintegerrimis glabris, caule suffruticoso incano, spicis ovatis, bracteis glabris. *C. B. S.*

2114. TAMONEA Aubl.

verbenacea Sw. 1. T. fructibus 4spinosis, spicis axillaribus, foliis ovatis inciso-serratis pubescentibus. *Inf. Carib.* (Verbena curassavica L. Kämpfera Houst. Ghinia Sw. fl. ind. occ. Tamon. curassavica Pers.)

mutica Pers. 2. T. fructibus muticis, racemis axillaribus, foliis ovatis dentatis villoso-tomentosis. *Guiana.* (Ghinia Sw.)

2115. CONGEA Roxb.

tomentosa Roxb. *Ind. or.* Frutex foliis subcordato-ovatis villosiusculis, paniculis axillaribus.

2116. STREPTIUM Roxb.

asperum Roxb. *Ind. or.* Herba foliis subcordatis pilosis, spicis filiformibus, calycibus inflatis hispidis. (Tortula aspera W. Priva leptostachya Pers.)

2117. HOLMSKIOLDIA Retz.

sanguinea Retz. *Bengal.* Frutex cortice cinereo, foliis cordato-ovatis acuminatis ferratis pubescentibus, pedunculis subtrifloris corymbosis, calycibus purpureis, corolla coccinea. (Hastingia coccinea Sm. Platunium rubrum Juss.)

2118. PREMNA.

* *Foliis integerrimis*

† *glabris.*

integrifolia 1. Pr. foliis ovato-oblongis acutis integerrimis glabris, panicula corymbosa terminali. *Ind. or. Cayenn.?* (Citharexylon paniculatum Poir.?)

obtusifolia R. Br. 2. Pr. foliis cordatis obovato-oblongis obtusissimis integerrimis glaberrimis, panicula terminali. *Nov. Holl.*

attenuata R. Br. 3. Pr. foliis obovato-oblongis obtusis basi attenuatis integerrimis glaberrimis, panicula terminali. *Nov. Holl.*

media R. Br. 4. Pr. foliis late ovatis acutis integerrimis subtus costatis ramulisque glabriusculis. *Nov. Holl.*

†*parvifolia* Roth. 5. Pr. foliis ovato-subrotundis subintegerrimis glabris, spinis axillaribus oppositis horizontalibus, racemis terminalibus strictis. *Ind. or.*

†† *pubescentibus.*

tomentosa W. 6. Pr. foliis ovato-oblongis acuminatis integerrimis supra villosiusculis subtus ramulisque fulvo-tomentosis, paniculae terminalis ramis flexuosis filiformibus. *Ind. or. Nov. Holl.* (Pr. acuminata R. Br., flavescens Juss.)

mollissima Roth. 7. Pr. foliis subcordato-ovatis obtusis integerrimis mollissime villosis, ramis ferrugineo-tomentosis, panicula dichotoma. *Ind. or.*

arborea Roth. 8. Pr. foliis cordato-subrotundis acutis integerrimis 3nerviis venosis subtus cinereo-tomentosis, racemis terminalibus simpliciss imis. *Ind. or.*

cordata R. Br. 9. Pr. foliis reniformi-cordatis acuminatis integerrimis utrinque tomentosis, panicula terminali. *Nov. Holl.*

reticulata Juss. 10. Pr. foliis ovato-oblongis acuminatis subintegerrimis subtus venoso-reticulatis subtomentosis, paniculae ramis decussatis, calycibus 4dentatis incanis. *Jamaica.* (Citharexylon Melanocardium Sw.)

ovata R. Br. 11. Pr. foliis rhombeo-ovatis acuminatis integerrimis subtus ramulisque tenuissime tomentosis, panicula supradecomposita. *Nov. Holl.*

salvifolia * 12. Pr. foliis lanceolatis integerrimis rugosis pube stellata furfuraceis, pedunculis axillaribus multifloris. *Nov. Holl.* (Pityrodia R. Br.)

** *Foliis ſerratis.*

ſerratifolia 13. Pr. foliis oblongis utrinque attenuatis acute ſubcartilagineo-ſerratis glaberrimis, cyma terminali. *Ind. or.*

2119. CHLOANTHES R. Br.

Stoechadis R. Br. 1. Chl. foliis linearibus ſubtus calycibusque niveo-tomentoſis, pedunculis axillaribus 1floris medio bracteatis. *Nov. Holl.*

glanduloſa R. Br. 2. Chl. foliis linearibus ſubtus glanduloſis, pedunculis axillaribus 1floris baſi bracteatis, calycibus ſubpubeſcentibus. *Nov. Holl.*

lavandulifolia Sieb. 3. Chl. foliis linearibus crenulatis ſupra rugoſiſſimis hiſpidis ſubtus calycibusque ſeſſilibus lanatis. *Nov. Holl.*

2120. VITEX.

* *Foliis ſimplicibus.*

ovata Thb. 1. V. foliis ovalibus obtuſis ſubtus tomentoſis, panicula terminali trichotoma, caule decumbente repente. *Japon. China. Nov. Holl.* (V. rotundifolia L. ſuppl. falſa phraſi.)

† *macrophylla* R. Br. 2. V. foliis ovato-oblongis integerrimis glabris coſtatis baſi 2glanduloſis, caule arboreo. *Nov. Holl.*

** *Foliis ternatis.*

triflora Vahl. 3. V. foliolis lanceolatis acuminatis integerrimis glabris, ramulis petiolisque ferrugineo-tomentoſis, pedunculis axillaribus terminalibusque ternatis 1floris. *Cayenn.*

divaricata Sw. 4. V. foliolis oblongis acuminatis utrinque glabris ſubtus pallidis, intermedio maximo, paniculae dichotomae ramis divaricatis. *Inſ. Carib.*

Balbiſii * 5. V. foliolis obovato-ellipticis obtuſis utrinque glaberrimis ſubcoriaceis ſubtus discoloribus, racemis axillaribus ſubcompoſitis. *Hiſpaniola.* Bertero.

latifolia Lam. 6. V. foliolis oblongo-ellipticis utrinque attenuatis glabriusculis ſubtus venoſis concoloribus, panicula terminali tomentoſa. *Ind. or.*

pubeſcens Vahl. 7. V. foliolis ovatis acutis ſubtus pubeſcentibus, panicula trichotoma, bracteis caneſcentibus calyces aequantibus. *Ceylon.*

altiſſima 8. V. foliolis ovato-oblongis acutis ſubtus pubeſcentibus, ſpicis verticillato-paniculatis, fructibus 3ſpermis. *Ceylon.*

alata Roth. 9. V. foliolis ovatis acuminatis integerrimis ſubtus cinereo-tomentoſis, ramis articulatis ſubalatis, paniculae ramis brachiatis, floribus confertocorymboſis. *Ind. or.*

mollis Humb. 10. V. foliolis oblongis obtuſis integerrimis ſupra nitidis ſubtus incano-pubeſcentibus, corymbis axillaribus dichotomis, *Mexico.*

**** Foliis ternato-quinatis.*

gigantea Humb. 11. V. foliolis oblongis acutis integerrimis ſupra glabris ſubtus pubeſcentibus, pedunculis axillaribus 3-6floris. *Quito.*

bicolor W. 12. V. foliolis lanceolatis acuminatis integerrimis ſubtus albo-tomentoſis, panicula terminali ſupradecompoſita, ramis ſubcorymboſis. *Ind. or.*

glabrata R. Br. 13. V. foliolis ovatis integerrimis glabris, pedunculis axillaribus terminalibusque dichotomis, calycibus edentulis. *Nov. Holl.*

rufeſcens Juſſ. 14. V. foliolis ſeſſilibus ovato-lanceolatis ſubtus ramulisque ferrugineo-tomentoſis, pedunculis lateralibus paucifloris. *Braſil.*

parviflora Juſſ. 15. V. foliolis ovato-lanceolatis integerrimis ſubpubeſcentibus, paniculis axillaribus. *Inſ. Philippin.*

trifolia 16. V. foliolis ellipticis acutis ſubtus albo-tomentoſis, floralibus ſimplicibus, paniculis lateralibus terminalibusque dichotomis. *Ind. or.*

acuminata R. Br. 17. V. foliolis ovato-oblongis acuminatis integerrimis, paniculis ſtrictis dichotomis. *Nov. Holl.*

Negunda 18. V. foliolis oblongo-lanceolatis ſubſerratis ſubtus lanatis, paniculis terminalibus. *Ind. or.* (V. paniculata Lam.)

***** Foliis quinatis.*

umbroſa Sw. 19. V. foliolis petiolatis elliptico-oblongis acutis utrinque glabris, paniculis axillaribus trichotomis folia aequantibus. *Ind. occ.*

capitata Vahl. 20. V. foliolis petiolatis lanceolatis acuminatis glabris integerrimis, pedunculis axillaribus multifloris, floribus faſciculato-capitatis. *Inſ. Carib.*

Agnus 21. V. foliolis petiolatis lanceolatis ſubintegerrimis ſubtus ramisque incanis, verticillis ſpicato-paniculatis. *Europ. auſtr.*

inciſa Lam. 22. V. foliolis petiolatis lanceolatis inciſo-pinnatifidis ſubtus incanis, cymis oppoſitis abbreviatis. *China.*

cymoſa Berter. 23. V. foliolis ſubpedatis oblongis acutis integerrimis ſubtus ramisque tomentoſis, pedunculis lateralibus cymoſis. *Ad fl. Magdalen.*

flavens Kunth. 24. V. foliolis oblongo-lanceolatis integerrimis ſubtus ramisque flavo-villoſiusculis, pedunculis axillaribus dichotomis. *Peru.*

bignonioides Kunth. 25. V. foliolis oblongis acuminatis utrinque glabris, pedunculis axillaribus capitato-corymboſis. *Caracas.*

orinocenſis Kunth. 26. V. foliolis obovato-oblongis utrinque attenuatis glaberrimis, infimis ſubſeſſilibus, pedunculis axillaribus corymboſis. *Ad Orinocum.*

ſpicata Lour. 27. V. foliolis lanceolatis ſuberenatis ſubtus tomentoſis, ſpicis terminalibus. *China. Cochinchina.*

[V. pinnata L. eſt Opilia odorata * tom. 1. p. 766.]

2121. CLERODENDRON.

* *Calyce 5dentato, demum immutato.*

liguſtrinum R. Br. 1. Cl. foliis ovato-lanceolatis acuminatis integerrimis glabris, ramis incanis, pedunculis axillaribus 3fido-corymboſis, tubo corollae abbreviato. *Inſ. Mascaren.* (Volkamera Jacq.)

inerme R. Br. 2. Cl. foliis oblongis integerrimis glabris nitidis, pedunculis axillaribus 3fidis corymboſis, tubo corollae elongato. *China. Ind. or. Nov. Holland.* (Volkamera L.)

anguſtifolium * 3. Cl. foliis anguſte lanceolatis integerrimis opacis glabris, racemis axillaribus trichotomis, corolla infundibuliformi. *Jamaica.* (Volkamera Lam.)

Commerſonii * 4. Cl. foliis ovatis utrinque attenuatis integerrimis glabris, corymbis axillaribus trichotomis pubeſcentibus, tubo corollae elongato. *Inſ. Philippin.* (Volkamera Poir.)

coromandelinum * 5. Cl. foliis ovatis acutis integerrimis glaberrimis, panicula terminali corymboſa. *Ora Coromandel.* (Cl. ovatum Poir.)

volubile P. B. 6. Cl. foliis oblongis acuminatis integerrimis glabris, caule volubili, paniculae corymboſae pedicellis 3floris. *Guinea.*

buxifolium * 7. Cl. foliis obovatis retuſis integerrimis nitidis, pedunculis axillaribus ſub-1floris. *Patria?* (Volkamera W.)

heterophyllum R. Br. 8. Cl. foliis ovato-oblongis lanceolatis ſublinearibusque integerrimis glaberrimis, pedunculis axillaribus corymboſis, tubo corollae abbreviato. *Inſ. Mascaren.* (Volkamera heterophylla Poir., anguſtifolia Andr.)

ferratum * 9. Cl. foliis ſubſeſſilibus late lanceolatis ſerratis glabris, paniculae ramis brachiatis. *Ind. or.* (Volkamera L.)

** *Calyce 5ſido, 5partito, demum ſubinde aucto.*

† *Foliis integerrimis*

α. glabris.

Siphonanthus R. Br. 10. Cl. foliis verticillatis elongato-lanceolatis glabris, pedunculis axillaribus corymboſis, tubo corollae longiſſimo. *Java. Ind. or.* (Siphonanthus indica et Ovieda mitis L., Siphon. anguſtifolia W.)

longicolla Meyer. 11. Cl. foliis oblongis breviſſime acuminatis glabris, pedunculis 3fidis, tubo corollae longiſſimo. *Surinam.*

ovatum R. Br. 12. Cl. foliis ovatis glabris, pedunculis axillaribus 3floris, tubo corollae elongato. *Ora Coromandel. Nov. Holl.* (Ovieda ovalifolia Juſſ.)

ſcandens P. B. 13. Cl. foliis ovato-oblongis acutis integerrimis lucidis ſubcoriaceis, corymbis terminalibus compoſitis. *Guinea.* (Cl. umbellatum Poir.)

trichotomum Thunb. 14. Cl. foliis late ovatis glabris, inferioribus 3lobis, panicula supradecomposita glabra, tubo corollae elongato. *Japon.*

fortunatum 15. Cl foliis lanceolatis glabriusculis venosis, pedunculis axillaribus paucifloris folio brevioribus, tubo corollae calycem aequante. *China.*

ternifolium Kunth. 16. Cl. foliis ternis oblongis utrinque attenuatis glaberrimis, pedunculis axillaribus terminalibusque dichotomis pubescentibus, tubo corollae calycem superante. *Ad Orinocum.*

attenuatum R. Br. 17. Cl. foliis oblongis utrinque attenuatis subundulatis glabris, corymbis axillaribus, calycibus pubescentibus. *Nov. Holl.*

floribundum R. Br. 18. Cl. foliis elliptico-lanceolatis glabris, corymbis axillaribus, calycibus laevibus. *Nov. Holl.*

javanicum * 19. Cl. foliis ovato-oblongis acutis coriaceis glaberrimis, panicula terminali thyrsoidea. *Java.* (Cl. coriaceum Poir.)

β. Foliis subintegerrimis pubescentibus.

squamatum Vahl. 20. Cl. foliis cordatis subintegerrimis supra villosis subtus squamosis, paniculae ramosissimae ramis glabris coloratis, tubo corollae calycem duplo superante, genitalibus longissimis. *China. Japon.* (Volkamera Kämpferi Jacq.)

tomentosum R. Br. 21. Cl. foliis oblongis acutis tomentosis, corymbis congestis, calycibus demum incrassatis. *Nov. Holl.* (Volkamera Vent.)

infortunatum 22. Cl. foliis subcordato-ovatis acutis tomentosis, pedunculis terminalibus corymbosis, tubo corollae elongato. *Ceylon.*

molle Bonpl. 23. Cl. foliis ternis oblongis obtusiusculis subtus villosis, pedunculis axillaribus terminalibusque dichotomis pubescentibus. *Quito.*

medium R. Br. 24. Cl. foliis ellipticis acutis subtus tomentosis, corymbis axillaribus terminalibusque laxiusculis, calycibus glabris. *Nov. Holl.*

coriaceum R. Br. 25. Cl. foliis subcordato-ovatis acutis subtus reticulato-venosis petiolisque tomentosis, pedunculis axillaribus terminalibusque trichotomis. *Nov. Holl.*

costatum R. Br. 26. Cl. foliis ovatis obtusiusculis rugosis subtus tomentosis costatis, corymbis axillaribus terminalibusque trichotomis. *Nov. Holl.*

pumilum * 27. Cl. foliis lanceolatis subintegerrimis tomentosis, pedunculis axillaribus paucifloris, tubo corollae elongato. *China.* (Volkamera Lour.)

†† *Foliis dentatis, divisis.*

inermitosum 28. Cl. foliis ovalibus basi attenuatis inaequaliter dentatis utrinque glabris, pedunculis axillaribus paucifloris laxis folia superantibus, tubo corollae calycem triplo superante. *Java.* (Volkamera alternifolia N. L. Burm.)

ſpinoſum * 29. Cl. foliis oblongis ſubſeſſilibus coriaceis ſpinoſo-dentatis ſubtus reticulato-venoſis, ramis aſperis, pedunculis corymboſis abbreviatis, tubo corollae longiſſimo. *Hiſpaniola.* (Ovieda ſpinoſa L.)

phlomoides L. ſuppl. 30. Cl. foliis ovatis angulato-dentatis incanis, pedunculis axillaribus ſubtrifloris tomentoſis, tubo corollae calycem triplo ſuperante. *Ind. orient.* (Volkamera multiflora N. L. Burm.)

fragrans Vent. W. 31. Cl. foliis latis ſubcordato-ovatis repando-dentatis baſi 2glanduloſis ſubtus tomentoſis, corymbis terminalibus denſis hemiſphaericis, tubo corollae calycem duplo excedente. *Japon.* (Volkamera japonica Thunb. Volkmannia japonica Jacq.)

viſcoſum Vent. 32. Cl. foliis cordatis acutis repando-dentatis ſubtomentoſis, corymbis terminalibus paniculatis, calycibus viſcoſis, laciniis corollae aſcendentibus. *Ind. or.*

diverſifolium Vahl. 33. Cl. foliis ovatis angulato-trilobis glaberrimis trinerviis, paniculae dichotomae ramis villoſis racemoſis. *Ind. or.*

paniculatum 34. Cl. foliis cordatis 5lobis ſubdenticulatis glabris, paniculae ramoſiſſimae ramis corymboſis, tubo corollae elongato. *Java. Cochinchina.* (Cl. pyramidale Andr., Volkamera angulata Lour.)

2122. WALLROTHIA Roth.

articulata Roth. 1. W. foliis ternatis, foliolis ovatis acuminatis integerrimis ſubtus ſubtomentoſis, ramis articulatis ſubalatis, thyrſo terminali, bacca 4ſperma. *Ind. or.*

Leucoxylon Roth. 2. W. foliis quinatis, foliolis oblongis integerrimis utrinque glabris, panicula axillari dichotoma, bacca 1ſperma. *Ind. or.* (Vitex L.)

2123. PYROSTOMA Meyer.

ternatum Meyer. *Surinam.* Frutex ramis ferrugineo-villoſis, foliis ternatis oblongis glaberrimis, floribus corymboſis coccineis ſericeis.

2124. VOLKAMERA.

aculeata 1. V. foliis oblongis acutis integerrimis, aculeis ſtipularibus, corymbis axillaribus trichotomis. *Ind. occ.*

ſcandens 2. V. foliis cordato-ovatis obtuſis integerrimis glaberrimis, panicula corymboſa terminali, calycibus obtuſis tomentoſis. *Ceylon.*

† *capitata* W. 3. V. foliis ovato-oblongis integerrimis ſcabris, floribus capitatis, calycibus foliaceis trifidis. *Guinea.*

2125. PETREA.

volubilis 1. P. caule fruticoſo volubili, foliis elliptico-oblongis coriaceis utrinque ſcabris ſubtus venoſo-reticulatis, racemis laxis elongatis, laciniis calycis ext. ſpathulatis obtuſis reticulatis. *Ind. occid.*

arborea Humb. 2. P. caule arboreo, foliis ſubcordato-obovatis utrinque ſcabris, racemis laxis pendulis, laciniis calycis ext. ſpathulato-linearibus reticulatis. *Nov. Granat.*

rugoſa Humb. 3. P. caule arboreo (?), foliis ſubcordato-ellipticis rugoſis ſcabris ſubtus hirtis, racemis erectis laxis, laciniis calycis ext. obovato-oblongis reticulatis. *Caracas.*

oblonga * 4. P. caule volubili, foliis elliptico-oblongis utrinque glabris integerrimis, petiolis ſub-2glanduloſis, racemis abbreviatis, laciniis calycis ext. lineari-oblongis venoſis. *Braſil.* Sello.

dentata * 5. P. caule fruticoſo erecto, foliis lanceolatis utrinque glabris apice dilatatis ſubdentatis, racemis compoſitis corymboſis erectis, laciniis calycis ext. ſpathulato-linearibus elongatis reticulatis. *Braſil.* Sello.

2126. LANTANA.

(Flores capitato-ſpicati.)

* *Aculeatae.*

aculeata 1. L. foliis ſubcordatis ovatis acutis ſerratis ſupra ſcabris ſubtus villoſis, capitulis hemiſphaericis longe pedunculatis, bracteis oblongis acutis abbreviatis. *Jamaica. Mexico.* (L. horrida Kunth.)

purpurea Horn. 2. L. foliis ſubcordatis ovatis acutis ſerratis ſupra ſcaberrimis ſubtus piloſis, capitulis hemiſphaericis folia aequantibus, bracteis ovato-oblongis abbreviatis. *Amer. auſtr.*

ſcabrida Ait. 3. L. foliis ovato-oblongis acutis ſerratis ſupra calloſo-ſtrigoſis ſubtus villoſiusculis, capitulis hemiſphaericis folia ſuperantibus, bracteis lanceolatis tubo brevioribus. *Ind. occ.*

mixta 4. L. foliis oblongis utrinque attenuatis ſerratis ſcabris, capitulis hemiſphaericis folio ſubbrevioribus, bracteis lanceolatis flores ſubſuperantibus, caule ſetoſo-aculeato. *Ind. occ.*

meliſſaefolia Ait. 5. L. foliis ovatis baſi attenuatis crenatis utrinque villoſis, capitulis hemiſphaericis folia aequantibus, bracteis abbreviatis. *Braſil.*

nivea Vent. 6. L. foliis oblongis acuminatis crenulatis baſi attenuatis ſcabris, capitulis hemiſphaericis folia ſubaequantibus, bracteis linearibus abbreviatis. *Ind. or.*

** *Inermes.*

† *Pedunculis folia excedentibus vel aequantibus.*

viburnoides Vahl. 7. L. foliis ovato-lanceolatis ferratis rugosis scaberrimis subtus villosis, capitulis oblongis, bracteis lanceolatis tubo corollae brevioribus. *Arabia.* (Charachera Forsk.)

stricta Sw. 8. L. foliis oblongo-lanceolatis acuminatis crenatis supra rugosis hispidiusculis subtus albo-villosis, capitulis subrotundis, bracteis squarrosis. *Jamaica.* (L. suaveolens Poir.)

Radula Sw. 9. L. foliis rhombeo-ovatis acuminatis serratis supra rugosis asperis subtus hirsutis, caule hispido asperrimo, capitulis oblongis squarrosis, bracteis ovatis acuminatis. *Insul. Carib. Mexico.* (L. hispida Kunth.)

salviaefolia Jacq. 10. L. foliis ovato-oblongis utrinque attenuatis crenato-serratis supra scabris subtus incano-villosiusculis, capitulis conicis, bracteis ovatis acutis nervosis squarrosis. *C. B. S. Hispaniola. Cuba.* (L. pilosa Kunth.)

recta Ait. 11. L. foliis subellipticis rugosis crenulatis incanis subtus pubescentibus, capitulis hemisphaericis, bracteis oblongis elongatis. *Jamaica.* (L. parvifolia Salisb.)

rugulosa Kunth. 12. L. foliis ovatis acuminatis crenatis supra bullatis scabris subtus incano-tomentosis, capitulis hemisphaericis, bracteis acuminatis abbreviatis. *Quito.*

scabiosaeflora Kunth. 13. L. foliis ovatis acutis serratis supra rugosis asperis subtus incano-villosis, capitulis hemisphaericis, bracteis lanceolatis flores subaequantibus, caule procumbente. *Peru.*

involucrata 14. L. foliis oppositis ternisque rhombeo-ovatis obtusis crenatis rugosissimis subtus tomentosis, capitulis squarrosis, bracteis subfoliaceis ovatis. *Ind. occid.*

†† *Pedunculis folio brevioribus.*

odorata 15. L. foliis oppositis ternisque ellipticis rugosis, capitulis squarrosis, bracteis lanceolatis. *Ind. occid.*

trifolia 16. L. foliis subternis ovato-oblongis acutis supra scabris subtus incano-villosis, capitulis oblongis, bracteis ovatis acuminatis tubo corollae brevioribus. *Ind. occ.* (L. celtidifolia Kunth.)

Camara 17. L. foliis ovatis serratis subrugosis subtus albido-villosis, capitulis laxis umbellaribus, bracteis linearibus abbreviatis. *Amer. trop.*

fucata Ker. 18. L. foliis ovatis obtusiusculis crenatis rugosis hirsutiusculis, capitulis subhemisphaericis, bracteis oblongis tubo corollae brevioribus. *Brasil.*

annua 19. L. foliis subcordato-oblongis serratis scabris, capitulis oblongis, bracteis lanceolatis, caule annuo hispido. *Amer. trop.*

canescens Kunth. 20. L. foliis ovato-oblongis acuminatis crenato-ferratis supra scabris subtus incano-hirsutis, capitulis hemisphaericis, bracteis ovato-oblongis acutis. *Nov. Granat.*

lavandulacea W. 21. L. foliis lanceolatis obtusis crenatis basi attenuatis integerrimis supra scabris subtus hirsutis, capitulis cylindricis, bracteis imbricatis ovatis villosis. *Patria?*

salicifolia Kunth. 22. L. foliis ternis lanceolatis utrinque attenuatis subcrenatis rugosis supra scabris subtus incano-pubescentibus, capitulis subglobosis, bracteis lanceolatis. *Nov. Granat.*

geminata * 23. L. foliis ovato-oblongis utrinque attenuatis ferratis rugosis subtus incano-pubescentibus, capitulis oblongis, bracteis ovatis subulatis. *Ad Orinoc.* (Lippia geminata Kunth., Verbena lantanoides W. herb.)

lippioides * 24. L. foliis parvis oblongis utrinque attenuatis subdentatis *venosis* subtus ramisque pilosis, capitulis hemisphaericis, bracteis spathulatis tubum corollae aequantibus. *Brasil.* Sello.

*** *Omnino deciscens.*

racemosa Lour. 25. L. foliis subrotundis integerrimis subtus albicantibus, petiolis basi glandulosis, floribus racemosis, caule arboreo. *Cochinchina.*

2127. SPIELMANNIA Medic.

africana W. *Afric. austr.* Frutex foliis ovato-oblongis acutis serrulatis subdecurrentibus hirsutiusculis, floribus axillaribus sessilibus. (Lantana africana, crispa et capensis Thunb.)

2128. CITHAREXYLON.

* *Calycibus truncatis obsolete dentatis.*

caudatum 1. C. ramis teretibus, foliis obovato-ellipticis obtusis, racemis erectis elongatis. *Jamaica.* (C. erectum Jacq.)

Berterii * 2. C. ramis teretiusculis, foliis oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis mucronatis glaberrimis, racemis erectis elongatis. *Jamaica.* Bertero.

villosum Jacq. 3. C. ramis 4gonis, foliis obovatis coriaceis apice subdentatis subtus villosiusculis, racemis axillaribus terminalibus elongatis pendulis. *Hispaniola.*

quitense * 4. C. ramis 4gonis, foliis obovatis membranaceis apice integerrimis subtus villosis, racemis terminalibus nutantibus. *Quito.* (C. molle Kunth.)

quadrangulare Jacq. 5. C. ramis 4gonis, foliis oblongis utrinque attenuatis glaberrimis, racemis spicatis aggregatis elongatis nutantibus. *Ind. occid.* (C. caudatum Sw.)

** *Calycibus 5fidis.*

cinereum 6. C. ramis teretibus, foliis oblongis utrinque attenuatis glabris, racemis fpicatis aggregatis elongatis erectiusculis. *Ind. occid. Brafil.* (C. teres Jacq.)

reticulatum Bonpl. 7. C. ramis 4gonis, foliis oblongis bafi attenuatis coriaceis integerrimis glaberrimis nitidis, racemis fpicatis erectis. *Peru.*

fubferratum Sw. 8. C. ramis 4gonis, foliis obovato-oblongis apice fubferratis venofis utrinque glabris fupra lucidis, racemis terminalibus erectis fubcompofitis. *Hifpaniola.*

molle Jacq. 9. C. ramis 4gonis, foliis ovatis acutis ferratis utrinque villofis, racemis erectis terminalibus. *Patria?*

tomentofum Poir. 10. C. ramis teretibus, junioribus 4gonis, foliis ovato-lanceolatis acuminatis coriaceis integerrimis fubtus tomentofis, racemis terminalibus erectis pubefcentibus. *Inf. Carib. Amer. auftr.*

pentandrum Vent. 11. C. ramis 4angulis villofiusculis, foliis oblongis apice paucidentatis bafi attenuatis integerrimis fubtus pubefcentibus, racemis axillaribus fimplicibus erectis. *Portorico.* (C. pulverulentum Perf.)

ilicifolium Bonpl. 12. C. ramis 4angulis, foliis elliptico-oblongis integerrimis aut fpinofo-dentatis coriaceis glaberrimis nitidis, racemis fpicatis terminalibus. *Quito.*

fpinofum Kunth. 13. C. ramis 4angulis fpinofis, foliis oblongis obtufis integerrimis glabris fubmembranaceis, racemis axillaribus paucifloris. *Peru.*

2129. DURANTA.

Plumerii 1. D. fubfpinofa, ramis 4angulis, foliis oblongis acutis ferratis integerrimisque glabris fubmembranaceis, racemis fpicatis longiffimis nutantibus. *Ind. occ.* (D. phytolaccaefolia Juff.)

Ellifia 2. D. fubfpinofa, foliis oblongis utrinque attenuatis apice ferratis, racemis axillaribus erectis. *Ind. occ.* (D. microphylla Desf.)

xalapenfis Kunth. 3. D. fpinofa, ramis 4angulis, foliis obovatis obtufis coriaceis glaberrimis crenato-ferratis, racemis paniculatis terminalibus, floribus nutantibus. *Mexico.*

triacantha Juff. 4. D. fpinis ternis, ramis fub-6gonis, foliis ternis ellipticis obtufis integerrimis coriaceis glaberrimis, racemis terminalibus paucifloris. *Quito. Inf. Carib.?* (D. buxifolia Poir.?)

macrocarpa Kunth. 5. D. fubinermis, ramis angulatis, foliis fubternis elliptico-oblongis obtufiusculis apice fubferratis glaberrimis, racemis fpicatis terminalibus, floribus fubfecundis. *Nov. Hifpan.?* (D. dentata Perf.?)

Mutisii 6. D. inermis, ramis sub-6gonis, foliis oblongis acutis coriaceis integerrimis glaberrimis, racemis axillaribus fecundis, floribus nutantibus. *Nov. Granat.* (D. parietarifolia Juss. ?)

obtusifolia Kunth. 7. D. inermis, foliis obovatis obtusis coriaceis integerrimis glaberrimis, racemis paniculatis, floribus pendulis. *Nov. Granat.*

2130. AMASONIA.

arborea Humb. 1. A. bracteis petiolatis flore brevioribus, foliis oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis remote dentatis glabris, caule arboreo. *Ad Orinoc.*

integerrima * 2. A. bracteis sessilibus minimis, foliis oblongo-lanceolatis integerrimis glabris, caule arborescente. *Ad fl. Magdalen.* Bertero.

punicea Vahl. 3. A. bracteis sessilibus flore longioribus, foliis ovato-lanceolatis serratis laevibus, caule arborescente. *Inf. Trinit.*

erecta 4. A. bracteis subsessilibus flores aequantibus, foliis oblongo-lanceolatis subserratis scabris, caule herbaceo. *Guiana.* (Taligalea campestris Aubl.)

2131. GMELINA.

arborea Roxb. 1. Gm. inermis, foliis cordatis pubescentibus, floribus paniculatis. *Ind. or.*

asiatica 2. Gm. spinosa, foliis ovatis 3dentatis subtus venosis subtomentosis, racemis terminalibus. *Ind. orient.*

parvifolia Roxb. 3. Gm. spinosa, foliis ovatis acuminatis basi attenuatis 3dentatis integerrimisque, floribus terminalibus subracemosis. *Ind. or.* (Gm. parviflora Perf.)

2132. MENDOZIA R. et P.

aspera R. et P. 1. M. foliis ovatis acuminatis utrinque asperis, pedunculis 1floris. *Peru.*

racemosa R. et P. 2. M. floribus racemosis. *Peru.* (Mendoncia Vand. foliis ovatis acutis villosis. *Brasil.?*)

2133. MYOPORUM Banks.

* *Foliis oppositis.*

oppositifolium R. Br. 1. M. foliis sessilibus cordato-lanceolatis serratis, pedunculis axillaribus geminis. *Nov. Holl.*

** *Foliis alternis*

† *integerrimis.*

ellipticum R. Br. 2. M. foliis subspathulato-lanceolatis mucronatis subtus punctatis supra lucidis ramulisque laevibus, pedunculis subaggregatis, laciniis calycis

acutiſſimis, limbo corollae imberbi. *Nov. Holl.* (Pogonia glabra Andr., Andreuſia glabra Vent.)

tenuifolium Forſt. 3. M. foliis lanceolatis acuminatis integerrimis ramulisque laevibus, laciniis calycis lanceolatis acutis, limbo corollae imberbi. *Nov. Holl. Nov. Caledon.*

acuminatum R. Br. 4. M. foliis lanceolatis acuminato-cuſpidatis baſi attenuatis ramisque laevibus, laciniis calycis ovato-lanceolatis, limbo corollae barbato. *Nov. Holl.*

montanum R. Br. 5. M. foliis lineari-lanceolatis acutiſſimis baſi attenuatis ramisque laevibus, laciniis calycis linearibus acutis. *Nov. Holl.*

humile R. Br. 6. M. foliis ſpathulato-linearibus obtuſiusculis evoniis, caule procumbente. *Nov. Holl.*

†† *Foliis ſubdentatis ſ. ſerratis.*

parvifolium R. Br. 7. M. foliis ſpathulato-linearibus obtuſiusculis utrinque ſub-1dentatis ramisque glanduloſo-aſperis, pedunculis ſub-2partitis folia ſubaequantibus, caule diffuſo. *Nov. Holl.*

platycarpon R. Br. 8. M. foliis lineari-lanceolatis apice dentatis ramisque laevibus, fructibus compreſſis calycem 4plo ſuperantibus, caule erecto. *Nov. Holl.*

ſerratum R.Br. 9. M. foliis lineari-lanceolatis acuminatis ſerrulatis baſi attenuatis ramisque laevibus, pedunculis umbellatis. *Nov. Holl.* (Pogonia tetrandra Labill.)

debile R. Br. 10. M. foliis lanceolatis apice dentatis baſi integerrimis, fructibus compreſſiusculis calyce brevioribus, pedunculis ſolitariis, caule proſtrato. *Nov. Holl.* (Pogonia debilis Andr.)

diffuſum R.Br. 11. M. foliis lanceolatis baſi recurvo-dentatis apice ſubintegerrimis, caule diffuſo ramisque glanduloſis, pedunculis ſolitariis, fructibus compreſſiusculis calyce brevioribus. *Nov. Holl.*

tuberculatum R. Br. 12. M. foliis lanceolatis acutis ſerratis ramisque glanduloſo-tuberculatis. *Nov. Holl.*

inſulare R. Br. 13. M. foliis oblongo-lanceolatis baſi attenuatis apice ſerratis ramisque laevibus, ramulis viſcidis, pedunculis geminis, caule erecto. *Nov. Holl.*

viſcoſum R.Br. 14. M. foliis oblongis acutis ſerratis reflexis ramisque viſcidis glanduloſis. *Nov. Holl.*

laetum Forſt. 15. M. foliis oblongis acutis apice obſolete ſerratis baſi attenuatis ramisque erectis glabris, pedunculis aggregatis, laciniis calycis cuſpidatis. *Nov. Zeeland.*

aſcendens R. Br. 16. M. foliis obovato-oblongis obtuſiusculis apice obtuſe ſerratis ramisque aſcendentibus laevibus, caule diffuſo. *Nov. Holl.*

† *craſſifolium* Forſt. 17. M. foliis oblongis ſubſerratis carnoſis. *Inſ. botan.*

† *pubeſcens* Forſt. 18. M. foliis oblongo-ellipticis ſerratis pubeſcentibus. *Nov. Zeeland.*

2134. PHOLIDIA R. Br.

ſoparia R. Br. *Nov. Holl.* Frutex ramis virgatis, foliis oppoſitis ſubulatis, floribus pedunculatis axillaribus coeruleis.

2135. STENOCHILUS R.Br.

glaber R. Br. 1. St. foliis obovato-oblongis acutis ſubintegerrimis glabris, floribus ſolitariis folia ſubſuperantibus, ramulis tomentoſis, caule diffuſo. *Nov. Holl.*

maculatus Ker. 2. St. foliis ſpathulato-lanceolatis ſubcaneſcentibus, pedunculis flexuoſo-declinatis folia excedentibus, ramis ſericeis erectis. *Nov. Holl.*

longifolius R. Br. 3. St. foliis lanceolato-linearibus elongatis apice uncinatis integerrimis glabris, ramulis tomentoſis. *Nov. Holl.*

2136. BONTIA.

daphnoides *Ind. occ.* Frutex foliis lanceolatis ſubintegerrimis glabris, pedunculis axillaribus 1floris, floribus luteis, barba purpurea.

†2137. EREMOPHILA R. Br.

oppoſitifolia R. Br. 1. E. foliis oppoſitis ſemiteretibus, laciniis calycis unguiculatis eglandulоſis. *Nov. Holl.*

alternifolia R. Br. 2. E. foliis ſparſis ſemiteretibus calycibusque glandulоſis. *Nov. Holl.*

2138. XENOPOMA W.

obovatum W. *China?* Frutex aromaticus, ramis 4angulis aſperis, foliis obovato-oblongis glabriuſculis, floribus axillaribus breviſſime pedunculatis albis.

2139. TOZZIA.

alpina. *Alp. Europ. med.* Herba erecta ramoſa glabriuſcula, radice ſquamata, foliis ſeſſilibus ovatis paucidentatis, floribus axillaribus pedunculatis ſolitariis flavis.

2140. HEMIPHRAGMA Wall.

heterophyllum Wall. *Nepal.* Herba proſtrata, foliis inferioribus cordato-ovatis ſuperioribus linearibus, floribus faſciculatis roſeis.

2141. JOSEPHINIA Vent.

Imperatricis Vent. 1. J. germinibus 4-5locularibus, foliis elliptico-lanceolatis acutis ſubtus cauleque pubeſcentibus, laciniis calycis aequalibus. *Nov. Holl. occid.*

grandiflora R. Br. 2. J. germinibus 8locularibus, foliis lanceolatis acuminatis ſubtus pubeſcentibus, caule glabro, lacinia calycis ſuprema abbreviata. *Nov. Holl.*

2142. PEDALIUM.

Murex *Ind. or. Ceylon.* Herba erecta caule tomentoſo, foliis ovatis ſinuato-dentatis, floribus axillaribus ſolitariis pedunculatis flavidis moſchum redolentibus.

2143. AVICENNIA.

tomentoſa 1. A foliis oblongo-lanceolatis ſubtus tomentoſis. *Intra tropicos totius mundi. Nov. Zeeland?* (A. reſinifera Forſt., Sceura (melius Schurah) marina Forsk. Bontia germinans L. ſpec. ed. 2.)

nitida Jacqu. 2. A. foliis lanceolatis utrinque nitidis. *Martinic.*

2144. LIMOSELLA.

aquatica *Europ. Amer. bor. Nov. Holl.* Herba humilis, foliis ſpathulato-linearibus longe petiolatis, ſcapis 1floris breviſſimis, floribus rubentibus. (L. auſtralis R. Br., tenuifolia Nuttall.)

2145. ERINUS.

* *Foliis integerrimis.*

aethiopicus Thunb. 1. E. annuus, caule erecto hirſuto, foliis linearibus villoſis, floribus ſpicatis. *Afr. auſtr.*

villoſus Thunb. 2. E. annuus, caule erecto hirto, foliis lanceolatis integerrimis tomentoſis, floribus ſpicatis. *Afr. auſtr.*

ſimplex Thunb. 3. E. annuus, caule ſimplici pubeſcente, foliis oblongis obtuſis integerrimis pubeſcentibus, ſpica faſtigiata. *Afric. auſtr.*

maritimus Thunb. 4. E. decumbens fruteſcens, foliis lanceolatis obtuſis integerrimis glabris, ſpica denſa terminali. *Afric. auſtr.*

** *Foliis dentatis, ſerratis.*

Lychnidea Thunb. 5. E. erectus ſuffruteſcens, foliis linearibus apice ſubdentatis ciliatis, ſpica terminali, bracteis oblongis, tubo corollae pubeſcente. *Afr. auſtr.* (E. capenſis L.)

fragrans Ait. 6. E. ſuffruticoſus villoſus, foliis ſpathulato-linearibus dentatis ſubtus ſubtomentoſis, floribus ſpicatis,

catis, bracteis elongatis, laciniis limbi integris. *C. B. S.* (Selago Lychnidea L.)

africanus 7. E. caule debili flexuoso villoso, foliis lanceolatis obtusis dentatis pilosis, spica elongata, tubo corollae glabriusculo. *C. B. S.*

patens Thunb. 8. E. herbaceus ramosissimus glaber, foliis obovatis petiolatis serratis, floribus axillaribus pedunculatis. *Afric. austr.*

alpinus 9. E. herbaceus villosiusculus, foliis spathulatis crenatis, floribus corymbosis. *Europ. med. alp.*

selaginoides Thunb. 10. E. herbaceus decumbens hirsutus, foliis obovatis dentatis villosis, capitulis foliosis. *Afric. austr.*

tomentosus Thunb. 11. E. herbaceus erectus hirsutus, foliis oblongis serratis tomentosis, floribus axillaribus pedunculatis. *Afr. austr.*

incisus Thunb. 12. E. fruticosus ramosus, foliis ovatis obtusis inciso-serratis tomentosis, floribus racemosis. *C. B. S.*

tristis Thunb. 13. E. herbaceus glaber, foliis ovato-oblongis inciso-dentatis, floribus solitariis pedunculatis. *C. B. S.*

2146. LINDERNIA.

Pyxidaria 1. L. caule procumbente, foliis oblongis integerrimis 3nerviis, pedunculis axillaribus 1floris demum elongatis. *Europ. med.* (L. Pyxidaria Pers. est Gratiola dilatata Mühl. syst. 1. p. 39. eadem ac Gr. anagalloidea Mx. Huc et Gratiola inundata Kit.)

*montevidensis** 2. L. caule procumbente ramoso, foliis spathulato-linearibus enerviis, pedunculis axillaribus 1floris, calycibus foliaceis. *Monte Video.* Sello.

2147. MANULEA.

* *Fruticosae.*

microphylla Thunb. 1. M. foliis fasciculatis confertis linearibus minutis, floribus racemosis terminalibus. *Afric. austr.*

linifolia Thunb. 2. M. foliis subfasciculatis linearibus subintegerrimis scabris, floribus axillaribus solitariis pedunculatis. *Afric. austr.*

revoluta Thunb. 3. M. foliis linearibus obtusis oppositis erectis margine revolutis villosiusculis, floribus subracemosis. *Afric. austr.*

viscosa W. 4. M. foliis lineari-lanceolatis utrinque attenuatis denticulatis glanduloso-pilosiusculis, floribus racemosis, staminibus exsertis. *Afric. austr.*

coerulea Thunb. 5. M. foliis lineari-lanceolatis dentatis tomentosis, floribus subracemosis, tubo corollae brevissimo. *Afric. austr.*

integrifolia 6. M. foliis ovatis obtusis integerrimis glabris, floribus axillaribus racemosis. *C. B. S.*

tomentosa 7. M. foliis obovatis obtusis crenatis tomentosis, floribus thyrsoideis terminalibus. *C. B. S.*

virgata Thunb. 8. M. foliis obovatis acutis ferratis villosis, ramis virgatis, floribus alternis remotis. *C. B. S.*

incana Thunb. 9. M. foliis subspathulatis inaequaliter dentatis piloso-canescentibus, fasciculis thyrsoideis longe pedunculatis. *C. B. S.* (M. angustifolia Link.)

cuneifolia Thunb. 10. M. foliis obovatis acutiusculis serratis supra glabris subtus pilosis, spicis cylindricis. *C. B. S.*

argentea Thunb. 11. M. foliis petiolatis obovatis dentato-serratis subtus argenteo-punctatis, floribus axillaribus longe pedunculatis. *C. B. S.*

hispida Thunb. 12. M. foliis petiolatis ovatis serratis utrinque ramisque hispidis, floribus axillaribus subcorymbosis. *C. B. S.* (M. oppositifolia Vent.)

**** *Herbaceae.***

capensis Thunb. 13. M. erecta hirsuta, foliis linearibus dentatis calycibusque villoso-viscosis, racemis terminalibus fastigiatis. *C. B. S.* (Büchnera L. W.)

aethiopica Thunb. 14. M. erecta glabra, foliis lineari-lanceolatis paucidentatis, racemis fastigiatis, calycibus pubescentibus. *Afric. austr.* (Büchnera L. W.)

rubra Thunb. 15. M. erecta villosa, foliis lanceolatis dentatis, racemi secundi pedunculis remotis. *C. B. S.*

altissima Thunb. 16. M. caule elongato subaphyllo, foliis infimis lanceolatis remote dentatis pubescentibus, racemis spicatis. *C. B. S.*

corymbosa Thunb. 17. M. caule elongato glabro subaphyllo, foliis infimis obovatis crenatis glabriusculis, verticillis racemosis subumbellatis. *C. B. S.*

thyrsiflora Thunb. 18. M. erecta pubescens, foliis obovatis crenatis tomentosis, floribus paniculatis. *C. B. S.*

Cheiranthus 19. M. caule elongato pubescente oligophyllo, foliis infimis obovato-oblongis inciso-serratis villoso-tomentosis, floribus remotis axillaribus pedunculatis. *Afric. austr.* (Lobelia L. spec. 1. Nemia Berg.)

hirta Thunb. 20. M. caule erecto foliisque obovatis duplicato-serratis hirsutis, floribus remotis axillaribus. *Afr. austr.*

capillaris Thunb. 21. M. caule erecto, ramis capillaribus, foliis caulinis obovatis paucidentatis glabris, rameis linearibus, spicis ovatis. *C. B. S.*

† *divaricata* Thunb. 22. M. ramis divaricato-decumbentibus foliisque ovato-ellipticis obtusis dentatis pilosis, spica terminali fastigiata, calyce bilabiato. *C. B. S.*

heterophylla Thunb. 23. M. caule simplici foliisque villosis, inferioribus ovatis subdentatis, superioribus linearibus subintegerrimis, capitulis terminalibus globosis. *C. B S.*

plantaginea Thunb. 24. M. caule decumbente pubescente, foliis obovatis subdentatis glabris, capitulis terminalibus, calycibus sublanatis. *Afric. austr.*

capitata Thunb. 25. M. caule erecto foliisque ovato-lanceolatis serratis hirsutis, capitulis globosis. *Afric. austr.*

cephalotes Thunb. 26. M. caule erecto foliisque sessilibus oblongis eroso-serratis glabris, floribus subumbellatis. *C. B. S.*

cryſtallina Weinm. 27. M. caule erecto foliisque ovatis obtuſis duplicato-ſerratis papuloſis, floribus axillaribus pedunculatis. *C. B. S.*

indica Lour. 28. M. caule erecto foliisque ovato-oblongis integerrimis incano-villoſis, floribus terminalibus congeſtis ſubcapitatis. *Cochinchina.*

foetida W. 29. M. caule erecto foliisque ovato-oblongis inciſo-dentatis glabriusculis, pedunculis terminalibus ſubcorymboſis. *C. B. S.* (Büchnera Andr.)

†*antirrhinoides* Thunb. 30. M. caule erecto pubeſcente, foliis oblongis acutis inaequaliter ſerratis glabris, pedunculis axillaribus 1floris. *C. B. S.*

rhynchantha Link. 31. M. caule erecto ſuperne foliisque obovatis ſerratis pubeſcentibus, ſpicis aggregatis, corollae laciniis lineari-filiformibus. *C. B. S.*

violacea Link. 32. M. caule erecto foliisque oblongis obtuſis denticulatis glabris, floribus racemoſis. *C. B. S.*

cordata Thunb. 33. M. caule decumbente radicante foliisque petiolatis cordatis ſerratis pubeſcentibus, floribus axillaribus pedunculatis. *C. B. S.*

pinnatifida Thunb. 34. M. ramis divaricatis foliisque oblongis inciſo-pinnatifidis pubeſcentibus, floribus axillaribus pedunculatis. *C. B. S.* (Sutera glanduloſa Roth.?)

2148. HORNEMANNIA W.

bicolor W. *Ind. or.* Herba annua, ramis divaricatis aſcendentibus, floribus racemoſis albo-flavis. (Gratiola goodenifolia Hornem.)

2149. CONOBEA Aubl.

aquatica Aubl. 1. C. caule procumbente foliisque reniformibus dentatis amplexicaulibus glabris, pedunculis axillaribus 1floris elongatis. *Guiana.*

*viſcoſa** 2. C. caule erecto ſuperne viſcoſo, foliis lanceolatis argute ſerratis glaberrimis, pedunculis ſubgeminis folio brevioribus. *Braſil.*

*borealis** 3. C. caule erecto pubeſcente, foliis ſubconnatis lineari-lanceolatis apice denticulatis, pedunculis axillaribus folia aequantibus. *Amer. bor.* (Collinſia verna Nutt.? Gratiola acuminata Walt., neglecta Torr. Antirrhinum tenellum Pursh.?)

†*indica** 4. C. caule erecto glabro, foliis verticillatis, inferioribus linearibus pinnatifidis ſuperioribus lanceolatis 3nerviis apice ſerrulatis, verticillis ſpicatis terminalibus. *Ind. or.* (Stemodia aquatica W. Cyrilla Roxb.) Simillima Limnophilis, ſed capſ. 4valvis.

2150. RHINANTHUS M. B.

orientalis 1. Rh. calycis labio ſup. obtuſo emarginato, corollae labio ſup. incurvo. *Aſia minor. Caucaſ.*

Elephas 2. Rh. calycis labio ſup. acuto integro, corollae lab. ſup. ſubulato recto. *Calabria. Aſia minor.*

2151. ALECTOROLOPHUS M. B.

Crista galli — *Europ. Asia. Amer. bor.* Herba erecta glabra superne ramosa, caule submaculato, foliis lanceolatis serratis, floralibus ovatis, calyce membranaceo glabro vel hirsuto. Hinc varietates: Rhinanthus Alectorolophus Poll. (Rh. hirsutus Lam., villosus Pers.), qui omnino semina marginata habet: Rhin. major Ehrh. (glaber Lam.): Rhin. minor Ehrh., alpinus Baumg., pulcher Schummel.)

Sub Rhinantho indico tres latent diversae plantae, mihi juxta ignotae. Pluknetii longe alia ac Burmanni et ab his iterum differt Willdenowii, quae, calyce foliaceo subdiphyllo insignis, ob fructus defectum determinari nequit.

2152. GYMNANDRA Pall.

* *Labio corollae inf. plerumque bisido.*

integrifolia W. — 1. G. foliis radicalibus caulinisque oblongis utrinque attenuatis integerrimis, spica oblonga, antheris subsessilibus. *Dauuria.* (Gymn. borealis Pall., Bartsia Gymnandra L. suppl.)

gracilis W. — 2. G. foliis inaequaliter serratis, radicalibus oblongis longe petiolatis, caulinis sessilibus ovato-oblongis, spica laxa cylindrica, filamentis lanceolatis lab. sup. aequantibus. *Inf. Aleut.*

elongata W. — 3. G. foliis crenatis, radicalibus oblongis elongatis, caulinis ovatis, spica elongata, filamentis lab. sup. brevioribus. *Sibir. or.*

ovata W. — 4. G. foliis radicalibus oblongis subduplicato profunde dentatis, caulinis ovatis remote serratis, spica ovato-elliptica, filamentis lab. sup. brevioribus. *Sibir. or. Camtschatca. Inf. Aleut. Ora occid. Amer. bor.* (Bartlia Gymnandra Pursh.)

** *Labio cor. inf. plerumque 3fido.*

ultaica W. — 5. G. foliis obtuse serratis, radicalibus oblongis longe petiolatis, caulinis sessilibus ovatis, spica cylindrica, bracteis flore brevioribus, antheris subsessilibus. *Imaus. Camtschatca.* (Lagotis glauca Gärtn.)

minor W. — 6. G. foliis oblongo-lanceolatis subserratis, radicalibus petiolatis, caulinis sessilibus, spica cylindrica, filamentis lab. sup. crenatum aequantibus. *Sibir. or.*

dentata W. — 7. G. foliis profunde dentato-serratis oblongis, spica laxa cylindrica, filamentis lab. sup. integerrimum aequantibus. *Sibir. or.*

reniformis W. — 8. G. foliis radicalibus reniformibus crenatis, caulinis subrotundo-ovatis serratis, spica densa cylindrica, filamentis lab. sup. emarginato brevioribus. *Inf. Aleut.*

Stelleri Ledeb. 9. G. foliis radicalibus oblongis crenatis petiolatis, caulinis amplexicaulibus ſubrotundis obtuſis integerrimis, ſpica ovata, filamentis lab. ſup. integerrimum aequantibus. *Camtſchatca.*

2153. BARTSIA.

Trixago 1. B. caule ſimplici, foliis lanceolatis, remote obtuſe profundeque ſerratis, floribus ſpicatis ſub-4fariam imbricatis, calycibus villoſis, labio cor. inf. dilatato ſuperius depreſſum excedente. *Italia. Gallia auſtr. Luſitania. Graecia. Syria. Caucaſ.* (Rhinanthus W., Alectorolophus M. B., Bellardia All. Trixago rhinanthina Link.) Rhinanthus maximus W. verſicolor Lam. ſunt varietates.

viſcoſa 2. B. caule ſimplici villoſo ſuperne glanduloſo-viſcoſo, foliis oblongo-lanceolatis profunde ſerratis ſuperioribus alternis, floribus axillaribus remotiusculis, labio cor. inf. dilatato labium ſup. aſcendens ſubaequante. *Anglia. Gallia auſtr. Italia. Graecia.* (Euphraſia pratenſis Sebaſt.)

alpina 3. B. caule ſimplici villoſo, foliis omnibus oppoſitis ſubcordato-ovatis ſerratis, floribus axillaribus oppoſitis, calycibus ſubviſcoſis. *Alp. Europ. med. et bor. Amer. bor.*

Fagonii Lapeyr. 4. B. caule ſimplici villoſo, foliis oppoſitis ſubcordato-ovatis remote obtuſeque ſerratis, floribus ſpicatis, calycibus pubeſcentibus. *Pyren.* (B. ſpicata Ram. Rhinanthus Poir.)

bicolor Cand. 5. B. caule ſimplici villoſo, foliis oppoſitis lineari-lanceolatis remote ſerratis, floralibus integerrimis, floribus ſpicatis glanduloſo-piloſis. *Inf. pulcra ad Armoricam.*

latifolia Sm. 6. B. caule erecto hirſuto, foliis oppoſitis ovatis inciſo-ſerratis, floralibus ſubpalmatis, verticillis ſpicatis, labio cor. ſup. abbreviato. *Europ. auſtr.* (Euphraſia L.)

Odontites Hudſ. 7. B. caule erecto ramoſo foliisque oppoſitis lanceolatis ſerratis pubeſcentibus, racemis ſpicatis ſecundis, ſtaminibus exſertis. *Europ.* (Euphraſia L. E. verna Bellard. et ſerotina Lam. ſunt varr.)

*capenſis** 8. B. caule ſimplici foliisque lanceolatis dentatis villoſis, floribus verticillato-ſpicatis, calycibus viſcoſis. *C. B. S.* (Büchnera africana L., Rhinanthus capenſis Thunb.)

*ſcabra** 9. B. caule ſubramoſo hirſutiusculo, foliis ovatis dentatis ſcabris, floribus ſpicatis, bracteis foliaceis inciſo-dentatis. *C. B. S.* (Rhinanthus Thunb.)

*triſida** 10. B. caule ſimpliciſſimo ſubtomentoſo, foliis 3partitis linearibus pubeſcentibus, floribus axillaribus ſeſſilibus, laciniis calycis elongatis. *Aſia minor.* (Rhinanthus Vahl.)

2154. LAMOUROUXIA Kunth.

virgata Kunth. 1. L. fruticosa ramosa, ramis teretiusculis, foliis lineari-lanceolatis obsolete serrulatis glabris, laciniis calycis lanceolatis integerrimis. *Quito.*

serratifolia Kunth. 2. L. herbacea ramosa, ramis 4gonis, foliis linearilanceolatis inciso-serratis, laciniis calycis lato-lanceolatis integerrimis. *Nov. Granat.*

rhinanthifolia Kunth. 3. L. herbacea, ramis sub-4gonis pubescentibus, foliis subcordato-ovatis argute serratis pilosis, laciniis calycis ovatis serratis. *Nov. Hispan.*

sylvatica Kunth. 4. L. herbacea subvolubilis, ramis teretibus foliisque oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis inaequaliter serratis pilosis, laciniis calycis serrulatis. *Peru.*

viscosa Kunth. 5. L. herbacea glanduloso-pilosa superne viscosa, foliis lanceolatis acuminatis serrulatis incano-tomentosis, laciniis calycis lanceolatis integerrimis. *Mexico.*

xalapensis Kunth. 6. L. herbacea pubescens, ramis teretiusculis, foliis lanceolatis acuminatis argute serratis glabris, laciniis calycis integerrimis. *Mexico.*

multifida Kunth. 7. L. caule simpliciusculo foliisque pinnatifidis linearibus glabriusculis, calycis farinosi laciniis lanceolatis integerrimis. *Nov. Hispan.*

2155. CASTILLEIA Mut. (Folia alterna.)

* *Fruticosae.*

integrifolia L. suppl. 1. C. foliis linearibus integerrimis 3nerviis hispidis, floribus spicatis, corolla calycem superante. *Nov. Hispan. Nov. Granat.*

tolucensis Kunth. 2. C. caule procumbente, foliis lanceolatis obtusis hispidis, superioribus 3fidis, floribus axillaribus sessilibus, corolla calycem aequante. *Mexico.*

moranensis Kunth. 3. C. caule prostrato, foliis lanceolatis acutis 3nerviis hispidis, superioribus 3fidis, floribus axillaribus sessilibus, corolla calycem superante. *Mexico.*

coronopifolia Vent. 4. C. caule erecto, foliis linearibus hispidis integerrimis 3fidisque, floribus racemosis secundis. *Nov. Granat.*

nubigena Kunth. 5. C. caule erecto, foliis linearibus 3fido-pinnatifidis hirsutissimis, floribus axillaribus breviter pedunculatis, calyce ventricoso corollam subaequante. *In monte Pichincha.*

fissifolia L. suppl. 6. C. caule erecto, foliis linearibus 3fido-pinnatifidis hirsutissimis, floribus racemosis, corolla calycem tubulosum superante. *Nov. Granat.*

** *Herbaceae.*

*vallida** 7. C. caule simplici, foliis lineari-lanceolatis 3nerviis subpubescentibus, floralibus subdentatis, dentibus calycis acutis. *Sibir. Amer. bor.* (Bartsia L. Semina membrana laxa reticulata obvoluta).

*acuminata** 8. C. foliis linearibus elongatis acuminatis 3nerviis, floralibus oblongis longiſſime acuminatis flores ſuperantibus, dentibus calycis acutis. *Ora occ. Amer. bor. Inſ. Aleut.* (Bartſia Purſh.)

lithoſpermoides Kunth. 9. C. foliis lineari-lanceolatis obtuſis integerrimis 3nerviis hiſpidis, floralibus apice dilatatis coloratis, dentibus calycis obtuſis. *Nov. Hiſpan.*

ſcorzonerae folia Kunth. 10. C. foliis linearibus acuminatis baſi dilatatis amplexicaulibus hiſpidis, floralibus coloratis, dentibus calycis acutiuſculis. *Nov. Hiſpan.*

*coccinea** 11. C. foliis linearibus inciſo-pinnatifidis, floralibus dilatatis coloratis ſub-3fidis flores ſuperantibus, dentibus calycis obtuſis. *Amer. bor.* (Bartſia L. Euchroma Nuttall.)

*grandiflora** 12. C. foliis linearibus ſub-3fidis hiſpidis, laciniis divaricatis, floralibus ſimilibus viridibus. *Louiſiana ſuper.* (Caſt. ſeſſiliflora Purſh. Euchroma grandiflora Nutt.)

2156. LAFUENTEA Lag.

rotundifolia Lag. *Hiſpan. auſtr.* Suffrutex glanduloſo-viſcoſus graveolens, foliis decuſſatis reniformibus crenatis, ſpicis axillaribus pedunculatis ſolitariis.

2157. EUPHRASIA.

* *Foliis linearibus.*

tenuifolia Perſ. 1. E. caule virgato glabro, ramis filiformibus, foliis lineari-ſetaceis, floribus ſubſpicatis ſecundis, calycibus glabris, antheris barbatis. *Luſitania.* (E. linifolia Brot., filifolia Link., ſpiralis Pourr. in W. herb.?)

linifolia 2. E. caule virgato, ramis patentiſſimis pubeſcentibus, foliis ſubpetiolatis linearibus ſcabris, calycibus axillaribus alternis piloſiuſculis. *Italia. Gallia auſtr.*

tricuſpidata 3. E. caule ramoſo pubeſcente, foliis linearibus apice dilatatis 3dentatis, floribus axillaribus oppoſitis pedunculatis. *Mons Baldus.* Zanon. *Italia ſuperior.*

†*coromandeliana* Rottl. 4. E. caule ſimpliciuſculo humili, foliis linearibus ſub-3fidis ſerrulatis, floribus axillaribus pedunculatis, fauce corollae inflata. *Coromandel.*

lutea 5. E. caule ſubramoſo glabriuſculo, foliis linearibus ſerratis ſuperioribus integerrimis, floribus diſtiche racemoſis, genitalibus longe exſertis. *Europ. med. et auſtr.* (E. Coris Crantz.)

rigidifolia Bivon. 6. E. caule baſi 3fido ſtricto, foliis linearibus obtuſiuſculis ſubtus convexis erectis calycibusque ſtrigilloſis, ſuperioribus remotis, floribus ſpicatis alternis, corollis calycem excedentibus. *Sicil.*

corſica Loiſ. 7. E. caule baſi procumbente foliisque linearibus integerrimis hiſpidiuſculis, floribus ſubracemoſis, calycibus obtuſis corollam ſubaequantibus. *Corſica.*

glutinoſa M. B. 8. E. glanduloſo-piloſa viſcoſa, foliis linearibus carnoſis integerrimis, floribus ſubracemoſis, corolla calycem ſuperante. *Tauria. Caucaſ.*

purpurea Desf. 9. E. caule ramoſo colorato foliisque linearibus patentibus rigidulis glabris, floribus racemoſis ſecundis, ſtaminibus corollam aequantibus, capſula ſuperne hirſuta. *Afric. bor.*

longiflora Lam. 10. E. viſcido-pubeſcens, foliis oppoſitis linearibus obtuſis integerrimis, rameis imbricatis, floribus ſecundis, tubo corollae filiformi calycem triplo ſuperante. *Hiſpan.*

† *aſpera* W. 11. E. foliis linearibus calloſo-hiſpidis, floribus alternis ſeſſilibus, tubo corollae ſuperne inflato calycem triplo ſuperante. *Guinea.* Iſert.

paludoſa R. Br. 12. E. foliis linearibus acutiusculis paucidentatis glabris, rameis diſtantibus, floribus ſpicatis inferioribus distinctis. *Nov. Holl.*

melampyroides Humb. 13. E. caule ramoſo, ramis retrorſum hiſpidis, foliis linearibus apice obtuſe dentatis hiſpidiusculis, floribus racemoſis, calycibus glanduloſo-piloſis, ſtaminibus exſertis, capſula piloſa. *Quito.* (E. hiſpida W. herb.)

ſantolinaefolia Humb. 14. E. glanduloſo-piloſa viſcida, foliis linearibus obtuſis margine revolutis crenatis, floribus axillaribus pedunculatis, corolla calycem ſuperante. *Nov. Granat.*

** *Foliis ſublanceolatis.*

Bocconi Guſſon. 15. E. ſuffruticoſa elata, foliis lanceolato-linearibus integerrimis glabris, inferioribus margine ſcabris, racemis confertis ſecundis, bracteis calycibusque ciliatis, ſtaminibus exſertis. *Sicil.*

viſcoſa 16. E. herbacea viſcoſo-pubeſcens, foliis linearilanceolatis 3nerviis integerrimis, racemis ſecundis, corolla calycem glutinoſum triplo ſuperante. *Europ. auſtr. Afric. bor.*

alpina Lam. 17. E. herbacea ramoſo-glabriuscula, foliis oblongo-lanceolatis ſetaceo-ſerratis ſubinciſis, floribus axillaribus ſubſeſſilibus, calycibus ariſtatis. *Alp. Europ. med.* (E. ſalisburgenſis Funk. Hopp., pectinata Tenor.)

kaliformis Pourr. 18. E. herbacea ſtricta hiſpida, foliis lineari-lanceolatis integerrimis ſubcarnoſis abbreviatis, racemis terminalibus elongatis. *Hiſpan.*

ſtricta Humb. 19. E. herbacea ſtricta hiſpidiuscula, foliis linearilanceolatis obtuſiusculis crenatis, floribus racemoſo-ſpicatis terminalibus, ſtaminibus ſubincluſis, capſula piloſa. *Quito.*

mutica Humb. 20. E. herbacea ſcandens hiſpida, foliis linearilanceolatis obtuſis crenato-ſerratis, floribus racemoſis ſubſecundis, antheris muticis, capſula hirſuta. *Peru.*

cuneata Forſt. 21. E. ramoſa glabriuscula, foliis cuneatis apice 3dentatis, floribus racemoſis. *Nov. Zeeland. Terra Diemen.* (E. collina R. Br.)

scabra R. Br. 22. E. glanduloso-pubescens scabra, foliis lanceolatis inciso-dentatis, corollae pubescentis laciniis integris. *Nov. Holl. Terra Diemen.*

arguta R. Br. 23. E. pubescens, foliis lanceolatis inciso-pinnatifidis scabris, calycibus bracteisque cuspidatis, corollae laciniis integris. *Nov. Holl.*

*** *Foliis subovatis.*

officinalis 24. E. glabriuscula, foliis subsessilibus ovatis serratis, floribus axillaribus oppositis, calycibus eglandulosis, laciniis corollae emarginatis. *Europ. Amer. bor.* (E. minima Jacqu., imbricata Pers.)

Rostcoviana Hayn. 25. E. pubescens, foliis sessilibus ovatis obtuse inciso-serratis, calycibus glanduloso-pilosis, corollae amplae laciniis emarginatis. *Europ. Camtschatca.* (E. mollis Ledeb. var.)

tatarica Fisch. 26. E. caule stricto villoso, foliis ovatis setaceo-serratis, floribus axillaribus sessilibus, corolla calycem subaequante. *Sibiria.*

asperrima Link. 27. E. foliis ovatis obtuse serratis lineato-rugosis asperis, floribus spicatis, caule tereti laevi. *Lusitania.* (E. aspera Brot.)

*diemenica** 28. E. foliis cuneatis 3-5crenatis glabris, ramorum fertilium distantibus, sterilium decussatis, laciniis corollae emarginatis. *Terra Diemen.* (E. alpina R. Br.)

tetragona R. Br. 29. E. foliis subovalibus 3-5dentatis obtusis glabris, caule 4gono, calycibus subsessilibus obtusis glabris, laciniis corollae inferioribus emarginatis. *Terra Diemen.*

striata R. Br. 30. E. foliis bracteisque subpalmato-5lobis glabris, caule ascendente, floribus dense spicatis, calycibus acutiusculis glabris, laciniis corollae retusis striatis. *Terra Diemen.*

speciosa R. Br. 31. E. foliis ovatis inciso-crenatis decussatis caulequ erecto scabris, calycibus acutiusculis pubescentibus, laciniis corollae retusis. *Nov. Holl.*

2158. PEDICULARIS.

**Galea corollae rostrata.*

longiflora Rudolph. 1. P. tubo corollae longissimo filiformi, galea falciformi hiante, calyce 2fido foliaceo, foliis pinnatifidis linearibus, laciniis obtusis abbreviatis crenato-cristatis, caule humili. *Sibir. orient.*

grönlandica Retz. 2. P. galea acuminata declinata corollam claudente, calyce glabro 10dentato, dentibus alternis minoribus, floribus laxe spicatis, foliis lanceolatis pinnatifidis, laciniis linearibus serrulatis. *Grönland. Ad fl. Columbiam Amer. bor.* (Flores rosei.)

incarnata Jacqu. 3. P. galea porrecta acuminata truncata hiante, calyce 5fido villoso, floribus subspicatis alternis, foliis sub-2pinnatifidis, laciniis dentatis. *Alp. Europ. med.* (P. rostrato-spicata Crantz.)

roſtrata 4. P. galea porrecta truncata hiante, calyce 5fido ſubfoliaceo colorato glabro, floribus racemoſo-congeſtis bracteatis, foliis 2pinnatifidis, laciniis linearibus dentatis diſtantibus, caule aſcendente. *Alp. Europ. med.* (P. roſtrato-capitata Crantz., caeſpitoſa Sieber.)

tuberoſa 5. P. galea porrecta emarginata hiante declinata labium inferius excedente, calycibus 5fidis foliaceis hirſutis, floribus ſpicatis bracteatis, foliis 2pinnatifidis dentatis hirſutiusculis, caule aſcendente. *Alp. Europ. med.* (P. aſcendens Schleich. Sternb., ſummana *Pollin. var.) (Flores flavi.)

vireſcens Hartm. 6. P. galea porrecta acuta, calycibus 5fidis, ſpica folioſa, foliis pinnatifidis. *Scandinavia.* (P. folioſa Gunner.)

gyroflexa Vill. 7. P. galea porrecta emarginata labium inferius aequante, calycibus 5fidis foliaceis, floribus ſpiratim ſpicatis bracteatis, caule aſcendente. *Alp. Europ. med.* (Flores purpurei.)

aſplenifolia Flörk. 8. P. galea porrecta cernua truncata hiante labium inferius aequante, calycis 5fidi ſublanati laciniis recurvis, floribus ſubracemoſis, foliis pinnatifidis dentatis, caule aſcendente. *Alp. noric. dinar.* (P. atrorubens Cand.) (Flores purpurei.)

uncinata Steph. W. 9. P. galea falcata porrecta acuta emarginata, calyce 5dentato glabro, ſpica aphylla elongata, foliis pinnatifidis argute ſerratis. *Sibir. bor.* (P. incarnata L.)

tanacetifolia Adam. 10. P. galea ſubporrecta truncata corollam claudente, calycibus 5dentatis hirſutis, foliis pinnatifidis dentatis, caule aſcendente hirſuto. *Sibir. bor.*

compacta W. 11. P. galea porrecta emarginato-crenulata, calyce 5fido glabro obtuſo, ſpica capitata aphylla, foliis 2pinnatifidis, laciniis lanceolatis dentatis. *Sibir.*

Romanzovii Chamiſſ. 12. P. galea acuta horizontali abbreviata, calyce 5dentato glabro, ſpica pauciflora bracteata, foliis pinnatifidis lanceolatis ſerrulatis, caule erecto. *Camtſchatca.* (Flores purpurei.)

lapponica 13. P. galea porrecta truncata hiante, racemis ſpicatis laxis, calyce 2fido 5dentato, foliis lanceolatis inciſo-pinnatifidis denticulatis, caule erecto. *Lappon. Norveg. Sibir. Labrador.* (Flores flavi.)

reſupinata 14. P. galea acutiuscula, labio inferiori oblique flexo, calycibus 2fidis truncatis lanatis, floribus axillaribus ſeſſilibus, foliis lanceolatis profunde ſerratis, ſerraturis crenatis, caule elato ſimplici. *Sibir.*

**** *Galea reduncа.***

grandiflora Chamiſſ. 15. P. galea elongata hiante apice breviter reduncа, calyce 5fido foliaceo, caule humili pauciflоro, foliis 2pinnatis abbreviatis. *Ora occ. Amer. bor. ſuo circulo arctico.*

**** Galea obtusiuscula sub apice 2dentata.*

† Calyce bifido s. bilabiato.

palustris 16. P. galea apice obtuse 2dentata, calyce foliaceo, floribus subsolitariis pedunculatis, foliis 2pinnatifidis, caule erecto ramoso. *Europ.*

euphrasioides Steph. 17. P. galea apice acute 2dentata, calycibus obtusis 2fidis, floribus laxe racemosis, bracteis integerrimis, foliis lanceolatis sinuato-pinnatifidis denticulatis, caule ramosissimo. *Sibir. bor. Terra Labrador.*

aequinoctialis Kunth. 18. P. galea truncata cuspidato-2dentata, calycibus hinc fissis undulatis, floribus spicatis, foliis lanceolatis pinnatifidis serrulatis pubescentibus, caule prostrato radicante. *Mexico.*

striata Pall. 19. P. galea obtusa sub apice 2dentata, calyce glabro 2labiato $\frac{3}{2}$, floribus spicatis, bracteis integerrimis, foliis pinnatifidis, laciniis linearibus serrulatis. *Dauuria.*

canadensis 20. P. galea obtusa dentibus sub apice 2 setaceis, calyce oblique fisso integerrimo incano-pubescente, spica abbreviata foliata, foliis pinnatifidis inciso-crenatis laevibus. *Amer. bor.* (Flores albi.)

ramosa Wormsk. 21. P. galea obtusa sub apice 2setosa, calyce 2labiato $\frac{3}{2}$ 5nervio, floribus racemosis bracteatis, foliis pinnatifidis serrulatis subtus cauleque ramoso pubescentibus. *Grönland.* (Flores lutei.)

†† Calyce 5fido.

sylvatica 22. P. galea truncata acute 2dentata, calyce inaequaliter 5fido crenulato, floribus subsolitariis pedunculatis, foliis 2pinnatifidis, caule erecto subramoso. *Europ.*

myriophylla Pall. 23. P. galea falcata acuta sub apice 2dentata, calyce inaequaliter 5fido hirsuto, foliis 2pinnatis, foliolis lineari-lanceolatis serratis, caule erecto ramoso. *Imaus.*

altaica Steph. 24. P. galea obtusa emarginata 2dentata, calyce 5dentato glabro, floribus spicatis, foliis lanceolatis 2pinnatifidis hirsutiusculis, laciniis linearibus axi proximis decussatis. *Imaus.*

rubens Steph. 25. P. galea emarginata crenulata, dentibus sub apice 2setaceis, calyce inaequaliter 5dentato glabro colorato, spica foliosa, foliis 2pinnatifidis linearibus acutis. *Sibir. media.*

sudetica W. 26. P. galea emarginata sub apice 2dentata, lobis labii inferioris lateralibus serrulatis, calycibus 5fidis hirsutis, foliis pinnatifidis, laciniis linearibus lanceolatis inaequaliter dentatis. *Sudetes. Sibiria. Amer. bor.*

arctica R. Br. 27. P. galea truncata 2dentata, filamentis longioribus hirsutis, calycibus 5fidis lanatis, foliis pinnatifidis, laciniis subovatis inciso-dentatis. (*Inf. Melvill. Amer. bor.* (75° lat. bor.)

achillaciſolius Steph. 28. P. galeae falcatae declinatae collo anguſtato, dentibus ſub apice 2 ſubulatis, calyce inaequaliter 5fido pubeſcente, racemo ſpicato elongato denſifloro, foliis 2pinnatifidis linearibus dentatis. *Sibir.*

villoſa Ledeb. 29. P. galea emarginata, dentibus breviſſimis 2 ſub apice, calyce 5fido villoſo, ſpica compacta aphylla, foliis pinnatis, laciniis linearibus ſerratis, caule ſimplici villoſo. *Sibir.*

erioſtachys Ledeb. 30. P. galea depreſſa obtuſa, dentibus ſub apice 2 ſetaceis, calyce 5dentato lanato, ſpica compacta abbreviata, foliis pinnatis, laciniis linearibus ſerratis, caule ſimplici. *Sibir.*

alopecuroides Stev. 31. P. galea elongata obtuſa ſub apice 2dentata, calycibus 5dentatis denſe lanatis, ſpica elongata bracteata, foliis pinnatifidis ſubtus incanis, laciniis linearibus ſerratis. *Sibir.*

comoſa 32. P. galea oblique truncata 2dentata, calyce 5fido, ſpica denſa, foliis ſub-2pinnatis, laciniis linearilanceolatis argute ſerratis. *Gallia auſtr. Italia. Hungar. Transſylvan. Ucrania. Podolia. Sibiria.*

****** *Galea 3dentata.***

faſciculata Bellard. 33. P. galea adunca 3dentata, calyce 5fido foliaceo, floribus ſpicatis, foliis 2pinnatifidis hirſutis, laciniis obtuſe denticulatis. *Italia ſuperior. Gallia auſtr.*

******* *Galea obtuſa integerrima.***

† *Calyce bifido ſ. bilabiato.*

pallida Pursh. 34. P. galea depreſſa obtuſa, calyce 2fido rotundato, ſpica aphylla glabra, foliis lanceolatis crenatis dentatis. *Amer. bor.* (P. virginica Lam., lanceolata Mx., ſerotina Mühlenb., auriculata Sm. in Rees.)

ſpicata Pall. 35. P. galea abbreviata obtuſa, calyce 2fido rotundato, bracteis ſubintegerrimis, ſpica terminali elongata denſa, floribus inferioribus verticillatis, foliis quaternis lanceolatis ſinuato-pinnatifidis crenatis. *Dauuria.*

†† *Calyce 5fido.*

a. ſubfoliaceo.

Sceptrum 36. P. galea obtuſiſſima corollam claudente, calyce foliaceo obtuſo, floribus remote ſpicatis bracteatis, foliis pinnatifidis, laciniis obtuſis denticulatis. *Scandinavia. German. bor. Boruſſia. Hungar. Volhynia.*

flava Pall. 37. P. galea obtuſa depreſſa hiante, calyce foliaceo ſerrulato acuto, ſpica folioſa, foliis pinnatifidis, laciniis remotis lineari-lanceolatis acutis ſerratis. *Sibir. Olymp. Aſiae minoris.* Sibthorp.

caucaſica M.B. 38. P. galea erecta obtuſa patente, lab. inf. dilatato, calycibus ſubfoliaceis ſubulatis ſerrulatis hirſutis, ſpica folioſa, foliis 2pinnatifidis linearibus ſerrulatis. *Caucaſ.*

purpuraſcens Chamiſſ. 39. P. galea ſubdeclinata obtuſa, calycibus foliaceis hirſutis, ſpica folioſa, foliis pinnatifidis linearibus crenulatis. *Inſ. Aleut.*

parviflora Sm. 40. P. galea obtuſa labium inferius ſuperante, calyce foliaceo, foliis ſub-2pinnatifidis. *Ora occ. Amer. bor.* Menzies.

capitata Adam. 41. P. galea obtuſa crenulata, calycibus foliaceis, floribus capitatis bracteatis, caule nudo, foliis radicalibus 2pinnatifidis, laciniis inciſo-ſerratis obtuſiuſculis. *Inſul. oſtii Lenae.* (75° lat. bor.)

acaulis Scop. 42. P. galea erecta elongata obtuſiuscula, calycibus foliaceis, pedunculis 1floris radicalibus aggregatis, foliis pinnatis hirſutis, foliolis ovatis inciſo-ſerratis ſeſſilibus. *Carniolia. Carinthia. Italia ſuper.* (Flores albi ſ. rubentes.)

β. Calyce 5fido ſ. 5dentato membranaceo.

recutita 43. P. galea obtuſiſſima labium inferius multo ſuperante, calycibus 5dentatis glabris, ſpica compacta folioſa, foliis pinnatifidis glabris, laciniis lanceolatis acutis inciſo-ſerratis. *Alp. Europ. med. Ora occ. Amer. bor.* (Flores purpurei.)

folioſa 44. P. galea villoſa obtuſiſſima labium inferius aequante, calycibus inaequaliter 5dentatis, ſpica folioſa, foliis 2pinnatifidis hirſutis, laciniis linearibus inciſo-ſerratis. *Alp. Europ. med.* (Flores ochroleuci.)

verticillata 45. P. galea ſuberecta obtuſa, labio inferiori dilatato, calycibus 5dentatis hirſutis, ſpica ſubinterrupta baſi folioſa, fructuum roſtris elongatis enſiformibus, foliis pinnatifidis, laciniis obtuſiuſculis crenulatis. *Alp. Europ. med. Sibir. Amer. bor.* (P. gladiata Mx.) (Flores purpurei.)

interrupta Steph. 46. P. galea ſub-falcata obtuſa, calycibus inaequaliter 5dentatis villoſis, verticillis ſpicatis, bracteis ovatis integerrimis margine lanatis, foliis verticillatis pinnatifidis, laciniis lanceolatis inaequaliter dentatis. *Sibir.*

elata W. 47. P. galea erecta truncata labium inferius multo ſuperante, calycibus 5dentatis glabris, ſpica laxa folioſa elongata, bracteis ſub-3fidis, foliis pinnatifidis, laciniis lineari-lanceolatis crenatis, caule elato. *Sibir. Louiſiana.* (Flores purpurei.)

Wilhelmſiana M. B. 48. P. galea erecta obtuſiſſima labium inferius multo ſuperante, calycis lanati dentibus ſubulatis, ſpica compacta folioſa, caule lanato ſubaphyllo, foliis radicalibus 2pinnatifidis villoſis. *Caucaſ.* (Flores purpurei.)

condenſata M. B. 49. P. galea obtuſa, calycis lanati dentibus inaequalibus, ſpica compacta folioſa, foliis 2pinnatifidis lineari-lanceolatis dentatis. *Caucaſ.* (Flores purpurei.)

triſtis 50. P. galea obtuſa margine villoſa, calycibus 5fidis, ſpica compacta, foliis dentato-pinnatifidis, dentibus argute denticulatis. *Sibir.* (Flores flavi.)

asparagoides Lapeyr. 51. P. galea recurva obtusa, labio inf. erecto ipsam amplexante, calycibus glabris coloratis 5dentatis, spica oblonga bracteata, foliis 2pinnatis inaequaliter dentatis, radice tuberosa. *Pyren. orient.* (Fl. purpurei.)

flammea 52. P. galea erecta obtusa, laciniis lab. inf. angustis acutis, calycibus 5dentatis glabris, spica pauciflora, foliis pinnatis, foliolis reflexis oblongis obtusis crenulato-denticulatis, radice tuberosa. *Lappon. Island. Grönland. Labrador. Sibir. bor.* (Corolla fulva, galea coccinea.)

versicolor Wahlenb. 53. P. galea erecta truncata, laciniis lab. inf. rotundatis, calycibus 5dentatis pilosis, floribus spicatis, foliis pinnatis, foliolis reflexis oblongis obtusis incisо-dentatis, radice tuberosa. *Alp. Europ. med.* (P. flammea Suter. Cand. Baumgart.) (Corolla lutea, galea ferruginea.)

Oederi Vahl. 54. P. galea obtusa erecta, labio inf. dilatato rotundato, calycibus 5dentatis coloratis pilosis, floribus racemoso-spicatis remotiusculis foliatis, foliis pinnatis, foliolis ovatis incisо-serratis. *Norvegia.* (P. flammea Oeder. Gunner.) (Flores flavi 1-colores.)

hirsuta 55. P. galea arcuata obtusa, lobo medio labii inf. maximo emarginato, calycibus tubulosis 5dentatis hirsutis, floribus spicatis, foliis pinnatis, foliolis lineari-lanceolatis obtuse dentatis. *Lappon.* (Flores rosei.)

abrotanifolia Stev. 56. P. galea truncata recta patente, calycibus 5dentatis hirsutis, spica compacta bracteata, foliis 2pinnatifidis glabris, laciniis angustissimis distantibus serrulatis. *Sibir.*

rosea Jacqu. 57. P. galea erecta obtusa, lobo medio lab. inf. breviori, calycibus ventricosis 5dentatis villoso-lanatis, floribus spicatis, foliis 2pinnatifidis linearibus acutis. *Alp. Europ. med.* (P. hirsuta All.) (Flores rosei.)

2159. MELAMPYRUM.

cristatum 1. M. spicis 4angularibus, bracteis cordatis coloratis dense imbricatis denticulatis, foliis lineari-lanceolatis integerrimis. *Europ. nemora.*

arvense 2. M. spicis conicis laxis, bracteis coloratis pinnatifido-dentato-setaceis subtus punctatis, calycibus scabris, corollis clausis. *Europ. segetes.* (M. argyrocomum Fisch. var. bracteis albis.)

barbatum Kit. 3. M. spicis conicis laxis, bracteis virescentibus dentato-setaceis epunctatis ciliatis, calycibus villosissimis, corollis hiantibus. *Hungar. seget.*

nemorosum 4. M. floribus secundis lateralibus, bracteis cordato-lanceolatis dentatis, summis coloratis sterilibus, calycibus lanatis. *Europ. nemora.*

pratense 5. M. floribus secundis lateralibus remotis, bracteis viridibus hastato-dentatis, calycibus abbreviatis,

foliis lanceolatis integerrimis. *Europ.* (M. ſylvaticum Hudſ., vulgatum Perſ.)

ſylvaticum

6. M. floribus ſecundis lateralibus remotis, foliis bracteisque conformibus lineari-lanceolatis integerrimis, calycis dentibus elongatis. *Europ. alp.* (M. alpeſtre Perſ. ſaxoſum Baumg.)

lineare Lam.

7. M. floribus ſecundis lateralibus remotis, bracteis ſuperioribus latioribus baſi dentatis, calycis dentibus ſubelongatis, foliis lineari-lanceolatis integerrimis. *Amer. bor.*

2160. ORTHOCARPUS Nutt.

luteus Nutt.

Ad fl. Miſſuri. Herba annua ſimplex, foliis lineari-lanceolatis integerrimis *alternis*, floribus axillaribus ſeſſilibus, bracteis cuneatis divaricato-3fidis calycibusque viſcido-pubeſcentibus, corollae flavae tubo calycem ſubaequante.

2161. GOMARIA R. et P.

racemoſa R. et P.

Peru. Arbor foliis oblongo-lanceolatis apice denticulatis, floribus racemoſis.

2162. SCROFULARIA.

* *Foliis ſimplicibus, indiviſis,*

† *ovatis, oblongis, lanceolatis.*

cretacea Fiſch.

1. Scr. foliis lineari-lanceolatis utrinque attenuatis petiolatis ſerratis glabris, floribus racemoſis. *Sibir.*

Schellii *

2. Scr. foliis lanceolatis acutis utrinque glabris aequaliter ſerrulatis-breviter petiolatis, petiolis dilatatis, caule 4angulo laevi, paniculae terminalis ramis trichotomis. *Patria?*

lanceolata Pursh.

3. Scr. foliis lanceolatis acuminatis inaequaliter ſerratis, petiolis nudis, paniculae faſciculis corymboſis. *Penſyloan.*

meliſſaefolia Urv.

4. Scr. foliis ovato-lanceolatis argute ſerratis petiolatis, caule 4angulo laevi, paniculae elongatae ramis pubeſcentibus multifloris, bracteis lanceolatis ſerratis. *Aſia minor.*

orientalis

5. Scr. foliis lanceolatis elongatis acuminato-cuſpidatis argute ſerratis utrinque glabris petiolatis, inferioribus ternis ſuperioribus oppoſitis, paniculae pubeſcentis ramis corymboſis. *Aſia minor. Sibir.*

ruperſtris MB.

6. Scr. foliis ovato-oblongis utrinque attenuatis inaequaliter dentatis ſubtriplinerviis glabris, caule teretiusculo incano-pubeſcente, paniculae ramis ſubdichotomis racemoſis. *Tauria.*

fruteſcens

7. Scr. foliis ſubcarnoſis nitidis glabris dentatis, inferioribus petiolatis obovatis, ſuperioribus ob-

longis apice recurvis, paniculae ramis remotis 2fidis multifloris. *Lusitan. Afric. bor.*

ramosissima Loisl. 8. Scr. foliis oblongis utrinque attenuatis incisoserratis utrinque glabris, caule humili ramosissimo, pedunculis 1floris. *Corsica. Gallia provinc.* (Scr. frutescens Cand.)

ascendens W. 9. Scr. foliis lanceolatis utrinque attenuatis profunde inaequaliter duplicato-dentatis glabris, racemo terminali. *Patria?*

coccinea 10. Scr. foliis quaternis ovatis amplexicaulibus serratis, floribus verticillatis spicatis. *Nov. Hispan.*

minima MB. 11. Scr. foliis ovatis sublobatis denticulatis petiolatis cauleque simplicissimo humili subviscidis, capitulo terminali. *Caucas.*

†† *Foliis cordatis.*

marilandica 12. Scr. foliis cordato-lanceolatis acuminatis profunde serratis utrinque cauleque obtusangulo laevibus, paniculae ramis remotis alternis corymbosis. *Amer. bor.*

peregrina 13. Scr. foliis cordato-ovatis acutis inaequaliter dentatis utrinque cauleque obtusangulo glabris, pedunculis axillaribus paucifloris. *Italia.*

nodosa 14. Scr. foliis cordato-oblongis acutis serratis subtrinerviis cauleque acutangulo glabris. *Europ.*

aquatica 15. Scr. foliis subcordato-oblongis serratis utrinque glabris in petiolos decurrentibus, caule alato, pedunculis axillaribus corymbosis. *Europ.*

glabrata Ait. 16. Scr. foliis subcordato-oblongis obtusiusculis inaequaliter dentatis utrinque glabris, paniculae ramis trichotomis glandulosо-pubescentibus. *Inf. Canar. Hispan. austr.* (Scr. Smithii Hornem., nepetaefolia Presl.)

biserrata W. 17. Scr. foliis profunde cordatis oblongo-lanceolatis argute duplicato-serratis glabris, paniculae ramis trichotomis. *Patria?*

arguta Ait. 18. Scr. foliis cordatis duplicato-serratis glabris, paniculis axillaribus dichotomis. *Inf. Canar.*

vernalis 19. Scr. foliis cordato-ovatis duplicato-dentatis pubescentibus, caule villoso, pedunculis axillaribus corymbosis paucifloris. *Europ.* (Scr. cordata Pers.)

glandulosa Kit. 20. Scr. foliis cordato-oblongis inaequaliter crenatis pubescentibus, petiolis ciliatis, pedunculis bracteisque glandulosо-pilosis. *Carniolia. Hungar.* (Scr. auriculata Scop., rugosa W., nepetaefolia Sm., Scopolii Hopp. Pers.)

Scorodonia 21. Scr. foliis cordato-oblongis profunde rectangulo-duplicato-serratis subtus cauleque obtusangulo villosis, paniculae ramis foliatis. *Inf. Caesarea ad oram Armoricae.* (Jersey.) *Cornubia. Italia.* (Scr. grandidentata Tenor.)

altaica Murr. 22. Scr. foliis cordatis duplicato-dentatis subtus pubescentibus, racemis terminalibus villosis, laciniis calycis patentibus lanceolatis acutis. *Imaus.*

23.

betonicaefolia 23. Scr. foliis cordato-oblongis simpliciter argute dentatis rugosis subtus pubescentibus, dentibus baseos profundioribus, panicula terminali foliata. *Lusitan. Ital.* (Scr. hirsuta Hornem.)

** *Foliis basi appendiculatis ternatisque.*

appendiculata Jacq. 24. Scr. foliis cordato-ovatis duplicato crenato-serratis glabris basi appendiculatis, petiolis dilatatis, paniculae ramis abbreviatis paucifloris. *Ager tunetanus.*

Balbisii Hornem. 25. Scr. foliis subcordato-oblongis obtusis crenatis utrinque glabris, inferioribus appendiculatis, petiolis dilatatis, panicula terminali aphylla. *Italia.* (Scr. auriculata All.)

auriculata 26. Scr. foliis cordato-oblongis obtusis duplicato-dentatis subtus hirsutis basi appendiculatis, petiolis aequalibus, racemis terminalibus. *Hispan.*

micrantha Urv. 27. Scr. foliis oblongis obtusis grosse dentatis basi appendiculatis, racemo terminali composito, floribus minimis, caule glabro ascendente. *Inf. Thera maris aegei.*

heterophylla W. 28. Scr. foliis subcarnosis ternatis trilobis simplicibusque inciso-dentatis glabris longe petiolatis, racemis longissimis paniculatis, caule frutescente. *Creta. Inf. maris aegei.*

trifoliata 29. Scr. foliis subcarnosis subrotundis obtusis inaequaliter dentatis glabris, inferioribus ternatis superioribus simplicibus, pedunculis axillaribus abbreviatis subtrifloris. *Corsica.*

*** *Foliis incisis, laciniatis.*

laciniata Kit. 30. Scr. foliis cordato-oblongis sublyrato-lobatis dentato-serratis integrisque utrinque glabris, petiolis aequalibus, paniculae terminalis ramis glanduloso-pubescentibus. *Croatia.* (Scr. verbenaefolia Poir.)

deserti Delil. 31. Scr. foliis lyrato-pinnatifidis glabris margine cartilagineis dentatis, lobis obtusis, paniculae terminalis ramis glabris pauciflоris, caule frutescente. *Aegypti desert.*

pinnatifida Brot. 32. Scr. foliis lanceolatis utrinque attenuatis pinnatifidis glabris, laciniis acutis inaequaliter serratis, racemo composito terminali, caule frutescente. *Lusitan.*

caesia Sm. 33. Scr. foliis lyrato-pinnatifidis incisis glaucescentibus, panicula terminali pauciflora, caulibus caespitosis herbaceis. *Graecia.*

variegata MB. 34. Scr. foliis ovatis pinnatifido-laciniatis dentatis subpubescentibus, pedunculis axillaribus subtrifloris glanduloso-hispidis, caule fruticoso. *Caucas.*

tubulifolia MB. 35. Scr. foliis ternis glabris palmato-pinnatifidis, laciniis lanceolatis acutis inaequaliter serratis basi subincisis, racemis terminalibus paniculatis. *Caucas.*

grandiflora Cand. 36. Scr. foliis oppositis lyratis villosis, summis ovato-lanceolatis, pedunculis axillaribus 3fidis 5floris folio brevioribus. *Amer. austr.?*

****** *Foliis pinnatis.***

lyrata W. 37. Scr. foliis interrupte pinnatis subcordato-oblongis basi inaequalibus, paniculae terminalis pedunculis dichotomis. *Patria?*

mellifera Ait. 38. Scr. foliis pinnatis ternatisque glabris, foliolis ovatis crenato-serratis, pedunculis axillaribus abbreviatis subcymosis. *Corsica. Afr. bor.* (Scr. viridiflora Poir.)

sambucifolia 39. Scr. foliis pinnatis ternatisque cauleque herbaceo villosis, pedunculis axillaribus abbreviatis 3floris, corollis amplis. *Patria?*

Sibthorpiana * 40. Scr. foliis pinnatis lobatisque incisis glaucescentibus, floralibus elliptico-lanceolatis integerrimis, panicula cylindrica, caule fruticoso. *Graecia.* (Scr. frutescens Sm.)

hispida Desf. 41. Scr. foliis pinnatis duplicato-crenatis villosis, terminali maximo cordato, racemo composito terminali aphyllo, caule herbaceo hispido. *Atlas.*

tanacetifolia W. 42. Scr. foliis pinnatis glabris, foliolis oblongo-lanceolatis subpinnatifidis inciso-dentatis, paniculae terminalis ramis remotis corymbosis. *Amer. boreal.*

canina 43. Scr. foliis pinnatis glabris, foliolis oblongo-lanceolatis basi attenuatis inciso-dentatis, paniculae terminalis ramis dichotomis, lobis lab. inf. lateralibus integerrimis, caule tereti. *Europ. austr.*

chrysanthemifolia W. 44. Scr. foliis glabris, radicalibus 2pinnatifidis, caulinis pinnatis, foliolis lanceolatis inciso-dentatis, floralibus integerrimis, panicula diffusa foliosa, laciniis lab. inf. lateralibus emarginatis. *Tauria. Asia minor.* (Scr. bicolor Sibth. Sm.)

lucida 45. Scr. foliis subcarnosis glabris nitidis, inferioribus 2pinnatifidis, superioribus cuneiformibus incisis, paniculae terminalis foliosae ramis dichotomis. *Italia. Graecia. Tauria. Asia minor.*

filicifolia Mill. 46. Scr. foliis interrupte 2pinnatifidis glabris, foliolis laciniisque divaricatis lanceolatis incisis mucronato-dentatis, caule simplici quadrangulo, paniculae terminalis ramis abbreviatis foliatis. *Creta.*

multifida W. 47. Scr. foliis 2pinnatis glabris, foliolis lineari-lanceolatis acute inciso-dentatis, paniculae terminalis ramis remotis alternis paucifloris. *Sicil. Asia minor.* (Scr. filaifolia Clark.)

livida Sm. 48. Scr. foliis 2pinnatis angulato-incisis dilatatis, paniculae strictae ramis virgatis sub-5floris, caule herbaceo. *Asia minor.*

2163. DIGITALIS.

* *Corollae ventricosae labio superiori transverso.*

purpurea 1. D. foliis oblongis crenatis rugosis pubescentibus, pnduncnlis rectis calyces aequantibus, laciniis calycis ovato-oblongis. *Europ. montosa sylvatica.*

Thapsi 2. D. foliis oblongis crenatis rugosis undulatis decurrentibus nudiusculis, caule superne villoso, pedunculis arcuatis calyces multo superantibus, laciniis calycis lanceolatis. *Hispan.*

tomentosa **Link.** 3. D. foliis oblongis inaequaliter crenato-dentatis subtus villoso-tomentosis subdecurrentibus, caule superne villosissimo, pedunculis patulis calyces aequantibus, laciniis ovato-oblongis. *Lusitan.* (D. Thapsi Brot.)

fuscescens **Kit.** 4. D. foliis oblongis serrulatis venosis subtus ad venas pilosis, pedunculis calyce brevioribus laciniisque lanceolatis glanduloso-villosis, corollae reticulatae labio sup. obtusissimo, inferioris laciniа media ovata subreflexa. *Croatia.*

grandiflora **Lam.** 5. D. foliis lanceolatis serrulatis nervoso-venosis pubescentibus, pedunculis calyces aequantibus laciniisque linearibus villosis, corollae reticulatae pubescentis lab sup. praemorso, inferioris laciniis ovatis. *Europ. med.* (D. ambigua Murr. Lindl.)

ochroleuca **Jacq.** 6. D. foliis ovato-ellipticis venosis denticulatis cauleque viscido-villosiusculis, pedunculis calyce subbrevioribus, laciniis lanceolatis, corollae lobis brevissimis obtusis. *German.* (D. ambigua Schk.)

fulva **Lindl.** 7. D. foliis lanceolatis remote serrulatis venosis ciliatis, pedunculis alternis calyce brevioribus, laciniis lanceolatis, corollae pubescentis subreticulatae lobo medio lab. inf. triangulari subporrecto. *Patria?*

chinensis **Lour.** 8. D. foliis ovatis acutis serratis pilosis petiolatis, floribus axillaribus solitariis, laciniis calycis subulatis, corollae lobis obtusis. *China.*

cochinchinensis **Lour.** 9. D. foliis oppositis lanceolatis integerrimis asperis, floribus axillaribus solitariis sessilibus, laciniis calycis acutis, corollae lobis obtusis. *Cochinchina.*

** *Corollae subventricosae lobo medio lab. inf. porrecto tubum subaequante.*

laevigata **Kit.** 10. D. caule stricto foliisque lanceolatis elongatis denticulatis laevibus, floralibus linearibus, racemi elongati pedunculis remotis abbreviatis, laciniis calycis lanceolatis acutis, corollae labio inferiori ovato porrecto supra piloso. *Croatia.*

ferruginea 11. D. caule stricto foliisque lanceolatis elongatis subintegerrimis laevibus, racemi elongati pedunculis confertis, laciniis calycis obtusis margine

scariosis, corollae labio inferiori porrecto obtuso villoso. *Italia. Caucas.*

sibirica Lindl. 12. D. caule ramoso villoso, foliis lanceolatis dentatis, corollae villosae laciniis ovatis acutis. *Sibiria.*

aurea Lindl. 13. D. foliis lanceolatis nervosis subdentatis, racemi pedunculis confertis brevissimis, laciniis calycis subrotundis obtusis marginatis, corollae venoso-reticulatae labio inf. porrecto tridentato. *Graecia. Asia minor.* (D. ferruginea Sm.)

leucophaea Sm. 14. D. spica cylindrica densissima, bracteis flore longioribus, calycibus ciliatis, corollae labio inferiori spathulato obtuso pubescente. *Mons Athos Macedoniae.*

lanata Ehrh. 15. D. spica pyramidata densa lanata, bracteis calyce longioribus laciniisque lanceolatis, corollae labio inf. porrecto oblongo obtuso. *Hungaria. Transsylvan. Sicil.* (D. nova Winterl. ind. pest., Winterli Roth.)

orientalis Lam. 16. D. caule superne ramoso pubescente, inferne foliisque linearibus integerrimis nervosis laevibus, floribus sparsis subsessilibus, laciniis calycis oblongis tubum corollae aequantibus, corollae labio inf. porrecto oblongo integerrimo. *Asia minor.*

purpurascens Roth. 17. D. caule simplici foliisque lanceolatis venosis serrulatis glabriusculis, floribus racemosis secundis, laciniis calycis lanceolatis acutis tubo corollae multo brevioribus, lobis omnibus corollae obtusis integerrimis erectis, infimo porrecto. *German. occ.* (D. erubescens Ait.)

**** Corollae labio superiori bifido.*

minor 18. D. caule laevi, foliis radicalibus lanceolatis subintegerrimis supra glabris subtus pubescentibus, ramis paucifloris, pedunculis elongatis villosis, corollae glaberrimae lobis obtusis. *Hispania.*

parviflora Jacq. 19. D. caule simplici stricto villoso, foliis spathulato-lanceolatis nervoso-venosis integerrimis laevibus margine lanatis, racemo denso spicato elongato, floribus horizontalibus tubulosis, laciniis calycis ovatis obtusis, corollae lobis abbreviatis obtusis subaequalibus. *Patria?*

micrantha Roth. 20. D. caule stricto foliisque lanceolatis remote serratis nitidis glabris, superioribus integerrimis, racemo subconferto aequali, floribus nutantibus glabris, lobis corollae suberectis obtusis. *Helvetia.*

obscura 21. D. caule suffruticoso, foliis lineari-lanceolatis integerrimis basi adnatis, racemo paucifloro secundo, laciniis calycis ovatis, corollae reticulatae lobis obtusis recurvis. *Hispania.*

media Roth. 22. D. foliis lanceolatis remote serrulatis venosis glabriusculis ciliatis, racemo secundo, corollae ventricosae lobis acutis, labio inf. ovato barbato

reflexo, capsula 4sulca. *German. occid.* (D. intermedia Pers.)

lutea 23. D foliis lanceolatis remote serratis venosis glabris, racemo secundo, corollae tubulosae lobis acutis, labio reflexo, capsula bisulca. *Gallia. Italia.* (D. parviflora All., tubiflora Lindl. var.)

lutescens Lindl. 24. D. foliis cordato-oblongis crenatis glabris, racemo secundo, bracteis flore brevioribus, lobis corollae obtusis. *Patria?*

rigida Lindl. 25. D. glandulosо-pilosa, foliis oblongis inaequaliter serratis, racemo secundo, laciniis calycis lanceolatis, corollae ovatis subaequalibus. *Patria?*

viridiflora Lindl. 26. D. glandulosо-pilosa, foliis oblongis dentatis, bracteis flore longioribus, laciniis calycis linearibus, corollae (viridis) subaequalibus. *Mons Athos Macedoniae.*

Roxburghii Roth. 27. D. papillosо-muricata, foliis ovato-oblongis obtusis integerrimis, floribus terminalibus subsolitariis, calycibus strigosis subovatis conniventibus. *Ind. or.*

canariensis 28. D. frutescens glabra, foliis lanceolatis mucronato-serratis reticulato-venosis, racemo terminali, laciniis calycis lanceolatis elongatis, labio corollae super. longiori bilobo, reliquis acutis aequalibus. *Inf. Canar.*

Sceptrum 29. D. fruticosa, ramis foliisque oblongis acuminatis serratis subtus hirsutis, spica comosa, laciniis calycis linearibus, corollae obtusae labio sup. bifido, inf. lobo medio subrotundo lateralibus ovatis duplo latiori. *Madera.*

2164. LINARIA Tourn.

* *Fruticosae.*

fruticosa Desf. 1. L. caule fruticoso erecto villoso, foliis sparsis ovato-oblongis basi utrinque 1dentatis, floribus axillaribus pedicellatis, calcare corollam excedente subarcuato. *Montes Afric. bor.*

spinescens * 2. L. caule suffruticoso ramoso pubescente, ramis spinescentibus, foliis sparsis subsessilibus ovatis dentatis hispidulis, floribus axillaribus pedicellatis, calcare arcuato corollam aequante. *Montes Cyren.* Cella. (Antirrhinum Viv.)

fruticans * 3. L. caule fruticoso decumbente ramoso, foliis oppositis subsessilibus ovatis integerrimis margine revolutis asperis, floribus pedunculatis axillaribus. *C. B. S.* (Antirrhinum Thunb.)

dalmatica Buxb. 4. L. caule suffruticoso ramoso glabro, foliis semiamplexicaulibus cordato-oblongis acutis glaberrimis integerrimis, floribus racemosis amplis, calcare recto corollam aequante. *Dalmatia. Transsylvan. Armenia.* (Antirrhinum L.)

scoparia Brouffonet. 5. L. caule fruticoso ramoso, ramis virgatis glaberrimis inferne aphyllis, foliis linearibus an-

gustissimis, pedunculis axillaribus capillaribus subracemosis, calcare ascendente. *Teneriffa.*

** *Herbaceae.*

† *Caule prostrato.*

α. *Foliis lobatis, angulatis, dentatis.*

Cymbalaria W. 6. L. foliis alternis cordatis 5lobis glabris, floribus pedunculatis axillaribus subsolitariis, calcare brevi. *Europ.* (Antirrhinum L., A. hederaefolium Poir., acutangulum Tenor.)

pubescens Presl. 7. L. foliis alternis cordato-reniformibus 5lobis pubescentibus, floribus pedunculatis axillaribus subsolitariis, laciniis calycis linearibus, caule filiformi longissimo repente. *Neapol. Sicil.* (Antirrhinum pubescens et pallidum Tenor.)

pilosa Cand. 8. L. foliis alternis reniformi-orbiculatis obtuse 5lobis crenatisque pilosissimis, caule procumbente sublanato, floribus axillaribus longe pedunculatis. *Italia.* (Antirrhinum L.)

hepaticaefolia * 9. L. foliis suboppositis carnosis glaberrimis 3lobis, lobo medio maximo, lateralibus mucronatis, pedunculis axillaribus subgeminis elongatis, laciniis calycis obtusis, calcare abbreviato. *Corsica.* (Antirrhinum Poir.)

aequitriloba * 10. L. pilosa, foliis omnibus 3lobis, lobis aequalibus rotundatis, caule repente filiformi, pedunculis axillaribus elongatis, calcare brevi. *Corsica.* (Antirrhinum Viv.)

scariosa Desf. 11. L. foliis oppositis sparsisque ovato-oblongis villosis, inferioribus basi angulato-dentatis, superioribus integerrimis, floribus axillaribus breviter pedunculatis, calycibus hirsutis scariosis, calcare arcuato abbreviato, caule prostrato lanato. *Afric. bor.* (Antirrhinum scariosum Lam., dentatum Vahl.)

caucasica Mussin. 12. L. foliis sparsis oblongis mucronato-dentatis pilosis, pedunculis axillaribus elongatis filiformibus, calyce herbaceo acuto, caule procumbente pilosissimo. *Caucas.*

Elatine Desf. 13. L. foliis sparsis ovatis hastatis cauleque procumbente pilosiusculis, pedunculis axillaribus 1floris elongatis. *Europ. Asia med. Amer. bor.* (Antirrhinum L.)

elatinoides Desf. 14. L. foliis subsessilibus oblongis obtusis cauleque procumbente glabriusculis, inferioribus crenato-dentatis, floribus breviter pedunculatis, calcare corollam aequante. *Afric. bor.*

heterophylla * 15. L. foliis sparsis supra glabris subtus pubescentibus, inferioribus hastatis lanceolatis, superioribus lineari-lanceolatis basi integerrimis, pedunculis elongatis capillaribus, corolla inflata. *Marocco.* (Antirrhinum heterophyllum Schousb. W., sagittatum Poir.)

cirrhosa W. 16. L. foliis sparsis hastatis lineari-lanceolatis caulequе procumbente diffuso glabris, ramis petiolisque flexuosis, pedunculis capillaribus elongatis, calcare recto. *Aegypt.* (Antirrhinum L.)

β. Foliis subintegerrimis.

spuria W. 17. L. foliis sparsis subrotundo-ovatis mucronatis subintegerrimis superioribus subsessilibus caulequе procumbente villosis, pedunculis oppositifoliis solitariis, laciniis calycis oblongis. *Europa.* (Antirrhinum L.)

lanigera Desf. 18. L. foliis sparsis breviter petiolatis subcordato-ovatis acutis integerrimis cauleque prostrato ramosissimo lanatis, pedunculis axillaribus solitariis, calcare arcuato. *Afric. bor. Lusitan.* (Antirrhinum spurium Brot.)

dealbata Link. 19. L. foliis sparsis petiolatis subcordato-ovatis villosissimis, inferioribus dentatis, pedunculis axillaribus abbreviatis, calcare arcuato, caule procumbente ramosissimo lanato. *Lusitan.* (Antirrhinum lanigerum Brot.)

polygonifolia * 20. L. foliis subverticillatis oppositisque sessilibus ovatis cauleque prostrato ramosissimo glabris, floribus subspicatis, calyce hispido. *Ad Gibraltar.* (Antirrhinum Poir.)

†† *Caule erecto.*

α. Foliis inferioribus oppositis s. verticillatis.

αα. Foliis latioribus, ovatis s. oblongis.

latifolia Desf. 21. L. foliis ternis oppositisque oblongo-lanceolatis subtrinerviis ramisque glaberrimis, floribus racemoso-spicatis, calycibus elongatis, calcare recto corollam aequante. *Afric. bor.*

triphylla W. 22. L. foliis ternis ovato-oblongis obtusis 3nerviis margine scabris glaucescentibus, floribus racemoso-spicatis, laciniis calycis lanceolatis, calcare rectiusculo corollam subsuperante. *Europ. austr. Asia minor.* (Antirrhinum 3phyllum L., neglectum Clark.)

reflexa Desf. 23. L. foliis ternis alternisque obovatis mucronatis subtrinerviis cauleque ascendente glaberrimis, pedunculis subcorymbosis demum reflexis, galea bifida erecta, calcare recto corollam superante. *Italia. Afric. bor.* (Antirrhinum L.)

origanifolia Cand. 24. L. foliis oppositis obovato-oblongis subrotundisque glabriusculis, ramis erectis superne glandoloso-pubescentibus, floribus racemosis, fauce corollae aperta, calcare abbreviato. *Gallia austr. Hispan. Lusitan.* (Antirrhinum origanifolium L., crassifolium Cav., Anarrhinum W.)

cretacea Fisch. 25. L. foliis verticillatis oppositisque sessilibus ovatis acutis crassiusculis glaucis cauleque glaberrimis, floribus terminalibus aggregatis, fauce corollae aperta, calcare abbreviato. *Sibir.*

rhegina * 26. L. foliis glabris, inferioribus oppositis spathulatis superioribus alternis subrotundis, caule ramoso caespitoso, pedunculis racemosis elongatis laevibus, fauce corollae clausa, calcare recto elongato. *Rhegium in Calabria.* (Antirrhinum prostratum Cyrill.)

virgata Desf. 27. L. foliis glabris glaucis, inferioribus ternis ovato-oblongis superioribus alternis lanceolatis, floribus subspicatis, bracteis patenti-reflexis, calcare corollam excedente. *Afric. bor.* (Antirrhinum Poir. Vent.)

thymifolia Gaud. 28. L. foliis ternis oppositisque sessilibus ovali-oblongis glaucescentibus, floribus terminalibus fasciculatis, calcare incurvo abbreviato. *Ad ostium Aturi prope Baionnam.* (Antirrhinum Vahl.)

flava Desf. 29. L. foliis ternis oppositis alternisque obovato-oblongis glaucis, floribus terminalibus subcapitatis, galea bifida, calcare corollam aequante. *Afric. bor.* (Antirrhinum Poir. Vent.)

flexuosa Desf. 30. L. foliis oppositis sparsisque spathulatis obtusis glaberrimis in petiolum decurrentibus, ramis pedunculisque elongatis subracemosis flexuosis, calcare brevi recurvo. *Afric. bor.*

transtagana * 31. L. foliis verticillatis confertisque obovatis subcarnosis caulequc stricto simplici glaucis glaberrimis, floribus terminalibus pedunculatis, calcare incurvo. *Hispan. Lusitan.* (Antirrhinum lusitanicum Link., pedunculatum Poir.)

tenella * 32. L. foliis oppositis cordato-ovatis acutis petiolatis caulequc tenero ascendente villosis, pedunculis axillaribus solitariis elongatis, fauce corollae pervia. *Valentia Hispaniae austr.* (Anarrhinum W.)

alsinaefolia * 33. L. foliis verticillatis oppositisque ovatis acutis in petiolos attenuatis ramisque hirsutis, floribus axillaribus, laciniis calycis lineari-setaceis, calcare recto subulato breviſſimo. *Insulae cuniculariae in freto Sardiniam a Corsica sejungente.* (Antirrhinum Viv.)

oppositiflora * 34. L. foliis oppositis ovalibus petiolatis subtus ramisque villosis, pedunculis axillaribus oppositis hispidis, calcare inflato obtuso abbreviato. *Maracco.* (Antirrhinum Poir.)

villosa * 35. L. foliis oppositis ovatis subsessilibus trinerviis ramisque villosis, pedunculis axillaribus folia superantibus, calcare incurvo elongato. *Hispania.* (Antirrhinum L.)

scabra * 36. L. foliis oppositis subcordato-ovatis acutis serratis 3nerviis bveviter petiolatis glabris, pedunculis axillaribus solitariis folio brevioribus. *Afr. austr.* (Antirrhinum Thunb.)

rubrifolia Gand. 37. L. foliis infimis oppositis ovalibus in petiolum attenuatis subcarnosis rubentibus, superioribus sparsis oblongis ramisque villosis, calycibus 5sepalis patentissimis linearibus, fauce corollae

aperta, calcare ſubulato, capſula ſubevalvi. *Gall. auſtr.* (Antirrhinum origaniſolium Gouan.)

ocimifolia * 38. L. foliis infimis quaternis ovato-oblongis ſuperioribus lineari-lanceolatis, caule tenero humili ſimplici villoſo paucifloro, calcare breviſſimo. *Hiſpan.* (Antirrhinum Pourr.)

ββ. Foliis lanceolatis.

ſaxatilis Cand. 39. L. viſcido-pubeſcens, foliis verticillatis oppoſitisque lanceolatis, floribus ſpicatis, calcare abbreviato recto. *Armoric. Hiſpan. Luſitan.* (Antirrhinum ſaxatile L. Tournefortii Poir. pubeſcens Perſ. L. glutinoſa Link. var. ?)

hirta W. 40. L. villoſa, foliis infimis oppoſitis reliquis alternis ſeſſilibus lanceolatis, floribus ſubſpicatis, bracteis reflexis, calycibus obtuſis, calcare elongato rectiusculo. *Hiſpania. Luſitania.* (Antirrhinum L.)

triornithophora W. 41. L. glaberrima, foliis verticillatis oppoſitisque ſemiamplexicaulibus lanceolatis ſubtrinerviis, floribus verticillato-racemoſis, galea revoluta, calcare longiſſimo. *Aſturia. Luſitania.* (Antirrhinum L.)

marginata Desf. 42. L. glabra, foliis verticillatis oppoſitisque lanceolatis glaucis, floribus terminalibus faſciculatis, galea reflexa, calcare corollam aequante. *Ad Atlantem.*

paviflora Desf. 43. L. glabra, foliis verticillatis ſparſisque lanceolatis ſeſſilibus glaucis, floribus racemoſo-ſpicatis minimis, calcare breviſſimo. *Afric. bor.*

albifrons * 44. L. glabra, foliis verticillatis ſparſisque lanceolatis glaucis, calcare breviſſimo, ſeminibus alveolatis. *Rhodus.* (Antirrhinum Sibth.)

bipartita W. 45. L. foliis inferioribus ternis lanceolatis, ſuperioribus oppoſitis ſparſisque anguſtioribus, floribus ſpicato-racemoſis, galea 2partita, calcare corollam excedente. *Marocco.* (Antirrhinum Vent. L. ſpecioſa Jacq. fil.)

†*patens* * 46. L. foliis oppoſitis ſubſeſſilibus lanceolatis acutis ſubintegerrimis glabris, floribus terminalibus ſolitariis. *C. B. S.* (Antirrhinum Thunb.)

γγ. Foliis lineari-lanceolatis.

minor Cand. 47. L. foliis oppoſitis ſparſisque lineari-lanceolatis obtuſiusculis, caule ramoſo diffuſo glanduloſo-piloſo, pedunculis axillaribus calyce multo longioribus. *Europa.* (Antirrhinum L.)

litoralis W. 48. L. foliis oppoſitis ſparſisque lineari-lanceolatis obtuſis, caule ſtricto villoſo, pedunculis axillaribus calycem aequantibus. *Auſtria litoralis.* (Antirrhinum Bernh.)

chalepenſis Mill. 49. L. foliis lineari-lanceolatis acutis glabris, infimis verticillatis, ſuperioribus ſparſis, floribus racemoſis, calycibus ſub-5ſepalis corolla longioribus, calcare incurvo longiſſimo. *Italia. Gallia*

auſtr. (Antirrhinum chalepenſe L., album Lam., Oſyris Cyrill.)

triſtis Mill. 50. L. foliis lineari-lanceolatis glaucis, inferioribus verticillatis ſuperioribus ſparſis, floribus racemoſis, calcare elongato discolore. *Hiſpania.* (Antirrhinum triſte L., aerugineum Gouan.)

verſicolor Mönch. 51. L. foliis lineari-lanceolatis, inferioribus ternis, caule ſtricto ſuperne villoſo-viſcidulo, floribus racemoſo-ſpicatis, calcare elongato discolore, capſula ſubevalvi. *Gallia auſtr.* (Antirrhinum verſicolor Jacq.)

hians * 52. L. foliis lineari-lanceolatis ternis ſparſisque, caule ſtricto ſuperne glabro, floribus racemoſis, fauce corollae hiante, calcare breviusculo. *Europ. auſtr.* (Antirrhinum linarioides L.)

micrantha * 53. L. foliis verticillatis ſparſisque lineari-lanceolatis obtuſiusculis patentibus, floribus faſciculatis, calcare breviſſimo. *Hiſpan.* (Antirrhinum micranthum Cav.)

viſcoſa * 54. L. foliis verticillatis oppoſitisque lineari-lanceolatis cauleque ſuperne viſcido-villoſis, floribus ſparſis, calycibus foliaceis, calcare abbreviato. *Hiſpan.* (Antirrhinum viſcoſum L.)

purpureu Mill. 55. L. foliis verticillatis ſparſisque lineari-lanceolatis ſubtus trinerviis cauleque ramoſo laevibus, floribus racemoſo-ſpicatis, fauce corollae aperta, calcare incurvo corollam aequante. *Neapol.* (Antirrhinum purpureum L., L. purpuraſcens Hornem.)

arenaria Cand. 56. L. foliis verticillatis ſparſisque ſubſpathulato-linearibus ſeſſilibus, caule ſimplici ſuperne viſcidulo-pubeſcente, floribus racemoſo-ſpicatis, bracteis erectis calycem aequantibus, calcare abbreviato ſubulato. *Armorica.* (Antirrhinum ſaxatile Bonam.)

alpina Cand. 57. L. foliis verticillatis ſparſisque ſpathulatis ſubcarnoſis glaucis, caule diffuſo glabro, floribus racemoſis, calcare rectiusculo corollam aequante. *Alp. Europ. med.* (Antirrhinum alpinum L., ſubalpinum Brot.)

luſitanica Tourn. 58. L. foliis ternis ſparſisque lineari-lanceolatis glaucis, ramis ſterilibus proſtratis floriferis aſcendentibus, floribus laxe racemoſis, calcare rectiusculo corollam aequante. *Luſitania.* (Antirrhinum luſitanicum Vent. Brot. polygalaefolium W. herb.)

pyrenaica Cand. 59. L. foliis verticillatis ſparſisque lineari-lanceolatis glaucis, caule aſcendente ſuperne villoſiusculo, floribus ſubſpicatis, lacinia calycis ſuprema longiore, calcare recto ſtriato corollam aequante. *Pyren. Gallia. Aegypt.* (Antirrhinum pyrenaicum Ramond., Haelava Forsk., Thuillerii Merat.)

laxiflora Desf. 60. L. foliis linearibus obtuſis glaucis, infimis quaternis ſuperioribus ſparſis, caule ſubaſcendente ſuperne glabro, floribus laxe racemoſis, galea

acute 2fida, calcare corollam duplo ſuperante. *Afric. bor.*

Peliſſeriana Cand. 61. L. foliis inferioribus quaternis lanceolato-linearibus, ſuperioribus ſparſis linearibus, floribus corymboſis, calcare recto corollam excedente. *Gallia. Italia.* (Antirrhinum Peliſſerianum L., gracile et elegans Perſ. varr. ?)

§§. Foliis exacte linearibus.

†*procera* Cand. 62. L. foliis infimis verticillatis ſuperioribus ſparſis glabris, caule ſimpliciusculo, floribus denſe racemoſis, calcare calycem ſuperante. *Patria?*

ſtriata Cand. 63. L. foliis verticillatis ſparſisque glaucis glabris, racemis paniculatis, corolla ſtriata, calcare calycem aequante. *Anglia. Gallia. Italia.* (Antirrhinum repens et monſpeſſulanum L., ſtriatum et galioides Vent.)

amethyſtina * 64. L. foliis verticillatis ſparſisque glaucis glabris, caule ſimplici, racemo ſub-4floro villoſo, calcare corollam duplo excedente discolore. *Hiſpania. Luſitania. Armorica.* (Antirrhinum amethyſtinum Vent., bipunctatum Cav., tricolor Pourr., ſapphirinum Brot. Linaria maritima Cand.)

ſupina Desf. 65. L. foliis quaternis ſparſisque abbreviatis heteromallis glabris, caule diffuſo, floribus racemoſis, calcare reflexo corollam ſuperante. *Europ. auſtr. Afric. bor.* (Antirrhinum ſupinum L.)

bipunctata * 66. L. foliis quaternis ſparſisque, caule erecto paniculato, floribus ſubſeſſilibus, fauce corollae hiante, calcare recto corollam aequante. *Italia. Hiſpania.* (Antirrhinum bipunctatum L.)

ſpartea * 67. L. foliis ternis ſparſisque lineari-canaliculatis carnoſis, racemis paniculatis, fauce corollae clauſa. *Hiſpania. Afric. bor.* (Antirrhinum ſparteum L.)

ſimplex Cand. 68. L. foliis verticillatis ſparſisque glaucis glabris, floribus racemoſo-congeſtis, calycibus viſcidulo-pubeſcentibus, corollae exiguae calcare recto. *Gallia. Caucaſ.* (Antirrhinum parviflorum Jacq., ſimplex W.)

arvenſis Desf. 69. L. foliis verticillatis ſparſisque, floribus racemoſis, calycibus viſcido-villoſiusculis, calcare recurvo. *Europ.* (Antirrhinum arvenſe L.)

diffuſa Link. 70. L. foliis quaternis ſparſisque abbreviatis caulequ diffuſo pubeſcentibus, floribus ſparſis, calcare ſubulato aſcendente corollam ſuperante. *Luſitania.*

multicaulis * 71. L. foliis verticillatis linearibus carnoſis, ramis diffuſis laxis, floribus congeſtis, calcare elongato. *Sicilia. Luſitania. Afric. bor.* (Antirrhinum multicaule L., capitellatum Vent., multipunctatum Brot. Brouſſoneti Poir.)

tenuis * 72. L. foliis ternis ſparſisque linearibus ſubpubeſcentibus, caule tenero ſimplici paucifloro, calycibus hiſpidis, labio corollae inferiore bilobo,

calcare elongato. *Ad magnam Syrtim Afric. bor.* (Antirrhinum tenue Viv.)

incarnata * 73. L. foliis verticillatis ſparſisque linearibus abbreviatis ſubhomomallis, caule erecto flexuoſo ſuperne piloſo, racemo laxo terminali, laciniis calycis ſubulatis, fauce corollae hiante, calcare elongato discolore. *Hiſpan. Luſitan.* (Antirrhinum incarnatum Vent., L. lineogryſea Link.)

virgatula * 74. L. foliis ternis ſparſisque lineari-canaliculatis glaberrimis, caule ramoſo paniculato, floribus pedunculatis remotis, calcare abbreviato. *Luſitania.* (Antirrhinum virgatulum Brot.)

reticulata Desf. 75. L. foliis verticillatis ſparſisque lineari-canaliculatis, floribus racemoſo-ſpicatis, bracteis pedicellos ſuperantibus calycibusque hirſutis, corolla reticulata. *Afric. bor.* (Antirrhinum pinifolium Poir.)

glauca W. 76. L. foliis quaternis ſubulatis carnoſis, caule erecto, floribus ſubſpicatis, calcare ſtriato. *Aſia minor.* (Antirrhinum glaucum L.)

aparinoides * 77. L. foliis verticillatis confertisque linearibus glabris, caule ſimplici, racemo denſo ſpicato, calycibus villoſis, calcare recto elongato. *Atlas.* (L. heterophylla Desf., Antirrhinum aparinoides W.)

† *filifolia* Lag. 78. L. foliis verticillatis confertisque lineari-filiformibus carnoſis, floribus ſpicatis, calcare rectiusculo ſubulato elongato. *Ager matritenſis.*

† *capenſis* * 79. L. foliis oppoſitis linearibus glabris, ramis elongatis, racemis terminalibus. *C. B. S.* (Antirrhinum capenſe Thunb.)

β. Foliis omnibus ſparſis,

aa. latioribus.

glabrata Kunth. 80. L. foliis oblongis acutiusculis carnoſis glabris, floribus ſpicatis bracteatis, calycibus obtuſis, calcare aſcendente tubum aequante. *Quito.*

aegyptiaca Desf. 81. L. foliis alternis ovato-lanceolatis baſi 1-2dentatis petiolatis, caule erecto ramoſo, ramis ſtrictis pubeſcentibus, pedunculis ſolitariis perſiſtentibus ſpineſcentibus, calcare incurvo. *Aegypt.*

pyramidata Tourn. 82. L. foliis ſubcordato-oblongis acutis nervoſis amplexicaulibus, racemis glaberrimis, calcare elongato. *Armenia.* (L. ſilenifolia Link.)

geniſtaefolia Mill. 83. L. foliis lanceolatis acuminatis enerviis ſeſſilibus glaberrimis, racemis paniculatis, calcare elongato. *German. med. Helvetia. Sibir.* (Antirrhinum L.)

linifolia W. 84. L. foliis lanceolato-linearibus acutis 3nerviis, floribus racemoſo-ſpicatis, bracteis pedicellos ſuperantibus. *Italia. Taurin. Podolia.* (Antirrhinum Linaria MB., polygalaefolium Poir., Lin. Bieberſteinii Beſſ.)

vulgaris Bauh. 85. L. foliis lanceolato-linearibus acutis, caule foliioſo, floribus racemoſo-ſpicatis. *Europ. Amer. bor.* (Antirrhinum Linaria L.)

lagopodioides * 86. L. foliis lanceolato-linearibus apice recurvis subtomentosis, floribus spicatis dense villosis. *Sibir.* (Antirrhinum L.)

ββ. Foliis angustis, linearibus.

Löselii Schweigg. 87. L. foliis linearibus utrinque glabris sessilibus acutis, ramis virgatis, floribus racemosis, calcare corollam aequante. *Borussiae litora. Ad Borysthenem et in Tauria.* (Antirrhinum odorum MB.)

stricta Horn. 88. L. foliis linearibus confertis glaucis, caule simplici, floribus racemoso-spicatis, calycibus villosis, calcare recto corollam excedente. *Asia minor. Ad Volgam et in Tauria.* (Antirrhinum strictum Sm., macrourum MB.)

juncea Cand. 89. L. foliis linearibus angustissimis subtus convexis, ramis virgatis, floribus racemosis, calycibus glabris abbreviatis, calcare elongato. *Hispania.* (Antirrhinum L.)

canadensis * 90. L. foliis linearibus remotis glabris, caule simpliciſſimo filiformi basi stolonifero, racemis subcorymbosis, fauce corollae hiante. *Amer. bor.* (Antirrhinum L.)

pedunculata * 91. L. foliis linearibus subcarnosis laevibus remotis, pedunculis subracemosis folio longioribus, corolla striata. *Hispan.* (Antirrhinum L.)

monomotapensis Desf. 92. L. foliis linearibus obtusis subcarnosis obsolete dentatis, racemo laxo pubescente, calcare obtuso, caule simpliciusculo. *Afric. austr. mediterr.* (Antirrhinum dentatum Poir.)

---

aphylla * 93. L. scapo 1floro capillari. *Afric. austr.* (Antirrhinum aphyllum Thunb.)

2165. NEMESIA Vent.

chamaedryfolia Vent. 1. N. foliis ovatis serratis petiolatis, pedunculis axillaribus 1floris. *C. B. S.* (Antirrhinum macrocarpon Ait.)

bicornis Perf. 2. N. foliis linear-lanceolatis serratis verticillatis oppositisque sessilibus, racemo terminali laxo glanduloso-pilosiusculo, capsulis 2cornibus. *C. B. S.* (Antirrhinum 2corne L.)

foetens Vent. 3. N. foliis linear-lanceolatis subtrinerviis glabris, floribus racemosis terminalibus bracteatis. *C. B. S.*

linearis Vent. 4. N. foliis linearibus integerrimis sessilibus, floribus corymboso-racemosis. *C. B. S.*

2166. ANTIRRHINUM.

majus 1. A. foliis oppositis oblongo-lanceolatis glabris, floribus racemoso-spicatis, laciniis calycis glanduloso-pubescentibus obtusis. *Europ. med. et*

auſtr. (A. meonanthon Link. var. parviflora, A. tortuoſum Boſc. et Vent. in vicis Romae vulgare, A. anguſtifolium Urv., in inſula Melita, et A. capitatum Presl. in Sicilia bor. ſiſtunt varietatem eandem anguſtifoliam.)

ſempervirens Lapeyr. 2. A. foliis oppoſitis ovalibus ſubpubeſcentibus, pedunculis axillaribus ſolitariis folio brevioribus, laciniis calycis oblongis, caule fruticoſo, ramis divaricatis villoſis. *Pyren.*

molle 3. A. foliis oppoſitis ovatis tomentoſis, pedunculis axillaribus, caule procumbente. *Hiſpan. Luſitan. Cochinchina.*

Aſarina 4. A. foliis oppoſitis cordatis crenatis piloſis, pedunculis axillaribus oppoſitis folio brevioribus, caule procumbente radicante. *Italia.*

filiforme Poir. 5. A. foliis oppoſitis ovatis integerrimis glabriuſculis, ramis alternis 1floris, calycibus ſetaceis, caule filiformi pubeſcente. *Gallia provinc.*

papilionaceum N. L. Burm. 6. A. foliis alternis obovatis trinerviis carnoſis integerrimis, pedunculis axillaribus 1floris, lacinia calycis ſuprema latiſſima, corolla papilionacea. *Perſia.*

porcinum Lour. 7. A. foliis oppoſitis lanceolatis ſubſerratis viſcoſis, floribus axillaribus verticillatis, laciniis calycis ſubulatis, caule erecto. *Cochinchina.*

aquaticum Lour. 8. A. foliis verticillatis lanceolatis integerrimis glabris, floribus ſolitariis axillaribus, caule erecto. *Cochinchina.*

ſiculum Ucr. 9. A. foliis ternis lineari-lanceolatis glabris, floribus racemoſis, laciniis calycis lanceolatis acutis glanduloſo-piloſis. *Sicil.*

Orontium 10. A. foliis alternis oppoſitisque lanceolato-linearibus ſubpetiolatis, floribus ſparſis ſubſeſſilibus, calycibus digitatis longiſſimis. *Europ.* (A. calycinum Vent. Brot.)

2167. ANARRHINUM Desf.

fruticoſum Desf. 1. A. foliis inferioribus cuneiformibus apice 3dentatis, ſuperioribus linearibus, ramis virgatis, caule fruticoſo. *Ad Atlantem et in rupibus Palaeſtinae.*

bellidifolium W. 2. A. foliis radicalibus oblongis inciſo-dentatis triplinerviis, caulinis 3-5partitis linearibus, caule glabro herbaceo erecto. *Helvetia. Europ. auſtr.*

pedatum Desf. 3. A. foliis radicalibus obovato-lanceolatis ſerratis trinerviis, caulinis 3-5partitis ſubpedatis, laciniis media lato-lanceolata, caule foliisque hirſutis. *Numidia. Prov. interamnis Luſitaniae.* (Antirrhinum duriminium Brot.)

2168. MIMULUS.

* *Caule erecto.*

glutinosus Wendl. 1. M. caule fruticoso foliisque oblongis subserratis glutinosis, pedunculis flore brevioribus. *Patria?* (M. aurantiacus Curt.)

ringens 2. M. caule herbaceo foliisque oblongo-lanceolatis serratis glabris, pedunculis flore longioribus. *Amer. bor.*

alatus Ait. 3. M. caule herbaceo 4alato foliisque petiolatis ovato-oblongis crenatis glabris, pedunculis flore brevioribus. *Amer. bor.*

Lewisii Pursh. 4. M. caule humili foliisque lanceolatis nervosis sessilibus denticulatis pubescentibus, pedunculis paucis terminalibus elongatis. *Ad fl. Missuri.*

perfoliatus Mut. 5. M. caule 4alato foliisque connatis lanceolatis acuminatis argute serratis glabris, corymbis axillaribus folio brevioribus. *Nov. Granat.*

gracilis R. Br. 6. M. caule gracili foliisque lineari-oblongis integerrimis obtusis glaberrimis, pedunculis elongatis. *Nov. Holl.*

** *Caule basi repente.*

luteus 7. M. caule basi radicante tereti foliisque subsessilibus ovatis acutis nervosis serratis glabris, pedunculis axillaribus elongatis ebracteatis. *Chili.*

guttatus Cand. 8. M. caule basi radicante foliisque inferioribus longe petiolatis ovato-oblongis obtusis nervosis inaequaliter denticulatis basi subauriculatis glabris, pedunculis flore brevioribus bracteatis. *Inf. Aleut. Ora occ. Amer. bor. Mexico.* (M. luteus Pursh. Curt., glabratus Kunth.)

†*repens* R. Br. 9. M. caule repente glabro, ramis ascendentibus, foliis ovalibus obtusis, pedunculis calyce brevioribus. *Nov. Holl. Terra Diemen.*

andicola Kunth. 10. M. caule repente glabro, foliis subcordato-ovatis obtusis petiolatis nervosis irregulariter dentatis, pedunculis folio longioribus. *Peru.*

pilosiusculus Kunth. 11. M. caule repente 4angulo foliisque subcordato-ovatis obtusis petiolatis nervosis irregulariter dentatis pubescentibus, pedunculis folio brevioribus. *Peru.*

2169. TORENIA.

hirsuta Lam. 1. T. caule erecto foliisque oppositis subsessilibus ovatis acuminatis serratis hispidis, pedunculis terminalibus folio brevioribus. *Ind. or.*

lepidota Roth. 2. T. caule erecto, foliis oppositis alternisque linearibus integerrimis lepidotis, floribus axillaribus sessilibus. *Ind. or.*

flaccida R. Br. 3. T. caule diffuso foliisque late ovatis obtusis crenatis glabris, pedunculis flore triplo longioribus. *Nov. Holl.*

aſiatica 4. T. caule proſtrato radicante foliisque ovatis acutis crenatis glabris, pedunculis terminalibus elongatis. *Ind. or.*

cordifolia Roxb. 5. T. caule proſtrato pubeſcente, foliis cordato-ovatis ſerratis glabris, pedunculis axillaribus oppoſitis unifloris. *Ind. or.* [In Micrantho Rothii collocando haereo.]

2170. VANDELLIA P. Br.

pratenſis Vahl. 1. V. caule erecto 4gono, foliis lanceolatis acutis crenatis, pedunculis axillaribus ſubverticillatis folia ſuperantibus. *Amer. auſtr.* (Matourea Aubl.)

diffuſa 2. V. caule diffuſo 4gono foliisque ovatis crenatis villoſis, pedunculis axillaribus 1floris folio brevioribus. *Inſ. Carib. Braſil.*

2171. DIASCIA Link.

Bergiana Link. 1. D. caule diffuſo foliisque alternis petiolatis lanceolatis pinnatifidis glabris, pedunculis elongatis erectis ſubſolitariis. *C. B. S.* (Hemimeris diffuſa L. ſuppl., pedunculariis Lam., Paederota bonae ſpei L., Hem. fabuloſa Thunb. var.)

Thunbergiana * 2. D. caule diffuſo foliisque oppoſitis petiolatis obovatis inciſo-ſerratis glabris, pedunculis axillaribus 1floris elongatis ſubſolitariis. *C. B. S.* (Antirrhinum longicorne Thunb.)

macrophylla * 3. D. caule diffuſo, foliis oppoſitis cordato-ovatis dentatis glabris, pedunculis capillaribus piloſis bracteatis. *C. B. S.* (Hemimeris macrophylla Thunb.)

montana * 4. D. caule diffuſo pubeſcente, foliis oppoſitis ovatis obtuſiusculis crenatis glabris, pedunculis 1floris compreſſis folia aequantibus. *C. B. S.* (Hemimeris montana Thunb., alſinoides Lam.)

2172. TITTMANNIA Reichenb.

ovata Reichenb. 1. T. caule diffuſo ramoſo foliisque ovatis ſerratis petiolatis piloſiusculis, pedunculis axillaribus oppoſitis elongatis erectis. *Inſ. Philippin. et Societ.* (Hornemannia ovata Link., Antirrhinum hexandrum Forſt.)

alſinoides * 2. T. caule erecto, foliis oppoſitis ovatis ſubintegerrimis, pedunculis fructiferis deflexis. *Nov. Holl.* (Lindernia alſinoides R. Br.)

ſcabra * 3. T. caule erecto pubeſcente, foliis ovato-lanceolatis ſerratis ſcabris, pedunculis fructiferis erectis. *Nov. Holl.* (Torenia ſcabra R. Br.)

monticola * 4. T. caule erecto dichotomo, foliis radicalibus ſpathulatis caulinis linearibus remotis, pedunculis elongatis fructiferis deflexis. *Carolina bor.* (Lindernia monticola Nuttall.)

ſcapigera * 5. T. caule erecto, foliis late ovatis ſubintegerrimis, infimis confertis, ſuperioribus minutis, pedun-

dunculis longiſſimis fructiferis deflexis. *Nov. Holl.* (Lindernia ſcapigera R. Br.)

viſcoſa Reichenb. 6. T. caule proſtrato radicante foliisque ovato-oblongis venoſis crenato-ſerratis glanduloſo-piloſis viſcoſis, pedunculis racemoſis fructiferis deflexis. *Ind. or.* (Hornemannia viſcoſa W., Gratiola viſcoſa Horn.)

grandiflora * 7. T. caule proſtrato repente, foliis ſubamplexicaulibus craſſiusculis ſubrotundis ſubintegerrimis glaberrimis, pedunculis axillaribus elongatis. *Georgia.* (Lindernia grandiflora Nuttall.)

†*ſubulata* * 8. T. foliis lineari-ſubulatis integerrimis, pedunculis fructiferis deflexis. *Nov. Holl.* (Lindernia ſubulata R. Br.)

2173. HERPESTES Gärtn.

* *Calycibus bracteatis.*

domingenſis * 1. H. caule erecto glabro ramoſo, foliis petiolatis oblongis baſi attenuatis crenatis, pedunculis verticillatis, calycibus fructiferis reticulatis. *Hiſpaniola.* Bertero.

floribunda R. Br. 2. H. caule erecto glabro, foliis lineari-lanceolatis, pedunculis axillaribus ſub-5floris, calycibus fructiferis reticulatis. *Nov. Holl. Ind. or.*

ſtricta Link. 3. H. caule erecto glabro ſubramoſo, foliis oblongo-lanceolatis acutis in petiolum decurrentibus inaequaliter ſerratis, pedunculis axillaribus ſubſolitariis abbreviatis, calycibus crenulatis. *Braſil.?*

erecta * 4. H. caule erecto foliisque ovato-oblongis ſubcrenulatis villoſis, pedunculis axillaribus oppoſitis abbreviatis erectis. *Braſil.* Sello.

cuneifolia Pursh. 5. H. glaberrima, caule repente, ramis erectis, foliis ſpathulatis ſubintegerrimis, pedunculis ſolitariis folia ſuperantibus. *Carolina. Nov. Hiſpan. Ind. occ. et or.* (Gratiola Monneria L., Monneria Brownei Perſ., cuneifolia Mx., Herpeſtes Monneria et moranenſis Kunth., Monneria pedunculoſa et africana Perſ. varr.)

rotundifolia Pursh. 6. H. ſubpubeſcens, foliis orbiculato-ovalibus multinerviis, pedunculis ſuboppoſitis folia aequantibus. *Ditio illinoënſis, Amer. bor.* (Monneria Mx.)

amplexicaulis Pursh. 7. H. caule lanato, foliis cordatis obtuſis integerrimis amplexicaulibus, pedunculis folio brevioribus. *Carolina.* (Monneria Mx.)

micrantha Pursh. 8. H. caule repente glabro, foliis ſeſſilibus ſubrotundis obtuſis ſtriato-nervoſis, pedunculis folio brevioribus. *Jamaica. Amer. bor.* (Gratiola repens Sw.)

rugoſa Roth. 9. H. caule repente, foliis ovatis obtuſe ſerratis rugoſis ſubtus favuloſo-punctatis, capitulis axillaribus pedunculatis geminis. *Ind. or.*

** *Calycibus ebracteatis.*

vandellioides Kunth. 10. H. caule procumbente glaberrimo, foliis obovatis acutiusculis ferratis, pedunculis axillaribus solitariis folia superantibus. *Mexico.*

caprarioides Kunth. 11. H. caule repente glaberrimo, foliis obovatis obtusis crenato-serratis, pedunculis axillaribus solitariis folia subaequantibus. *Nov. Granat.*

colubrina Kunth. 12. H. caule ascendente glaberrimo, foliis oblongis utrinque attenuatis serratis, pedunculis axillaribus folia duplo superantibus. *Peru.*

procumbens * 13. H. caule prostrato radicante glaberrimo, foliis obovato-spathulatis sessilibus integerrimis, pedunculis axillaribus solitariis folio brevioribus. *Cuba. Brasil.*

cubensis Pöppig. 14. H. caule ascendente glabro, ramis virgatis, foliis petiolatis subrotundo-ovatis crenulatis, pedunculis axillaribus filiformibus oppositis folia superantibus. *Cuba.*

linearis * 15. H. caule humili ramoso, foliis linearibus integerrimis glabris, pedunculis axillaribus geminis 1floris. *Coromandel.* (Lindernia setamoides * N. E.)

montevidensis * 16. H. ramis erectis flexuosis foliisque lineari-oblongis obtusiusculis subintegerrimis, pedunculis axillaribus nutantibus folia superantibus. *Monte Video.* Sello.

2174. LIMNOPHILA R. Br.

gratioloides R. Br. 1. L. foliis verticillatis linearibus pinnatifidis, pedunculis axillaribus solitariis 1floris calycibusque pilosis. *Ind. or. Nov. Holl.* (Hottonia indica L. sub qua et Hydropityon Gärtn. latet: p. 330.)

trifida * 2. L. foliis oppositis verticillatisque lanceolatis apice serratis trifidisque, pedunculis axillaribus subdivisis folio longioribus. *Ind. or.* (Gratiola chamaedryfolia Lam., trifida W., Limn. gratioloides Roth.)

hyssopifolia Roth. 3. L. foliis oppositis lineari-lanceolatis remote denticulatis, pedunculis axillaribus racemosis glaberrimis. *Ind. or.*

2175. UVEDALIA R. Br.

linearis R. Br. *Nov. Holl.* Herba foliis oppositis linearibus, pedunculis axillaribus terminalibusque folia superantibus, floribus coeruleis.

2176. MORGANIA R. Br.

lucida * 1. M. caule diffuso radicante, foliis cordato-ovatis dentatis glabris, pedunculis axillaribus unifloris folia superantibus. *Ind. or. China.* (Gratiola lucida Vahl. Capraria crustacea L.)

rotundifolia * 2. M. caule erectiusculo glabro, foliis ſubrotundo-ovatis ſubintegerrimis 5nerviis, pedunculis axillaribus alternis patentibus folia ſuperantibus. *Ind. or.* (Gratiola rotundifolia L.)

aſpera * 3. M. caule aſcendente filiformi foliisque ſubcordato-ovatis obtuſis groſſe ſerratis ſubſeſſilibus hiſpidiusculis, pedunculis axillaribus folia excedentibus. *Ind. or.* (Gratiola aſpera Roth.)

ſtrigoſa * 4. M. caule erecto dichotomo, ramis divaricatis ſtrigoſis, foliis petiolatis ovatis acutiusculis ſerrulatis glabris, floribus racemoſis terminalibus. *Ind. or.* (Gratiola ſtrigoſa Roth.)

hyſſopioides * 5. M. caule erecto ſimplici, foliis lanceolatis ſeſſilibus ſubintegerrimis, pedunculis axillaribus folio longioribus. *Ind. orient.* (Gratiola hyſſopioides L.)

juncea * 6. M. caule erecto ſimplici, foliis ovalibus obtuſis integerrimis ſeſſilibus, floribus alternis axillaribus inferioribus ſubſeſſilibus. *Ind. or.* (Gratiola juncea Roxb.)

callitrichoides * 7. M. caule proſtrato foliisque oblongis utrinque attenuatis dentatis glabris, pedunculis axillaribus folio brevioribus. *Ad Orinoc.* (Herpeſtes callitrichoides Kunth.)

glabra R. Br. 8. M. caule erecto foliisque linearibus ſubintegerrimis glabris, pedunculis axillaribus calyces ſubaequantibus. *Nov. Holl.*

pubeſcens R. Br. 9. M. caule erecto foliisque lineari-lanceolatis dentatis pubeſcentibus, pedunculis axillaribus calyce brevioribus. *Nov. Holl.*

2177. MAZUS Lour.

rugoſus Lour. 1. M. foliis radicalibus ovatis ſerratis rugoſis, racemo laxo terminali caulem oligophyllum ſuperante, calycibus pubeſcentibus. *Cochinchina. China. Japan.* (Lindernia japonica Thunb.)

pumilio R. Br. 2. M. foliis radicalibus calycibusque glabris, ſcapo pauciflore. *Terra Diemen.*

2178. OURISIA Commerſ.

magellanica Perſ. 1. Ou. foliis radicalibus oblongis ſerratis longe petiolatis, caulinis amplexicaulibus, pedunculis axillaribus elongatis, calycis laciniis inaequalibus ciliatis. *Ad fretum Magellan. Chili.* (Chelone ruellioides Forſt.)

integrifolia R. Br. 2. Ou. foliis radicalibus ſubovatis integerrimis, pedunculo terminali ſubſolitario, calycis laciniis aequalibus. *Terra Diemen.*

2179. DICHROMA Cav.

coccineum Cav. *Inſ. Chiloe.* Herba villoſa, foliis radicalibus longe petiolatis cordatis crenatis ſubtus violaceis, caule

subpaniculato oligophyllo, floribus coccineis. (Ourisia coccinea Pers. Poir.)

2180. LOXONIA Jack.

discolor Jack. 1. L. foliis biformibus supra glabris subtus discoloribus scabris, reniformibus minutis et semicordatis subserratis, floribus racemosis. *Sumatra.*

hirsuta Jack. 2. L. foliis subbiformibus hirsutis, semicordatis semiovatisque subserratis, pedunculis subracemosis nutantibus secundis. *Sumatra.*

2181. CENTRANTHERA R. Br.

hispida R. Br. *Nov. Holl.* Herba erecta hispida, foliis lineari-lanceolatis integerrimis, floribus spicatis bracteatis purpurascentibus.

2182. BÜCHNERA.

* *Corollae limbo subaequali.*

cernua 1. B. fruticosa, foliis subternis oppositisque obovatis 5dentatis glabris, racemis spicatis terminalibus cernuis. *C. B. S.*

cuneifolia Thb. 2. B. fruticosa, foliis cuneatis glabris apice dentatis, racemis axillaribus simplicibus. *C. B. S.* (Phryma dehiscens L. suppl.)

americana 3. B. caule simplici, foliis lanceolatis subdentatis 3nerviis asperis, floribus remote spicatis. *Amer. boreal.*

urticaefolia R. Br. 4. B. scabra, foliis infimis confertis oblongis obtusis, reliquis lanceolatis dentatis, bracteis ciliatis calyce dimidio brevioribus. *Nov. Holl.*

tetragona R. Br. 5. B. caule glabro 4gono, foliis oblongo-lanceolatis paucidentatis, spicis 4gonis, bracteis late ovatis ciliatis calyce longioribus. *Nov. Holl.*

gracilis R. Br. 6. B. glabriuscula, foliis oblongis obtusis integerrimis, caule simplici, floribus remote spicatis, bracteis ciliatis calyce dimidio brevioribus, capsulis exsertis. *Nov. Holl.*

asperata R. Br. 7. B. scaberrima, foliis inferioribus oblongo-lanceolatis paucidentatis, superioribus lineari-lanceolatis integerrimis, bracteis ovato-lanceolatis calyce duplo brevioribus, capsulis inclusis. *Nov. Holl.*

† *cordifolia* 8. B. caule 4gono, foliis cordatis 3nerviis serratis, racemis terminalibus subspicatis. *Ind. or.*

grandiflora 9. B. caule glabro simplicissimo, foliis oblongis integerrimis 5nerviis scabris, pedunculis axillaribus 1floris, bracteis lineari-subulatis, calyce infundibuliformi. *Amer. austr.*

rosea Humb. 10. B. caule simplici hispido, foliis lanceolatis obtusiusculis subdentatis scabris, spicis aggregatis, bracteis linearibus calyce triplo brevioribus. *Caracas.*

macrocarpa Humb. 11. B. caule ſimplici teretiusculo hiſpido, foliis lanceolatis utrinque attenuatis 3nerviis ſubdentatis, ſpica ſimplici, bracteis linearibus calyce triplo brevioribus, capſula exſerta. *Nov. Granat.*

elongata Sw. 12. B. caule ſimplici ſcabro, foliis inferioribus oblongo-lanceolatis integerrimis 3nerviis, ſuperioribus oppoſitis linearibus, floribus remote ſpicatis, bracteis minutis. *Ind. occ.*

paluſtris * 13. B. caule ſimpliciſſimo, foliis omnibus alternis linearibus ſerrulatis, floribus paucis remote ſpicatis, bracteis minutis. *Guiana.* (Peripea paluſtris Aubl.)

diſticha Humb. 14. B. caule ramoſo 4gono hiſpidiusculo, foliis ſuboppoſitis linearibus integerrimis, floribus diſtiche ſpicatis, bracteis calyce brevioribus. *Nov. Granat.*

longifolia Humb. 15. B. caule ramoſo tereti ſcabriusculo, foliis linearibus elongatis integerrimis trinerviis calloſo-aſperis, inferioribus oppoſitis ſuperioribus ſparſis, ſpica terminali, bracteis calyce brevioribus. *Nov. Granat.*

lithoſpermifolia Humb. 16. B. caule ſimplici teretiusculo hiſpidulo, foliis linearibus ſubintegerrimis 3nerviis, ſpica ſolitaria, bracteis calyce brevioribus. *Amer. auſtr.*

ternifolia Humb. 17. B. caule ſimplici 3gono hiſpido, foliis inferioribus ternis lanceolato-linearibus apice ſubſerratis 3nerviis, ſpica ſolitaria, bracteis calyce brevioribus. *Amer. auſtr.*

virgata Humb. 18. B. caule ramoſo hiſpidiusculo, ramis virgatis 4gonis, foliis oppoſitis lanceolato-linearibus integerrimis 3nerviis, ſpicis paniculatis, bracteis minutis. *Nov. Granat.*

linearis R. Br. 19. B. caule ſcabro, foliis linearibus obtuſis integerrimis, floribus paucis remote ſpicatis, bracteis linearibus calyce piloſo brevioribus. *Nov. Holl.*

tenella R. Br. 20. B. caule ſcabro, foliis lineari-lanceolatis acutis integerrimis, floribus paucis remote ſpicatis, bracteis lanceolatis calyce brevioribus. *Nov. Holl.*

ramoſiſſima R. Br. 21. B. caule ſcabro ramoſiſſimo, foliis lineari-lanceolatis integerrimis, bracteis lanceolatis calyce brevioribus. *Nov. Holl.*

pinnatifida Thunb. 22. B. caule ſuffruticoſo ramoſo, ramis pubeſcentibus, foliis pinnatifido-palmatis petiolatis glabris, racemo laxo terminali. *C. B. S.*

** *Corolla ſubbilabiata.*

pedunculata Andr. 23. B. caule ſuffruticoſo, foliis obovatis inciſo-dentatis, pedunculis 1floris ſolitariis elongatis, laciniis limbi truncatis. *C. B. S.*

geſnerioides W. 24. B. caule ramoſo tetragono, foliis minutiſſimis ſquamaeformibus oblongis appreſſis ciliatis, floribus ſpicatis bracteatis. *Ind. or.*

humifuſa Vahl. 25. B. caule proſtrato ramoſo hiſpidulo, foliis minutis obovatis ſquamoſo-aſperis, pedunculis

axillaribus 1floris abbreviatis. *Arabia.* (Browallia humifusa Forsk.)

hermonthica Delil. 26. B. caule erecto herbaceo sub-4gono aspero, foliis lanceolato-linearibus calloso-hispidis, spicis terminalibus aggregatis, bracteis calyces subaequantibus. *Aegypt. super. Nubia.*

curviflora R. Br. 27. B. scaberrima, foliis elongato-linearibus integerrimis patentibus, calyce 5striato. *Nov. Holl.*

asiatica 28. B. scaberrima, foliis linearibus integerrimis squamosis, calycibus axillaribus solitariis 15striatis. *Ceylon. China.*

euphrasioides Vahl. 29. B. caule 4quetro ramoso, foliis linearibus abbreviatis integerrimis hispidiusculis, calycibus axillaribus sessilibus folia aequantibus, corollae pilosae laciniis linearibus. *Ind. or.*

parviflora R. Br. 30. B. scaberrima, foliis linearibus strictis integerrimis, calycibus 5striatis, lab. cor. sup. integro. *Nov. Holl.*

bilabiata Thb. 31. B. caule simplici villoso, foliis lineari-lanceolatis papilloso-asperis, floribus spicatis cernuis, calycibus hispidiusculis. *C. B. S.*

pusilla Humb. 32. B. caule simplici teretiusculo foliisque integerrimis hispidis, inferioribus obovato-oblongis, superioribus linearibus, spica solitaria, calycibus 10striatis. *Nov. Granat.*

2183. GERARDIA.

* *Floribus rubris.*

† *Foliis latioribus.*

brasiliensis * 1. G. fruticosa ramosa, foliis alternis oblongis petiolatis integerrimis subcoriaceis supra nitidis subtus ramisque fulvo-tomentosis, pedunculis axillaribus solitariis folio brevioribus. *Brasil.* Sello.

fruticosa Pursh. 2. G. fruticosa ramosa, foliis lanceolatis subpetiolatis serratis utrinque glabris, floribus racemosis terminalibus. *Ad montes scopulosos Amer. bor.*

cuneifolia Pursh. 3. G. suffruticosa ramosa, foliis spathulatis inaequaliter serratis superioribus alternis, pedunculis axillaribus folio longioribus. *Georgia.*

sessiliflora Vahl. 4. G. caule simplici hispidiusculo, foliis oppositis sessilibus cordatis obtusis basi dentatis 5nerviis, floribus axillaribus sessilibus oppositis. *C. B. S.*

glutinosa 5. G. caule teretiusculo foliisque oppositis petiolatis ovatis profunde serratis villoso-viscosis, floribus axillaribus breviſſime pedunculatis oppositis, calycibus bracteatis piloso-glutinosis. *China.*

japonica Thb. 6. G. caule simplici foliisque petiolatis ovatis incisо-pinnatifidis villosis, floribus axillaribus breviter pedunculatis oppositis. *Japon.*

tubulosa Thb. 7. G. caule herbaceo ramoso, foliis ellipticis integerrimis glabris, floribus axillaribus pedunculatis, tubo corollae calycem superante. *C. B. S.*

Nigrina Thb. 8. G. caule herbaceo 4gono aſpero, foliis oppoſitis ſeſſilibus lanceolatis profunde ſerratis calloſo-aſperis, floribus axillaribus pedunculatis, tubo corollae calycem ſubaequante. *C. B. S.* (Melaſma ſcabrum Berg.)

†† *Foliis anguſtis.*

ſcabra Thb. 9. G. caule herbaceo foliisque pinnatifidis hiſpidiuſculis, floribus racemoſis ſubſecundis. *C. B. S.*

delphinifolia 10. G. caule herbaceo ramoſo glabro, foliis lineari-filiformibus 3partito-pinnatifidis, pedunculis axillaribus 1floris, calycibus 5fidis. *Ind. or.*

domingenſis * 11. G. caule herbaceo tereti ramoſo, foliis linearibus confertis ſubfaſciculatis glabris, floribus racemoſis, calycibus abbreviatis 5dentatis. *Hiſpaniola.* Bertero.

purpurea 12. G. caule herbaceo 4gono ramoſo glabro, foliis linearibus remotis ſcabris, calycibus axillaribus breviſſime pedunculatis 5fidis. *Amer. bor.*

tenuifolia Vahl. 13. G. caule ſimpliciſſimo 4gono, foliis linearibus margine ſcabris, pedunculis oppoſitis folia ſuperantibus, calycibus 5dentatis capſula globoſa brevioribus. *Amer. bor.*

maritima Rafin. 14. G. caule 4gono ramoſo, foliis linearibus carnoſis obtuſiuſculis nitidis, ramis aphyllis pauciflo-ris, calycibus breviter pedunculatis crenulatis. *Ad oram maritimam. Nov. Caeſar.* (G. crinita Eddy.)

linifolia Nutt. 15. G. caule tereti ramoſo, ramis virgatis pauciflo-ris, foliis linearibus ſubcarnoſis acutis, calycibus truncatis, limbo corollae ciliato. *Caro-lina.*

filifolia Nutt. 16. G. caule tereti ramoſo, foliis filiformibus ſubfaſciculatis, pedunculis alternis folia ſuperantibus, calycibus acute dentatis. *Florida.*

ſetacea Nutt. 17. G. caule tereti ramoſo glaberrimo, ramis capillari-filiformibus elongatis 1floris, foliis ſetaceis, calycibus obſolete dentatis capſula ovata brevio-ribus. *Carolina.* (G. erecta Walt.)

aphylla Nutt. 18. G. caule erecto aphyllo, ramis virgatis 4anguliis, ſquamis minutis ovatis deciduis, floribus oppoſitis pedunculatis. *Carolina.*

** *Floribus flavis.*

flava 19. G. caule ſubſimplici pubeſcente, foliis oblongo-lanceolatis ſubſeſſilibus ſubintegerrimis, inferioribus baſi inciſo-pinnatifidis, ſpicis axillaribus oppoſitis abbreviatis. *Amer. bor.*

glauca Eddy. 20. G. caule ſimplici glaberrimo glauco-pruinoſo, foliis lanceolatis inciſo-pinnatifidis dentatis, pedunculis oppoſitis ſubracemoſis, laciniis calycis capſulaque roſtrata elongatis. *Amer. bor.*

quercifolia Pursh. 21. G. caule ramoſo glabro glauco, foliis inferioribus profunde pinnatifidis, laciniis oblongis ſubdentatis ſinuatis, ſuperioribus lanceolatis ſerra-

tis, floribus axillaribus oppositis breviter pedunculatis, laciniis calycis acutis. *Amer. bor.* (Rhinanthus virginicus L.)

Pedicularia 22. G. caule ramoso, foliis pinnatifidis, laciniis lanceolatis inciso-serratis, pedunculis axillaribus oppositis folia subaequantibus glanduloso-pilosis, laciniis calycis foliaceis crenatis. *Amer. borcal.*

virgata Humb. 23. G. caule ramoso, foliis pinnatifidis scabris, laciniis spathulato-linearibus acutiusculis, inferioribus inciso-serratis, pedunculis axillaribus spicatis calycibusque hirsutis. *Mexico.*

prostrata Humb. 24. G. caule prostrato foliisque pinnatifidis glabriusculis, laciniis linearibus, inferioribus inciso-serratis, floribus axillaribus sessilibus, laciniis calycis inciso-pinnatifidis. *Nov. Hispan.*

digitata * 25. G. caule erecto, ramis virgatis villosis, foliis digitatis linearibus acutis glabris, pedunculis solitariis axillaribus unifloris, calycibus glabris. *Brasil.* Sello.

serpyllifolia Humb. 26. G. caule procumbente, foliis ovatis obtusis petiolatis integerrimis glabris, floribus axillaribus sessilibus, calycibus glabris. *Nov. Hispan.*

2184. SCHWALBEA.

americana *Amer. bor.* Herba erecta simplex pubescens, foliis ovato-oblongis acutis integerrimis, floribus racemosis terminalibus atropurpureis.

2185. ESCOBEDIA R. et P.

scabrifolia R. et P. *Nov. Granat. Peru.* Herba erecta, foliis sessilibus cordato-oblongis nervosis remote denticulatis scabris, pedunculis axillaribus 1floris, floribus amplis albis (?).

2186. BROWALLIA.

elongata Kunth. 1. Br. caule erecto ramoso, foliis ovato-oblongis acutis, pedunculis axillaribus 1floris, ramulis calycibusque villosis. *Amer. austr.* (Br. elata et lactea Hortul.)

Linnaeana * 2. Br. caule erecto ramoso, foliis oblongis utrinque attenuatis, pedunculis axillaribus sub-1floris ramulisque pubescentibus, calycibus glabris. *Amer. austr.* (Br. elata et demissa L.)

viscosa Humb. 3. Br. caule diffuso ramoso, foliis subrotundo-ovatis obtusis, pedunculis axillaribus unifloris ramulis calycibusque villoso-viscosis. *Nov. Granat.*

2187. HEMIMERIS.

urticaefolia W. 1. H. caule fruticoso ramoso, foliis ovatis petiolatis inciso-serratis, inferioribus oppositis superioribus alternis, pedunculis elongatis subracemosis. *Amer. austr.* (Celsia urticaefolia Curt. Alonsoa incisifolia R. et P.)

parviflora Kunth. 2. H. caule herbaceo sub-4alato, foliis oppositis petiolatis ovatis acutis serratis glaberrimis, pedunculis solitariis axillaribus 1floris. *Caracas. Peru.* (Alonsoa caulialata R. et P.)

Muitisii Bonpl. 3. H. caule herbaceo sub-4alato, foliis oppositis petiolatis oblongis utrinque attenuatis serratis glabris, pedunculis axillaribus solitariis 1floris. *Nov. Granat. Peru.* (Alonsoa acutifolia R. et P. Scrofularia meridionalis Mut. L.)

hirsuta * 4. H. caule herbaceo 4alato, foliis ovatis dentatis in petiolum decurrentibus pilosis (pilis articulatis), pedunculis unifloris axillaribus solitariis calycibusque subinaequalibus hirsutis. *Brasil.* Sello.

procumbens Pers. 5. H. caule procumbente, foliis ovatis serratis. *Peru.* (Alonsoa procumbens R. et P.)

linarifolia Humb. 6. H. caule fruticoso ramosissimo, foliis linearibus acutis subintegerrimis trassiusculis, pedunculis racemosis bracteatis. *Peru.*

coccinea W. 7. H. caule suffruticoso, foliis fasciculatis linearibus remote denticulatis membranaceis, pedunculis racemosis bracteatis. *Amer. austr.* (Celsia linearis Jacq.)

2188. CELSIA.

orientalis 1. C. foliis 2pinnatis glabris, laciniis lanceolatis dentatis. *Graecia. Asia minor.*

Arcturus 2. C. foliis radicalibus lyrato-pinnatis, superioribus oblongis, pedunculis bracteas longe excedentibus, laciniis calycis integerrimis. *Creta. Asia minor. Ind. orient.* (C. coromandelina Vahl. heterophylla Pers.)

cretica 3. C. foliis radicalibus lyrato-pinnatis, superioribus oblongis, pedunculis bracteas subaequantibus, laciniis calycis ovatis serratis. *Creta. Afr. boreal.*

viscosa Roth. 4. C. viscoso-pubescens, foliis radicalibus petiolatis oblongis basi auriculatis, superioribus cordatis amplexicaulibus, pedunculis bracteas subaequantibus, laciniis calycis oblongis subintegerrimis. *Patria?*

laciniata Poir. 5. C. foliis inferioribus laciniato-pinnatifidis, superioribus sessilibus lanceolatis, pedunculis bracteas subaequantibus, laciniis calycis oblongis acutis integerrimis. *Afric. bor.*

betonicaefolia Desf. 6. C. foliis ovato-oblongis crenatis, pedunculis bracteas lanceolatas superantibus, laciniis calycis ovatis subserratis. *Afric. bor.*

lanata Jacq. 7. C. *suffruticosa* lanato-tomentosa, foliis oblongis obtusis crenatis, pedunculis bracteas superantibus, laciniis calycis ovatis integerrimis. *Patria?*

lanceolata Vent. 8. C. subtomentosa, foliis lanceolatis sinuato-dentatis, pedunculis axillaribus folio brevioribus, laciniis calycis lanceolatis integerrimis. *Ad Euphraten.*

2189. SEYMERIA Pursh.

macrophylla Nutt. 1. S caule elato ramoso, foliis inferioribus subpinnatifidis, superioribus lanceolatis integerrimis, floribus subsessilibus intus lanatis. *Ad fl. Ohio.*

auriculata * 2. S. caule simplici aspero, foliis ovato-lanceolatis integerrimis basi auriculatis, floribus axillaribus sessilibus. *Virginia.* (Gerardia auriculata Mx.)

pectinata Pursh. 3. S. viscido-pubescens ramosissima, foliis pectinato-pinnatifidis, laciniis linearibus acutis, floribus axillaribus subsessilibus. *Amer. bor.*

tenuifolia Purh. 4. S. glabriuscula ramosa, ramis virgatis, foliis pinnatifido-setaceis, laciniis divisis. *Amer. bor.* (Afzelia cassioides J. F. Gmel., Gerardia Afzelia Mx.)

2190. ANGELONIA Humb.

salicarifolia Humb. *Caracas. Hispaniola.* Bertero. Herba foliis confertis lanceolatis apice subserratis, pedunculis racemosis demum incurvis bracteas superantibus, floribus violaceis maculatis.

2191. STEMODIA.

suffruticosa Bonpl. 1. St. caule erecto suffruticoso, foliis ternis ovato-oblongis in petiolum decurrentibus inaequaliter crenatis pubescentibus, pedunculis axillaribus erectis subternis 1floris folia subsuperantibus. *Nov. Granat. Brasil.* (St. 3foliata Reichenb., Columnea 3foliata Link., Col. violacea Jacq. fil.)

ruderalis Retz. 2. St. caule erecto herbaceo, foliis oppositis petiolatis oblongis obtuse dentatis, pedunculis axillaribus oppositis 1floris. *Ind. or.*

camphorata Vahl. 3. St. caule erecto, foliis oppositis petiolatis ovatis inaequaliter serratis, floribus racemosis terminalibus. *Ceylon.*

viscosa Roxb. 4. St. caule erecto villoso-viscoso, foliis subhastato-oblongis denticulatis, pedunculis axillaribus 1floris. *Ind. or.*

verticillaris Link. 5. St. caule erecto glanduloso-piloso, foliis verticillatis amplexicaulibus lanceolatis serratis, pedunculis axillaribus subgeminis folio brevioribus. *Brasil.* (Conobea verticillaris * nov. prov.)

xorullensis Kunth. 6. St. caule erecto piloso, foliis ternis petiolatis ovatis acutis duplicato-serratis, pedunculis axillaribus solitariis elongatis. *Mexico.*

maritima: 7. St. caule erecto hirſuto, foliis oppoſitis ſemi-amplexicaulibus lanceolatis ſerratis, floribus axillaribus ſeſſilibus ſubſolitariis. *Jamaica. Hiſpaniola.*

durantifolia Sw. 8. St. caule erecto ſub-6gono hirſuto, foliis ternis oppoſitisque amplexicaulibus lanceolatis ſerrulatis, floribus ſubaggregatis axillaribus ſubſeſſilibus. *Jamaica. Hiſpaniola.* (Capraria durantifolia L.)

glabra * 9. St. caule aſcendente angulato glabro, foliis oppoſitis amplexicaulibus lanceolatis remote dentatis ſcabris, floribus axillaribus oppoſitis ſeſſilibus. *Monte Video.* Sello.

paluſtris Hilar. 10. St. foliis ſeſſilibus oblongo-linearibus acutis obſolete dentatis, ſuperioribus anguſtiſſimis, floribus racemoſis, calycibus pubeſcentibus. *Braſil.*

gratiolaefolia Hilar. 11. St. foliis ſeſſilibus linearibus acutis ſubintegerrimis glabris, paniculis axillaribus, floribus ſubſeſſilibus, calycibus glabriusculis. *Braſil.*

arenaria Humb. 12. St. caule diffuſe ramoſo villoſo, foliis oppoſitis petiolatis ovatis ſubduplicato-ſerrulatis, pedunculis ſubaggregatis axillaribus petiolo brevioribus. *Ad fl. Magdalen. Hiſpaniola. Braſil.* (St. parviflora R. Br., Conobea pumila * nov. prov.)

multifida * 13. S. caule diffuſe ramoſo piloſiusculo, foliis 3partito-pinnatifidis, laciniis linearibus obtuſiusculis ſubdentatis, pedunculis axillaribus oppoſitis laciniisque calycis capillaribus. *Ad fl. Miſſuri.* (Capraria multifida Mx.)

2192. RUSSELIA.

ſarmentoſa Jacq. 1. R. caule ſcandente ramisque 4angulis glabris, foliis oppoſitis breviſſime petiolatis ovatis acutis ſerratis ſupra piloſiusculis, pedunculis axillaribus 3–5floris. *Cuba. Panama.*

floribunda Humb. 2. R. caule ramisque 4angulis glabris, foliis breviſſime petiolatis ſubcordato-ovatis crenato-ſerratis glabriusculis, corymbis axillaribus ſeſſilibus multifloris. *Mexico.*

rotundifolia Cav. 3. R. caule fruticoſo, ramis ſub-4gonis foliisque ſeſſilibus cordato-ſubrotundis crenatis tomentoſis, racemis axillaribus 2fidis ſecundis. *Nov. Hiſpan.*

multiflora Sims. 4. R. caule ſubſcandente, ramis 4angularis, foliis petiolatis ovato-oblongis crenatis, racemo terminali verticillato, pedunculis cymoſis. *Mexico.*

ternifolia Kunth. 5. R. ramis hexagonis foliisque ternis petiolatis obovatis crenatis incano-hirſutis, corymbis axillaribus pedunculatis multifloris. *Mexico.*

verticillata Kunth. 6. R. caule lignoſo, ramis verticillatis decagonis glaberrimis, foliis verticillatis obovatis crenatis pubeſcentibus, corymbis verticillatis. *Nov. Hiſpan.*

2193. ACHIMENES Vahl.

ſeſamoides Vahl. 1. A. foliis oppoſitis ſeſſilibus elongatis ſubſerratis laevibus, floribus racemoſis terminalibus, pedicellis oppoſitis. *Ind. or.* (Seſamum javanicum Burm. Columnea longifolia L., Diceros longifolius Perſ.)

cochinchinenſis * 2. A. caule villoſo, foliis ternis ovato-lanceolatis ſerratis carnoſis glabris, floribus axillaribus pedunculatis ſolitariis. *Cochinchina.* (Diceros Lour. Columnea Poir.)

2194. RAZUMOVIA *.

tranquebarica * *Coromandel.* Herba puſilla pubeſcens, foliis ſpathulato-linearibus, floribus axillaribus ſeſſilibus rubris.

2195. TREVIRANIA W.

coccinea W. *Jamaica.* Herba villoſa, radice ſquamoſo-tuberoſa, foliis ternis petiolatis oblongis ſerratis, pedunculis axillaribus ternis, floribus coccineis. (Büchnera coccinea Scop., Columnea erecta Lam., Gesneria pulchella Sw., Cyrilla pulchella Herit., Achimenes coccinea Perſ.)

2196. CHELONE.

**Filamento quinto glabro.*

glabra 1. Ch. foliis oblongo-lanceolatis ſerrulatis utrinque glabris, floribus terminalibus denſe ſpicatis. *Amer. bor.* (Ch. obliqua L. var. fl. purpur.)

Lyoni Purſh. 2. Ch. foliis cordato-acuminatis ſerratis ſubtus tomentoſis, ſpicis axillaribus terminalibusque aggregatis. *Carolina.* (Ch. major Ker.)

gentianoides Humb. 3. Ch. foliis lanceolatis longe acuminatis ſeſſilibus integerrimis, pedunculis axillaribus pauciſloris, calycibus acutis, corollis imberbibus. *Mexico.*

imberbis Humb. 4. Ch. caule ſimplici pubeſcente, foliis linearibus obtuſiusculis integerrimis glabris, paniculae terminalis ramis 2floris, calycibus acutis, corollis imberbibus. *Nov. Hiſpan.*

barbata Cav. 5. Ch. caule tereti glabro ramoſo, foliis glaucis glaberrimis, inferioribus ſpathulato-ſuperioribus lineari-lanceolatis, paniculae terminalis ramis nutantibus, calycibus acutis, corollis barbatis. *Mexico.* (Ch. formoſa Wendl., ruellioides Andr.)

***Filamento quinto piloſo.* (Pentſtemon Mitch. Ait.)

fruteſcens * 6. Ch. caule fruticoſo ramoſo, foliis oblongis ſeſſilibus ſubdenticulatis, floribus ſubracemoſis terminalibus, calycibus acuminatis. *Camtſchatca. Inſ. Aleut.* (Pentſtemon fruteſcens Lamb.)

elegans Humb. 7. Ch. caule fruticoſo ramoſo, foliis ovato-lanceolatis amplexicaulibus argute ſerrulatis, pedunculis axillaribus 2floris, calycibus corollisque pubeſcentibus. *Cuba. Nov. Hiſpan.*

campanulata Cav. 8. Ch. caule herbaceo foliisque lineari-lanceolatis acuminatis ſerrulatis ſeſſilibus, pedunculis 2floris racemoſis, calycibus corollisque glabris. *Mexico.* (Chelone campanuloides Andr. Pentſtemon campanulata W. — Ch. anguſtifolia Kunth, var.)

*laevigata** 9. Ch. foliis glaberrimis, inferioribus petiolatis ovato-lanceolatis integerrimis ſuperioribus amplexicaulibus lanceolatis tenuiſſime denticulatis, pedunculis terminalibus corymboſis pubeſcentibus. *Amer. bor.* (Pentſtemon laevigata Ait.)

*erianthera** 10. Ch. foliis amplexicaulibus ovato-oblongis integerrimis ſubundulatis glaberrimis, pedunculis trifloris ſubracemoſis, antheris hirſutis. *Louiſiana ſuper.* (Pentſtemon glabra Pursh. Sims., erianthera Fraſ. Nutt.)

hirſuta 11. Ch. foliis lanceolatis denticulatis cauleque hirſutiusculis, panicula terminali, calycibus glanduloſo-piloſiusculis. *Amer. bor.* (Pentſtemon hirſuta W. — Ch. Pentſtemon L., Pentſt. pubeſcens Ait. var.)

*criſtata** 12. Ch. caule humili pubeſcente, foliis lanceolatis denticulatis, pedunculis axillaribus terminalibusque paucifloris abbreviatis, calycibus hirſutis, fauce corollae filamentoque ſterili criſtato-barbatis. *Ad fl. Miſſuri.* (Pentſtemon criſtatum Fraſ., erianthera Pursh.)

*coerulea** 13. Ch. foliis lineari-lanceolatis ſeſſilibus integerrimis ciliatis cauleque glabris glaucis, pedunculis multifloris. *Ad fl. Miſſuri.* (Pentſtemon anguſtifolia Fraſ. Pursh., coeruleum Nutt.)

*grandiflora** 14. Ch. caule elato foliisque amplexicaulibus oblongo-ſubrotundis integerrimis glaucis glaberrimis, floribus axillaribus amplis. *Ad fl. Miſſuri.* (Pentſtemon grandiflorum Fraſ. Nutt., Bradburii Pursh.)

*albida** 15. Ch. caule humili, foliis ſeſſilibus ovato-lanceolatis ſerrulatis glabris, floribus axillaribus faſciculatis, calycibus pubeſcentibus. *Ad fl. Miſſuri.* (Pentſtemon teretiflorum Fraſ., albidum Nutt.)

*gracilis** 16. Ch. foliis ſeſſilibus linearibus argute ſerrulatis cauleque glabris, panicula pauciflora. *Amer. bor.* (Pentſtemon gracile Nutt.)

2197. CAPRARIA.

* *Fruticoſae.*

undulata L. ſuppl. 1. C. foliis oppoſitis ovato-oblongis integerrimis undulatis, ſummis ſubcordatis verticillatis, racemis ſpicaeformibus ſecundis. *C. B. S.*

cuneata R. Br. 2. C. foliis alternis rhombeo-cuneiformibus inciſo-ſerratis piloſis, floribus geminis, laciniis calycis linearibus. *Amer. auſtr.* (C. hirſuta Kunth.)

biflora 3. C. ramis pilosis, foliis alternis argute serratis basi integerrimis attenuatis sessilibus glabriusculis, pedunculis geminis axillaribus, laciniis calycis subulatis. *Ind. occ. Amer. austr.* (Xuaresia biflora R. et P. syst. I. 622. solo staminum numero differt.)

lanceolata L. suppl. 4. C. ramis 4gonis, foliis oppositis lineari-lanceolatis rigidiusculis glabris, racemis terminalibus compositis, floribus subcapitatis. *C. B. S.*

** *Herbaceae.*

semiserrata Vahl. 5. C. caule piloso, foliis alternis lanceolatis cuspidatis basi attenuatis subintegerrimis ciliatis, pedunculis axillaribus capillaribus sub-1floris. *Ad fl. Magdalen.*

disjecta Delil. 6. C. caule ramoso viscido-villosiusculo, foliis pinnatifidis basi attenuatis, laciniis obtusiusculis dentatis, pedunculis axillaribus superne racemosis. *Ad Nilum Aegypt.*

2198. LEUCOPHYLLUM Humb.

ambiguum Humb. *Mexico.* Frutex ramosissimus, foliis alternis petiolatis obovato-oblongis integerrimis ramulisque densissime tomentosis, floribus axillaribus violaceis.

2199. MAURANDIA Jacqu.

semperflorens Jacqu. 1. M. foliis deltoideo-hastatis, lobis corollae emarginatis. *Mexico.* (Usteria scandens Cav. Andr.)

antirrhiniflora Humb. 2. M. foliis deltoideo-sagittatis, lobis corollae integerrimis. *Mexico.*

2200. SESAMUM.

orientale 1. S. foliis oblongis utrinque attenuatis integerrimis longe petiolatis caulequè piloslusculis, floribus axillaribus solitariis. *Ind. or.*

luteum Retz. 2. S. foliis lanceolatis integerrimis longe petiolatis caulequè piloslusculis, floribus axillaribus solitariis hispidis. *Ind. or.*

prostratum Retz. 3. S. foliis orbiculatis crenatis supra hispidis subtus niveo-tomentosis, floribus solitariis pedunculatis, caule diffuso. *Ind. or.*

indicum 4. S. foliis inferioribus 3lobis dentatisque superioribus oblongis, floribus axillaribus alternis. *Ind. or.*

laciniatum W. 5. S. foliis omnibus 3partitis laciniatis scabris, caule prostrato hispido, floribus axillaribus solitariis. *Ind. or.*

2201. DODARTIA.

orientalis 1. D. caule fruticoſo ramoſo, foliis linearibus ſeſſilibus ſubdentatis glabris, floribus racemoſo-ſpicatis. *Aſia minor. Caucaſ. Sibir. auſtr.*

indica 2. D. caule ſubſimplici foliisque ovatis ſerratis villoſis, floribus racemoſis. *Ind. or.*

2202. CYMBARIA.

davurica 1. C. foliis lanceolatis, calycibus 10dentatis, labio cor. ſup. 2partito reflexo. *Davuria.*

boryſthenica Pall. 2. C. foliis linearibus, calycibus 5fidis, labio cor. ſup. integerrimo recto. *Inter Boryſthenem et Hypanim. Provinc. Cherſon.*

2203. CALYTRIPLEX R. et P.

†*obovata* R. et P. *Peru.*

2204. SIBTHORPIA.

europaea 1. S. foliis cordato-reniformibus lobato-crenatis peltatis, floribus didynamis. *Anglia. Luſitania.*

retuſa Kunth. 2. S. foliis cordato-reniformibus lobatis, lobis retuſis, floribus 5andris. *Nov. Hiſpan.*

pichinchenſis Kunth. 3. S. foliis cordatis ſub-7lobis, floribus 5andris. *In monte Pichincha.* [Genus olim cum Disandra n. 1393. jungendum.]

2205. OROBANCHE.

** Labio cor. ſuper. integro.*

† Labio infer. bipartito.

americana 1. O. floribus imbricato-ſpicatis, bracteis tubum corollae aequantibus, calycibus 1phyllis integris, corollae incurvae labio inf. erecto. *Carolina.*

†† Labio infer. trifido: calycibus 4partitis ſub-2ſepalis.

major 2. O. floribus laxe ſpicatis inflato-ventricoſis, bracteis ſimplicibus calyces ſubſuperantibus, lobis lab. infer. ſubaequalibus acutiusculis, ſtaminibus glabriusculis. *Anglia. Europ. auſtr.* (O. barbata Brot.)

Pruinoſa Lapeyr. 3. O. glanduloſo-villoſa, floribus laxe ſpicatis, bracteis ſetaceis tubo corollae brevioribus, lobis lab. inf. ſubaequalibus rotundatis denticulatis, ſtaminibus glabris. *Ager ruſcinonenſis Galliae auſtr.*

cruenta Bertol. 4. O. pubeſcens, floribus laxe ſpicatis, bracteis flore brevioribus, labio cor. ſuper. emarginato, lobis inf. obtuſiſſimis crenulato-criſpis, ſtaminibus ger-

mine ſtyloque undique piloſis, ſtigmate luteo. *Italia.* (O. caryophyllacea Viv.)

caryophyllacea Sm. 5. O. pubeſcens, floribus laxe ſpicatis, bracteis flore brevioribus, labio cor. ſup. emarginato, lobis inf. obtuſis fimbriato-criſpis, ſtaminibus baſi piloſis, germine glabro, ſtigmate fuſco. *Europ. med.* (O. major Poll., vulgaris Lam. Cand., rubens Wallr.)

rigens Loiſ. 6. O. glaberrima, floribus laxe ſpicatis, bracteis pubeſcentibus rigidis calyces aequantibus, lobis lab. inf. ſubaequalibus acutiusculis, ſtylis ſtaminibusque glaberrimis. *Corſica.*

elatior Sutt. 7. O. pubeſcens, floribus confertim ſpicatis numeroſis, bracteis corollam ſubaequantibus flaccidis reflexis, limbo corollae undique crenulato, labio ſuper. emarginato, inferioris lobis ſubaequalibus, ſtaminibus baſi pubeſcentibus, ſtylo glabro, ſtigmate luteo. *Europ. med.*

crinita Viv. 8. O. pubeſcens, ſpica compacta cylindrica elongata apice bracteis comoſa, bracteis florem ſuperantibus, corolla cylindrica incurva, ſtaminibus germineque glaberrimis. *Corſica.*

coeruleſcens Steph. 9. O. pubeſcens, floribus denſe ſpicatis, bracteis flores aequantibus calycibusque albo-villoſis, ſtaminibus ſtyloque glabris. *Sibir. Caucaſ. Podolia.*

ſparſiflora Wallr. 10. O. pubeſcens, floribus remote ſpicatis, bracteis flores ſubaequantibus, corollae hirſutae lab. ſup. ſubemarginato, lobo medio lab. inf. obovato majori, ſtaminibus ciliatis. *German. med.*

minor Sm. 11. O. pubeſcens, ſquamis remotis, ſpica pauciflora, floribus tubuloſis, labio cor. ſup. integerrimo, infer. obtuſe lobato undulato, lobo medio majori 3lobo, ſtaminibus baſi ciliatis, ſtylo glabro. *Europ. med.* (O. barbata Lam.)

nudiflora Wallr. 12. O. pubeſcens, ſquamis paucis anguſtis, ſpica pauciflora laxa, bracteis flores tubuloſos ſuperantibus, lobis corollae integerrimis, medio labii inf. majori obovato, ſtaminibus baſi pubeſcentibus, ſtylo glabro. *Dania. Germania.* (O. minor Vahl. Epithymum Cand.?)

gracilis Sm. 13. O. corolla inflata, labio inferiori breviſſimo, laciniis obcordatis inaequalibus fimbriato-criſpis, ſtaminibus ſtyloque piloſis exſertis. *Liguria.*

**** *Labio cor. ſuper. bilobo.***

† *Calyce ſimpliciter 2partito aut 2ſepalo.*

rubra Sm. 14. O. ſcapo ſuperne glanduloſo-pubeſcente viſcido, floribus laxe ſpicatis tubuloſis, bracteis ſolitariis flore brevioribus, lobis cor. integerrimis, lab. inf. minori, ſtaminibus baſi ſtyloque apice ciliatis. *Hibernia bor.*

ſpecioſa Cand. 15. O. ſcapo ſuperne glanduloſo-piloſo, floribus denſe ſpicatis, bracteis ſolitariis, corollae tubuloſae lobis rotundatis crenulatis, medio labii inf. majori, ſtaminibus ſtyloque glabris. *Ad Telonem Galliae provinc.*

16.

alba Steph. W. 16. O. fulvo-villosa, floribus laxe spicatis, bracteis solitariis calycem aequantibus, lobis corollae subaequalibus denticulatis, staminibus basi stylogue apice glanduloso-pilosis. *Caucas.*

acaulis Roxb. 17. O. acaulis, floribus glomeratis, corollis campanulatis laciniato-serratis, antheris internis basi glanduliferis. *Ad Sacchari culmos in horto Calcutt.*

†† *Calyce 4partito, s. 2sepalo, sepalis 2fidis.*

coerulea Vill. 18. O. glabriuscula, floribus laxe spicatis tubulosis cernuis, bracteis acuminatis ternis calycem subaequantibus, labio cor. sup. 2fido sub-2dentato, lobis labii inf. aequalibus planis integerrimis, staminibus glabris. *Europ. med.* (O. laevis Lam., purpurea Jacqu.)

longiflora Trevir. 19. O. pubescens, floribus laxe spicatis, bracteis ternis, media ovata obtusa, corolla calycem triplo superante, labio infer. elongato, staminibus pubescentibus. *Ad Volgam.*

cernua Löfl. 20. O. glabra, bracteis corolla brevioribus, tubo basi ventricoso, lobo medio labii inf. crenulato, lateralibus acutis. *Hispania.*

foetida Poir. 21. O. hirsuta, floribus arcte spicatis campanulatis, bracteis solitariis cuspidatis corollas aequantibus, lobis corollae aequalibus obtusissimis denticulato-fimbriatis, staminibus pubescentibus. *Afric. bor. Sicilia. Gallia austr. Ins. maris aegei.* (O. canescens Presl.? pubescens Urv.)

sanguinea Presl. 22. O. pubescens squamata, floribus densissime spicatis, bracteis solitariis flores subaequantibus, lobis corollae aequalibus obtusis denticulatis, staminibus glaberrimis. *Sicil.*

compacta Viv. 23. O. scapo breviss*imo* squamoso, spica oblonga compacta, bracteis solitariis tubo corollae multo brevioribus, lobis corollae rotundatis undulatis, staminibus glabris. *Ad Syrtim magnam Afric. bor.*

media Desf. 24. O. hirsuta, floribus dense spicatis, bracteis solitariis ovatis calycem aequantibus, lobis corollae subaequalibus rotundatis planis integerrimis. *Afric. bor.*

arenaria M.B. 25. O. glabriuscula, spica pauciflora, bracteis solitariis corolla minoribus calycibusque laevibus, lobis corollae acutiusculis, staminibus glabris. *Podolia. Bessarabia. Tauria. Caucas.*

ramosa 26. O. scapo ramoso, floribus remote spicatis alternis, bracteis solitariis calyces subaequaliter 4fidos aequantibus, corollae tubo basi constricto, limbo aequaliter 5lobo, staminibus glabris inclusis. *Europ.*

purpurea Thunb. 27. O. scapo ramoso villoso, floribus racemosis, pedunculis oppositis, corollis campanulatis. *C. B. S.*

indica * 28. O. scapo ramoso, floribus terminalibus fasciculatis, bracteis ternis, corollae lobis subaequalibus obtusis. *Ind. or.* (Büchnera hydrabadensis Roth.)

††† *Calyce 5fido.*

comoſa Wallr. 29. O. ſquamis bracteisque furfuraceo-hirſutis, ſpica comoſa compacta, bracteis ternis, tubo corollae medio conſtricto, labio cor. ſuper. 2lobo revoluto, lobis inf. oblongis ſubcrenulatis. *Thuringia.*

ludoviciana Nutt. 30. O. pulverulento-pubeſcens, floribus denſe ſpicatis, bracteis binis corolla brevioribus, limbo recurvo ſub-5lobo, ſtaminibus glabris. *Louiſiana.*

ſquamoſa Thunb. 31. O. glabra ſubramoſa, floribus ſpicatis, bracteis ternis calycibusque obtuſis, corolla incurvo-tubuloſa. *Afric. auſtr.*

2206. PHELIPAEA Tourn.

Tournefortii Desf. 1. Ph. ſcapo nudo ſimpliciſſimo 1floro baſi vaginato, lobis corollae aequalibus orbiculatis patentibus. *Armenia.*

foliata Lamb. 2. Ph. ſcapo ſimpliciſſimo 1floro remote ſquamato, corollae cernuae lobis ovalibus. *Tauria. Caucaſ.* (Orobanche coccinea M. B. W.)

*biflora** 3. Ph. ſcapo abbreviato baſi vaginato ſubſquamato 2floro, corollae tubo recurvo, limbi lobis ſubaequalibus venoſis marginatis. *Amer. bor.* (Orobanche 1flora L., 2flora Nutt.)

*faſciculata** 4. Ph. ſcapo abbreviato pulverulento pubeſcente, floribus corymboſis terminalibus, corollae tubuloſae incurvae lobis rotundis. *Louiſiana.* (Orobanche faſciculata Nutt.)

violacea Desf. 5. Ph. ſcapo carnoſo ſquamoſo multifloro, ſpica denſa, bracteis ternis, calycibus obtuſis, corolla tubuloſa. *Afric. bor.* (Orobanche Phelypaea W.)

lutea Desf. 6. Ph. ſcapo carnoſo ſquamoſo multifloro, ſpica denſa, bracteis ternis, calycibus obtuſis, corolla infundibuliformi arcuata. *Luſitan. Afric. bor. Arabia.* (Lathraea Phelypaea L., Orobanche tinctoria Forsk. W., Ph. tinctoria Brot.)

2207. HYOBANCHE.

ſanguinea C. B. S. Scapus craſſus ſquamoſus ſanguineo-villoſus, floribus rubentibus bracteas ſubſuperantibus.

2208. LATHRAEA.

Clandeſtina 1. L. ſcapo ſubterreſtri ramoſo, pedunculis aggregatis terminalibus, floribus erectis. *Gallia. Italia.* (Clandeſtina rectiflora Lam.)

Squamaria 2. L. ſcapo ſimplici ſquamoſo, floribus bracteatis pendulis. *Europ.* (Clandeſtina penduliflora Lam.)

† *Anblatum* 3. L. corollae labiis indiviſis. *Aſia minor.* (Anblatum orientale Tourn. a nemine poſt Tourn. viſum.)

2209. EPIPHEGUS Nutt.

americanus Nutt. — *Amer. bor.* Scapus ramosus squamatus, floribus alternis remotis pedunculatis albidis purpureo-striatis. (Orobanche virginiana L.)

2210. ALECTRA Thunb.

capensis Thunb. — *Afric. austr.* Caulis simplex foliis squamaceis sparsis ovato-oblongis villosis, floribus spicatis luteis purpureo-striatis. (Gerardia orobanchoides Lam.)

2211. AEGINETIA Roxb.

indica Roxb. — *Ind. or.* Planta acaulis aphylla, scapi plures ex eadem radice nudi 1flori, corolla purpurea e spatha flava. (Orobanche Aeginetia L.)

2212. ACANTHUS.

ebracteatus Vahl. — 1. A. caule fruticoso inermi, foliis oblongo-lanceolatis elongatis dentato-spinosis, spica pedunculata terminali pedunculata, bracteis minutis solitariis. *Ind. or. Cochinchina. Nov. Holl.* (Ac. ilicifolius Lour. Dilivaria Juss. Pers.)

ilicifolius — 2. A. caule fruticoso subinermi, foliis oblongis sinuato-dentatis spinosis undulatis, spica foliata, bracteis ternis. *Ind. or. Nov. Holl.* (Dilivaria Juss. Pers.)

*Delilii** — 3. A. caule suffruticoso humili, foliis ovatis acutis subsessilibus dentato-spinosis, spicis 4fariam imbricatis rigidis, bracteis ternis, media foliacea flores superante, lateralibus setaceis, seminibus villosis. *Aegypt.* (Acanthodium spicatum Delil.)

spinosus — 4. A. caule herbaceo, foliis 2pinnatifidis undique spinosis, spica elongata, bracteis foliaceis 3partitis. *Italia.*

carduifolius Thunb. — 5. A. acaulis, foliis radicalibus oblongis sinuatis spinosis villosiusculis, scapo spicigero, floribus imbricatis, bracteis ternis spinosis. *C. B. S.*

mollis — 6. A. caule herbaceo, foliis sinuato-pinnatifidis inermibus nitidis, spica elata, bracteis latis foliaceis spinoso-dentatis. *Italia. Graecia.* (Ac. niger Mill. foliorum dentibus subspinulosis differt.)

2213. BLEPHARIS Juss.

*arborea** — 1. Bl. caule arborescente, foliis sinuato-dentatis supra glaberrimis margine spinosis, spica sessili densa, bracteis villosis. *Arabia.* (Acanthus arboreus Forsk.)

furcata Pers. — 2. Bl. caule fruticoso ramoso, foliis oblongis dentato-spinosis, floribus spicatis secundis, bracteis spina trifida terminatis. *Afric. austr.* (Acanthus furcatus Thunb.)

capenſis Perſ. 3. Bl. caule fruticoſo ramoſo, foliis ſubfaſciculatis obovato-oblongis dentato-ſpinoſis, ſpica capitata, bracteis ſpinoſis. *C. B. S.* (Acanthus capenſis Thunb.)

procumbens Perſ. 4. Bl. caule fruticoſo procumbente, ramis umbellatis, foliis obovatis dentato-ſpinoſis, floribus lateralibus capitatis, bracteis ciliato-ſpinoſis. *Afric. auſtr.* (Acanthus procumbens Thunb., glomeratus Lam.)

† *calaminthaefolia* Perſ. 5. Bl. caule fruticoſo, foliis ovatis integerrimis ſpinoſis, floribus axillaribus. *Patria?*

edulis Perſ. 6. Bl. caule ſuffruticoſo, foliis quaternis lanceolatis dentato-ſpinoſis, ſpicis pedunculatis axillaribus, bracteis foliaceis flores longe ſuperantibus. *Perſia. Arabia.* (Ruellia perſica N. L. Burm., ciliaris L., Acanthus edulis Forsk. W.)

boerhaaviſolia Perſ. 7. Bl. caule herbaceo dichotomo, foliis quaternis inaequalibus oblongis baſi attenuatis inermibus, capitulis pauciflоris axillaribus. *Ind. or.* (Acanthus ciliaris N. L. Burm., maderaſpatenſis L.)

molluginiſolia Perſ. 8. Bl. caule herbaceo repente hiſpido, foliis quaternis linearibus ciliatis, floribus axillaribus ſolitariis. *Ind. or.* (Acanthus repens Vahl.)

ſatureiaefolia Perſ. 9. Bl. caule herbaceo ramoſo, foliis ſubquaternis obovatis inermibus, floribus axillaribus ſolitariis. *Afric. auſtr.* (Acanthus integrifolius Thunb.)

linariaefolia Perſ. 10. Bl. caule herbaceo dichotomo, foliis linearibus elongatis ſubdentatis, floribus axillaribus ſolitariis. *Senegambia.*

2214. RUELLIA.

1. *Floribus axillaribus ſolitariis vel oppoſitis*

† *ſeſſilibus.*

coccinea Vahl. 1. R. caule ramoſo, foliis ovatis dentatis petiolatis. *Ind. occid.* (Barleria coccinea L.)

pallida Vahl. 2. R. caule ramoſo, foliis ovato-oblongis obtuſiusculis undulato-crenatis margine ſcabris, floribus bracteatis. *Arabia.* (R. ſtrepens Forsk.)

ocimoides Cav. 3. R. caule humili ramoſo, foliis ovato-ellipticis obtuſis integerrimis ſubtus glaucis petiolatis, floribus bracteatis. *Mexico.*

ciliata Hornem. 4. R. caule ſuffruticoſo erecto foliisque longe petiolatis ovatis acutis repando-ſubdentatis piloſis, bracteis petiolatis foliaceis. *Ind. or.*

auſtralis Cav. 5. R. caule erectiusculo, foliis oblongo-lanceolatis petiolatis, floribus ebracteatis. *Nov. Holl.*

foetida Humb. 6. R. caule ſuffruticoſo, foliis petiolatis oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis glabris. *Mexico.*

tubiflora Bonpl. 7. R. caule herbaceo erecto, foliis petiolatis oblongis acuminatis glabris, corolla infundibuliformi elongata. *Ad fl. Magdalen.*

quitenſis Kunth. 8. R caule ſuffruticoſo proſtrato foliisque obovato-oblongis obtuſiusculis pubeſcentibus, corolla infundibuliformi, antheris baſi 3dentatis. *Quito.*

geminiflora Kunth. 9. R. caule herbaceo foliisque oblongis acutis integerrimis subtrigosis. *Nov. Granat.*

biflora 10. R. caule herbaceo ascendente foliisque subsessilibus obovato-oblongis villosis, floribus bracteatis, calycibus tubum corollae aequantibus. *Carolina.* (R. oblongifolia Mx.)

aciculata Roth. 11. R. caule erecto villoso, foliis parvis ovalibus rigidiusculis mucronatis ciliatis, bracteis fasciculatis acerosis 4gonis rigidissimis apice 2-3spinosis ramos squarrosos obsidentibus, corolla campanulata. *Ind. or.*

microphylla Cav. 12. R. caule prostrato, foliis parvis oblongis integerrimis petiolatis, floribus ebracteatis, calycibus tubum corollae aequantibus. *Nov. Hispan.*

repens N. L. Burm. 13. R. caule repente, foliis lanceolatis acutiusculis sessilibus, floribus bracteatis. *Java.*

humistrata Mx. 14. R. caule prostrato radicante glabriusculo, foliis obovatis in petiolum attenuatis, capsulis linearibus. *Georgia. Florida.*

depressa Thunb. 15. R. caule suffruticoso prostrato, foliis confertis obovatis mucronatis petiolatis glabris. *Afric. bor.*

spinescens Thunb. 16. R. caule suffruticoso depresso, foliis fasciculatis confertis lanceolatis rigidis spinescentibus squarrosis, floribus sparsis. *Afric. austr.*

pumilio R. Br. 17. R. caule diffuso procumbente, foliis oblongo-linearibus obtusis, bracteis minutis. *Nov. Holl.*

†† *Floribus pedunculatis.*

violacea Aubl. 18. R. caule erecto herbaceo villoso, foliis oblongis utrinque attenuatis subrepandis tomentosis, pedunculis axillaribus alternis 1floris apice bracteatis, corolla infundibuliformi, genitalibus exsertis. *Guiana.*

longiflora Vahl. 19. R. caule erecto fruticoso villoso, foliis petiolatis ovatis obtusis stellato-pubescentibus, pedunculis solitariis abbreviatis bracteatis, corollae tubo gracillimo longissimo. *Arabia.*

pilosa 20. R. caule suffruticoso erecto, foliis ovatis obtusis integerrimis subsessilibus pubescentibus, pedunculis subterminalibus abbreviatis solitariis. *Afric. austr.* (R. ovata Thunb., pubescens Pers.)

barlerioides Roth. 21. R. caule fruticoso glaberrimo, foliis oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis integerrimis petiolatis, pedunculis axillaribus oppositis abbreviatis, bracteis coloratis reticulato-venosis, calycibus villosis. *Ind. or.*

bracteata R. Br. 22. R. caule erecto, foliis oblongo-ellipticis, pedunculis abbreviatis, bracteis foliaceis deciduis. *Nov. Holl.*

† *litoralis* 23. R. caule fruticoso incano, foliis cuneiformibus retusis serratis glabris, pedunculis axillaribus abbreviatis. *Ind. or.* Heyne. Roth.

acaulis R. Br. 24. R. caule pumilo, foliis obovato-oblongis obtusis, pedunculis axillaribus ebracteatis. *Nov. Holl.*

prostrata Poir. 25. R. caule herbaceo prostrato pubescente, foliis petiolatis ovatis crenatis villosis, pedunculis axillaribus abbreviatis. *Ind. or.*

2. *Floribus verticillatis.*

salicifolia Vahl. 26. R. caule erecto simplici, foliis lanceolatis integerrimis, bracteis lineari-lanceolatis, calycibus aristatis. *Ind. or.*

*brasiliensis** 27. R. caule erecto herbaceo foliisque oblongo-lanceolatis venosis integerrimis glabris, verticillis subebracteatis dimidiatis, calycibus aristatis. *Brasil.* Sello.

*verticillata** 28. R. caule erecto herbaceo retrorsum piloso, foliis lanceolatis integerrimis sessilibus hispidiusculis, verticillis ebracteatis, calycibus elongatis hispidis. *Monte Video.* Sello.

barbata Vahl. 29. R. caule erecto herbaceo, foliis lanceolatis integerrimis scabris sessilibus, verticillis paucifloris, bracteis oblongis, calycibus pubescentibus acutis. *Ind. or.*

setigera Pers. 30. R. caule suffruticoso ramoso, foliis obovatis obtusissimis glabris, verticillis bracteatis, calycibus subulato-aristatis scabris. *Afric. austr.* (R. aristata Thunb.)

rubricaulis Cav. 31. R. caule erecto herbaceo, foliis oblongis crenatis petiolatis glabris, verticillis paucifloris, bracteis linearibus subintegerrimis, calycibus subulatis. *Mexico.*

albicaulis Bert. 32. R. caule erecto herbaceo, foliis longe petiolatis ovatis acuminatis integerrimis pilosis, verticillis paucifloris, bracteis ovato-subrotundis, laciniis calycis linearibus pectinato-ciliatis. *Ad fl. Magdalen.*

ciliosa Pursh. 33. R. caule erecto ramoso, foliis subsessilibus ovato-oblongis longe ciliatis, bracteis lanceolatis abbreviatis, calycibus subulatis. *Georgia.*

hybrida Pursh. 34. R. caule erecto ramosissimo, foliis subsessilibus oblongis utrinque attenuatis hirsutis, bracteis abbreviatis, laciniis calycis linearibus. *Georgia.*

ovata Cav. 35. R. caule ascendente herbaceo, foliis oblongis obtusiusculis basi attenuatis, subsessilibus villosis, verticillis paucifloris, laciniis calycis linearibus hirsutis. *Mexico.*

patula Jacqu. 36. R. caule fruticoso erecto ramoso foliisque petiolatis ovato-oblongis obtusissimis integerrimis pubescentibus, verticillis paucifloris, capsulis obovatis calyce majoribus. *Ind. or.*

difformis 37. R caule diffuso hirsuto, foliis linearibus sinuato-dentatis integerrimisque. *Ind. or.*

3. *Pedunculis axillaribus paucifloris.*

formosa Andr. 38. R. caule erecto herbaceo foliisque ovato-oblongis integerrimis petiolatis pilosis, pedunculis elongatis hirsutis, laciniis calycis linearibus, corolla

fubringente, genitalibus exfertis. *Brafil.* (R. elegans Poir.)

ventricofa Humb. 39. R. caule herbaceo erecto foliisque oblongis integerrimis petiolatis pubefcentibus, pedunculis dichotomis elongatis, calycibus bracteatis fubulatis, corolla ventricofa. *Nov. Granat.*

cayennenfis * 40. R. ramis teretibus foliisque lanceolatis acuminatis integerrimis petiolatis glabris, pedunculis elongatis, calycibus villofis, corollae tubo apice inflato. *Cayenn.* (R. ventricofa Poir., longiflora Perf.)

grandiflora Poir. 41. R. ramis 4gonis foliisque petiolatis ovatis obtufis repandis glabris, pedunculis folia fuperantibus dichotomis, calycibus elongatis fubulatis. *Guadalupa.*

macrophylla Vahl. 42. R. ramis 4gonis foliisque oblongis utrinque attenuatis integerrimis petiolatis pubefcentibus, pedunculis elongatis 2fidis bracteatis, calycibus glabris. *Amer. auftr.*

dichotoma Berter. 43. R. caule herbaceo erecto ramisque teretibus, foliis oblongis utrinque attenuatis longe petiolatis canefcenti-pubefcentibus, pedunculis axillaribus dichotomis foliatis folio brevioribus, calycibus fubulatis elongatis hirfutis. *Ad fl. Magdalen.*

tuberofa 44. R. radice faſciculata, caule herbaceo afcendente hirfuto, foliis obovato-oblongis crenatis glabriusculis, pedunculis trifidis folio fubbrevioribus ebracteatis, calycibus elongatis fubulatis, capfulis linearibus. *Jamaica.*

ſtrepens 45. R. caule herbaceo erecto foliisque oblongis repandis petiolatis hirfutis, pedunculis breviffimis foliatis 3floris, calycibus hirfutis lineari-fubulatis. *Virginia. Carolina. Ind. occid.* (Flores fubverticillati.)

lactea Cav. 46. R. caule herbaceo tomentofo-lanato, foliis oblongis obtufis repandis in petiolum attenuatis pubefcentibus, pedunculis breviffimis 3floris bracteatis, capfulis linearibus. *Mexico.*

clandeſtina 47. R. caule herbaceo, ramis 4gonis, foliis oblongis obtufis bafi attenuatis crenulatis pubefcentibus, pedunculis 3floris folio brevioribus. *Ind. occid.*

erecta Roth. 48. R. caule erecto villofo, foliis fubrotundis obtufis mucronatis petiolatis fubcrenulatis fupra fcabris fubtus tomentofis, pedunculis breviffimis bracteatis. *Ind. or.*

dulcis Cav. 49. R. caule fimplici humili herbaceo, foliis longe petiolatis oblongis integerrimis, pedunculis bracteatis folio brevioribus. *Chili.*

4. *Racemis axillaribus multifloris.*

paniculata 50. R. caule fruticofo ramofo, foliis oblongis acutis venofis hirfutiusculis integerrimis petiolatis, racemis axillaribus dichotomis bracteatis, floribus fubfeffilibus, lobis corollae emarginatis. *Jamaica. Nov. Granat.*

rubra Aubl. 51. R. caule herbaceo, foliis oblongo-lanceolatis acuminatis repandis glabris, pedunculis corymbosis multifloris bracteatis, corollae limbo fimbriato, caplula utrinque sinuata. *Guiana.*

secunda Vahl. 52. R. foliis subcordato-ovatis obtusis integerrimis villosis petiolatis, racemis axillaribus secundis, calycibus hirtis corolla glabra brevioribus. *Ind. or.*

glandulosa Roth. 53. R. foliis ovato-lanceolatis utrinque attenuatis serrulatis pubescentibus, racemis axillaribus subsecundis, calycibus pubescentibus corollas subaequantibus. *Ind. or.*

viscosa Humb. 54. R. herbacea glanduloso-pilosa viscosa, foliis oblongis utrinque attenuatis integerrimis, pedunculis axillaribus dichotomis, floribus sessilibus. *Ad Orinocum.*

inundata Humb. 55. R. herbacea procumbens piloso-viscosa, foliis petiolatis ovatis acutis integerrimis, pedunculis axillaribus dichotomis, floribus sessilibus. *Ad fl. Magdalenae.*

5. *Floribus fasciculatis, capitatis.*

fulgida Andr. 56. R. caule erecto fruticoso, foliis ovato-acuminatis undulato-crenatis pilosis, fasciculis longe pedunculatis axillaribus bracteatis. *Ind. occid.*

undulata Vahl. 57. R. caule erecto herbaceo, foliis petiolatis oblongis obtusis undulatis glabris, capitulis axillaribus sessilibus. *Ind. or.*

mollissima Vahl. 58. R. villosa, foliis petiolatis lato-lanceolatis acuminatis integerrimis, fasciculis pedunculatis. *Madagascar.*

involucrata Vahl. 59. R. foliis subsessilibus lanceolatis obtusiusculis glabris, capitulis terminalibus breviter pedunculatis, bracteis quaternis pilosis. *Ind. or.*

aristata Vahl. 60. R. foliis petiolatis ovatis obtusis integerrimis subtus canescentibus, capitulo terminali involucrato, bracteis calycibusque nervosis aristatis. *Arabia.*

crispa 61. R. caule suffruticoso diffuso, foliis petiolatis oblongis obtusis undulato-crenatis, capitulis terminalibus foliosis hispidis, bracteis lanceolatis. *China. Ind. or.* (R. urens Roth.)

sumatrensis Roth. 62. R. caule repente hispido, foliis petiolatis oblongo-lanceolatis subintegerrimis, floralibus retusis, fasciculis terminalibus sessilibus, bracteis lanceolatis serrulatis. *Sumatra.*

6. *Floribus spicatis.*

cordifolia Vahl. 63. R. caule fruticoso, foliis sessilibus cordato-ovatis integerrimis subtus incano-tomentosis, spica terminali pauciflora, bracteis linearibus calycem aequantibus. *Ind. or.*

guttata Forsk. 64. R. caule suffruticoso, foliis petiolatis oblongis obtusiusculis undulatis margine scabris, spica ter-

minali pedunculata, bracteis ternis calyces subsuperantibus. *Arabia.*

japonica Thunb. 65. R. caule herbaceo erecto, foliis subpetiolatis ellipticis integerrimis glabris, spicis terminalibus alternis, bracteis oblongis obtusis. *Japon.*

hirta Vahl. 66. R. caule herbaceo ascendente foliisque petiolatis oblongis serratis albido-hirsutis, spicis terminalibus imbricatis, bracteis oblongis calycem aequantibus. *Ind. or.*

tetragona Link. 67. R. caule herbaceo 4gono erecto foliisque ovatis acuminatis repando-dentatis hirsutis, verticillis spicatis ebracteatis. *Brasil.*

latebrosa Roth. 68. R. caule herbaceo 4gono foliisque oblongis acutis medio grosse serratis longe petiolatis hispidiusculis, spicis terminalibus imbricatis pauciforis, bracteis lanceolatis. *Ind. or.*

† *rufescens* Roth. 69. R. caule erecto foliisque petiolatis oblongis acuminatis grosse serratis rufo-setosis, opposito minori, spicis imbricatis, bracteis lanceolatis, calyce 5partito inaequali. *Ind. or.*

myssorensis Roth. 70. R. caule erecto foliisque ovatis acuminatis crenatis scabris, spicis terminalibus ovatis imbricatis, bracteis lanceolatis margine pilosissimis. *Ind. oc.*

spicata Roth. 71. R. caule erecto hispido, foliis ovatis acuminatis serratis petiolatis supra scabris, spicis paniculatis oblongis pauciforis, bracteis lanceolatis 3nerviis. *Ind. or.*

longifolia Roth. 72. R. caule erecto glabro, foliis oblongo-lanceolatis subintegerrimis pubescentibus, spicis axillaribus sessilibus subgeminis, bracteis lineari-lanceolatis calycibusque setoso-ciliatis. *Ind. or.*

elongata P.B. 73. R. caule erecto foliisque oblongis acuminatis integerrimis glabris, floribus spicato-racemosis terminalibus bracteatis, corollae tubo longissimo. *Guinea.*

digitalis Kön. 74. R. caule erecto herbaceo foliisque ovatis acuminatis integerrimis longe petiolatis glabris, spica terminali laxa, floribus alternis remotis ebracteatis, corolla ventricosa. *Ind. or.*

repanda 75. R. caule repente, ramis erectis, foliis lanceolatis dentatis petiolatis, spicis terminalibus pedunculatis, calycibus aristatis. *Java. Amboina.*

reptans Forst. 76. R. caule repente, foliis ovatis obtusis serratis petiolatis, spicis pedunculatis terminalibus. *Nov. Hebrid.*

rupestris Sw. 77. R. acaulis, foliis longe petiolatis ellipticis repando-crenatis hirsutis subtus incanis, scapo spicigero bracteato folia subaequante, corolla hypocrateriformi. *Inf. Antill. Carib.* (Gerardia tuberosa L.)

scabrosa Sw. 78. R. acaulis, foliis brevissime petiolatis ovatis acutis coriaceis subrepandis glabris subtus scabris, scapo spicigero bracteato, corolla hypocrateriformi. *Hispaniola.*

7. *Dubiae.*

intrusa Forsk. 79. R. caule herbaceo, foliis ovatis integerrimis pilosis petiolatis, spica terminali secunda, bracteis setaceis, lacinia corollae quinta fornicata in faucem intrusa. *Arabia.*

gigantea Humb. 80. R. arborea, ramis 4gonis, foliis ovatis acuminatis glabris, panicula terminali, bracteis calycibusque obtusis pubescentibus. *Amer. austr.*

2215. BLECHUM Juss.

Brownei Juss. 1. Bl. caule herbaceo ramoso, foliis ovato-oblongis repando-dentatis pubescentibus, spicis pedunculatis axillaribus terminalibusque 4gonis, bracteis serratis hirsuto-ciliatis 3floris. *Ind. occ.* (Ruellia Blechum L., Barleria pyramidata Lam.)

laxiflorum Juss. 2. Bl. caule herbaceo ramoso, foliis ovato-lanceolatis subintegerrimis glabris, spicis terminalibus ovatis, bracteis cordato-ovatis integerrimis glabris sub-1floris. *Jamaica.* (Ruellia blechioides Sw.)

angustifolium R. Br. 3. Bl. caule herbaceo, foliis lineari-lanceolatis, integerrimis glabris, spicis terminalibus oblongis, bracteis ovatis integerrimis hirsutis. *Inf. Carib.*

2216. APHELANDRA R. Br.

cristata R. Br. *Ind. occid.* Frutex foliis oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis integerrimis subtus ad venas pilosis, spicis pedunculatis elongatis, bracteis coloratis, corollis coccineis. (Justicia pulcherrima L. fil., 4gona Vahl., Ruellia cristata Andr.)

2217. HARRACHIA Jacqu.

speciosa Jacqu. *Ind. or.* Frutex foliis oblongis undulatis glabris, spicis pedunculatis, bracteis ternis cuspidatis pubescentibus, floribus miniatis. (Justicia infundibuliformis L., Ruellia infundibuliformis Andr., Crossandra undulaefolia Salisb.)

2218. AETHEILEMA R. Br.

alopecuroides R. Br. 1. Ae. caule herbaceo foliisque ovatis subrepandis nervosis glabris, spicis pedunculatis terminalibus pilosis bracteatis, calycibus membranaceis subulatis. *Inf. Carib.* (Ruellia Vahl.)

imbricatum R. Br. 2 Ae. caule suffruticoso, foliis petiolatis ovatis undulato-crenatis, opposito minori, spica secunda foliosa, bracteis cordatis pilosis. *Arabia. Inf. Mascaren. Ind. or.* (Ruellia imbricata Forsk., dorsiflora Retz.)

*parviflorum** 3. Ae. caule herbaceo foliisque ovatis acutis venosis hirsutis, pedunculis 3floris axillaribus, calycibus

glandulosis. *Ind. or.* (Micranthus oppositifolius Wendl. Phaylopsis parviflora W.)

2219. LEPIDAGATHIS W.

crisiata W. 1. L. caule fruticoso diffuso, foliis sessilibus lanceolatis integerrimis rigidis glabris, capitulis radicalibus majoribus rameisque minoribus. *Coromandel.*

repens * 2. L. caule herbaceo repente, foliis sessilibus ovato-oblongis integerrimis, pedunculis axillaribus unifloris. *Cochinchina.* (Septas repens Lour.)

2220. BARLERIA.

* *Spinosae.*

buxifolia 1. B. spinis axillaribus oppositis simplicibus, foliis subrotundis coriaceis integerrimis, floribus solitariis axillaribus. *Ind. or.*

Hystrix 2. B. spinis axillaribus oppositis simplicibus, foliis oblongis utrinque attenuatis glabris, floribus axillaribus solitariis. *Ind. or. Inf. Moluce.*

acanthoides Vahl. 3. B. spinis geminis foliaceis, foliis oblongis cuspidatis pilosis, spicis axillaribus secundis. *Arabia.*

solanifolia 4. B. spinis axillaribus subquaternis simplicibus, foliis lanceolatis sinuato-dentatis glabris, floribus axillaribus oppositis. *Hispaniola.*

Prionitis 5. B. spinis axillaribus subquaternis divaricatis simplicibus, foliis ovato-oblongis subtus pubescentibus, floribus axillaribus oppositis. *Ind. or. Arabia.* (Justicia appressa Forsk.)

bispinosa Vahl. 6. B. spinis axillaribus oppositis 2fidis divaricatis, foliis ovatis mucronatis integerrimis subtus villosis, pedunculis e spinarum angulo 1floris. *Arabia.* (Justicia Forsk.)

trispinosa Vahl. 7. B. spinis axillaribus 3fidis, foliis oblongis acuminatis integerrimis glabris, spica terminali imbricata, calycibus villosis. *Arabia.* (Justicia Forsk.)

longifolia 8. B. caule foliisque lineari-lanceolatis longissimis integerrimis hispidis, floribus verticillatis, spinis verticillorum senis erectis crassis. *Ind. or.*

noctiflora 9. B. spinis axillaribus ramosis, foliis lanceolatis cuspidatis integerrimis, floribus solitariis sessilibus alternis, bracteis scariosis strigosis, tubo corollae elongato. *Ind. or. Arabia.* (Justicia lanceata Forsk. Barl. mysorensis Roth.)

** *Inermes.*

cristata 10. B. foliis oblongis integerrimis, floribus axillaribus subsolitariis, sepalis duobus majoribus nervosis ciliatis, duobus linearibus. *Ind. or.*

tomentosa Roth. 11. B. foliis oblongis integerrimis subtus tomentosis, floribus racemosis bracteatis, sepalis scariosis coloratis integerrimis, duobus majoribus ovato-lanceolatis, duobus linearibus. *Ind. or.*

strigosa W. 12. B. foliis oblongis subtus strigosis, spicis terminalibus ovatis, bracteis obtusis reticulatis ciliatis. *Ind. or.*

longiflora 13. B. foliis ovatis integerrimis sericeis, floribus terminalibus, bracteis cordatis scariosis, tubo corollae gracili elongato. *Malabar.*

flava Jacq. 14. B. foliis oblongo-lanceolatis integerrimis strigillosis, spica imbricata, bracteis ciliatis reticulatis, sepalo quarto bifido. *Arabia.* (Dianthera americana Forsk. Dianthera flava et Justicia flava Vahl. W., Eranthemum flavum W. suppl., Barleria mitis Ker.)

procumbens Lour. 15. B. foliis lato-lanceolatis crenatis pilosis, capitulis terminalibus, bracteis acuminatis ciliatis. *China.*

pungens Thb. 16. B. foliis subsessilibus ovatis integerrimis glabris mucronatis, floribus axillaribus, bracteis spinuloso-ciliatis. *Afric. austr.*

anomala * 17. B. foliis petiolatis oblongis integerrimis glabris, paniculis axillaribus, bracteis binis minutis, calycibus 5partitis obtusis. *Ad fl. Magdalen.* (Bignonia bibracteata Bertero.)

2221. HYGROPHILA R. Br.

formosa * 1. H. fruticosa, ramis teretibus, foliis oblongis subcoriaceis dentato-spinosis, petiolis basi verticillato-spinosis, floribus axillaribus sessilibus, bracteis calycibusque spinulosis. *Peru.* (Ruellia formosa Humb.)

ringens R. Br. 2. H. procumbens, foliis oblongis integerrimis, floribus axillaribus solitariis, bracteis calyce brevioribus. *Ind. or.* (Ruellia ringens L.)

angustifolia R. Br. 3. H. procumbens, foliis lanceolato-linearibus integerrimis, floribus axillaribus confertis, bracteis ciliatis. *Nov. Holl.*

2222. THUNBERGIA.

grandiflora Roxb. 1. Th. scandens, foliis cordatis angulatis acuminatis hispidiusculis, pedunculis 1floris, calyce inter. 0, antheris barbatis calcaratis. *Bengal.*

fragrans Roxb. 2. Th. scandens, foliis subcordato-angulatis pubescentibus, pedunculis unifloris, calyce inter. 12fido. *Ind. or. Guadalupa.* Bertero.

capensis Retz. 3. Th. caule diffuso flexuoso, foliis ovatis obtusis subdentatis 5nerviis scabris, pedunculis 1floris calycibus ext. hirto, int. 12fido. *Afric. austr.*

2223. ADENOSMA R. Br.

uliginosa * 1. A. caule diffuso hirsuto, foliis subsessilibus ovatis serrulatis pubescentibus, spicis 4gonis. *Coromandel.* (Ruellia uliginosa L. suppl.)

polyſperma * 2. A. caule diffuſo gracili, foliis oblongis obtuſis ſubintegerrimis ſtrigoſis, ſpicis ovatis. *Ind. or.* (Ruellia polyſperma Roth.)

fragrans * 3. A. caule diffuſo, foliis ſubrotundis ſeſſilibus crenatis, floribus ſolitariis ſeſſilibus. *Inſ. Societ.* (Ruellia fragrans Forſt.)

chenopodifolia * 4. A. caule erecto, foliis petiolatis ovatis integerrimis pubeſcentibus, floribus verticillatis. *Ind. or. Guadalupa?* (Ruellia chenopodifolia Poir.)

balſamea * 5. A. caule erecto glabro, foliis petiolatis lanceolatis ſerratis glutinoſis, floribus verticillatis bracteatis. *Ind. or.* (Ruellia balſamea L. ſnppl.)

coerulea R. Br. 6. A. caule erectiusculo foliisque ovatis pubeſcentibus, floribus axillaribus ſubſpicatis, bracteis calycibusque hirſutis. *Nov. Holl.*

2224. BIGNONIA.

1. *Foliis ſimplicibus.*

tenuiſiliqua Vahl. 1. B. ſcandens, foliis lanceolatis acutis utrinque glabris integerrimis, panicula terminali. *Ad fl. Magdalenae.*

viminalis Bonpl. 2. B. arborea, foliis longe petiolatis linearibus integerrimis glabris, panicula terminali ſeſſili. *Mexico.*

obtuſifolia Lam. 3. B. foliis alternis obovato-oblongis integerrimis glabris, floribus corymboſis terminalibus. *Braſil. Cayenn.* (B. latiſiliqua Poir. ?)

undulata Sm. 4. B. arborea, foliis lanceolatis undulatis glabris, floribus terminalibus umbellatis, involucro polyphyllo. *Ind. or.*

† *ilicifolia* Perſ. 5. B. foliis ovatis mucronatis coriaceis integerrimis margine revolutis. *Madagascar.*

2. *Foliis binatis.*

* *Scandentes cirrhiferae.*

† *Pedunculis uni-paucifloris.*

Unguis 6. B. foliolis ovato-oblongis glaberrimis ſupra lucidis, pedunculis oppoſitis 1floris. *Ind. occ.*

flaminea Lam. 7. B. foliolis ovato-oblongis glaberrimis, pedunculis oppoſitis 1floris, genitalibus longe exſertis. *Hiſpaniola.*

caprcolata 8. B. foliolis cordato-oblongis glabris opacis, pedunculis 1floris aggregatis. *Virginia. Carolina.*

pubeſcens 9. B. foliolis cordato-ovatis ſubtus pubeſcentibus, pedunculis 1floris. *Nov. Hiſpan.*

aequinoctialis 10. B. foliolis ovato-lanceolatis glabris, pedunculis paucifloris, fructibus longiſſimis. *Ind. occid. Braſil.* (B. Chamberlainii Bot. mag.)

ſalicifolia Kunth. 11. B. foliolis lanceolatis glaberrimis nitidis, pedunculis 3-6floris pubeſcentibus. *Ad Orinoc.*

chryſoleuca **Bonpl.** 12. B. foliolis ovato-oblongis acuminatis glaberrimis, pedunculis 3-5floris glabris. *Ad fl. Magdalen.*

obovata * 13. B. foliolis obovatis acutis membranaceis glabris, pedunculis pubeſcentibus axillaribus uniterminalibus 3floris. *Nov. Granat.* (Spathodea Kunth.)

alliacea **Lam.** 14. B. foliolis ellipticis coriaceis integerrimis glabris, pedunculis ſub-5floris. *Guiana.*

†† *Floribus racemoſis.*

ſpectabilis **Vahl.** 15. B. foliolis ovato-oblongis obtuſiusculis ſubcoriaceis nitidis, racemis terminalibus. *Porturico. Inſ. Carib. Amer. auſtr.* (B. picta Kunth.)

rigeſcens **Jacq.** 16. B. foliolis ovatis retuſis ſubcoriaceis venoſo-reticulatis glabris, racemi pedunculis 3floris. *Hiſpaniola. Amer. auſtr.* (B. obliqua et glabrata Kunth.)

lactiflora **Vahl.** 17. B. foliolis cordato-ovatis acutis venoſo-reticulatis glabris, racemo terminali inferne foliato. *Inſ. Carib. Amer. auſtr.* (B. hondenſis Kunth.)

laurifolia **Vahl.** 18. B. foliolis oblongis glabris, racemi terminalis ramis dichotomis, corollis extus tomentoſis. *Cayenn.*

grandiflora **Jacq.** 19. B. foliolis oblongis utrinque attenuatis undulatis ſubcoriaceis glabris, racemi terminalis pedunculis aſperis ſquamatis, corollis glabris. *Amer. auſtr.*

tiliaefolia **Kunth.** 20. B. foliolis cordato-ſubrotundis acuminatis membranaceis ſupra glabris ſubtus pubeſcentibus, racemis terminalibus, corollis extus tomentoſis. *Amer. auſtr.*

longiſiliqua **Bert.** 21. B. foliolis profunde cordatis acuminatis membranaceis utrinque glaberrimis, racemis terminalibus ſimplicibus, calycibus 5dentatis corolliſque glabris. *Ad fl. Magdalen.*

villoſa **Vahl.** 22. B. foliolis ellipticis obtuſis coriaceis ſubtus ramisque albido-villoſis, racemis axillaribus laxis. *Ad fl. Magdalen.*

latifolia **Rich.** 23. B. foliolis ovatis nervoſis membranaceis, racemis lateralibus, calycibus inflatis. *Cayenn.*

††† *Floribus paniculatis.*

elongata **Vahl.** 24. B. foliolis ovalibus obtuſis membranaceis ſubtus tomentoſis, paniculae terminalis longiſſimae ramis dichotomis, calycibus corollisque villoſis. *Amer. auſtr.*

molliſſima **Kunth.** 25. B. foliolis cordato-ovatis acutis ſupra villoſis ſubtus fuſco-tomentoſis, paniculis axillaribus dichotomis calycibusque 5dentatis pubeſcentibus. *Caracas.*

diverſifolia **Kunth.** 26. B. foliis conjugatis ſimplicibusque glabris nitidis, foliolis ſubcordato-ovatis acuminatis nervoſis venoſo-reticulatis, paniculis terminalibus, calycibus 5dentatis glabris. *Mexico.*

floribunda Kunth. 27. B. foliolis oblongis utrinque attenuatis glabris nitidis, paniculis axillaribus pulverulentis, corollis extus pubescentibus. *Mexico.*

Selloi * 28. B. foliolis subcordato-oblongis acutis glabris nitidis, paniculis oppositis horizontalibus multifloris, calycibus corollisque glabris. *Brasil.* Sello.

magnolifolia Kunth. 29. B. foliolis ovato-ellipticis acutis coriaceis glabris nitidis, panicula terminali, corollis glabris. *Ad Orinoc.* (B. pyramidata Rich.?)

†*candicans* Rich. 30. B. foliolis subrotundo-ovatis subtus albido-tomentosis, panicula laxissima parviflora. *Cayenn.*

** *Anelix s. absque cirrhis.*

corymbifera Vahl. 31. B. foliolis subcordato-ovatis acuminatis utrinque glabris, corymbis axillaribus terminalibus trichotomis, corollis pubescentibus. *Amer. austr.*

3. *Foliis ternatis.*

* *Scandentes cirrhiferae.*

crucigera 32. B. foliis ternatis binatisque glabris, foliolis subcordato-ovatis acuminatis, racemis axillaribus, tubo corollae longissimo, ramis verrucoso-asperis. *Virginia. Ind. occ.*

heterophylla W. 33. B. foliis ternatis binatisque glabris, foliolis subcordato-oblongis acutis, pedunculis axillaribus cymosis paucifloris, ramis angulatis. *Guiana.* (B. Cherere Aubl.)

venusta Ker. 34. B. foliis ternatis binatisque glabris punctatis, foliolis oblique ovatis acuminatis, petiolis villosiusculis, pedunculis axillaribus corymbosis multifloris. *Brasil.*

colorata Poir. 35. B. foliolis ovato-oblongis acuminatis coriaceis supra nitidis subtus pubescentibus, panicula terminali, calycibus coloratis. *Cayenn.*

microcalyx Meyer. 36. B. foliis ternatis binatisque glabris, foliolis ovalibus obtusis, racemis axillaribus, calycibus 5dentatis brevissimis. *Surinam.*

mollis Vahl. 37. B. foliolis amplis subcordato-oblongis utrinque pubescentibus, panicula terminali multiflora, floribus parvis villosiusculis. *Cayenn.*

incarnata Aubl. 38. B. foliis ternatis binatisque glaberrimis, foliolis ovato-lanceolatis acuminatis, pedunculis axillaribus cymosis paucifloris, fructibus longissimis. *Guiana.*

litoralis Kunth. 39. B. foliolis subrotundo-ovatis acuminatis supra nitidis villosis subtus villosissimis, paniculis axillaribus dichotomis, corolla pubescente. *Mexico.*

riparia Kunth. 40. B. foliolis cordatis obovato-subrotundis acutis subtus ad venas pubescentibus, paniculis axillaribus tomentosis, corolla pubescente. *Nov. Granat.*

umbrosa Kunth. 41. B. foliolis cordato-oblongis acuminatis membranaceis glaberrimis nitidis, ramulis petiolisque

villosis, paniculis lateralibus, corolla pubescente. *Nov. Granat.*

apurensis Kunth. 42. B. foliolis elliptico-oblongis utrinque attenuatis subtus ad venas pubescentibus, racemis terminalibus simplicibus glabris. *Ad Orinoc.*

** *Erectae anelices.*

verrucosa Kunth. 43. B. foliolis oblongis obtusiusculis basi attenuatis glaberrimis reticulato-venosis, panicula terminali sessili, corolla glabra, ramis verrucosis. *Ad Orinocum.*

carichanensis Kunth. 44. B. foliolis oblongis obtusis glabris supra nitidis subtus albidis, panicula terminali sessili, floribus 5andris glabris. *Ad Orinocum.*

haemantha Bert. 45. B. foliolis ellipticis retusis coriaceis glaberrimis, pedunculis axillaribus paucifloris abbreviatis. *Portorico.*

triphylla 46. B. foliolis ovatis acuminatis glabris, racemis axillaribus. *Mexico.*

4. *Foliis digitatis.*

fluviatilis Aubl. 47. B. arborea, foliis quinatis coriaceis glabris, foliolis petiolatis oblongis acuminatis, corymbis confertis breviter pedunculatis, calycibus 5fidis. *Amer. austr.*

Leucoxylon 48. B. arborea, foliis quinatis glabris, foliolis lanceolatis acuminatis nitidis, pedunculis 1floris terminalibus. *Jamaica.*

chrysantha Jacq. 49. B. arborea, foliis quinatis tomentosis, foliolis longe petiolatis ovatis acuminatis, floribus terminalibus congestis. *Caracas.*

hirsuta Lam. 50. B. foliis quinatis subtus pubescentibus, foliolis petiolatis obovato-oblongis emarginatis, floribus terminalibus fasciculato-corymbosis hirsutis. *Ind. or.*

lepidota Kunth. 51. B. arborea, foliis quinatis coriaceis glabris subtus sublepidotis, foliolis petiolatis oblongo-lanceolatis obtusis margine revolutis, pedunculis axillaribus sub-3floris. *Cuba.*

aesculifolia Kunth. 52. B. arborea proceriflima, foliis septenatis subtus tomentosis, foliolis obovato-oblongis, paniculа terminali corymbosa. *Mexico.*

serratifolia Vahl. 53. B. arborea, foliis subquinatis glaberrimis coriaceis, foliolis petiolatis ovatis acutis serratis, pedunculis terminalibus confertis subunifloris. *Inf. Carib.*

radiata 54. B. herbacea humilis, foliis longe petiolatis subseptenatis, foliolis sessilibus oblongis subbipinnatifidis crenatis glabris, pedunculis nudis paucifloris. *Peru.*

5. *Foliis simpliciter pinnatis.*

bijuga Vahl. 55. B. foliis abrupte pinnatis bijugis subcoriaceis glabris, foliolis petiolatis ellipticis integerrimis, racemis terminalibus. *Madagascar.*

56.

Clematis Kunth. 56. B. scandens cirrhifera, foliis abrupte pinnatis bijugis, foliolis cordato-ovatis acutiusculis glabris, floribus paniculatis. *Caracas.*

africana Lam. 57. B. arborea, foliis impari-pinnatis bijugis, foliolis obovatis dentatis rugosis, floribus racemosis. *Senegambia.*

racemosa Lam. 58. B. foliis impari-pinnatis 2-3jugis, foliolis ovatis acutis integerrimis glabris, petiolo communi alato, floribus racemosis. *Madagascar.*

compressa Lam. 59. B. foliis impari-pinnatis 2-3jugis, foliolis ovato-oblongis obtusis integerrimis coriaceis, petiolo communi marginato, ramulis compressis, floribus terminalibus congestis. *Ind. or.*

fraxinifolia * 60. B. scandens, foliis impari-pinnatis 3jugis glabris, foliolis ovato-ellipticis integerrimis, panicula terminali. *Caracas.* (Spathodea Kunth.)

chelonoides 61. B. arborea, foliis impari-pinnatis sub-5jugis pubescentibus, foliolis ovato-oblongis acuminatis integerrimis, panicula terminali. *Ind. or.*

fulva Cav. 62. B. fruticosa, foliis impari-pinnatis sub-9jugis glabriusculis, foliolis obovatis truncatis denticulatis, petiolo communi alato, floribus racemosis subterminalibus. *Peru.*

6. *Foliis decompositis s. bipinnatis.*

variabilis Jacq. 63. B. scandens cirrhifera, foliis inferioribus biternatis superioribus conjugato-ternatis glabris, foliolis ovatis acuminatis integerrimis, racemis terminalibus multifloris. *Caracas.*

peruviana 64. B. foliis decompositis, foliolis pinnatis ternatisque inciso-serratis, geniculis cirrhiferis. *Peru.*

suberosa Roxb. 65. B. arborea, cortice suberoso, foliis decompositis glabris, foliolis ovato-acuminatis subintegerrimis, paniculis ramosissimis. *Ind. or.* (Millingtonia hortensis L. suppl. Mallingtonia W.)

longifolia W. 66. B. arborea, foliis bipinnatis glabris, foliolis amplissimis subcordato-oblongis integerrimis, floribus racemosis, calycibus subglobosis mucosis. *Ind. or.*

Chica Humb. 67. B. scandens cirrhifera, foliis abrupte bipinnatis, foliolis bijugis, ovato-oblongis acuminatis integerrimis glabris, paniculis axillaribus pendulis. *Ad Orinocum.*

jasminifolia Kunth. 68. B. scandens, foliis conjugato-bipinnatis glabris, foliolis ovato-obtusis integerrimis, terminalibus duplo longioribus ovato-lanceolatis. *Ad Orinocum.*

7. *Dubia.*

linearis Cav. 69. B. fruticosa, foliis subternis linearibus acuminatis glaberrimis, floribus terminalibus subcorymbosis, corollae limbo undulato-crenato. *Patria?*

2225. TECOMA Juss.

splendida * 1. T. fruticosa, foliis confertis linearibus acutis carnosis glabris, floribus subracemosis terminalibus, antheris exsertis lanatis. *Brasil.* (Esterhazia splendida Mikan.)

pentaphylla Juss. 2. T. arborea, foliis digitatis glabris, foliolis obovatis integerrimis nitidis, floribus racemosis. *Ind. occ. Brasil.* (T. digitata Bonpl.)

australis R. Br. 3. T. scandens, foliis pinnatis glabris, foliolis lanceolatis subintegerrimis, floribus racemosis. *Nov. Holl.* (Bignonia pandorana Andr. Vent.)

mollis Humb. 4. T. foliis pinnatis villosis, foliolis oblongis acuminatis subintegerrimis, floribus racemosis terminalibus. *Mexico.*

radicans Juss. 5. T. scandens, ramis radicantibus, foliis pinnatis glabris, foliolis ovatis utrinque attenuatis incisodentatis, corymbis terminalibus. *Amer. boreal.* (Bignonia L.)

stans Juss. 6. T. arborea, foliis pinnatis glabris, foliolis lanceolatis acuminatis profunde serratis, racemis terminalibus. *Ind. occ.*

sambucifolia Kunth. 7. T. arborea, foliis pinnatis glabris, foliolis oblongis acuminatis serratis, panicula terminali. *Peru.*

rosaefolia Kunth. 8. T. arborea, foliis pinnatis glabris, foliolis oblongis obtusis serratis, racemis terminalibus. *Peru. Quito.* (T. azaleaeflora Kunth.)

sorbifolia Kunth. 9. T. arborea, foliis pinnatis subtus tomentosis, foliolis oblongis acuminatis serratis, racemis terminalibus. *Quito.*

2226. JACARANDA Juss.

echinata * 1. J. scandens, foliis ternatis glabris, foliolis ovato-oblongis obtusiusculis integerrimis, pedunculis axillaribus racemosis, fructibus echinatis. *Amer. austr.* (Bignonia Jacq. Aubl.)

orbiculata * 2. J. scandens, foliis digitatis glabris, foliolis oblongis acuminatis integerrimis, racemis axillaribus. *Amer. austr.* (Bignonia Jacq.)

alba * 3. J. scandens, foliis decomposito-pinnatis glabris, foliolis ovato-oblongis integerrimis, petiolis nodosis, pedunculis racemosis. *Guiana.* (Bignonia Aubl.)

procera * 4. J. arborea, foliis bipinnatis glabris, foliolis oblongis obtusis mucronatis, paniculae terminalis pedunculis bracteatis. *Guiana.* (Bignonia Copaia Aubl., procera W.)

caroliniana Perl. 5. J. arborea, foliis bipinnatis villosiusculis, foliolis lanceolatis acutis, paniculae terminalis pedunculis nudis. *Inf. Baham. Brasil.?* (Bignonia coerulea L. Jac. mimosae folia Don. Ker.)

brasiliana Perl. 6. J. arborea, foliis bipinnatis glabris, foliolis oblongis acutis, paniculis axillaribus, fructibus

utrinque finuato-cornutis. *Braſil.* (Bignonia Lam.)

obtuſifolia Humb. 7. J. arborea, foliis bipinnatis pubeſcentibus, foliolis oblongis obtuſis margine revolutis integerrimis, paniculis axillaribus. *Ad Orinocum.*

acutifolia Humb. 8. J. arborea, foliis bipinnatis glabris, foliolis lanceolatis acuminatis integerrimis, paniculis axillaribus terminalibusque. *Peru.*

rhombifolia Meyer. 9. J. arborea, foliis bipinnatis glabris, foliolis rhombeo-linearibus acuminatis integerrimis, panicula terminali ramoſiſſima. *Surinam.*

2227. SPATHODEA P. B.

uncata * 1. Sp. ſcandens, foliis binatis glaberrimis, cirrhis petiolo longioribus 3fidis uncatis, floribus racemoſis. *Ind. occ.* (Bignonia Sims.)

uncinata * 2. Sp. ſcandens, foliis binatis glabris, cirrhis trifidis uncinatis, pedunculis axillaribus unifloris. *Surinam.* (Bignonia uncinata Meyer.)

corymboſa Vent. 3. Sp. fruticoſa, foliis binatis glabris, foliolis ſubcordatis acutis integerrimis, petiolis baſi glanduloſis, floribus corymboſis. *Inſ. Trinit.*

laurifolia Kunth. 4. Sp. ſcandens, foliis binatis glabris coriaceis, foliolis ovatis obtuſis integerrimis, petiolis baſi glanduloſis, pedunculis terminalibus paucifloris. *Nov. Granat.*

heterophylla R. Br. 5. Sp. arboreſcens, foliis pinnatis ternatis ſimplicibusque glabris, foliolis lanceolato-linearibus integerrimis, floribus racemoſis. *Nov. Holl.*

atrovirens * 6. Sp. foliis impari-pinnatis bijugis molliſſime tomentoſis, foliolis ovato-lanceolatis integerrimis, racemis terminalibus paucifloris. *Ind. or.* (Bignonia Roth.)

Rheedii * 7. Sp. arborea, foliis impari-pinnatis 3jugis hirſutis, foliolis ſubcordato-ovatis integerrimis, pedunculis racemoſis. *Ind. or. Inſ. Molucc.* (Bignonia ſpathacea Retz.)

Roxburghii * 8. Sp. foliis pinnatis 4jugis glabris, foliolis ovato-oblongis ſerratis, paniculis villoſis, limbo corollae criſpo. *Ind. or.* (Bignonia 4locularis Roxb.)

laevis P. B. 9. Sp. arborea, foliis impari-pinnatis glabris, foliolis oblongis acuminatis apice dentatis, floribus racemoſo-ſpicatis. *Guinea.*

campanulata P. B. 10. Sp. arborea, foliis impari-pinnatis glabris, foliolis lanceolatis integerrimis, floribus racemoſo-ſpicatis. *Guinea.*

Dubiae.

longiflora Vent. 11. Sp. foliis impari-pinnatis, foliolis ovatis, floribus axillaribus pedunculatis longiſſimis. *Patria?*

orinocenſis Kunth. 12. Sp. ſcandens, foliis binatis glabris, foliolis oblongis acutis coriaceis. *Ad Orinocum.*

alternifolia R. Br. 13. Sp. arboreſcens, foliis ſimplicibus alternis ſubovatis integerrimis glabris coriaceis. *Nov. Holl.*

2228. AMPHILOPHIUM Kunth.

paniculatum Kunth. 1. A. ſcandens cirrhiferum, foliis binatis, foliolis ſubcordato-ovatis acuminatis ſubtus albo-punctulatis, venis ramulis angulatis petiolisque fulvo-tomentoſis, racemis erectis. *Ind. occ. Amer. auſtr.* (A. macrophyllum Kunth.)

Mutiſii Kunth. 2. A. ſcandens, foliis binatis cordato-ſubrotundis acuminatis utrinque tenuiſſime lepidotis, petiolis ramulisque angulatis pulverulentis, floribus racemoſis. *Nov. Granat.*

pubeſcens * 3. A. ſcandens, foliis ternato-bipinnatis pubeſcentibus, foliolis oblongis obtuſis ſeſſilibus ſubintegerrimis, floribus axillaribus oppoſitis pedunculatis. *Braſil.* Sello.

2229. ECCREMOCARPUS R. et P.

ſcaber R. et P. 1. E. ſcandens cirrhifer, foliis pinnatis bijugis, foliolis oblique cordatis ſerratis. *Chili.*

viridis R. et P. 2. E. ſcandens cirrhifer, foliis bipinnatis, foliolis ovatis integerrimis. *Peru.*

longiflorus Humb. 3. E. ſcandens, foliis 3pinnatis, foliolis ovalibus inciſis integrisque, pedunculis oppoſitifoliis 3-4floris pendulis. *Peru.*

2230. SALPIGLOSSIS R. et P.

ſinuata R. et P. *Chili.* Herba cubitalis, foliis alternis ſinuato-pinnatifidis, ſummis ſtipulisque linearibus integerrimis, floribus terminalibus pedunculatis ſanguineis.

2231. INCARVILLEA Juſſ.

grandiflora * 1. I. fruticoſa, foliis pinnatis, foliolis ovatis acuminatis dentatis, panicula terminali. *China. Japon.* (Bignonia grandiflora Thunb., chinenſis Lam.)

tomentoſa * 2. I. arborea, foliis ſimplicibus cordatis acutis 5nerviis integerrimis tomentoſis, paniculis axillaribus. *Japon.* (Bignonia Thunb.)

paraſitica Roxb. 3. I. fruticoſa, foliis lanceolatis carnoſis, umbellis terminalibus. *Ind. or.*

chinenſis Lam. 4. L. fruticoſa ſcandens, foliis 2pinnatifidis glabris, floribus corymboſis. *China auſtr.* (Campſis adrepens Lour.)

2232. GELSEMIUM Juſſ.

nitidum Mx. *Virginia. Carolina.* Frutex ſcandens glaberrimus, foliis lanceolatis, floribus axillaribus faſciculatis luteis. (Bignonia ſempervirens L.)

2233. TOURRETTIA Domb.

lappacea W. *Peru.* Herba ſcandens cirrhifera, foliis ternatis ſ. ternato-decompoſitis ſerratis, floribus racemoſis fuſco-violaceis. (Dombeya lappacea Herit.)

2234. MARTYNIA.

diandra Glox. 1. M. caule ramoſo, foliis oppoſitis cordatis dentatis, floribus diandris. *Mexico.* (M. anguloſa Lam.)

Craniolaria Sw. 2. M. caule ramoſo, foliis oppoſitis 5lobis dentatis, calyce bibracteato. *Ind. occ. Amer. auſtr.* (M. ſpathaceą Lam., Craniolaria annua L.)

proboſcidea Glox. 3. M. caule ramoſo, foliis alternis cordatis integerrimis, calyce bibracteato. *Amer. bor.* (M. annua L., alternifolia Lam.)

longiflora 4. M. caule ſimplici, foliis ſubrotundis repandis, calyce ebracteato abbreviato, tubo corollae elongato. *C. B. S.* (M. capenſis Glox.)

zanguebarica Lour. 5. M. caule ſuffruticoſo ramoſo, foliis pinnatifidis piloſis, calyce ebracteato 5partito. *Ora orient. Afric. med.*

2235. DIDYMOCARPUS Jack.

barbatus Jack. 1. D. fruticoſus erectus, foliis oppoſitis ovatis acuminatis integerrimis hirſutis, pedunculis axillaribus paucifloris, ſtaminibus apice barbatis, duobus abortientibus. *Sumatra.*

frutescens Jack. 2. D. ſuffruticoſus erectus, foliis oppoſitis longe petiolatis ovato-lanceolatis ſupra glabris ſubtus caneſcenti-tomentoſis, pedunculis axillaribus aggregatis paucifloris. *Inſ. in freto Malacc.*

corniculatus Jack. 3. D. ſuffruticoſus erectiusculus, foliis alternis obovatis acutis ſerratis villoſis, pedunculis axillaribus elongatis, floribus faſciculatis ſecundis. *Sumatra.*

minutus Jack. 4. D. herbaceus erectus, foliis alternis ſpathulatis acutis ſerratis piloſis ſubtus rubris, pedunculis axillaribus aggregatis 1floris petiolo adnatis. *Inſ. in freto Malacc.*

racemoſus Jack. 5. D. herbaceus erectus, foliis oppoſitis lanceolatis duplicato-ſerratis ſupra glabris, pedunculis axillaribus bifidis racemoſis. *Sumatra.*

elongatus Jack. 6. D. herbaceus erectiusculus, foliis oppoſitis ovatis utrinque attenuatis ſerratis papilloſo-piloſis, racemis axillaribus ſecundis, pedicellis binatis remotis, corolla elongata. *Inſ. ad oram Sumatrae.*

reptans Jack. 7. D. herbaceus reptans, foliis ellipticis crenulatis villoſis, pedunculis axillaribus ſubaggregatis unifloris, ſtaminibus duobus abortientibus. *Inſ. in freto Malacc.*

2236. AESCHYNANTHUS Jack.

volubilis Jack. 1. A. caule volubili, calycibus glabris. *Sumatra.*
radicans Jack. 2. A. caule radicante, calycibus villosis. *Sumatra.*

2237. GESNERA.

* *Fruticosae*

† *pubescentes.*

tomentosa 1. G. hirsuta, foliis lanceolatis elongatis acuminatis inaequaliter serratis, pedunculis lateralibus longissimis corymbiferis. *Ind. occ.*

scabra Sw. 2. G. foliis lanceolatis elongatis acuminatis crenulatis rugosis asperis, pedunculis axillaribus longissimis hirsutis corymbiferis, corolla villosissima tubulosa. *Jamaica. Hispaniola.*

grandis Sw. 3. G. arborescens, foliis amplis oblongo-lanceolatis crenatis supra aspero-hispidiusculis subtus villosis, pedunculis axillaribus longissimis hirsutis corymbiferis, corolla subcampanulata. *Jamaica. Hispaniola.*

elongata Humb. 4. G. foliis ovato-oblongis acutis serrulatis supra strigosis subtus lanato-tomentosis, pedunculis elongatis 4floris, corollae tubulosae fauce constricta. *Quito?*

corymbosa Sw. 5. G. foliis ovato-oblongis acutis serratis supra asperis subtus incano-pilosis, pedunculis elongatis trichotomo-corymbosis, corollae tubo incurvo, limbo inaequali. *Jamaica.*

longiflora Humb. 6. G. foliis oblique ovatis crenatis supra hirsutis subtus pubescentibus, pedunculis axillaribus biforis, corolla tubulosa. *Nov. Granat.*

mollis Humb. 7. G. foliis oblique subcordatis oblongis acutis serratis supra villosis subtus sericeis, pedunculis axillaribus 3floris, corolla tubuloso-ventricosa. *Nov. Granat.*

hirsuta Humb. 8. G. foliis ovato-oblongis utrinque attenuatis serratis supra tomentosis subtus lanatis, pedunculis axillaribus geminis 1floris, corolla tubuloso-ventricosa. *Cumana.*

ulmifolia Humb. 9. G. foliis oblique subcordato-ovatis acutis crenatis rugosis supra asperis subtus pilosis, pedunculis 1floris subaggregatis, corolla tubuloso-inflata. *Quito.*

Craniolaria Sw. 10. G. foliis oblongis dentatis villosis, pedunculis terminalibus corymbiferis, corollae campanulatae limbo fimbriato. *Hispaniola.* (G. fimbriata Lam., Craniolaria fruticosa L.)

prasinata Ker. 11. G. foliis oblongis utrinque attenuatis serratis subtus sericeo-tomentosis, pedunculis axillaribus folio brevioribus subbifloris, corollae extus villosae fauce ampliata, laciniis revolutis. *Brasil.*

spicata Humb. 12. G. foliis ternis oblongis utrinque attenuatis crenatis supra strigosis subtus lanatis, pedunculis

axillaribus verticillatis abbreviatis, corolla tubulosa villosa. *Nov. Granat.*

†† *Glabrae.*

ventricosa Sw. 13. G. foliis oblongis utrinque attenuatis crenulatis, pedunculis axillaribus 3floris folio brevioribus, corolla tubuloso-campanulata incurva. *Jamaica. Inf. Carib.*

macrantha * 14. G. foliis oblongis utrinque attenuatis obsolete denticulatis ciliatis, pedunculis unifloris axillaribus, corolla ampliffima campanulata. *Brasil.* Sello.

calycina Sw. 15. G. foliis oblongis utrinque attenuatis serrato-crenatis glabris, pedunculis axillaribus 3floris, calycibus campanulatis, capsulis cylindricis. *Jamaica.*

exserta Sw. 16. G. foliis oblongo-lanceolatis crenatis glabris, pedunculis axillaribus 3floris, calycibus profunde partitis, genitalibus corolla duplo longioribus, capsulis ovatis. *Jamaica.*

humilis 17. G. foliis lanceolatis apice dilatatis inciso-serratis subtus pallidis, pedunculis axillaribus corymbosis. *Cuba.*

** *Herbaceae.*

chelonioides Humb. 18. G. foliis oblongis grosse crenatis pilosis subtus canescentibus, pedunculis axillaribus bifloris. *Nov. Granat.*

elatior Humb. 19. G. foliis ternis subsessilibus lanceolatis obtusis crenatis utrinque hirsutis, pedunculis verticillatis 3floris, corolla tubulosa superne inflata. *Nov. Granat.*

verticillata Cav. 20. G. foliis oppositis sessilibus ovatis crenatis hirsutis, pedunculis axillaribus verticillatis 1floris. *Peru.*

sylvatica Humb. 21. G. foliis ternis quaternisque subsessilibus oblongo-lanceolatis acuminatis integerrimis pilosis, pedunculis axillaribus verticillatis 3-4floris. *Ad fl. Amazonum.*

tubiflora Cav. 22. G. foliis oppositis ovatis crenatis tomentosis, pedunculis axillaribus quaternis 1floris, corollae tubulosae tomentosae limbo suberecto. *In isthmo Panam.*

aggregata Ker. 23. G. foliis oppositis ovatis crenatis subtus tomentosis, pedunculis verticillatis 1floris, corollae villosae tubulosae basi bigibba limbo erectiusculo. *Brasil.*

bulbosa Ker. 24. G. foliis cordato-ellipticis crenatis subtus tomentosis, pedunculis axillaribus corymbosis, corollae limbo oblique truncato. *Brasil.*

acaulis 25. G. caule brevissimo, foliis lanceolatis elongatis serratis rugosis, pedunculis 3floris folio brevioribus. *Jamaica.*

pumila Sw. 26. G. acaulis, foliis obovato-oblongis crenatis supra hirsutis subtus pallidis, pedunculis sub-

unifloris, calycibus profunde partitis patenti-reflexis, corollae tubo infundibuliformi. *Jamaica.*

2238. BESLERIA.

* *Calycibus ferratis ſ. denticulatis.*

criſtata 1. B. fruticoſa ſcandens, foliis ovatis ſerratis hirſutis, pedunculis elongatis 1floris, calycibus latis rubris ſerrato-criſtatis, fructibus capſularibus. *Ind. occ. Amer. auſtr.*

hiſpida Kunth. 2. B. fruticoſa erecta, foliis elliptico-oblongis crenato-ſerratis hiſpidis, pedunculis ſolitariis 1floris, calycibus hiſpidis argute ſerratis, fructibus baccatis. *Quito. Nov. Granat.*

coccinea Aubl. 3. B. fruticoſa ſcandens, foliis oblongis acutis ſubdentato-repandis glabris carnoſis, pedunculis axillaribus paucifloris diphyllis, calycibus ampliſſimis coccineis ſerrulatis, limbo corollae crenulato. *Guiana.*

craſſifolia Schott. 4. B. foliis carnoſis oblongo-lanceolatis integerrimis ſupra glabris, pedunculis axillaribus 1floris nutantibus, calycibus lanceolatis ſerratis, corollae limbo revoluto. *Braſil.*

bicolor Humb. 5. B. fruticoſa erecta, foliis ovato-oblongis acutis denticulatis hirſutis ſubtus rubris, pedunculis axillaribus verticillatis 1floris, calycibus purpureis piloſis denticulatis. *Nov. Granat.*

dichrus * 6. B. foliis ovato-lanceolatis integerrimis pubeſcentibus, floribus axillaribus confertis ſubſeſſilibus, calycibus rubris denticulatis rotundatis, corollae clavatae limbo erectiusculo. *Braſil.* (B. bicolor Schott.)

ſanguinea Perſ. 7. B. foliis obovato-oblongis acutis dentatis pubeſcentibus ſubtus rubro-maculatis, floribus axillaribus ſeſſilibus, calycibus inciſo-ſerratis hirſutiſſimis. *Hiſpaniola. Nov. Granat.* (Dalbergia phoenicea Tuſſ.)

pulchella Don. 8. B. ſuffruticoſa erecta, foliis oblongis rugoſis ſerratis pubeſcentibus, pedunculis axillaribus multifloris umbelliferis, calycibus coccineis ſerratis, corollae limbo ſubaequali ciliato. *Inſ. Trinit.*

melittaefolia 9. B. ſuffruticoſa erecta, foliis oblongis crenatis hirſutiusculis, pedunculis axillaribus cymoſis, calycibus viridibus lanceolatis ſubſerratis. *Ind. occid.*

ſerrulata Jacq. 10. B. fruticoſa ſcandens, foliis oblongis dentatis hirſutis ſubtus rubris, pedunculis axillaribus oppoſitis 1floris, calycibus viridibus ſerratis. *Ind. occid.*

ſpectabilis Humb. 11. B. fruticoſa erecta, foliis oblongis obſolete dentatis pubeſcentibus, pedunculis axillaribus 1floris, calycibus viridibus obſolete dentatis. *Nov. Granat.*

calcarata Humb. 12. B. fruticosa erecta, foliis oblongis crenato-serratis pilosis, pedunculis axillaribus subtrifloris, calycibus coloratis (?) denticulatis, corollae basi saccato-calcarata. *Nov. Granat.*

** *Calycis laciniis integerrimis.*

lutea 13. B. foliis oblongo-lanceolatis obsolete denticulatis glabris, pedunculis axillaribus 1floris, calycibus 5fidis coloratis. *Ind. occ. Amer. austr.* (B. solanoides Kunth.)

elegans Humb. 14. B. foliis oblongis acuminatis integerrimis glabris, pedunculis axillaribus subgeminis 3floris, calycibus 5partitis integerrimis. *Nov. Granat.*

violacea Aubl. 15. B. scandens, foliis oblongis integerrimis glabris, pedunculis racemosis terminalibus, calycibus coloratis 5fidis. *Guiana.* (B. coerulea Aubl.)

grandiflora Bonpl. 16. B. fruticosa erecta, foliis oblongis acutis crenatis villosissimis, pedunculis axillaribus subcorymbosis, calycibus coloratis pilosis. *Nov. Granat.*

grandifolia Schott. 17. B. foliis late ovatis integerrimis subtus hirsutis, pedunculis axillaribus racemoso-paniculatis, calycibus coloratis, laciniis corollae inferioribus revolutis. *Brasil.*

hirtella Schott. 18. B. foliis ovatis integerrimis hirsutiusculis, floribus axillaribus confertis subsessilibus, calycibus obtusis coloratis, corolla clavata. *Brasil.*

incarnata Aubl. 19. B. herbacea tomentosa, foliis oblongis crenatis, pedunculis axillaribus solitariis 1floris, calycibus 5fidis. *Guiana.*

2239. PARENTUCELLIA Viv.

floribunda Viv. *Ora Afr. bor.* (regio Pentapolit.) Herba glandulosa-pilosa, foliis sessilibus ovatis inciso-serratis, floribus axillaribus oppositis purpureis.

2240. ANTHOCERCIS Labill.

litorea Labill. 1. A. foliis obovatis ramisque laevissimis, corollae laciniis tubo longioribus, capsula oblonga calycem bis superante. *Ora austr. Nov. Holl.*

viscosa R. Br. 2. A. foliis obovatis glandulosa-punctatis margine scabriusculis, ramulis pubescentibus, capsula ovata calycem subaequante. *Ora austr. Nov. Holl.*

2241. BRUNFELSIA.

americana 1. B. foliis subspathulato-lanceolatis petiolatis, pedunculis calycem patentem excedentibus, limbo corollae plano. *Ind. occ. Amer. bor.*

undulata Sw. 2. B. foliis lanceolatis sessilibus, pedunculis calycem conniventem aequantibus, limbo corollae undulato. *Jamaica.*

2242. CRESCENTIA.

Cujete 1. Cr. arborea, foliis oblongo-lanceolatis undulatis confertis, fructibus ſubellipticis. *Ind. occid. Amer. auſtr.*

acuminata Bonpl. 2. Cr. arborea, foliis anguſte lanceolatis confertis, fructibus ſubgloboſis. *Cuba.*

cucurbitina 3. Cr. arborea, foliis ovato-oblongis ſparſis, fructibus ovatis acuminatis. *Ind. occ. Amer. auſtr.* (Cr. latifolia Mill. Lam.)

jasminoides Lam. 4. Cr. fruticoſa, foliis ſpathulatis emarginatis coriaceis, fructibus ovalibus. *Inſ. baham.*

edulis Desv. 5. Cr. arboreſcens, foliis lanceolatis confertis, fructibus angulatis tuberculatis. *Nov. Hiſpan.*

aculeata Kunth. 6. Cr. arboreſcens, ramis aculeatis, foliis ternatis ſimplicibus, petiolo alato, fructibus teretibus (?). *Nov. Hiſpan.*

alata Bonpl. 7. Cr. arborea, ramis inermibus, foliis ternis ternatis, petiolo communi alato, fructibus globoſis, *Nov. Hiſpan.*

2243. TANAËCIUM SW.

paraſiticum Sw. 1. T. altiſſime ſcandens, foliis ovatis coriaceis, pedunculis 4floris. *Jamaica.*

Jaroba Sw. 2. T. altiſſime ſcandens, foliis inferioribus ternatis ſuperioribus geminis, foliolis amplis ovatis ſubmembranaceis. *Jamaica.*

2244. TRIPINNARIA Perſ.

aſiatica * 1. Tr. foliis tripinnatis, foliolis ovatis acuminatis glabris, floribus corymboſis. *Cochinchina.* (Tripinna tripinnata Lour.)

africana * 2. Tr. foliis pinnatis, foliolis ellipticis ſerratis coriaceis, floribus ſubſolitariis. *Ora or. Afr. med. Inſ. Mascaren.* (Creſcentia pinnata Jacq. Tanaëcium W.)

2245. COLUMNEA.

ſcandens 1. C. villoſa, foliis ovatis integerrimis ſubtus incanis, laciniis calycis integerrimis. *Ind. occid. Amer. auſtr.* (C. villoſa W. ſuppl.)

hirſuta Sw. 2. C. hirſuta, foliis oblongis acuminatis ſubſerratis, laciniis calycis dentatis. *Jamaica.*

rutilans Sw. 3. C. foliis ovato-oblongis denticulatis ſubtus hirſutis coloratis, laciniis calycis obtuſis laciniatis. *Jamaica.*

hiſpida Sw. 4. C. hiſpida, foliis ovatis obtuſis denticulatis, laciniis calycis integerrimis hirſutiſſimis coloratis. *Jamaica.*

† *ovata* Cav. 5. C. pubeſcens, foliis oblongis crenatis, laciniis calycis utrinque 1dentatis. *Inſ. Chiloe.* [Corollae forma aliena ſubregularis.]

†*stellata* Lour. 6. C. pilosa herbacea repens, foliis termis ovatis serratis, laciniis calycis subulatis. *Cochinchina.* [Corollae facies aliena $\frac{3}{2}$.]

2246. DUBOISIA R. Br.

myoporoides R. Br. *Nov. Holl.* Frutex foliis alternis integerrimis, floribus paniculatis albis.

2247. MITRARIA Cav.

coccinea Cav. *Inf. Chiloe.* Frutex scandens, foliis oppositis ovato-oblongis serratis, floribus axillaribus pedunculatis coccineis.

2248. TEEDIA Rudolph.

lucida Rud. 1. T. foliis oppositis ellipticis serratis lucidis, pedunculis 3floris axillaribus. *C. B. S.* (Capraria Ait. Borkhausenia Roth.)

pubescens Burch. 2. T. foliis oppositis ellipticis serratis opacis ramisque pubescentibus, pedunculis 3floris axillaribus. *Afric. austr.*

2249. HALLERIA.

lucida 1. H. foliis ovatis acuminatis serratis, corollis 2labiatis, staminibus exsertis. *Afric. austr.*

elliptica Thb. 2. H. foliis oblongis utrinque attenuatis dentatis, corollis aequalibus, staminibus inclusis. *Afr. austr.*

2250. DIPLANTHERA R. Br.

tetraphylla R. Br. *Nov. Holl.* Arbor ramosa foliis quaternis integerrimis basi 2glandulosis, floribus thyrsoideis flavis.

2251. LINNAEA.

borealis *Europ. et Amer. bor.* Planta suffruticosa, caule prostrato, foliis subrotundis crenatis, ramis floriferis erectis 2floris, floribus pendulis albo-rubentibus. [Nomen primus imposuit J. F. Gronovius.]

2252. PICRIA Lour.

Fel terrae Lour. 1. P. herbacea erecta, foliis ovatis serratis scabris, pedunculis congestis. *In hortis Chinae colitur.*

†*surinamensis* * 2. P. herbacea repens, foliis oblongis pilosis, pedunculis axillaribus oppositis. *Surinam.* (Besleria bivalvis L. suppl.)

2253. GLOXINIA Herit.

maculata Herit. 1. Gl. foliis cordatis inaequaliter dentatis supra hispidiusculis subtus glabris discoloribus, calycibus obtusis. *Amer. austr.* (Martynia perennis L.)

speciosa Ker. 2. Gl. foliis elliptico-oblongis crenatis utrinque villosis subtus discoloribus, calycibus acutis. *Brasil.*

2254. MELIANTHUS.

major 1. M. stipulis solitariis petiolo adnatis, foliis utrinque glabris. *C. B. S.*

minor 2. M. stipulis geminis distinctis, foliis subtus tomentosis. *Afric. austr.*

comosus Vahl. 3. M. stipulis distinctis, foliis villosis, bracteis cordatis elongatis. *Afric. austr.*

2255. KRAMERIA.

Ixina 1. Kr. foliis oblongo-lanceolatis cuspidatis triplinerviis, ramis racemiferis incano-pubescentibus. *Amer. austr.*

argentea Mart. 2. Kr. foliis ovato-oblongis crassiusculis cuspide decidua acutis superioribus racemisque spicatis villosis. *Brasil.*

triandra R. et P. 3. Kr. foliis oblongis acutiusculis villoso-sericeis, racemi abbreviati pedicellis folio longioribus. *Peru.*

paucistora Sess. 4. Kr. foliis oblongo-linearibus villosis, pedicellis paucis folio longioribus, calycis labio inf. gibbo. *Mexico.*

secundistora Sess. 5. Kr. foliis linearibus acutis villosis, pedicellis folio longioribus secundis. *Mexico.*

linearis R. et P. 6. Kr. prostrata, foliis lineari-subulatis villosis, pedicellis tomentosis. *Peru.*

cytisoides Cav. 7. Kr. foliis ternatis, foliolis ovalibus villosis, pedunculis solitariis. *Noc. Hispan.* [Kramera glabra * N. E. est Acidandra Mart.]

CLASSIS XV.

TETRADYNAMIA.

CRUCIFERAE.

I.

Syncliſtae: Fructus non dehiſcentes

1. *monoſpermi.*

2256. *Neslia* Desv. Cal. patens. Fructus globoſus intus membrana interſtinctus.

2257. *Calepina* Adanſ. Cal. erectus. Fructus ſubgloboſus rugoſo-muriculatus, ſtylo breviſſimo coronatus.

2258. *Sobolewskia* MB. Cal. patens. Fructus pyriformis. Sem. pendulum.

2259. *Myagrum.* Cal. erectus. Fructus coriaceo-ſuberoſus apice compreſſus, in lacunas 2 ſteriles dilatatus. Sem. pendulum.

2260. *Pugionium* Gärtn. Fructus membranaceus transverſe ovalis reticulato-echinatus utrinque in mucronem pugioniformem longum productus. Sem. arillatum.

2. *Fructus biarticulati oligoſpermi.*

2261. *Crambe.* Cal. patens. Filamenta majora ſubfurcata. Fructus 2articulatus 2ſpermus, articulo ſup. globoſo 1ſpermo, inf. pedicelliformi abortiente.

2262. *Cakile* Tourn. Cal. patens. Fructus 2articulatus 2ſpermus, articulo ſup. producto ſ. ſtylifero, ſemine ſup. ſuberecto, inf. pendulo.

2263. *Goldbachia* Cand. Cal. erectus. Fructus ſiliquaeformis oblongus 2articulatus 2ſpermus, ſeminibus pendulis, ſtylo ſubnullo.

2264. *Anchonium* Cand. Cal. baſi ſaccatus. Fructus ſiliquaeformis ovato-oblongus, ſtylo roſtriformi coronatus, 2articulatus: articuli 2loculares, loculis ſub-4ſpermis.

3. *Fructus 2loculares.*

2265. *Ochthodium* Cand. Cal. patens. Fructus coriaceus verrucoſus, loculis 1ſpermis, ſeminibus ad latera inſertis.

2266. *Coronopus* Sm. Cal. patens. Fructus didymus, ſtigmate ſeſſili, loculis 1ſpermis, ſeminibus pendulis.
2267. *Succovia* Medic. Cal. erectus. Fructus globoſus echinatus, ſtylo ſubulato coronatus, loculis 1ſpermis.
2268. *Zilia* Forsk. Cal. erectus. Fructus globoſus ſuberoſus, ſtylo coronatus, loculis 1ſpermis.
2269. *Bunias*. Cal. erecto-patens. Nux ſub-4gona 2-4locularis, loculis 1ſpermis.

4. *Fructus ſiliquaeformes articulati polyſpermi.*

2270. *Cordylocarpus* Desf. Cal. clauſus. Fructus teres ſubarticulatus, articulo ſupremo globoſo echinato cuſpidato.
2271. *Sterigma* Cand. Cal. erectus. Stam. longiora baſi connata. Fructus teres villoſo-tomentoſus, ſtigmate bilobo coronatus, articulatus, intus celluloſo-durus: ſem. 2ſerialia.
2272. *Chorispora* Cand. Cal. clauſus. Fructus teres, ſtylo longo coronatus, articulatus, ſeminibus pendulis. Cotyledones accumbentes (radiculam rima recipientes).
2273. *Enarthrocarpus* Labill. Cal. erectus. Fructus ſubcompreſſus 2articulatus, articulo inf. obconico 1-3ſpermo, ſuperiori elongato, iſthmis 9-10 1ſpermis ſtrangulato. Cotyledones conduplicatae.
2274. *Raphanus*. Cal. erectus baſi ſubſaccatus. Fructus teres roſtratus nodoſus multiarticulatus, ſeminibus pendulis. Cotyledones conduplicatae.

5. *Fructus valvati ſ. haud ſ. vix dehiſcentes.*

2275. *Clypeola*. Cal. baſi aequalis. Fructus ſiliculoſus compreſſus orbicularis 1locularis 1ſpermus.
2276. *Tauſcheria* Fiſch. Cal. erectus. Fructus oblongus hinc convexus illinc planus 1locularis 1ſpermus. Sem. pendulum.
2277. *Iſatis*. Cal. patens. Fructus ellipticus planus 1locularis 1ſpermus, valvis navicularibus vix dehiſcentibus. Sem. pendulum.
2278. *Biſcutella*. Cal. baſi ſaccatus vel aequalis. Fructus didymus planus, loculis orbiculatis 1ſpermis axi ſtylifero annexis, baſi dehiſcentibus.
2279. *Peltaria*. Silicula foliaceo-compreſſa reticulata 1locularis oligoſperma, ſuturis valvarum non dehiſcentium manifeſtis.
2280. *Euclidium* R. Br. Silicula ventricoſa, ſuturis valvarum non dehiſcentium manifeſtis, 2locularis, loculis 1ſpermis, ſeminibus pendulis.

II.

Siliculoſae, valvis dehiſcentibus.

1. *Siliculae oligoſpermae.*

α. Cotyledones accumbentes. (v. n. 2272.)

2281. *Lunaria*. Silicula pedicellata elliptica plana, funiculis longis ſepto adnatis. Sem. marginato-alata.
2282. *Nicotia*. Silicula ſeſſilis oblonga plana, demum 1locularis, funiculis liberis. Sem. aptera ſubſolitaria.

2283. *Alyſſum.* Filamenta ſubappendiculata. Silicula ſubrotunda compreſſa ſtylo coronata. Sem. ſubſolitaria ſubalata.
2284. *Petrocallis* R. Br. Filamenta edentula. Silicula ovalis plana, funiculis ſepto adnatis. Sem. 2 haud marginata in quovis loculo.
2285. *Hutchinſia* R. Br. Petala aequalia. Silicula elliptica, valvis navicularibus, loculis 2–4ſpermis, ſtylo coronata.
2286. *Iberis.* Petala exteriora ampliora. Silicula emarginata, valvis navicularibus alatis, loculis 1ſpermis.
2287. *Teesdalia* R. Br. Filamenta baſi appendiculata. Silicula emarginata, valvis navicularibus, loculis 2ſpermis.
2288. *Menonvillea* Cand. Cal. baſi ſaccatus. Silicula ſubſtipitata didyma margine alata, loculis 1ſpermis diſcos parallelos efficientibus.
2289. *Anaſtatica.* Silicula ventricoſa ſtylo terminata, valvis ad apicem auriculatis, loculis 2ſpermis.

β. Cotyledones incumbentes (radicula dorſum cotyledonum ſpectante).

2290. *Lepidium.* Silicula ſubovata, valvis carinato-ventricoſis, loculis 1ſpermis. Sem. haud marginata.
2291. *Bivonaea* Cand. Silicula emarginata ſtylo coronata, valvis carinatis dorſo alatis, loculis ſub-4ſpermis, funiculis ſepto adnatis.
2292. *Aethionema* R. Br. Filamenta longiora vel coalita vel dentata. Silicula ovalis ſubemarginata, valvis navicularibus dorſo alatis, loculis 1–2ſpermis.

γ. Cotyledones conduplicatae.

2293. *Vella.* Silicula ovata compreſſa, ſtylo dilatato foliaceo coronata, loculis 1–2ſpermis.

δ. Cotyledones bicrures biplicatae.

2294. *Subularia.* Silicula ovalis ſtigmate coronata, valvis ventricoſis, loculis 4ſpermis.

2. *Siliculae polyſpermae.*

a. Cotyledones accumbentes.

2295. *Farſetia* Turr. Cand. Silicula elliptica ſtylo brevi coronata, valvis planis. Semina compreſſa alata.
2296. *Aubrietia* Adanſ. Filamenta minora dentata. Silicula oblonga, valvis convexis. Semina haud marginata.
2297. *Veſicaria* Lam. Silicula inflato-globoſa, valvis ſubhemiſphaericis.
2298. *Draba.* Silicula ovali-oblonga, valvis plano-convexis.
2299. *Cochlearia.* Silicula ſubglobоſa ſ. ovato-oblonga, valvis ventricoſis craſſiusculis.
2300. *Thlaſpi.* Silicula compreſſa emarginata, valvis navicularibus ſubalatis.

β. Cotyledones incumbentes.

2301. *Camelina* Crantz. Silicula obovata ſ. ſubglobоſa, valvis ventricoſis cum ſtyli parte dehiſcentibus.

2302. *Stenopetalum* R. Br. Silicula elliptica, valvis planiusculis. Stylus 0. Semina 2feriata.
2303. *Eutrema* R. Br. Silicula ovato-oblonga, ſtylo coronata, valvis concavis. Septum apice feneſtratum.

γ. Cotyledones conduplicatae.

2304. *Pſychine* Desf. Silicula ſtylo longo ſuperata, valvis naviculariibus dorſo alatis, ſepto anguſtiſſimo.

III.

Siliquoſae.

1. *Siliquae abbreviatae, ſubſiliculoſae. Cotyledones accumbentes.*

2305. *Stevenia* Adam. Cal. baſi ſaccatus. Siliqua oblonga ſtylo perſiſtente coronata, oligoſperma, valvis planis.
2306. *Braya* Sternb. Cal. baſi aequalis. Siliqua teretiuscula ſtylo abbreviato coronata, valvis convexis. Sem. ſub-2ſerialia. Cotyled. oblique accumbentes.
2307. *Naſturtium* R. Br. Cal. patens. Siliqua teretiuscula ſtylo brevi coronata, valvis convexis. Sem. 2ſerialia. Cotyled. recte accumbentes.
2308. *Morettia* Cand. Cal. erectus. Siliqua oblonga ſtylo brevi coronata, valvis concavis intus in ſeptula ſeminum productis.

2. *Siliquae genuinae.*

α. Cotyledones accumbentes.

2309. *Dentaria.* Cal. erectus. Siliqua compreſſa lanceolata ſtylo coronata, valvis planis enerviis elaſtice reſilientibus, funiculis dilatatis. Sem. 1ſerialia.
2310. *Pteroneuron* Cand. Cal. patens. Siliqua compreſſa ſtylo coronata, valvis planis enerviis elaſtice reſilientibus, placentis extus funiculisque alatis.
2311. *Cardamine.* Siliqua linearis, valvis planis enerviis, ſepto margine incraſſato anguſtioribus, ſaepe elaſtice reſilientibus. Sem. 1ſerialia.
2312. *Neuroloma* Andrz. Siliqua lanceolata compreſſa, valvis planis, funiculis ſepto adnatis. Sem. late marginata.
2313. *Arabis.* Siliqua linearis, valvis planis medio 1nerviis. Sem. 1ſerialia,
2314. *Turritis.* Siliqua linearis elongata, valvis planis 1nervoſis. Sem. 2ſerialia.
2315. *Barbarea* R. Br. Cal. erectus. Siliqua 4gono-anceps, ſtylo coronata. Sem. 1ſerialia.
2316. *Notoceras* R. Br. Cal. erectiusculus. Siliqua 4gono-anceps, valvis apice in cornua productis. Sem. compreſſa.
2317. *Cheiranthus.* Cal. clauſus baſi ſaccatus. Siliqua ſtigmate bilobo ſ. capitato coronata. Sem. 1ſerialia compreſſo-marginata.
2318. *Matthiola* R. Br. Cal. clauſus. Filamenta longiora dilatata. Siliqua ſtigmatibus conniventibus dorſo incraſſatis ſ. cornigeris coronata. Sem. 1ſerialia compreſſa.

β. Co-

β. Cotyledones incumbentes.

2319. *Malcolmia* R. Br. Cal. ſubclauſus. Siliqua teretiuscula ſtigmate acuminato coronata.
2320. *Heſperis.* Cal. baſi ſaccatus. Siliqua teretiuscula ſ. ſub-4gona, ſtigmatibus conniventibus coronata. Sem. 1ſerialia.
2321. *Siſymbrium.* Cal. patens baſi aequalis. Siliqua teretiuscula ſ. angulata. Sem. 1ſerialia.
2322. *Eryſimum.* Cal. erectus ſ. clauſus. Siliqua 4gona. Sem. 1ſerialia.
2323. *Stanleia* Nutt. Cal. patentiſſimus coloratus. Siliqua pedicellata teretiuscula.

γ. Cotyledones conduplicatae.

2324. *Braſſica.* Cal. erectus. Siliqua teretiuscula vel ſtylo coronata vel roſtrata. Sem. 1ſerialia.
2325. *Sinapis.* Cal. patentiſſimus. Siliqua teretiuscula vel ſtylo coronata vel roſtrata. Sem. 1ſerialia.
2326. *Moricandia* Cand. Cal. baſi ſaccatus. Siliqua 4gona ſubanceps. Sem. 2ſerialia ſubalata.
2327. *Diplotaxis* Cand. Cal. patens baſi aequalis. Siliqua compreſſa. Sem. 2ſerialia ovata.

δ. Cotyledones ſpiratim convolutae.

2328. *Erucaria* Gärtn. Cal. erectus. Siliqua teres 2articulata, artic. infer. 2valvi pleioſpermo, ſuper. 2valvi oligoſpermo.
2329. *Schizopetalon* Sims. Cal. clauſus. Petala pinnatifida. Siliqua linearis ſtigmate dilatato coronata. Cotyledones bicrures.

ε. Cotyledones bis transverſe plicatae.

2330. *Chamira* Thunb. Cal. baſi bicalcaratus. Siliqua compreſſa ſubulata.
2331. *Heliophila.* Cal. baſi ſubaequalis. Filamenta ſaepe appendiculata. Siliqua compreſſa linearis ſ. moniliformis. Semina 1ſerialia ſubalata.

CLASSIS XV.

TETRADYNAMIA.

I.

SYNCLISTAE.

Fructus non dehiscentes.

2256. Neslia Desv.

paniculata Desv. — *Europ. Afric. bor. Asia med.* Herba annua erecta, foliis alternis sagittatis integerrimis, floribus racemosis flavis. (Myagrum L., Rapistrum Gärtn., Alyssum W. enum., Vogelia Horn.)

2257. Calepina Adans.

Corvini Desv. — 1. C. caule erecto, foliis radicalibus lyratis, caulinis sagittatis, fructibus rugosis. *Europ. austr.* (Bunias cochlearioides Murr. W., Crambe Corvini All., Cochlearia auriculata Lam., Laelia cochlearioides Pers.)

prostrata * — 2. C. caule procumbente, foliis bipinnatifidis denticulatis pubescentibus, fructibus muriculatis. *Afric. bor.* (Bunias prostrata Desf., Laelia Pers., Myagrum Poir., Muricaria Desv. Cand.)

2258. Sobolewskia MB.

lithophila MB. — *Tauria. Asia med.* Herba elata ramosa glabra, foliis cordato-reniformibus crenatis longe petiolatis, floribus racemosis albis. (Cochlearia sibirica W., Crambe macrocarpa MB.)

2259. Myagrum.

perfoliatum — *Europ. med. et austr.* Herba annua erecta, foliis caulinis sagittatis, floribus racemosis flavis. (Cakile Cand. fl. gall. Baumg.)

2260. PUGIONIUM Gärtn.

cornutum Gärtn. — *Aſia minor et med.* Herba glabra, foliis linearibus glaucis, floribus racemoſis albis. (Bunias cornuta L., Myagrum Lam.)

2261. CRAMBE.

* *Fruticoſae, fructibus ſtylo mucronatis.*

ſtrigoſa Herit. — 1. Cr. foliis ovatis baſi auriculatis dentatis hiſpidis, racemis laxis paniculatis, filamentis ſimplicibus. *Inſ. Canar.* (Myagrum arboreſcens Jacqu.)

fruticoſa L. ſuppl. — 2. Cr. foliis lyrato-pinnatifidis ſerratis incanis, racemis paniculatis, filamentis majoribus furcatis. *Madera.*

** *Herbaceae: fructibus muticis.*

† *perennes.*

maritima — 3. Cr. glaberrima, foliis ſubrotundis ſinuatis dentatis undulatis glaucis. *Ad litora marium Europ.*

pinnatiſida R. Br. — 4. Cr. glabra, foliis pinnatifidis, lobis oblongis dentatis. *Hungar. Tauria. Caucaſ.* (Cr. orientalis Jacqu.)

† *grandiflora* Stev. — 5. Cr. glabra, foliis interrupte pinnatifidis, lobis oblongis inciſo-dentatis. *Ad oſtia Hypanis Maeotic. paludis.*

orientalis — 6. Cr. caule glabro, foliis ſinuato-pinnatifidis dentatis ſcabris. *Aſia minor.*

Tataria Jacqu. — 7. Cr. caule glabriuſculo, foliis decompoſitis ſubtus piloſiuſculis, foliolis pinnatifidis dentato-inciſis. *Moravia. Hungar. Tranſſylvan. Tauria.* (Cr. laciniata Lam.)

aſpera M. B. — 8. Cr. caule aſpero, foliis 2pinnatifidis hiſpidiſſimis, laciniis diſtantibus inciſo-dentatis. *Tauria. Ad Volgam.*

juncea M. B. — 9. Cr foliis lyratis ſubtus cauleque retrorſum hiſpidis, lobis dentatis, terminali laciniato. *Ad fl. Cyrum* in *Caucaſ. regione.*

cordifolia Stev. — 10. Cr. caule glabriuſculo ramoſiſſimo, foliis petiolatis dentatis, inferioribus cordatis ſuperioribus ovatis. *Caucaſ.*

†† *annuae.*

hiſpanica — 11. Cr. caule retrorſum hiſpido, foliis pinnato-lyratis ſcabris, lobo extremo maximo cordato-orbiculato denticulato. *Hiſpan. Luſitan.* (Myagrum ſphaerocarpon Jacqu., Cr. cordifolia Duſour. var.)

reniformis Desf. — 12. Cr. caule hiſpidiuſculo, ramis virgatis, foliis cordato-reniformibus groſſe dentatis aſperis, petiolis auriculatis. *Atlas.*

filiformis Jacqu. — 13. Cr. foliis lyrato-pinnatis hiſpidis, lobo extremo ovato dentato, ramis filiformibus, filamentis ſubſimplicibus. *Patagonia.*

2262. CAKILE Tourn.

*Maritimae.

maritima Scop. 1. C. articulis fructus ancipitibus, ſuperiori ſagittato, foliis pinnatifidis ſubdentatis carnoſis. *Orae maritim. totius Europae.* (Bunias Cakile L. C. aegyptiaca W., latifolia Poir. var.)

americana Nutt. 2. C. articulo fructus ſuperiori ovato acuto, foliis oblongis obtuſis ſubdentatis carnoſis. *Orae maritim. Amer. bor. et Ind. occ.* (C. aegyptiaca Tuſſ., Bunias edentula Bigel.)

aequalis Cand. 3. C. articulo fructus ſuperiori baſi ſub-4gono apice longe roſtrato, foliis oblongis apice dentatis. *Inſ. Carib.* (Sinapis integrifolia Weſt. Raphanus lanceolatus W.)

ſtriata Herit. 4. C. articulis fructus 4gonis ſtriatis, ſuperiori pyramidato-roſtrato, foliis pinnatifidis glabris. *Inſ. maris aegei.* (Bunias tenuifolia Sm., Didesmus Cand.)

*aegyptia** 5. C. articulis fructus ſub-4gonis, ſuperiori in ſtylum pyramidatum abeunte, foliis inferioribus lyratis, ſuperioribus oblongis ſubdentatis. *Aegypt. Cyprus. Inſ. maris aegei.* (Myagrum aegyptium L. Bunias virgata Sibth. Didesmus aegyptius Desv. Cand.)

*cyrenaica** 6. C. articulis fructus ſub-4gonis ſtriatis, ſuperiori obtuſe pyramidato, foliis ovalibus carnoſis ſubintegerrimis. *Regio Cyrenaica.* (Bunias ovalis Viv.)

**Mediterraneae.

perennis Cand. 7. C. articulo fructus glabri ſuperiori ovato ſtylum ſuperante, foliis pinnatifidis hiſpidiusculis, ramis divaricatis. *Europ. med. et auſtr.* (Myagrum L., Rapiſtrum Crantz., Bunias Sm.)

rugoſa Cand. 8. C. articulo fructus pubeſcentis ſuperiori globoſo rugoſo abbreviato, foliis obtuſis dentatis, radicalibus ſublyratis. *Europ. med. et auſtr.* (Myagrum L. Rapiſtrum All. M. venoſum Perſ. var.)

† *clavata** 9. C. articulo fructus rugoſi ſuperiori acuminato ſtylifero, inferiori contracto, foliis haſtatis. *Syria.* Labillard. (Myagrum clavatum Poir., Rapiſtrum Cand.)

*bipinnata** 10. C. articulo fructus glabri ſuperiori ovato in ſtylum longum producto, inferiori obconico, foliis 2pinnatis glabris. *Mauritania.* (Sinapis Desf., Didesmus Cand.)

2263. GOLDBACHIA Cand.

laevigata Cand. 1. G. fructibus 4gono-compreſſis roſtratis rugoſis pendulis, foliis ſuperioribus ſagittatis. *Ad Volgam.* (Raphanus laevigatus M. B.)

toruloſa Cand. 2. G. fructibus teretiusculis breviſſime roſtratis toroſis aſcendentibus, foliis ſuperioribus oblongis. *Perſia.*

2264. ANCHONIUM Cand.

Billardierii Cand. — *Libanus.* Fruticulus glanduloſo-villoſus, foliis oblongis, floribus racemoſis purpureis.

2265. OCHTHODIUM Cand.

aegyptiacum Cand. — *Aegypt. Syria. Peloponneſ.* Herba annua ramoſa glabriuscula, foliis inferioribus ſublyrato-pinnatifidis, ſuperioribus oblongis, floribus racemoſis flavis.

2266. CORONOPUS Sm.

Ruellii Dalech. — 1. C. fructibus compreſſis reticulato-criſtatis, racemis axillaribus ſeſſilibus, foliis pinnatifidis, caule proſtrato. *Europ. omnis. Amer. bor.* (Cochlearia Coronopus L. Senebiera Poir. Perſ. Cand.)

ſerratus Desv. — 2. C. fructibus compreſſis reticulato-rugoſis, racemis ſeſſilibus, foliis oblongo-lanceolatis inciſo-ſerratis, caule procumbente. *Monte Video.* (Senebiera Poir. Perſ. Cand.)

*integrifolius** — 3. C. fructibus ſubgloboſis fungoſis rimoſo-areolatis, racemis oppoſitifoliis, foliis linearibus integerrimis, caule ramoſo. *Madagascar.* Senebiera Cand.)

*linoides** — 4. C. fructibus ſubcompreſſis areolato-punctatis, racemis oppoſitifoliis, foliis linearibus integerrimis, caule erecto ramoſo. *Afric. auſtr.* (Lepidium Thunb. Senebiera Cand.)

*Helenae** — 5. C. fructibus ſubgloboſis ſubareolato-reticulatis, racemis oppoſitifoliis, foliis pinnatifido-3fidis linearibus, caule decumbente ramoſo. *Inſ. Helenae.* Burchell. (Senebiera Cand.)

didymus Sm. — 6. C. fructibus compreſſis ruguloſis, racemis oppoſitifoliis, foliis pinnatifidis, caule proſtrato. *Anglia. Europ. auſtr. Amer. bor. et auſtr. Nov. Holl.* (Lepidium didymum L., Senebiera inciſa W., pinnatifida, pectinata Cand.)

*niloticus** — 7. C. fructibus compreſſis ſubcymbaeformibus glabris, racemis oppoſitifoliis, foliis pinnatifidis, caule erecto. *Aegypt. infer.* (Cochlearia nilotica Delil., Cotyliſcus Desv., Senebiera Cand. Lepidium niloticum Sieb.)

†*anomalus** — 8. C. fructibus glabris compreſſis, racemis elongatis, foliis oblongo-linearibus integerrimis, caule fruticoſo. *C. B. S.* (Heliophila flava L. fil., Brachycarpaea varians Cand.)

2267. SUCCOVIA Medic.

balearica Med. — *Inſ. balear. Teneriffa. Sicilia.* Herba annua ramoſa glabra, foliis pinnatifidis, floribus racemoſis flavis. (Bunias L., Myagrum Lam.)

2268. ZILLA Forsk.

myagroides Forsk. — *Aegypt.* Herba ſuffruticoſa, ramis ſpineſcentibus, foliis oblongis glaucis caducis, floribus racemoſis lilacinis. (Bunias ſpinoſa L. Myagrum ſpinoſum Lam.)

2269. BUNIAS.

Erucago — 1. B. angulis fructus 4locularis criſtatis, petalis emarginatis, foliis radicalibus runcinatis. *Europ. auſtr.* (B. aſpera Retz. var.)

raphanifolia Sm. — 2. B. angulis fructus 4locularis verrucoſo-glanduloſis ſubſinuatis, ſtylo perſiſtente elongato, foliis infimis pinnatifido-runcinatis, ſuperioribus lanceolatis ſerratis. *Creta. Graecia.* (Myagrum orientale L. Rapiſtrum Cand.)

orientalis — 3. B. fructibus ovatis ſub-4gonis 2locularibus verrucoſis, foliis inferioribus runcinatis, ſuperioribus lanceolatis dentatis. *Europ. orient.*

2270. CORDYLOCARPUS Desf.

muricatus Desf. — *Numidia.* Herba annua foliis ſublyratis oblongis, floribus racemoſis ochroleucis.

2271. STERIGMA Cand.

tomentoſum Cand. — 1. St. foliis runcinato-pinnatifidis tomentoſis, fructibus incanis laevibus. *Caucaſ. Sibir.* (Cheiranthus an litoreus Pall., tomentoſus W. Sterigmoſtemum M. B.)

ſulfureum Cand. — 2. St. foliis tomentoſis, inferioribus runcinatis, ſummis oblongo-linearibus integerrimis, fructibus ſtellato-pubeſcentibus. *Syria.* (Cheiranthus ſulfureus Ruſſel.)

toruloſum Cand. — 3. St. foliis ſublomentoſis oblongis, radicalibus ſinuato-dentatis, ſuperioribus integerrimis, fructibus incanis hiſpidis. *Caucaſ.* (Cheiranthus toruloſus M. B. Sterigmoſtemum incanum M. B. ſuppl.)

chichryſifolium Cand. — 4. St. foliis omnibus oblongo-linearibus integerrimis fructibusque tomentoſis. *Armenia. Perſia bor.* (Cheiranthus aureus W. herb.)

2272. CHORISPORA Cand.

tenella Cand. — 1. Ch. foliis infimis ſinuato-pinnatifidis ſuperioribus lanceolatis dentatis fructibusque glabris. *Pallas. Dolia. Tauria. Sibiria.* (Raphanus tenellus Pall., arcuatus W., Chorifpermum tenellum R. Br. Heſperis laxa Lam.)

ſtricta Cand. — 2. Ch. foliis linearibus dentatis fructibusque hiſpidis, ſeminibus alatis. *Regio Kirgiſorum.* (Raphanus ſtrictus Fiſch.)

fibirica Cand. 3. Ch. foliis omnibus finuato-pinnatifidis fructibusque glabris. *Sibir.* (Raphanus fibiricus L.)

iberica Cand. 4. Ch. foliis linearibus runcinato-dentatis, fructibus hirtis ftylum enfiformem aequantibus. *Caucaf. orient.* (Raphanus ibericus MB.)

2273. ENARTHROCARPUS Labill.

arcuatus Labill. 1. E. fructibus teretibus toruloſis ſcabris, racemis terminalibus elongatis. *Libanus.*

lyratus Cand. 2. E. fructibus compreſſis ſtriatis ſubſeſſilibus baſi foliatis remote racemoſis. *Aegypt.* (Raphanus lyratus Forsk., recurvatus Perſ. Delil.)

pterocarpus Cand. 3. E. fructibus compreſſis marginato-alatis longe acuminatis breviter pedunculatis baſi foliatis ſubracemoſis. *Aegypt.* (Raphanus pterocarpus Perſ. Delil.)

2274. RAPHANUS.

ſativus 1. R. ſiliquis teretibus acuminatis pluriloculariſus fungoſis ſeptatis pedicellos aequantibus. *China.*

biarticulatus W. 2. R. ſiliquis teretibus acuminatis 1locularibus fungoſis pedicellos ſuperantibus. *China.*

caudatus 3. R. ſiliquis depreſſis acuminatis fungoſis 1locularibus tota planta longioribus. *Java.*

*odeſſanus** 4. R. ſiliquis 1locularibus 8angulis ſulcatis ſtylum compreſſum aequantibus, foliis ſublyratis alterne runcinatis. *Ad Odeſſam.* (Raphaniſtrum odeſſanum Andrz. Beſſ.)

roſtratus Cand. 5. R. ſiliquis 1locularibus ſtylo conico ſubulato brevioribus. *Perſia bor.*

Raphaniſtrum 6. R. ſiliquis 1locularibus ſtylo longioribus, calyce colorato, foliis ſimpliciter lyratis, radice annua. *Europ. omnis.* (Raphaniſtrum Lampſaka Gärtn. Rapiſtrum arvenſe All.)

maritimus Sm. 7. R. ſiliquis 1locularibus ſtylo longioribus, calyce vireſcente, foliis interrupte lyratis, radice perenni. *Anglia. Italia ſuperior.* (R. Landra Morett. Cand.)

2275. CLYPEOLA.

Ionthlaſpi 1. Cl. ſiliculis glabrinsculis ciliatis, caule diffuſo. *Europ. auſtr. Aſia med.* (Alyſſum repens Baumg.?)

eriophora Cand. 2. Cl. ſiliculis emarginatis dentatis floccoſo-lanatis, caule erecto. *Hiſpania.* (Alyſſum eriophorum Pourr. W., Veſicaria lanuginoſa Poir. Orium Desv.)

echinata Cand. 3. Cl. ſiliculis dentatis ſetoſo-echinatis, caule erecto, calycibus deciduis. *Aſia minor. Ad Tigrim.* (Cl. laſiocarpa Perſ., Bergeretia Desv.)

2276. TAUSCHERIA Fiſch.

laſiocarpa Fiſch. 1. T. ſiliculis hinc villoſis, foliis ſagittatis. *Regio Kirgiſorum.*

gymnocarpa Fiſch. 2. T. ſiliculis glabris, foliis cordato-ſagittatis. *Regio Kirgiſorum.*

2277. ISATIS.

* *Siliculis marginato-alatis haud dehiſcentibus.*

Garcini Cand. 1. I. ſiliculis obovatis obtuſiſſimis apice 2tuberculatis, foliis oblongis utrinque attenuatis. *Perſia.* (Peltaria Garcini N. L. Burm. W.)

armena 2. I. ſiliculis cordato-orbiculatis ſtylo coronatis, foliis cordato-ſagittatis ſubdenticulatis. *Armenia. Caucaſ.* (Sameraria Desv.)

latiſiliqua Stev. 3. I. ſiliculis ellipticis obtuſis ſeſſilibus, ſtigmate ſeſſili, foliis cordato-ſagittatis. *Aſia minor. Caucaſ.* (I. cappadocica Desv.)

leiocarpa Cand. 4. I. ſiliculis ovali-oblongis ſtigmate ſeſſili ſubtruncatis ſeſſilibus, foliis ſagittatis. *Libanus.* Labillard.

luſitanica Brot. 5. I. ſiliculis obovatis obtuſiſſimis emarginatis, foliis cordato-ſagittatis. *Luſitan.* (I. glauca W. herb.)

** *Siliculis margine ſuberoſis ſubdehiſcentibus.*

alpina All. 6. I. ſiliculis ovali-oblongis utrinque obtuſis margine ſubfoliaceo-alatis, foliis acute ſagittatis. *Alp. cott. Apennin.*

praecox Kit. 7. I. ſiliculis ellipticis utrinque obtuſis margine coriaceo-alatis glaberrimis. *Hungar. Ad Volgam.*

litoralis Cand. 8. I. ſiliculis oblongo-cuneatis truncato-emarginatis glaberrimis, loculis utrinque exſertis ſulco ab ala distinctis. *Tauria.*

hebecarpa Cand. 9. I. ſiliculis oblongo-cuneatis apice rotundato-obtuſiſſimis villoſis, loculis eſulcis. *Tauria.*

tinctoria 10. I. ſiliculis ſpathulatis obtuſis glabris, calyce corollam ſubaequante. *Europ. auſtr.* (I. alpina Vill. var. fol. hirſutis. I. campeſtris Stev., taurica M. B., heterocarpa Andrz. et maeotica Cand. pariter varr.)

saneſcens Cand. 11. I. ſiliculis ſpathulato-linearibus obtuſis margine baſique incano-villoſis, corolla calycem excedente. *Gallia auſtr. Ad litora Ponti.* (I. iberica Stev.)

oblongata Cand. 12. I. ſiliculis elliptico-oblongis utrinque attenuatis glabris, loculo centrali complanato ſubtrinervio. *Sibir.*

orientalis W. 13. I. ſiliculis oblongo-linearibus ſtigmate ſeſſili apiculatis acutiuſculis pubeſcentibus. *Aſia minor.*

aleppica Scop. 14. I. ſiliculis linearibus obtuſis retrorſum villoſis. *Graecia. Aſia minor. Syria.* (I. aegyptiaca et luſitanica L.?)

2278. BISCUTELLA.

* *Calycibus baſi bicalcaratis.*

cichoriifolia Loiſ. 1. B. ſiliculis utrinque emarginatis punctato-aſperiusculis, foliis ſuperioribus oblongis ſinuato-dentatis cauleque villoſis. *Pyrenaei.* (B. picridifolia var. Lapeyr.)

hiſpida Cand. 2. B. ſiliculis utrinque ſubrectilineis ſcabris, foliis oblongis ſinuatis hiſpidis, caule hirto. *Gallia auſtr. Italia.*

auriculata 3. B. ſiliculis glabris apice confluentibus, foliis oblongo-lanceolatis dentatis glabriusculis, caule hiſpido. *Europ. med. et auſtr. Afric. bor.* (B. erigerifolia Cand. var.)

** *Calycibus baſi aequalibus.*

† *Fruticoſae: ſiliculis axin ſtyliferum tantum tangentibus.*

peruviana Lam. 4. B. ſtylo breviſſimo, foliis oblongis ſubcoriaceis ſerratis venoſo-lineatis glaberrimis. *Peru. Chili.* (Cremolobus Cand.)

ſuffruticoſa Cand. 5. B. ſtylo elongato, foliis oblongo-lanceolatis ſerratis glabris. *Peru.* (Cremolobus Cand. ſyſt.)

†† *Perennes: ſiliculis cum axi ſtylifero coalitis.*

megalocarpa Fiſch. Cand. 6. B. ſiliculis glabris apice emarginatis baſi ſubdecurrentibus, foliis 2pinnatifidis hiſpidis. *Sibir. auſtr.* (B. laciniata W. herb.)

montana Cav. 7. B. ſiliculis utrinque emarginatis laevibus, foliis inferioribus obovatis groſſe dentatis tomentoſis. *Hiſpan. auſtr.* (B. obovata Cand. var.)

laevigata 8. B. ſiliculis utrinque emarginatis laevibus, foliis lineari-lanceolatis ſubdentatis cauleque inferne pubeſcentibus. *Europ. auſtr.* (B. alpeſtris Kit.)

coronopifolia 9. B. ſiliculis utrinque emarginatis laevibus, foliis hiſpidis, inferioribus ſinuato-dentatis oblongis, ſuperioribus ſemiamplexicaulibus. *Europ. auſtr.* (B. ambigua Cand. Siſymbrium valentinum L.?)

lucida Cand. 10. B. ſiliculis utrinque emarginatis laevibus, foliis ſpathulatis nitidis glaberrimis dentatis integerrimisque. *Neapol.* (B. ſubſpathulata Lam.)

ſaxatilis Cand. 11. B. ſiliculis utrinque emarginatis ſcabris, foliis ſpathulato-linearibus hiſpidis dentatis integerrimisque. *Europ. auſtr.* (B. didyma et intermedia Gouan., longifolia Vill., mollis Loiſ., ſubſpathulata Suter.)

ſempervirens 12. B. ſiliculis utrinque emarginatis ſcabris, foliis ſubradicalibus linearibus ſubintegerrimis incano-tomentoſis, ſcapo nudo. *Hiſpan. Luſitan.*

tomentoſa Lag. 13. B. ſiliculis pubeſcentibus punctato-ſcabris, foliis radicalibus ſpathulatis repando-dentatis, caulinis cordato-ovatis cauleque molliſſimo tomentoſis. *Hiſpan.*

††† *Annuae.*

α. *Siliculis apice confluentibus.*

chilenſis Cand. 14. B. ſiliculis glabris pendulis, foliis lanceolatis remote ſerratis laevibus. *Chili.* (B. cuneata Lag. Cremolobus chilenſis Cand. ſyſt.)

β. *Siliculis utrinque emarginatis.*

raphanifolia Poir. 15. B. ſiliculis glaberrimis, foliis radicalibus lyratis ſcabris, caulinis obovatis dentatis, caule ſuperne glabro. *Sicil. Mauritan.* (B. leiocarpa Cand.)

lyrata 16. B. ſiliculis pubeſcentibus, foliis radicalibus lyratis elongatis, caulinis lanceolatis acuminatis, caule ſuperne hiſpido. *Europ. auſtr. Afric. bor.*

maritima Tenor. 17. B. ſiliculis diſco glabris margine pubeſcentibus ciliatis, foliis radicalibus obovatis dentatis hiſpidis, caule nudiusculo. *Neapol. Aegypt.* (B. depreſſa W. Delil. var.?)

ciliata Cand. 18. B. ſiliculis diſco glabris margine ciliatis, foliis oblongis remote dentatis cauleque folioſo hiſpidis. *Europ. auſtr.* (B. didyma et coronopifolia W.)

apula 19. B. ſiliculis pubeſcentibus, foliis lanceolatis ſerratis cauleque folioſo ramoſo hirſuto. *Italia. Sicilia. Graecia.*

Columnae Tenor. 20. B. ſiliculis ſubpubeſcentibus ſcabris, foliis radicalibus obovatis dentatis cauleque nudiusculo baſi hiſpido. *Neapol. Hiſpania.* (B. didyma β. L., microcarpa Cand.)

eriocarpa Cand. 21. B. ſiliculis diſco hiſpidis, foliis obovatis ſubdentatis cauleque ſuperne nudo baſi hirſutiusculis. *Mauritania.* Brouſſonet.

2279. PELTARIA.

alliacea 1. P. foliis caulinis ſagittato-amplexicaulibus, fructibus laevibus. *Auſtria. Transſylvan. Ital. ſuper.*

glaſtifolia Cand. 2. P. foliis caulinis ſagittato-amplexicaulibus, fructibus rugulosis coriaceis. *Syria. Meſopotamia.*

anguſtifolia Cand. 3. P. foliis inferioribus petiolatis oblongis ſuperioribus linearibus, fructibus laevibus. *Syria.*

2280. EUCLIDIUM R. Br.

ſyriacum R.Br. 1. E. fructibus hiſpidis, ſtylo ſubulato perſiſtente, foliis caulinis petiolatis oblongo-lanceolatis dentatis ſcabris. *Auſtria. Hungar. Transſylvan. Podolia. Aſia minor et media.* (Anaſtatica L., Bunias Gärtn. Myagrum ſyriacum Lam., roſtratum Scop., rigidum Pall.)

tataricum Cand. 2. E. fructibus glabris, ſtylo demum deciduo, foliis caulinis linearibus ſeſſilibus ciliatis. *Ad Volgam et in Tauria.* (Vella tenuiſſima Pall., Bunias tatarica W.)

II.
SILICULOSAE.

2281. LUNARIA.

rediviva 1. L. filiculis lanceolatis utrinque attenuatis. *Europ. austr.*

biennis Mönch. 2. L. filiculis ellipticis (utrinque rotundatis). *Europ.* (L. annua L.)

2282. RICOTIA.

Lunaria Cand. 1. R. foliis sub-2pinnatis, foliolis oblongis incisodentatis. *Syria.* (Cardamine Lunaria et Ricotia aegyptiaca L.)

tenuifolia Sibth. 2. R. foliis sub-2pinnatifidis, laciniis linearibus. *Asia minor.*

2283. ALYSSUM.

* *Floribus flavis.*

† *Filamentis appendiculatis.*

α. *Suffruticosa.*

saxatile 1. A. foliis oblongo-lanceolatis integerrimis ramisque subtomentoso-canescentibus, racemis paniculato-corymbosis. *Podolia.*

gemonense 2. A. foliis oblongis obtusis repando-dentatis ramisque subtomentoso-canescentibus, racemis subsimplicibus, filiculis glabris ovali-orbiculatis. *Saxonia. Austria. Transylvania.*

orientale Ard. 3. A. foliis oblongo-lanceolatis repando-undulatis incano-tomentosis, racemis compositis, filiculis transverse ovalibus glabris. *Creta. Ins. maris aegei. Asia minor.* (Clypeola tomentosa L.)

spathulatum Steph. 4. A. foliis minutis orbiculato-spathulatis integerrimis candido-tomentosis, racemo simplici, filiculis orbiculatis glabris. *Sibir. bor.* (A. cretaceum Adam.)

argenteum W. 5. A. foliis obovato-spathulatis supra stellato-pubescentibus incanis subtus lepidoto-argenteis, filiculis suborbiculatis villosis, seminibus submarginatis. *Alp. grai. cott. Tauria. Sibir.* (Lunaria argentea All. Al. murale M. B., spathulatum Adam., obtusifolium Stev. Cand.)

murale Kit. 6. A. foliis oblongis acutiusculis supra filiculisque stellato-pubescentibus subtus ramisque virgatis dense albido-tomentosis, seminibus haud marginatis. *Italia. Hungar. Transylvan.* (A. argenteum Bertol., Bertolonii Desv. Cand.)

savranicum Andrz. 7. A. foliis spathulato-linearibus stellato-pubescentibus incanis subtus dense tomentosis, ramis ascendentibus diffusis, floribus minutis, filiculis incano-pubescentibus. *Podolia.*

atlanticum Desf. 8. A. foliis lanceolatis ſtellato-pubeſcentibus *incanis* ciliatis, ſiliculis pubeſcentibus convexis ſtylum aequantibus. *Creta. Atlas.*

ſerpyllifolium Desf. 9. A. foliis incanis, inferioribus obovatis ſuperioribus lanceolatis, ſiliculis obovatis planiſſimis pubeſcentibus. *Afric. bor. Hiſpan.*

alpeſtre 10. A. foliis obovato-ſpathulatis ſtellato-pubeſcentibus ſublepidotis incanis, ſiliculis ovato-oblongis planis caneſcentibus. *Europ. med. et auſtr.*

tortuoſum Kit. 11. A. foliis ſpathulatis ſtellato-pubeſcentibus incanis, ramis flexuoſis, ſiliculis ellipticis planis incano-tomentoſis, ſeminibus haud marginatis. *Hungar. Transſylv. Podolia. Tauria.* (A. ſerpyllifolium M. B. A novum Winterl. ind. peſt.)

nebrodenſe Tin. 12. A. foliis roſaceo-congeſtis obovatis utrinque candido-tomentoſis, caule humili, ſiliculis ellipticis ſtellato-pubeſcentibus planis ſtylo longioribus, ſeminibus haud marginatis. *Sicil.*

Marſchallianum Andr. 13. A. foliis incanis, inferioribus obovatis ſuperioribus oblongo-linearibus, ſiliculis ellipticis caneſcentibus convexis ſtylo longioribus, ſeminibus haud marginatis. *Tauria. Caucaſ.* (A. alpeſtre M. B.)

lenenſe Adam. 14. A. foliis imbricatis lanceolatis ſtellato-tomentoſis, racemis abbreviatis, ſiliculis emarginatis incanis ſtylum aequantibus. *Sibir.*

lanigerum Cand. 15. A. foliis obovatis tomentoſo-lanatis, racemis corymboſis, ſiliculis ellipticis villoſo-tomentoſis ſtylum ſubaequantibus. *Perſia.*

montanum 16. A. foliis ſpathulatis candido-tomentoſis, ramis diffuſis aſcendentibus, racemis ſimplicibus, ſiliculis ſuborbiculatis caneſcentibus ſtylum ſubaequantibus. *Europ. med.* (A. arenarium Loiſ., diffuſum et cuneifolium Tenor. varr.)

Wulffenianum Bernh. 17. A. foliis lineari-lanceolatis remotis incanis, racemis ſimplicibus, filamentis omnibus appendiculatis, ſiliculis ellipticis ſtellato-pubeſcentibus ſtylum aequantibus. *Carinthia.*

gnaphalodes Cand. 18. A. foliis ellipticis villoſo-tomentoſis, rameis linearibus, racemis ſimplicibus, calycibus clauſis pedicello longioribus, ſiliculis ellipticis villoſis ſtylo duplo longioribus. *Perſia.*

petalodes Cand. 19. A. foliis obovato-oblongis ſubdentato-ſinuatis hirſutis, racemis ſimplicibus, calycibus denſis pedicello longioribus, ſiliculis ovatis margine villoſis. *Syria.* Labillard.

β. Herbacea.

ſibiricum W. 20. A. foliis obovato-oblongis ſtellato-pubeſcentibus incanis, ſiliculis orbiculatis demum glabris, ſtylo elongato, ſeminibus haud marginatis. *Sibir.* (A. Fiſcherianum Cand. var.)

umbellatum Desv. 21. A. foliis lineari-lanceolatis ſtellato-pubeſcentibus, racemis conferto-corymboſis, filamentis longioribus edentulis, ſiliculis ellipticis ſtellato-

pubeſcentibus incanis. *Tauria.* (A. brachyſtachyon M. B.)

roſtratum Stev. 22. A. foliis oblongo-lanceolatis ſtellato-pubeſcentibus ſcabris, ramis erectis racemoſo-paniculatis, ſiliculis ellipticis incano-piloſis ſtylo longo roſtratis. *Beſſarabia. Tauria.*

paroviflorum M. B. 23. A. foliis lanceolatis ſtellato-pubeſcentibus vilioſis, calycibus corollam ſubaequantibus, ſiliculis convexis hirſutis ſtylo breviusculo roſtratis. *Caucaſ.*

hirſutum M.B. 24. A. foliis oblongo-lanceolatis hirſutis, caule ſimpliciusculo erecto, ſiliculis orbiculatis tuberculato-hirſutis convexiusculis ſtylo breviusculo coronatis, ſeminibus marginatis. *Tauria. Caucaſ.* (A. Draba W.)

campeſtre 25. A. foliis oblongo-linearibus ſtellato-pubeſcentibus hirſutiusculis, calycibus deciduis corolla minoribus, filamentis omnibus appendiculatis, ſiliculis orbiculatis tuberculato-hirſutis ſtylo breviusculo coronatis, ſeminibus ſubalatis. *Gallia. Hiſpan. Italia. Graecia.*

calycinum 26. A. foliis lineari-lanceolatis baſi attenuatis ſtellata pube caneſcentibus, calycibus perſiſtentibus ungues petalorum marcidorum aequantibus, filamentis longioribus edentulis, ſiliculis orbiculatis pubeſcentibus ſ. glabriuſculis convexis ſtylo brevi coronatis, ſeminibus marginatis. *Europ. med.* (A. campeſtre Hofm. Schk.)

minimum W. 27. A. foliis linearibus incano-hirſutis, calycibus deciduis, ſiliculis orbiculatis medio convexis glaberrimis ſtylo brevi deciduo coronatis. *Auſtria. Podolia. Tauria.*

minutum Schlechtend. 28. A. pygmaeum, foliis ſtellata pube villoſis, radicalibus ovalibus petiolatis, caulinis oblongo-linearibus, calycibus demum deciduis, ſiliculis orbiculatis glabris. *Sibir.*

glomeratum Burch. 29. A. foliis obovato-oblongis villoſis, racemis confertis folioſis, calycibus perſiſtentibus, filamentis omnibus appendiculatis, ſiliculis orbiculatis glabris. *Afric. auſtr.*

fulveſcens Sm. 30. A. foliis ſtellata pube caneſcentibus, infimis obovatis petiolatis, ſummis oblongis, calycibus perſiſtentibus, filamentis longioribus edentulis, ſiliculis ovato-globoſis glabris. *Peloponneſ. Inſ. maris aegei.*

†† *Filamentis omnibus edentulis.*

edentulum Kit. 31. A. foliis ſubtus incano-villoſiuſculis, inferioribus obovato-oblongis repando-ſinuatis, ſuperioribus lanceolatis, racemis paniculatis, calycibus patulis, petalis 2fidis, ſiliculis glabris ſubinflatis. *Hungar. Tranſylvan.* (Veſicaria Poir.)

daſycarpon Steph. 32. A. foliis oblongis ſtellata pube caneſcentibus, pedicellis breviſſimis, petalis emarginatis calycem ſubaequantibus, ſiliculis convexis ſtellato-pubeſcentibus hirſutis. *Ad Volgam.* (A. ſibiricum Trevir.)

**** *Floribus albis.***

† *Suffruticosa: filamentis edentulis.*

***maritimum* Lam.** 33. A. foliis lineari-lanceolatis acutis canescentibus, ramis diffusis ascendentibus, racemis elongatis, siliculis orbiculatis glabris. *Ad oras maris mediterr.* (Clypeola maritima, Alyssum halimifolium et minimum L. Lepidium fragrans W. in Usteri mag.)

***rupestre* Tenor.** 34. A. foliis argenteis, inferioribus oblongo-lanceolatis superioribus linearibus, siliculis obovatis flocculoso-lepidotis stylo brevi mucronatis. *Neapol.*

***halimifolium* W.** 35. A. foliis obovato-spathulatis candido-tomentosis, floribus corymbosis, siliculis orbiculatis planis glabris stylo coronatis. *Italia super.* (Lunaria All.)

spinosum 36. A. foliis minutis oppositis stellato-tomentosis argenteis, ramis demum spinescentibus, siliculis subrotundis stellato-pubescentibus. *Hispan. Gallia austr.* (Draba spinosa Lam.)

***macrocarpon* Cand.** 37. A. foliis spathulatis subtus argenteo-lepidotis, racemis paucifloris, siliculis oblongis subinflatis glaberrimis stylo coronatis, seminibus alatis. *Montes Gebenn. Galliae austr.*

***pyrenaicum* Lapeyr.** 38. A. foliis obovatis subtus incano-villosis, ramis crassis lignosis, siliculis oblongis utrinque attenuatis stellato-pubescentibus stylo longo coronatis. *Pyrenaei montes.*

***canescens* Cand.** 39. A. foliis oblongo-linearibus incano-tomentosis, floribus corymbosis, siliculis ellipticis stellato-villosis stylo longo terminatis. *Sibir. Camtschatca.*

***tenuifolium* Steph.** 40. A. foliis linearibus acutis stellato-villosis, siliculis ovalibus incano-hirsutis stylo terminatis. *Sibir.*

†† *Herbacea.*

***densiflorum* Desf.** 41. A. foliis lineari-lanceolatis stellata pube incanis, floribus dense confertis racemosis, siliculis orbiculatis pubescentibus. *Armenia.* (A. strictum W.)

hyperboreum 42. A. foliis oblongis grosse dentatis hirsutiusculis glaucescentibus, floribus corymbosis, filamentis majoribus denticulatis, siliculis ellipticis planis. *Ora occid. Amer. bor.* (Draba hyperborea Desv.)

2284. PETROCALLIS R. Br.

***pyrenaica* R. Br.** *Alp. Europ. austr.* Herba caespitosa ramosissima, foliis 3-5fidis cuneatis linearibus glabris ciliatis, floribus subcorymbosis roseis. (Draba L.)

2285. HUTCHINSIA R. Br.

*Foliis indivisis.

rotundifolia R. Br. 1. H. foliis subcarnosis integerrimis glaberrimis, inferioribus subrotundis petiolatis, superioribus oblongis amplexicaulibus, petalis stamina, siliculis subemarginatis stylum superantibus. *Alp. Europ. med. et austr.* (Iberis rotundifolia L., Lepidium rotundifolium All.)

cepeaefolia Cand. 2. H. foliis subcarnosis, inferioribus obovato-oblongis dentatis in petiolum decurrentibus, superioribus oblongis sessilibus, petalis stamina, siliculis subemarginatis stylum superantibus. *Carinthia. Apennin.* (Iberis cepeaefolia Wulff.)

pumila Cand. 3. H. foliis subcarnosis, inferioribus ovalibus integerrimis longe petiolatis, caulinis oblongis sagittatis, siliculis utrinque attenuatis stylum superantibus. *Caucas.* (Iberis pumila Stev. M. B.)

styllosa Cand. 4. H. foliis subcarnosis, inferioribus obovato-oblongis petiolatis subintegerrimis, superioribus oblongis subamplexicaulibus, staminibus petala stylo que siliculam oblongam obtusam subaequantibus. *Neapol.* (Iberis stylosa Tenor.)

brevistyla Cand. 5. H. foliis subcarnosis confertis obovatis petiolatis subdentatis, silicula emarginata, stylo brevissimo. *Syria.* Labillard.

trinervia Cand. 6. H. foliis cordato-oblongis amplexicaulibus 3nerviis integerrimis, staminibus petala subaequantibus. *Persia.*

hastulata Cand. 7. H. foliis subhastato-oblongis amplexicaulibus subdentatis, siliculis elongatis truncatis. *Persia.*

**Foliis pinnatis s. pinnatifidis.

calycina Desv. 8. H. foliis decursive pinnatis villosis, foliolis linear-lanceolatis obtusis integerrimis, calycibus persistentibus, siliculis oblongis utrinque attenuatis stylo coronatis. *Sibir.* (Lepidium calycinum Steph. W.)

alpina R. Br. 9. H. foliis decursive pinnatis glabris, foliolis obovato-linearibus, petalis calyce deciduo multo majoribus, siliculis oblongis utrinque attenuatis stylo abbreviato coronatis. *Alp. Europ. med.* (Lepidium alpinum L., Halleri Crantz., Draba alpina Baumg., Nasturtiolum Scop.)

*brevicaulis** 10. H. foliis lyrato-pinnatis, foliolis obovatis, petalis calyce deciduo majoribus, siliculis obovato-oblongis obtusis stylo destitutis. *Summae alpes Carinth.* (Lepidium brevicaule Hopp.)

petraea R. Br. 11. H. foliis decursive pinnatis glabris, foliolis oblongo-linearibus, petalis calycem aequantibus, siliculis ovalibus (utrinque rotundatis) 4spermis, stigmate sessili. *Europ.* (Lepidium petraeum L., Linnaei Crantz.)

procumbens Cand. 12. H. foliis ſinuato-pinnatifidis integrisque glabris, petalis calycem aequantibus, ſiliculis ovalibus ſub 10 ſpermis, ſtigmate ſeſſili. *Thuringia. Hiſpan. Cyprus. Tauria. Ad Volgam.* (Lepidium procumbens L. Thlaſpi Lapeyr.)

2286. IBERIS.

* *Fruteſcentes.*

ſemperflorens 1. I. foliis ſpathulatis integerrimis ſubcoriaceis glabris, floribus corymboſis, ſiliculis transverſe ovalibus (apice haud emarginatis), ſeminibus marginatis. *Sicilia.*

ſempervirens 2. I. foliis oblongo-linearibus obtuſis integerrimis, floribus racemoſo-corymboſis, ſiliculis acute emarginatis. *Italia. Creta.* (I. Garrexiana All. var.)

gibraltarica 3. I. foliis ſubſpathulatis apice dentatis integrisque glabris, floribus corymboſis, ſiliculis acute emarginatis. *Hiſpania.*

Tenorii Cand. 4. I. ſuffruteſcens procumbens, ramis pubeſcentibus, foliis ovato-oblongis ſubcarnoſis denticulato-ciliatis, floribus corymboſis, ſiliculis oblongis utrinque attenuatis (vix emarginatis). *Neapol.* (I. cepeaefolia Tenor.)

Pruiti Tin. 5. I. ſuffruteſcens glabra, foliis ſpathulato-linearibus integerrimis ſubcarnoſis, floribus corymboſis, ſiliculis ſubrotundis acute emarginatis. *Sicil.*

contracta Perſ. 6. I. fruticoſa ramoſiſſima, foliis ſpathulato-linearibus ſubdentatis carnoſis, corymbis umbellatis contractis. *Hiſpania.*

conferta Lag. 7. I. ſuffruticoſa humillima, foliis ſubradicalibus confertiſſimis lineari-lanceolatis acutis glabris ſubcarnoſis, ſcapo racemifero, ſiliculis ovatis (vix emarginatis). *Hiſpania.*

ſaxatilis 8. I. foliis linearibus acutiusculis integerrimis ſubciliatis, floribus corymboſis, ſiliculis emarginatis. *Europ. auſtr.* (I. vérmiculata W.)

pubeſcens W. 9. I. ſuffruticoſa procumbens, foliis ſpathulatis obtuſe dentatis ſubſinuatis ciliatis, floribus corymboſis, ſiliculis ſubrotundis acute emarginatis, ſtylo elongato. *Hiſpania.* (I. Lagaſcana Cand.)

ſubvelutina Cand. 10. I. fruteſcens, foliis linearibus acutis integerrimis villoſis, floribus racemoſis, ſiliculis acute emarginatis. *Hiſpania.* (I. ſempervirens Lag.)

cappadocica W. 11. I. fruteſcens humilis, foliis ſtrigoſis, inferioribus ſpathulatis ſuperioribus linearibus acutis, floribus corymboſis. *Aſia minor.*

** *Herbaceae: floribus racemoſo-corymboſis, ſiliculis emarginatis.*

carnoſa W. 12. I. foliis ſpathulatis integerrimis ſubcarnoſis glabris baſi ciliatis. *Pyren.* (I. cepeaefolia Pourr., ſpathulata Cand., rotundifolia Lam.)

pyrenaica Lapeyr. 13. I. foliis ellipticis integerrimis glabris subcarnosis, inferioribus oppositis superioribus alternis. *Pyren.*

nana All. 14. I. humilis, foliis subrotundo-spathulatis integerrimis subcarnosis glabris. *Gallia austr. Pedemont.* (I. aurosica Vill.)

violacea R.Br. 15. I. ramosa, foliis spathulatis petiolatis obtusis dentatis integerrimisque ciliatis, calycibus dorso pilosiusculis. *Patria?*

ciliata W. 16. I. subramosa, foliis spathulato-linearibus integerrimis ciliatis. *Gallia. Italia. Tauria.* (I. taurica Cand.)

linifolia 17. I. foliis linearibus sparsis integerrimis glabris. *Europ. austr.*

umbellata 18. I. foliis lineari-lanceolatis acuminatis inferioribus serratis superioribus integerrimis. *Italia. Hispania. Graecia.*

amara 19. I. foliis lanceolatis apice dilatatis dentatis acutis glabris, floribus racemosis. *Europ.* (I. intermedia Guers. var. ♂.)

odorata 20. I. foliis linearibus apice dilatatis serratis glabris basi ciliatis, floribus corymbosis. *Creta.*

pinnata 21. I. foliis linearibus pinnatifidis ramisque pilosis, floribus corymbosis. *Europ. austr.* (I. crenata Lam.)

2287. TEESDALIA R. Br.

Iberis Cand. 1. T. petalis inaequalibus, exterioribus majoribus. *Europae arenosa.* (Iberis nudicaulis L. Guepinia Bât. Cand.)

Lepidium Cand. 2. T. petalis aequalibus. *Europ. austr. Afric. bor.* (Lepidium nudicaule L., Thlaspi nudicaule Desf. Guepinia Lepidium Desv., Teesdalia regularis Sm.)

2288. MENONVILLEA Cand.

linearis Cand. *Peru. Chili.* Herba suffruticosa, foliis linearibus, inferioribus serratis superioribus integerrimis, floribus racemosis.

2289. ANASTATICA.

hierochuntica *Aegypt. Palaestina.* Herba humilis ramosa pubescens, foliis oblongis, floribus racemosis albis parvis.

2290. LEPIDIUM.

*Fruticosa.

oppositifolium Labill. 1. L. foliis oppositis amplexicaulibus orbiculatis integerrimis glaucis subcarnosis, racemis elongatis, siliculis emarginatis. *Libanus.* (Iberis Pers., Thlaspi Poir., Lepia Desv., Eunomia Cand.)

*chloraefolium** 2. L. foliis oppositis subrotundis crenulato-scabris amplexicaulibus, floribus corymbosis, siliculis

emarginatis. *Olymp. Asiae minoris.* (Iberis chloraefolia Sibth. Sm. Eunomia Cand.)

*Tournefortii**. 3. L. foliis alternis cordato-ovatis amplexicaulibus glaucis, filiculis margine subdentatis. *Armenia. Syria.* (Thlaspi cordatum Desf., Myagrum chloraefolium W., Ennomia Cand.)

subdentatum Burch. 4. L. foliis alternis oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis apice dentatis, summis linearibus integerrimis, racemis oppositifoliis, floribus minimis diandris, siliculis ellipticis obtuse emarginatis. *Afric. austr.*

†*fruticulosum* Desv. 5. L. foliis obovato-oblongis apice dentatis subcarnosis, ramis divaricatis, siliculis ovatis obtusis astylis. *Nov. Holl.* (L. Novae Hollandiae Desv.)

suffruticosum 6. L. foliis inferioribus cuneato-linearibus apice dentatis, caulinis linearibus integerrimis, floribus racemosis, siliculis ovatis apice attenuatis astylis. *Hispania.* (L. graminifolium Cav.)

subulatum 7. L. foliis lineari-subulatis integerrimis confertis, racemis subpaniculatis, floribus parvis, siliculis ovatis subemarginatis. *Hispania.*

divaricatum Ait. 8. L. foliis inferioribus pinnatifidis, laciniis divaricatis acutis, superioribus linearibus subincisis, caule ramosissimo, floribus minimis, siliculis ovalibus subemarginatis. *C. B. S.*

africanum Cand. 9. L. foliis lyratis, laciniis incisis, summis linearibus integerrimis, racemis elongatis, siliculis ellipticis stigmate sessili apiculatis. *C. B. S.*

lineare Cand. 10. L. foliis inferioribus pinnatifidis, laciniis oblongis, caulinis lineari-subulatis integerrimis, calycibus pubescentibus, siliculis ovatis.

†*pinnatum* Thunb. 11. L. foliis fasciculatis pinnatifidis glabris, siliculis emarginatis. *C. B. S.*

bipinnatum Thunb. 12. L. foliis radicalibus 2-3pinnatis glabris, laciniis filiformibus, superioribus 3fidis. *C. B. S.*

***Herbaceae.*

†*Siliculis apice attenuatis s. rotundatis, haud emarginatis.*

α. Foliis indivisis.

Draba 13. L. foliis cordato-sagittatis amplexicaulibus oblongis dentatis, racemis corymbosis, siliculis ovatis turgidis stylo coronatis. *Europ. med. et austr.* (Cochlearia Draba L. spec. 2. Cardaria Desv. Cardiolepis Wallr.)

chalcense 14. L. foliis sagittato-lanceolatis amplexicaulibus dentatis, siliculis ellipticis compressis stylo coronatis. *Syria.* (L. oxyotum Cand.)

glastifolium Desf. 15. L. foliis caulinis cordato-oblongis amplexicaulibus basi subdentatis, siliculis obovato-ellipticis stylo coronatis. *Numidia.* (Thlaspi Poir.)

amplexicaule W. 16. L. foliis caulinis sagittato-lanceolatis amplexicaulibus apice dentatis, siliculis subrotundis stylo terminatis. *Sibir.*

† *cordatum* W. herb. 17. L. foliis caulinis cordato-oblongis integerrimis amplexicaulibus glaucis, siliculis ellipticis. *Sibir.*

flexuosum Thunb. 18. L. foliis caulinis semiamplexicaulibus oblongo-linearibus basi nervosis, siliculis ovatis stylo brevissimo apiculatis, caule decumbente flexuoso. *Afric. austr.*

crassifolium Kit. 19. L. foliis carnosis, inferioribus petiolatis ovalibus nervosis, superioribus sagittato-ovatis amplexicaulibus, siliculis ovatis obtusis stylo brevissimo apiculatis. *Hungar. Tauria. Ad Volgam.* (L. verrucosum Cand.)

latifolium 20. L. foliis ovato-oblongis dentato-serratis, infimis longe petiolatis summis subsessilibus, racemis paniculatis, siliculis ovatis stigmate apiculatis. *Europ. Sibir.* (L. affine Ledeb. var.)

crispum Desv. 21. L. foliis obovatis profunde dentatis subcrispis carnosis, siliculis subovalibus stigmate apiculatis. *Nov. Holl. austr.*

iberioides Desv. 22. L. foliis linearibus, inferioribus apice dentatis, siliculis ellipticis. *Inf. Mascaren.*

β. Foliis divisis.

coronopifolium Fisch. 23. L. foliis radicalibus lyrato-pinnatifidis, laciniis lineari-lanceolatis distantibus, summis linearibus integerrimis, ramis paniculatis, siliculis lanceolatis stylo coronatis. *Ad Volgam et in Sibir. austr.*

lyratum 24. L. foliis lyratis, laciniis inciso-dentatis, siliculis ovatis stigmate apiculatis. *Armenia.*

Iberis 25. L. foliis inferioribus lanceolatis subpinnatifidis vel, inciso-serratis, superioribus linearibus integerrimis, caule ramosissimo, siliculis ovatis stigmate apiculatis. *Europ. med. et austr.* (L. graminifolium L.)

capense Thunb. 26. L. foliis inferioribus oblongis pinnatifidis, superioribus lanceolatis serratis, summis linearibus integerrimis, floribus 2andris, siliculis ovatis stigmate apiculatis. *C. B. S.*

†† *Siliculis emarginatis.*

α. Foliis indivisis.

campestre R.Br. 27. L. foliis sagittatis subdentatis pubescentibus, siliculis subalatis lepidoto-punctatis. *Europ.* (Thlaspi campestre L., Iberis Wallr.)

hirtum Hook. 28. L. foliis sagittatis subdenticulatis villosis, siliculis oblongis profunde emarginatis hirsutis. *Anglia. Scotia. Europ. austr.* (Thlaspi L.)

rotundum Cand. 29. L. foliis caulinis lanceolato-linearibus acutiusculis subcarnosis siliculisque profunde emarginatis glabris. *Nov. Holl. versus Africum.* (Lepia rotunda Desv.)

spinescens Cand. 30. L. foliis superioribus linearibus apice inciso-dentatis, ramis divaricatis apice spinescentibus, siliculis laevibus emarginatis, stylo brevissimo. *Syria.*

virginicum 31. L. foliis lineari-lanceolatis inciso-serratis glabris, siliculis orbiculatis emarginatis laevibus. *Amer. bor.*

hyssopifolium Desv. 32. L. foliis lineari-lanceolatis remote denticulatis glabris, ramis subpubescentibus, siliculis ovalibus obtuse emarginatis. *Nov. Holl.*

caespitosum Desv. 33. L. foliis radicalibus confertis linearibus pilosis glaucis persistentibus, racemo paucifloro, siliculis ovatis anguste emarginatis. *Armenia.*

spicatum Desv. 34. L. foliis linearibus integerrimis erectis glabris, floribus subspicatis, siliculis orbiculatis emarginatis laevibus. *Ad fret. Magellan.*

oleraceum Forst. 35. L. foliis inferioribus oblongis profunde serratis, superioribus cuneato-linearibus apice cuspidato-serratis, siliculis obtuse emarginatis. *Nov. Zeeland. Nov. Holl.* (L. cuneifolium Cand.)

Piscidium Forst. 36. L. foliis oblongo-lanceolatis antice paucidentatis, siliculis obovato-oblongis emarginatis. *Inf. oceani austr.* (L. 2dentatum Montin., L. oleraceum Ait.)

† *foliosum* Desv. 37. L. foliis oblongis obtusis apice dentatis subcarnosis, siliculis ovali-rhombeis emarginatis. *Terra Diemen.*

β. Foliis divisis.

sativum 38. L. foliis pinnatifido-incisis integrisque glabris, siliculis orbiculatis marginatis emarginatis. *Persia. Syria. Aegyptus.* (Thlaspi sativum Crantz. L. obovatum Kit. var. foliis lyratis.)

Humboldtii Cand. 39. L. foliis pinnatifidis glabris, calycibus persistentibus petala superantibus, siliculis ovatis emarginatis stylo brevi apiculatis. *Quito.* (Senebiera dubia Kunth.)

spinosum 40. L. foliis inferioribus pinnatifidis, superioribus linearibus integerrimis, siliculis oblongis bifidis glabris. *Graecia.* (Nil spinosi in herba.)

Menziesii Cand. 41. L. foliis pubescentibus, inferioribus pinnatifidis, laciniis incisis, superioribus linearibus integerrimis, siliculis orbiculatis retusis. *Ora occ. Amer. bor.*

pubescens Desv. 42. L. foliis glabris pinnatifidis, laciniis linearibus dentatis, caule prostrato pedicellisque villosis, siliculis retusis. *Brasil.*

Chichicara Desv. 43. L. foliis glabris pinnatifidis, laciniis denticulatis, superioribus ovato-oblongis inaequaliter dentatis, siliculis obovatis emarginatis. *Brasil.*

bonariense 44. L. foliis pinnatifidis ciliatis, laciniis incisis, caule glabro, floribus minimis diandris, siliculis orbiculatis emarginatis. *Ad fl. Plata.* (Thlaspi multifidum et bonariense Poir.)

Cardamines 45. L. foliis lyrato-pinnatis glabris, foliolis subintegerrimis, floribus parvis, siliculis retusis. *Hispania.*

pestcarium 46. L. foliis pinnatis glabris, foliolis linearibus, geniculis caulinis inflatis, siliculis ellipticis retusis. *Caucas. Persia.*

incisum Roth. 47. L. foliis infimis lyrato-pinnatis, superioribus lato-lanceolatis inciso-dentatis, summis linearibus integerrimis, floribus parvis 2andris, siliculis orbiculatis retusis. *Caucas. Bessarabia.* (L. Pollichii Roth. fl. germ., obovatum Kit., angulosum Urv.)

ruderale 48. L. foliis infimis pinnatifidis superioribus linearibus integerrimis, floribus 2andris apetalis, siliculis ovatis emarginatis. *Europ. omnis.* (Ad Volgam obvia est var. foliis omnibus integerrimis.)

bipinnatifidum Desv. 49. L. foliis 2pinnatifidis, laciniis multifidis, racemis oppositifoliis multifloris, ramis pubescentibus, siliculis ovalibus emarginatis. *Amer. austr.*

perfoliatum 50. L. foliis inferioribus 2pinnatis, laciniis linearibus incisis, superioribus cordatis amplexicaulibus integerrimis, siliculis ellipticis retusis. *Hispania. Austria. Transylvan. Persia. Syria.*

2291. Bivonaea Cand.

lutea Cand. *Sicil.* Herba humilis, foliis cordatis obtusis subdentatis amplexicaulibus glaucis, floribus racemosis luteis. (Thlaspi luteum Bivon.)

2292. Aethionema R. Br.

* *Siliculis bilocularibus.*

coridifolium Cand. 1. Ae. fruticosum, foliis confertis linearibus, inferioribus patulis, silicularum alis integerrimis. *Libanus.*

membranaceum Cand. 2. Ae. fruticulosum, foliis remotis oblongo-linearibus appressis, valvarum alis integerrimis. *Persia.*

stylosum Cand. 3. Ae. fruticulosum, foliis ovato-lanceolatis integerrimis, staminibus majoribus connatis, stylo elongato. *Syria.* (Thlaspi carneum Ruffel.)

saxatile R. Br. 4. Ae. fruticulosum, foliis oppositis obovato-oblongis glaucescentibus, staminibus majoribus dentatis, stylo brevissimo, valvarum alis subintegerrimis vel obsolete crenulatis. *Europ. med. et austr.* (Thlaspi saxatile et peregrinum L., Lepidium et Thlaspi marginatum Lapeyr. Aeth. gracile Cand. valde dubium.)

*cappadocicum** 5. Ae. herbaceum, foliis cordatis amplexicaulibus glaucis integerrimis, siliculis aggregatis, valvarum alis latissimis integerrimis. *Asia minor. Caucas.* (Iberis arabica L., Thlaspi arabicum M. B., Aeth. Buxbaumii Cand.)

cristatum Cand. 6. Ae. herbaceum, foliis ovato-lanceolatis petiolatis glaucis, valvarum alis grosse dentato-cristatis. *Syria. Persia.* (Thlaspi arabicum β. Desv.)

** *Siliculis 1locularibus.*

polygaloides Cand. 7. Ae. suffruticosum, foliis oblongo-linearibus glaucis, siliculis utrinque emarginatis, valvarum alis integerrimis. *Inf. Chios.*

monospermum R. Br. 8. Ae. herbaceum, foliis obovatis ovalibusque coriaceis sessilibus, siliculis emarginatis 1spermis, valvarum alis integerrimis. *Hispania.*

2293. VELLA.

Pseudocytisus 1. V. fruticosa, foliis obovatis rigidiusculis hispidis, floribus laxe spicatis, filamentis majoribus connatis, fructibus glabriusculis. *Hispania.*

annua 2. V. herbacea, foliis pinnatifidis, floribus racemosis, filamentis omnibus liberis, fructibus setosis. *Europ. austr.* (Carrichtera Vellae Cand.)

2294. SUBULARIA.

aquatica *Europ. med. et bor.* Herba aquatica pusilla unguicularis, foliis lineari-subulatis, floribus paucis pedicellatis albis.

2295. FARSETIA Turr. Cand.

* *Fruticosae.*

aegyptiaca Turr. 1 F. foliis linearibus siliculisque ovalibus incano-sericeis, staminibus edentulis. *Aegypt. Afric. bor.* (Cheiranthus Farsetia L., Lunaria scabra et Cheir. linearis Forsk., Farsetia cheiranthoides R. Br.)

suffruticosa Cand. 2. F. foliis lanceolatis integerrimis tomentosis, filamentis minoribus dentatis, siliculis subrotundis glabris. *Persia.* (Lunaria suffruticosa Vent.)

lunarioides R. Br. 3. F. foliis obovato-oblongis petiolatis siliculisque ovalibus tomentosis, filamentis minoribus dentatis. *Inf. maris aegei.* (Alyssum lunarioides et Lunaria graeca W.)

eriocarpa Cand. 4. F. foliis oblongis stellato-pubescentibus, siliculis dense sericeo-lanatis. *Cyprus.*

triquetra Cand. 5. F. foliis obovato-oblongis petiolatis canescentibus, ramis triquetris, staminibus edentulis, silicula elliptica stellato-pubescente, stylo longo deciduo. *Dalmatia.*

mutabilis R. Br. 6. F. foliis lineari-lanceolatis obtusis undulatis stellato-pubescentibus, petalis bilobis, staminibus minoribus basi dentatis, siliculis ellipticis glabris. *Inf. ion.* (Alyssum mutabile Vent. Draba mutabilis Desv.)

obliqua * 7. F. foliis sublinearibus undulatis canescentibus, petalis bifidis, siliculis oblique ellipticis stellato-pubescentibus incanis. *Neapol. Sicil.* (Alyssum obliquum Sm., Berteroa Cand.)

orbiculata * 8. F. foliis incanis, radicalibus oblongis sinuatis, caulinis lanceolatis integerrimis, floribus minimis, siliculis suborbiculatis stylo filiformi coronatis. *Macedonia.* (Alyssum orbiculatum Urv., Berteroa Cand.)

peruviana * 9. F. foliis ovali-oblongis utrinque attenuatis stellato-pubescentibus, pedicellis bracteatis, petalis obcordatis, staminibus edentulis, siliculis ovato-oblongis scabris. *Peru.* (Berteroa Cand.)

** *Herbaceae.*

incana R. Br. 10. F. foliis lanceolatis incanis, petalis 2fidis, siliculis ovali-oblongis pubescentibus. *Europ.* (Alyssum L., Draba cheiranthifolia Lam., Mönchia incana Roth, Vesicaria Desv., Berteroa Cand.)

clypeata R. Br. 11. F. foliis oblongis repandis stellato-pubescentibus hirsutiusculis, petalis integris, siliculis oblongis pubescentibus. *Sicilia. Graecia. Tauria. Asia minor.* (Alyssum clypeatum L., Draba Lam., Lunaria canescens W.)

parviflora * 12. F. foliis glabris, inferioribus obovato-oblongis crenatis, superioribus linearibus, siliculis corymbosis longe pedicellatis glabris. *Aegypt.* (Lunaria parviflora Delil., Savignia Cand.)

libyca * 13. F. foliis subspathulato-linearibus integerrimis, siliculis corymbosis hispidiusculis. *Afric. boreal.* (Lunaria libyca Viv.)

linifolia Andrz. 14. F. foliis linearibus integerrimis cano-pubescentibus, siliculis ellipticis glaberrimis. *Hispania. Podol. Caucas. Syria.* (Alyssum minimum Pall., linifolium et illyricum W., linearifolium Lag., Meniocus serpyllifolius Desv., linifolius Cand.)

2296. AUBRIETIA Adans.

deltoidea Cand. 1. A. caule procumbente, foliis subspathulatis utrinque 1dentatis siliculisque villosis, stylo elongato. *Neapol. Sicil. Creta. Asia minor.* (Alyssum deltoideum L., Farsetia R. Br., Vesicaria Poir., Draba hesperidiflora Lam., Arabis purpurea Sibth.)

† *lepidioides* * 2. A. caule erecto, foliis pinnatis subcarnosis linearibus, siliculis corymbosis glabris, stylo elongato. *C. B. S.* (Peltaria capensis L. fil., Lunaria pinnata Thunb, Farsetia pinnata et Aurinia capensis Desv., Heliophila lepidioides Link, H. Peltaria Cand., Trentepohlia lepidioides Roth.)

† *diffusa* * 3. A. caule erecto, foliis pinnatis filiformibus, siliculis racemosis glabris. *C. B. S.* (Lunaria diffusa Thunb., Farsetia Desv., Heliophila Cand.)

2297. VESICARIA Lam.

utriculata Lam. 1. V. caule suffruticoso foliisque lanceolatis glabris, calycibus basi saccatis. *Gallia. Italia. Hungar.* (Alyssum L.)

Ludoviciana Cand. 2. V. caule suffruticoso, foliis spathulato-linearibus integerrimis stellato-pubescentibus incanis, siliculis tomentosis. *Ad fl. Missuri.* (Myagrum argenteum Pursh.)

cretica Poir. 3. V. caule fruticoſo, foliis lanceolatis repando-ſinuatis tomentoſis, ſiliculis glabris, ſeminibus alatis. *Creta.* (Alyſſum L. V. fruticuloſa Desv.)

veſtita Desv. 4. V. caule ſuffruticoſo, foliis linearibus acutis integerrimis tomentoſis, calycibus perſiſtentibus, ſiliculis glabris, ſeminibus apteris. *Perſia.*

arctica Richardſ. 5. V. caule ſuffruticoſo humili, foliis ſpathulatis ſtellato-lepidotis incanis integerrimis, ſiliculis glabris. *Amer. bor. arctic.* (Alyſſum arcticum Wormsk. Hornem.)

paniculata Desv. 6. V. caule ſuffruticoſo, foliis obovatis integerrimis glabris, racemis paniculatis, ſiliculis ovatis. *Creta.* (Alyſſum paniculatum Desf.)

arenoſa Richardſ. 7. V. caule ſuffruticoſo, foliis inferioribus ſubrhombeis obſolete ſinuato-dentatis ſtellato-pubeſcentibus, ſiliculis incanis. *Litus maris glacialis Amer. bor.*

ſinuata Poir. 8. V. caule herbaceo, foliis lanceolatis baſi attenuatis ſinuato-dentatis, ſiliculis glabris. *Hiſpania. Italia.* (Alyſſum ſinuatum L.)

reticulata Lam. 9. V. caule herbaceo, foliis oblongo-linearibus ſubdentatis glabris, ſiliculis reticulatis. *Armenia. Syria.* (Alyſſum Veſicaria L.)

cochlearioides * 10. V. caule herbaceo, foliis oblongis obtuſis ſinuato-dentatis ſubcarnoſis glabris, calycibus perſiſtentibus fructiferis inflatis. *Ind. or.* (Alyſſum cochlearioides Roth.)

2298. DRABA.

I. *Scapigerae.*

* *Floribus flavis.*

† *Stylo filiformi: foliis rigidis ciliatis: pedunculis elongatis ſcapiformibus.*

aizoides 1. Dr. foliis confertis lineari-lanceolatis carinatis rigidis, ſtaminibus petala aequantibus, ſtylo eadem ſuperante. *Montes Europ. med.* (Dr. alpina Crantz., ciliaris L. W., Alyſſum ciliatum Lam.)

brachyſtemon Cand. 2. Dr. foliis confertis linearibus elongatis carinatis rigidis, ſtaminibus ſtyloque corolla brevioribus. *Patria?* (Dr. aizoides Curt.)

Aizoon Wahlenb. 3. Dr. foliis confertis lineari-lanceolatis carinatis rigidis, ſiliculis hirtis ſtylo multo longioribus. *Bavaria. Auſtria. Transſylvan. Carpathi montes.* (Dr. ciliaris Schrank.)

cuſpidata MB. 4. Dr. foliis confertis linearibus acutiusculis carinatis, pedunculis calycibusque hirſutis, ſiliculis hiſpidis ſtylum ſubexcedentibus. *Italia. Tauria. Transſylv.* (Dr. aſpera Bertol., ciliaris Baumg. ?)

rigida W. 5. Dr. foliis confertiſſimis oblongis obtuſis carinatis ſubciliatis, pedunculis calycibusque glabris. *Caucaſ.* (Dr. bryoides Cand.)

olympica Sibth. 6. Dr. foliis confertiſſimis linearibus acutis carinatis ciliatis, pedunculis ſiliculisque ovatis villoſis,

ſtylo breviſſimo. *Graecia. Aſia minor.* (Dr. aizoides Sm.)

bruniaefolia Stev. 7. Dr. foliis confertis linearibus acutiusculis carinatis ciliatis, pedunculis ſiliculisque ovalibus villoſis, ſtylo abbreviato. *Caucaſ.*

ericaefolia Stev. 8. Dr. foliis confertis linearibus acutiusculis carinatis ciliatis, pedunculis ſiliculisque oblongis glaberrimis, ſtylo abbreviato. *Caucaſ.*

piloſa Adam. 9. Dr. foliis linearibus carinatis ciliatis, pedunculis glabris ſub-2floris, calycibus piloſis, petalis ſtamina duplo ſuperantibus, ſiliculis ovato-rotundis glabris. *Sibir. orient.*

aſpera Adam. 10. Dr. foliis linearibus carinatis ciliatis, pedunculis calycibusque glabris, petalis ſtamina duplo ſuperantibus, ſiliculis oblongis laevibus, ſtylo ſubnullo. *Ad oſtia fl. Lenae.* (75° lat. bor.)

†† *Stylo ſubnullo: ſcapigerae molles.*

veſicaria Desv. 11. Dr. foliis confertiſſimis oblongo-linearibus ſcapoque paucifloro ſtellato-hirſutiusculis, ſiliculis ovatis ſubinflatis hirſutis. *Syria.*

algida Adam. 12. Dr. foliis oblongis planis calycibusque ſimpliciter piloſis, ſcapo racemoſo, ſiliculis oblongis glabris. *Ad oſtia fl. Lenae.* (75° lat. bor.)

alpina 13. Dr. foliis oblongo-lanceolatis enerviis integerrimis ſcapoque paucifloro ſimpliciter piloſis (pilis ramoſis intermixtis), ſiliculis oblongis glabris. *Scandinavia arctica.* (Dr. pauciflora R. Br.)

glacialis Adam. 14. Dr. foliis lineari-lanceolatis integerrimis ſcapoque ſtellato-piloſis, calycibus villoſis, ſiliculis ovatis glabris. *Litus maris glacialis Sibir. or.*

repens MB. 15. Dr. caule foliato baſi ſtolonifero, foliis lanceolatis integerrimis, ſetulis bipartitis centro appreſſis, calycibus ſiliculisque oblongis glabris. *Caucaſ.*

Gmelini Adam. 16. Dr. ſurculis caeſpitoſis, foliis lanceolatis pube ſtellata hiſpidis, ſcapis nudis calycibusque piloſis, ſiliculis oblongis glabris. *Sibir.*

tridentata Cand. 17. Dr. foliis ſpathulato-lanceolatis apice ſub-3dentatis hiſpidis, pilis 2-3fidis, ſcapo racemifero calycibus ſiliculisque oblongis glabris. *Caucaſ.* (Dr. rupeſtris W. herb.)

hiſpida W. 18. Dr. foliis obovatis ſubdentatis hiſpidis, pilis rigidis bifidis divaricatis, ſiliculis ovalibus glabris. *Aſia minor.*

incomta Stev. 19. Dr. ſurculis caeſpitoſis ramoſis, foliis lanceolatis obtuſiusculis incano-villoſis, ſcapo calycibusque villoſiusculis, pedicellis flore brevioribus, ſiliculis oblongis incanis. *Caucaſ.*

molliſſima Stev. 20. Dr. ſurculis caeſpitoſis, foliis oblongis obtuſis, ſcapo pedicellisque flore longioribus glabris, calycibus piloſiusculis, ſiliculis lanceolatis glabris. *Caucaſ.*

aretioides Humb. 21. Dr. ſurculis caeſpitoſis ramoſis, foliis obovatis obtuſis ſericeo-villoſis albidis, ſcapis pauciflo-

ris, siliculis ovatis. *Alp. Quito.* (Aretia cana W. herb.)

** *Floribus albis.*

† *Petalis indivisis: perennes.*

Liljebladii Wallm. 22. Dr. caespitosa, foliis oblongis integerrimis pube stellata caesio-incanis, siliculis lanceolatis glabris. *Scandinavia arctica. Amer. bor.* (Dr. hirta Oed., nivalis Liljebl., muricella Wahlenb.)

Wormskioldii Fisch. 23. Dr. foliis oblongis utrinque 1dentatis scapoque 1phyllo corymbifero pilosis, pube apice ramosa, siliculis oblongis glabris. *Sibir. or. extrema.*

hirta 24. Dr. radice stolonifera, foliis lanceolatis denticulatis integerrimisque scapoque racemifero subsub-2phyllo pube ramosiuscula pilosis, siliculis oblongis glabris. *Europ. et Amer. bor. arctica.* (Dr. pyrenaica Oed., nivalis Cand.)

corymbosa R. Br. 25. Dr. foliis dense caespitosis oblongis integerrimis basi attenuatis scapoque corymbifero stellata pube pilosis, siliculis ellipticis hispidulis. *Amer. bor. ad sinum Baffini.*

oblongata R. Br. 26. Dr. foliis caespitosis oblongo-linearibus integerrimis scapoque racemifero pube floccoso-stellata villosis, siliculis elliptico-oblongis villosis. *Amer. bor. ad sinum Baffini.*

borealis Cand. 27. Dr. foliis oblongis basi attenuatis integerrimis pube stellata villosis, scapo 1phyllo hirsuto, siliculis ovatis glabris. *Ins. Pauli in mari camtschatico.* (58° lat. bor.)

rupestris R. Br. 28. Dr. foliis lanceolatis subintegerrimis scapoque sub-2phyllo pilosis, pilis simplicibus stellatisque, siliculis lanceolatis stellata pube hirsutiusculis. *Scotia. Norvegia.* (Dr. hirta Sm.)

Wahlenbergii Hartm. 29. Dr. foliis oblongis ciliatis glabriusculis, scapo humili paucifloro siliculisque ovalibus glaberrimis. *Scandinavia arctica. Grönland. Alp. summ. helvet.* (Dr. androsacea Wahlenb. excl. syn., lapponica W. Cand., ciliaris Wahlenb. helv., helvetica Cand., glabella Pursh.)

stadnizensis Wulff. 30. Dr. foliis oblongis glabris nitidis rigide ciliatis, scapo paucifolio siliculisque oblongis laevibus. *Carinthia. Croatia. Transsylvania.* (Dr. ciliata Scop., ciliaris Holt., androsacea W.)

stellata Jacq. 31. Dr. foliis oblongis obtusiusculis integerrimis pube stellata tomentosis, scapo sub-2phyllo pubescente, siliculis oblongis glabriusculis. *Alp. Europ. med.* (Dr. hirta Vill. Townsend., austriaca Crantz., tomentosa Wahlenb., dubia Sut., laevipes Cand. var.)

uralensis W. 32. Dr. foliis oblongis basi attenuatis utrinque 2dentatis scapoque racemifero oligophyllo pube minuta stellata incanis, staminibus subdentatis, siliculis ovalibus incano-pubescentibus. *Ural. Po-*

dolia. Volhynia. (Alyssum podolicum Bess. Schivereckia Andrz. Cand.)

lactea Adam. 33. Dr. foliis oblongo-linearibus utrinque attenuatis integerrimis pubescentibus, scapo glabro corymbifero, siliculis elliptico-oblongis laevibus. *Ad ostia Lenae in Sibir. orient.*

calycina Desv. 34. Dr. foliis caespitosis oblongis basi attenuatis pilosiusculis, scapo filiformi glabro 1floro, siliculis linearibus laevibus. *Peru.*

†† *Petalis bipartitis: annuae. Erophilae Cand.*

verna 35. Dr. foliis oblongis subdentatis pube stellata pilosiusculis, scapo nudo racemifero, siliculis oblongis glabris. *Europ. omnis. Asia med. Amer. bor.* (Dr. caroliniana Bart., praecox Stev. varr.)

minutissima W. herb. 36. Dr. foliis ellipticis petiolatis integerrimis pilosiusculis, scapo nudo sub-3floro. *Ad Constantinopolin.*

muscosa R. et P. 37. Dr. foliis oblongis ciliatis crassiusculis, scapo paucifloro, siliculis ovalibus glabris pedicellos subsuperantibus. *Peru.*

Pumilio R. Br. 38. Dr. foliis radicalibus oblongis integerrimis longe petiolatis, scapo 1floro, floribus minimis, siliculis ovatis. *Terra Diemen.*

II. *Caule folioso.*

* *Perennes.*

† *alyssoides* Humb. 39. Dr. caule suffruticoso ramoso, ramulis tomentosis, foliis sessilibus ovato-oblongis subdentatis tomentoso-hirsutis, floribus racemosis (albis), siliculis ovatis acutis. *Amer. austr.*

† *Bonplandiana* Kunth. 40. Dr. caule suffruticoso procumbente, ramis foliosis, foliis imbricatis sessilibus ovatis incano-tomentosis, floribus axillaribus pedunculatis (violaceis), siliculis ovato-oblongis. *Quito.*

jorullensis Humb. 41. Dr. caule ramoso villoso, foliis oblongis subintegerrimis pilosiusculis petiolatis, racemis viscido-pubescentibus, floribus flavis, petalis 2lobis, siliculis subrotundo-ovatis pilosis. *Mexico.*

toluccnsis Humb. 42. Dr. caule ramoso hirsuto, foliis radicalibus spathulatis, caulinis oblongis incano-villosis, racemis terminalibus confertis, siliculis ovatis glabris. *Mexico.*

filiquosa MB. 43. Dr. caule subramoso foliato, foliis lineari-lanceolatis subdentatis pubescentibus, siliculis linearibus glabris. *Caucas.*

** *Annuae s. biennes.*

† *Floribus flavis.*

aurea Vahl. 44. Dr. caule simpliciusculo folioso villosiusculo, foliis integerrimis stellato-pubescentibus, radicalibus spathulatis, caulinis lanceolatis, flori-

bus racemosis, siliculis linearibus pubescentibus. *Grönland.*

nemorosa 45. Dr. caule ramoso folioso foliisque subovato-oblongis sessilibus dentatis ramulose pubescentibus, siliculis oblongis piloSiusculis tandem glabratis. *Suecia.* (*Gestricia* Östling.) *Transsylvan. Tauria. Caucas. Asia minor. Japon. Amer. bor.* (Dr. nemoralis Ehrh., muralis Thunb. MB., pontica Desf., lutea Gilib. Cand.)

†† *Floribus albis.*

muralis 46. Dr. caule subramoso foliisque dentatis stellata pube hirsutiusculis, infimis spathulatis, caulinis subcordato-ovatis amplexicaulibus, siliculis oblongis glabris pedicello multo brevioribus. *Europ. omnis. Afric. bor.* (Dr. nemorosa All.)

incana 47. Dr. caule subramoso foliisque ovato-oblongis dentatis stellato-pubescentibus incanis, siliculis oblongis obliquis glabriusculis pedicello longioribus. *Europ. Asia et Amer. bor.* (Dr. confusa Ehrh.. Dr. contorta Ehrh. est var. altior. Alyssum dentatum Nutt. videtur huc pertinere, licet pedicelli longiores sint.)

cinerea Adam. 48. Dr. caule simplici laxo foliisque oblongo-linearibus integerrimis pubescentibus, siliculis oblongis piloSiusculis pedicello brevioribus. *Sibir. arctica.* (Cochlearia siliquosa Schlecht. Cand.)

magellanica Lam. 49. Dr. caule simplici foliisque lanceolatis integerrimis pube stellata villosis, siliculis villosiusculis pedicello brevioribus. *Ad fretum Magellan.*

Arabis Pers. 50. Dr. caule subramoso foliisque lanceolatis acutis dentatis stellato-pubescentibus, siliculis linearibus acuminatis glabris erectis pedicello longioribus. *Amer. bor.* (Dr. arabisans Mx.)

† *davurica* Cand. 51. Dr. caule ramoso foliisque ovatis dentatis stellato-pubescentibus, siliculis oblongis glabris pedicellos aequantibus. *Davuria.*

† *unalascensis* Cand. 52. Dr. caule simplici foliisque ovato-oblongis integerrimis stellato-pubescentibus, siliculis oblongis hirsutiusculis. *Insul. Aleut.*

caroliniana Walt. 53. Dr. caule basi folioso foliisque obovato-subrotundis integerrimis hispidis, racemis siliculisque glabris pedicello longioribus. *Amer. bor.* (Dr. hispidula Mx.)

spathulata * 54. Dr. foliis spathulatis paucidentatis pube ramosa piloSiusculis, siliculis lanceolatis stylo brevi apiculatis pedicello brevioribus. *Insul. Aleut.* (Cochlearia Schlechtend. Cand.)

falsa * 55. Dr. foliis cordato-lanceolatis amplexicaulibus cauleque ramoso stellato-pubescentibus, siliculis lanceolatis stylo conico superatis pedicello brevioribus. *Sibir.* (Cochlearia Schlechtend. Cand.)

2299. COCHLEARIA.

* *Genuinae, siliculis subglobosis s. ovatis.*

saxatilis Lam. 1. C. foliis radicalibus spathulato-oblongis dentatis, caulinis spathulato-linearibus, siliculis lentiformibus laevibus. *Gallia. Helvetia. Italia. Austria. Transsylvania.* (Myagrum saxatile L., Camelina Pers., Alyssum rupestra W.)

auriculata Lam. 2. C. foliis radicalibus lyratis, caulinis inferioribus spathulatis subpetiolatis, superioribus sagittato-linearibus, siliculis lentiformibus laevibus. *Carinthia. Gall. austr.* (Myagrum auriculatum Cand. suppl.)

microcarpa Cand. 3. C. foliis oblongis denticulatis basi auriculatis amplexicaulibus, siliculis globosis. *Sibir.*

glastifolia 4. C. foliis cordato-sagittatis amplexicaulibus integerrimis glaucis, siliculis subglobosis reticulato-venosis, seminibus muricatis. *German. austr. Gallia.*

oblongifolia Cand. 5. C. foliis caulinis oblongis obtusis integerrimis sessilibus, summis brevissime auriculatis, siliculis subglobosis. *Camtschatca. Ins. Pauli in mari camtschat.*

officinalis 6. C. foliis dentato-angulatis glaberrimis, radicalibus cordatis petiolatis, caulinis amplexicaulibus, siliculis globosis pedicello brevioribus. *Europ. bor. Carpath. et Pyren.* (C. pyrenaica Cand. C. grönlandica L., foliis radicalibus reniformibus integerrimis petiolatis subcarnosis, caulinis ovato-oblongis, siliculis ovato-subglobosis, in Ins. Laaland, Willius in Bartholin act. havn. In Scotia Don. Nec Hornemann. nec Hooker. agnoscunt hanc plantam tanquam speciem, sed minorem habent varietatem C. officinalis.)

danica 7. C. foliis omnibus petiolatis cordatis angulatis, siliculis elliptico-globosis. *Ad lit. mar. Europ. boreal.*

anglica 8. C. foliis radicalibus ovatis subintegerrimis longe petiolatis, caulinis cordato-oblongis amplexicaulibus subdentatis, siliculis elliptico-globosis. *Armorica. Anglia. Dania. Norvegia. Grönland. Sibir.* (C. arctica Schlechtend. Cand.)

lenensis Adam. 9. C. foliis radicalibus petiolatis reniformibus integerrimis, caulinis oblongis subdentatis, siliculis ovato-subglobosis. *Sibir. arctica.*

† *tridactylites* Banks. 10. C. foliis caulinis subtrilobis, siliculis ovato-globosis. *Amer. bor. ad sinum Hudson.*

** *Siliculis oblongis.*

Armoracia 11. C. foliis radicalibus oblongis crenatis, caulinis lanceolatis elongatis inciso-serratis, sepalis patulis, siliculis elliptico-oblongis, radice carnosa maxima. *Europ.*

macrocarpa Kit. 12. C. foliis radicalibus cordato-oblongis margine cartilagineo-crenatis, caulinis lanceolatis inci-

ſo-dentatis, ſepalis erectis, ſiliculis elliptico-oblongis. *Hungar. Transſylvan.*

ſiſymbrioides Cand. 13. C. foliis caulinis amplexicaulibus ovato-lanceolatis inciſo-dentatis, ſiliculis oblongis. *Sibir. arctic.*

grandiflora Cand. 14. C. foliis caulinis cordato-oblongis obtuſe dentatis, ſiliculis oblongis. *Sibir. auſtr. ad fl. Amur.*

integrifolia Cand. 15. C. foliis radicalibus lyratis, caulinis ſuperioribus lanceolatis integerrimis, ſiliculis oblongis. *Imaus.*

†*ſaxifragaefolia* Cand. 16. C. foliis radicalibus reniformibus palmatifido-inciſis glabris, caulinis ovatis trilobis, ſummis linearibus, ſiliculis oblongis. *Perſia.*

velutina Cand. 17. C. foliis pube ramoſa villoſis, radicalibus pinnatis, foliolis ovatis obtuſis, ſummis linearibus, ſiliculis oblongis. *Meſopotamia.*

*** *Habitu deſciſcens.*

acaulis Desf. 18. C. caule humili breviſſimo, foliis longe petiolatis ſubcordato-ovatis obtuſis ſubintegerrimis, pedunculis radicalibus ſ. axillaribus 1floris, ſiliculа elliptico-oblonga. *Luſitania. Mauritania.* (C. *puſilla* et *olyſſiponenſis* Brot.)

2300. THLASPI.

* *Fructibus oligoſpermis* (ſeminibus 4-8).

latifolium MB. 1. Thl. foliis omnibus petiolatis dentatis, inferioribus cordato-reniformibus, ſummis oblongis, ſiliculae ſepto craſſo. *Caucaſ.* (Lepia latifolia Desv.)

ceratocarpon Murr. 2. Thl. foliis radicalibus petiolatis obovato-oblongis, caulinis ſeſſilibus haſtato-lanceolatis ſubdenticulatis, ſiliculis bicornibus glabris. *Sibiria.* (Lepidium ceratocarpon Pall.)

montanum 3. Thl. ſurculis repentibus, foliis radicalibus ſpathulato-oblongis integerrimis, caulinis ſagittatis amplexicaulibus, petalis calyce majoribus, ſiliculis obcordatis 4ſpermis, ſtylo filiformi. *Europ. med.* (Thl. alpinum Crantz. Jacq., praecox Wulff. Draba carnica Scop.)

alpeſtre 4. Thl. radice perenni (non ſtolonifera), foliis radicalibus petiolatis ellipticis repandis, caulinis ſagittatis amplexicaulibus, petalis calycem aequantibus, ſilicula retuſa ſub-8ſperma, ſtylo filiformi. *Europ. media.* (Thl. montanum Hudſ. Hutchinſia corymboſa Gay.?)

perfoliatum 5. Thl. radice annua, caule ramoſo, foliis ſubdentatis, radicalibus petiolatis, caulinis cordato-ſagittatis, petalis calycem aequantibus, ſiliculis obcordatis 8ſpermis, ſtigmate ſubſeſſili. *Europ. med. Aſia med.* (Thl. alpeſtre Hudſ.)

alliaceum 6. Thl. radice annua, caule ſimpliciusculo, foliis radicalibus petiolatis oblongis repandis ſublyratis, caulinis ſagittatis obtuſis, petalis calycem ſubae-

quantibus, ſiliculis retuſis 8ſpermis, ſtylo nullo. *Europ. med. et auſtr. Amer. bor.* (Thl. heterophyllum Cand.)

cochleariforme Cand. 7. Thl. foliis inaequaliter argute dentatis glaucis, inferioribus petiolatis oblongis, ſuperioribus cordatis amplexicaulibus, petalis calycem ſubexcedentibus, ſiliculis emarginatis, ſtylo breviſſimo. *Sibir.*

magellanicum Perſ. 8. Thl. foliis radicalibus ovalibus ſubintegerrimis petiolatis, caulinis oblongis obtuſis ſeſſilibus, petalis calycem aequantibus, ſiliculis truncatis 8ſpermis, ſtylo abbreviato. *Ad fretum Magellan.*

** *Fructibus polyſpermis.*

Burſa 9. Thl. foliis radicalibus ſubruncinato-pinnatifidis, caulinis ſagittatis dentatis, ſiliculis obcordatis. *Per omnem fere terrarum orbem.* (Capſella Mönch. Cand.)

umbellatum Stev. 10. Thl. foliis acute dentatis, radicalibus ſubrotundis petiolatis, caulinis ſubſagittatis ſemiamplexicaulibus, ſiliculis obcordatis, ſtigmate ſeſſili, nervo alas cingente. *Perſia bor.*

arvenſe 11. Thl. foliis omnibus ſagittato-oblongis ſinuato-dentatis ſiliculisque ſuborbiculatis obcordatis. *Europ. omnis et Amer. bor.* (Thl. collinum MB. et baicalenſe Cand. varr.)

orbiculatum Stev. 12. Thl. foliis ſuperioribus amplexicaulibus integerrimis, ſiliculis orbiculatis emarginatis ſtriatis, nervo alas cingente. *Caucaſ.*

†*ſamolifolium* Cand. 13. Thl. foliis ovatis obtuſis integerrimis, inferioribus breviter petiolatis, petalis emarginatis. *Aſia minor.* (Alyſſum ſamolifolium Desf.)

†*tuberoſum* Nutt. 14. Thl. radice tuberoſa, foliis ovato-rhomboideis obſolete dentatis ſeſſilibus glabris, radicalibus longe petiolatis, caule humili pubeſcente, ſiliculis ſuborbiculatis. *Penſylvan.*

2301. CAMELINA Crantz.

ſativa Crantz. 1. C. foliis ſagittatis lanceolatis ſubdentatis, ſiliculis pyriformibus bicoſtatis ſtylo coronatis. *Europ. omnis. Aſia med.* (Myagrum ſativum L., Alyſſum Scop., Mönchia Roth... Myagrum dentatum W., Bauhini C. C. Gmel., pinnatifidum Ehrh., Camelina ſylveſtris Wallr. et microcarpa Andrz. varr.)

armeniaca Desv. 2. C. foliis lineari-lanceolatis integerrimis pubeſcentibus, ſiliculis obconicis elongatis ſtylo brevi coronatis. *Armenia.*

auſtriaca R. Br. 3. C. foliis oblongo-lanceolatis dentatis baſi auriculatis, ſiliculis obovato-ſubgloboſis bicoſtatis ſtylo longo coronatis. *Sileſia. Auſtria. Transſylvan. Tauria. Caucaſ. Sibir.* (Myagrum auſtriacum Jacq., Naſturtium Crantz.)

barbareaefolia Cand. 4. C. foliis oblongis pinnatifidis basi auriculatis, caule basi villoso, siliculis subglobosis stylo longo coronatis. *Sibir. austr.*

2302. STENOPETALUM R. Br.

lineare R. Br. *Nov. Holl. austr.* Herba tenuissima filiformis, foliis gracilibus lineari-filiformibus, floribus racemosis flavidis.

2303. EUTREMA R. Br.

Edwardsii R. Br. 1. E. foliis petiolatis ovato-lanceolatis, floribus corymbosis. *Inf. Melvill. Amer. bor.* (75° lat. bor.)

Rossii * 2. E. foliis petiolatis ovatis dentatis, floribus corymbosis. *Ora occ. sinus Baffini.* (Cochlearia fenestrata R. Br.)

Humboldtii * 3. E. foliis imbricatis linearibus, floribus axillaribus solitariis. *Alp. Quito.* (Draba Humboldtii Desv., Eudema rupestris Humb.)

Bonplandii * 4. E. foliis confertis spathulatis ciliatis, floribus axillaribus solitariis. *Alp. Quito.* (Draba nubigena Desv., Eudema Humb.)

2304. PSYCHINE Desf.

numidica * 1. Ps. caule ramoso hispido, foliis cordato-oblongis dentatis hirsutiusculis, siliculis apice truncatis. *Numidia.* (Ps. stylosa Desf., Thlaspi Psychine W.)

arabica * 2. Ps. caule ramoso glaberrimo, foliis cordato-oblongis subintegerrimis laevibus, siliculis apice rotundato-attennatis. *Aegypt. super.* Sieber. *Arabia.* Forsk. (Subularia purpurea Forsk. Thl. arabicum Vahl. Schouwia Cand.)

III.

SILIQUOSAE.

2305. STEVENIA Adam.

alyssoides Adam. 1. St. caule ascendente ramosissimo foliisque oblongo-linearibus pube stellata villosis, siliquis pedicello brevioribus. *Ad fl. Lenam sub circ. arctico.*

cheiranthoides Cand. 2. St. caule stricto foliisque linearibus pube stellata villosis, siliquis pedicello longioribus. *Sibiria.* (Cheiranthus salinus W. herb.)

2306. BRAYA Sternb.

alpina Sternb. 1. Br. foliis lineari-lanceolatis subintegerrimis, racemis contractis. *Carinthia.*

glabella Richardſ. 2. Br. foliis linearibus remote dentatis, racemo fructifero laxo elongato. *Ad fl. cupri Amer. bor. ſub circ. arctico.*

2307. NASTURTIUM R. Br.

** *Foliis indiviſis.*

bengalenſe Cand. 1. N. foliis obovato-oblongis apice dentatis, pedicellis bracteatis ſiliqua turgida ſubbrevioribus. *Bengal.*

indicum Cand. 2. N. foliis ovato-lanceolatis inciſo-ſerratis utrinque attenuatis laevibus, floribus apetalis, ſiliquis teretiusculis pedicellos ſuperantibus. *Ind. orient. Java. China.* (Siſymbrium indicum L., dubium Perſ , S. Sinapis N. L. Burm., apetalum Desf.)

glaucophyllum Cand. 3. N. foliis radicalibus petiolatis obovato-orbiculatis crenatis coriaceis, caule elongato dichotomo aphyllo ſquamato, ſiliquis oligoſpermis. *Perſia.*

ſagittatum R. Br. 4. N. foliis haſtato-ſagittatis oblongis obtuſis pubeſcentibus, radicalibus petiolatis baſi auriculatis, caulinis amplexicaulibus, ſiliquis deflexis. *Ad mare caſpium.* (Siſymbrium molle Jacq., ſagittatum Ait. W.)

burſifolium Cand. 5. N. foliis villoſis, radicalibus inciſo-pinnatifidis, caulinis ſagittatis integerrimis acuminatis, ſiliquis glabris. *Camtſchatca.*

natans Cand. 6. N. foliis natantibus oblongo-linearibus integerrimis, ſubmerſis multifido-capillaceis, petalis calycem ſubaequantibus, ſiliquis breviſſimis obovatis. *Sibir. media in fl. Alei ditionis Koliwan.*

** *Foliis pinnatifidis.*

amphibium R. Br. 7. N. foliis oblongis pinnatifidisque ſerratis, petalis calyce majoribus, ſiliquis ellipticis ſtylo coronatis, caule baſi radicante. *Europ. Aſia et Amer. bor.* (Siſymbrium amphibium L.)

ſylveſtre R. Br. 8. N. foliis pinnatifidis, laciniis oblongo-lanceolatis inciſo-ſerratis, petalis calyce majoribus, ſiliquis teretiusculis ſtylo coronatis, caule aſcendente. *Europ. Aſia et Amer. bor.* (Siſymbrium ſylveſtre L.)

anceps Cand. 9. N. foliis oblongis ſerratis pinnatifidisque, auriculis amplexicaulibus glaberrimis, petalis calyce majoribus, ſiliquis utrinque attenuatis ancipitibus, caule repente. *German. med. et bor. Dania. Suecia.* (Siſymbrium anceps Wahlenb., amphibium Vahl.)

paluſtre Cand. 10. N. foliis lyrato-pinnatifidis glabris, laciniis obtuſe dentatis, auriculis amplexicaulibus ciliatis, petalis calycem aequantibus, ſiliquis turgidis, radice fuſiformi. *Europ. omnis. Afric. Aſia et Amer. bor.* (Siſymbrium paluſtre Leyſſ. Poll., ter-

restre Wither. Sm., pusillum Vill., barbareaefolium Delil., mexicanum Sess. varr.)

portoricense * 11. N. foliis interrupte pinnatifidis glabris, laciniis oblongis obtusis repando-crenatis, petalis calyce minoribus, siliquis teretiusculo-linearibus stigmate subsessili coronatis. *Portorico. Hispaniola.* Bertero.

pyrenaicum R. Br. 12. N. foliis radicalibus petiolatis obovatis lyratisque, caulinis amplexicaulibus decursive pinnatis, laciniis linearibus integerrimis, siliculis ovalibus stylo capillari coronatis. *Europ. austr.* (Sisymbrium pyrenaicum L.)

lippiense Cand. 13. N. foliis radicalibus obovatis dentatis sublyratisque, caulinis subpinnatis, laciniis linearibus integerrimis, petalis calyce majoribus, siliquis linearibus declinatis stylo brevi coronatis. *Carinthia. Croatia. Dalmatia. Thracia.* (Sisymbrium lippizense Wulff.)

coronopifolium Cand. 14. N. foliis lanceolatis pinnatifido-dentatis pubescentibus, laciniis obtusiusculis integerrimis, pedunculis scapiformibus, petalis calycem superantibus, siliquis linearibus apice curvatis stigmate subsessili coronatis. *Numidia.* (Sisymbrium coronopifolium Desf.)

ceratophyllum Cand. 15. N. foliis linearibus pinnatifido-dentatis glabriusculis, laciniis abbreviatis distantibus, siliquis oblongo-linearibus utrinque attenuatis stigmate subsessili coronatis. *Numidia.* (Sisymbrium ceratophyllum Desf.)

bonariense Cand. 16. N. foliis pinnatifidis glabris, laciniis linearibus subintegerrimis remotis, racemis laxis, corolla calycem subaequante, siliquis tereti-compressis suberectis. *Ad fl. Plata.* (Sisymbrium bonariense Poir.)

† *diffusum* Cand. 17. N. foliis subpinnatifidis ovali-oblongis dentatis glabris petiolatis, siliquis teretibus pedicello longioribus stylo distinctis, caule diffuso. *Java.*

† *apetalum* Cand. 18. N. foliis hastato-pinnatifidis tomentosis, floribus apetalis, siliquis teretiusculis obtusis. *Cochinchina.* (Sisymbrium apetalum Lour.)

*** *Foliis pinnatis.*

officinale R. Br. 19. N. foliolis subcordato-oblongis obtusis repandis, (floribus albis,) siliquis teretiusculis subdeclinatis. *Europ. Asia. Africa. Amer. bor. et austr.* (Sisymbrium Nasturtium L.)

micranthum Cand. 20. N. foliis lyrato-pinnatis pubescentibus, foliolis inciso-laciniatis, petalis calyce minoribus, siliquis erectis oblongo-linearibus. *Ind. or.*

madagascarense Cand. 21. N. foliis lyrato-pinnatis glabris, foliolis inciso-lobatis, floribus minimis, siliquis declinatis ovato-oblongis. *Madagascar.*

microspermum Cand. 22. N. foliis glabris, inferioribus pinnatis, foliolis ovato-oblongis inciso-dentatis, floribus minimis, siliquis erectis teretiusculis. *China.*

clandestinum * 23. N. foliis lyrato-pinnatis, foliolis petiolatis cordato-subrotundis repandis, floribus apetalis, siliquis teretiusculis elongatis. *Brasil.*

† *album* * 24. N. foliis pinnatis caulequе erecto incano-pubescentibus, foliolis spathulato-linearibus subincisis, petalis calycem coloratum superantibus, siliquis tereti-linearibus stigmate capitato coronatis. *Ad lacum Baical in Sibir. austr.* (Sisymbrium album Pall.)

† *multifidum* * 25. N. foliis interrupte pinnatis pubescentibus, foliolis pinnatifidis rotundato-lobatis, siliquis oblongis stylo destitutis. *Florida.* (Cardamine multifida Banks. Pursh.)

† *Menziesii* * 26. N. foliis pinnatis pube stellata canescentibus, foliolis pinnatifidis inciso-dentatis, siliquis oblongis stigmate sessili coronatis. *Ora occ. Amer. bor.* (Cardamine? Menziesii Cand.)

† *myriophyllum* * 27. N. foliis 2pinnatis caulequе erecto ramoso pube stellata canescentibus, foliolis oblongis obtusis incisis, racemis strictis, floribus parvis, siliquis lanceolatis glabris erectis stylo brevissimo terminatis. *Quito.* (Sisymbrium myriophyllum W. herb. Humb.)

2308. MORETTIA Cand.

philaea * *Syene.* Sieber. *Philae inf. Nili.* Nectoux. Fruticulus omnis pube ramosa hirsutus incano-tomentosus, foliis oblongis subdentatis, floribus axillaribus siliquisque folia aequantibus. (Sinapis Philaeana Delil.)

2309. DENTARIA.

* *Foliis verticillatis, stylo elongato.*

polyphylla Kit. 1. D. foliis ternis alternisque petiolatis subdecursive pinnatis, foliolis lanceolatis grosse serratis ciliatis, floribus corymbosis. *Croatia. Alp. rhaet. Pedemont.*

enneaphylla 2. D. foliis ternis petiolatis ternatis, foliolis oblongis acuminatis inaequaliter serratis glabris, floribus corymbosis (albidis), staminibus petala subaequantibus, *Alpestria Europ. med.* (Cardamine R. Br.)

glanduloſa Kit. 3. D. foliis ternis petiolatis ternatis, foliolis lanceolatis grosse dentatis, axillis glanduliferis, racemis paucifloris, staminibus corolla (rubra) brevioribus. *Hungar. Transsylvan.*

laciniata Mühlb. W. 4. D. foliis ternis alternisque petiolatis, foliolis palmatis 3-5partitis, laciniis lineari-lanceolatis inciso-serratis, axillis subglanduliferis, staminibus corolla (alba) multo brevioribus. *Amer. bor.* (D. concatenata Mx.)

** *Foliis caulinis alternis ternatis, digitatis.*

trifolia Kit. 5. D. foliis ternatis, foliolis oblongis venosis obtuse dentatis ciliatis, axillis glanduliferis, floribus corymbosis (albidis). *Croatia.*

maxima Nutt. 6. D. foliis ternatis, foliolis ovalibus inciso acute dentatis, lateralibus sublobatis, axillis eglandulosis, floribus racemosis (rubentibus). *Amer. boreal.*

diphylla Mx. 7. D. foliis binis ternatis, foliolis lobatis obtuse mucronato-dentatis basi attenuatis ciliatis, floribus racemosis (albidis). *Amer. bor.*

heterophylla Nutt. 8. D. foliis binis petiolatis ternatis, foliolis lineari-lanceolatis integerrimis ciliatis, floribus racemosis (rubentibus). *Pensylvan.*

tenuifolia Ledeb. 9. D. foliis binis petiolatis ternatis, foliolis linearibus obtusis paucidentatis, corymbo paucifloro (floribus albis). *Imaus. Sibir.* (D. 3fida Lam.?)

tenella Pursh. 10. D. foliis binis sessilibus ternatis, foliolis lineari-ellipticis integerrimis, floribus racemosis (purpureis). *Ora occ. Amer. bor.*

digitata Lam. 11. D. foliis digitato-palmatis, foliolis lanceolatis serratis ciliatis, caule flexuoso, floribus corymbosis (rubentibus, nonnunquam albidis). *Europ. med.* (D. pentaphyllos β. γ. L. Cardamine pentaphylla R Br.)

*** *Foliis caulinis alternis pinnatis.*

pinnata Lam. 12. D. foliolis oblongo-lanceolatis remote serratis ciliatis, floribus corymbosis longe pedicellatis (albis). *Gallia. Helvetia. Italia.* (D. heptaphyllos C. Bauh. Vill., Cardamine pinnata R. Br.)

quinquefolia MB. 13. D. foliolis omnibus discretis lanceolatis obtuse serratis, floribus corymbosis, staminibus abbreviatis. *Tauria. Caucas. Ucrania.* (D. caucasica W. herb.)

hypanica Bess. 14. D. foliis decursive pinnatis, foliolis lanceolatis inaequaliter dentatis, axillis bulbiferis. *Bessarabia et Podolia.* (Hypanis citerior fl. Bug.)

bulbifera 15. D. foliis inferioribus pinnatis, superioribus ternatis, summis simplicibus, foliolis lanceolatis serratis, axillis bulbiferis, floribus corymbosis (albis s. rubentibus). *Montosa umbrosa Europ. et Asiae med.* (Cardamine bulbifera R. Br.)

microphylla W. 16. D. foliis omnibus pinnatis 3-5jugis, foliolis lineari-lanceolatis subdentatis, axillis nudis. *Caucas. Sibir.*

2310. PTERONEVRON Cand.

carnosum Cand. 1. Pt. foliis pinnatis carnosis glaucescentibus, foliolis obovato-subrotundis integerrimis. *Croatia. Dalmatia.* (Cardamine carnosa Kit.)

graecum Cand. 2. Pt. foliis pinnatis membranaceis, foliolis profunde lobatis subdentatis. *Italia. Graecia.* (Cardamine graeca L.)

2312. CARDAMINE.

* *Foliis indivisis.*

rhomboidea Cand. 1. C. radice tuberoso-fibrosa, caule simplici, foliis elliptico-rhombeis obtusis repando-dentatis petiolatis glabris. *Amer. bor.* (Arabis tuberosa et rhomboidea Pers.)

rotundifolia Mx. 2. C. radice fibrosa, caule debili procumbente, foliis orbiculatis subdentatis petiolatis glabris. *Amer. bor.*

spathulata Mx. 3. C. caule decumbente, foliis radicalibus spathulatis integerrimis pube 3partita pubescentibus, caulinis linearibus. *Carolina.*

asarifolia 4. C. caule erecto, foliis petiolatis reniformi-cordatis repando obtuse dentatis, superioribus subpeltatis, siliquis elongatis. *Gallia prov. Italia.*

† *indica* N. L. Burm. 5. C. caule erecto, foliis petiolatis glabris, inferioribus ovatis obtusis crenulatis, summis obovato-oblongis, siliquis linearibus. *Java.*

stylosa Cand. 6. C. caule erecto, foliis caulinis sagittato-oblongis acutis calloso-denticulatis semiamplexicaulibus glabris, siliquis patulis, stylo elongato. *Nov. Holl.*

chenopodifolia Pers. 7. C. caule procumbente, foliis ovatis petiolatis sublobato-sinuatis glabris, siliquis erectis, stigmate sessili. *Monte Video.*

bellidifolia 8. C. caule humili, foliis radicalibus longe petiolatis ovatis integerrimis, caulinis subnullis vel oblongis subdentatis sessilibus, siliquis strictis elongatis. *Alp. Scandinav. Inf. Melvill. Amer. bor. Sibir. Europ. med.* (C. alpina W. et heterophylla Baumg. varr.)

** *Foliis plerisque tripartitis s. ternatis.*

uniflora Mx. 9. C. foliis radicalibus 3lobis subrotundis obtusis glabris, scapo 1floro. *Kentucky Amer. bor.*

trifolia 10. C. foliis radicalibus longe petiolatis ternatis, foliolis subrotundis obtuse mucronato-dentatis, ramis imis sarmentosis, caule oligophyllo, paniculа corymbosa. *Austria. Hungar. Transsylv.*

† *scutata* Thb. 11. C. foliis radicalibus petiolatis ovato-subrotundis, terminali crispo, scapo nudo. *Japon.*

† *tuberosa* Cand. 12. C. foliis radicalibus longe petiolatis reniformibus crenatis, caulinis ternatis subrotundis crenato-dentatis, racemo paucifloro, radice tuberosa. *Chili.*

chilensis Cand. 13. C. caule erecto flexuoso glabro, foliis petiolatis ternatis supra pubescentibus, foliolis oblique ovato-lanceolatis crenatis, floribus racemosis. *Chili.*

barbonica Pers. 14. C. caule ramoso glabriusculo, foliis longe petiolatis ternato-subpinnatis pilosis subtus canescentibus, foliolis ovatis acuminatis subdentatis, siliquis erectis. *Insul. Mascaren. Arabia.* (C. africana Vahl.)

africana 15. C. caule ramoſo, foliis longe petiolatis rhombeis acuminatis inaequaliter mucronato-dentatis glabris, petalis calycem ſubaequantibus, ſiliquis patentibus. *C. B. S.*

Burchellii * 16. C. caule ramoſo decumbente, foliis petiolatis ternatis ſupra piloſiusculis ſubtus glabris, foliolis ovatis acuminatis inaequaliter dentatis, petalis calycem duplo ſuperantibus, ſiliquis erectis. *Afric. auſtr.* (C. anteniquina Burch. errore typographi l. *Houtniqua.*)

bonarienſis Perſ. 17. C. caule ramoſo, foliis glabris petiolatis, inferioribus ternatis ſubrotundis repandis, ſuperioribus trilobis integrisque obtuſis, ſiliquis erectis. *Ad fl. Plata.*

microphylla Adam. 18. C. foliis radicalibus petiolatis ternato-pinnatis glabris, foliolis obovatis minutis, ſcapo paucifloro, folio florali 3dentato, ſiliquis erectis. *Sibir. bor.* (C. minuta W. herb.)

reſedaefolia 19. C. foliis petiolatis glabris, radicalibus ſubrotundis integris, caulinis ternatis ſ. lyrato-pinnatis, petiolis baſi bidentatis, ſiliquis erectis. *Alp. Europ. med.* (C. heterophylla Lapeyr.)

thalictroides All. 20. C. caule debili flexuoſo foliisque glabris, foliis radicalibus ſimplicibus, ſuperioribus ternatis ſubpinnatisque, foliolis ſubrotundis obtuſe lobatis, ſiliquis elongatis. *Alp. cott. grai. Delphinat.* (C. Plumerii Vill.)

*** *Foliis plerisque pinnatis.*

granuloſa All. 21. C. radice tuberoſo-granuloſa, foliis radicalibus longe petiolatis ſubrotundis integris, caulinis pinnatis, foliolis ſubrotundo-ellipticis repandis, ſiliquis erectis. *In pratis ad Auguſtam Taurinor.*

amara 22. C. caule baſi radicante ſolido, foliolis ellipticis repando-angulato-dentatis glabris, floribus corymboſis, petalis integerrimis, antheris fuſcis, ſiliquis ſtylo filiformi coronatis. *Europ. Sibir.* (C. trifolia Wahlenb. lapp.?)

uliginoſa MB. 23. C. caule baſi ſtolonifero, foliolis angulato-dentatis obtuſiusculis, radicalibus ſubrotundis caulinis oblongis, floribus corymboſis, petalis integerrimis, antheris flavis, ſtylo breviſſimo. *Tauria. Ucrania. Galicia. Sibiria.* (C. dentata Schult.)

prorepens Fiſch. 24. C. caule baſi ſtolonifero ſiliquisque ſtylo filiformi coronatis pubeſcentibus, foliis pinnatis ſubcarnoſis glabris, foliolis ſubrotundo-ovatis ſubintegerrimis, terminali ſub-3lobo. *Sibir. orient.*

pratenſis 25. C. caule erecto fiſtuloſo, foliolis inferioribus ſubrotundo-ovatis dentatis, ſuperioribus lineari-bus integerrimis, antheris flavis, ſiliquis ſtylo breviſſimo ſtigmateque capitato apiculatis. *Europ. omnis. Aſia et Amer. bor.*

pensylvanica Mühlb. 26. C. caule erecto ramoso, foliis sublyrato-pinnatifidis pinnatisque, foliolis cuneatis paucidentatis, petalis calycem aequantibus, siliquis patulis gracilibus stigmate subsessili apiculatis. *Pensylvania.*

parviflora 27. C. caule erecto foliisque pinnatis glabris, foliolis inferioribus spathulato-linearibus obtusis, summis linearibus, petalis angustis, siliquis erecto-patulis. *Gallia. Transsylvania. Sibir. Amer. bor.* (C. virginica L. et teres Mx. sec. Mühlenb. exemplar.)

hirsuta 28. C. caule erecto subflexuoso solido foliisque pinnatis hirsutiusculis, foliolis subdentatis, radicalibus subrotundis, superioribus oblongis, petalis spathulato-linearibus calycem excedentibus, siliquis obtusiusculis. *Montosa Europae totius.* (C. Impatiens fl. dan., flexuosa With.)

sylvatica Link. 29. C. caule erecto fistuloso retrorsum piloso, foliis pinnatis, foliolis oblongis sinuato-dentatis, petalis amplis calycem multo excedentibus, siliquis patulis subulatis. *Sylvatica Europ. totius.* (C. hirsuta fl dan.)

umbrosa Andrz. 30. C. caule erecto foliisque pinnatis glabris, foliolis integerrimis mucronatis, pedicellis subturbinatis, petalis oblongis, siliquis patulis stylo brevissimo crasso terminatis. *Volhynia.*

Impatiens 31. C. caule erecto glabriusculo, foliis pinnatis multijugis, foliolis incisis, stipulis lanceolatis ciliatis reflexis, floribus subapetalis. *Montosa totius Europae et Asiae med.*

chelidonia 32. C. caule ramoso flexuoso foliisque pinnatis subbijugis glabris, foliolis subrotundis obtuse lobatis, siliquis hirsutis. *Italia. Croatia.*

latifolia Vahl. 33. C. caule subramoso, foliis pinnatis subbijugis glabris, foliolis ovatis sinuato-dentatis, siliquis linearibus laevibus stigmate coronatis. *Hispan. Pyren. Italia.* (C. chelidonia Lam., raphanifolia Pourr.)

macrophylla W. 34. C. caule erecto foliisque sub-3jugis amplis pubescentibus, foliolis oblongis utrinque acuminatis grosse serratis, floribus racemosis. *Sibir.* (C. chelidonia Pall.)

† *petiolaris* Cand. 35. C. caule erecto foliisque sub-5jugis glabris, foliolis petiolatis ovatis sublobatis dentatis, siliquis erectis stylo brevissimo crasso terminatis. *Caucasus.*

pectinata Pall. 36. C. caule erecto foliisque 3jugis glabris, foliolis petiolatis subcordato-ovatis pectinato-incisis, siliquis tenuissimis stylo terminatis. *Persia.*

hederacea Cand. 37. C. caule tenero subramoso foliisque glabris, inferioribus longe petiolatis cordatis 3lobis, superioribus pinnatis bijugis, foliolis subcarnosis lobatis, floribus parvis, siliquis tenuissimis. *Syria.* Labillard.

glacialis Cand. 38. C. caule tenero foliisque subbijugis pubescentibus, foliolis lateralibus minimis subdenticulatis,

terminali maximo orbiculato crenato, racemo paucifloro, filiquis gracillimis. *Terra ignis.* (Siſymbrium glaciale Forſt.)

debilis Banks. 39. C. caule tenero foliisque bijugis glabris, foliolis lateralibus ovatis, terminali reniformi ſubδdentato, floribus parvis racemoſis, ſiliquis erectis. *Nov. Zeeland. Inſ. Triſtan d'Acunha?* (C. propinqua Carmich. Siſymbrium heterophyllum Forſt.)

ſarmentoſa Forſt. 40. C. caule erecto baſi ſtolonifero foliisque ſubδ3jugis glabris, foliolis ovatis groſſe dentatis, racemis elongatis, floribus parvis. *Inſ. humiles in archipelag. Georg.*

glauca * 41. C. caule diffuſo ramoſiſſimo, foliis pinnatis ſubcarnoſis glaucis laevibus, foliolis obovatis, terminali 3lobo, floribus corymboſis, ſiliquis linearibus elongatis ſtylo tenui coronatis. *Calabria. Sicilia. Dalmatia?* (C. thalictroides Tin., corydaloides Guſſon., maritima Portenſchl.?)

digitata Richardſ. 42. C. caule baſi repente foliisque digitato-pinnatis glabris, foliolis linearibus integerrimis. *Lit. mar. glacialis in Amer. bor.*

2312. NEVROLOMA Andrz.

arabidiflorum Cand. 1. N. foliis radicalibus oblongis acutis ſubdentatis carnoſis, ſcapo ſimplici corymbifero, petalis integerrimis. *Sibir. orient.* (Arabis grandiflora L., Heſperis arabidiflora Cand. ſyſt. Cheiranthus ſcapiger Adam. Heſperis et Nevroloma ſcapigerum Cand.)

nudicaule Cand. 2. N. foliis radicalibus lineari-oblongis ſubdentatis glabris, ſcapo racemifero, ſiliquis ſubnoduloſis. *Sibir. or. Ora occ. Amer. bor.* (Cardamine nudicaulis L., articulata Pursh.)

arcticum * 3. N. foliis radicalibus imbricatis lanceolatis ſubintegerrimis, ſcapo corymbifero, ſiliquis linearioblongis. *Inſ. Melvill.* (75° lat. bor.) (Parria arctica R. Br.)

2313. ARABIS.

I. *Seminibus haud marginatis.*

* *Foliis ſubamplexicaulibus.*

† *Glabrae.*

braſſicaeformis Wallr. 1. A. caule ſimplici foliisque glaucis glaberrimis, radicalibus ſpathulatis caulinis cordato-ſagittatis acutis integerrimis. *Hercynia. Thuringia. Palatinat. Gallia. Hiſpania. Transſylvan.* (Braſſica alpina L. Eryſimum alpinum Baumg. Cand. Conringia alpina Link. Turritis Braſſica Leers.)

reſedaeflora Humb. 2. A. caule ramoſo foliisque cordato-lanceolatis remote dentatis glabris. *Nov. Granat.* (Naſturtium arabiforme Cand.)

ciliata R. Br. 3. A. caule simplici glaberrimo, foliis ciliatis subdentatis, radicalibus obovatis, caulinis semiamplexicaulibus, siliquis erectis. *Austria. Helvetia. Hibernia.* (Turritis alpina L. syst. ed. 13. ciliata W.)

†† *Pubescentes.*

toxophylla MB. 4. A. caule ramoso foliisque pube stellata sparsis, radicalibus obovato-oblongis subintegerrimis, caulinis cordato-lanceolatis, petalis spathulatis longe unguiculatis. *Ad Volgam et Borysthenem.*

hirsuta Scop. 5. A. caule simplici stricto foliisque pube ramosa hirsutis, radicalibus obovato-oblongis repando-dentatis, caulinis cordato-sagittatis subdenticulatis, petalis spathulatis erecto-patulis, siliquis strictis. *Europ. et Amer. bor.* (Turritis hirsuta L., praecox Sm., sagittata Bertol., ovata Pursh., Arabis montana Lam., sagittata Cand., longisiliqua Wallr., curtisiliqua Fries., planisiliqua Pers. varr.)

crispata W. 6. A. caule superne ramoso foliisque pube stellata hirsutiusculis, radicalibus obovato-oblongis basi profunde dentatis, caulinis cordato-oblongis amplexicaulibus inaequaliter dentatis undulatis, petalis subspathulato-linearibus elongatis erectis, siliquis elongatis patentibus. *Carniolia. Calabria.* (A. undulata Link. var.)

stenopetala Cand. 7. A. caule stricto foliisque supra pube stellata hispidiusculis, radicalibus obovato-lanceolatis in petiolum decurrentibus dentatis, caulinis cordato-ovatis, petalis linearibus angustis, siliquis strictissimis torulosis. *Patria?*

saxatilis All. 8. A. caule simplici foliisque subdentatis pube stellata scabris, radicalibus obovato-oblongis, caulinis cordatis amplexicaulibus, siliquis patulis subtetragono-compressis striatis. *Gallia austr. Ital. super.* (A. nova Vill.)

auriculata Lam. 9. A. caule simpliciusculo foliisque pube ramosa hirsutis, radicalibus ovalibus subintegerrimis, caulinis cordato-oblongis dentatis, pedicellis calycem subaequantibus, siliquis patulis linearibus. *Europ. med. et austr.* (A. aspera All., recta Vill., patula Weinm. Wallr. Turritis patula Ehrh.)

Stelleri Cand. 10. A. caule superne ramoso foliisque pube subsimplici hispidis, radicalibus spathulato-oblongis petiolatis, caulinis cordatis dentatis, floribus corymbosis, petalis obovato-oblongis. *Camtschatca.* (A. camtschatica W. herb.)

laxa Sm. 11. A. caule simpliciusculo colorato, foliis radicalibus obovatis lyrato-dentatis hispidis, caulinis cordatis glaberrimis, siliquis longissimis angustissimis deflexis. *Peloponnes.*

mollis Stev. 12. A. caule ascendente simpliciusculo foliisque pube minima stellata canescentibus, radicalibus

cordato-ſubrotundis groſſe crenatis, caulinis amplexicaulibus inciſo-ſerratis, petalis obovatis, ſiliquis linearibus. *Caucaſ.*

albida Stev. 13. A. caule aſcendente foliisque pube molli ramoſa albido-floccoſo-villoſiusculis, radicalibus ſpathulatis grandidentatis, caulinis cordato-ſagittatis, petalis amplis obovatis, ſiliquis erecto-patulis glabris. *Caucaſ. Perſia.* (A. alpina MB., caucaſica W., Cheiranthus mollis Hornem. A. longifolia Cand. var.)

Billarderii Cand. 14. A. caule tenero foliisque pube ramoſa incano-tomentoſis, radicalibus obovatis paucidentatis, ſuperioribus baſi attenuatis amplexicaulibus, ſiliquis patulis. *Syria.* Labillard.

brevifolia Cand. 15. A. caule glabriusculo, foliis pube ramoſa denſa villoſo-tomentoſis, radicalibus obovatis paucicrenatis, caulinis cordato-ſagittatis integerrimis, ſiliquis patulis ſubincurvis. *Syria.* Labillard.

thyrſoidea Sm. 16. A. caule tenero foliisque obovatis obtuſe dentatis pube ſtellata incano-tomentoſis, caulinis ovatis ſubamplexicaulibus, racemo capitato, ſiliquis curvato-aſcendentibus. *Olymp. Aſiae min.*

alpina 17. A. caule ſubramoſo foliisque ſinuato-dentatis pube ramoſa villoſis, radicalibus obovato-oblongis (interdum ſublyrato-runcinatis), caulinis profunde cordatis amplexicaulibus, ſiliquis compreſſis linearibus ſubincurvis. *Europae alpeſtria. Hiſpania. Islandia. Grönland. Labrador. Atlas. Madera.* (Turritis verna Lam.)

viſcoſa Cand. 18. A. caule pube ſimplici hirſuto ſuperne viſcoſo, foliis paucidentatis pube ramoſa ſcabris, radicalibus obovato-oblongis, caulinis cordato-ovatis amplexicaulibus, calycibus hirſutis. *Perſia bor.*

roſea Cand. 19. A. caule gracili apice glabro, foliis pube ſubramoſa ſcabris, radicalibus obovato-oblongis obtuſe dentatis, caulinis cordatis obtuſis ſemiamplexicaulibus, ſiliquis erectiusculis linearibus ſtigmate ſimplici apiculatis. *Calabria.*

verna R. Br. 20. A. caule erecto foliisque pube 3partita hirſutis, radicalibus ſpathulato-oblongis groſſe ſerratis, caulinis profunde cordatis inaequaliter dentatis, calycibus hiſpidis breviſſime pedicellatis, ſiliquis linearibus compreſſis. *Europ. auſtr. Atlas.* (Heſperis verna L., Turritis purpurea Lam.)

** *Foliis ſeſſilibus.*

† *Glabriusculae.*

Allionii Cand. 21. A. caule aſcendente ſubramoſo flexuoſo, foliis radicalibus obovatis ſubintegerrimis, caulinis ſeſſilibus ovatis ſerratis ſubciliatis, petalis linearibus. *German. auſtr. Pedemont.* (Turritis ſtricta All. nemorenſis Wolf.)

procurrens Kit. 22. A. caule baſi ſtolonifero erecto ſtrigilloſo, foliis glabris integerrimis margine pube appreſſa

2partita ciliatis, radicalibus ſpathulatis caulinis oblongis ſeſſilibus, ſiliquis patulis toruloſis. *Bannatus. Servia.* (A. praecox W.)

vochinenſis * 23. A. caule baſi radicante aſcendente glabriuſculo, foliis radicalibus obovatis ſubintegerrimis laevibus pube appreſſa ciliatis, ſiliquis patulis planis abbreviatis ſtylo terminatis. *Alp. carn. jul.* (Draba mollis Scop., Subularia alpina W.)

petraea Lam. 24. A. caule aſcendente foliisque glabris, radicalibus ſpathulatis paucidentatis, caulinis lineari-lanceolatis integerrimis, ſiliquis patulis linearibus ſtigmate apiculatis. *Europ. Amer. bor.* (Cardamine petraea L., haſtulata Sm. . Card. faeroenſis Horn. et A. lyrata L. var. foliis radicalibus lyratis.)

Halleri 25. A. caule ramoſo baſi pubeſcente ſtolonifero, foliis radicalibus lyratis glabriusculis, caulinis oblongis inciſo-dentatis, ſiliquis toruloſis ſtylo coronatis. *Hercynia. German. auſtr. Italia. Hungar. Transſylvan.* (Cardamine ſtolonifera Scop., Arabis ſtolonifera Horn. Gand.)

ambigua Cand. 26. A. foliis radicalibus ſublyratis ciliatis, caulinis lanceolatis ſeſſilibus integerrimis apice barbatis, ſiliquis linearibus patulis. *Camtſchatca.* (Siſymbrium Tileſii Ledeb.)

†† *Pubeſcentes.*

hiſpida L. fil. 27. A. caule ramoſo inferne hiſpido, foliis radicalibus lyrato-runcinatis pube ramoſa hirſutis, caulinis ſeſſilibus oblongis inciſis, ſiliquis linearibus patentibus. *Europ. med. et bor.* (Cardamine petraea fl. dan., Arabis Thaliana Crantz. et Crantzina Ehrh. ſunt. varr. foliis radicalibus minus lyratis.)

arenoſa Scop. 28. A. caule hiſpido, foliis radicalibus caulinisque inferioribus lyratis pube bifurca hiſpidis, ſiliquis patentibus planiusculis. *Europ.* (Siſymbrium arenoſum L.)

ſtricta Hudſ. 29. A. caule aſcendente baſi hiſpido, foliis pube ſimplici bifurcaque ſparſa hiſpidiusculis, radicalibus ſinuato-pinnatifidis ſublyratis, caulinis ſeſſilibus ſerratis, racemo ſtricto paucifloro, ſiliquis ſcabris. *Anglia. Gallia. Italia. Transſylvan. Amer. bor.* (A. hiſpida Ait., hirta Lam., Turritis Raii Vill.)

muralis Bertol. 30. A. caule aſcendente inferne foliisque hiſpidis, radicalibus ſpathulatis dentatis, caulinis ovatis denticulatis ſeſſilibus, racemo elongato ſiliquisque ſtrictis toruloſis. *Etruria. Liguria. Gallia prov.?*

ſpathulata Cand. 31. A. caule gracili glabro, foliis integerrimis pube ſparſa aſperis ciliatis, radicalibus ſpathulatis mucronatis, caulinis ſubrotundis parvis, racemo brevi, ſiliquis erectis. *Monte Video.* (Siſymbrium ſpathulatum Poir.)

incana Roth. 32. A. caule stricto folioso ad apicem sublanato, foliis omnibus oblongis basi attenuatis sessilibus dentatis pube ramosa incano-villosis, siliquis linearibus erecto-patulis. *Helvetia. Gallia ad fl. Ligerim.*

serpyllifolia Vill. 33. A. caule caespitoso ascendente, foliis omnibus oblongis subintegerrimis pube stellata sparsa scabris, racemo laxo, siliquis elongatis. *Gallia austr.*

Thaliana 34. A. caule gracili subramoso foliisque pube brevissima ramosa pubescentibus, radicalibus spathulato-oblongis subdentatis, caulinis paucis oblongis, siliquis patulis. *Europ. omnis. Asia med. Amer. bor. et austr.?* (A. ramosa Lam. Sisymbrium bellidifolium Poir.?)

pubescens Poir. 35. A. caule erecto stricto, foliis siliquisque erectis pubescentibus, foliis obtuse dentatis, radicalibus spathulato-oblongis, caulinis lanceolatis, petalis linearibus. *Numidia. Hispania?* (Turritis pubescens Desf. A. parvula Dufour. Cand.?)

lasioloba Link. 36. A. caule elato superne ramosissimo siliquisque stellulato-tomentosis, foliis radicalibus lyratis, caulinis lanceolatis dentatis sessilibus, racemis confertis parvifloris, siliquis patentibus stylo subulato terminatis. *Mexico.*

*** *Foliis petiolatis.*

cebennensis Cand. 37. A. caule elato ramoso pilis sparsis obsito, foliis omnibus petiolatis inferioribus cordatis pubescentibus, superioribus ovatis acuminatis sinuato grosse dentatis glabriusculis, racemis axillaribus, siliquis planiusculis. *Tractus Gebennarum Galliae.* (Hesperis inodora Gouan.)

ovirensis Wulff. 38. A. caule basi radicante stolonifero foliisque glabris, radicalibus subrotundis, caulinis oblongis repando-dentatis in petiolum attenuatis, siliquis linearibus. *Carinthia. Transsylvan.*

II. *Seminibus marginato-alatis.*

* *Foliis amplexicaulibus.*

Turrita 39. A. caule simplici foliisque denticulatis pubescentibus, radicalibus oblongis, caulinis cordato-lanceolatis, siliquis margine incrassatis recurvis. *Europ. austr. Anglia (in muris Cantabrig.).* (A. ochroleuca Lam., umbrosa Crantz.)

pendula 40. A. caule sulcato foliisque serratis hispidis, radicalibus ovato-oblongis, caulinis basi dilatata cordatis, siliquis pendulis gracilibus margine aequalibus. *Sibir.* (A. Patriniana Cand.)

oxyota Cand. 41. A. caule ramoso hispido, foliis caulinis acute sagittatis linearibus stellato-pubescentibus, siliquis erectiusculis. *Ind. or.*

laevigata Cand. 42. A. caule simplici foliisque superioribus glaberrimis, radicalibus obovatis denticulatis scabris

subtus discoloribus, caulinis sagittatis integerrimis, siliquis elongatis recurvis. *Amer. bor.* (Turritis laevigata Mühlenb.)

dasycarpa Andrz. 43. A. caule basi stolonifero pubescente, foliis siliquisque compressis stellata pube hirsutis, foliis radicalibus oblongis obtuse dentatis, caulinis hastatis integerrimis. *Podolia. Transsylvan.* (A. recta Baumg.)

** *Foliis sessilibus.*

nivalis * 44. A. caule simplici foliisque oblongis denticulatis glabris, siliquis racemosis compressis pendulis. *Imaus.* (Cardamine nivalis Pall., Macropodium R. Br. Cand.)

canadensis 45. A. caule simplici glabro, foliis subsessilibus oblongo-lanceolatis subdentatis subpubescentibus, siliquis compressis pendulis subfalcatis stylo coronatis. *Amer. bor.* (A. falcata Mx.)

bellidifolia 46. A. caule ascendente foliisque subintegerrimis glabris, radicalibus obovato-oblongis, caulinis ovatis, racemo nutante, siliquis erectis elongatis. *Alp. Europ. med.* (A. intermedia Hopp. var. foliis ciliatis, caulinis subdentatis: A. pumila Wulff. (A. scabra All., nutans Mönch. W., Turritis alpina Braun.) alia var. foliis scabris subdentatis.)

coerulea Wulff. 47. A. caule erecto foliisque glabriusculis, radicalibus spathulatis subdentatis, caulinis subbinis oblongis, siliquis cernuis abbreviatis. *Alp. summae Carinth. Salisburg. Transsylvan.*

stellulata Bertol. 48. A. caule humili paucifolio, foliis radicalibus obovatis obtusis integerrimis pube ramosa incano-hirsutis, racemo pauciflora, siliquis rectis linearibus compressis. *Mons Baldus et Apennin.* (A. pumila Pollin.)

collina Tenor. 49. A. caule erecto, foliis radicalibus obovatis basi profunde dentatis subhyratis, caulinis sessilibus oblongis dentatis pube stellata incano-villosiusculis, siliquis linearibus erectis. *Neapol.*

Heliophila Cand. 50. A. foliis caulinis remotis linearibus pube appressa 2partita canescentibus, siliquis compressis linearibus. *Ind. or. Java.* (Heliophila canescens W.)

2314. TURRITIS.

glabra 1. T. caule elato stricto, foliis radicalibus lanceolatis sinuato-dentatis hirsutiusculis, caulinis sagittatis amplexicaulibus glaberrimis, siliquis strictissimis elongatis. *Europ. omnis. Sibir.* (Arabis lucida L., perfoliata Lam., Sisymbrium simplicissimum Lapeyr.)

salsuginosa Cand. 2. T. caule flexuoso ramoso, foliis cordatis subcarnosis glaucis, siliquis patulis obtusiusculis. *Sibir.* (Sisymbrium salsugineum Pall.)

hispidula Cand. 3. T. caule ramoso foliisque pube ramosa pilosis, caulinis sagittatis amplexicaulibus subserratis, siliquis erectis pubescentibus. *Quito.* (Arabis andicola Kunth.)

Löselii R. Br. 4. T. caule hirto ramoso, foliis runcinatis pilosis, siliquis patentibus glabris. *German. Ital. Borussia. Tauria. Graecia.* (Sisymbrium Löselii L. Leptocarpaea Cand.)

2315. BARBAREA R. Br.

vulgaris R. Br. 1. B. foliis lyratis crenatis basi auriculatis, lobo terminali subrotundo, lateralibus obovatis, petalis spathulato-linearibus, siliquis strictis. *Europ. omnis. Sibiria.* (Erysimum Barbarea L. Sisymbrium Crantz. Barb. stricta Andrz. Bess.)

arcuata Reichenb. 2. B. foliis lyratis angulato-repandis basi auriculatis, lobo terminali subrotundo, lateralibus oblongis, petalis obovatis, siliquis patulo-incurvis. *Germania med. Volhynia. Tauria.* (Erysimum Barbarea MB., Barb. taurica Cand. sub Ch. iberico f. laevigato in W. herb. Sed adest etiam genuinus Ch. ibericus a Mussin Puschkin acceptus.)

praecox R. Br. 3. B. foliis inferioribus lyrato-interrupte pinnatis, superioribus pinnatifidis, laciniis lineari-oblongis integerrimis, petalis obovatis, siliquis erecto-patulis. *Anglia. Gallia. Etruria.* (Erysimum Barbarea β. L., E. praecox Sm.)

plantaginea Cand. 4. B. foliis inferioribus lyratis, lobo terminali maximo subcordato, lateralibus minimis, foliis superioribus ovatis dentatis, siliquis arcuatis. *Asia minor.* (Sisymbrium Barbareae L.)

† *integrifolia* Cand. 5. B. foliis radicalibus oblongis obtusis integerrimis petiolatis, caulinis auriculatis, racemis oppositifoliis. *Asia minor.* (Sisymbrium cappadocicum Tourn.)

2316. NOTOCERAS R. Br.

canariense R. Br. 1. N. caule diffuso, foliis oblongis basi attenuatis subintegerrimis substrigilloso-glabris, petalis angustissimis aequalibus, cornubus siliquae subulatis. *Inf. Canar.* (Erysimum bicorne Ait.)

hispanicum Cand. 2. N. caule prostrato, foliis oblongo-linearibus integerrimis strigosis, petalis inaequalibus, cornubus siliquae subulatis. *Hispania.* (Diceratium prostratum Lag.)

Sibthorpii * 3. N. caule erecto, foliis pinnatifidis incanis, petalis oblongis, cornubus siliquae toruloſae subulatis. *Graecia?* (Cheiranthus bicornis Sibth. Sm.)

cardaminaefolium Cand. 4. N. caule simplici erecto, foliis pinnatis glabris, foliolis subrotundis, terminali trilobo, petalis subaequalibus, cornubus siliquae compressis ob-

tusiusculis. *Asia minor. Thracia. Cyprus.* (Lepidium cornutum Sibth. Sm., Andrzeiowskia Cardamine Reichemb.)

quadricorne Cand. 5. N. caule erecto foliisque oblongo-lanceolatis subdentatis incano-pubescentibus, floribus apetalis, siliquis villosis apice 4cornibus. *Ditio Casan. Russiae.* (Erysimum 4corne Steph. W.)

2317. CHEIRANTHUS.

* *Seminibus haud marginatis.*

Cheiri 1. Ch. caule herbaceo vel suffruticoso, foliis lanceolatis acutis glabris vel pube appressa 2partita subtus canescentibus, siliquis linearibus, stigmatis lobis recurvis. *Europ. med. et austr.* (Ch. fruticulosus L. var.)

alpinus 2. Ch. caule gracili simplicissimo, foliis lanceolatis subdentatis stellato-pubescentibus, siliquis elongatis patulis linearibus, seminibus apice appendiculatis. *Scandinavia arctica.*

ochroleucus Hall. fil. 3. Ch. caule basi decumbente, foliis lineari-lanceolatis subdentatis glabriusculis (s. pube appressa scabriusculis), siliquis erectis stylo filiformi apiculatis. *Jura.* (Ch. dubius Suter., Erysimum ochroleucum *α.* Cand. fl. gall. Ch. decumbens W.)

† *pygmaeus* Adam. 4. Ch. caule simplicissimo ascendente, foliis lineari-lanceolatis integerrimis hispidulis, racemo corymboso, (floribus violaceis,) siliquis longissimis subtetragono-compressis. *Litora maris glacialis in Sibir.*

† *Pallasii* Pursh. 5. Ch. caule simplici foliisque lanceolato-linearibus utrinque attenuatis repando-dentatis glabriusculis, siliqua teretiuscula stylo brevi coronata. *Ora occid. Amer. bor.* (Ch. denticulatus W. herb.)

** *Seminibus marginatis: caule fruticoso.*

tenuifolius Herit. 6. Ch. foliis linearibus integerrimis subsericeis. *Madera.*

linifolius Pers. 7. Ch. foliis linearibus subserratis scabris confertis, pedicellis calyce brevioribus, siliquis teretiusculis calycem triplo superantibus. *Hispania.* (Hesperis linifolia Desf.)

mutabilis Herit. 8. Ch. foliis lineari-lanceolatis argute serratis glabriusculis, racemo longe pedunculato, floribus versicoloribus. *Madera. Teneriffa.*

scoparius Brouss. W. 9. Ch. foliis lineari-lanceolatis integerrimis scabris erectis subcanescentibus, pedicellis calycem subaequantibus, floribus versicoloribus. *Teneriffa.* (Hesperis cinerea Poir.)

semperflorens Schousb. 10. Ch. foliis lineari-lanceolatis integerrimis scabriusculis, pedicellis calyce brevioribus, floribus

albis. *Mauritania.* (Ch. linearis Vent., mutabilis Brouss. in W. herb., frutescens Pers., Hesperis semperflorens α. et frutescens Poir.)

*** *Dubii.*

pulchellus W. 11. Ch. foliis lineari-lanceolatis subspinuloso-serratis strigillosis, calycibus glabris. *Asia minor.*

odoratus Pall. 12. Ch. caule simplici erecto glabro, foliis omnibus albido dense tomentosis, radicalibus pinnatifido-serratis petiolatis, caulinis oblongis sessilibus cartilagineo-dentatis, floribus racemoso-spicatis, calycibus glabris. *Persia bor.*

2318. MATTHIOLA R. Br.

* *Stigmatibus dorso incrassatis ecornibus.*

incana R. Br. 1. M. caule suffruticoso s. herbaceo, foliis lanceolatis obtusis incanis sessilibus, siliquis subcylindricis. *Anglia. Europ. austr. ad litora maris.* (Cheiranthus incanus, annuus L., fenestralis L. fil., glaber Mill. sunt varietates constantes s. subspecies.)

elliptica R. Br. 2. M. caule suffruticoso ramoso tortuoso, foliis petiolatis ellipticis siliquisque teretibus pube stellata tomentosis. *Abyssinia.*

sinuata R. Br. 3. M. caule herbaceo ramoso foliis siliquisque glandulosis floccoso-tomentosis, foliis oblongis inferioribus sinuatis. *Anglia. Europ. austr. Afr. bor.* (Cheiranthus sinuatus L.)

odoratissima R. Br. 4. M. caule erecto ramoso, foliis pinnatifidis tomentosis, siliquis compressis elongatis brevissime pedicellatis tomentoso-villosis. *Tauria. Caucas.* (Cheiranthus odoratissimus Pall. MB.)

tristis R. Br. 5. M. caule basi suffruticoso ramoso, foliis linearibus subdentatis tomentosis, floribus subsessilibus, siliquis teretiusculis incanis apice bituberculatis. *Europ. austr. Afric. bor.* (Cheiranthus tristis L., Hesperis angustifolia Lam. Ch. hilaris W. herb. var. culta.)

varia Cand. 6. M. caule simpliciusculo, foliis linearibus obtusis integerrimis incano-villosis, floribus subsessilibus, siliquis compressis scabris apice bituberculatis. *Italia super. Graecia.* (Cheiranthus varius Sibth. Sm., tristis Suffren.)

tatarica Cand. 7. M. caule simpliciusculo glabro, foliis oblongis dentato-pinnatifidis tomentosis, siliquis teretiusculis subtorulosis glaberrimis. *Sibir. austr. Ad fl. Tanaim.* (Hesperis tatarica Pall.)

torulosa Cand. 8. M. caule erecto foliisque linearibus subintegerrimis floccoso-tomentosis, siliquis subtorulosis glandulososo-hispidis. *Afric. austr.* (Cheiranthus torulosus Thunb.)

9.

tenella Cand. 9. M. caule simpliciusculo foliisque oblongis sinuato-dentatis pube stellata canescentibus, siliquis pubescentibus apice 2tuberculatis. *Cyprus.* Labillard.

graeca Sweet. 10. M. foliis oblongis obtusis basi attenuatis integerrimis glabris, siliquis apice 2tuberculatis. *Graecia.* (Cheiranthus graecus Juss. Pers.)

acaulis Cand. 11. M. caule subnullo, foliis linearibus angustissimis pinnatifido-dentatis tomentosis, floribus subradicalibus racemosis. *Aegypt.* (Cheiranthus acaulis Balb.)

*nana** 12. M. caule pygmaeo, foliis oblongo-linearibus obtuse pinnatifidis pube stellata incano-villosiusculis, floribus minimis subcorymbosis. *Sibiria.* (Cheiranthus nanus W. herb. Pallas. Sisymbrium nanum Cand.)

** *Siliquis apice tricuspidatis.*

coronopifolia Cand. 13. M. caule fruticoso ramoso, foliis linearibus hastatis pinnatifidisque incano-tomentosis, siliquis brevissime pedicellatis linearibus incanis. *Sicilia. Attica. Hispania?* (Cheiranthus coronopifolius Sibth. Sm.)

oxyceras Cand. 14. M. caule ramoso glanduloso, foliis lanceolatis incano-villosis, inferioribus sinuatis superioribus integerrimis, siliquis subsessilibus patentissimis glanduloso-villosis, cuspidibus lateralibus reflexis. *Syria. Persia.* (Cheiranthus syriacus W. herb.)

livida Cand. 15. M. caule ramosissimo, foliis oblongo-linearibus glanduloso-tomentosis, infimis sinuatis, siliquis subsessilibus glanduloso-villosis, cuspidibus ascendentibus stigmate longioribus. *Aegypt.* (Cheiranthus tristis Forsk., lividus Delil.)

*macropetala** 16. M. caule ramoso foliisque sublinearibus sinuato-dentatis pube stellata subvillosis, petalis acutis undulatis elongatis, germine tricuspide eglanduloso. *Ad fl. Tigrim.* (Cheiranthus longipetalus Vent. Matthiola longipetala Cand.)

tricuspidata R. Br. 17. M. caule erecto herbaceo ramoso foliisque lanceolatis sinuato-pinnatifidis villoso-tomentosis, siliquarum cuspidibus subaequalibus. *Ad litora maris mediterran.* (Cheiranthus tricuspidatus L., Hesperis Lam.)

parviflora R. Br. 18. M. caule herbaceo ramoso foliisque lanceolatis repando-dentatis tomentosis, siliquae sessilis cuspidibus lateralibus acutis media obtusa longioribus. *Hispania austr. Mauritania.* (Cheiranthus parviflorus Schousb., Hesperis Poir. Matthiola lunata Cand.)

*lacera** 19. M. caule erecto ramoso, foliis runcinato-pinnatifidis acuminatis glabriusculis, laciniis basi dentatis, calycibus pilosis, siliquis torulosis. *Hispania.* (Cheiranthus lacerus L. sp. Hesperis lacera syst. veg.)

pumilio Cand. 20. M. caule breviſſimo, foliis oblongis obtuſiſſimis ſinuato-pinnatifidis in petiolum decurrentibus ſtellato-tomentoſis, ſiliquae cuſpidibus obtuſis. *Rhodus.* (Cheiranthus pumilio Sibth. Sm.)

humilis Cand. 21. M. caule breviſſimo, foliis oblongis ſinuato-dentatis ſubincanis, floribus racemoſo-ſpicatis, ſiliquae demum glabrae cuſpidibus breviſſimis. *Aegypt.*

2319. MALCOLMIA R. Br.

africana R. Br. 1. M. caule ramoſo foliisque oblongis ſubdentatis pube ramoſa hiſpidis, ſiliquis ſeſſilibus hirtis. *Europ. auſtr. Afric. bor.* (Heſperis africana L., diffuſa Lam., hiſpida Roth.)

taraxacifolia Cand. 2. M. caule ramoſo foliisque oblongis inciſo-dentatis pube diviſa ſparſa hiſpidiusculis, ſiliquis breviter pedunculatis elongatis glabris. *Patria?*

laxa Cand. 3. M. caule ramoſo ſuperne glabro, foliis ovato-lanceolatis dentato-angulatis glabriusculis, ſiliquis elongatis rigidis laevibus. *Sibir.* (Cheiranthus anchius Pall. Heſperis laxa Lam.)

chia Cand. 4. M. caule ramoſo foliisque obovatis ſubintegerrimis pube appreſſa ſcabris, ſiliquis pubeſcentibus ſtylo breviſſimo apiculatis. *Graecia.* (Cheiranthus chius L., Heſperis chia Lam.)

maritima R. Br. 5. M. caule ramoſo foliisque obovato-oblongis ſubdentatis pube diviſa appreſſa ſcabris, ſiliquis pubeſcentibus ſtylo longo cuſpidatis. *Europ. auſtr. Numidia.* (Cheiranthus maritimus L., Heſperis Lam.)

incraſſata Cand. 6. M. caule ramoſo foliisque ovali-oblongis integerrimis pube diviſa appreſſa ſcabris, pedicellis fructiferis incraſſatis, ſiliquis pubeſcentibus. *Inſ. maris aegei.*

arenaria Cand. 7. M. caule ramoſo, foliis inferioribus lanceolatis dentatis ſuperioribus anguſtioribus integerrimis pube ſtellata villoſiusculis, ſiliquis ſeſſilibus patulis toruloſis. *Afric. bor.* (Heſperis arenaria Desf.)

*aegyptiaca** 8. M. caule baſi ſuffruticoſo ramoſo ſiliquisque pedicellatis toruloſis ſtylo brevi apiculatis pube ſtellata caneſcentibus, foliis lineari-oblongis integerrimis albido-tomentoſis. *Ad pyramidas Aegypt.* (Cheiranthus lividus Sieber.)

parviflora Cand. 9. M. caule ramoſo foliisque lineari-oblongis ſubintegerrimis ſublanato-tomentoſis, pedicellis fructiferis incraſſatis, ſiliquis patulis elongatis gracilibus pubeſcentibus. *Gallia auſtr. Italia. Corſica.* (Heſperis parviflora Cand. fl. gall., pumila Poir.)

litorea R. Br. 10. M. ramis virgatis foliisque lineari-lanceolatis obtuſis ſubintegerrimis albo-tomentoſis, ſiliquis pedicellatis incanis. *Gallia occid. Europ. auſtr. Mauritania.* (Cheiranthus litoreus L., unguiculatus Pourr. in W. herb., Heſperis Lam.)

lyrata Cand. 11. M. caule ramoſo foliisque pube appreſſa 2partita caneſcentibus, inferioribus lyratis petiolatis

ſuperioribus oblongis ſeſſilibus ſubdentatis, ſiliquis pedicellatis erectis pubeſcentibus. *Cyprus.* (Cheiranthus lyratus Sibth. Sm.)

alyſſoides Cand. 12. M. caule ramoſo foliisque imbricatis obovato-ſpathulatis ſubintegerrimis ſtellato-tomentoſis, ſiliquis ſubſeſſilibus. *Luſitan.* (Heſperis alyſſoides Perſ.)

patula Cand. 13. M. caule ramoſo diffuſo foliisque linearibus ſubintegerrimis ſtellato-tomentoſis, ſiliquis pedicellatis gracilibus ſtylo longo cuſpidatis pubeſcentibus. *Hiſpania.* (Heſperis arenaria Lag.)

*triloba** 14. M. caule baſi ramoſo foliisque linearibus obtuſis ſinuato-pinnatifidis ſtellato-tomentoſis incanis, ſiliquis pedicellatis toruloſis ſtylo longo cuſpidatis incano-pubeſcentibus *Mauritania. Hiſpania. Aſia minor.* (Cheiranthus globus L. Heſperis pinnatifida Desf., eroſa Lag.? M. Brouſſonetii Cand.) [Malcolmia lacera Cand. ex hac et Matthiola lacera* eſt compoſita.]

*exacoides** 15. M. foliis glabris glaucis ſubdentatis, radicalibus obovatis, caulinis oblongis acutis, racemis paucifloris. *Libanus.* Labillard. (Siſymbrium exacoides Cand.)

2320. HESPERIS.

alyſſifolia Cand. 1. H. foliis oblongis utrinque attenuatis integerrimis ſtellato-ſubtomentoſis, pedicellis calycem villoſiſſimum aequantibus, petalis oblongo-linearibus ſubundulatis. *Perſia.*

triſtis 2. H. foliis oblongo-lanceolatis ſubdentatis ſuperioribus ſeſſilibus hirſutis, pedicellis elongatis rigidis, ſiliquis compreſſis, ſuturis incraſſatis. *Auſtria. Hungar. Transſylvan. Tauria. Italia.* (Cheiranthus lanceolatus W.)

laciniata All. 3. H. caule ramoſo ſiliquisque glanduloſo-hirſutiuſculis, foliis dentato-ſinuatis, radicalibus obovatis, caulinis lanceolatis acuminatis ſeſſilibus. *Gallia auſtr. et orient. Pedemont. Italia. Ucrania.* (H. hieracifolia Vill., villoſa Cand. Cheiranthus laciniatus Poir. Heſp. ſuaveolens Beſſ.)

runcinata Kit. 4. H. caule apice diffuſe ramoſo ſubviſcido-villoſo, foliis inferioribus lyratis, ſuperioribus ovato-oblongis ſinuato-dentatis, ſiliquis glabris. *Hungar.*

matronalis 5. H. caule villoſiuſculo ſubramoſo, foliis ovato-lanceolatis acuminatis ſinuato-dentatis, ſiliquis erectis glabris. *Europ. Sibir.* (H. inodora et ſibirica L.)

nivea Baumg. 6. H. caule hirto, foliis ovato-lanceolatis dentatis hirſutis, inferioribus petiolatis ſuperioribus amplexicaulibus, ſiliquis piloſis patulis. *Alp. dinar.*

heterophylla Tenor. 7. H. caule diffuſo foliisque pubeſcentibus, inferioribus ellipticis ſubintegerrimis, ſuperioribus ovato-lanceolatis ſerratis, ſiliquis erectis gracilibus ſubpubeſcentibus. *Neapol.*

Steveniana Cand. 8. H. caule simplici siliquisque hispidis, foliis radicalibus glabriusculis runcinatis, superioribus ovato-lanceolatis inciso-dentatis hispidiusculis. *Tauria.*

aprica Poir. 9. H. caule simplici retrorsum hispido, foliis spathulato-oblongis linearique lanceolatis hirsutis subintegerrimis, floribus corymbosis. *Sibir.* (Cheiranthus apricus Steph. W., Hesperis Cheiranthus Pers.)

*hyrcanica** 10. H. caule fruticoso dense folioso humili superne hirsutissimo, foliis radicalibus spathulato-linearibus albo-tomentosis, floralibus linearibus calycibusque hirtis. *Persia bor.* (Cheiranthus versicolor Pall. in W. herb.)

bicuspidata Cand. 11. H. caule simplici foliisque lanceolatis acutis subdentatis stellato-pubescentibus, siliqua stigmatibus conniventibus coronata. *Asia minor.* (Cheiranthus 2cuspidatus W., Hesp. cuspidata Poir.)

nitens Viv. 12. H. caule ramosissimo foliisque oblongo-linearibus obtusis integerrimis sessilibus glaberrimis, siliquis brevissime pedicellatis compresso-subtetragonis stigmate duplici coronatis. *Regio Cyrenaica.*

ramosissima Desf. 13. H. caule ramosissimo herbaceo foliisque oblongo-linearibus subintegerrimis incano-subtomentosis, siliquis gracilibus scabris torulosis. *Sicilia. Numidia. Aegypt. Asia minor.*

pygmaea Delil. 14. H. caule ramoso foliisque oblongis obtusis sinuatis pube stellata scabris, siliquis tenuissimis glabris. *Syria. Aegypt.*

pulchella Cand. 15. H. caule subramoso glabro basi folioso, foliis sinuato-pinnatifidis pube ramosa ciliatis, siliquis pedicellatis glabris. *Syria?*

pinnatifida Mx. 16. H. caule subramoso glabro sulcato, foliis inferioribus basi pinnatifidis, superioribus ovato-lanceolatis inaequaliter dentatis, siliquis pedicellatis torulosis scabris. *Ad fl. Ohio.*

crenulata Cand. 17. H. caule ramoso scabro, foliis oblongis obtusis amplexicaulibus crenatis siliquisque glabris. *Mesopotamia.*

diffusa Banks, 18. H. caule suffruticoso, foliis coriaceis inferioribus obovato-oblongis subdentatis, superioribus linearibus paucis. *Madera.* (Sinapis frutescens Ait., angustifolia Cand.)

2321. SISYMBRIUM.

* *Foliis indivisis.*

filifolium W. 1. S. caule humili, foliis linearibus angustissimis, siliquis axillaribus linearibus scabris. *Provinc. Casan Russiae orient.* (Leptaleum Cand.)

lineare Cand. 2. S. caule ramoso, ramis superne villosis, foliis linearibus integerrimis hispidiusculis ciliatis, racemis corymbosis, siliquis glabris tenuissimis. *Sibir.* (Cheiranthus leptophyllus W. herb.)

integrifolium 3. S. caule ramoso siliquisque subtorulosis glanduloso-muricatis, foliis linearibus integerrimis glandu-

losо-villosis. *Sibir.* (Hesperis glandulosa Pers. Andreoskia Cand. prodr.)

†*eglandulosum* Cand. 4. S. caule ramoso villoso siliquisque glabris eglandulosis, foliis linearibus integerrimis. *Sibir.*

contortuplicatum Cand. 5. S. caule ramoso siliquisque torulosis subcontortis hispidulis, foliis radicalibus runcinatis caulinis lanceolatis subdentatis. *Ad Volgam et in Albania veteri.* (Cheiranthus Steph. W., Hesperis M. B.)

juneeum M. B. 6. S. caule ramoso foliisque glaucis laevibus, ramis virgatis, foliis radicalibus runcinatis, caulinis lineari-lanceolatis integerrimis. *Hungar. Transsylvan. Bessarabia. Tauria. Sibir.* (Brassica polymorpha Murr., Cheiranthus junceus Kit., Erysimum junceum W.)

hispanicum Jacqu. 7. S. caule ramoso, foliis lanceolatis subdentatis glabris glaucescentibus, siliquis gracilibus erectis. *Hispan.*

peruvianum Cand. 8. S. caule ramoso hirsuto, foliis oblongis grosse dentatis hirsutiusculis, floribus racemosis bracteatis, bracteis coloratis dentatis pedicellos superantibus, siliquis patentibus hispidis. *Peru.*

strictissimum 9. S. caule elato foliisque oblongo-lanceolatis denticulatis pubescentibus, racemis ebracteatis, siliquis strictis glaberrimis. *Europ. med.*

*toruloso*Desf. 10. S. caule ramoso foliisque oblongo-lanceolatis hispidis, radicalibus inciso-pinnatifidis, caulinis obtuse serratis, siliquis torulosis hispidulis. *Afric. bor. Cyprus.*

*Pallasii** 11. S. caule ramoso, foliis omnibus linearibus integerrimis glabris, inferioribus obtusis superioribus angustis acutis, calycibus longe pilosis, siliquis tenuibus erecto-patulis. *Sibir.?* (S. tenuifolium Pall. in W. herb.)

Kahikir Mart. 12. S. caule gracili ascendente superne nudo, foliis oblongo-linearibus acutis basi attenuatis subintegerrimis hirsutiusculis, ramis racemiferis elongatis, calycibus hispidis, petalis linearibus, siliquis gracilibus elongatis glabris. *Patria?*

atrovirens Horn. 13. S. caule diffuse ramoso foliisque oblongis denticulatis basi auriculatis glabris, petiolis basi dilatatis amplexicaulibus, siliquis subarcuatis laevibus. *China.*

nitidulum Lag. 14. S. caule ascendente simpliciusculo superne glabro aphyllo, foliis oblongis inciso-dentatis petiolatis, racemo laxo, siliquis longe pedicellatis glabris. *Hispania.*

subhastatum W. 15. S. caule diffuso foliisque glaberrimis, radicalibus runcinatis, caulinis subhastatis lanceolatisque integerrimis, siliquis elongatis rigidis patentissimis laevibus. *Inf. maris aegei.* (Brassica subhastata W. sp., Sis. affine W. suppl.)

**** *Foliis pinnatifidis, runcinatis.***

† *Siliquis axillaribus.*

polyceraton. 16. S. caule diffuso foliisque glabris, inferioribus lyrato-runcinatis, superioribus repando-dentatis

haſtatis, ſiliquis ſubaggregatis breviſſime pedicellatis arcuatis ſcabris. *Europ. auſtr.*

villoſum Lag. 17. S. caule diffuſo, ſiliquis elongatis arcuatis villoſis ſubſeſſilibus, foliis omnibus runcinatis. *Hiſpania.* (S. hirſutum Cand.)

runcinatum Lag. 18. S. caule diffuſo glabro, foliis inferioribus runcinato-dentatis, ſuperioribus lanceolatis utrinque attenuatis integerrimis ſiliquisque incurvis laevibus. *Hiſpania.*

ſupinum 19. S. caule erecto ſcabro, foliis petiolatis ſinuato-pinnatifidis, ſiliquis pedicellatis remotis glabris ſubarcuatis ſtylo brevi craſſo coronatis. *Inſ. Oeland. Mons Jura. Ad Sequanam et Rhodanum.* (Arabis ſupina Lam.)

rigidum M. B. 20. S. caule erecto, foliis lineari-lanceolatis ſinuato-dentatis pinnatifidisque hirſutis, racemis paucifloris breviſſime pedunculatis oppoſitifoliis, ſiliquis rectis hiſpidis. *Tauria. Sibir.* (Eryſimum polyceraton et cornutum Pall., Heſperis rigida Stev.)

†† *Siliquis racemoſis.*

α. *Foliis pubeſcentibus.*

†*ſetoſum* Ledeb. 21. S. caule ſimplici erecto ſuperne glabro, foliis radicalibus lyratis argute denticulatis hiſpidis, caulinis paucis exiguis lanceolatis ſeſſilibus, racemo paucifloro, ſiliquis hiſpidis. *Perſia bor.*

† *cinereum* Desf. 22. S. caule ramoſo foliisque linearibus pinnatifidis obtuſis pubeſcentibus, ſiliquis villoſiusculis. *Numidia.*

pectinatum Fiſch. 23. S. caule ſubramoſo foliisque pectinato-pinnatifidis piloſis glanduloſo-muricatis, laciniis linearibus acutis, ſiliquis ſubtoruloſis glabriusculis. *Sibir.* (Cheiranthus pinnatifidus et Siſymbrium muricatum W. herb., Heſperis pinnata Perſ., punctata et piloſa Poir., Arabis grandiflora Pall. Andreoskia Cand. prodr.)

pumilum Steph. W. 24. S. caule erecto foliis ſiliquisque pube minutiſſima ſtellata ſcabris, foliis inferioribus runcinatis, ſuperioribus ſagittatis lanceolatis ſinuato-dentatis. *Perſia bor. Caucaſ.*

hirſutum Lag. 25. S. caule ſimpliciſſimo humili ſiliquisque ſeſſilibus piloſis, foliis radicalibus lyratis hirſutiusculis, caulinis paucis lanceolatis. *Hiſpania.*

Columnae Jacqu. 26. S. caule incano villoſo, foliis runcinatis pubeſcentibus, laciniis ſuperiorum linearibus, ſiliquis erectis ſtrictis glabris ſ. pubeſcentibus. *Europ. auſtr. Aſia minor.* (S. orientale et altiſſimum L., Löſelii Thuill.)

officinale Scop. 27. S. caule ramoſo foliisque runcinatis pubeſcentibus, ſiliquis cauli appreſſis ſubvilloſis. *Europ. omnis. Afric. bor. Amer. bor.* (Eryſimum officinale L.)

obtusangulum W. 28. S. caule inferne retrorſum hiſpido, foliis lyratis pubeſcentibus, lobis obtuſis dentatis, ſuperiorum

anguſtis acutius dentatis, ſiliquis patulis ſubtoruloſis glabris. *Hiſpania. Gallia. Helvetia.* (Sinapis naſturtiifolia et hiſpanica Lam.)

lyratum Burm. 29. S. caule inferne foliisque inferioribus lyratoruncinatis hirſutis, ſuperioribus oblongis dentatis glabris, ſiliquis patulis glabriusculis. *C. B. S.*

Burchellii Cand. 30. S. caule hirto, foliis pinnatis pinnatifidisque piloſis, foliolis ovatis angulato-dentatis, ſiliquis erectiusculis ſcabris. *Afric. auſtr.*

gariepinum Burch. 31. S. caule ramis divaricatis ſubſtellato-appreſſe pubeſcentibus, foliis pinnatifidis piloſiusculis glaucis, laciniis dentatis acutiusculis, ſiliquis rigidis ſcabris. *Afric. auſtr.*

pannonicum Jacqu. 32 S. caule retrorſum hiſpido, foliis inferioribus runcinatis hiſpidulis, ſuperioribus pinnatis linearibus integerrimis glabris, ſiliquis patentiſſimis elongatis gracilibus laevibus. *Helvetia. Hungaria. Transſylvan. Tauria. Caucaſ.* (S. Sinapios Retz. Sinapiſtrum Crantz.)

β. Foliis glabris.

pinnatifidum Cand. 33. S. caule aſcendente inferne pubeſcente, foliis lyratis glabris, ſuperioribus anguſtioribus, (floribus albis), ſiliquis patulis ſtigmate ſeſſili obtuſo terminatis. *Gallia. Italia. Helvetia.* (S. burſifolium Gouan., dentatum All., Arabis pinnatifida Lam., Cardamine runcinata Pourr.)

gallicum W. 34. S. caule aſcendente inferne pubeſcente, foliis ſublyratis ſinuato-pinnatifidis glabris, racemo laxo, (floribus albidis), ſiliquis patentibus ſtylo longo terminatis toruloſis glabris. *Gallia?*

burſifolium 35. S. caule ſubramoſo humili foliisque lyratis glabris, floribus (albis) breviſſime pedicellatis, ſiliquis rigidis patentiſſimis laevibus ſtylo brevi terminatis. *Sicilia. Pyren.* (Heſperis dentata L., Arabis burſifolia Lam.)

aſperum 36. S. caule ramoſo foliisque pinnatifido-ſinuatis glabris, laciniis obtuſis ſubdentatis, pedicellis rigidis breviſſimis, (floribus flavidis), ſiliquis aſperis ſtylo brevi terminatis. *Gallia auſtr. Hiſpania. Luſitan.*

ramuloſum Delil. 37. S caule ramis gracilibus virgatis, foliis inferioribus lyrato-pinnatifidis, ſuperioribus oblongo-linearibus ſubintegerrimis, racemis laxis pauciflоris, ſiliquis laeviſſimis. *Aegypt.*

graecum W. herb. 38. S. caule decumbente diffuſo foliisque petiolatis ſublyratis, lobis repando-dentatis, petalis fugacibus minimis, ſiliquis patentiſſimis laevibus obtuſis. *Patria?*

Irio 39. S. caule foliisque runcinatis glabris, laciniis lanceolatis dentatis, ſiliquis erectis gracilibus laevibus. *Europa. Arabia.* (S. pinnatifidum Forsk., glabrum W.)

eryſimoides Desf. 40. S. caule ſimpliciusculo foliisque lyratis glabris, laciniis argute dentatis, terminali maxima ſublo-

bata, floribus exiguis, ſiliquis pedicellatis patentiſſimis elongatis. *Numidia. Hiſpania.* (S. rigidulum Lag.)

acutangulum Cand. 41. S. caule ſubramoſo, foliis runcinato-pinnatifidis glabris, laciniis ſinibusque acutis, pedicellis filiformibus, calyce patentiſſimo, ſiliquis ſcabris erecto-contortis. *Gallia. Italia.* (Sinapis pyrenaica L., Eryſimum pyrenaicum Vill., Siſymbrium ſinapoides R. Br.)

taraxacifolium Cand. 42. S. caule inferne piloſo, foliis runcinato-pinnatifidis glabris, laciniis acutiſſimis ſubdentatis, calyce erectiusculo, ſiliquis glabris declinatis. *Gallia provinc. Hiſpania.* (S. fugax Lag., contortum ej.?)

*Zeae** 43. S. caule erecto ſubramoſo, foliis inferioribus lyratis repando-dentatis, ſuperioribus haſtato-angulatis, petalis calycem aequantibus, ſiliquis gracillimis ſeſſilibus incurvo-patulis. *Hiſpan.* (S. nitidum Zeae.)

auſtriacum Jacqu. 44. δ. caule erecto foliisque plerisque runcinatis glabris, laciniis approximatis dentatis acutis ſubaequalibus, foliis ſummis linearibus, racemis corymboſis, calyce patente, ſiliquis erecto-patulis ſtrictis glabris obtuſis. *German. med. et auſtr. Helvetia. Gallia. Italia.* (S. Tillerii et eckartsbergenſe W., eryſimifolium Pourr., multiſiliquoſum Hofm.)

***Foliis pinnatis.*

tanacetifolium 45. S. caule ſimplici foliisque pinnatis petiolatis ſubpubeſcentibus, foliolis lanceolatis inciſo-ſerratis, racemis corymboſis, ſiliquis pedicello brevioribus ſubclavatis glabris erectis. *Helvetia. Italia. Gallia auſtr.*

multifidum W. herb. 46. S. caule erecto teretiusculo glabro, foliis inferioribus hirſutis, foliolis lanceolato-linearibus dentatis, infimis reflexis, foliolis ſummis filiformibus glabris, floribus paniculatis, ſiliquis longiſſimis flexuoſis gracilibus ſtigmate craſſo coronatis. *Patria?*

****Foliis decompoſitis.*

Sophia 47. S. caule erecto, foliis 2pinnatis glauco-pubeſcentibus, laciniis linearibus, petalis calyce brevioribus, ſiliquis pedicellatis erectis glabris. *Europ. omnis.* (S. parviflorum Lam.)

*perſicum** 48. S. caule ramoſo pubeſcente, foliis 2pinnatis glabris, laciniis linearibus apice ſubdilatatis ſubdentatis, petalis calycem excedentibus, ſiliquis patentibus pedicellatis glabris. *Perſia.*

caneſcens Nutt. 49. S. foliis 2pinnatis caneſcentibus, laciniis obtuſis dentatis, petalis calycem aequantibus, ſiliquis cla-

vatis pedicello brevioribus. *Amer. bor. et austr.* (S. Sophia Pursh., brachycarpon Richards., myriophyllum W. herb.)

tripinnatum Cand. 50. S. caule ramoso foliisque 3pinnatis pube stellata villosis, laciniis oblongo-linearibus subdentatis, floribus parvis, siliquis gracilibus elongatis glabris. *Afric. austr.* (Sinapis? tripinnata Burch.)

millefolium Ait. 51. S. caule suffruticoso, foliis sub-3pinnatis incanis, foliolis obtusis crenatis, petalis calycem superantibus, siliquis pedicellatis patulis acuminatis. *Teneriffa.* (Sinapis millefolia Jacqu.)

***** *Dubium.*

septulatum Cand. 52. S. foliis pinnatifidis glabris, laciniis linearibus acuminatis subdentatis, siliquis patulis, septo in loculis semina impressa gerente. *Syria.* (Alex. Russell). Novum potius genus esse videtur.

2322. ERYSIMUM.

* *Genuina, calyce erecto deciduo, siliquis exacte tetragonis.*

† *Foliis integerrimis.*

suffruticosum * 1. E. caule suffruticoso, foliis fasciculatis lanceolatis acutis integerrimis pube sub-2partita appressa scabris, calyce unguibus petalorum breviori, siliquis strictis stylo breviusculo coronatis. *Hispania.* (Cheiranthus silenifolius W.)

caespitosum Cand. 2. E. caule suffruticoso, foliis spathulato-linearibus integerrimis pube 2partita canescentibus, siliquis erectis stylo breviusculo coronatis. *Persia bor.*

helveticum Cand. 3. E. caule herbaceo angulato, foliis linearibus obtusis subintegerrimis pube 2partita incanis, petalorum laminis obovatis, siliquis canescentibus stylo stigmateque emarginato coronatis. *Alp. cott. pennin. carpath.* (Cheiranthus helveticus Jacqu., pumilus Schleich. Hornem.? Erysimum pallens Pers.)

canescens Roth. 4. E. caule diffuse ramoso foliisque lineari-lanceolatis integerrimis pube 2partita appressa canescentibus, unguibus petalorum calycem excedentibus, laminis obovatis, siliquis erectis stigmate subsessili coronatis. *Europ. austr.* (E. diffusum Ehrh., Redowskii Weinm., Andrzeiovianum Bell., sylvestre Scop., Cheiranthus alpinus Jacqu.)

leptophyllum Andrz. 5. E. caule ramoso foliisque lineari-lanceolatis integerrimis pube appressa 2partita scabris canescentibus, siliquis patulis pube stellata incanis. *Caucas.* (Cheiranthus leptophyllus M. B.)

strigosum Cand. 6. E. caule subramoso foliisque lanceolatis integerrimis pube 3partita strigosis, siliquis erectis stig-

mate sessili 2partito coronatis. *Sibir.* (Cheiranthus strigosus Ledeb.)

** *Foliis dentatis.*

leptostylum Cand. 7. E. caule herbaceo simpliciusculo, foliis lanceolatis remote subdentatis pube 3partita incanis, petalorum laminis orbiculatis, siliquis stylo filiformi coronatis. *Ad fl. Tanaim. Caucas.* (E. grandiflorum M. B.)

exaltatum Andrz. 8. E. caule elato paniculato, foliis radicalibus spathulatis, caulinis lineari-lanceolatis patentibus remote denticulatis, petalis retusis, glandulis externis 3lobis, siliquis patentibus incrassatis incanis stylo breviss imo coronatis. *Podolia austr.*

odoratum Ehrh. 9. E. caule ramoso, foliis lanceolatis inciso-sinuato-dentatis pube 3partita scabris, unguibus petalorum calycem subaequantibus, laminis subrotundis, siliquis strictis elongatis stigmate 2lobo coronatis. *Hungar.*

virgatum Roth. 10. E. ramis strictis virgatis pube appressa 2partita scabris, foliis lanceolatis denticulatis pube 3partita scabris, unguibus petalorum calyces excedentibus, lamina oblonga, siliquis strictis erectis stylo brevissimo stigmateque 2lobo coronatis. *German. med.* (E. durum Presl.)

longisiliquum Schleich. 11. E. ramis erectis pube appressa 2partita scabriusculis, foliis oblongo-lanceolatis subdentatis pube 3partita scabris, petalorum unguibus calycem aequantibus, laminis oblongis, siliquis strictis elongatis glabris stylo brevi stigmateque 2lobo coronatis. *Helvetia. German. med.*

crepidifolium Reichenb. 12. E. caule ramoso, foliis linearibus apice dilatatis sinuato-dentatis pube 3partita scabris, unguibus petalorum calycem excedentibus, siliquis longissimis patentibus stigmate subsessili coronatis. *German. med.* (E. hieracifolium Cand.)

hieracifolium 13. E. caule ramoso stricto, foliis lanceolatis patulis remote dentatis pube 3partita scabriusculis viridibus, unguibus petalorum calycem aequantibus, siliquis erectis stigmate subsessili coronatis. *Europ.* (E. strictum Gärtn.)

aureum M. B. 14. E. caule ramoso, foliis lanceolatis remote dentatis pube 3partita scabris viridibus, unguibus petalorum calycem excedentibus, siliquis patentibus stylo breviusculo coronatis. *Caucas.*

cheiranthoides 15. E. caule ramoso pube 2partita foliisque lanceolatis subdentatis pube 3partita scabris, siliquis erecto-patulis stigmate parvo subsessili coronatis. *Europ. omnis. Sibir. Amer. bor.* (E. parviflorum Pers. Cheiranthus erysimoides Hudf., turritoides Lam., aquaticus Lejeun., Er. sylvaticum M. B.)

repandum 16. E. caule ramoso, foliis radicalibus runcinatis caulinis lineari-lanceolatis canaliculatis sinuato-dentatis pube appressa 2partita scabris, petalis spathulato-linearibus, siliquis patentissimis subsessilibus elongatis obtusis torulosis. *Europ. med.*

Asia med. (Er. ramosissimum Crantz., Cheiranthus ramosissimus Lam., tenellum Cand.?)

collinum Andrz. 17. E. caule angulato ramoso foliisque pube stellata scabris, inferioribus spathulatis angulato-dentatis superioribus lineari-lanceolatis subintegerrimis, petalis spathulato-linearibus, siliquis erectis gracilibus subasperis. *Caucas.* (Cheiranthus collinus M. B.)

versicolor Andrz. 18. E. caule stricto pube 2partita foliisque 3partita incanis, inferioribus runcinatis superioribus linearibus subintegerrimis, siliquis teretiusculis canescentibus. *Caucas. Persia bor.* (Cheiranthus leucanthemus Steph. W., versicolor M. B.)

Cheiranthus Pers. 19. E. caule ascendente simplici, foliis sublanceolatis sinuato-dentatis pube 3partita scabriusculis, petalorum lamina ampla obovata, siliquis erectis stylo stigmateque 2lobo coronatis. *Europ.* (E. lanceolatum R. Br., diffusum Ker., cheiranthoides Crantz., murale Desf., dubium Cand., alpinum Pers., cheiriflorum Wallr., Hesperis Scop., Cheiranthus erysimoides L., alpinus Vill.)

ibericum Cand. 20. E. caule ramoso glabro, foliis radicalibus runcinatis, caulinis oblongo-lanceolatis sinuato-mucronato-dentatis (pube minima sparsa subramosa) glabriusculis, siliquis elongatis glabris obtusis. *Caucas.* (Cheiranthus ibericus Adam. W. M. B., armeniacus Sims.)

longifolium Cand. 21. E. foliis lineari-lanceolatis elongatis repando-subdentatis, petalorum laminis obovatis, siliquis erectis pubescentibus, stylo longiusculo. *Numidia.* (E. grandiflorum Desf.)

altissimum Lejeun. 22. E. caule diffuso foliisque lanceolatis subdentatis pube appressa scabris, petalorum laminis emarginatis, siliquis erectis canescentibus stylo abbreviato stigmateque 2lobo coronatis. *Belgium.*

rhaeticum Cand. 23. E. caule angulato foliisque lineari-lanceolatis remote denticulatis pube appressa 2partita scabris, siliquis longissimis patulis stylo stigmateque capitato terminatis. *Alp. rhaet.* (Cheiranthus rhaeticus Schleich.)

† *gracile* Cand. 24. E. caule angulato subramoso foliisque lineari-lanceolatis dentatis pube 2-3partita scabris, petalorum laminis obovatis, siliquis erectis pube stellata scabris, stylo subnullo. *Caucas.*

rigidum Cand. 25. E. caule ramosissimo foliisque lineari-lanceolatis acute dentatis pube appressa 2partita scabris, siliquis patulis rigidis, stylo subnullo. *Syria.* Labillard.

scabrum Cand. 26. E. caule simpliciusculo foliisque linearibus pube appressa 2partita canescentibus, inferioribus spathulatis subdentatis, superioribus subintegerrimis, siliquis erectis tuberculato-scabris, stylo filiformi. *Libanus.* Labillard.

asperum Cand. 27. E. caule angulato foliisque pube appressa 2partita subcanescentibus, radicalibus subruncinatis sinuato-dentatis, caulinis linearibus integerri-

mis, siliquis patentibus scabris stylo crasso terminatis. *Ad fl. Missuri.* (Erysimum lanceolatum Pursh., Cheiranthus asper Nutt.)

** *Desciscentia,*

† *calyce patulo.*

Alliaria 28. E. caule foliisque petiolatis cordatis glabris, siliquis erectis tetraëdris pedicello multo longioribus. *Europ. omnis. Asia med.* (Alliaria officinalis Andrz. Cand.)

† ***brachycarpon**** 29. E. caule foliisque petiolatis subrotundis crenatis villosis, siliquis lanceolatis pubescentibus pedicellos subaequantibus. *Caucas.* (Raphanus tauricus Adam., rotundifolius M. B., Alliaria brachycarpa Andrz. Cand.)

†† *Glabritie partium et foliis amplexicaulibus.*

perfoliatum **Crantz.** 30. E. glaberrimum glaucum, foliis radicalibus obovatis, caulinis cordatis obtusis amplexicaulibus integerrimis, siliquis 4gonis venosis patentibus. *Europ. omnis. Asia med. Japon.* (Brassica orientalis L., perfoliata Lam., Eryс. orientale R. Br. Conringia perfoliata Link. Er. austriacum Baumg. (Brassica austriaca Jacqu.) nonnisi floribus minoribus ochroleucis differt.

††† *Calyce subsessili, stylo longo persistente: Syreniae* Andrz.

filiculosum **Cand.** 31. E. foliis linearibus incanis integerrimis, siliquis patentiusculis 4gono-globosis stylo brevioribus calyce tectis. *Caucas. bor. Ad Volgam.* (Cheiranthus filiculosus M. B.)

siculum* 32. E. foliis lineari-lanceolatis glabris integerrimis, siliquis 4gono-ancipitibus incanis stylo brevioribus calyce tectis. *Sicilia.*

sessiliflorum **R. Br.** 33. E. foliis linearibus canaliculatis glabriusculis, calycibus sessilibus deciduis, siliqua lata stylum filiformem aequante. *Tauria. Caucas. Sibir.* (Cheiranthus montanus Pall., 4angulus Herit., cornutus Lam., Erysimum cornutum Pers.)

angustifolium **Ehrh.** 34. E. foliis linearibus angustissimis incanis, calycibus sessilibus deciduis, siliquis 4gonis stylo filiformi multo longioribus. *Hungar. Transsylvan. Podolia.* (Cheiranthus canus Pill. et Mitterp., virgatus Poir.)

cuspidatum **Cand.** 35. E. foliis oblongis sinuato-dentatis scabris, calycibus brevissime pedicellatis deciduis, siliquis appressis 4gono-ancipitibus stylo triplo longioribus. *Tauria. Caucas. Asia minor.* (Cheiranthus cuspidatus M. B., bithynicus Pers.)

† ***rupestre*** **Cand.** 36. E. foliis subdentatis pube ramosa scabris, radicalibus spathulatis, caulinis oblongis, caule suffruticoso. *Asia minor.* (Cheiranthus rupestris Sibth. Sm.)

2323. STANLEIA Nutt.

pinnatifida Nutt. 1. St. caule elato, foliis interrupte pinnatifidis sublyratis subcarnosis, racemis multifloris. *Louisiana.* (Cleome pinnata Pursh.)

† *cartilaginea* * 2. St. foliis petiolatis pinnatifidis cartilagineo-carnosis, laciniis linearibus obtusis subdentatis, floribus corymbosis. *Tauria.* (Sisymbrium cartilagineum Pall. Cand.)

gracilis Cand. 3. St. caule gracili, foliis superioribus oblongis obtusis integerrimis, racemis abbreviatis. *Amer. bor.*

amplexifolia Nutt. 4. St. foliis amplexicaulibus integerrimis glaucis, floribus corymbosis, siliquis nutantibus. *Florida.*

2324. BRASSICA.

* *Siliqua stylo tereti haud mutato terminata.*

† *Siliqua sessilis.*

α. *Foliis superioribus amplexicaulibus.*

oleracea 1. Br. glaberrima glauco-pruinosa, foliis subcarnosis, radicalibus lyratis, caulinis superioribus cordato-oblongo-lanceolatis denticulatis. *Anglia. Graecia.* Subspecies cultu vel solo ortae ac fere constantes:

α. viridis Magnol., caule tereti elongato, foliis expansis, racemis paniculatis.

β. fabellica Renealm., caule subsimplici, foliis sinuato-lobatis, lobis multifidis.

γ. crispa Camer., foliis junioribus subcapitatis, demum patulis bullatis crispatisve.

δ. capitata Lobel., foliis concavis non bullatis ante anthesin in capitulum congestis albidis s. rubentibus.

ε. Caulorapum Lobel., caule ad originem foliorum tumido subgloboso. (Br. gongylodes C. Bauh.)

ζ. cauliflora Renealm., racemorum pedunculis corymbosis confertis ante anthesin valde carnosis abbreviatis, floribus saepe abortientibus. (Br. asparagoides Dalech.)

η. oleifera Mönch.

ϑ. Napus L., radice fusiformi.

ι. praecox Kit., radice annua.

campestris 2. Br. foliis radicalibus lyratis subcarnosis glaucescentibus cauleque inferne hispidis, caulinis superioribus oblongis inciso-dentatis ramisque glaucis glabris. *Per omnem Europam passim.* (Napobrassica est subspecies radice tumida napiformi.)

Rapa 3. Br. foliis radicalibus sublyratis viridibus setoso-scabris, caulinis summis cordato-lanceolatis subintegerrimis glabris, calyce patente. *Europa passim.*

cretica Lam. 4. Br. ſuffruticoſa glaberrima, foliis inferioribus petiolatis ſubrotundo-ovatis crenulatis, ſuperioribus cordato-lanceolatis amplexicaulibus, ſiliquis patulis, ſtylo ſubdilatato. *Creta. Graecia.*

chinenſis 5. Br. herbacea glaberrima glauceſcens, foliis inferioribus petiolatis ovalibus ſubintegerrimis, floralibus amplexicaulibus lanceolatis ſubinciſis, unguibus petalorum calyce brevioribus. *China.*

violacea 6. Br. herbacea, foliis oblongis acute dentatis glabris, floralibus pedicellos ſtipantibus integerrimis, pedicellis calycibus germinibusque villoſis. *China.*

β. Foliis ſuperioribus ſeſſilibus ſ. nullis.

hybrida Tenor. 7. Br. caule baſi ſuffruticoſo ſuperne glabro foliato, foliis laevibus, inferioribus lyratis denticulatis, ſummis ſubhaſtatis ſeſſilibus, calycibus breviſſime pedicellatis coloratis clauſis. *Neapol.*

incana Tenor. 8. Br. caule baſi ſuffruticoſo foliisque incano-villoſiusculis, inferioribus lyratis denticulatis, lobo terminali maximo, caulinis paucis oblongis ſeſſilibus, racemo ſubcompoſito, calycibus longe pedicellatis ſubpatulis. *Neapol.*

Gravinae Tenor. 9. Br. caule foliisque hiſpidis, inferioribus lyratoruncinatis, laciniis inferioribus foliisque ſuperioribus ſubintegerrimis, calycibus patulis, ſiliquis glabris. *Neapol.*

lyrata Desf. 10. Br. caule aſcendente foliisque hiſpidis, radicalibus lyratis, caulinis paucis inciſis, ſiliquis turgidis abbreviatis hiſpidiusculis. *Afric. bor.*

† *Heleniana* Burch. 11. Br. caule aſcendente foliisque lyrato-pinnatifidis hiſpidiusculis, petalis longe unguiculatis venoſis. *Inſ. Helenae.*

magellanica Juſſ. Perſ. 12. Br. caule erecto herbaceo foliisque pectinato-pinnatifidis glabris, racemis ſubcorymboſis, ſiliquis ſtylo ſubnullo terminatis. *Ad fret. Magellan.*

pinnatifida Desf. 13. Br. caule erecto foliisque pinnatifidis glabris, laciniis lanceolatis elongatis ſerratis, calycibus clauſis, ſiliquis glabris cuſpidatis. *Afric. bor. Hiſpan. auſtr.*

Erucaſtrum 14. Br. caule erecto herbaceo foliisque pinnatifidis ſtrigoſis, laciniis oblongis obtuſis irregulariter dentatis, calycibus patulis, ſiliquis glabris ſtylo craſſiusculo terminatis. *German. occid. Gallia. Helvetia. Italia.* (Eryſimum Scop., Eruca Baumg., Siſymbrium Vill.)

† *humilis* Cand. 15. Br. foliis radicalibus carnoſis pinnatifidis glabriusculis, ſcapo corymbifero, ſiliquis toruloſis ſtylo craſſiusculo terminatis. *Gallia auſtr.*

repanda Cand. 16. Br. foliis radicalibus carnoſis ſpathulatis repando-dentatis glabris, ſcapo corymbifero, ſiliquis elongatis applanatis ſtylo terminatis. *Gallia occid. et auſtr.* (Siſymbrium monenſe Vill., repandum W.)

†† *Siliqua substipitata: Günthera* Andrz.

elongata Ehrh. 17. Br. caule herbaceo ramoso glauco-pruinoso, foliis radicalibus sinuato-pinnatifidis hispidulis, superioribus glabris subintegerrimis, calycibus patulis. *Hungar. Transsylvan. Podolia. Tauria. Caucas.*

** *Siliqua stylo dilatato (rostro subancipiti) coronata.*

Sabularia Brot. 18. Br. caule herbaceo foliisque hispidulis, radicalibus pinnatifido-runcinatis, laciniis ovatis dentatis, caulinis simpliciter pinnatifidis, racemis laxis, siliquis torulosis rostro ancipiti terminatis. *Lusitania.* (Sisymbrium Parra L.)

monensis Hudf. 19. Br. caule herbaceo simplici, foliis runcinato-pinnatifidis subcarnosis glaucescentibus, infimis hispidiusculis, laciniis distantibus linearibus subdentatis, racemis elongatis. *Inf. Mona. Scotiae litora occid.* (Sisymbrium monense L. sp. ed. 1.)

Cheiranthus Vill. 20. Br. caule ramoso basi foliisque inferioribus hirtis, foliis pinnatifidis subruncinatis, laciniis distantibus linearibus subintegerrimis, calycibus clausis, petalis venosis, rostro siliquae 1spermo. *Gallia med. et austr. Italia.* (Sinapis Tournefortii et recurvata All., Br. montana Cand. fl. gall.)

cheiranthiflora Cand. 21. Br. caule ramoso hispidulo, foliis glabris, radicalibus lyratis, caulinis pinnatifidis, laciniis inciso-serratis, calycibus clausis, petalis eveniis, rostro siliquae abbreviato aspermo. *Hispania. Gallia.* (Raphanus cheiranthiflorus W.)

Tournefortii Gouan. 22. Br. caule ramoso foliisque lyrato-pinnatifidis hirsutiusculis, laciniis ovatis dentatis, siliquis longe pedicellatis subdeflexis anguste rostratis. *Hispania. Aegypt.* (Eruca erecta Lag.)

laevigata Lag. 23. Br. caule glaberrimo glauco, foliis radicalibus runcinato-pinnatifidis hirtis, laciniis inciso-dentatis, caulinis paucis linearibus, siliquis anguste rostratis. *Hispania.*

valentina Cand. 24. Br. caule basi foliisque inferioribus pinnatifidis hirsutis, laciniis oblongis subdentatis, caulinis glabris subintegerrimis, siliquis anguste rostratis. *Hispania.* (Sisymbrium valentinum L.)

fruticulosa Cyr. 25. Br. caule basi suffruticoso hispido, foliis inferioribus lyratis scabris, lobis obtusis, terminali repando-lobato, calycibus patulis, siliquis torosis brevirostratis. *Neapol. Sicil. Hispan. Afric. bor.* (Br. rupestris Raffin. Sinapis radicata Desf.)

Richerii Vill. 26. Br. caule foliisque glabris, inferioribus petiolatis ovalibus, caulinis paucis lineari-lanceolatis integerrimis, siliquae rostro compresso 2spermo. *Gallia occid. et austr. Italia super.*

*cyrenaica** 27. Br. caule foliisque superioribus amplexicaulibus cordato-ovatis serrulatis glabris, calycibus clausis,

siliquae torulosae rostro tetragono-ancipiti obtuso. *Regio Cyren.* (Raphanus amplexicaulis Viv.)

fragilis Sieb. 28. Br. caule foliisque oblongis in petiolum decurrentibus inaequaliter dentatis glabriusculis, racemo elongato, pedicellis hispidulis, siliquis erectis stipitatis stylo crasso breviusculo coronatis. *Aegypt.*

montana Rafin. 29. Br. suffruticosa glaberrima, foliis petiolatis sublyrato-incisis grosse dentatis, floralibus linearibus integerrimis, floribus paniculatis, siliquis turgidis rostro crasso aspermo terminatis. *Sicil.* (Br. cretica Tin.)

† *erysimoides* Sieb. 30. Br. caule ramoso foliisque lyratis hispidulis, siliquis erectis longe rostratis retrorsum hispidis. *Aegypt.*

† *pinnata** 31. Br. caule foliisque pinnatis glabris, foliolis linearibus obtusis subintegerrimis, siliquis patulis furfuraceo-torulosis longe rostratis. *Ad magnam Syrtim Afric. bor.* (Raphanus pinnatus Viv.)

Eruca 32. Br. caule foliisque lyrato-pinnatifidis hirsutiusculis, racemi pedicellis abbreviatis, petalis venosis, siliquae glabrae rostro lato ancipiti. (Eruca sativa Lam., Br. hispida Tenor.)

vesicaria 33. Br. caule foliisque runcinato-pinnatifidis subtus pilosis, calyce subinflato hirsuto, siliquae retrorsum hispidae rostro ensiformi glabriusculo. *Hispania.* (Eruca vesicaria Cav. Cand.)

2325. SINAPIS.

**Siliqua glabra.*

amplexicaulis Cand. 1. S. caule ramoso foliisque cordatis amplexicaulibus subintegerrimis glabris, siliquis oblongis abbreviatis stylo tenui coronatis erectis longe pedicellatis. *Sicil. Numidia.* (Sisymbrium amplexicaule Desf.)

lanceolata Cand. 2. S. caule ramoso, foliis inferioribus oblongis inciso-dentatis, superioribus lanceolatis subintegerrimis, racemis elongatis. *Ind. occid.*

laevigata 3. S. glaberrima, foliis inferioribus lyratis petiolatis, summis lineari-lanceolatis. *Hispania. Lusitania.* (S. campestris Jacqu. fil.)

integrifolia W. 4. S. glaberrima, foliis inferioribus obovato-oblongis petiolatis duplicato-dentatis, superioribus sessilibus integerrimis. *Ind. or. China.*

brassicata 5. S. glaberrima, foliis inferioribus lyratis, superioribus cordato-oblongis amplexicaulibus. *China.* (S. auriculata Cand., japonica Thunb.)

juncea 6. S. glaberrima, ramis virgatis, foliis amplexicaulibus, inferioribus oblongis dentatis, superioribus lanceolatis subintegerrimis. *China.*

chinensis 7. S. caule basi foliisque lyratis subtus pubescentibus, laciniis subdentatis. *China.*

nigra 8. S. glabriuscula, foliis inferioribus lyratis, superioribus lanceolatis, siliquis erectis stylo breviusculo coronatis. *Europ. Asia med.* (S. Oliveriana Cand., cernua Thunb.)

9.

retrorsa Burch. 9. S. caule basi retrorsum hispido, foliis lyrato-pinnatis basi auriculatis pubescentibus. *Afric. austr.*

arvensis 10. S. caule foliisque inferioribus lyratis superioribus oblongis dentatis pilosis, siliquis erectis angulatis torulosis. *Europ.* (S. timoriana Cand.)

taurica Fisch. 11. S. caule foliisque inferioribus sublyratis superioribus oblongis dentatis glabris, siliquis erectis 4gonis nervosis stylo ancipiti coronatis. *Tauria.*

Allionii Jacqu. 12. S. glabra ramosa, foliis pinnatifidis, laciniis lanceolatis acutis subdentatis, siliquis oblongis laevibus rostrum tenue aequantibus. *Aegypt.*

turgida Delil. 13. S. glabra, foliis oblongis inaequaliter repando-serratis, siliquis ovatis nervoso-reticulatis rostrum conicum subaequantibus. *Aegypt.* (Raphanus turgidus Pers.)

incana 14. S. caule foliisque inferioribus lyratis villosis, siliquis appressis oligospermis rostro ovato coronatis. *Europ. austr.* (Myagrum hispanicum L., Cordylocarpus pubescens Sm.)

subbipinnatifida Lag. 15. S. caule scabro ramoso, foliis pinnatifidis glabris, laciniis lanceolatis obtusis sinuato-pinnatifidis, siliquis patentibus stylo breviusculo coronatis. *Hispania.*

Kaber Cand. 16. S. caule pubescente, foliis oblongis inciso-serratis glabris, siliquis rigidis laevibus stylo conico coronatis. *Persia?*

hastata Desf. 17. S. caule foliisque lyrato-pinnatifidis glabris, siliquis erectis linearibus torulosis rostro ensiformi longioribus. *Nov. Holl.*

leptopetala Cand. 18. S. caule foliisque runcinato-pinnatifidis hispidis, petalis linearibus, siliquis patulis. *C. B. S.*

***Siliqua pubescente s. hispida.*

alba 19. S. caule foliisque lyrato-pinnatifidis glabriusculis, siliquis torosis hispidis oligospermis rostro ancipiti brevioribus. *Europ. med. et austr.* (S. foliosa W.)

hispida Schousb. 20. S. caule retrorsum foliisque lyratis hispidis, siliquis rostroque linearibus hispidiusculis. *Mauritania. Teneriffa. Hispania.* (S. flexuosa Lam.)

disjecta Lag. 21. S. caule ramoso hispidiusculo, foliis interrupte decursive pinnatis, foliolis linearibus obtusis dentato-incisis remotis, siliquis pubescentibus rostro glabro brevioribus. *Hispania.*

heterophylla Lag. 22. S. caule foliisque petiolatis scabris, inferioribus lyratis, superioribus lanceolatis subintegerrimis, siliquis strictis erectis retrorsum hispidis rostro ovato longioribus. *Hispania.*

orientalis 23. S. caule siliquisque erectis retrorsum hispidis sub-4gonis rostro tenui brevioribus, foliis inferioribus lyratis superioribus oblongis incisis. *Germam. austr. Helvet. Hispania.*

circinata Desf. 24. S. caule villoso, foliis lyratis subtrigosis, lobo terminali maximo circinato, siliquis hirtis rostrum aequantibus. *Afric. bor. Sicil.*

pubescens 25. S. caule basi suffruticoso, foliis lyratis siliquisque erectis villosis, lobo foliorum terminali ovato. *Neapol. Sicil. Hispan. Inf. ion.*

geniculata Desf. 26 S. glabriuscula, foliis inferioribus lyratis, summis lanceolatis, siliquis pubescentibus mucrone geniculato inflexo obtusiusculo terminatis. *Afric. bor.*

2326. MORICANDIA Cand.

arvensis Cand. 1. M. siliquis sub-4gonis, foliis oblongis repandis glabris glaucescentibus, superioribus cordatis amplexicaulibus. *Europ. austr. Afric. bor.* (Brassica arvensis L., suffruticosa Desf., Turritis arvensis R. Br.)

hesperidiflora Cand. 2. M. siliquis compressis, valvis 1nerviis, foliis subsessilibus ovato-oblongis sinuato-dentatis subinciſis. *Aegypt.* (Hesperis acris Forsk.)

teretifolia Cand. 3. M. siliquis compressis, valvis enerviis, foliis carnosis teretibus glaucis pinnatis, laciniis filiformibus obtusis. *Numidia. Aegypt.* (Brassica teretifolia Desf.)

2327. DIPLOTAXIS Cand.

* *Stigmate subsessili, siliquis pendulis.*

crassifolia Cand. 1. D. foliis oblongis carnosis basi attenuatis incisolobatis irregulariter dentatis hispidiusculis, racemis paniculatis, siliquis pedicellatis. *Sicilia.* (Sinapis crassifolia Rafin.)

Lagascae Cand. 2. D. foliis pinnatifidis pilosiusculis, laciniis linearibus distantibus, siliquis pedicellatis. *Hispania.*

pendula Cand. 3. D. caule erecto inferne piloso, foliis lanceolatis subsessilibus duplicato-serratis hirsutis, siliquis pedicellatis linearibus truncatis. *Afric. bor.* (Sisymbrium pendulum Desf.)

hispida Cand. 4. D. caule foliisque obovato-oblongis in petiolum decurrentibus hispidis, siliquis breviter pedicellatis. *Aegypt. Syria.* (Sisymbrium Hara Forsk., hispidum Vahl.)

** *Siliquis erectis stylo coronatis.*

*simplex** 5. D. caule subnudo glabro, foliis radicalibus oblongo-linearibus remote dentatis, caulinis paucis linearibus integerrimis, rostro siliquae filiformi, stigmate capitato. *Afric. bor.* (Sisymbrium simplex Viv.)

muralis Cand. 6. D. caule subnudo ascendente retrorsum pilosiusculo, foliis radicalibus sublyratis s. oblongis incisodentatis glabris, caulinis paucissimis, rostro siliquae truncato abbreviato. *Anglia. Europ. med.* (Sisymbrium murale L., Erucastrum Gouan., Barrelieri et monense Thuill.)

Barrelieri Cand. 7. D. caule erecto subnudo superne glabro ramoso, foliis radicalibus confertis lyrato-runcinatis hirsutis, lobis dentatis, foliis caulinis paucis linearibus serratis. *Ital. Hispan.* (Sisymbrium Barrelieri L.)

scaposa Cand. 8. D. scapo nudo breviſſimo foliisque radicalibus oblongis pinnatifidis glabris, lobis brevibus obtusis. *Inſ. Lopaduſa* (hodie Lampeduſa) *inter Meliten et Afric. bor.* Labillard.

viminea Cand. 9. D. scapo nudo decumbente folia radicalia lyrata obtuſiſſima laevia aequante, lobis foliorum repandis, petalis anguſtis calycem subaequantibus, siliquis patulis stylo brevi coronatis. *Gallia. Ital. Sicilia.* (Sisymbrium vimineum L.)

saxatilis Cand. 10. D. caule subnudo erecto, foliis radicalibus subcarnosis pinnatifidis piloſiusculis, laciniis distantibus integerrimis obtuſiusculis, siliquis stylo brevi conico coronatis, seminibus sub-2serialibus. *Europ. austr.* (Sisymbrium monense L. sp. ed. 2., saxatile Lam., repandum Poir., murale et vimineum MB.)

tenuifolia Cand. 11. D. caule ramoso folioso, foliis glabris subbipinnatifidis pinnatifidisque, laciniis distantibus sublinearibus integerrimis, racemis elongatis nudis erectis, siliquis stylo brevi coronatis. *Europ. passim.* (Sisymbrium tenuifolium L., laevigatum W., acre Lam., Brassica muralis Hudſ., Sinapis tenuifolia R. Br.)

catholica Cand. 12. D. caule ramoso folioso glabriusculo, foliis multifidis, laciniis lineari-lanceolatis incisoserratis acutis, siliquis erectiusculis stylo tereti coronatis. *Calabria. Hispania. Lusitania.* (Sisymbrium catholicum L.)

virgata Cand. 13. D. caule folioso superne glabro, foliis petiolatis pinnatifidis, laciniis obtusis dentatis, siliquis stylo ensiformi coronatis. *Hispania.*

erucoides Cand. 14. D. caule ramoso scabro, foliis sublyrato-pinnatifidis, laciniis oblongis dentatis, siliquis patentibus stylo ensiformi coronatis. *Hispan. Gallia austr. Italia. Afric. bor. Mesopotamia.* (Sinapis erucoides L., Sisymbrium Desf.)

ramosissima * 15. D. caule ramosiſſimo foliisque lanceolatis subintegerrimis glaberrimis, racemis longe pedunculatis, siliquis stylo tereti coronatis. *Patria?*

2328. ERUCARIA Gärtn.

aleppica Gärtn. 1. E. siliqua stylifera, foliis subbipinnatifidis pinnatifidisque glaberrimis, laciniis linearibus obtusiusculis subintegerrimis. *Inſ. maris aegei. Asia minor. Syria. Aegypt.* (Bunias myagroides L., Cordylocarpus laevigatus W., Cakile myagroides Poir., Dideſmus Desv.)

Oliverii * 2. E. siliqua stylifera scabra, foliis pinnatifidis pubescentibus, laciniis linearibus obtuse dentatis. *Mesopotamia.* (Raphanus? cakiloideus Cand.)

† *tenuifolia* Cand. 3. E. siliqua stylifera sub-3sperma, foliis bipinnatis glabris, foliolis lineari-subulatis. *Hispania.* (Sinapis hispanica L., Cordylocarpus tenuifolius Sm.)

latifolia Cand. 4. E. siliqua stylifera, foliis pinnatifidis glabriusculis, laciniis oblongis inciso-dentatis. *Aegypt. Syria.*

hypogaea Viv. 5. E. siliqua stylifera, foliis pinnatis, foliolis sessilibus triangulari-falcatis, scapo nudo unifloro. *Corsica austr.* (Sisymbrium monanthon Viv. fl. libyc.)

crassifolia Delil. 6. E. siliqua stigmate subsessili coronata, foliis bipinnatifidis carnosis, laciniis linearibus obtusis. *Aegypt.* (Brassica crassifolia Forsk.)

hyrcanica Cand. 7. E. siliqua stigmate sessili coronata, foliis oblongis basi attenuatis grosse dentatis. *Persia bor.*

2329. SCHIZOPETALON Sims.

Walkeri Sims. *Chili.* Herba ramosa, foliis inferioribus sinuato-pinnatifidis, superioribus lanceolato-linearibus obtuse dentatis pube stellulata, floribus racemosis albis.

2330. CHAMIRA Thunb.

cornuta Thb. *C. B. S.* Herba subscandens, foliis cordatis angulato-dentatis glabris, floribus racemosis albis. (Heliophila circaeoides L. f. W.)

2331. HELIOPHILA.

* *Siliquae moniliformes: herbaceae glabrae.*

pusilla 1. H. foliis lineari-subulatis integerrimis. *C. B. S.*

tenuisiliqua Cand. 2. H. foliis linearibus integerrimis, siliquis tenuissimis. *C. B. S.*

longifolia Cand. 3. H. foliis linearibus integris s. 3partitis, siliquis tenuissimis. *C. B. S.*

amplexicaulis 4. H. foliis infimis oppositis superioribus alternis amplexicaulibus cordato-lanceolatis integerrimis glaucescentibus, siliquis subdeflexis. *C. B. S.* (Trentepohlia integrifolia Roth. catal. 2. 76.)

sonchifolia Cand. 5. H. foliis radicalibus pinnatifidis, laciniis foliisque superioribus linearibus subintegerrimis. *C. B. S.*

dissecta Thb. 6. H. foliis alternis lineari-subulatis 3partito-pinnatifidis, siliquis gracillimis stigmate crasso nodoso terminatis. *C. B. S.*

rivalis Burch. 7. H. foliis pinnatifidis linearibus acutis, petalis obovatis, siliquis erectiusculis stylo brevi apiculatis. *Afric. austr.*

variabilis Burch. 8. H. foliis pinnatifidis linearibus elongatis acutis, petalis oblongo-linearibus, siliquis erectiusculis. *Afric. austr.*

ſeſelifolia Burch. 9. H. foliis pinnatifidis lineari-ſubulatis, ſtaminibus lateralibus appendiculatis, ſiliquis erectiusculis. *Afric. auſtr.*

pendula W. 10. H. foliis pinnatis lineari-filiformibus ſulcatis, ſtaminibus edentulis, ſiliquis pendulis. *Afric. auſtr.* (H. pinnata Vent. Trentepohlia Roth. catal. 2. 73.)

lepidioides Link. 11. H foliis pinnatis ſubcarnoſis linearibus canaliculatis, ſiliquis ovato-oblongis oligoſpermis. *C. B. S.* (Trentepohlia Roth nov. ſpec.)

trifida Thb. 12. H. foliis 3partito-pinnatis ſubfiliformibus, ſiliquis patentibus. *C. B. S.* (H. pinnata L. fil.)

** *Siliquae lineares.*

† *Fruteſcentes.*

cleomoides Cand. 13. H. foliis lineari-lanceolatis integerrimis glabris, ſtaminibus ſubaequalibus, ſiliquis ſtipitatis compreſſis. *Afric. auſtr.* (Cleome capenſis L. Cheiranthus ſtrictus L. fil.)

incana Ait. 14. H. foliis obovato-oblongis ſubcarnoſis ramisque incano-villoſis, ſtaminibus lateralibus appendiculatis, ſiliquis linearibus tomentoſis ſtylo craſſo conico coronatis. *C. B. S.* (H. fruteſcens Lam.)

virgata Burch. 15. H. foliis ovato-oblongis ſubcarnoſis integerrimis ſubdentatisque ramisque glabris, ſiliquis linearibus ſubdeflexis ſtylo longo filiformi coronatis. *Afric. auſtr.*

glauca Burch. 16. H. foliis oblongis ſubcoriaceis integerrimis glabris ramisque virgatis glaucis, ſuperioribus ſublinearibus acutis, ſtaminibus edentulis, ſiliquis linearibus erectis ſtylo acuminatis oligoſpermis. *Afric. auſtr.*

ſtyloſa Burch. 17. H. foliis linearibus acutis integerrimis, ſtaminibus edentulis, ſiliquis linearibus ſtylo filiformi coronatis pendulis. *Afric. auſtr.*

linearifolia Burch. 18. H. foliis linearibus acutis integerrimis, ſtaminibus lateralibus appendiculatis, ſiliquis linearibus ſtylo terminatis erectis. *Afric. auſtr.*

ſucculenta Banks. 19. H. foliis ſemiteretibus carnoſis acutiusculis glabris, ſiliquis linearibus ſtylo terminatis patulis. *Afric. auſtr.* (H. platyſiliqua R. Br., Cheiranthus carnoſus Thunb.)

ſuaviſſima Burch. 20. H. foliis lineari-ſubulatis, ſtaminibus edentulis, ſiliquis linearibus ſtylo terminatis patulis. *Afric. auſtr.*

ſubulata Burch. 21. H. pubeſcens, foliis lineari-ſubulatis acutiſſimis, ſiliquis linearibus ſtylo cuſpidatis patulis. *Afric. auſtr.*

ſcoparia Burch. 22. H. foliis lineari-ſubulatis rigidis ſubfaſciculatis, ramis virgatis, racemis pauciflоris, ſtaminibus edentulis, ſiliquis linearibus erectis ſtylo brevi coronatis. *Afr. auſtr.* (Cheiranthus ſtrictus Poir.)

fascicularis Cand. — 23. H. foliis filiformibus alternis, siliquis linearibus stylo acuminatis erectis. *C. B. S.*

abrotanifolia Cand. — 24. H. foliis 3fido-pinnatifidis subulatis, siliquis linearibus stigmate apiculatis patentibus. *C. B. S.*

†† *Herbaceae.*

pilosa Lam. — 25. H. foliis linearibus trifidisque calycibusque pilosiusculis, staminibus lateralibus dentatis, siliquis linearibus pedicellatis stylo incrassato terminatis. *C. B. S.* (H. integrifolia L., arabioides Sims.)

digitata — 26. H. foliis ovalibus integris sub-5fidisque pilosiusculis, siliquis linearibus. *C. B. S.*

incisa Cand. — 27. H. foliis oblongis basi attenuatis apice lobato-incisis glabris, siliquis angustissimis pendulis. *C. B. S.*

coronopifolia — 28. H. foliis pinnatifidis linearibus glabris, siliquis linearibus angustissimis erectis. *C. B. S.*

trifurca Burch. — 29. H. foliis linearibus angustissimis 3partitis glabris, siliquis linearibus deflexis. *Afric. austr.* (H. 3partita Thunb.)

pectinata Burch. — 30. H. foliis pectinato-pinnatifidis glabris, laciniis approximatis linearibus, siliquis subapiculatis pendulis. *Afric. austr.* (Lunaria elongata Thb.?)

foeniculacea R. Br. — 31. H. pilosiuscula, foliis pinnatis 2pinnatisque filiformibus, siliquis subapiculatis patulis. *C. B. S.*

chamaemelifolia Burch. — 32. H. pilosiuscula, foliis pinnatis linearibus acutis integerrimis, siliquis mucronulatis erectis. *Afric. austr.*

crithmifolia W. — 33. H. villosa, foliis pinnatis subcarnosis linearifiliformibus, petalis calycem subaequantibus, siliquis subapiculatis nutantibus. *Afric. austr.* (H. parviflora Burch.)

*** *Siliquae lanceolatae.*

macrosperma Burch. — 34. H. suffruticosa glabra, foliis linearibus acutis integerrimis, siliquis stylo brevi terminatis oligospermis. *Afric. austr.*

INDEX.

Numerus prior major genera, posterior minor paginas signat.
Nomina literis obliquis expressa synonyma sunt.

A.

Abama Cand. 90.
Abatia R. et P. 1842. 499.
Aberemoa Aubl. 635.
Ablania Aubl. 1978. 612.
Abuta Aubl. 157.
Acacia W. 326.
Acanthodium Delil. 819.
Acanthospora * 1172. 25.
Acanthus 2212. 819.
Acanthus Forsk. et al. 819. 820.
Acer 1464. 224-226.
Achimenes Vahl. 2193. 812.
Achimenes Pers. 812.
Achras 1316. 132.
Achras Forst. 208.
Acladodea R. et P. 225.
Aconitum 1986. 619-622.
Acorus 1293. 118.
Acorus Lichtenst. 109.
Acosta Lour. 212.
Acroconia Mart. 1162. 19.
Actaea 1889. 571.
Actaea L. et al. 628.
Actinocarpus R. Br. 163.
Acunna R. et P. 458.
Acynos Pers. 697.
Adambea Lam. 603.
Adamsia W. 1212. 65.
Adenanthera 1599. 528.
Adenaria Kunth. 475.
Adenodus Lour. 449.
Adenosma R. Br. 2223. 828-829.
Adenostemon Pers. 1680. 357.
Adonis 2036. 645.
Adonis L. et al. 644. 645.
Adoxa 1513. 260.
Adrastea Cand. 1683. 360.
Aechmea R. et P. 1167. 22.
Aeginetia Roxb. 2211. 819.
Aegle Corr. 1922. 598.
Aeollanthus Mart. 2110. 750.
Aeschynanthus Jack. 2236. 838.
Aesculus 1394. 166-167.
Aetheilema R. Br. 2218. 826.
Aethionema R. Br. 2292. 369.
Afzelia Sm. 1633. 345.
Afzelia J. F. Gmel. 810.
Agapanthus Herit. 1184. 29.
Agapanthus W. 29.
Agathophyllum Juss. 1776. 460.
Agave 1232. 78-79.
Agdestis Sess. 2006. 630.
Agrimonia 1787. 461.
Agrimonia L. 245.
Agrostemma L. 420. 422.
Aïphanes W. et al. 140.
Aira L. 114. 115.
Aiuga 2071. 705-706.
Aiuga Link. 706.
Aïzoon 1853. 504-505.
Akeesia Tuss. 223.
Alangium Juss. 1939. 602.
Albuca 1182. 27-28.
Albuca Ker. 83.
Alectorolophus M. B. 2151. 772.
Alectorolophus M. B. 773.
Alectra Thunb. 2210. 819.
Alegria Sess. 1905. 582.
Aletris 1221. 74.
Aletris Ait. et al. 74. 75. 92. 93. 94.
Algue-laguen Feuill. 716.
Alisma 1391. 163.

Aliſma Pursh. L. 633. 634.
Alliaria Andrz. 908.
Allium 1186. 33-40.
Allophylus L. et al. 222.
Aloë 1218. 68-74.
Aloë Lam. et al. 74. 94.
Aloëxylon Lour. 327.
Alonſoa R. et P. 809.
Aloyſia Orteg. 753.
Alphonſia Humb. 141.
Alſine L. et al. 392. 399-403.
Alſtrömeria 1234. 80-82.
Alyſſum 2283. 859-862.
Alyſſum W. et al. 850. 855. 862. 870-872. 875-877. 879.
Amajoua Aubl. 1306. 126.
Amaryllis 1198. 40-54.
Amaryllis W. et al. 56. 55-59.
Amaſonia 2130. 765.
Amirola Perſ. 242.
Ammocharis Herb. 52.
Ammyrſine Pursh. 315.
Amonia Neſtl. 245.
Amoora Roxb. 1320. 133.
Amphilophium Kunth. 2228. 836.
Amygdalus 1815. 475-476.
Amygdalus Pall. 477.
Amyris 1446. 217-219.
Anacampſeros Haw. et al. 433. 453.
Anacardium 1526. 271.
Anagyris 1636. 346.
Anamenia Vent. et al. 644. 645.
Anarrhinum Desf. 2166. 798.
Anarrhinum W. 791. 792.
Anaſtatica 2289. 865.
Anaſtatica L. 858.
Anavinga Lam. 355. 356.
Anblatum Tourn. 818.
Anchonium Cand. 2264. 853.
Andreoskia Cand. 901. 902.
Andreuſia Vent. 766.
Androcymbium W. 1359. 143.
Andromeda 1546. 289-291.
Andromeda L. et al. 185. 197. 202. 210. 287. 288. 291.
Androphytax Wendl. 156.
Andrzeiowskia Reichenb. 895.
Anemone 2043. 660-663.
Anemone Oed. et al. 659. 663. 664. 674.
Angelonia Humb. 2190. 810.
Angophora Cav. 1830. 490.
Anguillaria R. Br. 1368. 146-147.
Aniba Aubl. 243.
Anigozanthus Red. Labill. 26.
Aniſomeles R. Br. 2072. 706.
Anneslea Andr. 605.
Annona L. et al. 636. 639.
Anona Lour. 327. 328.
Anona 2027. 640-642.
Anona Gärtn. et al. 604. 636.
Anopterus Labill. 1321. 153.
Anthericum 1238. 83-85.
Anthericum L. et al. 29. 52. 53. 83. 85-88. 90. 91. 143. 144.
Antherylium Vahl. 1813. 475.
Anthocercis Labill. 2240. 841.
Anthodiſcus Meyer. 1875. 556.
Antholoma Labill. 1876. 567.
Anthonotha P. B. 1638. 346.
Antichorus 1442. 216.
Antirrhinum 2166. 797-798.
Antirrhinum Pursh. et al. 771. 789-798. 800.
Aotus Sm. 1659. 353.
Apactis Thunb. 1780. 460.
Apalatoa Aubl. 357.
Apeiba Aubl. et al. 582.
Aphelandra R. Br. 2216. 825.
Aphyllanthes 1277. 112.
Apicra W. 69. 70.
Aponogeton Thunb. 1799. 465.
Aquilaria Cav. 1669. 356.
Aquilegia 2007. 630-631.
Arabis 2313. 888-895.
Arabis Sibth. et al. 871. 885. 888. 893. 894. 902. 905.
Arbutus 1541. 286-287.
Arbutus Lam. et al. 212. 287.
Arctoſtaphylos Adanſ. 1542. 287.
Areca 1345. 139.
Areca Jacq. 140.
Aremonia Neck. 245.
Arenaria 1713. 395-404.
Areng Labill. 624.
Aretia W. 874.
Argemone 1945. 604.
Argemone L. 569.
Argolaſia Juſſ. 26.
Ariſtotelea Herit. 1756. 450.
Arſis Lour. 1895. 577.
Artabotrys R. Br. 2023. 636.
Arthropodium R. Br. 1240. 87.
Aruba Aubl. 319.
Arundo L. et al. 112. 113.
Aſarum 1785. 461.
Aſcium Schreb. 1927. 599.
Aſimina Adanſ. 2026. 639-640.
Aſparagus 1257. 94-96.
Aſparagus Thunb. 93.
Aſphodelus 1236. 82-83.
Aſphodelus Houtt. et Pall. 76. 83.

Aſpidiſtra Ker. 1489. 245.
Aſtelia Banks. 1364. 144.
Aſteranthus Desf. 1882. 568.
Aſtragalus Pursh. 346.
Aſtranthus Lour. 1405. 169.
Aſtrocaryon Meyer. 1163. 19-20.
Atalanta Nutt. 125.
Athenaea Schreb. 356.
Atherosperma Labill. 1869. 544.
Atragene 2034. 644.
Atragene L. et al. 664. 667.
Atraphaxis 1328. 136.
Attalia Humb. 1995. 624.
Aubletia Schreb. 1904. 582.
Aubletia Gärtn. 493.
Aubrietia Adanſ. 2296. 871.
Augea Thunb. 1668. 556.
Aulacia Lour. 314.
Aurinia Desv. 871.
Averrhoa 1738. 440.
Avicennia 2143. 768.
Axinaea R. et P. 1769. 458.
Azalea L. 293.
Azara R. et P. 1965. 608.

B.

Baccaurea Lour. 1487. 243.
Bactris Gärtn. et al. 19. 141.
Bactyrilobium W. 334.
Baducca Rheed. 573.
Bäckea 1453. 220.
Baitaria R. et P. 1747. 447.
Balanites Delil. 1610. 330.
Balbiſia Cav. 432.
Ballota 2099. 758.
Ballota L. et al. 706. 751. 732. 738. 740. 743.
Balſamona Vand. 456.
Bambuſa Schreb. 1280. 112.
Bambuſa Roxb. et al. 113.
Banara Aubl. 1819. 478-479.
Baniſteria 1706. 586-588.
Baniſteria L. Lam. 329.
Baptiſia Vent. 1641. 347-348.
Baraultia Steud. 1564. 313.
Barbacenia Vand. 1173. 25-26.
Barbarea R. Br. 2315. 894.
Barleria 2220. 827-828.
Barleria L. Lam. 820. 826.
Barraldeia Thuars. 313.
Bartonia Sims. 1837. 493.
Bartſia 2153. 773.
Bartſia L. Pursh. 772. 774. 775.
Baryxylon Lour. 1602. 328.
Baſilaea Poir. Lam. 75. 76.
Baſſia Kön. 1746. 447.
Batſchia Thunb. 1383. 157.
Bauera Andr. 1975. 610.
Bauhinia 1626. 333-334.
Baumgartenia * 1249. 91.
Beatſonia Roxb. 134.
Beauharnoiſia R. et P. 628.
Befaria Mut. 1770. 458.
Begonia 1998. 624-627.
Bellardia All. 773.
Bembix Lour. 1702. 382.
Berberis 1295. 118-120.
Bergera L. 315.
Bergeretia Desv. 855.
Bergia 1723. 422-423.
Berria Roxb. 1906. 582.
Berteroa Cand. 870. 871.
Bertolonia * 1797. 465.
Bertolonia Radd. 509.
Besleria 2238. 840-841.
Besleria L. 843.
Betonica 2100. 738-739.
Bieberſteinia Steph. 1733. 438-439.
Bigelowia * 354.
Bignonia 2224. 829-833.
Bignonia Berter. et al. 828. 834-836.
Binectaria Forsk. 208.
Birolia Bellard. 261.
Biſcutella 2278. 857-858.
Bivonaea Cand. 2291. 869.
Bixa 1910. 594.
Blackwellia Commerſ. 1800. 466.
Blairia Houſt. Gärtn. 753.
Blakea P. Br. 1768. 457-458.
Blandfordia Sm. 1189. 40.
Blechum Juſſ. 2215. 826.
Blepharis Juſſ. 2213. 819-820.
Blighia Kön. 1463. 223.
Boccouia 1778. 460.
Bombax L. 596.
Bonannia Rafin. 223.
Bonapartea R. et P. 25.
Bonnetia Schreb. 1923. 598.
Bontia 2136. 767.
Bontia L. 768.
Boophane Herb. 52.
Boraſſus Jacq. 136.
Borkhauſenia Roth. 843.
Boronia Sm. 1435. 214-215.
Borya R. Br. 91.
Boſcia Lam. 460.
Boswellia Colebr. 1560. 313.
Brachycarpaea Cand. 853.

Brachyſema R Br. 1663. 353.
Brachyſtemum Mx. W. 718. 719.
Braſenia Schreb. 2016. 634.
Braſſica 2324. 909-912.
Braſſica L. et al. 888. 901. 908. 914. 915. 916.
Braya Sternb. 2306. 880-881.
Brindonia Thuar. 448.
Bromelia 1165. 20-22.
Brotera * 752.
Brouſſonetia Orteg. 348.
Browallia 2186. 808.
Browallia Forsk. 806.
Brownlowia Roxb. 1898. 578.
Brünnichia Banks. 1508. 252.
Bruguiera Lam. 1938. 602.
Brunelia R. et P. 1805. 467.
Brunfelſia 2241. 841.
Brunsvigia Ker. Sims. 52. 54. 56.
Bryophyllum Salisb. 260.
Buchanania Roxb. 1562. 313.
Bucida 1687. 359.
Büchnera 2182. 804-806.
Büchnera L. et al. 770. 771. 773. 812. 817.
Buginvillea Commerſ. 1400. 168.
Bulbine W. 1239. 85.
Bulbocodium 1188. 40.
Bulbocodium Adam. 143.
Bunchoſia Juſſ. 1604. 328-329.
Bunias 2269. 854.
Bunias Murr. et al. 850-854. 858. 915.
Burchardia R. Br. 1262. 98.
Burſera Jacq. 1563. 513.
Burtonia R. Br. 1662. 353.
Butomus 1534. 273.
Byrſonima Cand. et al. 383-385.
Byſtropogon Herit. 2086. 720-721.
Byſtropogon Herit. 733.

C.

Cabomba Aubl. 135.
Cacoucia Aubl. 532.
Cactus 1838. 493-498.
Cadia Forsk. 1600. 328.
Cadſura Juſſ. 2028. 642.
Caeſalpinia 1628. 343-344.
Caeſalpinia Lam. 327.
Caeſia R. Br. 1242. 88.
Cakile Tourn. 2262. 852.
Cakile Cand. et al. 850. 915.
Calamintha Pursh. 700.
Calamus 1156. 17-18.
Calamchoë Cand. 260.
Calandrinia Kunth. 453.
Calectaſia R. Br. 1279. 112.
Calepina Adanſ. 2257. 850.
Calinea Aubl. 568.
Callicoma R. Br. 1788. 461.
Calligonum 1798. 465.
Calliſtachys Vent. 1652. 350.
Calliſtachys Vent. 549.
Calliſtemon R. Br. 1845. 499.
Callixene Juſſ. 1268. 99.
Calochortus Pursh. 1371. 147.
Calophyllum 1891. 571-572.
Caloſtemma R. Br. 1194. 45.
Calpidia Thuar. 1674. 357.
Caltha 2042. 659-660.
Calycanthus 1867. 543-544.
Calycanthus L. 544.
Calycopteris Lam. 360.
Calyplectus R. et P. 1836. 493.
Calyptranthes Sw. 1846. 499-500.
Calythrix Labill. 1829. 490.
Calytriplex R. et P. 2203. 815.
Cambogia L. 448.
Camelina Crantz. 2301. 879-880.
Camelina Perſ. et al. 877. 879.
Campelia Rich. 1288. 117.
Campomaneſia R. et P. 1824. 488.
Campſis Lour. 836.
Campynema Labill. 1356. 142.
Canarina 1323. 135.
Canarium 1301. 125.
Canarium W. 513.
Capparis 1894. 572-577.
Capparis Lour. et al. 448. 606.
Capraria 2197. 813-814.
Capraria L. Mx. 802. 811. 843.
Capſella Mönch. Cand. 879.
Capura L. 257.
Carallia Roxb. 1773. 460.
Carapa Aubl. et al. 213.
Cardamine 2311. 885-888.
Cardamine L. et al. 859. 883. 884. 888. 891. 893.
Cardaria Desv. 866.
Cardiaca Lam. 725.
Cardiolepis Wallr. 866.
Cardioſpermum 1500. 246-247.
Cargillia R. Br. 1413. 204.
Carpodetes Herb. 48.
Carpodon Labill. 2020. 634.
Carrichtera Cand. 870.
Cartonema R. Br. 1171. 25.
Caryocar 2000. 627.
Caryophyllata Lam. 543.
Caryophyllus L. 486.
Caryota 1992. 623.

Cafearia 1667. 354-356.
Caffia 1627. 334-343.
Caffia Desv. Collad. 345.
Caffipourea Aubl. 599.
Caffupa Humb. 1308. 127.
Caffuvium Lam. 271.
Caffyta 1525. 271.
Caftalia Salisb. 605.
Caftela Turp. 1432. 214.
Caftelia Cav. 754.
Caftilleia Mut. 2155. 774-775.
Cataria Tourn. 735.
Cathartocarpus Perf. 334. 335.
Cauconthus Forsk. 385.
Caulophyllum Mx. 121.
Cavanillea Lam. 203.
Cavinium Thuar. 294.
Cebatha Forsk. 157.
Cedrota Schreb. 1486. 243.
Celfia 2188. 809-810.
Celfia Gurt. Jacq. 809.
Centranthera R. Br. 2181. 804.
Cephalotus Labill. 1808. 467.
Cephaloxys Desv. 105.
Ceraftium 1720. 416-420.
Ceraftium Vill. et al. 393-394.
Ceratocephalus Mönch. 1810. 469.
Ceratopetalum Sm. 1615. 331.
Ceratoftemma Juff. 1552. 294.
Cercis 1637. 346.
Cercocarpus Kunth. 1844. 499.
Cercodia Murr. 261.
Ceroxylon Humb. 625.
Chadara Forsk. 580-582.
Chaetocrater R. et P. 355.
Chaiturus Ehrh. 737.
Chalcas Lour. 315.
Chamaedorea W. 1332. 156.
Chamaelaucium Desf. 1622. 332.
Chamaelirium W. 151.
Chamaemeles Lindl. 1774. 460.
Chamaenerion Schreb. 233.
Chamaerops 1336. 137.
Chamaerops Mx. et al. 137.
Chamira Thunb. 2330. 916.
Charachera Forsk. 762.
Cheiranthus 2317. 895-896.
Cheiranthus Pall. et al. 854. 870. 880. 888. 890. 894. 896-902. 905-908. 917.
Chelidonium 1887. 570.
Chelidonium Mx. et al. 570. 571.
Chelone 2196. 812-813.
Chelone Forft. 803.
Cherleria 1716. 404.
Chilmoria Hamilt. 1611. 330.
Chilodia R. Br. 2065. 705.
Chimaphila Pursh. 1575. 317.
Chimonanthus Lindl. 1868. 544.
Chitonia Seff. 1440. 216.
Chitonia Don. 300.
Chlamyfporum Salisb. 89.
Chlidanthus Lindl. 48.
Chloanthes R. Br. 2119. 756.
Chlora 1417. 208.
Chloromyron Perf. 1961. 607.
Chlorophytum Ker. 1241. 88.
Choifia Kunth. 1584. 322.
Chondrodendron R. et P. 155.
Chorifpermum R. Br. 854.
Chorifpora Cand. 2272. 854.
Chorizema Labill. 1646. 349.
Chryfobalanus 1817. 478.
Chryfofplenium 1700. 382.
Chryfofplenium Walt. 272.
Chryfithrix 1971. 610.
Chuncoa Juff. 559.
Cimicifuga 2003. 628.
Ciftus 1908. 584-586.
Ciftus L. et al. 586-594.
Citharexylon 2128. 763-764.
Citharexylon Poir. Sw. 755.
Citrofma R. et P. 1871. 544-545.
Citrus L. 598.
Clandeftina Lam. 818.
Claucena N. L. Burm. 315.
Clematis 2045. 664. 670.
Clematis Cand. et al. 644. 663. 664.
Cleome 1299. 121-125.
Cleome Pursh. 125. 909. L. 917.
Cleonia 2056. 694.
Clerodendron 2121. 758-760.
Clethra 1572. 315-316.
Cleyera Thunb. 1916. 596.
Clidemia Don. 298. 299.
Cliffortia 1977. 611-612.
Cliftonia Banks. 1573. 316.
Clinopodium 2062. 700.
Clinopodium L. et al. 719. 731. 742.
Clufia 1924. 598-599.
Clypeola 2275. 855.
Clypeola L. 859. 862.
Cneftis Juff. 1736. 439.
Coburgia Herb. 53.
Coccoloba 1509. 252-253.
Cocculus Cand. et al. 155-157.
Cochlearia 2299. 877-878.
Cochlearia Lam. et al. 850. 853. 866. 876. 880.
Cochlofpermum Kunth. 1918. 596.
Cocos 1353. 141-142.

Cocos Sw. et al. 19. 622. 624.
Codia Forsk. 1494. 245.
Codon 1551. 293.
Coffea Lour 126.
Colbertia Salisb. 631.
Colchicum 1358. 142–143.
Colchicum Ker. 40.
Colebrookia Roxb. 2077. 715.
Coleus Lour. 690.
Collinſia Nutt. 771.
Colona Cav. 582.
Colquhounia Wall. 2107. 745.
Columbia Perſ. 1902. 582.
Columnea 2245. 842–843.
Columnea Link. et al. 810. 812.
Comarum L. et al. 556. 541.
Combretum 1618. 331.
Commelina L. et al. 115. 117.
Conanthera R. et P. 1247. 90–91.
Congea Roxb. 2115. 754.
Conobea Aubl. 2149. 771.
Conobea * 810. 811.
Conocarpus L. 332.
Conoſtegia Don. 296. 301.
Conoſtylis R. Br. 1174. 26.
Conoſtylis Pursh. 27.
Conringia Link. 888. 908.
Convallaria 1258. 96–97.
Convallaria L. et al. 97.
Cookia Sonner. 1568. 314.
Copaifera 1677. 357.
Copaiva Jacq. 557.
Coptis Salisb. 2041. 659.
Corchorus 1907. 583–584.
Cordyline Kunth. et al. 92. 93.
Cordylocarpus Desf. 2270. 854.
Cordylocarpus Sm. W. 913. 915. 916.
Coriaria 1741. 440.
Coronopus Sm. 2266. 853.
Correa Sm. 1436. 215.
Correia Vand. 317. 319.
Corypha 1338. 137–138.
Corypha Roxb. et al. 18. 137.
Coſcinium Colebr. 156.
Coſmia Domb. 453.
Coſſinia Commerſ. 1302. 125.
Cotoneaſter Lindl. et al. 505. 506.
Cotyledon 1731. 437–438.
Cotyledon L. et al. 260. 434.
Cotyliſcus Desv. 853.
Couroupita Aubl. 603.
Coutarea Aubl. 1311. 127.
Crambe 2261. 851.
Crambe All. M. B. 850.
Craniolaria L. 837. 838.
Craniotome Reichenb. 706.
Craſpedum Lour. 449.
Craſſula All. et al. 436. 458.
Crataegus Lour. et al. 505–510.
Crataeva L. 598.
Crateria Perſ. 355.
Crateva 1748. 447–448.
Cremanium Don. 503.
Cremolobus Cand. 857–858.
Crenea Aubl. 1751. 449.
Creſcentia 2242. 842.
Creſcentia Jacq. 842.
Crinum 1199. 54–56.
Crinum L. et al. 29. 56. 51–55. 57. 58.
Croſſandra Salisb. 826.
Crotalaria L. 347. 348.
Croton L. 358.
Crowea Sm 1583. 322.
Crudia Schreb. 1678. 357.
Cryphia R. Br. 2067. 704.
Cryptocarya R. Br. 1524. 270–271.
Cubaea Scop. 1631. 345.
Cuboſpermum Lour. 232.
Cucifera Delil. 139.
Cucubalus 1714. 404.
Cucubalus L. et al. 405–407. 410–415.
Cuellaria R et P. 315. 316.
Cullay Molin. 440.
Cunonia 1691. 361.
Cupania 1456. 220–221.
Cuphea P. Br. 1766. 455–457.
Curatella 1972. 610.
Curculigo Gärtn. 1207. 61.
Cuſſo Bruce 220.
Cyamus Pursh. Salisb. 605. 634.
Cyanella 1231. 78.
Cyclopia Vent. 1643. 348.
Cydonia Perſ. 510.
Cymation * 1357. 142.
Cymbaria 2202. 815.
Cynometra 1595. 527.
Cyrilla Roxb. Herit. 771. 812.
Cyrta Lour. 1587. 285.
Cyrtanthus Ait. 1204. 58.
Cytinus 1420. 209.
Cytiſus Fral. 548.
Czackia Andrz. 1246. 90.

D.

Daïs 1670. 356.
Dalbergia Tuſſ. 840.
Dalibarda Mx. 1860. 526.
Damaſonium Schreb. 1390. 163.

Damasonium Perſ. 163.
Dammara Rumph. 636.
Daphne 1477. 236-238.
Daphne L. et al. 240. 241. 245.
Darwinia Rudg. 1675. 357.
Daſypogon R. Br. 1278. 112.
Daviesia Sm. 1656. 351-352.
Daviesia Vent. 353.
Davilla Vand. 1963. 608.
Decadia Lour. 1937. 602.
Decaspermum Forſt. 488.
Decumaria 1777. 460.
Delima 1920. 597.
Delphinium 1985. 616-619.
Dentaria 2309. 883-884.
Dentidia Lour. 691.
Desmanthus W. 1591. 525-526.
Desmos Lour. 638.
Deutzia Thunb. 1703. 383.
Diamorpha Nutt. 1512. 260.
Dianella Lam. 1252. 92.
Dianella Lam. 93.
Dianthera Forsk. Vahl. 828.
Dianthus 1697. 375-381.
Diaphora Lour. 1718. 416.
Diaſcia Link. 2171. 800.
Dicalyx Lour. 1881. 568.
Dicera Forſt. 449.
Diceratium Lag. 894.
Diceros Perſ. Lour. 812.
Dichorisandra Mik. 1289. 117-118.
Dichroa Lour. 1795. 465.
Dichroma Cav. 2179. 803-804.
Dictamnus 1581. 321.
Didesmus Cand. Desv. 852. 915.
Didymocarpus Jack. 2235. 837.
Digitalis 2163. 787-789.
Dilatris Lam. 26.
Dilivaria Juſſ. 819.
Dillenia 2033. 644.
Dillenia W. et al. 613. 614. 631. 632.
Dillwynia Sm. 1658. 552.
Dillwynia Labill. Sm. 352.
Dimocarpus Lour. 222.
Dionaea 1608. 330.
Dioſcorea 1380. 151-154.
Diospyros 1412. 202-204.
Diospyros Perſ. et al. 267.
Diphylleia Mx. 1298. 121.
Diplanthera R. Br. 2250. 843.
Diplaſia Rich. 1404. 169.
Diplochlaena R. Br. 1679. 357.
Diplophractum Desf. 1900. 578.
Diplotaxis Cand. 2327. 914.
Diplothemium Mart. 1994. 623-624.
Diptera Borkh. 362.
Dipterocarpus Gärtn. 1899. 578.
Dirca 1480. 242.
Disandra 1393. 166.
Dodartia 2201. 815.
Dodecas 1773. 459.
Dodonaea 1481. 242.
Dodonaea Sm. 248.
Doliocarpus Roland. 1883. 568.
Dombeya Herit. 837.
Doryanthes Corr. 1233. 80.
Draba 2298. 872-876.
Draba Lam. et al. 862. 863. 870. 871. 878. 880. 891.
Dracaena 1253. 92-93.
Dracaena Ait. et al. 74. 92. 97. 147.
Dracocephalum 2053. 692-694.
Drimia Jacq. 1223. 75.
Drimys Forſt. 2004. 628.
Droſera L. 432.
Droſophyllum Link. 1727. 432.
Drupatris Lour. 1820. 479.
Dryas 1861. 527.
Dryas Pall. et al. 526. 543.
Drymophila R. Br. 1266. 99.
Duboiſia R. Br. 2246. 843.
Duchesnea Sm. 533.
Duranta 2129. 764-765.

E.

Ebenus Rumph. 126.
Echeandia Orteg. Red. 91.
Eccremocarpus R. et P. 2229. 836.
Edwardſia Salisb. 1645. 349.
Ehrenbergia * 1318. 133.
Ehrharta Thunb. 1285. 114-115.
Elaeis Jacq. 1350. 141.
Elaeocarpus 1752. 449.
Elaeocarpus Retz. 599.
Elaphrium Cand. et al. 218. 219.
Elate 1352. 141.
Elatine 1516. 261.
Elatine Delil. 422.
Elliottia Mühlenb. 1414. 204.
Elsholtzia W. 2089. 721.
Elvaſia Cand. 1431. 214.
Embryopteris Roxb. et al. 203.
Emex Neck. 1386. 162.
Enargea Gärtn. 99.
Enarthrocarpus Labill. 2273. 855.

Encyanthus Lour. 1543. 287.
Entada Adanſ. 1590. 325.
Entada Adanſ. 528.
Entoganum Gärtn. 216.
Ephielis Schreb. 1460. 223.
Epibaterium Perſ. Forſt. 155. 156.
Epigaea 1545. 288–289.
Epilobium 1471. 232–234.
Epilobium Lour. 231.
Epiphegus Nutt. 2209. 819.
Eranthemum W. 828.
Eranthis Salisb. et al. 658.
Eremophila R. Br. 2137. 767.
Eremurus M. B. 1237. 83.
Erica 1408. 177–201.
Erica W. et al. 202.
Erinus 2145. 768–769.
Erinus L. 748. 750.
Eriobotrya Lindl. 505.
Eriogonum Mx. 1531. 272.
Erioſpermum Jacq. 1227. 76.
Erioſtemon Sm. 1582. 521–322.
Eroteum Sw. 596.
Eruca Lam. et al. 910. 911. 912.
Erucaria Gärtn. 2328. 915.
Eryſimum 2322. 905–908.
Eryſimum Baumg. et al. 888. 894. 895. 901. 902. 904. 910.
Erythronium 1211. 64.
Erythronium Rottl. 97.
Erythroſpermum Lam. 1395. 167.
Erythroxylon 1710. 390–391.
Escobedia R. et P. 2185. 808.
Eſpera W. 1943. 603.
Eſpinoſa Lag. 272.
Eſterhazia Mik. 834.
Eucalyptus Herit. 1847. 500–501.
Euchilos R. Br. 1658. 550.
Euchroma Nutt. 775.
Euclea 1789. 462.
Euclidium R. Br. 2280. 858.
Eucomis Herit. 1226. 75–76.
Eucroſia Ker. 1200. 56.
Eucryphia Cav. 2019. 634.
Eudema Humb. 880.
Eugenia Lam. et al. 479–488.
Eunomia Cand. 865. 869.
Euphoria Commerſ. 1458. 222.
Euphraſia 2157. 775–777.
Euphraſia Sebaſt. et al. 775.
Eupomatia R. Br. 1873. 546.
Eurya Thunb. 1755. 450.
Euryale Salisb. 1951. 605.
Euryandra Forſt. 629
Euſtathes Lour. 1448. 219.
Euſtephia Cav. 1205. 59.
Euſtrephus R. Br. 1256. 91.
Eutaxia R. Br. 1657. 352.
Euterpe Gärtn. 1347. 140.
Eutrema R. Br. 2303. 880.
Evandra R. Br. 1970. 610.
Evodia Gärtn. 460.
Evonymus Forsk. 597.
Evosmus Nutt. 267.

F.

Fabricia Gärtn. 1833. 493.
Fagara Thunb. W. 218. 219.
Fagonia 1588. 324.
Farſetia Turr. 2295. 870–871.
Farſetia Desv. 871.
Fereira Vand. 127.
Feronia Corr. 1565. 313–314.
Ferreola Roxb. 126.
Fibraurea Lour. 156.
Ficaria Fiſch. 660.
Fiſchera Sw. 315.
Flacourtia Commerſ. 1957. 607.
Flagellaria 1375. 149.
Flörkea W. 1325. 135.
Floſcopa Lour. 1304. 126.
Foetidia Commerſ. 1848. 501.
Fothergilla 1979. 612.
Fothergilla Aubl. 300.
Fouqueira Kunth. 1879. 568.
Fourcroya Vent. Haw. 79.
Fragaria 1863. 533.
Fragaria L. 541.
Francoa Cav. 1519. 262.
Frankenia 1322. 134–135.
Freziera Sw. 1917. 596.
Frieſia Cand. 449.
Fritillaria 1210. 63–64.
Fritillaria L. 75. 76.
Fuchſia 1473. 234–235.
Fuchſia Sw. 127.
Funckia W. 144.
Funkia * 1190. 40–41.

G.

Gärtnera Roxb. 529.
Gahnia Forſt. 1283. 113–114.
Galanthus 1196. 48.
Galega Thunb. 348.
Galenia 1498. 246.
Galeobdolon Sm. 2091. 725.
Galeopſis 2092. 725.
Galeopſis L. 725.
Galphimia Cav. 1705. 385–386.
Galvezia R. et P. 1520. 262.

Garcinia 1749. 448.
Gardoquia R. et P. 2059. 699-700.
Garidelia 1717. 416.
Garuga Roxb. 1561. 313.
Gasteria Haw. 71.
Galtonia Commerf. 1743. 440.
Gastrolobium Sm. 1651. 350.
Gastronema Sims. 49.
Gaultheria 1544. 287-288.
Gaultheria Pursh. et al. 212. 289.
Gaura 1472. 234.
Gaylussacia Humb. 294.
Gela Lour. 216.
Gelonium Roxb. 1793. 465.
Gelsemium Juss. 2232. 836.
Gemella Lour. 222.
Gentiana L. 208.
Geonoma W. 1160. 18-19.
Geranium L. 432.
Gerardia 2183. 806-808.
Gerardia Mx. et al. 810. 819. 825.
Germanea Lam. Poir. 683. 690.
Geryonia Schrank. 362.
Gesnera 2237. 838-839.
Gesneria Sw. 812.
Gethyllis 1235. 82.
Gethyllis Jacq. W. 60.
Getonia Roxb. 1685. 360.
Geum 1865. 542-543.
Geum L. et al. 543.
Glinia Sw. 754.
Gilibertia R. et P. 1407. 169.
Gillenia Mönch. Nutt. 504.
Gimbernatia R. et P. 1684. 359.
Ginoria Jacq. 1767. 457.
Glabraria L. 267.
Glaphyria Jack. 1826. 489.
Glaucium Tourn. 1888. 571.
Glechoma 2094. 727.
Glechoma Cand. 733.
Glinus 1806. 467.
Gloriosa 1213. 65.
Gloxinia Herit. 2253. 843-844.
Glycosmis Corr. 1566. 314.
Gmelina 2131. 765.
Gnidia 1478. 238-239.
Gnidia Thunb. 241.
Godoya R. et P. 1612. 330.
Goldbachia Cand. 2263. 852.
Gomaria R. et P. 2161. 783.
Gomortega R. et P. 357.
Gomphia Schreb. 1577. 317-319.
Gompholobium Sm. 1649. 349-350.
Gompholobium Labill. Sm. 349. 353.
Gomutus Rumph. 1996. 624.
Gonocarpus Labill. 261.
Grangeria Commerf. 1757. 450.
Gratiola Mühlenb. et al. 769. 771. 801-803.
Greggia Gärtn. 486.
Grewia 1901. 579-582.
Grewia L. 602.
Grias 1890. 571.
Grielum 1728. 432.
Griffinia Herb. 53.
Grislea 1441. 216.
Grubbia Berg. 1491. 245.
Guaiacum 1585. 322.
Guaiacum L. 326.
Guapurium Juss. 1821. 479.
Guatteria R. et P. 2021. 634-636.
Guepinia Bât. et al. 865.
Guettarda Aubl. 127.
Guiera Juss. 1620. 332.
Guilandina 1597. 327.
Guilandina L. 327. 344.
Guioa Cav. 221.
Gulielma Mart. 1349. 140.
Günthera Andrz. 911.
Guzmannia R. et P. 1166. 22.
Gymnandra Pall. 2152. 772-773.
Gymnocarpus Forsk. 382.
Gymnocladus Lam. 1596. 327.
Gymnocladus Lam. 328.
Gynandropsis Cand. 121. 122.
Gynestum Poit. 18. 19.
Gynocardia Roxb. 2013. 632.
Gypsophila 1695. 371-373.
Gypsophila L. 397.
Gyromia Nutt. 150.
Gyrostemon Desf. 2047. 674.

H.

Haemanthus 1201. 56-57.
Haemanthus Thunb. Ait. 52. 56.
Haematoxylon 1601. 328.
Hagenia Lam. 1452. 220.
Halleria 2249. 843.
Haloragis Forst. 1514. 260-261.
Hamadryas Commerf. 2038. 658.
Hamelia W. Lam. 126.
Hardwickia Roxb. 1676. 357.
Harrachia Jacq. 2217. 826.
Hastingia Sm. 755.
Havetia Kunth. 599.
Haworthia Haw. 68-70.
Hebelia C. C. Gmel. 143.

Hebenſtreitia 2113. 754.
Hecatonia Lour. 653.
Hedona Lour. 420.
Hedwigia Sm. 1411. 202.
Hedycarya Forſt. 1872. 546.
Heimia Link. 455.
Heiſteria 1614. 330.
Helianthemum Tourn. 1909. 586-594.
Helianthemum Perſ. 610.
Heliocarpus 1750. 448.
Heliophila 2331. 916-918.
Heliophila L. fil. et al. 853. 871. 893. 916.
Helleborus 2040. 658-659.
Helleborus Lam. L. 469. 659.
Hemerocallis 1214. 65.
Hemerocallis Andr. et al. 40. 41. 90.
Hemiandra R. Br. 2069. 705.
Hemigenia R. Br. 2076. 712.
Hemimeris 2187. 809.
Hemimeris L. et al. 800.
Hemiphragma 2140. 767.
Hemiſtemma Juſſ. 1973. 610.
Hepatica Cand. 660.
Heptaca Lour. 1936. 602.
Hermeſia Thunb. 1497. 246.
Herpeſtes Gärtn. 2173. 801-802.
Herpeſtes Kunth. 803.
Herreria R. et P. 1251. 91.
Heſperis 2320. 899. 900.
Heſperis Lam. et al. 854. 888. 890. 892. 895-903. 914.
Heterodendron Desf. 1672. 356.
Heteropteris Cand. et al. 387. 388.
Hexanthus Lour. 267.
Heymaſſoli Aubl. 216.
Hibbertia Salisb. 1983. 613-614.
Hillia 1312. 127.
Hippeaſtrum Sims. 50. 53.
Hippophaë Pursh. L. 243.
Hiptage Gärtn. 1606. 329.
Hiraea Jacq. 1709. 389.
Hofmannseggia Cav. 1629. 344.
Holmskioldia Retz. 2117. 755.
Holoſteum L. 395.
Homalium Jacq. 1981. 612.
Honckenya W. 1451. 219.
Honkenia Ehrh. 395.
Hopea Roxb. 1745. 447.
Horminum L. et al. 692. 700.
Hornemannia W. 2148. 771.
Hornemannia Link. W. 800. 801.
Hortenſia Lam. et al. 560.
Hottonia L. 330. 803.
Houmiri Aubl. 600.
Hudſonia 1761. 452.
Hutchinſia R. Br. 2285. 863-864.
Hyacinthus 1215. 65.
Hyacinthus L. et al. 26. 29. 65. 66. 78.
Hydrangea 1690. 360-361.
Hydrocharis 1535. 273.
Hydrocleis Rich. 634.
Hydrogeton Perſ. 1388. 162.
Hydromyſtria Meyer. 1365. 145.
Hydropeltis Mx. 634.
Hydropityon Gärtn. 1609. 330.
Hygrophila R. Br. 2221. 828.
Hymenaea 1634. 345.
Hymenocallis Herb. 46. 47.
Hyobanche 2207. 813.
Hyoſpathe Mart. 1344. 139.
Hypelate P. Br. 1455. 220.
Hyperanthera Vahl. 1598. 327-328.
Hypericum Labill. 632.
Hyphaene Gärtn. 1342. 139.
Hypocalyptus Thunb. 347. 348.
Hypopitys Nutt. 317.
Hypoxis 1206. 59-60.
Hypoxis Thunb. L. 60.
Hyptis Jacq. 2096. 730-735.
Hyſſopus 2088. 721.
Hyſſopus Lam. 721.

I.

Jacaranda Juſſ. 2226. 834-835.
Jackſonia R. Br. 1661. 353.
Jambolifera 1437. 216.
Iberis 2286. 864-865.
Iberis L. et al. 863. 865-867. 869.
Icica Aubl. 218.
Jefferſonia Bart. 1468. 227.
Ilex Thunb. 119.
Illicium 2032. 643-644.
Imbricaria Poir. 208.
Imbuſia Herb. 52.
Incarvillea Juſſ. 2231. 836.
Inocarpus Forſt. 1538. 235.
Intſia Walt. 208.
Joncquetia Schreb. 1734. 439.
Jonesia Roxb. 1398. 167.
Joſephinia Vent. 2141. 768.
Iriartea R. et P. 1991. 623.
Iroucana Aubl. 556.

Ifanthus Mx. 2084. 719.
Ifatis 2277. 856.
Ifertia Schreb. 1307. 126-127.
Ismene Herb. 45.
Ifopyrum 1811. 469-470.
Jubaea Humb. 1993. 623.
Juncus 1275. 103-109.
Juncus L. et al. 109. 110. 111. 112.
Juffiena 1470. 231-232.
Juffieua Forsk. 216.
Juftieia L. fil., et al. 826. 827. 828.

K.

Kämpfera Houft. 754.
Kageneckia R. et P. 1803. 466.
Kalmia 1549. 293.
Keithia* 1450. 219.
Keria Cand. 1851. 504.
Keulia Molin. 357.
Kiggelaria 1739. 440.
Klaprothia Kunth. 479.
Knowltonia Salisb. 2035. 644. 645.
Köllea Bir. 658.
Kölreutera Laxm. 1428. 213.
Kölreutera Perf. 247.
Krameria 2255. 844.
Kunthia Humb. 1161. 19.
Kunzia* 1814. 475.

L.

Lacara* 1624. 332.
Lachenalia Jacqu. 1229. 76-78.
Lachenalia L. Thunb. 76. 78.
Lachnaea Lam. et al. 239. 240.
Lacis Schreb. 1980. 612.
Laelia Perf. 850.
Laëtia 1968. 609.
Lafoënfia Vand. 493.
Lafuentea Lag. 2156. 775.
Lagerftrömia 1941. 603.
Lagetta Juff. 1492. 245.
Lagonychium M. B. 326.
Lagotis Gärtn. 772.
Lamium 2093. 725-727.
Lamium Hofm. 725.
Lamourouxia Kunth. 2154. 774.
Lampocarya R. Br. 113. 114.
Lanaria Ait. 1176. 26.
Lancretia Delil. 1726. 432.
Lantana 2126. 761-763.
Lantana Thunb. 763.
Lapageria R. et P. 1270. 99.
Lapiedra Lag. 56.
Laplacea Kunth. 2009. 631.
Lardizabala R. et P. 1384. 158.
Larrea Cav. 1587. 324.
Lafiopetalum Vent. 215.
Latania Commerf. 1988. 623.
Lathraea 2208. 818.
Lathraea L. 818.
Laurelia Juff. 1812. 470.
Laurus 1521. 265-266.
Laurus Retz. et al. 267. 268. 269. 270. 271.
Lavandula 2079. 713.
Lavandula L. fil. et al. 691.
Lawfonia 1445. 217.
Laxmannia R. Br. 1248. 91.
Leandra Radd. 465.
Lecythis 1940. 602-603.
Ledebouria Roth. 1261. 97.
Ledocarpon Desf. 1725. 452.
Ledum 1570. 315.
Ledum Lam. Berg. 315.
Legnotis Sw. 1928. 599.
Leimanthium W. 146.
Leiophyllum Perf. 1571. 315.
Lemnifcia Schreb. 1931. 600.
Lendia Poir. 631.
Leonotis R. Br. 2104. 744.
Leontice 1297. 121.
Leontice L. 118.
Leonurus 2098. 737-738.
Leonurus W. Lour. 725. 744.
Leopoldinia Mart. 1343. 139.
Lepechinia W. 2061. 700.
Leperiza Herb. 48.
Lepia Desv. 865. 867. 878.
Lepidagathis W. 2219. 827.
Lepidium 2290. 865-869.
Lepidium Thunb. et al, 853. 862. 863. 864. 865. 869. 878. 895.
Lepidocaryon Mart. 1340. 138.
Leptaleum Cand. 900.
Leptafpis R. Br. 114.
Leptocarpaea Cand. 894.
Leptochlaena Thuar. 1613. 330.
Leptofpermum Forft. 1832. 491-492.
Leptofpermum Forft. et al. 220. 490. 491.
Lettfomia R. et P. 596.
Leucas R. Br. 2103. 742-744.
Leucoium 1197. 48-49.
Leucoium Thunb. 57.
Leucophyllum Humb. 2198. 814.
Leucofceptrum Sm. 2078. 713.
Lewifia Pursh. 1771. 459.
Lichtenfteinia W. 142.

Licuala Thumb. 1157. 18.
Lightfootia Vahl. 609.
Lilium 1208. 61-62.
Lilium L. Pursh. 64.
Limacia Lour. 155.
Limeum 1403. 169.
Limnocharis Bonpl. 2017. 634.
Limnophila R. Br. 2174. 802.
Limonia 1567. 314.
Limonia L. Roxb. 133. 514.
Limosella 2144. 768.
Linaria Tourn. 2164. 789-797.
Lindera Thunb. 1305. 126.
Lindernia 2146. 769.
Lindernia R. Br. et al. 800. 801. 802. 803.
Lindleya Kunth. 1802. 466.
Linnaea 2251. 843.
Lippia 2111. 751-753.
Lippia Kunth. 763.
Liriodendron 2029. 642.
Liriodendron L. et al. 643.
Liriope Herb. Lour. 46. 97.
Litsea Lam. et al. 266. 267.
Littaea Brignol. 79.
Livistonia R. Br. 1337. 137.
Llagunoa R. et P. 1482. 242.
Llaupanke Feuill. 262.
Loasa Adanf. 1933. 600-601.
Lobelia W. L. 397. 770.
Lodoïcea Commerf. 1987. 622.
Lomandra Labill. 148. 149.
Lomatophyllum W. 1219. 74.
Lonicera Gärtn. 129.
Lophiola Ker. 1177. 27.
Lophira Banks 1841. 499.
Loranthus 1315. 128-132.
Loxonia Jack. 2180. 804.
Ludia Commerf. 1966. 608.
Ludia Bory. 609.
Lumnitzera Jacqu. 2048. 687.
Lunaria 2281. 859. 918.
Lunaria All. et al. 859. 862. 870. 871.
Luffacia * 1554. 294.
Luxemburgia Hilar. 1465. 226.
Luzula Cand. 1276. 109-112.
Luzuriaga R. et P. 1255. 94.
Lychnis 1721. 420-422.
Lychnis Murr. et al. 407. 415.
Lycoris Herb. 55.
Lydaea Molin. 466.
Lyonia Nutt. 1547. 291.
Lythrum 1763. 454.
Lythrum L. et al. 216. 454. 455. 456.

M.

Maba Forft. 1303. 125-126.
Mabea Aubl. 1782. 460.
Macbridea Ell. Nutt. 700.
Macrogyne Link. 245.
Macromerum Burch. 125.
Macropodium R. Br. Cand. 893.
Maerua Forsk. 1954. 606.
Magallana Cav. 1467. 227.
Magnolia 2030. 642-643.
Magnolia Roxb. 642.
Mahonia Cand. Nutt. 119. 120.
Mahurea Aubl. et al. 598.
Malcolmia R. Br. 2319. 898. 899.
Mallingtonia W. 833.
Mallococca Forft. 580.
Mallotus Lour. 1999. 627.
Malpighia 1704. 383-385.
Malpighia Cav. et al. 328. 329.
Mammea 1892. 572.
Mammea Vahl. 607.
Mammillaria Haw. 493. 494.
Mangifera L. 439.
Manicaria Gärtn. 1997. 624.
Manulea 2147. 769-771.
Mappia Schreb. 568.
Marathrum Humb. 1499. 246. 613. 612.
Marcgravia 1877. 567.
Marenteria Thuar. 637.
Margaritaria L. fuppl. 1517. 261.
Marialvea Vand. 2002. 628.
Marila Sw. 598.
Marlea Roxb. 1475. 235.
Marrubium 2101. 739-740.
Marrubium Sieb. 736.
Marsippospermum Desv. 104.
Marsypianthus Mart. 731.
Martinezia R. et P. 1355. 142.
Martinezia R. et P. 136. 157. 140.
Martynia 2234. 857.
Martynia L. 843.
Mascagnia Bert. 589.
Maffonia 1183. 28-29.
Maffonia Sims. 66.
Mataïba Aubl. et al. 225.
Matourea Aubl. 800.
Matthiola R. Br. 2318. 896-898.
Maublia Thunb. 29.
Maurandia Jacqu. 2199. 814.
Mauritia L. fil. 1159. 18.
Maximiliana Mart. 1354. 142.
Mayna Aubl. 1935. 602.
Mazeutoxeron Labill. 215.

Mazus Lour. 2177. 803.
Meconopsis Vign. Cand. 570.
Medeola 1377. 150.
Medeola L. 151.
Megasea Haw. 362.
Melaleuca Forst. et al. 220. 490. 491–492.
Melampyrum 2159. 782–783.
Melanium P. Br. 1764. 454–455.
Melanthium 1367. 146.
Melanthium Jacqu. et al. 143. 144. 146. 147. 151.
Melasma Berg. 807.
Melastoma 1556. 295–305.
Melastoma Aubl. et al. 305. 306. 307. 308. 309. 312.
Melianthus 2254. 844.
Melica Thunb. 114. 115.
Melicocca 1454. 220.
Melicocca Juss. 243.
Melicope Forst. 1438. 216.
Melissa 2052. 692.
Melissa L. et al. 698. 699. 727.
Melistaurum Forst. 354.
Melittis 2063. 700–701.
Melocanna Trin. 1282. 113.
Melodorum Lour. 638.
Memecylon 1474. 235.
Mendoncia Velloz. 679. 765.
Mendozia R. Br. 2132. 765.
Meniocus Desv. 871.
Menispermum 1382. 154–157.
Menonvillea Cand. 2288. 865.
Mentha 2090. 722–724.
Mentha L. et al. 720–721.
Mentzelia 1934. 601.
Menziesia Sm. 1410. 202.
Mercurialis 1529. 271–272.
Merendera Ram. et al. 143.
Meriania Sw. 306.
Mesembrianthemum 1858. 511–525.
Mespilus 1854. 505–508.
Mespilus L. et al. 509. 510.
Metrosideros Gärtn. 1831. 490–491.
Metrosideros W. 492. 499.
Metroxylon Rottb. 1341. 138–139.
Mezonevron Desf. 1630. 345.
Michauxia Herit. 1423. 213.
Michelia 2031. 643.
Miconia Don. 301.
Micranthus Wendl. 827.
Microcorys R. Br. 2075. 712.
Microcos L. et al. 579. 580. 581.
Microlaena R. Br. 115.
Micropetalon Pers. 1719. 416.
Millea Cav. 1224. 75.
Millingtonia L. 833.
Miltus Lour. 467.
Mimosa W. 1415. 204–207.
Mimosa L. et al. 207. 208. 325. 326.
Mimulus 2168. 799.
Mimusops 1419. 208.
Mirbelia Sm. 1664. 353.
Mirobolanus Poir. 558.
Mitella 1693. 361.
Mitraria Cav. 2247. 843.
Mnasium Schreb. 1179. 27.
Möhringia 1496. 246.
Mönchia Roth. 871. 879.
Molina Cav. 329.
Molinaea Juss. W. 221.
Moluccella 2105. 744–745.
Monneria Pers. et al. 801.
Monodora Dun. 1947. 604.
Monotropa 1576. 317.
Monotropsis Schweinitz. 317.
Morenia B. et P. 1334. 137.
Morettia Cand. 2308. 883.
Morgania R. Br. 2176. 802–803.
Moricandia Cand. 2326. 914.
Moringa L. 327.
Mouvera Aubl. 612.
Mouriri Aubl. 331.
Mucizonia Orteg. 438.
Munchhausia L. 603.
Muntingia 1903. 582.
Muricaria Desv. Cand. 850.
Murraya 1569. 315.
Muscari Desf. 1216. 65.
Myagrum 2259. 850.
Myagrum L. et al. 850. 851. 852. 853. 854. 858. 866. 871. 877. 879. 913.
Mylocaryum W. 316.
Myoporum Banks. 2133. 765–766.
Myrodendron Schreb. 1930. 600.
Myrospermum Jacqu. 1635. 345–346.
Myroxylon L. 346. Forst. 608.
Myrsiphyllum W. 1378. 151.
Myrtus 1822. 479–488.
Myrtus Lour. et al. 483. 491. 500.

N.

Nandina Thunb. 1296. 121.
Naravelia Cand. 64.
Narcissus 1193. 42–45.

Narciſſus R. et P. 45.
Narthecium Möhr. 1245. 90.
Narthecium Mx. 144.
Naſturtiolum Scop. 863.
Naſturtium R. Br. 2307. 881–883.
Naſturtium Grantz. et al. 879. 888.
Naſtus Juſſ. 1281. 113.
Neaea R. et P. 1422. 213.
Neetandra Berg. et al. 238. 239. 269.
Nectris Schreb. 1326. 135.
Nectris Pursh. 135.
Negundo Mönch. 225.
Nelitris Gärtn. 1823. 488.
Nelumbium W. 2018. 634.
Nelumbium W. 605.
Nemeſia Vent. 2165. 797.
Nemia Berg. 770.
Nepeta 2095. 727–730.
Nepeta L. W. 706. 718. 733. 735.
Nephelium L. 222.
Nephroia Lour. 156.
Neptunia Lour. 525.
Nerine Herb. Sims. 52. 53.
Neſaea Commerſ. 1765. 455.
Neslia Desv. 2256. 850.
Nevrada 1742. 440.
Nevroloma Andrz. 2312. 888.
Nicandra Schreb. 286.
Niebuhria Cand. 448.
Nigella 2008. 631.
Niota Lam. et al. 214.
Nitraria 1759. 452.
Nolina Mx. 1372. 147.
Norantea Aubl. 599.
Nothria Berg. 134.
Notoceras R. Br. 2316. 894.
Nunnezharia R. et P. 137.
Nunnezia W. 137.
Nuphar Sm. 1952. 606.
Nymphaea 1950. 604–605.
Nymphaea L. et al. 606. 634.

O.

Ochna 1919. 596–597.
Ochna Lam. 318.
Ochradenus Delil. 1792. 464.
Ochthodium Cand. 2265. 853.
Ocimum 2049. 688–689.
Ocimum L. et al. 687. 689. 690. 691.
Ocotea Kunth. 268. 269. 270.
Oenocarpus Mart. 1346. 140.
Oenothera 1469. 227–230.
Oenothera L. et al. 231. 234.
Omphalobium Jacqu. fil. 1594. 327.
Omphalocarpus P. B. 1880. 568.
Oncoba Forsk. 1948. 604.
Oncus Lour. 1273. 103.
Ophiopogon Ker. 1260. 97.
Ophira L. 245.
Ophiſpermum Lour. 356.
Opuntia Haw. 497. 498.
Orchidocarpon Mx. 639.
Oreodoxa W. et al. 140.
Origanum 2082. 716–718.
Origanum Walt. 718. 719.
Orium Desv. 855.
Ormoſia Jackſ. 1665. 353.
Ornithogalum 1185. 29–33.
Ornithogalum L. et al. 27. 68. 75. 76. 90.
Ornithogloſſum Salisb. 1370. 147.
Ornitrophe Poir. et al. 221. 222. 223.
Orobanche 2205. 815–818.
Orobanche M. B. et al. 818. 819.
Orontium 1290. 118.
Orontium Thunb. 118.
Orthocarpus Nutt. 2160. 783.
Orygia Forsk. 1804. 466.
Orygia Forsk. 452.
Oryza 1329. 136.
Osbekia 1559. 311–313.
Osbekia Sw. 306.
Oſteomeles Kunth. 506. 508.
Othrys Thuar. 447.
Ottelia Perſ. 163.
Ouratea Aubl. 318.
Ouriſia Commerſ. 2178. 803.
Ouriſia Perſ. Poir. 804.
Ouvirandra Thuar. 162.
Ovieda L. 758. 760.
Oxalis 1724. 423–432.
Oxycarpus Lour. 448.
Oxycoccus Pursh. Perſ. 209. 212.
Oxylobium Andr. 1648. 349.
Oxyria Hill. 1327. 135–136.

P.

Pachynema R. Br. 1701. 382.
Paederota L. 800.
Paeonia 1984. 614–615.
Pallaſia L. Pall. 465.
Paméa Aubl. 359.
Pancovia W. 1397. 167.
Pancratium 1195. 45–48.
Panicum W. 609.
Panke Molin. 262.

Panzera W. 1536. 285.
Panzera Mönch. 738.
Papaver 1885. 569-570.
Papaver L. 570.
Papularia Forsk. 582.
Parentucellia Viv. 2239. 841.
Pariana Anbl. 1969. 609.
Parinari Aubl. 167.
Paris 1515. 261.
Parkinsonia 1632. 345.
Parria R. Br. 888.
Passerina 1479. 239-242.
Passerina Thunb. et al. 238-239.
Patrisia Rich. 1956. 607.
Patrisia Rich. 607.
Pauletia Cav. 554.
Paullinia 1503. 248-250.
Paullinia L. et al. 247. 248.
Pavia Lam. et al. 166. 167.
Pavonia R. et P. 470.
Pedalium 2142. 768.
Pedicellia Lour. 1507. 252.
Pedicularis 2158. 777-782.
Peganum 1760. 452.
Peganum L. Forsk. 521. 452.
Pekea Aubl. 627.
Peliosanthes Andr. 1274. 103.
Pellinia Molin. 634.
Peltaria 2279. 858.
Peltaria N. L. Burm. et al. 856. 871.
Pemphis Forst. 455.
Penthorum 1729. 432.
Pentstemon Lamb. et al. 812. 813.
Peplis 1324. 135.
Pera Mut. 2001. 627.
Pereskia Forst. 498.
Perilomia Kunth. 2068. 704.
Peripea Aubl. 805.
Peritoma Cand. 1300. 125.
Persea Gärtn. 1523. 267-270.
Personia W. 215.
Perula Schreb. 627.
Petaloma Sw. 1617. 531.
Petiveria 1402. 163.
Petrea 2125. 761.
Petrocallis R. Br. 2284. 863.
Petrocarya Schreb. 1396. 167.
Peumus Perf. 1870. 544.
Phaeocarpus Mart. 1462. 223.
Phalangium Mx. et al. 51. 83. 84. 87. 147.
Phanera Lour. 533.
Pharus 1284. 114.
Pharus Retz. 136.
Phaylopsis W. 827.
Phebalium Vent. Cand. 322.
Phelipaea Tourn. 2206. 818.
Philadelphus 1884. 493.
Philadelphus Ait. 492.
Philesia Juss. 1267. 99.
Phlebocarya R. Br. 1178. 27.
Phlomis 2102. 740-742.
Phlomis L. et al. 743. 744.
Phoberos Lour. 1840. 499.
Phoenix 1339. 158.
Phoenix Cav. 137.
Pholidia R. Br. 2134. 767.
Phormium 1228. 76.
Phormium L. Thunb. 77. 78.
Photinia Lindl. 1856. 508.
Phryma 2055. 694.
Phryma Forsk. 753.
Phyllema Haw. 74.
Physostemon Mart. 1426. 213.
Phytolacca 1744. 441.
Phytoxys Molin. 2081. 716.
Picria Lour. 2252. 843.
Pierardia Roxb. 1484. 243.
Pilophora Jacqu. 624.
Pimela Lour. 125.
Pisonia 1401. 168.
Pisonia Rottb. 126.
Pitavia Molin. 262.
Pitcarnia Herit. 1168. 22-25.
Pitcarnia Perf. R. et P. 23.
Pitumba Aubl. 535.
Pityrodia R. Br. 755.
Platunium Juss. 755.
Plectranthus Herit. 2050. 689-691.
Pleea Mx. 1532. 273.
Plegorrhiza Molin. 1527. 271.
Pleroma Don. 299.
Pleurandra Labill. 1790. 462-463.
Plinia 1818. 478.
Podaliria Lam. 1640. 347.
Podaliria Mx. et al. 347. 348.
Podolobium R. Br. 1647. 349.
Podophyllum 1946. 604.
Podophyllum L. 227.
Podopterus Humb. 1387. 162.
Podoria Perf. 1779. 460.
Pogonia Andr. Labill. 766.
Pogostemon Desf. 2087. 721.
Poinciana L. Kunth. 544.
Polanisia Rafin. 124.
Polianthes 1225. 75.
Polianthes Jacqu. 29.
Pollia Thunb. 1180. 27.
Pollichia Perf. et al. 725. 727.
Polycarpon Walt. 595.

Polygonatum Pursh. 96.
Polygonum 1510. 253-260.
Polygonum Thunb. et al. 136. 251. 253.
Polylepis R. et P. 1843. 499.
Polyphragmon Desf. 1555. 295.
Pomaria Cav. 343.
Pometia Forst. 222. 225.
Ponaea Schreb. 1505. 251.
Pontederia 1192. 42.
Populus 1490. 244.
Porcelia R. et P. 2011. 652.
Porcelia Perf. 639.
Porliera R. et P. 1439. 216.
Portlandia L. 127.
Portulaca 1772. 459.
Portulaca L. et al. 452. 455. 466.
Possira Aubl. 567.
Potalia Aubl. 1540. 286.
Potamophila R. Br. 1331. 136.
Potentilla 1864. 533-542.
Poterium 1979. 611.
Pourretia R. et P. 1169. 25.
Pourretia R. et P. 23.
Prasium 2054. 694.
Premna 2118. 755-756.
Primula Lour. 360.
Prinos 1317. 132-133.
Priva Adans. 2112. 753-754.
Priva Perf. 754.
Prockia P. Br. 1967. 608-609.
Proiphys Herb. 46.
Prosopis 1592. 326.
Prostanthera Labill. 2066. 703-704.
Prunella 2051. 691-692.
Prunus 1816. 476-478.
Prunus Perf. 475.
Psathyra Commerf. 1313. 127.
Psidium 1825. 488-489.
Psidium L. 488.
Psychine Desf. 2304. 880.
Pteracoccus Pall. 465.
Pteronevron Cand. 2310. 884.
Pterospora Nutt. 1550. 293.
Pterotum Lour. 1783. 461.
Ptychosperma Labill. 1989. 623.
Pugionium Gärtn. 2260. 851.
Pulsatilla Tourn. 2044. 663-664.
Pultenaea Sm. 1654. 350-351.
Pultenaea Andr. et al. 349. 352. 353.
Punica 1828. 490.
Purshia Cand. 475.
Puschkinia Adam. 65.
Pycnanthemum Mx. 2083. 718-719.
Pyrola 1574. 516-517.
Pyrola L. et al. 517.
Pyrostoma Meyer. 2123. 760.
Pyrus 1857. 509. 511.
Pyrus Scop. et al. 508.
Pythagorea Lour. 1518. 261.

Q.

Quapoya Aubl. 599.
Quassia 1578. 519.
Queria Löfl. 1681. 358.
Quillaja Molin. 1796. 465.
Quinaria Lour. 314.
Quisqualis 1619. 331-332.

R.

Racoubea Aubl. 612.
Rafnia W. 547.
Rajania 1381. 154.
Rajania Walt. 252.
Ranunculus 2037. 645-658.
Ranunculus L. al. 469. 660.
Rapatea Aubl. 27.
Raphanistrum Andrz. et al. 855.
Raphanus 2274. 855.
Raphanus W. et al. 852. 854. 855. 908. 911. 912. 913.
Raphia P. B. 139.
Raphiolepis Lindl. 1855. 508.
Rapistrum Gärtn. et al. 850. 852. 854. 855.
Ravenala Sonner. 115.
Ravenfara Sonner. 460.
Razumovia* 2194. 812.
Reaumuria 2012. 632.
Recchia Sess. 1689. 360.
Reichardia Roth. 1625. 332.
Reseda 1791. 463-464.
Rhapis L. fil. 1335. 137.
Rhapis W. 137.
Rheedia 1960. 607.
Rheum 1530. 272.
Rhexia 1558. 305-311.
Rhexia Kunth. et al. 298. 299. 312. 313.
Rhinanthus M. B. 2150. 771.
Rhinanthus Lam. et al. 772. 775. 808.
Rhinium Schreb. 630.
Rhipidodendron W. 75.
Rhipsalis Gärtn. 496. 497.
Rhizobolus Corr. et al. 627.
Rhizophora 1476. 235-236.

Rhizophora L. et al. 593. 602.
Rhodiola L. 435.
Rhodochlaena Thuar. 1914. 595.
Rhododendron 1548. 292-293.
Rhodora 1623. 352.
Rhus L. 222.
Rhynchotheca R. et P. 1671. 356.
Richaeia Thuar. 594.
Richardia 1309. 127.
Richardsonia Kunth. 127.
Ricotia 2282. 859.
Ripogonum Forst. 1271. 99.
Rittera Vahl. 567.
Rizoa Cav. 2106. 745.
Robergia Schreb. 1735. 439.
Robertia Merat. 658.
Robertsonia Haw. 362.
Robinia Herit. 548.
Robinsonia Schreb. 1827. 489.
Rocama Forsk. 532.
Römeria Cand. et al. 571.
Rohdea Roth. 1291. 118.
Roridula Forsk. 125.
Rosa 1874. 546-556.
Roscovia Desv. 103.
Roumea Poit. 2014. 632.
Rourea Aubl. 439.
Roxburghia Jon. 1433. 214.
Roydsia Roxb. 1958. 607.
Royena 1686. 360.
Rubus 1862. 527-533.
Rubus L. et al. 504. 526.
Rülingia Ehrh. et al. 452. 455.
Ruellia 2214. 820-826.
Ruellia N. L. Burm. et al. 820. 826. 828. 829.
Ruizia R. et P. 544.
Rumex 1385. 158-162.
Rumex L. 162.
Ruscelia 2192. 811.
Ruta 1580. 320-321.
Ryania Vahl. 1955. 607.

S.

Sabal Adans. 1333. 137.
Sagittaria 2015. 632-633.
Sagus W. et al. 138. 139.
Salaxis Salisb. 1409. 202.
Salmia Cav. 94.
Salpiglossis R. et P. 2230. 836.
Samadera Gärtn. 214.
Sameraria Desv. 856.
Samyda 1666. 555-556.
Samyda W. et al. 554. 555. 556.
Sanguinaria 1944. 604.
Sanseviera Thunb. 1254. 93-94.
Sauvari Aubl. 627.
Sapindus 1504. 250-251.
Sapindus L. 213.
Saponaria 1696. 374.
Saponaria L. et al. 371. 372. 373.
Sarcochlaena Thuar. 1912. 594-595.
Sarracenia 1932. 600.
Sassia Molin. 1427. 213.
Satureia 2085. 719-720.
Satureia L. et al. 695. 698. 718.
Sauravia W. 1982. 613.
Saururus 1406. 169.
Saururus L. 465.
Savignia Cand. 871.
Saxifraga 1694. 361-371.
Sceura Forsk. 763.
Schelhammera R. Br. 1263. 98.
Schepperia Neck. 125.
Scheuchzeria 1360. 145.
Schinus 1711. 591.
Schivereckia Andrz. 875.
Schizochlaena Thuar. 1913. 595.
Schizopetalon Sims. 2328. 916.
Schleichera Roth. et al. 243.
Schmidelia Schreb. 1459. 222-225.
Schotia Jacqu. 1593. 526.
Schotia Jacqu. 327.
Schousboa W. 1621. 532.
Schouwia Cand. 880.
Schradera Vahl. 1314. 127.
Schrankia W. 1416. 207-208.
Schwalbea 2184. 808.
Schwägrichenia* 1175. 26.
Scilla 1217. 66-68.
Scilla Curt. et al. 78. 84. 85.
Scleranthus 1699. 382.
Sclerothamnus R. Br. 1655. 351.
Scopolia L. 236.
Scrofularia 2162. 785-786.
Scrofularia Mut. L. 809.
Scutellaria 2064. 701-705.
Scutula Lour. 1449. 219.
Scytalia Gärtn. 222.
Seaforthia R. Br. 1990. 623.
Sebifera Lour. 266.
Sedum 1730. 433-437.
Sedum Mx. 260.
Seguiera 1959. 607.
Selago 2108. 745-747.
Selago L. 769.

Selas* 1443. 216.
Sempervivum 1809. 468-469.
Semperviuum Jacqu. et al. 435.
Senebiera Poir. et al. 853. 868.
Septas Lour. 827.
Seriana Plum. 1502. 247-248.
Sesamum 2200. 814.
Sesamum Burm. 812.
Sesuvium 1852. 504.
Seymeria Pursh. 2189. 810.
Shepherdia Nutt. 1488. 243.
Shorea Roxb. 1896. 577.
Sibthorpia 2204. 815.
Sibthorpia L. 166.
Sideritis 2080. 713-716.
Sideritis Lam. 734.
Sieversia W. 1866. 543.
Silene 1715. 404-415.
Simaba Aubl. 315.
Simaruba Aubl. 319.
Sinapis 2325. 912-914.
Sinapis Wett. et al. 852. 853. 900. 903. 904. 905. 911. 914. 915. 916.
Singana Aubl. 599.
Siphonanthus L. W. 758.
Sisymbrium 2321. 900-905.
Sisymbrium L. et al. 857. 881. 882. 883. 888. 891. 892. 893. 894. 897. 899. 909. 910. 911. 912. 914. 915. 916.
Sloanea 1964. 608.
Smegmaria W. 1740. 440.
Smilacina Desf. 1259. 97.
Smilax 1272. 99-102.
Smilax Forst. 99.
Sobolewskia M. B. 2258. 850.
Sodada Delil. 1425. 213.
Sonneratia L. fil. 1835. 493.
Sophora 1639. 346.
Sophora L. et al. 347. 348. 349. 353.
Soramia Aubl. 568.
Sorbus Crantz. et al. 510. 511.
Sowerbaea Sm. 1187. 40.
Spallanzania Pollin. 1493. 245.
Sparrmannia Thunb. 1893. 572.
Spathium Lour. 465.
Spathodea P. B. 2227. 835.
Spathodea Kunth. 850. 833.
Spergula 1722. 422.
Spergula Desf. et al. 400. 401. 402. 432.
Spergularia Presl. 400.
Spergulastrum Mx. 394. 416.
Spermacoce W. 127.
Sphaerolobium Sm. 1650. 350.
Spielmannia Medic. 2127. 765.
Spiraea 1850. 502-504.
Spondias 1737. 439.
Sprekelia Herb. 50.
Stachys 2097. 733-737.
Stachys Vahl. et al. 714. 740. 743.
Stadmannia Lam. 1483. 243.
Stanleia Nutt. 2323. 909.
Stellaria 1712. 392-395.
Stellaria Sw. et al. 595. 396. 599. 400. 402. 416. 419.
Stellera L. et al. 239. 241.
Stemmatospermum P. B. 113.
Stemodia 2191. 810-811.
Stemodia W. 771.
Stenochilus R. Br. 2135. 767.
Stenomesson Herb. 48.
Stenopetalum R. Br. 2302. 880.
Sterbeckia Schreb. 1925. 599.
Sterigma Cand. 2271. 854.
Sterigmostemon M. B. 854.
Sternbergia Kit. 1202. 57.
*Steudelia** 591.
Stevenia Adam. 2305. 880.
Stevensia Poit. 1310. 127.
Stigmarota Lour. 632.
Stixis Lour. 1784. 461.
Stratiotes 1807. 467.
Stratiotes L. W. 165. 634.
Streptium Roxb. 2116. 754.
Streptopus Mx. 1265. 98.
Strumaria Jacqu. 1203. 57-58.
Struthiola Thunb. 238.
Stylidium Lour. 235.
Stylobasium Desf. 1673. 357.
Stylophorum Nutt. 1886. 570.
Stypandra R. Br. 87.
Styrax 1539. 285-286.
Subularia 2294.
Subularia Forsk. W. 880. 891.
Succovia Medic. 2267. 853.
Suriana 1732. 438.
Sutera Roth. 771.
Swartzia W. 1878. 567-568.
Sweetia* 1424. 213.
Syagrus Mart. 1351. 141.
Symphorema Roxb. 1418. 208.
Synandra Nutt. 2070. 705.
Syrenia Andrz. 908.

T.

Tacca Forſt. 1294. 118.
Tachigali Aubl. 345.
Talauma Juſſ. 642.
Taliera Mart. 1158. 18.
Taligalea Aubl. 765.
Talinum Adanſ. 1792. 452-453.
Talinum W. 466.
Taliſia Aubl. 1461. 223.
Tambouca Aubl. 359.
Tamonea Aubl. 2114. 754.
Tanaëcium Sw. 2243. 842.
Taonabo Aubl. 595.
Tapirira Aubl. 439.
Tasmannia R. Br. 1921. 597.
Tauſcheria Fiſch. 2276. 856.
Tecoma Juſſ. 2225. 834.
Teedia Rud. 2248. 843.
Teesdalia R. Br. 2287. 865.
Temus Molin. 1974. 610.
Terminalia 1682. 358-359.
Ternſtrömia L. ſuppl. 1915. 595.
Ternſtrömia Cand. 596.
Tetracera 2005. 629-630.
Tetracera W. et al. 568. 597.
Tetragonia 1859. 526.
Tetragonia L. 261.
Tetranthera Jacqu. 1522. 266-267.
Tetrapteris Cav. et al. 389.
Tetrarrhena R. Br. 114. 115.
Tetratheca Sm. 1434. 214.
Tetratheca Perſ. 215.
Tetroncium W. 1389. 163.
Teucrium 2073. 706-712.
Teucrium L. W. 705. 706. 727. 732.
Thalaſſia Banks. 1528. 271.
Thalictrum 2046. 670-674.
Thea 1942 603.
Thermia Nutt. 1644. 348.
Thermopſis R. Br. 348.
Thibaudia Pav. 1553. 294.
Thiga Molin. 470.
Thlaſpi 2300. 878-880.
Thlaſpi Lap. et al. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 880.
Thoa Aubl. 1786. 461.
Thouinia Poit. 1457. 221.
Thrinax L. fil. 1164. 20.
Thryallis 1605. 529.
Thunbergia 2222. 828.
Thylacium Lour. 1953. 606.
Thymbra 2060. 700.
Thymbra Walt. et al. 700. 720.
Thymus 2058. 695-699.
Thymus Scop. et al. 692. 700. 718. 727.
Thyſanotus R. Br. 1244. 89-90.
Tiarella 1692. 361.
Tibouchina Aubl. 506.
Tigarea Aubl. 630.
Tilia 1897. 577-578.
Tiliacora Colebr. 155.
Tillaea Nutt. et al. 260. 261.
Tillandſia 1170. 23-25.
Tillandſia Poir. 25.
Tinea * 609.
Tittmannia Reichenb. 2172. 800-801.
Tococa Aubl. 298. 299.
Todda-vaddi Zanon. 432.
Tofieldia Hudſ. 1361. 143.
Tolvifera Lour. et al. 313. 345.
Tomex W. et al. 266. 267.
Topobea Aubl. 457.
Torenia 2169. 799-800.
Torenia R. B. 800.
Tormentilla L. 539. 540.
Tortula W. 754.
Touchiroa Aubl. 557.
Toulicia Aubl. 251.
Tounatea Aubl. 568.
Touroulia Aubl. 489.
Tourretia Domb. 2233. 857.
Tovaria R. et P. 1399. 167.
Tovomita Aubl. 628.
Toxicodendron Thunb. 1781. 460.
Toxicodendron Gärtn. 222.
Tozzia 2139. 767.
Tradescantia 1287. 115-117.
Tradescantia Sw. 117.
Tragopyrum M. B. 1506. 251.
Trentepohlia Roth. 871. 916. 917.
Trevirania W. 2195. 812.
Trianthema 1698. 581-582.
Tribulus 1589. 524-525.
Trichoa Perſ. 157.
Trichoſtemma L. 719.
Tricoryne R. Br. 1243. 88-89.
Tricuſpidaria Lour. 449.
Tricuſpis Perſ. 1753. 449.
Trientalis 1392. 166.
Triglochin 1366. 145.
Triglochin Vahl. 165.
Trigonis Jacqu. 220.
Trilix 1884. 568.

Trillium 1376. 149-150.
Triopteris 1708. 588-589.
Triopteris W. 589.
Triphaca Lour. 1839. 498.
Triphasia Lour. 1319. 135.
Tripinna Lour. 842.
Tripinnaria Perf. 2244. 842.
Triplaris 1533. 273.
Triftellateia Thuar. 329.
Triftemma Juff. 1557. 305.
Tritoma Ker. 1220. 74.
Triumfetta 1758. 450-452.
Trixago Link. 773.
Trochera Rich. 115.
Trollius 2089. 658.
Tropaeolum 1466. 226.
Tulbaghia 1181. 27.
Tulipa 1209. 62-63.
Tulipa L. 146.
Tupiftra Ker. 1292. 118.
Turaria Molin. 1687. 360.
Turritis 2314. 893-894.
Turritis Leers. et al. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 914.

U.

Unona 2024. 637-639.
Unona Dun. et al. 636. 638.
Urania Schreb. 1286. 115.
Urceolaria Herb. 56.
Uropetalum Ker. 1230. 78.
Urvillea Kunth. 1501. 247.
Ufteria Cav. Andr. 814.
Ufubis Burm. 222.
Uvaria 2025. 639.
Uvaria Lam. et al. 634. 635. 636. 637. 638. 642.
Uvedalia R. Br. 2175. 802.
Uvularia 1264. 98.
Uvularia Thunb. W. 63. 98.

V.

Vaccinium 1421. 209-212.
Vaccinium Hudf. 202.
Valdefia R. et P. 457.
Valentinia Sw. 1485. 243.
Vallea Mut. 1929. 599-600.
Vallota Herb. 51.
Vandellia P. Br. 2170. 800.
Vantanea Aubl. 600.
Vargafia Berter. 1707. 388.
Vateria 1926. 599.
Vatica 1754. 449.
Vauquelinia Bonpl. 1801. 466.
Vella 2293. 870.
Vella Pall. 858.
Veltheimia Gled. 1222. 75.
Veltheimia W. 74.
Ventenatia P. B. 1949. 604.
Veratrum 1379. 151.
Verbena 2109. 747-750.
Verbena Thunb. et al. 751. 752. 753. 754. 763.
Verea Andr. 1511. 260.
Verticillaria R. et P. 608.
Veficaria Lam. 2297. 871-872.
Veficaria Poir. 855. 861.
Viburnum Thunb. 360.
Viminaria Sm. 1660. 353.
Viminaria Link. 351.
Virgilia Lam. 1642. 348.
Vifcago Baumg. 411.
Visnea 1794. 465.
Vitex 2120. 756-757.
Vitex L. 760.
Vitmannia Vahl. 1430. 214.
Viviania Cav. 1616. 331.
Vogelia Hornem. 850.
Volkamera 2124. 760.
Volkamera Jacqu. et al. 758. 759. 760.
Vouarana Aubl. 223.

W.

Wahlbomia Thunb. 629.
Waldfteinia Kit. 1849. 502.
Wallichia Roxb. 1348. 140.
Wallrothia Roth. 2122. 760.
Weihea * 1911. 594.
Weinmannia 1495. 245-246.
Wendlandia W. 156.
Weftringia Sm. 2074. 712.
Wintera Murr. et al. 628.
Winterana Poir. 628.
Woodfordia Salisb. 216.
Wormia Rottb. 2010. 631-632.
Wurmbea Thunb. 1373. 147.
Wurmbea W. 74.

X.

Xanthophyllum Roxb. 1447. 219.
Xanthorrhoea Sm. 1250. 91.
Xenopoma W. 2138. 767.

Xerophyllum Mx. 1363. 144.
Xerophyta Juss. 1269. 99.
Xerotes R. Br. 1374. 147–149.
Ximenia 1444. 216–217.
Ximenia L. Poir. 330.
Xylocarpus Schreb. 1429. 213.
Xylopia 2022. 636.
Xylopia P. B. 638.
Xylosma Forst. 1962. 608.

Y.

Yucca 1191. 41.

Z.

Zaleya Burm. 381.
Zapania Poir. et al. 749. 751. 752. 755.
Zephyranthes Herb. 49. 51.
Zietenia Gled. 714.
Zigadenus Mx. 1369. 147.
Zilla Forsk. 2268. 854.
Zizania 1330. 156.
Zostera Fork. 271.
Zuccagnia Cav. 1603. 528.
Zuccagnia Thunb. 78.
Zwingera Schreb. 1579. 319.
Zygophyllum 1586. 322–323.
Zygophyllum Jacqu. 322.
Zymum Nor. Juss. 1607. 329.